



PARLOR
P. 11
N. 11









Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu



2
102

HISTORIAE

GENERALIS

PLANTARVM,



PARS ALTERA

CONTINENS reliquos novem libros.

*Eodem in hac parte studio, quo in superiore ampla
Plantarum descriptiones digesta.*



LUGDUNI,

APVD GVLIELMVM ROVILLIVM,

SVB SCVTO VENETO.

M. D. LXXXVI.

Cum Privilegio Pont. Max. Cæsareæ Maiest. & Christian. Galliarum Regis.





HISTORIAE

OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS,

In quo describuntur & ad vniuersum depinguntur plantae omnes, quae in
asperis, saxosis, sabulosis & aprici nascuntur.

BURSA PASTORIS,

CAP. I.



CONTRARIAM nunc viam ingredimur. In vndis enim & aquaticis locis stirpes, quanta potuimus diligentia, vestigauimus: nunc in aridis & sitientibus indagamus, & inter saxa rimamur, hic natura non minus quàm illic vires & diuitias suas ostēte, in quibus explicandis à vulgarioribus & notioribus ad rariores & minus notas progrediemur. Et cui non notissima recentiorum & planta & nomenclatura Bursa pastoria, siue pera & Bursa pastoris, Gallicè *Tahouret*, & *bourse de berger*, Germanicè *Deschelkraut*, sic dicta à theculis siue folliculis semen cōcludentibus, marsupii siue crumenę aut cordis

Nomen

BURSA, Pastorii.

effigiem referentibus: nullum enim aliud ei nomen Græcum Latinūve à veteribus positum fuisse sciunt herbarij. Caules habet rotundos, lentos, pedales aut maiores, folia longa, altius incisa, irionis, aut erucę: flores albicantes thlaspi non dissimiles, cui etiam congener est, & folliculos siue marsupiola latiuscula, in quibus semen cōcluditur exiguum, nigrum: radicem longam singularem, & cādidam. Vbiuis copiosissima est, secus vias, urbium areas, locis incultis, asperis & saxosis. Iunio & Iulio mensibus floret. Calida est & sicca tertio ordine. Sanguinem efficacissimè sistit: Nec ideo refrigerare putandum, vt recentiorum quidam non rectè tradiderunt. Nam flores gustanti acrimonia non nihil inurunt. Quare non refrigerādo, sed siccādo cogendoq; sanguinis fluxiones cohibet. Huius herbę decoctum potum alui fluores, dysenterias, sanguinis excreationes reprimat, & eiusdem sanguinis ex vtero, renibus, deniq; quauis ex parte profluvia inhibet, quouis modo sumpta, ita vt scripserint quidam manu

Forma.

Locus.

Tempus.

Dos. lib. i.

cap. 14.

Temper.

Uires.



solum, aut quavis alia corporis parte delatam posse sanguinem sistere. Prodest, inquit Matthiolus, arrira & emplastri modo imposita, inflammationibus, & lacris ignibus. Decoquitur pluuiali aqua cum plantagine, & armenia gleba, bibiturque eius decoctum ad intestinorum difficultatem, & cruentas excreationes. Herbarum succus recentiora vulnera glutinat, & auribus purulenti medetur. Sistit mensum abundantiam, si eius & persicariæ decocto infideant mulieres, esturque ad idem. Denique contra omnes sanguinis fluxiones efficax est, tenui pulicula circumlita, & in oleo frixa. Additur emplastris quæ ad capitis vulnera componuntur, & vnguentis multis.

PILOSELLA,

CAP. II.

Nomina

Genera

Forma



Ecce etiam huius norissimæ herbarum meminisse, nec nomen vllum ei indidisse vereres, aiunt herbarij, quam recentiores Pilosellam appellant à copiosis pilis, quibus tum cauliculi, tum folia vestiuntur, Galli *Piloselle*. Eius genera duo reperiuntur. Est enim Pilosella maior, Germanis propriè *Nihilkraut* nominata, & Pilosella minor, Germanis *Mensgerlin*, vel *Hänselsam* peculiariter dicta. Pilosella maior foliis est per terram graminis modo

PILOSELLA Maior,
Matthioli.PILOSELLA Minor,
Fuchsij.

sparsis candicantibus; hirsutis, oblongis, aliquantum supernè concavis, & autem murinam referentibus: cauliculis villosis, gracilibus, palmaribus, & sesquipalmaribus: floribus luteis, aut pallidiusculis, duplici foliorum ordine: radice digitum longa, multum fibrata. Huic Pilosella altera similis est, nisi multò minor esset foliis parvis, hirsutis, altera parte candidis. In summis cauliculis flores congesti modò lutei sunt, modò rubri, modò fusci, modò varij: radix parua, fibrata. Hanc pro gnaphalio montano describunt alij & depingunt. Etsi quidam Pilosellam dixerint esse Myosotidem, id est, muris auriculam, tamen longè alia est à Myosotide Dioscoridis: nam, ut reliquas dissimiles notas taceam, neque maior Pilosella, neque minor florem

flor. em exruleum velur anagallis obtinet. Pilosellam aliam maximam spectandam nobis dedit Lobellius, quam habuit Syria missam, foliis maioribus, carnosis, densè abmo stipatis, candore & lanugine sericeo ve vellere, Holocerici attractatu, hilarè & specioso aspectu, incanis. Caules ternos quaternosve, quadrangulos, geniculatos, pedales emittit : radicè duriorè, lignosam, fibratam, flores videre non contigit. Hæc Lobellius. Pilosella maior montosis locis, & collibus terrenis nascitur, & agrorum herbidis limitibus: minor in aridis montibus, & locis aliis asperis, & incultis. Maio & Iunio mensibus potissimum florèt. Calidas & siccas esse Pilosellas gustus demonstrat. Habèt enim adstrictionè cum exigua quadam acrimonia coniunctam, vt hoc nomine ad purificanda & glutinanda vulnera mirè sint utiles. Ferunt enim foliorù farinam id strenuè efficere. Herbar recentis succù exprimunt ad cohibendos quartanæ febris horrores. Eodè tingunt gladiorum aciem, vt omne ferrum aliud domet, secetque. Ferrum enim quod eius succo commaduit, tantam contrahit duriciam, vt chalybis acie respuat. Sunt qui huius herbar radicè Maio mense effossam, siccaram, & in puluerem redactam ac potam, aut in cibo datam, efficacissimum esse aduersus ramicem remedium tradunt. Pilosellæ vis est præsentissima ad calcalum. Huic plantas duas & forma & facultate affines misit Myconus ex Hispania. Prior & minor passim in pra-

Locus.

Tempus.

Temper.

Ex Ures

Fach. c. 390.

PILOSELLA Maxima,
Syriaca, Lobelij.



TVBERARIA Maior,
Myconi.



TVBERARIA Minor,
Myconi.



tis reperitur, & terrenis locis pinguibusq; , folia habet plantagini similia , sed multo minora , humi repentia , villosa : caules dodrantes , rotundos , inanes , hirsutos , in quibus per intervalla folia sunt bina , exigua , caulem ambientia , minora iis quæ circa radices humi iacent : in caulium vertice flores luteos , in quorum medio putpureum quiddam est in nigrum vergens : semen in exiguo folliculo dilapso flore statim conspicitur , radix admodum parva est , tenuis , nonnihil fibrata . Tota herba hirsuta est : totius etiam sapor adstringit cum siccitate . Castellani eam *Terna Turmera* vocant , id est , Herbam Tuberariam : quoniam ubi illa crescit , tubera frequentissime reperiuntur . Quæ si veteribus cognita fuerit , eam esse suspicatur Myconus , quam apud Athenæum Pamphilus hyduophyllum vocat , quia læpissimè tubera demonstrat : unde nomen Tuberariæ ei , quæ hic picta est , à Castellanis indicum . Altera à Mycono Tuberaria maior dicta , quod foliorum & florum figura , hirsutis , & facultate superiori sit similis , magnitudine tantum distans , in locis siccis nascitur , foliis multis , plantagini similibus , minoribus tamen , hirsutis , humi iacentibus , & vix à terra sese attollentibus : caules multos fundit , subhirsutos , rotundos , in quibus folia sunt per intervalla , caulem amplectentia , minora iis quæ humi repunt . In caulium summitate flores visuntur lutei : deinde semen folliculo inclusum . Radix lignosa per summa cespitum spargitur . Tota herba aliquantum pilosa est , eiusque sapor adstringens , maioris quam superior efficacis .

ANCHUSA, CAP. III.

Nomina

De morb.
multeb.

Lib. 4. c. 42.

Lib. 7. c. 17.

ΓΧΟΥΣΑ similiter Latinis Anchusa dicitur , Officinis Alcanaz radices , Gallis *Orcanette* , Hispanis *Soagem* , Germanis *Kooloschenzung* . Hippocrates *χρυσίδα τὴν μακρὰν* , & *χρυσίδα τὴν μικρὰν* nominat . Galenus in glossis *τὴν ὀγχουσαν* interpretatur , atq; sic etiam appellari scribit . Paulus anchusam quæ spinosam , & latam , & nigrum folium habet *χρυσίδα* . Spor appellari dicit , & alibi anchusam *chaetospelethron* , onoclea esse ipse exponit , significat autem hæc vox iugerum porcinum . Verbum Græcum *ἄγχουσιζεν* , quod

ANCHUSA Prima,
Mantidli.

Genera.
Lib. 4. c. 42.

Lib. 6. sim.
Lib. 11. c. 20.
Lib. 4. c. 42.
Forma.

Pet. P. n.
in Ada.

In Theria.



est fucare & colorare formam , huic herbæ nomen fecit , ob radice sanguineum floridumve colorem , in signum nimirum eius tarâmque : hanc in aliis plantis coloris notam , cuique anchusarum cognitionem acceptam referte debemus : vix enim innotuissent tum propter magnam cum echis , lycopside , buglossis similitudinem , tum propter incertam , & minus perspicuam foliotum in Dioscoride delineationem , ut dicemus . Is tria anchusæ genera facit . Vnam quæ alio nomine Calix , & Onoclea appellatur , alteram quæ Alcibiadion , & Onochiles , tertiam huic haud dissimilem . Galenus his quartum genus addidit , lycopsim . Plinius Pseudanchusam . Anchusa prima , ut describit Dioscorides , folia habet lactuæ , in acumen fastigiata : sic vertit Ruellius , cum tamen Græci codices , & Oribasius habeant , *τὴν ἀνὸν φάλαγξιν ἔχουσαν τὴν ὀνυχίδα* , id est , folia habet lactuæ , cui acuta sunt folia , simili quod nonnullis accipiendum videtur de lactuæ agresti , quæ hirsutior est , & horridior . Etiam Nicander lactuæ foliis Anchusæ folia comparat hoc versu .

Δι

Δη γαρ ὃν ἀγγέλου θριβλακίδα λεῖστο χαίτη.

Mest, summo Anchusæ similem lactucæ comā) hirsuta, aspera, nigra, multa (additur in veteri codice *μεγάλη*, id est, magna, & ita Oribasius habet) quoque uersum à radice per terrā sparśa (*προσπελασμένη* τὴ γὰ dixit Dioscorides folia anchusæ, quam similiter Theophrastus in iis numerat, quæ *ἐπηβύουλα* vocat, id est, folia per terram spargentia, Gaza ab radice foliata conuertit) spinosa. Radix est digiti crassitudine, quæ æstate prouenit, ac manus inficit sanguineo colore (Ruellius sic interpretatus est Græca, ut leguntur in vulgatis codicibus, τὴν χροὶν ὕψατος ἐν τῷ θίρει γινώσκουσιν, καὶ βέβαιον τῶ χέρας. legendum, ἐν τῷ θίρει γινώσκουσιν. Plinius legisse videtur siue apud Crateuam, siue apud Dioscoridem: ἐν τῷ ῥίζῃ διακρίνεται ὁ πικρὸς τῶν χροῶν ὕψατος, ὡς πικρὸς χροῶν ἐν τῷ θίρει γινώσκουσιν, καὶ βέβαιον τῶ χέρας. quæ in veteri codice And. Lat. sic legi affirmat, τὴν χροὶν ὕψατος ἐν τῷ θίρει γινώσκουσιν, καὶ βέβαιον τῶ χέρας. Quod est, quæ per æstatem gustata colore sanguineo suffunditur manūsq; tingit, &c. Quæ lectio, inquit, ille, alteri præstat. Nam dicere Anchusæ radicem prouenire tantum æstate, videtur ineptum, cum omnes omnium plantarum radices proueniant quauis tempestate. Marcellus ex antiquissimi codicis fide, pro γινώσκουσιν instaurauit γινώσκουσιν, ut intelligat Dioscorides non toto anno, sed æstate tantum hanc radicem eo colore esse, tuncque dignosci & deprehendi certò posse. Sed & vulgata lectio Latine sic reddi potest, sanguinei coloris æstate fit, & manus inficit.) Nascitur in pinguibus locis. Eam ex Matthiolo sic expressimus. Anchusæ altera quam aliqui Alcibiadiōn, vel Onochilos vocarunt, à ptiore distat, quod minora folia habeat, sed æpera similiter ramulos tenues, in quibus flos purpureus in puniceum vergens (sic interpretatur Ruellius *κόκκινος πορφυροῦς ἐκ πορφυροῦς*), id est, flos purpureus subpuniceus. Oribasius legit, ὁ χροῶν, id est, aut puniceus) radices rubras, benè lōgas, quæ circa messes sanguineum succum habent. Gignitur in arenosis locis. Est etiam ex Matthiolo hic appicta. Item tertia quæ secundæ similis est, nisi q̄ florem minus puniceum habeat. Plinius de trabus Anchusæ generibus diuersis in locis scribit. De prima hæc. Et Anchusæ radix in vŭ est, digitali crassitudine. Finditur papyri modo, manusq; inficit sanguineo colore. De altera verò sic tradit. Est & alia herba proprio nomine Onochilos, quam aliqui Anchusam vocant, alij Architelion, alij Onocleam, aliqui rhexiam, multi Anchusam, paruo frutice, flore purpureo, asperis foliis & ramis, radice melisibus sanguinea, cæterò nigra, in sabulosis nascens. Et mox addit etiam de tertia Est & alia huic similis, flore rubro, minor, & ipsa ad eōdem vŭsus. Pseudanchusam verò primæ Anchusæ subiunxit. Est & alia similis, Pseudanchusæ ob id appellata, à quibusdam verò Enchusæ, aut Doris; &c. Cum Anchusæ primæ florem cæruleum in puniceum vergentem tribuant herbarij, secundæ

ANCHUSA II. Matth.



& tertiæ huic simili florem purpureum, aut subpuniceum, lycopsidi, quæ etiam Anchusæ generibus adnumeratur, purpurascens, id quod hic ex Dalechampio proponimus, ab omnibus his generibus floris luteo colore diuersum flauendum est. Nascitur in sabulosis propè Lugdunum, & qua Lugdunò itur Va-

ANCHUSA III. Manb.



lentiam Allobrogum, in aridis campis circa D. Ramberti pagum, radice longa, crassa, sanguineo succo manus ringente, foliis Onocleæ, hirsutis, circa radicem multis, caule pede altiore, lanuginoso: flore oblongo, cauo, luteo, digitalis simili. Describitur etiam à Pena Anchusa lignosior, angustifolia, omnium minima, & vix Anchusa habenda, inquit, ut cuius radix nihil aut parum sit purpurea, fundens cauliculos sesquipalmares, lignosos, satureix: foliola oblonga, Alcibiadij Anchusæ minora, minusq; hirsuta: flores non multum absimiles, pusillos, cæruleos. Hæc radix lignea est, ex fusco rufescens parum aut nihil inniciens. Marginibus agri Frontignani, & Valenzæ silvæ hæc interdum occurrit. Non omnes Anchusæ iisdem facultatibus viribusve præditæ sunt. Primæ radix adstringendi vim habet, inquit Dioscorides, faciens ad ambusta & vetera ulcera cum oleo & cera coctæ: erysipelata cum polentra imposita sanat, & vitilignes & lepras cum aceto admota. Eadem apposita scortus detrahit.

ANCHUSA Lutea,
Dalechamp.ANCHUSA Lignosior,
Pena.

Lil. c. 20.

Ad decoctum ipsius datur ictericis nephriticis, splenicis, febrientibus quidem cum aqua mulsâ. Folia aluum sistunt cum vino pota. Utuntur vnguentarij radice ad spissanda vnguenta. De eadem hæc Plinius. Sanat ulcera in cerato, præcipue

Cinnam, item adusta. Liquari non potest in aqua, oleo dissoluitur, idē, sincerum
 experimentum est. Datur & ad renum dolores drachma eius porri in vino:
 aut si febris sit, in decocto balani. Item iocinorum vitis & leuis, & bile suffusis.
 Lepris & lentigini illinitur ex aceto. Folia trita cum melle & farina luxatis inpo-
 nuntur, & pota drachmis duabus in multo aluum siliunt. Pulvis necare radix in
 decocta traditur. In quibus Plinius vlcera senū dixit, quæ Dioscorides *παλαιοί*
 idest, vlcera antiqua: deinde balani decoctum pro aqua multa: mox lentigini
 vox supposita est pro vitiligini. Dioscorides enim habet *αλπος & λιπας*, idest,
 vitilignes & lepras: postremo cum multo dixit, pro vino. Cæterum quod Diosco-
 rides dixit vnguentarius radice Anchusæ vitā spissanda vnguenta, Plinius de
 vnguentis tractans ad colorem retulit his verbis. Tertius inter hæc est colos à
 multis neglectus: huius causa adduntur cinnabari & Anchusæ, &c. Secundæ An-
 chusæ vis foliorumq; ipsius est, eodem Dioscoride auctore, vt demorsis à serpen-
 tibus, & maximè à viperis auxilietur, siue edantur, siue bibantur, siue adalligentur:
 & si quis manducata in os serpentis inspuat, ipsum occidet. Eadem Plinius, at-
 que alia quæ Dioscorides non habet, tradidit. Efficax, inquit, contra serpen-
 tes, & maximè: viperas, & radice, & foliis, æquè cibo ac potu. Vires habet inef-
 fibus. Folia trita odorem cucumeris reddunt. Datur in cyathis tribus vulua pro-
 cedente. Pellit & tinea cum hyssopo: & in dolore renum aut iocinoris ex aqua
 multa, si febris sit: sin aliter, ex vino bibitur. Lentigni ac lepris radix illinitur
 habentes eam à serpentibus feriri negantur. Tertiæ Anchusæ semen manduca-
 tum, vt Dioscorides tradit, si quis in os serpentis expuerit, ipsum necabit: radix
 acetabuli mensura cum hyssopo & nasturtio pota latos lumbricos expellit. Plin-
 ius, est alia, inquit, huic (secundæ Anchusæ sub.) similis, flore rubro, minor, &
 ipsa ad eisdem vlus: traduntque commanducata ea, si inspuatur, mori serpen-
 tem. Galenus verò enucleatius & magis distinctè, vt solet, vires omnium sic
 declarat. Onoclea radicem habet simul adstringentem & subamaram, corporibus
 condensandis, & modicè extenuandis idoneam, tum abstergēdis quoq; & abluen-
 dis biliosis & salis succis. Dictum est enim suprā, quod qualitas acerbā mixta
 amaritudini ea præstare queat. Sic sanè aurigini, & lienosis, & renum affectibus
 est vtilis. Sed & refrigerare idonea est. Et sanè cum polenta illita iuuat erysipelata,
 & abstergit non modò epota, sed & foris imposita. Proinde vitilignes & le-
 pras sanat cum aceto. Ac radicis quidem hæc opera sunt, & operum facultates,
 quas diximus. At folia ipsius herbæ radice quidem sunt imbecilliora, non
 tamen aliena sunt à resiccatione, & adstrictione: itaque etiam profluxuum sanant
 pota cum vino. At Onochili & Alcibiadij cognominatæ vis magis est medicata.
 Nam & gustu protinus maiorem habet acrimoniam, & eos qui à viperis morfi
 sunt, admodum iuuat, tum illita, tum suspensa, tum esā. Reliqua verò quæ parua
 est, & ferè nomine caret, ferè ex illis sola Alcibiadiū quidem per similes idē, verum
 & amarior, & magis medicamentosa, ac proinde ad latos lumbricos idonea,
 oxybaphi mensura, cum hyssopo, & nasturtio pota.

Cornat.
Embl. 11.
lib. 4.

Lib. 4, ca. 2.

ibidem.

Litt. C. 10.

Ibidem.

Число

1.45 mol

Nomina
L. & simpl.
L. 4. cap. 24.



ST Lycopsis Galeno anchusæ quarta species. Hanc etiam anchusam vocari testatur Dioscorides. Dicta autem est Lycopsis ob radicis fuscum ex purpureo colorem, quasi fuscedo, seu obscuritas quædam, qualis est summi diluculi, & primæ lucis, quæ ortum solis præcedit, vel vespertini crepusculi, vulgo nostro, *Entre chien & loup*, nominata: Græcis λυκόπους à lupo, cuius color cinereus est, nigrorem præferens, sed non intensiorem: nisi si quis ab hispida caulis, foliorum, & florum, impexaq; hirsutie, pedem lupinum referente, herbam Lycopsin nuncupatam fuisse malit. Multi, inquit Ruellius, Lycopsin hanc esse putant, nec abs re, quam vulgus herbariorum appellat Linguam canis. Horum sententiam refellit Matthiolum, quod Lycopsis, ut describit Dioscorides, folia habeat lactucæ similia, longiora, asperiora, crassa & latiora, circa radicis caput prolapsa, caulem longum, rectum, asperum, propagine multas emittentem, cubitales, asperas, & in iis flores paruos, purpurascens, radicem rubram, Linguz canis autem radix candida sit, non rubra: folia lævia, non aspera, sursum spectantia, non ad terram recidentia, caule molli, non scabro. Sed aliam genuinā, videlicet Dioscoridis Lycopsin ipse, nec depinxit, nec descripsit, ait duntaxat se credere Lycopsin herbam esse anchusæ non absimilem, quam ideo non temerè Galenus & Aëtius cum secutus in anchusarum genera retulerunt, seq; Lycopsin legitimam vidisse sæpius in campestribus, sitientibus, aridisque locis enatam, anchusæ adeo similem, ut vix ab ea discerni possit. Lonicerus Lycopsin aliam hic depictam siluestris videlicet buglosi speciem descripsit. Nascitur, inquit, in campestribus: caulibus longis, hirsutis: floribus purpureis: foliis lactucæ, longioribus, asperioribusq; circa radicem recidentibus, adnatis in summo multis. Denique echio similis est, nisi quod omnia minora habet. Periti herbarij longè aliam Lycopsin ostendunt, eam scilicet herbam, quam Matthiolum verum Cynoglossum esse censet, ut fusiùs alio in loco diximus. Radix Lycopsidis adstringit, inquit Dioscorides, cum oleo im-

Lib. 3. c. 89.

Cap. 24. li. 4.
L. 4. cap. 24.
Forma.

LYCOPSIS Loniceri.



Pet. Pen. in
Ad.

Lib. de pl.
quæ in ven-
brof. &c.
cap. 27.
L. 27. cap. 11.

L. 4. simpl.

posita vulnera sanat: cum polenta verò erysipelata. At si cum oleo trita illinatur, sudores mouet. Plinius, Lycopsis, inquit, longioribus quàm lactuca est foliis, crassioribusq; caule longo, hirsuto, adnatis multis, cubitalibus: flore paruo, purpureo. Nascitur in campestribus. Illinitur cum farina hordeacea igni sacro: sudorem in febribus mouet, succo aquæ calidæ admixto. Hæc Plinius ferè ex Dioscoridis sententia. Galenus verò, Lycopsis, inquit, refrigerat & deficcet, magisque quàm onoclea adstringit.

ECHIVM,

CAP. V.

Nomina



XION, ἑχινάδιον, & ἑχινάριον Græcis, Apuleio *Tricampylon*, & ἑχιδνιον, Latinis Echium, Alcibiadium, & Alcibion, Serpentaria, & Viperina. Vulgus herbariorū silvestre Buglossum vocat, quod sequentes Germani *Vuildochsenzungen* appellant, Galli *Borache sauvage*, l'herbe aux vipères,

Herbe aux serpents. Dictum est Echium teste Dioscoride, quod semina habeat
 capite apertis similia, quo indicio facissima natura homines commonescere
 faciat hinc aduersus viperarum & ceterarum venenarum bestiarum mor-
 tualem eam esse. Aleibiadion autem siue Alecium ab inuentore Alebio, ut scri-
 bit Nicander. Is enim cum dormiens in extremo inguine a vipera ictus esset, ex-
 iectus a somno succum huius herbe commanducando, palato & dentibus expres-
 so, haustoque in corpus, mansit vero herbe reliquum vulnere imposuit contra
 doctorem, quo medicamento sanus euasit. Sed quum Dioscorides Echium vocari
 Aleibiadion scripserit, Nicander etiam Alecium, mirum est Plinium dixisse Ale-
 cibium, quod qualis esset herba apud auctores non reperi. Sed radicem eius & folia
 circa ad serpentis morsus imponi & bibi iubent, &c. Echij vniuersum duntaxat memi-
 nit Dioscorides, Plinius duorum eius generum his verbis. Echios vtriusque gene-
 ris Pulgionis foliis coronata, drachmis duabus ex vini cyathis quatuor datur.
 Item altera, quae lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula viperarum similia sunt:
 haec ex vino & aceto. Haec Plinius Nicandrum fortasse imitatus, qui Echium
 vnum tantum spinoso folio, simili Anchusae, parua & modice in terram descen-
 dens radice. Alterum foliis & semine viride, & alterum, modico circum floscu-
 lo, parua specie: cui semen est viperarum forma, durumque supernè caput. Quo
 loco Nicandri Scholiastes Numenium citat, qui in Theriaco duo etiam Echij
 genera fecerit vnum minus, Ocimoides nomine, quod folia ei sint Ocimo simi-
 lia. Sunt etiam herbarij qui Echij plura statuunt
 genera, ut dicemus. Echium Dioscoridis folia
 habet oblonga, aspera, aliquantum tenuia,
 Anchusae proxima, minora tamen, subrubra &
 pingua, spinulas tenues incumbentes, quae
 etiam folia exasperant: cauliculos renes, mul-
 tos, & ab his vtrunque foliola minuta, expassa,
 nigra, in summo caule proportionem minora:
 flores iuxta folia purpureos, in quibus semina
 capiti viperarum similia insunt. Radix digito
 tenuior est, & subnigra. Haec herba Plinii Pseu-
 danchusae videtur esse. Sic enim is de ea scribit.
 Est & alia similis (Anchusae) Pseudanchusae ob
 id appellata, à quibusdam verò Anchusae, aut
 Doris, & multis aliis nominibus, lanuginosior,
 & minus pinguis, tenuioribus foliis & langu-
 dioribus, &c. Echium hic ex Marthiolo depic-
 tum ubique ferè prouenit, in aridis praesertim
 & asperis locis, secundae Dioscoridis Anchusae
 non ab simile. Flores profert in rubrum purpu-
 rascentes inter minuta folia, ab medio caule ad
 summum, è quibus semen prodit nigrum, hirsu-
 tum, spinosisque inuolutis inclusum, vipera-
 rum capitibus simile. Lonicerus vulgare Bu-
 glossum, quo officinae vtuntur, Echium Dioscoridis esse putat, describitque his
 verbis. Folia circa terram nascuntur, oblonga, tenuia, aspera quae, cuiusmodi
 etiam in Anchusae conspiciuntur, aliquanto tamen minora, & crassa: caules vtri-
 que à terra foliis tenuibus, pennatis, linguae similitudine in acutum exeuntibus,
 versus caulis summitatem minoribus sunt vestiti. Flores habet purpureos, stella-
 tos, quia caeruleos tandem mutantur. Semen flore decedente inuenitur rugosum
 & longius

ECHIVM Marthioli.



In Theriaco

Lib. 17. c. 6.

Lib. 4. c. 25.

Lib. 1. c. 69.

Genera.

In Theriaco

Lib. 4. c. 25.

Forma.

Lib. 11. c. 10

Locus.

Tomus 2.

cap. 73.



ECHIVM montanum
Dalechampij.



Cap. 101.

Locus.

Vires.

Lib. 4. c. 25.

Lib. 5. sim.
cap. 10.

& longiusculum, cuiusmodi in tymphyto, sed maius forma caput serpentis referens, gustu dulce. Porro alias duas Echij species idem addit, quibus forma fere similis est, ac folia Echij superioris similitudinem referunt, in altero tamen minus hirsuta: flore caruleo, quas Echij siluestris nomine appellat. Id cuius folia sunt magis hirsuta, Echium est à Fuchsis descriptum, & depictum. Hic quoque depictam plantam herbarij Echium montanum vocant, alij Alopecurum montanum. In montium vdis recessibus gignitur, radice crassa, sensim gracilescente, nonnihil furculosa: caule singulari, terete, rubro, tenero, pedali: folijs Echij, sed non ita asperis, hinc inde è caule produntibus, & cum circumuoluentibus, in vertice densius confertis ac stipatis caudæ instar: flore pallido, oblongo, vasculi instar, in caulis cacumine è medijs folijs sese proferente, tenuibus hilis geminis præpilato. Rara quidem certe & aspectu pulcherrima hæc est planta. Echij radix, auctore Dioscoride, non modò morsis à serpentibus cum vino pota auxiliatur,

sed etiam eos qui præbiberunt. conseruat ne feriantur. Idem præstant folia & semen. Sedat dolores lumborum, & cum vino aut foris ne sumpta lac adtrahit. Hæc Dioscorides. Ex quibus colligere licet Echium esculidum esse, citra tamen insignem siccitatem, quod lactis procreatricem facultatem habeat. Medicamenta enim Galeno auctore, quia pituitosos humores calfacientia in sanguine

percutiunt verum, lac gignere solent. Galenus in libris simplicium medicamentorum Echi non meminit, sed Paulus ex Dioscoride his verbis. Echium spinosum herba est, quæ non modo à serpente demorsis cum vino pota auxiliatur, sed præsumentes quoque percuti non patitur. Plinius Pseudanchusam, quam Echium Dioscoridis videmus diximus, eandem terè vires tribuit. Radix, inquit, oleum non fundit, sed rubentem succum, (Cornarius ex vetere codice emendat, Radix in oleum non fundit rubentem succum: vius contrarium paulò antè de vera anchusâ dixit, sanguineum scilicet fundere succum, & oleo dissolui, aqua verò non posse liquari. Quidam legunt: Radix illius non fundit rubentem succum, &c.) Et hoc ab anchusâ discernitur. Contra serpentes efficacissima, poru foliorum, vel seminis. Folia ictibus imponuntur: virus serpentium fugat. Bibitur & propter spinam. Cornarius ex veteri codice legit, Virus serpentes fugat: quòd de odore eius dum suscitatur, intelligit. Quod vero dicit, Bibitur & propter spinam, videtur id esse quod Dioscorides ait, τὸ πῶς ἀλγῆται. Sedat & lumborum dolorem.

Embl. 13.
lib. 4.

ibidem.

ONOSMA,

CAP. VI.

O NOSMA Græcis Latinisq; dicitur, & Galeno teste Osma, vel Phlomis, vel Ononis. Folia habet, inquit Dioscorides, similia anchusæ foliis, longitudine quatuor digitorum, latitudine vnus, per terram intrata, simillimo anchusæ modo. Est autem sine caule, sine flore, sine semine. Radix subest oblonga, infirma, tenuis, modicè rubra. Nascitur in asperis locis. Eadem serè Plinius habet. Onosma longa folia habet serè ad tres digitos, in terra incutia, tria, ad similitudinem anchusæ incisâ, sine caule, sine semine, sine flore. Ex qua delineatione nullus est rei herbariæ peritus qui non coniciat Onosma in anchusam habendum esse, & Lycopsidi, cognatum, quemadmodum & pictura ipsa demonstrat. Folia eius, inquit Dioscorides, in vino pota fœtus extrahunt: prægnans si supergrediatur abortum illi facere dicitur. Eadè Plinius tradit. Prægnans si edat eam aut supergrediatur, abortum facere dicitur. Constat enim, vt scribit Galenus, ex acri & amara substantia: quare creditur fœtus necare, & eicere, foliis eius in vino potis.

Nomina
Lib. 6. simpl.
Lib. 3. c. 190.
Forma.

Locus.
Lib. 7. c. 112.

Vires.
ibidem.
Lib. 6. c. 112.

Lib. 6. simpl.

ONOSMA, Matthioli.



SCABIOSA MONTANA,

CAP. VII.

O MEN Scabiosæ de multis plantis dici sciunt herbarij, vt & de iis quæ hic depinguntur, vt de ea quam montanam & capitatam cognominant. In terrenis collibus alpinis provenit, radice crassâ, nigra, valde fibrata, sic se cæsiore aduoluentibus radiculis aliis, vt in mali figuram quandoque rotundentur: foliis centaurij minoris aut erucæ, crassis, asperis, laciniatis, caule cubitali, interdum proceriore capitulis cyano aut centaurio magno similibus, squamosis: flore puniceo purpurascente: semine oblongo, papporum molli lanugine obuoluto. Scabiosam aliam maiorem vulgarem pinxit Lobellius, Pena descripsit verbenæ Dioscoridis similem, sed latioribus foliis, pullis, hirsutis, in terram procumbentibus, & altioribus incisuris, nec tam Verbenam quàm maiore Valerianam exprimentibus. Radix simplex, longior caulem sæpius singularem,

Nomina.

Locus.
Forma.

SCABIOSA Montana,
Dalechampij.



Scabiosa
peregrina
Lobellij.

Pena in
Advers.

quantum serrata: flores Globulariæ aut Scabiosæ. Non omittenda hæc pictura à Lobellio posita Scabiosæ raræ & peregrinæ elegantia, quæ hæcenus incognita non nisi in hortis quibusdam Belgicis spectatur, facie & virgultis Valerianæ rubræ, sed floribus & semine Scabiosæ Hispanicæ. His adiecit Pena Scabiosam omnium mi-

SCABIOSA Peregrina,
Lobellij.



SCABIOSA Maior vulgaris,
Pena. & Lobellij.



niniam

SCABIOSA *Montana, omnium montium, Pena.*



nimam, quæ in montibus cretaceis & incultis provenit, cauliculos habens paucos, sesquipal-
mum pedémve altos, foliis in imo sæpius dona-
tos, angustioribus, floribus dilutæ purpuræ &
squamosis capitulis. Alias plantas hic adscri-
bemus, quas Clusius ad Scabiosas seu laceas re-
ferendas putat: quarum primam & secundam
Salmanticensis Stœbes nomine donarunt. Pri-
ma laceæ nigre similis folia per terram expan-
sa habet, Scabiosæ, laceæq; foliis, latiora, ad ci-
chorij folia accedentia, mollia, lanuginosa, &
interdum candicantia: aliquot ex eadem radice
caules, cubitales aut ampliores, multis alis bra-
chiatos, quibus inhaerent minora minulq; dis-
secta, & mucrone quodammodo spinoso, spi-
nosa folia: flores in summis ramis villosos, pur-
pureos, & calicibus squamosis, semen subru-
tum, cœtaurij maioris æmulum, sed minus. Radix
est longa, candida, digiti interdum crassitudine.
Huius generis aliam inveniri tradit omnibus
foliis mollibus & lanuginosis, & erucæ inodo
laciniatis, caule infirmo, ramofo, & in terram
procumbente, cuius flores superioribus maio-

*Lib. 4. stirp.
Hisp. cap. 4.*

res, barbulis exterioribus cyani æmulis, sed purpureis, villi quibusdā luteis inter-
mixtis, medium florem occupantibus: semen superiori simile, vel cyanocradix digi-
talis, candida. Secunda numerosa promit folia, secundum radicem, humi sparsa, in-
cana, oblonga, magnis & profundis incisuris, ut in nonnullis Scabiosarū generibus

SCABIOSA, Seu Stœbe
Salmantica prior, Clus.



STOEBE *Salmantica
altera, Clusij.*



BBb 2

SCABIOSA Hispanica,
Clusij maior.



extrema folia utcumq; acuminata sunt: sed & alterâ prioris generis ad cyanos referrebât, altera etiâ pro Scabiosâ utebâtur. His addit Clusius Scabiosâ Hispanicâ, quæ vulgaris Scabiosæ folia similia habet, laciniata, & altè incisâ, mollia, lanuginosa: caules rotundos, nodosos interdum cubitales, è quorum geniculis folia bina

aut erucæ: caules plerumq; cubitales, locis autè frigidioribus & humidioribus bicubitales, aut maiores, in irrequentes ramos diuisos, folia per ramos sparsa, altè quidem incisâ, uti ea quæ ad radicem nascuntur, sed minora multò & breuiora, & in molles quosdam aculeos desinentia: ramorû fastigio insident caliculi argenteis velut squamis cõpacti, vnde flos exilit cyani forma, sed purpuræ dilutioris, & medio villosus: semen lanugine quadam includitur ut in lacearû generibus, exiguum, nigricans, summo capite villosum: radix singularis, crassâ, & nonnûquam fibrata. Alia autem in hortis Belgicis alitur semine è Gallia missò, huic adeò similis, ut ab ea, nisi à peritiioribus vix dignosci possit: etenim solis caliculis, qui tam eleganti argenteo colore non splendent, secernitur. Nascuntur omnes præter postremam, Salmanticè si agro frequentes in aruorû & vinetorû marginibus. Postretum in Gallia, tum in Viennensi agro copiosè. Florent omnes Iunio, Iulio, Augusto: deinde semen proferunt. Salmanticensis, ut diximus, priorem & alteram Stæbes nomine appellabât,

SCABIOSA Montana calidarum
regionum, Lobell. & Pen.



SCABIOSA Media,
Lobelij.



inter

inter se opposita, summis ramis capitula insidēt ex multis caliculis membraneis & copiosis, qui singulos flores continēt candicātes, quibus deciduis, in medio nisi singulorū caliculorū umbilico, exigua quædā stella subnigra cōspicitur, quæ, quin præter sex radiolis constans: paulatim verò hi caliculi excrecentes expanduntur, donec semen hirsutū & crassum (quo caliculi sustinētur) maturefcere incipiat: radix cādida, crassa, vulgari similis. Alia inuenitur, inquit Clusius, huic petasimili, & sola magnitudine distā: est enim per omnia minor, foliisq; tenuius incis: caliculi & flores minores, & ex caruleo colore purpurascētes. Crescit vtraq; iuxta vinearū margines & semitas, locisq; incultis agro Salmanticensi & per reliqua Hispaniæ. Florent mense Iunio. Amara sunt, ideoq; caloris & siccitatis participes.

SAXIFRAGA, CAP. VIII.

N VLTIS plantis Herbarij Saxifragæ, Officinis Saxifragæ dictæ, nomen imposuerunt, a mitifica in comminuendis frangendisq; calculis vi & efficacia. In quibus quædam sunt veteribus Græcis, Latiniq; fortassis incognitæ. Sed de Dioscoridis Saxifraga primum tractabimus, Saxiphagæ, inquit, aliqui Satxiphagæ, vel, ut in vulgari Græcis legitur, Sarxiphagæ, alij Sarxiphragæ, alij Empetrum, Romani Saxifragam vocant, frutex est fuscus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino morbus febri, tantibus opitulatur: stranguriæ prodest, singulorū sedat, calculos velicæ tangit, & vrinam cieit. Huic tum facie, tum viribus tam aptè cōuenit, quæ hic

Nomina

Formæ.

SAXIFRAGA Vera, Diosc.



ex Matthiolo appicta est, vsgenuinā esse nemo nunc dubitet. Nam in atidis, montosis, saxosis, sterilibus & sabulosis Italiæ, Delphinatus, Gallicæ, Angliæ locis, vbi Polium montanū & Thymum, prouenit: ramulis in summo sparsis, pedē altis, multis, crebris, exilibus, serpilli, in imo cōtortis vnā & implicatis, geniculatis, in quibus foliola bina ex geniculis, in summo lōgiora & angustiora, Tunica: in singulis singuli flosculi, oblongi, quadātenus Tunica: summa ora fimbriati, vel apiculis tenuibus crenati, vbi semen subrubrum, rotundū, exiguum. Radix est patua, non multis fibris huc illuc sparsis capillata, albicans. Huic magna est cum epithymo similitudo: Matthiolus tamen non rō *tristitia*, sed rō *visu* in quibusdam codicibus legi aitquam lectionem magis probat, & Saxifragam thymo adeo similem esse scribit, ut nisi gustata ab eo discerni possit. In quibusdam codicibus neutrum legitur. Sed nec totum caput Dioscoridis esse multi putant, idq; inter notha rececerunt. Aliis non videtur esse adscritium, cum in omnibus

Pet. Pen. in Ad.

ferè exemplaribus Græcis habeatur. Eandem Saxifragam copiosam nasci, ait Pena, Iulio & Augusto, in accliu, cretaceo, & arido monte inter Chipnam & Malburgū Angliæ, Bristolienis à Londino via, sed variare floribus, qui longè sunt minores, alibi, non secus ac tota planta. Aliud Saxifragæ genus tradit Matthiolus, quod folia in caulibus per intervalla habet, patua, longiucula; vtrinque singula, comitatibus aliis longè minoribus, multis simul ex eadem origine prodeuntibus, quæ in cæcumine numerosiora sunt, & breuioribus intervallis distincta. Flores promit in summis caulibus purpureos, odoris nō iniucūdi. Præter has duas Saxifragas, alia tria ge-

SAXIFRAGA Anglica, Pen.

moidis modo, crenatis oris, in coronæ modum, admodum pusillos, in quibus semen rubrum, papauere minus. Radix altius petris inhæret, vtauelli nequeat. Miris laudibus plantâ hanc cômendabat Calzolarius ad calculos è renibus educendos. Saxifragia verò maior seu alba, cuius paulò antè meminimus, à floribus albis, quibuldâ Chelidonioides dicta, Gallicè *Rompipierre*, vel *Saxifrage blanche*, Germanicè *Flabensteinbrech*. Folia fert è petiolis pilosis, rotunda, plurima, humi iacentia, in extremitatibus

SAXIFRAGIA Altera, Matth.*SAXIFRAGIA III. Matth.*

incisa,

*SAXIFRAGIA Magna,
Mautholi.*



*SAXIFRAGA Alba, Fuch.
feu Saxifraga quarta, Matth.*



inciſa, ac veluti criſtata, mollia, aſarinæ aut hederæ terreſtris, minora tamẽ, & magis ex luteo virentia : caules rotundos, villoſos, pedales, & ſeſquipedales in ſummitate flores albicantes, naſturtij colore & effigie, aut erucæ : radicem nigricantem, fi-

*SAXIFRAGA Aurea,
Dodonæi.*



bris multis ſtipatâ, ex quibus pendente quaſi granu-
la quædam qualia chelidoni j minoris, aut ſemini
coriandri paria, vel paulò maiora, fuſca & obſcura
purpurea, acria, amara, à vulgo ſemina huius her-
bæ falſò credita, quorû in medicina yſus eſt. Mon-
tibus aridis, ſaxoſiſq; locis & arenofiſ provenit.
Maio menſe floret, deinde ſtatim euaneſcit. Huc
inferenda eſt Saxifraga Alpina, ſic dicta quòd fo-
liis Saxifragiam albam imitetur, & in Alpium ex-
celſis, niuofiſ, opaciſ mœtibus, ſub ſagis, abietibus,
piceis in putri & vliginoſo ſolo naſcuntur, neq; vi-
quàm alibi. Creſcit ad palmi altitudinem, radice
breui, in tenuiſſimas fibras diuiſa, ſubnigra: foliis
circa radicem tribus aut quatuor, rotûdis per am-
bitû inciſis, venofiſ, longo pediculo ſubnectiſ, gu-
ſtus amari : caule tereti, in ramulos aliquor diuiſo,
& aliquot folia proferente flore parvulo, quinque
foliolis conſtante, colore è luteo palleſcẽte, & pro-

*Forma.
Fuch. c. 38 p.
Pena in
Ade.*

*Locus.
Tempus.
Temper.*

pemodû herbaceo : ſemine paruo, rotundo, duro. Temporaria eſt herba ad primû
veris teporẽ. Aprili menſe exoritur, ſtatimque interit. Albæ Saxifragiæ flores, folia,
& præſertim radix, cum guſtanti amara ſunt, calidâ & ſiccâ eſſe ordine tertio ve-
riſimile eſt. Radicis cum granuliſ decoctum ex vino, potu vrinam mouet, calculos
frangit, & conterit. Stranguriæ itaq; conſert: abſtergit enim expurgatq;, & quæ in
venis eſt craſſitiè, ſicut omnia alia quæ amara ſunt, incidit, mēſes quoq; cit, craſſaq;

Vitis.

SAXIFRAGA, Alpina.



ac glutinosa ex thoriace educta. Huius videtur species saxifraga aurea a floribus aureis, Gallice *Rompierre Dorée*, Germanicè *Golden Steenbrech*, herbula palmaris, & sesquipalmaris, per quā similis foliis sunt enim similiter rotunda, crassiuscula, nigriora: radix tenella, humi repens, multum fibrata, hinc inde multos cauliculos emittit, in quorum summitate, bina ternave sunt foliola cōiuncta, e quorum medio flosculi emicant aurei, deinde capitula sponte hiantia: cum maturi sunt, semina exigua, rubentia, rotunda, sapore herbaceo, insipido, frigido, & eiusdē prorsus tum figuræ tum naturæ cum hepatica aquatica, cum qua, aut cū lichene locis saxeis & parietinis humentibus provenit, unde eius vsum non alium putarūt periti herbarij, quàm hepaticæ aut lichenis. Eandē Saxifragiam Lichenis facie & natalibus Lobellius pinxit, Erysimi speciem Aldrouandi. Illi cōiungenda ob virium affinitatē quæ Saxifraga Romanorū, vulgò Herba contra grauellam, Gallis *L'herbe cōtre la grauelle* nuncupatur, meritò Lithontribos dicenda ab insigni calculi frangendi potestate. Nascitur Romæ ac vicinis in lo-

Locus.

Vires.

cis ferè in maceris, ac veterū, ædificiorū ruinis, altitudine cubitali, radice longiusculā, digiti crassitudine, fibrata: foliis multis, circa radicē humi iacētibus, figura lonchi, sapore acri, caulibus multis, in quibus folia supradictis minora, atriplici maris familia, subobscurè viridia: flores pusilli, copiosi, e ramulorū pediculis prodeuntes, ex albo herbacei: semen rufum, minutissimum in siliquis gracilibus & longis, feruidi gustus, quod drachmæ pondere sumptum ex decocto radicis graminis, calculum efficacissimè exerit ac expellit.

SAXIFRAGA Romanorū, Lob.



SAXIFRAGA Aurea, Lob.



GNA

GNAPHALIVM, CAP. IX.

MVLTA plantæ gnaphalia herbarij nuncuparunt, quod molli lanugine seu lana vel tomento essent obvolutæ. Est enim Græcis γνάφειν vellere, carperéve lanas, aut pannum, seu vellicando & deradendo expolire, vnde γνάφαλον, tomentum quod culcitris infarcitur, & quorū natura inollis, candida, & omnino lanæa est, γνάφαλον appellatur, cuiusmodi sunt dictāni folia, quæ Dioscorides γνάφαλον vocat, id est, tomentosa seu tomentitia, tomento quodam pubescentia, siue mollia tomenti modo. Gnaphalum igitur herba dicta, quod foliis eius mollibus & candidis pro tomento vterentur, auctoribus Dioscoride & Galeno, à Latinis Centunculus & Centūcularis herba, quod centronibus cum tomento maxima sit cognatio, & Tomentaria seu Tomentitia. Aliquot gnaphalia iam exposuimus in maritimis plantis, de aliis hic dicemus, ac primum de vulgari, quod filago nominatur, Gallis *Herbe à cotton*, Germanis *Rhuskraut*, ab eius facultate aduersus dysenteriam. Filago multos profert cauliculos ex vna radice, rotundos, graciles, cinericios, lanugine seu molli lana tectos, rectos, sæpius sine sulculis, in quibus folia crebra, longiuscula, angusta, mollia, villosa, stæchadis citrinæ foliis similia, nisi quod longiora sunt, latiora, & paulo viridiora. Flores glomeratim oriuntur in summis sulculis, cauliculisve, non tam lutei quam stæchadis citrinæ, sed sublutei & pallentes. Duū videtur esse generum, inquit Fuchsius. Vnum enim paulo latioribus ac candidioribus foliis constat, alterum tenuioribus, & minus candidis. Illud flores fert partim mediis sulculorum diuicationibus, partim extremis sulculis: hoc in cacumine tantum. Dodonæus tria eiusdem genera facit, primum genus Impian herbam esse Plinij censet, sic dictam quoniam liberi super patres excellant, id est, postremo geniti flores prius genitos superant. In eadem sententia est Matthiolus. Tragus amaranthi lutei, seu Tinearix, seu Eliochrysi Theophrasti sylvestre genus facit. Alij filaginem ad stæchadem citrinam potius referendam censent. Aridis & sterilibus locis potissimum provenit. Iunio & Iulio mensibus floret. Adstringit & exsiccatur Gnaphalum. Bibuntur, auctore Dioscoride, efficaciter eius folia in vino austero ad dysenteriam. Et Galenus, Gnaphali folia, inquit, modicè adstringunt, ac proinde quidam exhibent ex austero vinorum quopiam ad dysenterias. Item Plinius. Datur in vino austero ad dysenteriam ventris

Nomine

Lib. 5. c. 9

Lib. 4. c. 10.
Lib. 6. um.

Dodo. lib.
1 cap. 60.
Pena in
Ad.

Capit.
Genera.

Ibid.
Lib. 24. c. 19

In cap. 17.
lib. 4.
Lib. 2. c. 19

Pena in
Ad.

Locus.
Tempus.
Temper.

Vires.

Lib. 6. sim.

Lib. 27. c. 10

GNAPHALIVM

vulgare, Fuch.



GNAPHALIVM, Matth.



GNAPHALIVM
Montanum, Dalech.

Locus.

Forma.

Lib. ac. 40.

Cap. 22.
Pet. Pe. in
Ad.

Nomina

Locus.

Forma.



ventris solutiones, mensesque mulierum sistit. Infunditur aures tenesmo. Illinitur & putrescentibus ulcerum. Similiter Filago dysentericis, & profluuiis immoderatis non parum utilis est. His Gnaphalii generibus cognatum est, quod Montanum vocant docti herbarij, quia in excelsorum & frigidorum montium summis verticibus provenit, radice subnigra, breui, fibrata, multisq; villis tenuibus & prolixis capillata, foliis propè radicem densius congestis, in caule paucis, oblongis, albis, tomento lanuginosis: caule dodrantali, rotundo: flore in summo eius vertice nunc luteo, nunc ex albo rubefcente, in orbem umbellæ instat conformato. Quidam pilosellæ genus esse volunt. A superioribus Gnaphaliis hæc discrepat floris colore, qualem diximus, in illis luteo: folio latiore, in illis angusto: & quod humilis sit, caulèque singulari, nec surculoso: illæ verò prociores, fruticose, caulèque in surculos supernè diuiso. Tragus aliud Dioſcoridis Gnaphalium esse censet, videlicet Linum pratense, & Lanam pratensem herbarijs dictam, Germanis *Matthenfleuch*. Est autem iuncea graminis genus, de quo inter palustres diximus. Iuncum bombycinum alij vocant.

SONCHVS LANATVS, CAP. X.



TOMENTITIS coniungi debet Sonchus lanatus, sic dictus à candore, & mollitie ad tactum manus suavi, in tota planta, præsertim in capitulis florem promētibus. Gignitur in laxis & apricis, radice dimidio pede longiore, candida, fibrata, foliis sonchi, rugosis, laciniatis, sed magnis ex interuallis, multis, costa candida supernè diuisis, per totum caulem nascentibus, lanugine pubescentibus, ad quorum radices cauliculi exoriuntur, caule est cubitali, anguloso, in ramulos supernè diuariato, in quorum verticibus capitula eminent, suavi tomento villosa, Soncho similia, quæ in aureum florem explicantur. Tota planta lacteo succo turget cichoriædum more, gustuque amaro prædita est, sed minùs quàm reliqua cichoriæde, quorum & facultatem obinet, licet imbecilliorum. Quidam hanc Molluginem quæ causam supradictam appellant, quamvis à Plinij Mollugine diuersa sit. Floret Iunio mense.

ἸΑΗΡΪΤΙΣ Græcis, Latinis quoque Sidentis, sic dicitur à ferro, quasi *Nomina*
 ferruminatrix, quod vulneribus ferro factis perutilis sit, vel quoniam glutinandis vulneribus apta, præcipuum in bello habeat usum, quod sæpe ab eo metallo in Græcis scriptoribus indicatur. Sed cum permultæ sint plantæ, diuersæ etiam generis, earumque insignes, quæ ferro sauciatis partibus, vel vulneribus in bello acceptis opem polliceantur, ac ob id Sideritides, & Strationdes, id est, militares, merito nuncupandæ, de omnibus hic minimè dicendum. Satis enim benè studiosis consilium fore putamus, si earum, quæ à Dioscoride descriptæ sunt, & paucae quedam ab illis possint innotescere. Is tria facit sideritidis genera. Prima est Sidentis *Genera.*
 heraclea, siue ferruminatrix herculea, fortasse à viribus ethicacillius, & planè herculeis, quæ folia marrubio similia habet, inquit, sed oblongiora, ad saluæ aut quercus folia accedentia, minora tamen & aspera: caules edit quadrangulos, palmares, aut etiam maiores, gustu non insuaues, & quodammodo subabstringentes, in quibus per intervalla verrucilli rotundi velut in marrubio, & in ipsis semen nigrum. Nascitur in petrosolis locis. Altera Sidentis ramos habet bicubitales, tenues, folia in pediculis longis sinilia foliis filicis, multa, vtrinque in summo fistilla, ex supericioribus alis propagines longas, tenues, in summo globi speciem referentes, capitulum habentes asperum, in quibus semen betæ semini simile, sed rotundius & durius. Sidentis tertia, quam Crateus etiam heracleam vocat, nascentem in parietinis & vineis, folia habet multa ab vna radice, coriandro similia, circum cauliculos palmares, læues, teneros, subcandidos: flores puniceos, paruos, gustanti ainaros, lentos. Plinius de achillea, quæ etiam sideritis nominatur, agens, mox ob cognationem de *Forma.*
 Sideriidis generibus subiungit hæc verba. Aliqui & hanc (Achillea subaud.) Panacem heracleam, alij Sideritim, & apud nos Millefolium vocant, cubitali scapo, ramosam, minutioribus quam feniculi foliis vestitam ab imo. Alij fatentur quidem *Lib. 4. c. 5.*

*SIDERITIS Prima,
 Martialis.*



illam vulneribus utilem, sed veram achilleam esse scapo cæruleo, pedali, siue rariis, ex omni parte singulis foliis rotundis eleganter vestitam. Alij quadrato caule, capiribus manubij, folio quercus. Hanc etiam præcisos nervos glutinare ferunt. Alij Sideritim in maceris nascentem cum teritur, fædi odoris: Etiamquam aliam similem huic, sed candidioribus foliis, & piugioribus, tenerioribus cauliculis, in vineis nascentem. Aliam verò binuin cubitorum, ramulis exilibus, triangulis, folio filicis, pediculo longo, betæ semine, omnes vulneribus præcipuas. Nostram, quæ est latissimo folio, scopas regias vocant. Medetur anginis suum. Hæc Plinius satis indistinctè, ut tamen agnoscere & intelligi possit, primam Achilleon eius, Dioscoridis Achilleam esse: secundam, Achilleon veram, scapo cæruleo, &c. esse Myriophyllum Dioscoridis. Tertiam quadrato caule, &c. esse Sideritin Heracleam primam Dioscoridis. Quartam in maceris nascentem, &c. esse Heracleam Crateus, apud Dioscoridem. Quintam superiori similem, sed foliis candidioribus, &c. esse tertiam Sideritin Dioscoridis.

Lib. 8. sim.
In cap. 29.
lib. 4.

Scoridis. Sextam, Dioscoridis Sideritin secundam. Galenus vnus duntaxat Sideritidis meminit. Matthiolo prima Sideritis videtur esse ea quæ hic primo loco expressa est, quod notis omnibus, vt ait, eam referat: nec aliud obstatè putat, quàm quòd ea frequentius nascatur humidis quàm siccis locis: quamquam sæpè eandem virentem in locis quoq; siccis se inuenisse affirmet. Huic tandem sententiæ, veri

*SIDERITIS Secunda,
Matthioli.*



*SIDERITIS Terna,
Matthioli.*



*SIDERITIS Quarta,
Matthioli.*



Lib. 3. c. 92.
Cap. 394.

incertus aliam substituit, his verbis: Id itaq; tantum in causa est, vt hanc non ausim omnino legitimam facere Sideritim, præsertim cum aliam nunc repperim plantam in Viennensi agro, ac alius Austriae locis, arido in solo, quæ sideritim primam perbellè refert. Exit enim quadrato caule, ipsoq; dodrantali, aut maiore, ramosoque, foliis marrubio longioribus, & ad saluæ faciem accedentibus, crispis & albicantibus, per ambitum laciniatis, sapore haud ingrato: floribus verticillatis in caule prodeuntibus marrubij modo, vt ex appicta imagine perspicere licet. Deinde Ruellium & Fuchsum viros de re herbaria benemeritos erroris insinulat, quòd primam sideritidem dixerint herbam esse, quæ hodie nostris herbarijs & Officinis barbaro nomine Tetrahit, alijs Herba Iudaica nominatur. Postemò duas alias sideritides depinxit tantum, nul-

la prorsus aut figuræ, aut virium facta mentione, quas hic quoq; expressimus. At petiti & exercitati herbarij, cum Ruellio Fuchsiq; ætate superiores, tum inferiores multis rationibus inducti Tetrahit siue Iudaicam herbam, primam, siue herba-

clean

TETRAHIT, *Herba Iudaica*
Sideritis prima, Fuch.



TETRAHIT, *Sideritis Hera-*
clea Dioscoridi.



cleam Sideritidem esse censuerunt. Primum omnes delineationis Dioscoridis notæ respondent. Nam folia habet marrubij cretici, sed longiora, & angustiora, incana, scabra & crispâ, ambitu laciniato, ut chamædrys, aliquando laciniosa diuisura obscurius apparente in quibusdam foliis, quæ fortasse caula fuit cur Dioscorides illa modò cum quercus, modò cum saluar aut marrubij foliis contulerit. Caules fundit modò depressos, modò surrectos, palmum sæpius excedentes, & pedales, quadratos, duriusculos, ternos aut quaternos, asperos & pungentes, non iniucundi gustus, aliquantum adstringentes, quos verticilla per interualla coronant, ut in marrubio Cretico videre licet: flores sunt albicantes ex diluta purpura, vel lutei: semen nigrum, radix lignosa, marrubij. Ad hæc arida, petrosa, sabulosa, & inculta loca perpetuò amat. Iunio & Iulio mensibus floret, nec desinit nisi autumnii fine. Præterea vehementer exsiccatur & adstringit, ad vulnera curanda planè nata, magnòque multorum còmodo cognita practicis quibudâ Iudæis, qui hac enterocelas, & alba menstrua curant, inde Iudaicè nomen adeptæ, quæ cum Dioscoride cògruunt, scribente folia imposita vim habere glutinandi vulnera, & arcendi inflammationes. His Galenus adstipulatus, Sideritis, inquit, phlegmonem sedat, & glutinat. Item Plinius, Sideritis tantam vim habet, ut quamvis recenti gladiatoris vulnere alligata sanguinè claudat. Quare hæc prima Sideritis Dioscoridis fuerit, non herba illa Iudaica, cuius meminit Aucenna, quæ nihil aliud est quam eruum. Matthioli verò Sideritis prima, minimè Sideritis dicenda, quòd notæ eius multæ ei planè refragentur, sed Penæ sententia marrubij potius aut verbenæ species, quam ob id herbarij marrubium palustre, siue aquaticum vocant, de quo in palustribus diximus. Altera autem quam illi substituit, cannabis siluestris est herbariorum, neutra ad vulnere curationem commendata. Dodonæus sideritidem primam herbam eam esse putat, quæ Cardiaea ab herbariis nominatur. Sideritis secunda Dioscoridis multorum doctorum iudicio nostra est Pimpinella, cuius partes omnes, qui cum Dioscoridis descriptione conferre

Locus.
Tempus.
Temper.
& Vires

Lib. 8. sim.
Lib. 26. c. 13

Lib. 2. c. 399

Cap. 47.

Lib. 10. c. 187.

Pena in
Aduer.

De psila.
cap. 79.

voluerit, has ei prorsus còuenire perspiciet, ut ex Sideritidis delineatiõe superiore, & his quæ de Pimpinella alio in libro diximus, intelligere licet, etià suffragante in Chio insula eius vernacula appellatio, in qua etiam hodie Sideritis appellatur. Iam verò curandis vulneribus perutilis est, unde ei sanguisorbæ nomē. Sic secundæ

Lib. 4. c. 30.
In cap. 31.
lib. 4.

Sideritidis seminis foliorūq; vis, inquit Dioscorides, ad vulnera præcipua est. Qui verò sint illi nescio quos Matthiolus reprehendit, quòd hanc tertiam Sideritidem faciant, cum ei folia coriandri non sint, nec eadem circa caules oriantur, sed pinnata ex longo vtrinq; pediculo exeant: prætereà quòd caules præduros habeat, non teneros, ac etiam quòd flores capitulaq; non amaro, nec lenito gustu sint, sed astringenti, & austero. Nullus enim est tam ignarus, qui nō perspicuè videat Pimpinellā cum secunda, non cum tertia Sideritide prorsus convenire. Quæ tertia Sideritis, Crateuz herculeæ, in maceris & vineis nascitur eorumdem peritissimorum herbariorum sententia, nostras est herba Roberti notissima, foliis coriādri, inter gerapia à nobis descripta, non solum vulneribus & sanguinis eruptionibus, verum etiam vulneribus, & potionibus vulnerariis vilissima, quod & de Crateuz herculeæ tradidit Dioscorides, eam nimirum huius esse vim, vt quamvis recenti vulnere imposita sanguinem supprimat, interprete Ruellio, cum Græcè legatur, *καὶ τὰς τῶν ἰσχυρῶν καὶ ἀσθενῶν καὶ ἀσθενῶν καὶ ἀσθενῶν*. Id est, Hæc etiam imposita vim habet glutinandi cruenta, & recentia vulnera. In veteri tamen codice legitur, *ἰσχυρῶν καὶ ἀσθενῶν*, id est, cruenta, & vulneratos nervos, sed prior lectio melior. Sideritides alias viri in re herbaria exercitati approbarūt, quas hic apposuimus. Primum eam quam Monspelienſium Schola præter herbam iudaicam novit, in agro Monspe-

Pen. in Ad.

Lib. de iis
que in v
bro. cap. 31.

And. Lac.

Locus.

SIDERITIS, Monspelienſium.



HERBA Venti, Parietaria Cordi, Sideritiæ genus.



Forma. liensi frequentē, locis nimirum pinguibus, & triticæ messis fertilibus, radice crassā, valde fibrata, caulibus multis, cubitalibus, angulosis, tactu asperis, surculosis: foliis saluiz longioribus, latioribus, per oras diuisis, scabris, geminis semper, caulem & surculos per intervalla amplectentibus, ex quorum veluti sinu flos emicat, verticillato ambitu, densus, puniceus: semen in hirsutis vasculis, vt in marrubio. Hanc Pharmacopœi Monspelienſes Herbam venti vocant, quòd eius folia tota pertusa & vento peruia cernantur, vt mox dicetur. Itali Verbaſci silueſtris speciem, periti quidam Othonnam Dioscoridis, quòd arescenti herbæ folia non defluant, sed per hyemē in planta ipsa remanentia, siue à tineis, siue ab aëris frigidi occurſu sic eroduntur,

*SIDERITIS, Querno
folio, Dalechampij.*



duntur, vt abſumpto reliquo eorum corpore duran-
tibus, venoſis, netuoſiſq; fibris, eo textu quo à natura
reticulatim ſunt implexx, cribri modo pertuſa appa-
reant, & quaſi à blattis exeſa, quod apud Dioſcoridē
orthonnē poſcir hiſtoria. Alia herbariorum vulgò ſi-
deritis pratenſis rubra nominatur, ob exiguā quen-
dam cum Tetrahir officinarum foliis ſimilitudinē,
quam ſideritidem appellari diximus. In pratis & hu-
midis locis prouenit. Radieem mittit lignoſam, bre-
uem, nigrā, in multas radieulas diuiſam: caules mul-
tos, quadratos ſurculosos: folia multa, parua, in am-
bicu nonnihil diuiſa, guſtu perquam amara: florem
copioſum, obſcurē purpuraſcentem, luteis apicibus
ē medio prodeuntibus: ſemen minutulum in lae-
caliculis alſines modo. Eſt & iuſdem ſideritis praten-
ſis lutea dicta, quæ in ſiccaneis pratis naſcitur, flore,
ſurculis, fructu, guſtu, ſuperiori ſimilis, niſi quòd ſos
omnino luteus eſt: foliis autem diſtat, quæ longē mi-
nora ſunt & anguſtiora, nec per margines inciſa.
Item aliud hic etiam pictum Sideritidis genus ſta-
ruunt herbarij, quòd recentia vulnera ferro illara ſo-
lidet: quòd folia quernis aſſinia ſint, minora tamen,
in ambitu diſſecta, ſubſpæra: quòd caules per inter-
ſtitia rotundæ vetrebræ, vt in praſſio coronent, quæ omnia in Sideritide prima
Dioſcot. requirit. Aliam hic quoq; appoſitam Sideritidis generibus adnumerant,
quæ in vmbroſis reperitur, inter ſaxa, & muſcoſos lapides, radice breui, nigra, fibra-

*SIDERITIS, Pratenſis
rubra.*



*SIDERITIS, Pratenſis
lutea.*



ALIA, Sideritis.

nec ingratam, vfu nullo exploratam.

ta : caulibus multis, nunc furrectis, nunc per vicina repentibus : folio marrubij, longiore, in ambitu valde inciso: flore luteo, aut pallido, verticillatim caulis superiора ad foliorum exortum circumdante, marrubio simili. Sideritidem Monspeliensem Pena depinxit & descripsit palmum & felquipalmum altam, viticulis angulosis, rectis, multis, aridis, lignosis, coma & verticillis hyssopi, foliis, facie, colore scordij Dioscoridis, sed minoribus, magis rugosis, rigidis, crispis, pilosis quàm tetrahit ludaicum, nec minus laciniosis, sed hirsutioribus, flosculis satyreæ vulgaris ad foliorum articulos, gustu amaricante & exsiccante, non nihil aromatici suavisque spirantibus, quod Chamædryn aut betonicam referat. Aliam ex Sabaudia Alpina pictam exhibuit, quam Sideritidum vnam esse opinatur, & satis quadrare heracleæ sideritidi, ni folia angustiora multo essent, vique efficacior carerent: alioqui verticillatos citros habet, asperiusculos, pallidos, marrubij aut tetrahit, viticulas multas, tenues, lignosas, nec quadratas, binum palmorum : radicem flexuosam, prolixam, lignosam, pullam, amaricantem gustu, præsiccam,

SIDERITIS Monspeliensis, Pena.*SIDERITIS Montana, Pena.*

POLY

POLYGONVM ἄππιν Græcè, Latine etiam Polygonum mas, Seminalis, Sanguinalis, & Sanguinaria, Proserpinaca, Arabibus *Basitrahagi*, Officinis Corrigiola, & Centinodia, Gallis *Renouee malle*, & *Corrigiole*, Italis *Polygona mas*, his, & *Corrigiola*, Germanis *Vuegrast*. Polygonum à geniculorum frequentia & multitudine dicitur, seminalis à seminis multitudine, sanguinalis à cohibendo sanguine, proserpinaca à serpendo. Polygoni duo geneta facit Dioscorides, matem & feminam. De hoc in palustribus, de illo nunc dicemus, & de aliis generibus quæ recentiores herbarij adinuenerunt, de matino agemus in maritimis. Polygonum mas, ut describit Dioscorides, herba est ramos habens ténues, teneros, multos, geniculis cinctos, repentes per terram velut gramen,

Nominia

Lib. 4. c. 4.
Genera
Cap. 13.Ibidem.
Forma

POLYGONVM Mas.



folia rutæ similia, sed longiora & molliora (impressi codices habent *ἰππικύστερα*, cum legendum sit *ἰππικύστερα*, id est, longiora, adde etiam *μαλακώτερα*, id est, molliora: sic enim Oribasius legit, quem secuti sunt interpretes:) fructū iuxta singula folia fert, unde mas vocatur: florem candidum, aut puniceum. Breuius sic Plinius, Polygonum Græci vocant, quam nos sanguinariam. Non attolitur à terra, foliis rutæ, semine graminis. Nascitur passim, quotidieq; pedibus conculcatur in aggeribus & semitis, item secus arces, & compita. Aestate floret. Vis e poti succi est spissare, ac refrigerare. Prodest cruentæ excreationi. Sic Ruellius Græca exemplaria secutus, quæ sic habent. *Πολύγονον δὲ ἔχει στυπτικὴν, ψυχτικὴν ὃ χυλὸς ἀποκρίνεται ἀραιώσκει δὲ*, &c. In aliis verò legitur, *Πολύγονον δὲ ἔχει στυπτικὴν καὶ ψυχτικὴν, ὃ δὲ χυλὸς ἀποκρίνεται ἀραιώσκει*, &c. id est, Vim adstringentem habet & refrigerantem: succus verò potus prodest sanguinæ spuentibus, alui fluxionibus, cholericis & vrinæ stillicidio, vrinam enim euidenter ducit. Cum vino potus venenato

Lib. 17. c. 11

Locus.
Tempus.

tum morbis auxiliatur. Valet etiam ad febrim circuitus hora vna antè accessionem sumptus, muliebri profluuium appositus sistit. Aurium doloribus, & purulentis auribus instillatus confert. Cum vino decoctus, melle adiecto, eximie ad genitalium vlcera facit, folia contra stomachi ardorem, sanguinis reiectionem, herpetas, erysipelata, inflammationes, & demata, & vulnera recentia illinuntur. Eadem ferè Plinius habet. Succus eius infusus natibus supprimit sanguinem, & potus cum vino cuiuslibet patris profluuium, excreationisque purulentas inhibet. Vis eius est spissare, ac refrigerare. Semen aluum largius sumptum soluit, vrinam ciet, rheumatismos cohibet, qui si non fuere, non prodest. Stomachi feruori folia imponuntur, vesicæ dolori illinuntur, & ignibus sacris. Succus & auribus purulentis instillatur, & oculorum doloti per se. Dabatur & in febribus ante accessiones, duobus cyathis in tertianis, quartanisve præcipue: item cholericis, dysentericis, & in solutione stomachi. Polygonum, inquit Galenus, ut adstrictionem quandam obinet, ita sanè vincit in eo aqueum frigidum, ut videlicet secundi sit ordinis medicamentorum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij. Est etiam exsiccatorium. Quare quibus stomachus æstu feruet, extrinsecus illitum auxiliatur, veluti etiam erysipelata, & calidas phlegmonas iuuat. Potro tale cum sit, & fluxiones re-

Lib. 17. c. 11

Lib. 2. m.

primit, & hac ratione videtur exsiccatorium esse. Quare cum herpetum tum vlc-
rum, aliorumq; bonum est remedium: efficacissimum aurem inflammatione & flu-
xione laborantium partium. Est & cruentorum vulnere glutinatorium. Sed &
aurum vlcibus prodest: vel satis puris insit, hoc tamen etiam desiccat. Eisdē
ob facultates, & muliebri profluuiū & dysenteriam, & sanguinis eiectiones, & vn-
decumque aliunde immoderatiores impetus sistit. Refert Dioscorides quod & vri-
nam prouocet exhibitum stillicidio affectis. non tamen affectum accuratē distin-
guit, quo dari ipsum expediat: quamuis probabile sit vine subtillo cōuenire, quod
accidit renibus impacto lapillo, arenosive, aut crassa quadam materia, quoniā vim
habet calculum frangendi, vt & Herniaria, proculdubio eius species. Pena alia Po-

POLYGONVM Montanum
niueum, Pena.



POLYGONVM Alterum
Serpylli folio, Pena.



POLYGONVM
Herniaria foliis.



Lib. 2. Hist.
Hisp. c. 91
91.

lygoni genera pingenda curauit. Primum mōta-
num minimum, niueum & sericeum, herbula est
vix vnciam & semūciam æquans, densis confertisq;
ramusculis, sarmentosis, duriusculis, densis-
simis geniculis, & foliorum quasi denticellis, her-
nariæ aut thymi tenuifolij foliolis minoribus,
per parua interstitia visu vix discernēda. Eximio
vellere sericeo, & niueo candore lucentibus glo-
merulis foliaceis, delicatissimis, tenuissimisque
membranulis contexti flores vniuersam supernē
plantam ornant & occultunt: exilis radix, lignea,
& quā cauliculi longior: semina paruula, acero-
sa, erythrodani marini vix visu capi queunt præ
exilitate. Alterum rarum & hæcenus indictum,
ramulis & cauliculis est furculosis, prolixis, gra-
cilibus, Serpylli, huius sparsis. E' geniculis foliola
prodeunt pusilla, teretia, succulenta, thymo pa-
uo nostrati æqualia & similia, radix prælonga
lignosa, sapore amaricante, calidiufculo. In colli-
bus maritimis Galloprovinciæ non secus ac her-
naria luxuriat. Tertium non minūs rarum quā
superius

POLYGONI Hispanica genus Clusij.



superius. Est perpusilla herbula & humi accumbens, cespitè semiobruta, ramulis creberrimè geniculatis: foliolis & seminibus parvis, albidis, prorsum herniatis: tota incana, flore muscoso, valde exiguo: radice ampliore quàm pro plàtæ modo, dura, furculosa,

impleta, & in se reticulatim conuoluta, auulso difficili, gustu præscoco, calidiuscula. In amplissima Cretæ Salonensis Galloprovinciæ planitie, media via inter Arelatem & Salonam prouenit ad diuersorium D. Martini. Eandem plantâ Clusius Polygoni maris genus esse arbitratur, eamque graphicè depinxit his ferè verbis. Multis viticulis per terram sternitur, dodrantalibus magna ex parte, sed interdum etiam pedalis, aut longioribus, geniculatis, foliis Polygoni maris, minoribus, & in nouella planta virentibus, deinde temporis spatio confertissima & numerosa admodum adnascuntur foliola acerosa & membranæa, omninò alba, sic vt tota argenteis squamis constare videatur gratissimo spectaculo: flos candidus Polygoni, sed adeò paruus & inter membranulas istas latens, vt vix conspiciatur: semen Polygoni: radix candicans, oblòga & tenuis. Nusquàm abundantius prouenire ait, quàm in collibus petrosis & siccis Salmanticæ vicinis, trans flumen Thormuitem circa Valentia & Murcia: se etià vidisse in eodè quo Pena loco, nèpe lapidoso illo campo supra Arelatè, nò procul à D. Martini diuersorio, qua Malsilià

Lib. 1. stirp. Hispan. ca. 94.

CHRYSOCOME
Lanuginosa, Dalech.



iter est, sed multò minorè, & vncià vix excedentem. Floret Maio & Iunio, deinde semen profert. Murcia ni vulgò Asprilla vocant, à foliorum exsuccorum fortasse asperitate. Salmanticenses & Valentini Paronychiam vocat, cum tamen etiam Clusij iudicio nihil aliud sit quàm Polygoni maris genus peculiare, vt diximus. Etenim cum primùm è semine prodit, à sanguinaria vulgari nihil differt, & comman-ducara eodem gustu deprehenditur.

CHRYSOCOME LANUGINOSA,
CAP. XIII.

HÆC à florum colore & foliorum lanugine, Chrysocome lanuginosa herbariis dicta, in aridis collibus Alpium, & sabulosis cliuis gignitur: radice nigra, crassiuscula, plurimis exilibus fibris capillata, Ellebori nigri modo: caulibus multis, palmum altis, foliis hyssopi vulgaris longioribus, canis, villosis: flore aureo, ad foliorum exortu, quæ superiora caulibus parte prodeunt, in pappos abeunte. Quidam impie à Plinio memoratæ genus esse putant, quod doctis herbariis iudicandum relinquimus.

Nomen.
Locus.
Forma.

HERNIARIA,

CAP. XIII.

Nomina

sive Herba Turca.

Lib. i. est.

Locus.

Forma.

Vires.



VERBASCULVS

Alpinus.



Nomen.

Locus.

Forma.



VIDAM plantam istam Lithontribon ab affectu, vt & Herniosam, siue Hetniatiam vocant, nonnulli Herbam Turcam, Cordus Mulegranam, Itali *Centograna*. Tragus Empetrum, Anguillata Epipactida, alij Elleborinē Dioscoridis esse censent. Sunt qui nec sine ratione Polygoni speciem faciunt. Matthiolus Polygoni minoris nomine, depinxit in aruis & oliuetis Narbonensis Galliz, vt circa Monspelium. Crescit in sabulosis, aridis & persflatis, radice quatuor, aut quinque digitos longa, sensim gra cilescēte, modicē fibrata: ramos edit teneros, numerosos, densos, sicculosos, exiles, per terram repentes, folia lentis, valde parua, albescentes minimæ minora, crebra, semina numerosissima, inter foliola & sub singulis cōgesta, atriplicis & Polygoni minora, flosculi luteoli, multi, tribuli terrestres multo minores, nec dissimiles. Tota ex herbaceo flauet. Experimentis multis certisque constat herbæ huius succum vino albo expressum, & potum, efficacissimè renum calculos comminuere, & exterre: item eximie valere ad ramices & hernias, vel si trita, im ponatur extrinsecus: vel si bibatur succus: vel si arida & tusa cochlear detur. Prodesse etiam dysentericis aiunt, & sanguinis eruptionibus, & aduersus viperarum & cæterarum venenatarum animantium venena, cum sumptam, cum foris impositam. Stillaxitia eius aqua octo dierum spatio hausta hepatis obstructions, & icterum persanare proditur.

VERBASCULVS ALPINVS,
CAP. XV.

AB herbariis verbasculus Alpinus, siue Cæruleus dicitur, proueniens in asperis & opacis Alpium tractibus, radice breui, fibrata, candicante, totius circa ipsam densis, humi procumbentibus, oblongis, læuibus, tribus aut quatuor cauliculis, pedalis, minimè foliosis: flore cæruleo in caulium cacumine, ferè instar umbellæ coaceruato, speciosissimo, ac pulcherrimo.

VALE



PHU Montanum siue Valerianam Montanam herbarij plantam istā vocant, quod odore, sapore, flore Phu vulgare æmuletur. Cignitur in opacis & vdis montium saxis, radice è nigro subrufa, dura, lignosa, parum fibrata: foliis propè radicem multis, longiusculo pediculo nixis, altine aut perdicio ferè similibus, in caulibus paucis, & iis semper geminis, caulem ima sui parte amplectentibus: flore Phu simili, purpurascente, odoris perquàm iucundi. Pena Valerianam aliam minimam pinxit, flore & umbella ex candido purpurascente, thlaspi, & foliorum diuisura Valerianæ siluestri minori similem, sed illa ad eò sunt exigua, vt minoris Augæ folia æquent. Radix candida, exilis, & nardi penè infinitis fibris similis, odore Valerianæ siluestris minoris. Interdum montosis locis è saxorum rimis erumpit, interdum in segetibus, vt propè Monspelium. Lobellius Phu minimum alterum exhibuit, Gallobelgis *Sallade de chamois*.

Nomen.

Locus.

Forma.

nc, Belgis *Beltroppen*, quasi dicas lactucam campestrem, quia folia primo pullulatu habet lactucis aut seridis adhuc tenellis similia, & in Quadagesima cibo & acetariis experatur lactucarum modo. Frequentissima in agro Antuerpiano. Flos & radix Monspeliacæ æmulatur, folia minus laciniata.

PHV Minimum.

PHV Minimum alterum, Lobel.



AIZO

Nomina



ΕΙΖΩΝ Græci, Semperuium & Sedum Latini vocāt, Apuleius Vitalē, Arabes *Beihalalem*, seu *Haialhale*, Officinæ Semperuiū, vulgus Iouis barbam, Galli *Soubarbe*, Itali *Semperuiuo*, Germani *Hanfseurte* & *Donderbar*, quod nonnullis locis plebis animos iam pridem inuasit

Lib. 4. c. 16.

Genera.

opinio, non ferri fulmine domum, in cuius tegulis vireat Sedum. Aizoon autem & Semperuium appellant, quod perpetuū tam æstate quā hyeme vireat, nec ullis frigoribus, aut cæli iniuria quatuorvis frigida emoriatur. Eius tria statuit genera Dioscorides, ἀϊζων μέγα, Aizoon, Sedum & Semperuium maius, Apuleius τριφύλλον, & ζυζυβαλιον vocat, Galli *Grande Soubarbe*, Itali *Semperuiuo maggiore*: ἀϊζων μικρὸν, Aizoon, sedum & Semperuium minus, seu Semperuiū medium, quibusdā πεδάλιον, quod ter anno floreat dicitur, Apuleio Erithales, Plinio Erisithales, Gallis *Triquemadame*, & *Petit Soubarbe*, Germanis *Kleinhanfschurtz*, & *Kleindonderbari*, Italis *Semperuiuo minore*, & *Pigmola*, à folio tereti pineo. Tertium genus ἀϊζων τέλειον, Aizoon sedum & Semperuiū tertium: quidam ἀνδράχυν ἀγρίον, idest, portulacam siluestrem, & telephium nominauerunt Romani, auctore Dioscoride, Illecebrā, Arabes *Andrachahara*, *Alficebran*, *Tulasen*. Herbarij plura assignarunt genera, & aliter distinxerunt. Fuchsius tria descripsit & depinxit. Primum maius Aizoon, deinde minus, sed id duplex: alterum marem, quod floribus luteis spectatur: alterum feminam, quod floribus candidis seu pallidis conspicitur: postremò Aizoon minimum, de quo mox, quod tertium Dioscoridis esse putat. Dodonæus quatuor, semperuium maius, semperuium minus, crassulam minorem siue vermicularem

Lib. 4. c. 75.

Ca. 14. lib. 4.

Officinarum, à similitudine foliorum vermiculos referentium, quod tertium genus statuit his quartum addit minimum, quod portulaca agrestis, & Romanis Illecebra dicitur. Matthiolus ex Sedi generibus à Dioscoride descriptis, duo nota esse ait, nimirum maius & minus: minoris duo esse genera: vnum, de quo Dioscor. tractat, quod feminam recentiores appellant, alterum marem: tertium diu incognitū tandem Ghini opera & industria veluti in lucem prodisse. Pro minori, Crassulam Officinarum seu vermiculatem, siue Sedum minus feminam Fuchsi depinxit: tertium Aizoon minimum, repens, Illecebram minorem, Gallis *Pain d'oiseau*, Germanis *Rotzentreibler*, siue *Maußfresser*, idest, murinum piper, propter acrem exulcerantemq; facultatem. Gramen tertium Plinianum Anguillara, Itali *Granellosa* & *Grafella*. His addit Aizoon arborefcens, idq; varium. Sed hæc ex descriptionibus

Lib. 1. c. 13.

dilucidiora fient. Plinius, Aizoi, inquit, duo genera sunt: maius in scitilibus vasculis feritur, quod aliqui Bupthalmum vocant, alij Zoophthalmū, alij Stergethrū, quod amatoriis conueniat, alij Hypogeson, quoniam in subgrundiis ferè nascitur. Sunt qui Ambrosiam potiùs vocant, & qui amerimnon. Itali Sedum magnū, aut oculum, aut digitellum. Alterū minusculum, quod Aithales, alij Trithales, quia ter floreat, alij Chrysothales, alioqui Isoetes, Itali Sedum, alij Aizoon vtrumq; quoniā vireat semper, aliqui etiam semperuium. Aliquantò post tertium Aizoi genus nō facit, sed ait. Huic (minori subau.) similis est, quam Græci Andrachnen agrian vocant, &c. Galenus quoque duo duntaxat Aizoi genera esse dixit. Ac sanè Dioscorides, & eum secutus Orbasius, illecebram non esse, sed videri tantum Aizoi speciei esse scripserunt, vt eam Aizois similitudinis & affinitatis gratia duntaxat subdidisse videantur. Aizoon maius, vt describit Dioscorides, caules emittit cubitales, aut etiam maiores, digiti magni crassitudine, pingues, benè virentes, incisuras characiz richymali modo habentes, folia pingua, pollicis magnitudine, in summo linguz speciem habentia, atque ex ipsis ea quidem quæ proximior à radici sunt, in terram resupinata sunt, quæ verò in capite, inter sese coherentia & circulum oculo

Lib. 6. simpl.

Lib. 4. ca. 14.

Forma.

similem

AIZOON Maus, siue Semperuium minus, Dodon



similem circumscribentia. Aizoon minus cauliculos habet ab vna radice multos, plenos foliis rotundis, pinguibus, paruis, in summo acutis. Emitteit & e medio caulem, umbellam & flores pallidos seu luteos sustinentem. Sic enim interpretari *χλωρά* oportet, non herbidos, vt Ruellius verit. *χλωρά* enim hoc loco, vt alijs sæpe, pro *ώχρα* accipitur, id quod etiam ex Serapione constare potest, qui locum hunc Dioscoridis sic traduxit Et habet virgam in medio longam, circa longitudinem palmi, super quam est capicellum, in quo est flos citrinus, subtilis. Videtur, inquit Dioscorides, tertium Semperuii genus esse, quod foliola habet crassiora, ad portulacæ folia accedentia, densa. In qua Diosc. descriptione nihil ambiguum, nihil obscurum dici potest, nisi in dictione *δασύ*, quæ hic, vt plurimis alijs in locis, non pilosum neque hirsutum, sed densum, rigidum & compactum significat. Ex alijs verò descriptionibus perspicuum vera hic Dioscoridis Aizoa depicta esse. Ac primum quidem, omnes Aizoon maus fatentur esse. Secundum, siue minus, id esse, quod Do-

Cap. 310.

donzus Semperuium minus, Fuchsius Sedum minus mare vocat, clarè demonstrant ramuli à radice tenui graciles, edentes foliola angustiora, rotundiora, minor, carnosà, acuta, falicotniæ colore & modo: flosculis aureis, stellatis. Præterea iidè

Cap. 311.

AIZOON Minus, siue Semperuium, Dodonæi.



AIZOON Minus, Martii. idem cum proximo.



sunt

*AIZOON Minus femina, Fuchf.**Craffula minor seu vermicularis.*

Petr. in Ad.

Locus.

Tempus.

Temper.

Vires.

Lib. 4. c. 34.



sunt natales, eadem vires, vr dicemus. Alterum irem minus, quod idem Fuchsius Aizoon minus foeminam appellat, pro secundo siue minore sedo depinxit Matthiolus. Sæpissimè colligentes id fallit propter natales eosdè, faciemq; adeò minoris sedi similem, vt mirum magis sit contraria pollere facultate. Discernitur tamen foliis rotundis, retetibus, oblongis, magis carnosis, superne rerufis, mucronatis instar vermium, è rotis ramis pendulis, flosculisq; pallidis, vel albidis. Eius species est minimum repens, hic quoq; appictu tertium Sedi genus Fuchfij, illecebra Latinis, Gallis *Pain d'oiseau*, Germanis *Rotzentreble*, pusillis ramulis parietes, saxosaq; moles & colles aridos amplexantibus, gracilibus, repentibus, foliis valde paruis & breuibus, carnosis, confertis: floribus aureis, stellatis. Semperuium maius nascitur in montosis & testaceis, supra domicilia etiam reperitur. Minus in petris, parietinis, & maceris, nec non scrobibus opacis. Tertium nascitur in saxis, sicur & minimum repens. Aizoon Maius Iulio & Augusto mensibus floret, reliqua genera

Maior & Iunio. Aizoon maius, auctore Dioscor. vim habet refrigerantem & adstringentem. Folia per se & cum polenra illita conferunt ad erysipelata, herpesas, nomas, oculorum inflammationes, ambusta, podagras. Succus verò cum polenta & rosaceo capiti in doloribus infunditur. Datur à phalangio morlis in potu, diarrhœa labotantibus dysentericisque: teretes lumbricos cum vino porus excutit. Subdicius in pello muliebres fluxiones sistit. Succus etiam in lippitudine oculorù ex sanguine orta vtiliter inungitur. Minoris folia eandem cum anredicto vim habent. Quod rectiù videtur Aizoi genus esse, vim habet calfacientem, acrem, exulcerantem, discutientē strumas, si cum axungia fuerit illitum. Eadem vi prædita est eius species repens, siue illecebra minor, gustu quasi ar. aut flammulæ. Plinius cū de Aizois, quæ suprà citauimus, scripsisset, subiungit. Omnium harum vis eadem perfrigerare & adstringere. Medentur epiphoris folia imposita vel succus inunctus: purgant enim vlcera oculorum, expletq; & ad cicatricem perducunt, palpebras deglutinant. Eadem capitis doloribus medentur, succo vel folio temporibus illitis. Aduersantur phalangiorum ictibus: aconito verò maius Aizoon præcipuè. A scorpionibus quoque, habentem id, feriri negant: Medetur & autium dolori. Quæ magna ex parte cum Dioscoride consentiunt,

AIZOON Minimum repens, tertium Dioscoridis.

Lib. 4. c. 34.

consentiunt, nisi cum omniū vim refrigerantem & adstringentē faciat, eandē etiā tertio generi tribuat, quod cōtraria prăditū esse facultate Dioscorides scripsit. Galenus maioris & minoris duntaxat Aizoi meminit, vt diximus, & utrūque scribit desiccate quidem leuiter, quandoquidē & mediocriter adstringit, omnis alterius vehementis qualitatis expert. Quare in eo plus cæteris abundat essentia aquea: cæterum non mediocriter refrigerat: est enim ex tertio ordine refrigerantium. Hinc etiam ad erysipelata, & herpetas, & phlegmonas à fluxione natas accommodatur. Herbarij quidam aliud Aizoon Telephium hic quoque depictum nuncupant, quod in saxosis & lapidosis gignitur, radice parua, candida, modicè fibrata, folijs humi circa radicem iacentibus, & eam in orbem circūdantibus, vt in Semperuiuo maiore, oblongis, nonnihil incis, etasis, hirtis, portulacæ similibus, in caule paucis, caule nunc singulari, nūc multiplici, dodrantali, flore violæ, candido, semine in siliquis exilibus, sinapi modo. Plantæ sapor initio fatuus, deinde acris vt in Nasturtio. Item aliud, quod montanum cognominant, in editissimis Alpibus proueniens, folijs multis, exiguis, circa radicem humi stratis, paucis, in caule alternatim dispositis, caule tres digitos alto, flore odorato, in medio luteo, rubris & radiatis foliolis stellato, quorū infima pars capitulo luteo vicina, alba linea notatur. Matthioli

Lib. simpl.

AIZOON Telephium, Dalech.



AIZOON Montanum.



AIZOON Arborescens, Matth.



DDd

duas arborescentis Aizoi species exhibuit, alteram ex Constantinopoli, alteram ex Corcyta. Pena multas eiusdem plantas se vidisse asserit Veronæ, Patavij, Venetiis, & in Hetruriæ hortis. Postea passim in maritimis Sclauoniæ seu Illyrij circa Dyr-rachium nasci ex amico intellexit. Demum se in sinus Bristoiensis Anglici Oceani

SEMPERVIVVM Arbo-
rescens alterum, *March.*



SEDVM Minimum
arborescens. *Lobellij.*



VERMICULATVS Frutex
maior, *Lobellij.*



Vermicularis, Sive *Stecobra* maior, *Lob.*
sive *Sempervivum* minus alterum, *Dod.*



insulis

infulis vocatis Homs se copiosum auulisse ait, sed in saxosis, nec perinde carnosum aut ramosum, tamen stipite ramisq; fruticans lignosis, duris, multis, lentis: foliis parvis & similibus, vulgare maius Sedum situ & ortu æmulatibus, minus crasis, inter vulgare Sedum maius, laureolam & tithymalum ambigentibus. Græcum verò, quod & Illyricum, maius multò & speciosius, ramis & cortice, foliorum circinato per summa positu magis laureolam imitantibus, crasioribus, tenerioribus, breuioribus, succulentis, cubitum longis in scapo pedali, & cubitali, laureolæ crasior. Adiungam hic ex Dalechampio Aizoon Dasyphyllum, idest, Densifolium, quod in parietibus & muris Viennæ Allobrogum nacti obseruauit, radice breui, capillata, pallida, gracili, in exigua terra & parietum cemento hærescente: ramulis plurimis, quatuor digitos altis, perquam spissè congestis, foliis numerosissimis, crasis,

*SEDUM Minimum
tertium, Lobelij.*



*AIZOON Dasyphyllum,
Dalechampi.*



teretibus, albicantibus, confertissimè stipatis, gustu fatuis cum leui quadam adstrictione: flore in virgulis tenuibus, candido, copioso, semperuiuo medio simili. In Gallia nusquam alibi quàm in eo tractu à se visam & reperta: non meminit. Aliud Sedum minimum tertium depinxit Lobellius, & huic, inquit, omnium logè minimo ex Syria asportatò, folia quàm Sedi minoris minora: cauliculi sesquiuiciam æquât, in quibus luteoli flores maiores pro plantæ exilitate, saxifragis albis: radix implicata, fibrata. Idem Semperuiuum paruum graphicè depinxit, Crassulam minorem Dodon. Sedum feminam Fuchsiæ Semperuiuum minus æstiuum, Semperuiuum minus Dodon. Sedum minus marem Fuchsiæ: præterea Vermicularem, siue Illecebram maiorem, qualem hic expressimus, & semperuiuum minimum seu Illecebrâ. Adhuc Sedum arborescens maius, candidis flosculis, & Sedum minimum arborescens vermiculatum, plantulam quam iisdem Syriæ natalibus habuit, fruticosam & densè geniculatam, còfertissq; foliis & ramulis: flores luteoli, vermicularis acris, uti tota facies. Postremò Vermiculatum fruticem maiore, fortassè Chamæpitum alteram Dioscoridis: cuius est aliqua varietas. Vtrique densi confortiq; ramuli: sed

ERVCA Aduralis.

quæ maior, foliis est albis densissimè conferta, denticulatis vermicularis acris, maioribus. Exilior totaq; minor altera, minus crebris foliis, teretibus, oblongis, & flosculis herbaceis Polygoni.

Nomen.
Locus.
Forma.

*ERVCA MVRALIS,*

CAP. XVIII.



QUAE Eruca muralis ab herbariis nominata est, in panetinis, murorumq; rimis & inter saxa nascitur, radice parua, breui, candida, foliis propè radicem multis, circa eam sparsis, & vndique ambientibus, oblongis, ambitu laciniato, in caule paucis, caule pedali, tereti: flore in surculis gracilibus & breuibus, albo, violæ simili: semine minuto in tenuibus & longis siliquis, sapore principio fatuo, tandem subacri & mordaci.

ASARVM MVRi,

CAP. XIX.

Nomen.

Locus.
Forma.



Locus.



ASARVM muri hanc plantam herbarij vocant, quòd Asarum foliis imitetur, & quòd nusquam alibi quàm in muris gignatur. Ex parietum fissuris prosilit, radice crassiuscula, nodosa, è rufo nigrescente, poly-podij ferè colore, in plurimos fibrarum tenuissimos villos diuisa: foliis paucis, Asaro similibus, venosis, longo pediculo subnixis: nec semen, nec florem vidi.

ASTER MONTANVS,

CAP. XX.



ASTER montanus luteus in excelsis montibus gignitur, radicibus multis, è candido flauescens, odoratis: caulibus multis, cubitalibus, villosis: foliis circa radicem densis, in caulibus paucis, longis, venosis, in ambitu laciniatis, hirsutis: flore in summis caulibus luteo, anthemidis capitulo simili: foliis stellatim radiato, in pappos abeunte. Est & Asteris lutei genus, herba hic depicta, Oculus Christi minor herbariis dicta, in sabulosis tumulis & a. idis nascens, quæ Lugduno iuxta Viennam, radice crassiuscula, nigra fibrata, dimidium

ASTER Montanus;
Luteus.



ASTER Luteus, sine oculis
Christi minor.



ASTER, Luteus, alter oculus
Christi minor.



ASTER Montanus
Hirsutus Pena.



dimidium pedem longa: foliis propè radicem multis, per terram sparsis, canis,
lanuginosis, saluzæ similimis, gustu valde amaris, caulibus tribus aut quatuor, vil-
losis, vix pedem altis, in quibus folia pauca supradictis minora, capitulo

Chamaemeli chrysanthemi, sed paulò ampliore. Pena etiam Asterem hirsutum pinxit, caule & foliis hirsutis, longioribus, Cynoglossi parui nostri paribus & similibus, radice minùs fibrata.

MYAGRUM,

CAP. XXI.

Nomina
Lib. 7.



MYAGRON Græcis, & μελαμύριον, velut & Latinis Myagrum & Melampyrum nominatur. In Paulo duæ plantæ habentur, nomine & oleoso succo affines, Myaron, scilicet, & Myagron: *μυαρὸν* quidem impurum significat, & sordidum, cuiusmodi est Melampyrum.

Μελαγρον autem muscipulam potius, siue muscariam, quæ insidentes, siue prætervolantes muscas glutine suo implicat. At Cornarius hoc Pauli loco Myagron ubique legendum censet, & non Miaron, quòd alia non sit herba à Myagro, ordinemq; lectionis hic perturbatum esse, ut primùm habeatur Myagri semen, deinde interpositis mutulis sequatur Miaros, &c. quæ eadem sit cum Myagro: quare sic restituendum esse ordinem. Myagros, quam alij vocant Melampyrum, herba est sarmentiticia ac pinguis: pinguedo ipsius corporis asperitates explanare videtur. Semen Myagri pingue est, & quod in ipso est oleosum, meatus obducendi facultatē habet. Præterea hoc loco, Myagros quā alij Melampycnum, falsò legi in Græcis codicibus *μελαμύριον* pro *μελαμύριον* putat, ut ex Dioscoride liquet. Est & hic observandum, Melampyrum istud ab eo diversum esse de quo alibi diximus. Id autem triticum vaccinum, siue bouinum vulgò dicitur, quod fortassis *μελαμύριον* Theophrasti & Galeni esse diximus. Est autem Myagrum siue Melampyrum,

Lib. 4. c. 11.
Forma.

MYAGRUM, Dodon.



Lib. 3. cap. 7.
Lib. 4. cap. 35.

pallida, semen fœnogræco simile, pingue, quo utuntur ad lucernas, torrefactum ipsum tundentes, & virgis oblinentes. Non eadem omnino Plinius tradit. Myagros herba ferulacea est, foliis similis rubiæ, tripedanea, semen oleosum, quod & fit ex eo. Dioscorides herbam esse *φρυγανώδης* dixit, idest, furculaceam, Plinius *νεφθηκώδης*, idest, ferulaceā. Id Dioscoridis Myagrum Ruellius, & cum secuti Dodonæus, atque alij docti herbarij, eam herbam esse putant, quæ Gallis *Cameline* & *Camemine* dicitur, Germanis *Flachdotter*, & *Leimdotter*, nec eam Matthioli sine tatione intrusit. Cauliculos emittit illa rectos, rotundos, sesquicubitales aut maiores, in multos furculos fissos, folia longa, angusta ferè rubiæ, denticulis in ambitu eminentibus. In furculorum summitatibus flosculi sunt lutei, deinde caliculi lini, sed magis compressi, in quibus semen fulvum sesamo aut fœnogræco simile, sed duplò minus & oblongum. Legitur tamen in vulgatis Dioscoridis exemplaribus semen *τραχύλας ιονδς*, idest, collo simile, quod Ruellius emendavit, legitè *τράλς ιονδς*, idest, fœnogræco simile, quod & de toto caliculo accipi potest. Hanc plantam rustici in Angliæ, Baratiæ, Zelandiæ, Lotharingiæ, Leodij arvis ferunt, quamvis & sùx spontis inter segetes inveniatur, melampyrum Græcis, idest, triticum

MYAGRVM Alterum
*minus, Dalecham.**PSEVDOMYAGRVM,*
Matthioli.*MYAGRVM Aliud Thlaspi*
effigie, Lobelij.

triticum nigrum ideo dicta. Semen in areis pa-
uitis rura flagris decutiunt, & vannis in auram
vento silentem iactant, dum siliquarum reci-
menta vanescant: tum trufatilibus molis subii-
ciunt, versandoque subinde oleum exprimunt,
quo non ad lumina tantum lucernarum, sed &
ciborum quoque condimenta pauperes vru-
tur, magno huius olei prouentu. Hanc ob cau-
sam quidam minus sesanum putarunt. Hoc oleo,
inquit Dioscorides, corporis scabritias leui-
gari, atque expoliri constat. Galenus scribit
myagri semen pingue esse: nam, si tundatur,
oleolum quid effundere, quod emplasticam
vim habet. Diuersam ab his facultatem tribuit
Plinius huic oleo, nempe quod medeatur oris
viceribus eo perunctis. Sunt qui plantam quam
ex Matthiolo hic ostendimus, legitimam Mya-
grum esse contendunt, sed cum folia rubra non
habeat, sed glastii potius, & semen ei sit nastur-
tij, non fenogreci, ab eis dissentit Matthiolus,
& non Myagrum sed Pseudomyagrum appel-
lat. Nascitur passim inter linum & segetes, &
eius semen audissimè ab auiculis expetitur: est

Lib. X. 11

enim dulce & gustui gratum. Myagrum alterum & minus hic depictum exhibent
herbarij quidam, quod in agtis, & nonnunquam in hortis gignitur, radiculis mul-
tis, candidis, tenuibus, foliis erythrodani, minoribus, pallentibus: cauliculis multis,
pede altioribus, flore in summo cauliculorum vertice copioso, pusillo, purpura-

scente, semine minutulo, pingui & oleoso. Aliud Myagrum ex Lobellio hic pingendum curauimus, quod iisdem quibus Camelina oritur locis, Anglis & Belgis hortenſe, folio paruo, Narbonenſis Thlaſpi parui vel leucoij matini minimi. Floſculi couſertim ſtipati umbellam exprimunt, ſtellati, lutei, eryſimi vel thlaſpeos.

FILIPENDULA ALPINA,
CAP. XXII.

Nomen.

Locus.

Forma.

FILIPENDVLAM Alpinam vocant herbatij, quam gignunt ſumma Alpium iuga paſcuſ, pratis, & vberrimo forni prouentu greges innumeros atque armenta ſaginantia, atque inde ruſticos ditantia. Hæret illa radice craſſa, nigra, multiſida. Folia ex radice proſert longo pediculo nixa, quæ foliolis multis conſtant, toto ambitu minutiffimè inciſis, ex aduerſo ſitis vt in Filipendula, quæ cauſa nominis fuit. Caulis pede altior, flores

FILIPENDULA
Alpina.



PEDICULARIS *Maor,*
Alpina.



luteos ſpicatim ſerè congeſtos in vertice ſuſtinet, quibus dilapſis vaſcula ſuccedunt oblonga, antithini loculis ſimilia, minuto ſemine plena. Huic affinis eſt quæ à quibuſdam Pedicularis maior vocatur, & in vertice Montis aurei, Gergobiz Aruethorum propinqui gignitur, radice foris nigra, napi modo gracileſcente, rugoſa, nonnihil ſutculoſa: caule ſerè cubitali, virgato, vnico: foliis filicis, in longo pediculo ordine collocatis, per ambitum crenatis, exeunte per caulem alternatim vnoquoque foliorum pediculo: flore pallido, ſpicatim in ſummo caule congeſto: ſemine copioſo, in latis corticoſis vaſculis concluſo, alyſſi modo.

GALE

GALEGA MONTANA, CAP. XXIII.



A FOLIORVM Galegæ similitudine, herbâ hanc Galegam herbarij vocarunt, montanam autem ut à Galega vulgari discernerent natalium differentia. Nascitur hæc in asperis montibus, non in eorum quidem salebris aut præcipitiis, sed in ipsis culminibus, si qua vda planities illic occurrat. Radice nititur crassâ, nigra, fibris longissimis & tenuissimis capillata, per summa terræ hæc illuc oblique vagis. Caulis multos edit pedales, teretes, folia galegæ, latiora, eminente costa per medium diuisa, minimè in ambitu dissecta, densius congesta: florem in summis caulibus pisi vel genistæ, luteum: siliquas nigras seminibus plenas, lenticultæ similibus. Efficacem esse aunar contra venena, lumbricos, morbum eaducum & pestem, non minùs quàm Galegam alteram.

Nomina

Locus.

Forma.

Vires.

DENTELLARIA, CAP. XXIIII.

QUIDAM Dentellariam hanc vocant, quæ in agri Montepelici locis aridis gignitur, radice nigra, supernè crassa, paulatim gracilescente, ima parte fibrata, caulibus multis, pedalibus, foliis longis, propè caulem angustis, in summitate latioribus, media costa diuisis, calendulæ fere similibus, acerrimi gustus & caustici, in singulis caulibus septenis fere, aut no-

Nomen.

Locus.

Forma.

DENTELLARIA.

DENTELLARIA Altera, Dod.



uchis;

uenis, quamobrem Enneaphyllum Plinij quidam esse purarunt: flore pusillo, copioso, valerianæ penè modo, purpureo, in summis tamis. Dentiam dolotibus medentur folia trita & carpis admota, pustulis enim inde excitatis, veluti in ambustis, humor dolotem efficiens reuellitur, vnde Dentellarix nomen ei posuitur fuit. Eodem modo febris quartanæ paroxysmis incipientibus tusam ægrorum carpis admouent, vt rigores citius desinant, & natura sensu doloris irritata humorem noxium aut vomitionibus, aut sudoribus valentius expellat. Vlcera quoque eius imposito corporis aliquor partibus, forasque euocaro pustulis ruptis seroso humore, pestis contagium vitari posse quidam affirmant: nempe venenatis succis pestilenti huc corpora nostra afficientibus, ab internis & principibus partibus, corde potissimum, ad exteriora & ignobilia reuocatis. Huic iungemus Dentariâ alteram Dodonzi & Herbariorum, siue Alabastritem alteram (prima Alabastrites explicata est in Libro, De iis quæ flore placent. Cap. De Anemone, trifoliæ Anemones Dodonzi nomine) Coralloidem alteram Cordi, quæ folia habet non Pentaphylli, quemadmodum Dentaria minor Matthioli, in lib. de Vmbrosis explicata, sed fraxim modo costata, mediæ costæ annexa, oblonga, lara per margines crenata, crebro ad vnâ costam seprena: flores candidos, & siliquas Dentariæ minoris Matthioli similes: radices asperas & squamosas.

POLYRRHISOS, CAP. XXV.

Nomina

Locus.

Forma.

Polyrrhiza trifolia.

Locus.

Forma.



RADICVM multitudinem herbæ huic nomen darum. Polyrrhizon inquit Plinius, folia habere myrti & radices multas, cui hanc congruere herbarij aurumant, quæ asperis gaudet. Radice est multiplici, nigra, caulibus multis, angulosis, palmum altis: foliis myrti paulo obtusioribus, per interualla geminis: flore pallido, semine in oblongis vasculis. Radices rursus, inquit Plin. dantur in vino contra serpentes: profunt & quadrupedibus. Polyrrhizon aliam latifoliam vocant herbatij in Alpium obscuris riguisque vallibus pro-

POLYRRHISOS Plin.
Dalechampij.



POLYRRHISOS Latifolia,
Dalechampij.



uenientem,

uenientem, radiculis multis, tenuibus, ab vno cespire confibratis, candidis, elleboro similibus, circumquaque diffusis, ob quam radicum multitudinem herbarij Polyrchizi nomen indiderunt: caulibus multis ex vna radice prodeuntibus, ferè cubitalibus, foliis smyrnij, siue petroselini Alexandrini Officinarum, in ambitu dissectis, ad singulos ferè exortus quinis, venosis, in acumen desinentibus: flore candido, violæ simili, longiusculis lursculis fulto, quinque foliolis constante. Copiosa reperitur in montibus qui Muræ Allobrogû oppidulo incumbunt, non procul à Gratiopolis. Valere aiunt ad vlcera maligna, & depascentia, pedumque tumores.

ALYSSVM, CAP. XXVI.

ALYSSON Græcis, similiter Alyssum Latinis sic dicitur, quod mor- Nomina
 fos à cane rabido mirificè iuuat, auctoribus Galeno, Paulo, & Plinio.
 Varia autem est Alyssi apud auctores historia. Plinius videtur rubiam
 minorem Alyssum facere: cùm enim de erythrodano seu rubia ma- Lib. 14. c. 11
 iore dixisset, subiungit. Distat ab eo qui Alyssum vocatur, foliis tantum, & ramis
 minoribus. Nomen accepit quod à cane commotos rabiem sentire non patitur
 potus ex aceto, adalligatûque. Mirum est quod additur, saniem conspecto omni-
 nò frutice eo siccati. Quæ postrema Cornarius ex veteri codice sic emendauit. Mi-
 num est quod additur, insaniam cõspecto omnino frutice eo sanari. Alyssum aliud
 descripsit Aetius his verbis. Alyssum aiunt esse sideritim heracleam appellatam, Lib. 1.
 quæ iuxta vias nascitur vbique, purpureum florem habens, & folia crassiora. Nomē
 inuenit ex eo quod commorsus à cane rabido mirificè succurrit. Item Galenus de Lib. 2. Ant.
 diuerso ab his Alyssò loquitur, conscripta ab Asclepiade medicamenta ad canis ra-
 bidi morsus commemorans. Alyssum, inquit, herba est marrubio similis, asperior
 tamen, & magis aculeata: circa orbiculos florem ad cæruleum vergentem profert.
 Hanc sub caniculæ æstu colligere oportet, exsiccata cõtundi citrari & seruati de-
 bet, nediffusetur. Hæc, opinor, Alyssa omnia à Dioscoridis alyssò disceant, sic enim Lib. 4. c. 89.
 is suum descripsit. Alyssum paruius est frutex, subasper, folia habet rotunda, fructum Forma.

ALYSSVM, Dodonæi.

ALYSSVM, Dalechampij.



duplicis

duplicis scuti figura, in quo semen quadantenus latum. Nascerur in montibus, & asperis locis. Huic Dioscoridis Alyllo nulla planta melius quadrare videtur, quàm quæ hic ex Dodonæo pro alyllo descripta & depicta est, à recentioribus quibusdā Lunaria maior appellata. Est enim caule recto, rotundo, cubitum alto, supernè

ALYSSVM, Matth.

ALYSSVM Minus,
Dalechampi.

in tres quatuorve furculos sese findente: foliis primum rotundis, deinde longis, incanis, ac nonnihil tomentosis, asperiusculis, radice exili. In furculorum fastigiis flosculi multi lutei nitent, deinde folliculi asperi, candicantes, compressi, in rotunditate oblongi, clypeolorum effigie, quos duplicatos facit membranula diuidens vtrinque seminum seriem duplicem, quæ sunt compressa, leucioj similia, sed maiora. In hortis colitur ab herbarijs. Iunio floret, Julio semen maturum est. Luculentiore figura sic expressimus. Plantam aliam Itali fecerunt Alyssum, vel Alylji genus, quos secutus Matthiæ libro tertio omniam eadem depinxit. At doctiorum omnium Monspelienfium, apud quos frequens oritur, sententia, thlaspeos generibus adnumeranda est, non Alylji, cui multo aptius cõuenit, à Dodonæo depicta. Alyssa alia herbarij depingunt, minus videlicet, quod in sabulosis crescit, radice candida, parum fibrata, satis longa, cauliculis multis, rotundis, lanuginosis, supra terram parum extantibus: foliis multis albicantibus, & tanquam cinere conspersis, aizoo minori similibus, si rotunda & non lata forent, gustu farvis cum paucula adstrictione: flore in summis virgis copioso, luteo, semine lini, minuto, rufo, in loculis scuro similibus, duplicibus, membrana tenui & pellucida distinctis. Alyssum aliud trigonum ob loculorum seminis triquetram figuram nominant, quod nascitur in asperis, lapidosis, & solis diuturna mora æstuosis locis: radice breui, lignosa, parum fibrata, caulibus tribus aut quatuor palmum altis, foliis oblongis, angustis, in ambitu minimè diuisis, per interualla prodeuntibus, flore Aprili emicante: semine rotundo, minuto, papaueri simili in conceptaculis triangularibus, scuto figura similibus, vt & in Alyllo. Aliud Alyssum ostendit Lobelius, Germanicū Echiioides, siue facie Molluginis, Aparine Plinij creditum. E' radice geniculatis, bicubitalibus, cauliculis asperis, Aparines ritu vicina quæuis arripit: folia bina & terna ex arro virentia, Echij modo hispida, Rubiæ paria, & aliquando maiora, flosculi purpurei violacei, Echij minores verticillatim Cruciarum modo à medio caule summe tenus dispositi. Semen inuolucris

volucris foliaceis sinuosis sesamo simile aut Thlaspi, fuscum, gustanti dulcè claudicatur. Vniuersa planta gustu Echium æmulatur. Eximias Alyssi vires tradit Dioscorides, his verbis. Alyssi decoctum, inquit, singultus sine febris potu discutit, idem efficit si quis teneat, aut odoretur. Cum melle tritum lentigines, & maculas

ALYSSVM Trigonum,
Dalechampi.



ALYSSVM Germanicum
Echinosides, I. Abel.



sole contractas purgat. Putatur & rabiem canis sanare contusum in edulio, & exhibitum (sunt enim hæc Dioscoridis verba, *δοκεῖ δὲ καὶ λύσσαι κυνὸς ἰσχυρὰ συγκεκινῆσαι ἐκλύσαι καὶ διαλύειν*, quibus significare videtur, Alyssum ipsius canis rabiem sanare, nisi *λύσσαι κυνὸς* eam rabiem, quæ ex cane homini inducitur sit accipere velimus, vel legatur locus in vti in veteri codice, *δοκεῖ δὲ καὶ λυσοειδὲς* And Lac. *ἰσχυρὰ*, &c. id est, contusum in cibis exhibitumque, iis, quos rabidus canis momordit, mederi videtur.) Sed & in domo suspensum salutare esse creditur, cum hominibus, cum aliis animalibus, ne à fascino lardantur. Quin & puniceo panniculo alligatum, pecorum morbos abigit. Quod verò de singultu ille, idem Plutarchus scripsit, *τὴν δὲ ἀλωσὴν χαλαρῶντι βοτάνῃ καὶ λελύσταις ἐπὶ τὴν χεῖρα μόνον, ἐπὶ δὲ καὶ προσβλέψασαι, ἀπαλλοτρίωνται λυγρῶς*. Id est, Alyssum herbam manu tenentes solum, alij verò intuentes, singultu liberantur. Galenus dilucidius eius facultates declarat. Nuncupata est Alyssum herba, quòd mirificè iuuet morbos à cane rabido: sed & rabienti quoque data sæpè in totum sanauit, atque hoc ex totius substantiæ similitudine efficit, dictumque prius est talem facultatem sola percipi experientia, & planè nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experiatur, cognosceret facultatem habere mediocriter siccantem & digerentem, cum hoc vt absterforium nonnihil etiam obtineat. Hac ratione & vitiliginem & ephelim purgat.

And Lac.

Lib. 4. Sym.

Lib. 6. Sim.

Nomina

Forma.

Lib. 46. 90.
Lib. 17. 64.Cap. 46.
Lib. 4. 64.
In cap. 90.
lib. 4.

ἈΣΚΛΗΠΙΑΣ Græcis, Asclepias Latinis, quibusdam *κισσός*, id est, hederula & *κισσός*, hederatolium, Herbariis Hirundinaria, Officinis Vincetoxicum, Germanis *Schmalbennurtz* appellatur. Asclepias autem ab Aesculapio, qui *Ἀσκληπιός* Græcis dicitur, antiquo medicinarum auctore, nominata est: hirundinaria verò à siliquis quas producit, quæ dehiscen-tes plumosum semen ostendunt, atq; adeò hirundinis effigiem referunt. Vincetoxicum, vel rectius *νεκτάρειον*, quod illi insignis aduersus venena vis insit. Asclepias, ut describit Dioscorides, ramulos profert longos, in quibus folia longa, hederæ similia, radices multas, tenues, odoratas, flores grauitè olentes, semen securidacæ. Nascitur in montibus. Eadem prorsus Plinius habet. Asclepias folia hederæ habet, tamos longos, radices numerosas, tenues, odoratas, floris virus graue, semen securidacæ. Nascitur in montibus. Ex qua descriptione perspicuum est Fuchsum & Dodonæum rectè Vincetoxicū pro Asclepiade depinxisse, illum à Matthiolo minis rectè reprehensum. Nam caules fert laues, rotundos, tenues, flexiles, fractu contu-

VINCETOXICVM

sive Asclepias, Fuch.



VINCETOXICVM,

Matthioli.



maces, cubito altiores, in his folia quidem hederæ, rigida, ex atro virentia, sed aliquantò longiora, & quasi supernè mucronata: flores in petiolis exiguos, candican-tes, odoris grauis, & ingrati, herba virente, quibus succrescunt siliquæ teretes, oblongæ, quæ dehiscen-tes semen cohibent securidacæ simile, id est, rufum & latum, lanugine obuolutum. Radices longæ sunt, rotundæ, innumeris ferè capillamentis fibratæ, odoratæ. His accedit locus natalis, prouenit enim in montibus asperis, altis & arenosis, aut aridis collibus, præsertim Narbonæ, & apud Ligures Taurinos. Præterea vires consentiunt. Radices cum vino potæ, inquit Diosco. torminibus & venenatorum morsibus auxiliantur, folia imposita ad mammarum & vteri maligna Lib. 46. 90. Lib. 17. 64. vlcera faciunt. Sic Plinius. Radices torminibus medentur, & cōtra serpentium ictus non solum potu, sed etiam illitu. Galenus ait Dioscoridem de Asclepiade scripsisse se verò

se verò nondum eius periculum fecisse. At Paulus scribit calidam succamq; esse, & tenuis substantiæ: torminibus in vino potam competere, illitam verò venenatorum moribus, & malignis mammarum ac vteri vitiis succurrere. Sic vincetoxicum amarum est, parum glutinosâ eius radix. Folia aliquam præferunt adstrictionem. Recentiores eius radice vti, primum cum aduersus venena, tum ad ulcera, magnû sibi

Fuch. lib. 4.
Penna
Ad.

ASCLEPIAS Nigra,
Dalechampi.



& plantæ nomen pepererûr, neq; posterî potuerunt postea adduci, quin pro Asclepiade agnoscerent & vterentur. Adhæc eiûdem radice vtuntur magna efficacia ad mensium prouocationem, & ad rabidi canis morsum, eandem in vino maceratam & coctam hydropicis mirè auxiliari tradunt. Flores præterea foliisque siccata, mox trita vulneribus vtiliter inspergi aiunt, sordida etiam vlcera purgare, & ad cicatricem perducere, genitaliumque vitiis & rupturis egregiè mederi docent. Ob superioris asclepiadis similitudinem, herbarij hic appictam Asclepiada nigram vocant, à floris colore. Est enim antedictæ toto plantæ habitu similis, viribusque iisdem prædita, solo floris atro colore discrepans. Eadem prorsus, opinor Lobellij est Asclepias altera flore nigro, siue aliud Vincetoxicum, in agri Mœspeliensis collibus. Frontignani vicinis, & Belgij hortis, quod à floris pullo colore, nonnihil purpurante, minimè albo, vt alterius, nigrum vocatur, cauliculis flexuosis ternum & quaternum cubitorum, proxima quævis fulcra Periplocæ modo, quam etiam quia refert, Periplocam fecerunt, scandendo ambit: cætera priori similia, succo pallido turget.

CERINTHE PLINII. CAP. XXVIII.



PLINIUS Cerinthen scribit esse folio candido, incuruo, cubitalem, capite concauo, mellis succum habente, horum floris audivissimas esse apes. Quam herbam coniectarunt docti herbarij esse eam quæ hic depingitur, in aridis & apricis provenientem, radice longa & crassâ, caulibus multis, torundis, pedalis, foliis longis in acutum desinentibus, superne candidis, punctis quasi de industria notatis, inferne villosis, caulem ima sui parte sic ambientibus, vt per rimam in iis diuisis caulis trahere videatur. In surculos caules diuiduntur, qui florem oblongum dactilidi similem, sed minorem, luteum, in cacumine fundunt, quo delapso in vasculis minutum semen continetur, per ambitum crenatis, exstante in medio apice tenuissimo. Pulmonariam & alias plurimas plantas videmus maculis insignes, sed quæ tam crebris & densis, atq; ita distinctis conspersa sit, nullam hæcenus vidi. Parisienses in hortis alunt, ac nominis huius ignari telephium vocât.

Lib. 4. c. 11.

Locus.

Forma.

Nomina

Locus.

Forma.



FLORIS puniceo siue ferrugineo colore, & foliorum cum Elleboro albo similitudine, hanc Elleborinem ferrugineam siue puniceam nominarunt herbarij, quam ab Elleborine Dioscoridis plurimum differre non ignorant. Est, inquiunt Pena & Lobellius, recentiorum calceolus Marig, Damafonium nothum Dodonæi

de florib. In asperis, sitientibus, & confragosis montium iugis nascitur, radice obliqua polygonati modo carnosâ, subrufa, in quamplurimas fibras, huc illuc vagantes diuiscata: foliis Ellebori albi, septem aut octo, latis, venosis, ima sui parte caulem amplectentibus, nec ab eo separatis: caule pedali, flore in caulis vertice unico, in quatuor foliola, radiis similia extrinsecus diuiso, quorum duo latiora sunt, duo angustiora, ferruginei coloris. Hæc cauum quidpiam galero aut calathio simile circundant luteum, intrinsecus lineis rubris virgatum. Ex radiorum medio velut ex aperto hiantēque rictu lingua duplex porrigitur, candicans, canaliculata, extroorsum altera, altera introorsum, exili breuifque fulta pediculo, eleganti & planè admiranda floris specie. Maio mense floret. Amari gustus est, & odoris nonnihil grauis. Vulnerariam herbam esse, plagasque recenter illatas sanare aiunt.

Tempus
Vires.



THALICTRVM, Dodon.

CAP. XXX.

Nomina

Lib. 4. c. 93.

Forma.

Lib. 17. c. 13

Lib. 6. sim.

Forma.

Dodon. lib.
1 cap. 77.
Pena in
Adect.



VON Græcis θαλιττον & θαλιττον nominatur, similiter Latinis Thalictrum & Thalictrum. Id sic descripsit Dioscor. Thalictrum folia coriandro similia habet, sed pinguiora, caulem rutæ crassitudine, in quo folia. Plinius iisdem ferè verbis depinxit. Thalictrū folia coriandri habet, pinguiora paulò, caulem papaueris, nascitur vbique præcipuè in campeltribus In quibus iechunos legisse videtur, id est, papaneris, pro coriandri, id est, rutæ. Dioscoridem secutus est Galenus scribens. Thalictrum folia habet cotiandro similia, caulem crassitudine rutæ. Sed tam succincta delineatio facit, vt alij aliam herbam pro Thalictrō exhibeāt. Doctiores tamen eam quæ hodie à Chirurgis Sophiâ dicitur, Germanis *Puellsomen*, Thalictrum esse asserunt, tum propter figuram apud congruentem, tum propter eximias sanandū vlcera maligna vires. Est enim foliis minutissimè incisis, coriandri, sed tenuioribus,

seruoribus, aut absinthij Romani albicantibus, caulibus sesquicubitalibus, rotundis, rectis, lignosis, rutaceis, pallidulos vel luteos flores in summo proferentibus eruct, vel sinapi siluestris, nec dissimiles siliquis, sed exiliores, semen exile, rubellum cohærentes. Secus vias, incultis locis, macerisq; frequens est. Iunio mense floret in Septembrem usq;. Talistrum, inquit Dioscorides, vlcera antiqua ad cicatricem perducit. Scribit Galenus vim ei inesse exsiccatóriâ citra morsum, quare vlcera inueterata cicatrice obducere. Plinius folia mederi vlceribus air cum melle. Sic Sophiam tradiderunt Chirurghi practici, qui ætate Guidonis, & Petri Argelatæ vixerunt vlcera antiquata & maligna sanare & glutinare, semen eius cum vino aut aqua chalybeata potum dysenteriam, alui & sanguinis fluxiones cohibere. Fuchsius, Tragus, Cordus, perperam Seriphium Germanicum fecere.

Locu.

Tempus.

ibidem.

Virtus.

Tempus.

Lib. 6. sim.

ibid.

Cap. 4.

ATHANASIA LEUCANTHEMOS, CAP. XXXI.



ATHANASIA leucanthemos in nemoribus & dumetis aridis provenit, radice plurimis fibris capillata, caule cubitali, & nonnunquam altiore, ramis multis brachiato, foliis Athanasie chrysanthemi, paulo magis dissectis, coriandri ferè incisuris, gustu principio subdulcibus, sed cum diu mansi fuerint, os & fauces incendentibus, pyrethri ferè modo, sed imbecillius: flore in ramorum fastigio radiato, per ambitum candido, intus melino. Hanc plantam Vchnam albam esse Auicennæ quidam volunt, vel, ut legit Bellunenſis, Achnam, citrinam verò Athanasiam chrysanthemum, licet interpret Vchnam conuertat matricariam, quam vnus tantum generis & non duplicem agnoscimus, vt propterea interpreti fides minùs habenda sit. Ceterum huic nostræ plantæ conuenit quod Auicenna scripsit, Vchnam candidam lutea valentiorè esse. Hæc enim vt Athanasie luteæ sapore perquam amarum feruida acrimonia sua longè vincit, sic ab ea odoris gratia superatur. Quare hæc videtur esse Tanacetum nõ odorum siluestre Lobellij & Penæ, sponte in Delphinatu propè Valentiam frequens, nullo odore præditum.

Locu.

Lib. 2. c. 73.

rum siluestre Lobellij & Penæ, sponte in Delphinatu propè Valentiam frequens, nullo odore præditum.

AMBROSIA, CAP. XXXII.

VEMADMODVM *Ambrosia* veteribus Græcis τὸ τῶν θεῶν βρώσιον, id est, deorum cibus dicitur, quod mortales eam non edant, vel quod qui eam ederint immortales euadant, ita eximie fragrantie gratia etiam diuis expetita, ne dum coronamentis, plantæ Ambrosiæ nomen dedat, vel quod eius in cibus vsus longæuos faciat homines. Hæc, vt scribit Dioscorides, frutex exiguus est, tres palmos altus, ramosus, folia habens circa caulis exortum parua, vt rutæ. At cauliculi seminibus referti sunt, similibus racemulis, qui nunquã borent, odor est vinosus, iucundus, radix tenuis, longitudinis duorum palmorum. Nescitur in Cappadocia in coronas. Plinius eadem tradit. Ambrosia vagi nominis est, & circa alias herbas fluctuanſis, fruticem vnũ habet, densum, ramosum, tenuem, trium ferè palmorum, tertia parte radice breuiore, foliis rutæ. Circa imum caulem in ramulis semen est, vuis dependentibus, odore vinoso, qua de causâ Borrys à qui-

Nomina

Lib. 4. c. 11.

Forma

Lib. 17. c. 4.

busdam vocatur, ab aliis Artemisia. Coronatur ea Cappadoces. Matthiolus genuinam Ambrosiam quam hic depinximus, esse credit, eadem quæ Ambrosia spontanea strigosior Lobellij alteram tamen quam prima Latinorum commentariorum editione pro vera expresserat, etiam Ambrosiam facit, ut altera mas, altera femina dici possit, aut certe congeneres plantæ ut ambe censeantur. Verum posterior non

AMBROSIA Prima, Matth.



AMBROSIA Altera, Matth.



AMBROSIA Hortensis procerior, Lobellj.



AMBROSIA, Montana.



Ambrosia,

Ambrosia, sed Artemisia tenuifolia multis videtur esse. Saxosis locis sponte nascitur. Loc. barur Ambrosia, nunc non nisi in hortis colitur, in quibus si procèrior quàm quæ sponte oritur, fuit, non est quod quis ob id Ambrosiam esse neget, cum planta aridis vel saxosis locis nata, si in hortis colatur, facile incrementum capere, & habitior atque vegetior reddi possit, qualem pictura hæc ostendit, quæ est Ambrosiæ hortenlis campetrem & spœce enatam foliorum magnitudine, longè superantis, odore, sapore, habitu non diuersis. Vires Ambrosiæ à veteribus assignatæ tam egregiæ appellationi haud respondent. Vim habet, inquit Dioscorides, sistendi ac reprimendi, & illitu adstringendi humores, qui in aliquam partem illabuntur. Plinius, vsus eius ad ea quæ discutit opus est. Verù his verbis Plinius vim repellendi *interpres* Dioscoridi dictam, in vim discutendi *Amorpha* appellatam commutauit. Nam & Galenus scribit Ambrosiam illicitam vim habere adstringentem & repellentem. His subiungemus plantam quam Ambrosiam montanam Herbarij vocant. Quæ ex obseruatione Dalechampij, in Allobrogum monte Gratianopoli vicino quem Diui Anardi vocant, in alta & opaca silua gignitur, fruticosa, exili radice, proluxa admodum, lignosa, nigricante: quatuor aut quinque cauliculis, dodrantalibus erectis: foliis laxe viti aut pruno siluestri similibus, venosis, subrotundis, in ambitu nonnihil serratis, quatuor aut quinque ferè simul ex eodem in caulibus loco prodeuntibus: bullis multis absque flore, in caulium summis virgulis racemetim coherentibus, angulosis, subrotundis, prominente è singulis apice, muscarum rostro siue proboscidi simili, saporis aceti.

Forma.

libidem.

Lib. simpl.

Locus.

Forma.

ANTHYLLIS,

[CAP. XXXIII.



ANTHYLLEIDES aliquot explicauimus in libro de maritimis plantis, quosdam alii hoc aptiore loco declarabimus. Primum eam quam Anthyllidem secundam vocant herbarij, Monspelienfis luam muscatam, in agro Monspelienfi vbique nascentem, radice crassiuscula, modicè

ANTHYLLIS,
II. Herbariorum.



fibrata, non admodum longa, candicante, tribus aut quatuor cauliculis, dodrantalibus, minime surculosis, ex eadem radice surgentibus: foliis Chamæpityos tertiæ circum caules densis, in vertice potissimum, oblongis, in ambitu dissectis, sed non Chamæpiteos modo in tria foliola fissis: flore purpureo ad foliorum exortum ex interstitiis prodeunte, odorato: semine in vasculis exiguo. Eandem agnouit Pena, & Anthyllidem Chamæpityoidem vocat, quæ in oliuetis, inquit, & aridis aruorum marginibus Narbonæ ac Galloprovinciæ fruticat, nec alibi temerè nota. Moschata autem vulgò vocata fuit, quòd odora quidem sit, sed olfactu minime grata, nec pinum redoleat, verè & odoratæ chamæpityi cognata, sed rigidioribus surculis, sarmentosis, lignosis, breuioribus, foliis lartioribus, longioribus, leuiter incisis, copiosis, lanugine obductis: floribus inter hæc maioribus, purpureis, semine hirsuto: radice lignea, gustu amaro, ingrata tota, & nonnihil styptica. Clusius Anthyllidis alterius nomine depinxit. Alia est Anthyllis montana, quæ in vmbrosis montibus nascitur, radice breui, contorta, alba, modicè fibrata, caulibus



multis, palmum altis, rotundis, foliis densis, per caules alternatim dispositis, longis, linariæ modo, propè caulem trifidis, gustu subfalsis, è quorum medio, flos exit, deinde semen minutulum in rotundis loculis lino similibus, quibus herbaceus apex veluti præfixus insidet. Lobellius pinxit Anthyllidem alteram Italorum Camphoratæ congenerem (de qua in fine libri huius dicemus) stirpem tenuifoliâ, humilem pinum exprimentem, quam Dioscoridis alterum Anthyllidem Aiugæ foliis & ramulis putabant Itali docti. Sed quum minus olida sit, Monspelienſium Iuam Moschatam pro secunda Anthyllide retinendam cenſet. Surculis, foliis, ortu & facie Camphoratam adumbrat sed exilior tota & summis virgultis, tomentosis, mucosis flosculis, luteo pallentibus, gustatu præficcis.

LINARIÆ,

CAP. XXXIIII.

Locus.
Forma.

Linæ, cerulea.
Forma.

Locus.
Tempus.
Vires.

MULTAS Linariæ species herbarij obseruarent, quarum aliquot hæc depinximus. Prima est Linaria tenuifolia cognominata, quæ in aridis, macris, & perflatis nascitur: radice valde capillata, nigra: caulibus multis, dodrantalibus, rotundis: folio lini, tenuissimo & subtilissimo: saporis subauster: flore copioso: priusquam hiet, rubentem: apertus est, ex rubro albicante: semine minutulo: in oblongis & corticosis vasculis. Linaria cærulea radicem mittit duram, lignosam, albam: folia proximè radicem multa, burse pastoris similia, lacinia, rariuſculè venosa: caulem cubito proceriorem, foliis vestitum, longis, Linariæ similibus, angustioribus, nigrioribus, per ambitum minimè incisis, quinis senisve ex vno pediculo in caule extante simul prodeuntibus, capillacea tenuitate: ramulis multis, gracilibus: flore copioso, ex cæruleo albicante, in thyrsi modum congesto, quo decedente vascula subsequuntur infernè valde compressa, supernè latiora, bifida, vt in Elatine. Gignitur in aridis, squallètibz & apricis. Floret Maio deficiente. Totius plantæ sapor amarus est. Vlcera sordida purgat, lumbricos interficit,

LINARIA *Tenuifolia.*



LINARIA *Carulea, Dalech.*



LINARIA *Odorata, Ded.*



LINARIA *Minor, Dalech.*



interficat, obstructions expedir. Linariam odoratam profert ager Lugduno vicinus foliis similem vulgari. Cæterum huius flos ex caruleo candicat, vulgaris sub-luteus est, & corniculata cauda terminatus, ille minime: præterea suavisimè olet, quamobrem odoratam vocauerunt, cum vulgaris flos grauem odorem spiret. Linariam odoratam etiam pinxerunt Dodonæus & Clusius, quæ singulari est caule, nonnunquam cubitali, in multos tenues ramulos superne diuiso, quos oblonga folia,

folia, lino similia ambiunt, quæ tamen iuxta radicem sunt humi sparsa, longè maiora latioraque, bellidis foliis similia, sed per ambitum serrata, nonnulla etiam per caulem sparsa, altius incisæ: flos exiguus, copiosus virgulis seu ramulis spicatim insidet, cæruleus, laundula: fere æmulus extrema parte hamuli instar incuruus

LINOSTRIS Recentiorum, Lobell.



(quem pictor non satis accuratè expressit) aliquantulum odoratus: semen exiguum, rufum, in valvulis, linariæ similibus, sed minoribus continetur. Radice est singulari, candicante, minimi interdum digiti crassitudine. Sponte provenit montosis Castellæ locis, lapidoso & arido solo, ubi Aprili floret, & Maio, Iunioq; semen profert. Linaria minor in saxosis & asperis Arbæ fluvij propè Genevam ripis gignitur: radice breui, nigricante, capillata: cauliculis multis, dodrantalibus: folio lini, numerofo: flore purpureo, corniculo simili, phœniceum verticem amplectente, & contegente: semine parvo, in rotundis vasculis, lino similibus, præfixo pilo tenuissimo insignibus, capreolo simili. His addenda ex Lobellio Linostyris recentiorum, quæ sic vocarunt propter similitudinem cum Linariis & Scopariis. Est enim virgis rigidis & foliis Scopariæ aut Oxyridis vulgaris: sed flores in summitatibus luteo fulvo languent, Asteris montani angustifolij vel Crithmi Chrysanthemi situ & positu: parilitate & effigie conyzæ maioris aut minoris. Cauliculi pedem & cubi-

LINARIA Aurea, Tragi.



PASSERINA, Linaria folio, Lobellj.



cum æquant. Hanc in collibus Narbonensis Galliz non procul à mari erutam meminit Lobellius: qua ad Balnea propè Frontignanum itur. Est acris gustati, glutinosa, amaricans, Senæ æmulo sapore, ad Thymelæam accedente. Tum Linaria aurea Tragi, Hyssopus umbellifera Dioscor. Guilandino, Helichrysi genus. Prorsus genere eadem Linosyridi videtur: facie siquidem, iisdem foliis & cubitalibus summis alis multifidis cauliculis neutiquam diversa: sed extrema florum bullata capitula copiosis aureis villis referta, fulgent: radix lignosa, fibrata, semen exiguum. Præterea Passerina Linariæ folio, Linariis ob simile effugiem reddida: folia etenim Linariæ similia, sed aceruatim in capitulis coriandrinis seminibus paribus, summis Chrysocomes similibus, pallidioribus, surculosis pediculis lini stoculi pallentes. Ex agro Monsipeliensi oriunda. Hæc Lobellius.

HYPERICVM,

CAP. XXXV.

QUÆ planta Græcis ὑπερίκον, ἀνδροῦν & χαμαίπυτος, Latinis similiter Hypericum, Androsæmum, & Chamæpitys nominatur, Mauritania *Reisifricum*, & *Reisofricum*, Italis *Hyperico*, & *Perforata*, Germanis *S. Johannis-kraut*, Hispanis *Cornaconcillo*, Gallis *Millepertuis*. Androsæmum ob florem, qui digitis confricatus sanguineum emittit liquorem, dixerunt: Chamæpityn verò ab odore seminis resinaceo: Perforatam, & *Millepertuis*, quòd folia soli obuersa innumeris foraminibus scatere, & omni ex parte punctis quibusdam peruersa esse videantur, quod neque à Dioscoride, neque à Plinio annotatum fuit. Hypericum, ut descripsit Dioscorides, frutex est surculosus, palmi altitudine, folia

Nomina

Lib. 3. c. 113.
Forma.

HYPERICVM, Matth.



habens rutæ similia, florem luteum, (in vulgatis Græcis exemplaribus Leucoij mentio nulla, in Oribasio tamen legitur, ὡς ὁ ἔχει μέλαν, λευκοῖο ὅμοιον, idest, florem habens luteum, Leucoio similem, quam lectionem Matthioli approbat. Nam Hypericum floris colore violam luteam proximè refert, utenduinq; voce Græca Leucoij ceter, ne ex albo aliqua suboritur difficultas, quod fortasse Marcel. Florentino imposuit, qui florem Hyperici album interpretatus est,) qui inter digitos tritus sanguineum succum remittit, ramulos subhirsutos, in rotundo oblongos, magnitudinis hordei (in emendati sunt hoc loco vulgati codices Græci, κλωνία μῖν ὑποδάσκα, περιπλεῖ, ἢ τῷ περιπλεῖ, μέγιστος κεῖται, ἢ ὡς σπέρμα, &c. in quibus necessario deest vox, locū quo semen coëneatur significans. Quare hanc lectionem minimè secutus Ruellius legisse videtur, περιπλεῖται ὑποδάσκα, vertit enim subhirsuta siliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine, semine intus nigro, &c. Cornarius verò sic legit, κλωνία μῖν ὑποδάσκα, χερσὶ περιπλεῖται, &c. Idest, ramulos subhirsutos, fructum in

rotundo oblongum, hordei magnitudine, &c. in quo semen nigrum, resinā olens. Nasceitur in locis cultis, & asperis. Ex hac Græci codicis emendatione, & præcipuarum huius plantæ notarum declaratione, neminem latere potest, eam Hypericum Dioscoridis esse, quæ hodie à Medicis & Chirurgis maxime celebratur, & vñ quotidiano vsurpatur. Sunt autem notæ maxime duæ, quæ id certò demonstrant nempe

Locus.

nempe cruenos florum contritorum succus, qui odori sunt, pingues, glutinoso cōtactu hærentes, & seminis odor resinaceus, in pericarpis copiosi, amari & ingiati gustanti. Plinius non omninò Discoridi consentit, etiamsi de eadem herba agat, his verbis. Eadem præstat Hypericum, quam alij Chamæpityn, alij Conon appellant, oleraceo frutice, tenui, cubitali, rubente, folio rutæ, odore acri, semine in siliqua nigro, maturescen- te cum hordeo. Hæc Plinius. Hypericum æstate floret, lulio potissimùm & Augusto mensibus. Vim habet ciendi vrinā, auctore Diosco- ride, & ducendi menses appositum. A tertianis quartanisque cum vino potum li- berat. Semen quadraginta diebus potum ischiadicis medetur. Folia cum semine illita sanant ambusta. Natura semini Hyperici spissandi, inquit Plinius, aluum si- stit, vrinam ciet. Ad calculos vesicæ cum vino bibitur. Galenus verò scribit cale- facere & siccare, essentiaq; tenuis esse, adeò vt & menses & vrinās prouocet. Sed ad- hæc totum sumendum esse fructum, non tantum semen. Porro cum foliis viridem illitam ad cicatricem ducere cū alia, tum omnia ambusta. Cæterum si sicca contu- sa inspergas, humida & putredinosa vlcera sanare. Sunt & qui ischiadicis bibendū exhibeāt. Hyperico, vt scribit Matthiolus, vis inest referādi, resoluēdi, agglutinādi, atque etiam cohibendi. Eporum semen ex vino calculos eiicit, & venenis aduersa- tur, venenatorumq; moribus resistit, tum idem potum, tum herba ipsa deuorata haustive, tum moribus illita. Aqua stillaritia florentis herbæ maximè prodesse dicitur comitialibus & resolutis, si iis potanda detur. Datur seminis farina cōmodè cum Polygoni succo ad sanguinis reiectiones. Inest floribus & semini mira facul- tas ad vulnera omnia sananda, præter ea quæ in capite sunt. Ideoq; oleum in quo diu flores & semine prægnantes siliquæ maceratæ fuerint, diuq; insolutæ, miriicè recentia vulnera sa- nant, sed id efficacius præstat, si cum lari- ceæ, aut abiegne lacrymæ oleo misceatur. Idem per se ven- tri illitum dysente- ricos iuuat, potum verò cochlearis mē- sura lūbricos necat. Clusius Hyperici ge- nus ostendit, quod multis cōstat ramu- lis per terram stratis, numerosis, con- fertisque foliis eos ambientibus, alteri Hyperico similibus, sed planè tomento- sis & incanis: flores sunt secundū ramu- los lutei, aliquantulum tamen pallidio- res & minores quā in vulgari, quibus succedunt capitula vulgari similis: radix lignosa

HYPERICVM Humi stratum, Clusij.



L.L. Strep.
Hisp. c. 701.

HYPERICVM Tomentosum, Lobelij.



alteri Hyperico similibus, sed planè tomento- sis & incanis: flores sunt secundū ramu- los lutei, aliquantulum tamen pallidio- res & minores quā in vulgari, quibus succedunt capitula vulgari similis: radix lignosa

HYPERICVM Syria-
cum, Lobelij.

lignosa & duratam etiam ipsi per terram strati-
radices & fibras agunt. In conuallibus qui-
busdam non procul à Salamantica crescit, vbi
Iulio florent plantæ latè sese diffundentes: item
in Valentini regni maritimis, vbi Martio flo-
rent. Proculdubio hæc inter Hyperici genera
referenda est, cum plurimum illi respondeat
imbecillior tamen, & vulgari magis odora. Lo-
bellius adiecit aliud Hypericum tomentosum,
quod prouenit in locis agri Monspeliensis na-
tura vliginosis, sed feruidiore sole exultis, pal-
mo non maius, & humi stratum, foliis item mi-
noribus, & per interualla rarioribus: flore & se-
mine luteolis, pallidioribus. Tota planta cana
est & hirsuta, minus odorata, Hyperici sapore,
sed imbecilliore. Præterea Hypericum Syria-
cum & Alexandrinum, cuius folia quadruplò
minora sunt quàm nostri Europæi, quæ sum-
mis cubitalibus virgultis confertim tanquam
in verticulis exeunt. Flores lutei nostri per-
similes.

ASCYRVM,

CAP. XXXVI.



ΣΚΥΡΟΝ & ἀνδροσέμνιον, atque etiam Ἀνδροσέμνιον, Latinis similiter
Ascyron & Ascyroides. Hæc Hyperici species est, inquit Dioscorides,
magnitudine differens, maiores ramos habens, surculosiores, puni-
ceolis, folia tenuia, flores luteos, fructû Hyperico similem, resinacei

Nomina

Lib. 3. cap. 30.

Forma.

ASCYRVM, Matth.



odori, qui cum digitis teritur, ipsos ferè cruen-
tat: qua de causâ Androsæmum vocauere. Pli-
nius parum à Dioscoride discrepans, scribit,
Ascyrum & Ascyroides similia sunt inter se &
Hyperico, sed maiores haber ramos quod
Ascyroides vocatur, ferulaceos, omninò ru-
bentes, capitulis paruis, luteis: semen in calicu-
lis, pusillum, nigrum, resinosum. Comæ triæ
velut cruentant, qua de causâ quidam hanc An-
drosæmum vocauere. Galenus Ascyron Andro-
sæmi genus facit, vt dicitur. Verum id Ascyru
est à Matthiolo cum Hyperico affabre in
commentariis expressum, quale & hic depinximus,
iam notissimum, amnium & riguorum, riuulo-
rumq; prætensum amans valde, quadratos &
rectos viticulos è radice multum fibris sparsa
exiles erigens, Hyperici foliis, paulò maiori-
bus, venosis, poros peruios habentibus, & flo-
ribus iridem luteis, coccineum cruorem affri-
canti illipientibus: seminis odore resinaceo sui
indice, nares feriente, haud disparis, sed infre-
quentioris vsus. Facit huius fructus, inquit

Lib. 27. c. 1.

Lib. 8. simpl.

Pena in
Aduers.

Lib. 4. c. 54.

Vires

Lib. 27. c. 4.

Dioscorides, cum hydromelitis heminis duabus potus, ad ischiadas ducit enim crementa multa. Sed assidue dare oportet donec sanitati restituantur. Idem in positis ambustis prodest. Plinius, vsus seminis, inquit, ad ischiadicos, poro duabus drachmis in hydromelitis sextario. Aluū soluit, bilē detrahit. Illinitur & ambustis.

ANDROSÆMVM,

CAP. XXXVII.

Nomina

Lib. 9. c. 17.

Forma.

Lib. 26. c. 4.

Locu.

Cap. 1. h. 3.

ΝΑΡΘΕΪΜΟΝ quibusdam Dionysias & Ascyrum, Latinis etiam Androsæmum nominatur, quasi humanum sanguinem dixeris, quod sanguineum succum emitat. Ab hyperico ascyroq; differt, ita tradente Dioscoride, quod fructet ramulis sicutulosis ac tenuibus, virgis puniceæ coloris, folia habens triplo aut quadruplo maiora quàm rutæ, quæ trita vinosum succum remittit: alas in cacumine pinnatas, circa quas flosculi parui, lutei: semen in calice simile semini papaueris nigri, velut lineis notatum. Coma contrita resinofum odorem reddit. Plinius, Androsæmum, inquit, siue vt alij appellauerit, Ascyrū non absimile est Hyperico, de quo diximus, cauliculis maioribus, densioribusq; & magis rubentibus: folia alba, rutæ figura: semē papaueris nigri. Comæ rutæ sanguineo succo manant: odor resinofus. Gignitur in vineis medio Autumno effoditur, suspenditurq;. Androsæmum ex Matthiolo hic pictū damus, quod etiam Lobellius & Pena approbant, in opacis & siluosis proveniens, non modo floribus, sed etiam foliis tritis & expressis muriceum succū reddēs, quo vno

ANDROSÆMVM,
Matthioli.ANDROSÆMVM, Dod.
11. Fuch.

præ cæteris Androsæmum hoc agnoscendum, & discernendum. Procerius est maiusq; Hyperico, & altero tanto maiora folia habet, sed pauciora, eidem etiam similis flore, & semine procerioribus, cubitalibus, gracilibus, rotundis, rubentibus ramis. Androsæmum aliud ostendunt Dodonæus & Fuchsius, quod Itali Clymenum putant, pleriq; Sicilianā appellant, quod in Sicilia tantū repetiri falsū credūt, quidam Clymenū Plinij, Galli *Toutefaine*, quasi Panaces, idest, omniū morborum remedium

ANDROSÆMVM

Aliud, Dodon.



ANDROSÆMVM

Album, Dalechampij.



Cæterum in vino austero decocta, vinum ipsum vulnere grandium glutinatorium efficiunt.

remedium. Hæc plâta semper virēs virgas producit vimineas, vt describit Pena, sanguineas, nitentes, rectas, flexiles, nonnihil angulosas, aut secundū longitudinē striatas, Periclymeno similes & eiuldē coloris: folia bina ex intervalis, infernē cæcia, supernē saturatē virētia, etiā Periclymeno similia, nisi q̃ ex geniculis erūpant, nec vti illa à virgis traiciuntur, quæ non tam sanguineum cruorem vel fundunt, vel affricta illinunt, vt diximus de Androsæmo vero: flores lutei sunt: deinde baccæ parvæ, primum rubræ, deinde nigræ, cruore purpureo, & seminibus fuscis, minutis turgidæ. Radix foris fusca, intus alba, lignosa, fragilis, pedem & sesquipedē longa, gustanti resinosa, lentoris expers: nec tota planra ingrata, nonnihil gummi Elemni, aut trifolij odorati sapit. Moderatē adstringit digerendo, & desiccatur, parua admodum, aut nulla calfactione. Vulnerariis remediis, balsamis, oleis, portionibus commodissima, & vsu multo laudatissima. Auctor est Pena in Angliæ fluis, lucis & nemoribus frequentem esse, Flandris hortensem. Androsæmi semen, vt scribit Dio-

Vires.

scorides, tritum, duabus drachmis potum, biliosa alui excrementa pellit. Ischiadicis maximē sanat, verum post purgationem aquam exorbere oportet. Sed & herba ambusta sanat impostita, & sanguinem sistit. Vulgati codices habent, *ἡ ἄλγη ἰσχυρά*, cum in veteri legatur, *ἡ ἄλγη ἰσχυρά*, idest, vlcera carnem exedentia compescit. Quæ de re fusius hæc Plinius. *Viscaria*. Vfus ad purgandam aluum tuxæ cum semine, potatq; maturino, vel à cœna, duabus drachmis, in aqua mulsâ, vel vino, vel aqua pura, totius potionis sextario. Trahit bilem, prodest ischiadicis maximē. Sed proxima die capparæ radicem resinæ permixtâ deuorare oportet drachmæ pondere, iterumque quatruidui intervallo eadem facere. A purgatione autem ipsa robustiores vinum bibere, infirmiores aquam. Imponitur & podagris & ambustis, & vulneribus, cohibens sanguinem. Androsæmum, inquit Galenus, planta fruticosa, natura duplex. Vnum enim Ascyrum & Ascyroides nuncupatum est species hyperici: alterum verò à quibusdam Dionysias appellatur. Est autem semen eorum purgatorium, florum verò facultas modicè extergens, & desiccans, vt & ambusta curare credantur.

Lis. simpl.

Nomina

Forma.

L. 16, ca. 2.



YPERICO & congeneribus plantis Corin subinmixxit Dioscorides, tanquam similem, atque etiam congenerem, ideôq; ab aliquibus Hypericum nominari scripsit, foliumq; habere Ericæ simile, minus tamen, pinguius ac rubrum. Est autem frutex palmi altitudine, ori gratus, actis & odoratus. Phnius quoq; Corin Hyperici genus facit, & similiter fere describit, his verbis. Est aliud Hypericum, quod alij Corin appellat, folio Tamaricis, & sub ea nascitur, sed pinguioribus foliis & minoribus ac rubetibus, odoratum, palmo altius, leniter suave, aculeatû. Hic Tamaricis folio dixit, pro Erica folio. Matthiolus pro Cori plantam hic pictam exhibuit, scripsitq; Corin non ita Hypericum referre, quemadmodum Ascyro & Androsæmumistq; nudam tantum Dioscoridis historiam subdidit, eamq; plantam sæpius ad se ab herbariis allatam, nasciq; frequentissimam in Italia, nulla adscripta aut figuræ aut virium declaratione. Eam Lobellius descripsit. Matthioli Cori, inquit, flores stellati Ornithogali minores, ex rubore candicantes, quorum apiculi flauent. E lignosa radice multos spithameos cauliculos & foliola kali aut spergulæ stellarim ex geniculis profert. Gaudet pratis in assatu maritimo. Aliâ Pena Corin pulchram & valde hilari aspectu depinxit, quam Monspelicam cognominat, quianusquam nisi Monspelij & Frontignani

CORIS, Matthioli.



CORIS Monspelensis.

L. 16, ca. 19.
Vires.

L. 16, ca. 2.

ad radices Cetij montis, & propè Magalonem reperit. Fruticat hæc ramulis multis, densis, duriusculis, surrectis, rotundis, palmum & sesquipalmum altis, lignosis, cuius foliola densè stipata Ericæ maiori similia sunt, & similiter disposita: flores in summis ramulis purpurei, aut ex purpureo cærulei, elegantissimi spectantur: semen utriculis, mollioribusve alabastris parvis conclusum, rotundum, Tamaricis par, glaucum vel pullum, tenuissimis glumis inuolutum, quasi oculi pupilla tutior inde foret. Radix multo sine maior, longior & crassior, quam pro plantæ modo, Anchusæ minoris par & concolor. Tota enim planta rubella visitur, & succo purpureo radices pannos imbuendo commendatur: amaricat, gustu subacri, non inodora. Huius semen potum, inquit Dioscorides, urinas & menses ducit, auxiliatur commorsis à phalangii: ischiadicis item & opisthoronicis cum vino potum: ad rigores verò cum pipere. At in opisthoronicis etiam commodè cum oleo illinitur. Plinius aliter de eius viribus scripsit. Vis semini exsiccatoria, & ideo instillationem facit enterocelis, sed stomacho non inutile, præcipuum

præcipuum ad stranguriam, si exulcerata non sit vesica. Medetur & pleuriticis ex vino potum. In quibus cum hæc sensum rectum non habeant. Et ideo inflationem facit, &c. sic emendat Cornarius ex veteri codice. Et ideo ad inflationem facit, sed stomacho inutile, &c. Eandem Monspeliensem Corin depinxit & descripsit Clusius, florereq; ait mense Maio, nonnunquam etiam Martio, siccis quibusdam circa Salamanticam & Monspelium locis, & maritimis Valentia & Gallia Narbonensis. Eandem dudum depingendam curauerat, & breuiter descripserat Dalechampius. Radice multiplici, lignosa, rubra, caulibus multis, dodratalibus, rubentibus, furculosis: foliis multis, exiguis, Ericæ specie, gustu amaris. Flores in caulium fastigiis veluti spicati congesti sunt, ex caliculis siue alabastris paruis exeuntes purpurei, venutissimi.

Li. 2. Scirp.
Hæp. c. 94.

CHAMAEPITYS,

CAP. XXXIX.

VAS Græcis χαμαίπυτος, Latinis quoque Chamæpitys, Aiuga, seu Abiga, Plinio auctore, nominatur: inuenitur & Ibiga vocari, quod nomē, Hermolao teste, ferè seruāt hodie. Hinc abiectis duabus literis i, & g, Iba, & ab Aiuga abiectiōne duarū literarū, a, & g, Iua manauit in vulgi appellationem. Officinæ Iuā muscatā appellant, & Iuā arthetica, Arabes *Hameficus* seu *Chamaefichus*, Itali *Chamepino* & *Iua*, Hispani *Pimilho*, & *Iua arthetica*, Germani *Te lenger*, *ye lieber*, Galli *Iue muscate*, & *Artenique*. Cæterū Chamæpitys dicta est, idest, humilis siue pumila picea, q̃ eius folia piceā oleant: Abiga verò propter abortus, Plinio & Dioscor. auctoribus, quos, educēdis iis quæ in vtero sunt, excitare solet: vt & Arthetica, siue potiùs Arthritica, quòd ischiadicis, & cæteris articulo- rum doloribus opem ferat. Dioscorides tria Chamæpityos genera ponit. Primam repentem, foliis sedi, alteram maiorem, tertiam marem. Plinius totidem, sed inuer- so ordine. Primam maiorem, alteram breuiorem, tertiam marem. Chamæpitys, vt

Nomina
Li. 24. ca. 6.
In Coro.
176. lib. 3.

Genera.

Lib. 2. c. 175.
Forma.

CHAMAEPITYS Prior,
Matthioli.



describit Dioscorides, herba est per terram ser- pens, subcuruz, folia minori Aizoo similia ha- bens, multò tamen tenuiora & pinguiora, hoc est, Serapione interprete, quæ habent super se humiditatem tenacem, hirsuta, circa ramos fre- quentia, odore piceæ: flores exiguos, luteos, aut candidos: radicem cichorij. Altera cubitalibus est ramis: anchoræ modo incuruis, tenuibus, co- ma supradictæ simili, flore candido, semine ni- gro. Olet autem & ipsa piceam. Tertia quæ mas appellatur, herbula est foliis tenuibus, candidis & hirsutis: caule aspero, candido, flosculis luteis: semine secus alas pusillo: piceam & hæc olet. Plinius non adeò cum Dioscoride cōsentiens, hæc scribit. Chamæpitys, Latine Abiga appel- latur, diciturq; propter abortus, ab aliis Thus terræ, cubitalibus ramis, flore pinus & odore. Altera breuior & incuruz similis. Tertia eodem odore, & ideo nomine quoque, paruulo cauli- culo, crassitudine digitali, foliis scabris, exilibus, albis, in petris nascens. Prima Dioscoridis Cha- mæpitys à Matthioli depicta, ea est quam hic primo loco expressimus: tertia, quam secundo:

Cap. 179.
simpl.

Li. 24. ca. 6.

.n. Aduerſi

Locus.

mediam maioremſe non noſſe fatetur. At Lobellius & Pena primam Matthioli, & Dodonxi non primam, ſed marem, ſiue tertiam Dioſcoridis eſſe ſtatuunt, eam nimirum, quæ compertæ vtilitatis & vulgaris cognitionis vbique prouenit. Sabulera, a ida, lapidoſaq; vineta & oliueta amat Narbonenſis Gallia, vbi perquã odoratuiſculis gracilibus, hirsutis, inflexis, numeroſis: pinifoliis, vel pſyllij, minoribus, incanis, cõterris, reſinoſis, exiguis interſertis ſecus floſculos, melinos, veronicæ fœminæ, ſed ſemine oblongo, tereti, fuſco, Germaniæ Galliæ & Angliæ agris ſponte peruia, ſed paucis in locis: eoque in hortis tantum colitur, ad medicos tamen uſus odore & viribus cultura ignauior: radix fibris duriuſculis, lignoſis, amaro ſapore, medicato, ſubacti, neutiquam dulci, ſed reſinaceo, diuq; faucibus hærente, quæ idcirco nonnullis Germanis *Verſenymnichte*, ideſt, ne mei obliuiſcere, fortè dicta fuit, quod etymum dum Matthiolus à Germano Pharmacopœo & Braſauola adductum reprehendit, immeritò facit, nam ipſemet fallitur, cum aliam vocaram

CHAMAEPITYS Tertia,
ſiue altera *Matth.*



CHAMAEPITYS Prima,
Dioſcor. Pena & Lobel.



ye lenger ye leber, id ſonantem, quò diutius eò amantius, aut gratius (hoc autem amaræ dulci ſiue circæ meritò quadrare diximus) in hanc tranſfert. Altera Chamaepitys ſiue tertia Matthioli, & tertia Dodonxi lurecoltis floribus iuſdem Lobellio & Pena auctoriſibus, prima eſt Dioſcoridis, pinum redolens, minus nota, & paucis obuia locis, tamen odoratior, collibus aridis & aruiſ editioribus Nicæ Sabaudorum, & Genue Liguriæ fruticat. Quinetiam eandem vireta nonnulla Belgij ſtudioſe colunt: radice fibrata, ſonchi, aur dentis leonis, minore. Ramulos ea proſert palmum altos, humilſtratos, ſoliolis ſeptos, ſemperuiui minoris, aur potiùs vermicularis, minus carnoſis, ſed incanis, & hirsutis, in quibus floſculi in medio albi. Suauioreſpirat hæc odorem, interdum vliɡinoſum, quemadmodum muſcus quernus aut cedrinus. Secunda verò Dioſcoridis Chamaepitys fortäſſe eſt vermiculatus frutex maior, de quo diximus capite de Aizoo. Chamaepitys altera etiam multis dicitur quæ capite proximo Chamaedrys altera, & Chamaedrys fœmina nominatur

minatur. Ad huius genus refert Dodonæus plantam, quæ quod foliorum
 folam formam cui imitetur, odore verò destituta sit, Pseudochamaepitym appellat.
 Pennæ Dodonæi procumbentibus ac tenuibus pediculis foliisque similis est, sed
 foliulis distit, qui in hac candidi sunt, & inuersos Lamij flores satis referunt,
 ipsi tamen & longiores & patentiores. Quaterni inde cohaerent femina: radix
 mediocriter crassitudinis. Ex Hispaniis anonymum missam fuisse ait Dodonæus.
 Scribit Clusius se in Hispaniis inuenisse pusillam quandam plantam Aiugæ ad-
 modum similem, tum cauliculis, tum foliorum triflorum foriua, hirsutam totam
 subâslo gustu, & inodoram, nisi quiddam herbaceum & ingratum redoleret. Flo-
 res extrinsecus ramis ex alis prodeunt, Aiugæ similes, sed maiores & albi: femina qua-
 terni in singulis caliculis cinerei coloris, maiuscula & rotunda ferè: radix crassius-
 scula, subalbida. Prouenit locis incultis, & æstate floret. Eadem esse videtur quæ
 Pseudochamaepitys Dodonæi, aut certè simillima. Chamaepithyos primæ folia, au-
 PSEUDOCHEMAEPITYS, AIUGA ADULTERINA

Dodonæi.

Clusij.



etore Dioscoride, septem diebus in vino pota regio morbo medentur: quadraginta
 verò, ex hydromelite ischiadicos sanant. Danrur peculiariter iocinorosis, vrinæ dif-
 ficularibus, & renum vitiis, profunt etiam torminosus. Ea apud Hera cleam Ponti-
 cam, perinde atque antidoto contra aconitum vtuntur, bibentes decoctum: Ad an-
 redicta illinitur cum polenta iure decocti macerata. Trita & cum fico pro pilulis
 data aluum emollit. Excepta melle, squama æris, & resina, purgat. Apposita cum
 melle ducit quæ ab vtero duci solent. (legitur enim Græcè, αἰγὴ δὲ τοῦ τοῦ ἀνδρὸς ὅτι
 ἀπορροῖται τὸ οὐρ πάλιν.) significant enim αἰγὴ δὲ ὅτι ὁ ἄνθρωπος non solum menses, sed etiam
 foris & secundas, quare Abiga ab abigendo partu, & procurando abortu nuncupa-
 ta est. Mammarū duritias discutit, vulnera glutinat, herpetas cum melle illita co-
 hibet. Secūda & tertia eandem vim obtinent, nou tamen adeo efficacem. Eadem fe-
 rè Plinius de vsu medico tradit. Profunt aduersus scorpionum ictus. Item iocinori,
 illita cum palmis, aut cotoneis. Renibus & vrinæ decoctum earum cum farina hor-
 deacea. Morbo quoque regio, & vrinæ difficultatibus ex aqua decocta bibuntur. No-

Lib. 4. c. 6.

uissima contra serpentes valet cum melle. Sic & apposita vulvas purgat. Sanguinē densatum extrahit pota. Sudores facit perunctis ea, peculiariter renibus utilis est. Fiunt ex ea & hydropicis pilulæ cum ficu aluum trahētes. Lumborū quoq; dolorē victoriat pondere in vino finit, & tussim recentem. Mortuos factus ex aceto cocta pota, eiicere prius dicitur. Galenus verò multò distinctiùs, Chamæpitrys, inquit, amarū quidem gustu sapore validiorē acri obtinet: effectu verò purgat, abstergitq; viscera, plus quàm calefacit. Proinde regio morbo correptis, & omninò quibus faciliè iecur obstruitur, bonum est remedium. Quin & menses ducit, cum pota, cum apposita cum melle. Sed & vrinæ mouendæ aptum est medicamentum. Sunt qui etiam eam exhibent ischiadicis, decoctam cum melicrato. Herba porro ipsa viridis magna vulnera conglutinat, & vlcera putrescentia sanat mammarum præterea duritias discutit. Est enim in siccando ordinis tertij, in calfaciendo verò secundi.

CHAMÆDRTS,

CAP. XL.

Nomina



ΑΜΑΥΡΥΣ & χαμαίφυρα Græcè, Latine Trixago siue Trisago dicitur. Officinæ Græcum nomen retinent, vulgò Quercula minor, & à ferratis folijs Setratula appellatur, Arabicè Damedrios, Chamadrios, seu Kemadrios, Italicè Chamædio, Querciola & Calamandrina, Germanicè Gamander, Iyssen Bachelgel, Gallicè Germandree, vel Chersne. Chamædryes autem Græcis dicta est, quasi humilis ac terrestris quercus, quòd scilicet, folia quercus habeat.

Genera.

Capit.

Lib. 3. c. 96.

Forma

Dioscorides & alij veteres vnicam faciunt Chamædryn: recentiores verò herbarij plura eius genera. Fuchsius quatuor depinxit: primùm veram Chamædryn, eamque duùm generum, marem scilicet, & foeminam. Deinde Chamædryn vulgarem duùm item generum, marem scilicet, & foeminam. Alij aliter eius genera distinguunt. Chamædrys, vt describit Dioscorides, frutex est paruus palmi altitudine, folia habens parua, & figura & diuisuris quercui similia, amara, florem subpurpureum, paruum (in veteri codice legitur ἀνθος ἐμποτόρυφον, μικρὸν καὶ ποτὶν, id est,

CHAMÆDRTS,

Matthioli.

CHAMÆDRTS Vulgaris,

mas Fuchsy.



florem

florē purpurācentem, pusillum, amarum. Oribasius legit *βιότροπρον*, id est, subtrifidum. Ruellius Plinium secutus, vertit, flore paruo, penē purpureo. Nasctur in asperis & petrosis locis. Colligere ipsam oportet semine ptegnantem. Breuiter sic Plinius. Chamædrys herba est quæ

Locus.
Lib. 24. c. 11

CHAMÆDRTS femina, Dodonæi.



Latinè Trissago dicitur: aliqui eam Chamædropem, alij Teucriū appellauēre. Folia habet magnitudine menthæ, colore & diuisura quercus. Alij serratam, & ab ea ferram inuentam esse dixēre: flore penē putpureo. Hæc facie vetē refert, quæ hīc picta est, radice exigua, surculosa, virgultis numerosis, pedem altis, foliis in ambitu serratis, binis, numerosis, vt quercus, sed profundē minū incisis: floribus purpureis. Hæc Chamædrys minor appellari potest. Nam quæ Antverpiæ atque alibi in hortis visitur, maior: quod foliis sit maioribus, candidioribus, flore cæcio, pallescente, vbi etiam niues imbrēsque spernit, illa cōtrā breui marcescit. His addēda minima, quæ à quibusdam femina dicitur, & hoc nomine à Dodonæo pingitur humilis herbula, multis cauliculis, lanuginosis, foliis hirsutis, profundius & fetē decussatim infectis: flosculis purputascentibus, citcum cauliculos emicantibus: semine in rotundis capsulis, nigro, & rotundo: radice crassa, plutimis fibris capillata. Eadem est quæ à Matthiolo pro Chamædry altera picta exhibetur. Quibusdam Chamæpithys altera videtur esse, quam floribus & odore quadātenus refert,

Pet. Pe. in
Ad.

Lib. 2. c. 16.

CHAMÆDRTS Altera, Matthioli.



CHAMÆDRTS Vulgaris, femina Fucosij.



alijs

aliis Ocimastrum. Dodonæus in Libro Purgant. Chamæpitym tertiam facit, Lobelius Chamædym aliam laciniatis foliis, vel potiùs Chamæpitym alteram, Tragus Chamætyparissum agrestem. Aliam hic quoque appositam herbarij Chamædryn montanā vocant, à foliorum cum chamædry similitudine, & à natalibus, alijs Leucadem Dioscoridis, ob foliorum eximium candorem. Frutex, aut potiùs suffrutex

CHAMÆDRYS *Admontana,*
Dalechampi.



Lib. 4. c. 6.
Virens
Temper.

est in editissimorum montium saxosis, cōfrago-
sisq; locis proueniens, pedis aut sesquipedis lon-
gitudine, radice nigra, longa, huc illic sparsa,
lignosa, caules multos gignente, è nigro rufescē-
res, rotundos, humi sparsos, folia quereui aut
Chamedryi similia, marginibus valde incisa, su-
perne nigrius viretia, inferne candicantia, den-
sius congesta: flos longo nitiur petiolo, albus,
rosæ siluestri aut cistho similis, quinque foliolis
constans, luteis in medio staminibus, eleganti
formosq; aspectu. Lobellius etiā Chamædryn
montanam duriorē pinxit, Ceruicariam Gef-
neri, quorundam Itolorum *Chiana di Jove*, sic di-
ctam à floris similitudine, qui è foliolis sericeo
vellere in latam cæsariem tortilibus crinibus
explicatur, in cæteris omnibus huic nostræ plan-
tæ similem. Tota planta valde adstringit, vt gu-
stus demonstrat. Chamædrys prima, auctore Dio-
scoride, recens ac viridis in aqua decocta & po-
ta, conuulsis, tussientibus, lienī indurato, vrinæ
difficultatibus, hydro picis inter principia auxi-
liatur. Cit menses, fertusque extrahit, lienem ex
aceto pota minuit. Aduersus venenata cum vi-

no pota & illita efficax est. Trita ad prædicta in pilulas conformatur, cum melle ve-
tera vlcera purgat, cum oleo trita inuncta & illita oculorū caliginem discutit. Eadē
Lib. 14. c. 19 magna ex parte Plinius tradidit. Aduersus serpentium venena pota illitaq; effica-
cissima. Itē stomacho, tussi vetusta, pituita in gula coharefcenti, ruptis, conuulsis,
lateris doloribus. Lienē consumit. Vrinam & menses cit, ob id incipientibus hydro-
picis efficax, manualibus scopis eius in tribus heminis aquę decoctis vsq; ad tertias.
Sanat & vomicas, & sordida vlcera cum melle, sit & vinū ex ea pectoris vitiis, folio-
rum succus cum oleo caliginem oculorū discutit. Ad splenē ex aceto sumitur. Ga-
lenus qualitates eius & effectus enucleatē declarat, his verbis. Chamædrys vincen-
tem habet qualitatē amarā. Est & quodāmodo acris: quare merito lienes colliquat
& vrinas ac menses prouocat, crassitudinem humorum incidit, & viscerum obstru-
ctiones purgat. Ponatq; eam quispiā in tertio ordine exalfaciensium & desiccant-
ium, plus tamē calefacit quā discutit. Theophrastus aliā vim foliis, aliam semini
tribuit, his verbis, τὸν ὅν χαμαίδρυος τὰ μὲν φύλλα πρὸς τὰ ῥήγματα, ἔπρὸς τραχυντὰ ἐν
Lib. 1. lib. 1. ἰαλῶν τρεῖς μέρη, πρὸς τὰ ἐν ἰσχυρίσιν ἔλαιον, τὸν ὅν χαμαίδρυος χυλὸν, ἄγαντον ὃν ὁ φθάλ-
μοις. πρὸς ὃ τὰ ἀργύρεα προσάγειν ὃ φύλλον ῥιζαντὰ ἐν ἰαλῶν, ἔχει ὃ τὰ φύλλα ὡς περ
ἀλρυος, τὸν ὅν ἀνίσχυμα τὸς ὀλῆς ὅσον σπιγναμῶν, ἰσχυροὶ ὃ καὶ ὁδύ. Id est, Trissaginis folia ad
rupta vulneraq; in oleo trita valēt, & ad depascētia vlcera, semē bilem trahit, & ocu-
lis quoq; vile est, foliū ad albugines tritum in oleo prodest. Hęc Theophras. Chamæ-
dryn montanā ad vētris profusiones, mensiū abundantia, sanguinis effluxiones, vo-
mitiones immodicas Alpinī cōmendant, sed ad dysenterias precipuē, huiusq; fron-
dē damas auidissimē carpere narrāt in locis huius plātæ feracibus degere cōsuetas.

VERO



IN SEQUANTIS gignitur quæ maxima Veronica dicitur à nonnullis, ad montium confragosa præcipitia inter ipsa saxa, radice nigra, plurimis fibris capillata, caulibus multis fruticosa, cubitalibus, foliis quercus, multum crenatis, semper geminis, caulem Chamædryos instar amplexantibus, quam ob causam Chamædryos genus esse quidam volunt, surculis multis ex alarum sinu prodeuntibus, minime foliosis: flore denso, puniceo, Veronicæ, exiguo, specioso: semine in loculis latis, duobus simul iunctis, Elatine non dissimilibus.

TEUCRIUM, CAP. XLII.

TEYKPION vel *Teucrium* à Teucro inventore, quibusdam ob similitudinem Chamædryos dicta, Latine etiam Teucrium nominatur. Herba, inquit Dioscori, virgata, similis chamædry, tenuifolia, & ciceri

Nomina

Lib. 3. c. 95.
Forma.

simile solum habens. Ex qua brevis & fortasse mutila descriptione, quamvis minus certa Teuerij notio sit, tamen Chamædryos cognitio ad consimilem herbam accommodata, fecit ut Teucrium legitimum innotesceret, quod ob similitudinem, Galli *Grosse Germandree* vocant, Germani *Groscheatengel*, id est, grandem Chamædryn. Locis montosis & aridis fruticat, virgultis multis, rectis, lignosis, foliis planè Chamædryos, sed crassioribus, aliquatò minus incanis, rugosis & asperis: flores item Chamædryj consimiles sunt, sed purpureæ magis saturæ. De Teuerio sic Plinius. Inuenit & Teucer eadem

Locus.

TEUCRIUM Primum,
Matthioli.

ætate Teuction, quam quidam hemionirin vocant, spargentem iuncos tenues, folia curua, asperis locis nascentem, austero sapore. Nuncquā floret: neque semen gignit. Medetur lienibus, constatque sic inuentam. Quum exta super eam proiecta essent, adhæsisse lien, eumque exinanisse: ob id à quibusdam Asple non vocatur. Narrant fides, qui radicem eius edunt, tunc splere inueniri. Et mox addit. Quidam ramis hyssopi (Chamædryos Dioscori.) turculosam, folio fabæ (Ciceris Dioscori.) eodem nomine appellant, & colligi florentem adhuc iubent, adco florere non dubitant, maximeque ex Cilicis, & Pisdiz montibus laudant (iuxta Gentianæ & Cassidæ Dioscori.) In quibus Plinius Hemionirin Dioscoridis priore loco Teuerij nomine designat & mox Teueriū verum. Viridis cum potest, inquit Dioscorides, aut arida sero facta potest, vint habet lienē potenter abluendi. Splenis eum sicubus

Lib. 3. c. 95.

Viridis
Temper.
Lib. 3. c. 95.

ficubus & aceto illinitur: irem serpentium moribus cum aceto solo sine ficubus. Eadē ferē Plinius tradit, his verbis. Lienimedetur Teucris, præcipuē pota arida, & decocta, quantum manus capit, in aceti heminis tribus ad heminam. Illinitur eadem cum aceto, aut si rolerari non possit, ex ficu vel aqua. Teucris, inquit Galenus, in-

TEUCRIVM Alterum,
Matthioli.



TEUCRIVM Basicum,
Clusij.



cidendi & tenuium partium facularis est, quare lienes sanant. Ponatque ipsum quispam in tertio exsiccantium, secundo verò exsiccantium ordine. Aliud Teucris Clusius pinxit, quod Basicum nominat. Interdū ad hominis alitudinem assurgit inquit, interdū humilius est, vnico stolone, minimi digiti crassitie, cortice candicante obducto, in ramos non admodū frequentes diuiso, ordine quodam ita digestos, vt bini perpetuū sint inter sese oppositi, incani: folia vulgaris Teucris ferē, maiora, per ambitum non nihil sinuosa (quod pictor malē expressit) prona parte omnino incana, supina verò ex atro virentia, gustu perquā amaro: flos candidus, labris infernē prominētibus, nulla galea superius imminere, aliquor oblongis staminibus seu villis ex medio flore exilientibus. Perpetuū viret. Montibus Calpe vicinis, & Bæticæ maritimis, in sepibus, & inter frutices alios se inuenisse ait Clusius: tum etiā Gadibus ea parte, qua nunc insula continenti est coniuncta ponte admirabili. Florer Februario.

EVFRASIA,

CAP. XLIII.

Nomen



VM Eufrazia nomen Græcam testetur originem, videtur sanē à buglosso veterum desumptum esse. Vt enim id in vinum deiectum, vt loquitur Plinius, animi auget voluptates, vnde *εὐφροσύνη*, ita etiā illa quia oculos iuuat & delectat, *εὐφροσύνη* appellata esse videtur, quam vocem un periri linguz Græcæ deprauantes, in Eufraziam verterunt, eamq; sic corruptam Officinæ, vt in plurimis aliis, retinuerunt. Eri autem Græco & eleganti nomine donata sit hæc herbula, nihil tamen de ea, quod sciam, apud veteres Græcos &

EVFRASIA, *Marth.*



EVFRASIA Secunda,
Dodonæi & Lobelii.



cos & Latinos, nempe Dioscoridem, Galenum, Plinium, adde etiam recentiores Aëtium, Paulum, & Actuarium scriptum repetitur: sed à ducentis tantum vel paulo plus annis posteritati Eufrasie nomine innotuit, ad oculorum caligines, & morbos pituitosos peruatque commendationis. Vnde Germanis *Augenrost*, id est, oculorum solatium, dicta fuit: nonnullis hac quoque ratione motis, *Ophthalmica*, id est, ocularia. Galli, *Eufrase* vocant, Itali *Eufrasia*. Est igitur Eufrasia herba parua, palmi vnus altitudine, cauliculis purpureis, surculosa, foliis multis, exiguis, crispatis, per ambitum serratis, flosculis exiguis, candidis, intus purpureo & luteo colore maculatis: radice parua, tenui, fibrata. Apricis collibus & pratis strigosis potissimum gaudet. Iulio & Augusto mensibus floret, tunc colligenda & siccanda. Sapor amaricans calidam & siccam esse perspicue docet. Vtuntur ea tam recente quam exsiccata aduersus omnia mala quæ oculorum claritati officiunt. Quare trita & oculis imposita, aut succus eius cum vino instillatus caligines delet, & visus acie restituit. Idem præstat eius exsiccatæ farina, si tribus eius partibus cum vna parte macis commixtis, quotidie manè cochlearis mensura sumatur per se, aut cum saccharo, aut cum vino. Nec solum oculorum aciem, sed etiam memoriâ mirifice roborat, amissamque reparat. Arnaldus vinum Eufrasiatum valde commendat, his verbis. Eufrasie vinum fit ad oculos, ponendo herbam in musto donec fiat vinum. Cuius vsu oculi senum reuiuenscunt. Aufert hoc impedimenta eorum, & defectum visus in quocunque cuiusvis ætatis homine, præsertim vbi pinguedo & pituita redundent. Est & qui permansit nihil videns per longum tempus, & infra annum eius vsu restitutus est ad visum. Ipsa enim herba calida est & sicca, & habet hoc a proprietate, quod quando puluis eius comeditur cum ouorum vitellis, idem mirifice præstat, vel quando pulvis idem recipitur cum vino. Et supersunt testes fide digni, qui fecerunt in seipsis, & qui non poterant legere sine oculariis, & legerunt postmodum absque ipsis etiam literam subtiliorem. Er

Forma.

Loci.

Temper. & Vires.

In lib. de Vitis.

In Aduers.

do visui. Si autem vinum esset nimis forte, temperetur cum aqua feniculi, & si opus est addatur saccharum necessarium. Hæc Arnaldus. Cui non omnino assentitur Pena, nec ei vino prorsus fidendum suadet, ut cuius potu tantum trimestri in Heluetia visum socium & fodalem suum asserat penè ambobus orbatum oculis, & fluxionibus modo non oppressum: cum duntaxat antea leui cathaphora, & lacrymation-

culis laboraret. Quare puluere aut decocto citra vinum tutius vtendum. Alia est planta quam nonnulli Euphragiam vocant, minimè tamen Euphragia vera existimanda, pedalis & altior, cauliculis rotundis, furculosis, in quibus folia parua, angusta, longiuscula, sæpiùs deorsum vergentia: flores rubentes: radicem exiguum superiiori similem. Hæc verò Euphragiæ vice minimè vtendum. Descripsit Dodo. pinxit Lobellius, qui Cratægogonum secundum quorundam vocat.

SINAPI ALBUM, CAP. XLIII.

Locus.
Forma.



Nomina

Cap. 245.
hüll.

Lib. 4. c. 30.

Lib. 4. c. 35.

Forma.



IN ASPERIS & saxosis hoc sinapi adolescit, radice dura & solida, candida, brachiata, & nonnihil fibrosa, foliis proximè radicem in orbè sparsis, multis, infectis cicutoij modo, adulto caule percuntibus, & exarescentibus, in caule numerosis, læuibus, crassis & carnosis, in cuspidè mucronatis, quæ caulem attingunt lunatis, caule cubitali, nonnumquam altiore, rotundo, infernè rubente, in ramulos multos supernè diuiso, flosculis multis scatentes, candidis, quibus succedunt graciles & prælongæ siliquæ, minuto semine grauidæ, aeris & teruidi gustus, elegatè specie siliquarum tanquam vallo quodam circa caulem & furculos erectarum. Floret Maio mense. Quidā thlaspeos alij Drabæ genus esse volunt.

PTARMICA, CAP. XLV.

TSI multis plâis olfactu sternutamenta cientibus ptarmices, id est, sternutatoriæ siue sternutamentariæ nomen competere possit, tamè quæ hic primo loco depicta cernitur, Fuchsij & multorû herbariorum sententia id nomen adepta est, quod acri suo odore nares feriens sternutamenta irriter. Pyrethrum siluestre à Dodonæo appellata ab acri & feruida facultate, diuq; linguam vellicante Pyrethri modo, quamquam moderatius, à Germanis *Wilderbertram* vocata. Alij ptarmicas alias proponunt. Sed ptarmicæ descriptionem audiamus ex Dioscoride. Ptarmica, inquit, frutex est paruus ramulis paruis (vetus codex habet non *μικρὸν*, id est, paruus: sed *λαγνὸν*, id est, tennes) multis, rotundis, abrotono similibus, circa quos folia multa, oblonga, oleæ similia, in summo veluti chamæmeli capitulum, paruum, rotundum, olfactu acre, sternutamenta ciens, vnde & nomen inuenit. Quæ delineatio plantæ cuius pictura hic datæ, apertè quadratnam furculis fruticat exiguis, multis, rotundis, abrotono non dissimilibus, lentè rufescentibus, qui foliis frequentibus, longiusculis, oleæ similibus, angustis, vtrimque leuiter serratis ambiuntur flore in cacumine Anthemidis propè ad vmbellæ modum qui

dum, qui acri suo odore nares feriens sternutamenta elicit. Inuenitur sæpius in al- *Locus.*
 lis montibus, & saxosis locis sæpè & in pratis. Floret æstate, radix extremo effodi- *Tempus.*
 tur autumno. Eadem planè est quam Matthiolus Ptarmicæ nomine depinxit, & in
 Bohemiæ hortis passim seri scripsit, è montibus, in quibus nascitur, illic transla- *Lib. 2. c. 10.*
 tam: eadem enim eius delineatio ab eo ponitur, quæ modò à nobis exposita est,
 iidem natales. Hanc quòd acri sit sapore, quidam Pyrethrum vocant, quos secutus
 Dodonæus, Pyrethri siluestris nomine pinxit & descripsit. Eadem etiam videtur,
 quæ pro menthæ Sarracenicæ specie, ex Myconi sententia, à nobis in Horto inter
 menthæ genera explicata est. Plantam aliam Ptarmicam Matthiolus appellare vo-
 luit, quæ caules tenues habet, folia oleæ, flores umbellatos in cacumine, & capitula
 quæ naribus immissa sternutamenta cient. Verùm Dioscoridis Ptarmicam esse ne-

PTARMICA *Altera,*
Matthioli.



PTARMICA *Montana,*
Dalechampi.



gar. Ptarmicâ montanam herbarij vocant aliud plâte genus in altissimis & asper-
 rimis Allobrogum montibus, sed tamè herbidis proliens, radice nigra, in multos
 furculos fissâ, longa, valde fibrata, odorata, gustu principio amara, deinde acri, cauli
 bus multis fruticâs, teretibus, lignosis, abrotono similibus, cubitalibus: foliis in cau-
 libus, oblongis, oleæ similibus, propè radicè lationibus, plantaginis ferè specie, humi
 stratis, capitulis in summo cauliû vertice chamemelo simili, odorè validû & acré
 spirantibus, qui sternutamenta excitat, flore in ambitu luteo. Ptarmices folia, inquit
 Dioscorides, cum floribus illita, sugillata possunt tollere. Flores sternutamèta effi- *Lib. 2. c. 176*
 cacissimè mouent. Galenus verò, Ptarmices flores, inquit, cièdæ sternutationis vim *Vires.*
 obtinent vnde ei herbæ nomen. Totus autem frutex si contundatur viridis, sugil- *Lib. 2. c. 180.*
 lata, & reliquas ecchymoses digerit. Est enim temperies eius calida & sicca, viridis
 etiamnum ordine secundo, siccatæ tertio. Montanæ Ptarmices radicem muliercu-
 læ Alpinae ad vteri suffocationes, mensium suppressione, virginum pallores, ma-
 ciem & cachexiam summopere commendant.

Nomina

Lib. p. cxi.



Vt plantæ Getmanicè *Bertram*, Gallicè *Puehre*, aut *Pied d'alexandre* dictæ, ob radicis eius fetuorem igneum pyrethri nomē dederunt. Officinæ, suffragante etiam Dioscoridis descriptione, quæ est huiusmodi. Pyrethrum folia caulemq; emitit vt daucum siluestre, & fœniculum,

PYRETHRVM *Alicrums*, *Mart.*PYRETHRVM, *Gesneri.*PYRETHRVM *Verum* *Mart.*

Plantam

umbellamque anethi, circinatæ rotunditatis, radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. A qua descriptione foliis floribus distat hæc planta, quos non in umbellis Anethi circinatis, sed in medio luteos, foliolis candidis circumdatos, planè chamæmeli, aut bellidis, magnitudine bupthalmi: cauliculos multos, sesquipalmm alcos, crassiusculos, foliis multum incis, fœniculi vel anthemidis, stipatos, crassioribus, longioribus: radicē lōgam, rectam, digiti crassitudine, linguam vrentem. Est enim canda siccaq; ad tertium vsque ordinem. Quare eadem præstat quæ Pyrethro Dioscotides & Galenus tribuunt, imò maiore efficacia quàm nonnullæ alię, quibus Pyrethri nomen dederūt quidam herbarij. Huius igitur radix cum melle sumpta, aduersus epilepsiam, apoplexiam, omnes inueteratos & frigidos cerebri morbos valet. Communis piuitæ copiam ex cerebro elicit, vnde Saluarius à Latinis dicta. Dentium immanes cruciatus sedat, si aceto cocta colluatur. Oleum ex recenti radice educum mirificū est.

Plantam aliam hic appictam Pyrethri veri nomine ad Dalechampium ex horto suo misit Conradus Gesnerus vir doctissimus & cãdidissimus. Radice niritur longa, simplici, modicè fibrata, pallente, digiti crassitudine, feruidi & vrentis gustus: folia anetho similia prodeunt, caulis forniculaceus, flos in umbella circinata: rotunditatis, vt omnino in nostris Dioscoridis exemplaribus legendum sit, *οὐκ ἔστιν ὡς Ἐρίδις*, non *τρυφώδης*, id est, capillacea umbella. Quare nullam prorsus notam desse ad veram Pyrethri delineationem putabat ille. Matthiolus verò, Guilandinus & alij, plantam hic expressam Pyrethri veri nomine donarant, cui radices sunt & folia cõtate foetida, umbellæ ab vno quasi centro multis petiolis innixa, pectinis veneris ritu, aur Anethi, candidi flosculi, feruido & amaricante gustu. Non tam efficaces vires habet quàm Pyrethrum Officinarum.

FLAMMVLA, CAP. XLVII.

A HERBARIIS dicta est flammula, quòd non secus ac flamma cuti *Nomina*
appressa vesicas, crustas, vlceraq; inurat. Huius species duas assignant
Herbarij. Prior adminiculis eget quibus fulciatur: altera recta assurgit
sine adminiculis. Illa sarmentosos emittit caudiculos, lentos & valde *Forma.*
obsequiosos, cortice virente vestiros, folia minora quàm Vitalba incondita, ex vno
pediculo cõplura, qui capreoli vice vicinis sese alligat. Flores candidi sunt: semina,

FLAMMVLA, Dodonæi.

FLAMMVLA, Matth.



exigua, coheretia, canescetibus quoq; plumis, sed minoribus & breuioribus exornata: pro radicibus multæ sunt & tenues fibræ. Hanc vulgi Flåmulam, Lobellius & Pena Clematidem alterã vrentem appellant. Nullam esse scribit Pena, quæ tam benè
quadret facie, & viribus Clematidi alteri Diosco. acri & exulceratæ. Cui enim affric-
ta non secus ac Flamma vrit. Quin tantæ tenuitatis est eius feruor, vt dum digitis
fricantur folia, spiritum vrẽtem eminùs præsertim in nares iaculetur, cerebrumq;
& sensus repenrè magnoperè percellat: quia feruor ille non in centro intimsque

terre partibus, sed in leuioribus extimis residet. Quare succus & stillaticius liquor primus quasi è vino Flâmëus est. In Narbonësi & Gallica Prouincia sponte in prætis maritimis humi sparsa, teneta & humilis visitur, nisi fruticibus & sepibus innitatur, & aliis pedamentis siquæ nacta sit. In frigidioribus regionibus hortensis est. Flammula altera foliis est amplioribus maioribusque, vitalbæ similioribus, quam & candidissimis stoculis, & semine plumaceam cristam gerente, in fastigio cauliculorum eminentibus refert. Cauliculi cubito altiores, sine adminiculis stant, sursumque eriguntur. Vere noua promit folia & cauliculos, æstate flores. Scribit Marthiolus, Flammulæ stillaticiam aquam in morbis frigidissimis efficacissimam esse. Sunt, inquit, qui Flammulam quartanariis edendam præbeant, magno, vt ferunt, commodo. Alij eius oleum commendant ischiadicis, articulorum, illiûque doloribus, vrinæ angustis, & renum calculis, in quibus morbis aut calidum inungunt, aut clysteribus infundunt. Id aut præparant hoc modo. Flâmule folia tenuissimè concisa, in rosaceum imponunt, quod vitreum vas exceperit, tum per æstatem insolant obstrato vase. Dant etiam in cibis hæc morbis affectis, trium drachmarum pondere. De Flammula aquatica, lib. de palustribus, diximus.

— PSTLLIVM, CAP. XLVIII.

Nomina

C RACCE' *Ψύλλω*, Latine Pulicaris herba dicitur. Nomen græcum in Officinis seruatum, Arabice *Bazra Chatma*, seu *Begerochume*, Italice *Psillo*, Germanice *Psilenkraut*, Gallice *L'herbe aux puces*, Hispanice *Zarzapatera*. Tam græcam quam Latinam appellationem à pulice, cuius effigiem semen eius refert, sortita est herba, vel, vt nonnullis videtur, quia si vitidis in domum inferatur, generari in ea pulicēs prohibeat. Duo Psyllij genera exhibuit Marthiolus. Vnum vulgare & communis vus, alterum sarmentosius prolixiusque, forte Plinianum. Psylliû, auctore Dioscoride, folia coronopo similia habet, hirsuta, longiora, ramos dodrantales. Tota herba ad scæni graminisve formam accedit. Coma eius à medio caule incipit, capitula bina aut terna in summo, contracta conuolutaue, in quibus semen pulicibus simile, nigritum durumque. In aruis & incultis nascitur. Plinius, Psyllium, inquit, alij cynoides, alij corystallion, alij sicelion, alij cynomyian appellant, radice tenui, superuacua, sarmentosum, fibræ granis in cacuminibus, foliis canino capiti (cynopi herbe) non dissimilibus, semine autem pulici, vnde ei nomen: hoc in baccis. Ipsa herba in vineis inuenitur. Quæ omnia vna cum nomenclatura vtrique generi aptè conueniunt.

In cap. 61.

lib. 4.

Genera

lib. 4. cap.

Forma.

PSTLLIVM, *Marth.*

Locus.

Lib. 2. cap.



Prius enim folia fert incana, hirsuta, longa, angusta, scopariæ vel coronopi æmula, non tamen corniculata: ramulos rotundos, teneros, crebros in cacuminibus gerentes globulos, compactos, rotundos, oblongos, squamosos, florem ex viridi albicantem: semen nigrum, nitidum, pulicis effigie, colore, & magnitudine: radix est dodrantalis, subalbicans, multis stipata fibris. Alterum multò sarmentosius est, & copiosioribus refectum foliis, longioribus, angustioribus, densioribus, similiter hirsutis & incanis, atque inter sese implicatis capitula huic sunt alteri similia,

PSYLLIVM Alterum,
Matthioli.



similia, sed paulò minorā, & numerosiorā, in quibus semen alteri simile: radicem habet multifidā, & numerosis scarentem fibris. Nascitur in campestribus, sed in maritimis frequentius. Flores tota serē astate ex capitulis eius spicatis erumpentes dependent, canino capiti haud dissimiles: Semen verò At-
minno profert. Vires nunc acutius expendē-
dæ. Vis Psyllio refrigeratoria, inquit Dio-
scorides, cum rosaceo, aceto, aut aqua illinitur, articulorum doloribus, parodontib, & dentibus, cedematis, luxatis, capitibus, doloribus prodest. Enterocelas puerorum & umbilicos proci-
dentes, cum aceto illitum sanat. Oportet ali-
tem acetabuli mensura rufum in aqua behunis
duabus madere, & ubi aqua concreuerit, illine-
re: egregiè siquidem refrigerat, & delectum in
feruentem aquam, calorem eius reprimat. Pro-
dest erysipelatis. Aiant si viridis domum im-
portetur, prohibere ne pulices in ea generen-
tur. Tusa cum adipe, fordida & maligna vlcera
expurgat. Succus eius cum melle ad aures
fluxione tentatas & vermiculosas conducit.

Loco.
Tempus.
Vires &
Temper.
Lib. 4. cap. 1.

Plinius, Vis ei, inquit, ad refrigerandum & discutendum ingens: semen in vsu. Fronti imponitur in dolore, & temporibus ex aceto, aut rosaceo, aut posca. Ad cætera illinitur acetabuli mensura aquæ: densa ac contrahitur: tunc terere, & cætera illinere oportet cuiusq; dolori & collectioni, inflammationiq;. In quibus Plinij verbis id primùm obseruandum quòd Psyllio vim discutienti inesse scribit, quæ cum percalida fiat, videtur contrahi, id est, vim repellendi, quæ per frigida fit, vim discutienti conuertisse, quæ est dissolutio. Deinde vulgata lectu ad cætera illinitur acetabuli mensura, &c. nullam sententiam exhibet quaream sic restituit Cornarius ex Dioscoride. Ad cætera illinitur. Acetabuli mensura in sextario aquæ densa se ac contrahitur: tunc terere, &c. Est enim hic ferè modus, quo etiam vtuntur Officinæ ad extrahendam mucaginem seminis Psyllij & fenigræci. Legunt alij, & fortassis rectius, Ad cætera cum illinitur, acetabuli mensura sextario aquæ maceratum densatur, ac contrahitur. Tunc terere, &c. Et alibi Plinius, Tenesmo in aqua cum radicibus decoctum medetur. Omnibus articulorum morbis salutare est huius semen madefactum in aqua, admissis in heminam seminis, duobus resinæ colophoniz cochlearibus, thuris vno. Galenus Psyllij qualitates ita definit, Psyllium semen habet admodum vile, ex secundo refrigerantium ordine, in desiccando verò & humectando medium quodammodo, & symmetrum. Quod Mesues de medulla, seu substantia inferiore, calida, sicca ordine quarto, acris admodum scribit, commentitium esse arbitrantur viri docti. Quod verò aqua frigida maceratum, & agitarum, esse cholagogum, ac ob id febribus biliosis conuenire & inflammationibus thoracis, thoracem quoque lenire, & sitim extinguere ait, id mucoso admodum & refrigeranti lubricantique semini attribunt.

Lib. 4. cap. 1.
Embl. 60.
lib. 4.
Lib. 4. cap. 1.
Lib. 4. simpl.

Cap. 9. li. 4.
Nomen
Lib. 4. ca. 9.
Forma.



REDIDIT Matthiolus plantam hinc pictam σύμφυτον πετράων esse Dioscoridis, Latinis similiter Symphytum petræum, quod nascatur in petris, vocatur & Alum. Ramulos habet, inquit Dioscor. origano similes, tenues, capitula velut thymum (sic enim quædam exemplaria habent, κλώνες δὲ ἵχθῳσι δεσμέναι, λυπητὰ, κεφάλαια δὲ ὡς θύμιν), alia κλώνες δὲ ἵχθῳσι δεσμέναι ἑμπεριεῖ, λυπητὰ φάλαρα, κεφάλαια δὲ ὡς θύμιν. Id est, ramulos habet origano similes, folia tenuia, caput thymi: quam lectionem secutus est Plinius. Alij priorem secuti λυπητὰ κεφάλαια coniungunt, nulla foliorum facta mentione: totum lignosum est & odoratum, gustu dulce, saluam ciens: radicem habet longam, subpurpuream, digiri crassitudine. Plinius, Alum, inquit, nos vocamus, Græci Symphytum petræum, simile cunilæ bubulæ, foliis paruis, ramis tribus aut quatuor à radice, cacuminibus thymi, furculosum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens, radice longa, rutila.

Lib. 27. ca.

SYMPHYTUM Petræum,
Matthioli.



SYMPHYTUM Petræum,
Lobelij.



Nascitur in petris, ideo petræum cognominatum. Huic descriptioni plantam apictam nullis prorsus deficientibus notis conuenire Matthiolus ait, quas nec declarat, nec vires, nec aliud quippiam præter natales, & eius pulchritudinem, quæ præsertim cum floret, maxima cum voluptate ad se contemplandam viatorum oculos allucit. At Pena qui eam vidit in Pœninis alpiibus, hodie diui Bernardi, scribit esse floribus purpureis, confertis, speciosis, ericæ maioris spicatis: foliis pusillis chamæpityos, breuioribus, aliquantum hirsutis pilosellæ modo, in furculis pedibus, lignosis, sed inodoram, radice lignea, non purpurea: dulcem non esse gustum plantæ, nec saluam elicere, quæ à Symphyto petræo Dioscoridis multum absuit. Quare alij aliud, arque aliud Symphytum petræum exhibuerunt, ob vim glutinandi & coniungendi potius quam ob figuram & similitudinem. Pena tradit Prunellam

In Aduers.

CHAMAEMYRSINE
Quorundam, Dalechampi.



Prunellâ, de qua in libro de iis quæ in vmbrosis proueniūt diximus, vulgò à Monspeliensibus. Cap. 16. Symphytū petræū vocari. Aliud est Lob. Symphytum petræū, Veronica recta Herbariorū. Folia Teucrii similia profert, aut Lysimachiz carulez, cui congener etiâ cū folio, tum flore.

CHAMAEMYRSINE *Quorundam,*
CAP. L.



LII Chamæmyrsinen, alij Ocimū montanum plantam hanc à foliorum similitudine vocant, quæ in altissimorum montium superciliis crescit, radice exigua, candida, inutili: ramulis multis, in orbem humi sparsis, dodrantalibus, rotundis, foliosis folio myrti, sed minùs acuminato: vel, vt alij volunt, ocimi, paruo: flore inæquali serie per summos caules exoriente, copioso, purpureo, sex foliolis cōstare, nitidissimi venustissimiq; coloris: semine in loculis minuto lo. Pulcherrima hæc plâta floris sui purpura sic viatorū oculos recreat, vt ad colligendū inuiteret.

TORMENTILLA CANDIDA, CAP. LI.



Axe plantam Tormentillam candidam herbarij vocant, ob radicem Tormentillæ æmulam, & ob foliorū in aduersâ parte candorē. Ad Pentaphylli genera pertinere verisimile est, vt ex eius descriptione perspicuum sit. In gelidissimorū & altissimorum montiū pratis herbidiq; locis prouenit, radicibus multis, nodosis, implicatis, è rufo nigrescentibus, fibrosis, multas alas huc illuc sparsas ad nouâ caulium & foliorum procreationem ex sese gignentibus: foliis loci pratensis, minimè dissectis, interdum quinis, interdum septenis, interdum nouenis, tenui longoque pediculo appensis, supina parte virentibus, prona cãdidis, albæ populi modo: iunceis cauliculis, flore herbaceo, copioso, muscarij ritu congesto, quale visitur in pede leonis, siue Alchimilla, siue stellaria vulgò dicta: semine minuto ex luteo viridi, siliquis aut vaginis exiguis incluso. Ad sanguinis eruptiones vndecumq; profluat, huius radicem tritam & potam multum laudant Alpini, narrantque eam, si quis vel collo tantum gesserit, sanguinem è naribus profluentem cohibere. Eadem siccata & in farinam tusa, iusculūque inspersa dysenteriz medetur.

Nomen.

Locus.

TORMENTILLA
Candida, Dalechampi.



Nomina



ΙΘΟΣΠΕΡΜΟΝ Græcis, Lithospermum Latinis, Officinis & medicis hodie omnibus Milium Solis, Arabibus Kulb, Cule, Cole, siue Calab, Italis Lithospermo, Germanis Meerhirse, & Steinsamen, Gallis Greml, & l'herbe aux perles. Nomen à lapidea seminis duritia accepit.

LITHOSPERMV M

Marius, Matth.

Genera.

Liliaceæ.

Liliaceæ.
Fermæ.

LITHOSPERMV M

Minus Matth.

Locus.
Liliaceæ.

Cassia, Lili.

Neque enim Lithospermum aliud sonat Græcis quàm Lapideum semen. Quum itaque semina tanquam calculos ferat, duritia lapidea, cādore & rotunditate margaritarum, cōmodissima voce Lithospermum dictum est, & Gallis l'herbe aux perles, recentioribus verò non Milium solis, quòd semen id candore & lucis splendore fulgeat nominandum fuit, sed Miliū Soler, auctore Serapione, quod auctoritate Aben Iuliel, nascitur in mōtibus Soler. Dioscorides & Plinius vnus duntaxat Lithospermi meminerunt, recentiores duo assignarunt genera, maius & minus. Alij alia addiderunt. Dodonæus tradit Lithospermum aliud esse hortense, aliud agreste. Hortense aliud maius, aliud minus. Lithospermū, auctore Dioscoride, folia habet olex (similia, longiora tamen, latoria ac molliora: quæ in ima parte sunt, humi iacent: ramulos rectos, tēnes, crassitudine iunci acuti solidos, lignosos, in quorum cacuminibus binidi exortus cauliculorum speciem exhibent, foliis longis, inter quæ paruum semen, rotundum, &c. (Sic Ruellius ex vulgari codice, cū in antiquo legatur, ἵχνη φάλα μωρὰ, παρ' οἷς ἀρίστὰ λιθώδες, & ρογύδον, λεπτόν, ὁρθότα μωρὰ ἴσσι. Id est, folia habentes parua, inter quæ semen lapideum, rotundū, tenue, orobolū, exiguo æquale.) Nasceitur in asperis & sublimibus locis. Plinius idem graphicè depinxit his verbis. Inter omnes herbas Lithospermo nihil est mirabilius. Aliqui Ægonychon vocat, alij Diospyron, alij Hera leā. Herba quincuncialis ferè, foliis duplò maioribus quàm rutæ, ramulis furculosis, crassitudine iunci: gerit iuxta folia singulas veluti barbulas, & earum in cacuminibus lapillos cādore & rotunditate margaritarum, magnitudine ceteris, duritia verò lapidea. Ipsi quæ pediculis adhærent, cauernulas habent, & intus semen. Nasceitur in Italia, sed laudatissimum in Creta. Nec quicquā inter herbas maiore quidem miraculo aspexit. Tantis est decor velut aurificum arte, alternis inter folia candicantibus margaritis, tam exquisita difficultas lapidis ex herba nascentis. lacere atque humi serpere auctores tradunt. Ego vulgā non hærentem vidi. Matthiolus legitimum Dioscoridis Lithosper

Lithospermum id esse putat quod maius est hic pictum, Fuchsumq; reprehendit quod pro vero Lithospermo, illud quod Officinæ Lithospermum minus vocant, depinxit. Dodonæus Lithospermū maius depinxit cauliculis, longis, gracilibus, hirsutis, magna ex parte humi instratis, quos longiuscula cingunt folia, nigricantia, Lib. 1. c. 90.

LITHOSPERMV M

Maius, Dodon.



hirsuta, inter quæ & cauliculos caliculi sunt hirsuti, primum ferentes florem caruleum, deinde semen rotundum, durum, lapideum, maiusculū, Lithospermū verò minus cauliculis rectis, rotundis, lignosis, furculosis, foliis longis, angustis, acuminatis, nigricantibus, minoribus quàm Lithospermū superioris. Inter quæ & cauliculos flosculi oriuntur candidi, tandē semen producēs aspectu pulchrū, rotundū, candidū, durū, lapideū, vnioni simile, minus supradictō. Maximus huius vbiq; in Officinis vsus, maioris rarior, quia minū frequens, minorq; suppetit copia, nec perinde seminis est ferax: verū calculo exterendo, lotioq; mouēdo efficacius multo. Floret Iunio & Iulio mēlibus, eoq; tēpore semē etiam profert. Id semen cuius maximus vsus est calidū siccūq; esse ex eius facultatibus conuicitur. Omnia etenim vrinam cientia, Galeno teste, calida & sicca sunt. Vim habet semen, inquit Dioscorides, atterēdi calculos, & ducendi vrinā, si cum vino albo bibatur. Plinius, his lapillis, inquit, drachmæ pondere potis in vino albo, calculos frangi pelliq; cōstat, & stranguriā discuti.

Temper.

Li. 4. simpl.

Li. 3. ca. 14.

Vires.

Li. 27. ca. 11.

LITHOSPERMV M Fuchf.

Minus Dodon.



LITHOSPERMV M

Nigrum, Dalech.



Matthioli

In cap. 14.
lib. 4.

Matthioli tradit dari vtriusque semen potandum vtiliter diebus multis sc̄squi-
drachmæ pondere, addita aspleni semidrachma, & succini scrupulis duobus ex
succo plantaginis aut portulacæ aut lactucæ ad gonorrhœam. Item dari magno
sanè auxilio minoris Lithospermi seminis drachmas duas ex lacte muliebri po-
randas, feminis agrè parturientibus. Quidam herbarij Lithospermum nigrum
vocant plantam hic appositam, quæ radices habet breues ac inutiles, caules bicubi-
tales, nodulosos, teretes, luteolosos, aridos: folia rubia, tactu aspera: semen rotundum,
nigrum, oleosum & pingue, quod in areis cum tritico simul exteritur, simulq; mo-
litur, & estur nulla capitis offensa. Hoc alij Myagrum Dioscoridis, alij Melampy-
rum Theophrasti esse autumant. Est præterea aliud Lithospermi genus, quod
arundinaceum vocant. Id Monspelij in hortis prouenit ad nihil aliud vtile, quàm
quod ex eius lapidosis seminibus coloris varietate formosis, nectuntur mulieribus
corollæ ad numerandas preces, quibusdam & monilia. Incolæ vocant lacrymas,
herbariorum vulgus Lacrymam Iob: quòd rotunditate & nitido splendentique
læuore ex oculis manantes lacrymas vicumque imitentur. Gaudet hæc planta solo

LITHOSPERMVM*Arundinaceum, Dalech.***LITHOSPERMVM***Anchusa facie, Lobelij.**Forma.*

madido & irrigari solito. Quamobrè ad puteos in hortis effossos seritur, vt aquam
situlis dum hauriunt, effusam, vel dum olera lauant, radicibus excipiat. Assurgit ad
sc̄squicubiti proceritatem, radice milio simili, foliis arundinaceis, latis, neruosis,
tactu rigidis, ad singulos caulium articulos exeuntibus, vt tenuia stamina fructui
præfixa, fructumque ipsum inuolucri vice protegant. Quod dictu audituque uni-
rum est, & huic plantæ ferè proprium, ante floris exortu fructus formatur & gran-
descit, absolutusque florem quasi intra se delitescentem & occultum summo verti-
ce promit, candicantem, spicatum congestum. Fructus color per initia herbaceus:
cùm maturuit, è cinereo purpurascens, iucunda quadam & oculis grata varietate,
figura non omninò globosus, sed infernè latiusculus, supernè tantillum cōpressus
& fastigiatus, silicis duritia, & lineis quasi virgatus. Semen intus milio Indico
simile,

simile, rufum, gustu careale, non iniucundo, tunicis muleis albis obuolutū, ex quo verisimile est & farinā & panē confici posse, non aliter quā ex milio & panico Indicis. Rarē huius plantæ nullus in medicina traditur vſus ab herbariis. Quidam esse putant Coicem Theophrasti, Arundinis foliis insignem, memoratum cap. 16. lib. 1. Hist. r. Item aliud Lobellius Lithospermum habet Anchusæ facie, in decliuibus saxosis vallis Ostensis Pedemontium nascens, fiuticosis pedalibus ramulis hirsutis: folus Lithospermi & floribus Anchusæ aut Echij aut Buglosi facie, purpurascens, radice lignosa.

CHAMÆPEUCE PLINII, CAP. LIII.



AMPHORATA minor hæc planta vulgò ab herbariis nominatur, quæ Chamæpeuce Plinij à quibusdam esse creditur. In squallidis & arenosis locis gignitur, radice subnigra, longa, crassa, furculosa: ramis multis, humi circa radicem iacentibus: foliis numerosissimis per cauliculos ex interuallis confertim prodeuntibus, larici similibus, nullo flore, nullo fructu. Chamæpeuce, inquit Plinius, larici foliis similis lumborum & spinæ doloribus propria est. Chamæpeuce frutex est plurimis à terra assurgens virgis in summitate rubente lanugine obsitis, folia habet sexquinciāli longitudine, angusta, gracilia, retroflexis vtrinque laterum extremitatibus & à tergo modicè

Nomina
Locus.
Forma.

CHAMÆPEUCE Plinij,
Amphorata minor, Dalech.



CHAMÆPEUCE,
Cord.



hirsuta, flaua hyeme virentia: flores veris exitu in summis virgis producit paruos, candidos & foliaceos, corymborum modo coacervatos, his singuli succedunt parui, andiq; fructus hordeo minores, in quibus tantillum clauditur semen, radicibus ruzitur longis, obliquis & fibratis, foris in flauo rubentibus: odorem folia, flores, & fructus grauissimum habent: saporem verò acrem & vehemēter tenuem. Nascitur macris, putridis, vliginosiq; locis sub Tedis arboribus. Dioscorides verò flores rosæ ei tribuit, quod fortè perperam legitur. Plinius florum non meminit.



HORTENSIVIS plantis acris facultate præditis aliquot genera Thlaspeos adiunximus: quædam alia à recentioribus obseruata hoc commodiore loco exponemus. Primum, id genus quod à Dalechampio obseruatum est propè Arcem pini in Sequanis, haud procul à Lugduno Salinatio. In a. idis nascitur, radice parua, breui, candida, superuacua, in exiles fibras diuisa: foliis octo; nouem, decem paruis, ocimo ferè similibus, nonnihil lacinia-
tis, humi iacentibus, exorientem caulem ambientibus, qui rotundus est, ima parte ruber, supernè viridis, dimidium pedem altus, sæpiùs vnicus & singularis, nonnunquam in ramulos brachiatus, foliis tribus vel quatuor ex interuallis perfoliata: modo cum singulis vestientibus, non binis simul, vt in aliis multis plantis, eo spatio quod inter caulem & folia est, tanquam ex ala prodeuntibus aliis foliolis & flosculis: floribus violæ minutis, albis, quos capillacei pediculi sustinent: semine in vasculis bifidis, cordis figura, extorsum velut in umbonem prominentibus, introrsum velut in alueolum cauitis, numerofo, lato, velut compresso, acris: foliorum & caulis sapore satuo principio, mox subamaro, tandem fauces vrente: quare eadem ei vis, quæ & cæteribus Thlaspeos generibus. Huius pictura desideratur. Alium eiusdem Thlaspi montanum candidum, ad vicum quem incolæ vocant D. Guilie-
mum delerit, haud procul ab Agnania cœnobio gignitur, in præruptissimo saxo, ramosa iuculosaq; planta, radicibus multis, huc illud dispersis, caule procero, in multos ramos diuiso, cortice scabro, è fusco nigrescente: foliis densis, leucoio similibus, sed brevioribus, candicantibus, gustu acris: flore in summis ramis copioso, pusillo, candido: semine minutulo in latis vasculis Thlaspeos vulgaris modo, acrimonia sua linguam pungente. Tertium Dalechampii Thlaspi montanum minimum in umbrosis montiu recessibus gignitur, radice quatuor digitos longa,

THLASPI Montanum
Candidum.



THLASPI Montanum,
Minimum, Dalech.



tereti,

cereti, candida: ramulis permultis ferè humi iacentibus, quibusdam erectis, do-
drantalibus, foliosis: folio minimo, oblongo, ordine disposito vt in Aphaca, gultu
acti: flore candido, minutulo, in cauliculorum vertice copioso: semine perquam
exiguo, in latis valculis, actis saporis. Dodonæus quatuor Thlaspeos genera po-
suit. Primum quod à Lobellio quoque depi-
ctum & à Pena descriptum est, foliis longiori-
bus, angustis, mollioribus leuiter laciniatis,
Drabæ, caule multis alis diuiso, gracilibus, len-
ris, obsequiosis, flores lunio ferentibus, pusillos:
deinde foliacea inuolutra, multa, compressa,
perfectè circinata, supernè hirsuta, quæ semen
continent pusillum, rotundum, oblongum, ni-
gricans, acre, gustu feruens, & quemdam allij,
sinapi aut cepæ saporem exhibens. In maceris
vetustioribus, & aruis Galliæ, Germaniæ, An-
gliæ frequens. Alterum id quod à Matthiolo
primo loco positum est. Tertium cum Fuschio
minus & angustifoliū, Germanorū *Wysenkrant*.
Foliis est & caulibus minoribus quàm Thlaspi
primum, ramulis multis & gracilibus fruticat,
in quibus flores, fructus, & semina sicut in pri-
mo genere, sed omnia hæc minora habet.
Quartum est Creticum umbellatum, Iberidis
folio, pictum etiam à Lobellio, cuius folia ser-
rata sunt, inquit Pena, vulgaris Iberidis, sed ma-
iora: caulis cubitalis, multos ramulos fundens,
in quorum extremo umbellæ & flores, sambuci

THLASPI *Angustifolium*,
Dodonæi & Fuschij.



THLASPI *Incarnum* Mechli-
niense, Lobelij.



THLASPI *Fruticosum*, foliis
Leucocy marmi minoru.



palustris similes, ex candido purpurascens Julio & Augusto, deinde semen in corniculis Thlaspeos minoris similibus, acre & gustu feruens. Dodonæus idram etiam esse censet, de qua in horto diximus. His addenda quædam alia à Lobellio expressa. Primum Thlaspi incanum Mechliniense, quod finitimo Mechliniæ turi fruticat, oleæ foliis, multisq; summo diuisis, hirtis ramulis, pedem & sesquipedem longis. Flos albus, & in pericarpis quadamtenus rotundis, summum caulem ambientibus, semine exiguum, minus cæteris acre. Alterum eius Thlaspi fruticosum est, foliis Leucoij marini minoris. Virgæ numerosæ, sparæ, crebris Leucoij minoribus foliis: flores candidi, copiosi, & semen compressum Thlaspi parui. Radix lignosa, fibrata, in Belgij hortis. Aliud fruticosum spinosum Narbonense, quod non nisi sterilibus cautibus rupibusve propè Nemausum & Monspelium fruticat, dodrantalibus ramulis, multis alis diuisis, nonnihil spinosis & sinuosis Poterij ritu: folia oleæ, pusilla, albida, flores candicant. Semen acre glumis includitur. Item aliud folio est thymbræ, hirsuto, rigido: cauliculos emittit multos, pedales, fruticis specie è quorum summis flores, albi, & semina in compressis folliculis. Huc adducenda etiam alia à Pena prodita. Ac id primum quod nusquam se



THLASPI Fruticosum
Alterum, Lobellij.

vidisse

THLASPI Narbonense,
Pena.



vidisse

THLASPI Minus Cly-
peatum, Pena.

THLASPI Aliud umbel-
latum, Pena.



vidisse ait, nisi in agro Narbonensi & Monspelienfi, locis squallidis, sabulosis, propè pusillas anchusas proveniens. Folia, flores, seminaq; ex luteo pallent, & peltæ superioris sunt, sed penè pergamenæ chartæ instar pellucida, tenuia, similitudine, sapore Leucoij; vnde quidam Leucoium marinū putarunt: ramuli sunt exiles, pal-

SINAPI Et Thlaspi media
Prouincialis planta., Pena.



mares, nitidi, foliolis albicantibus thymi, non ita numerosis. Aliud eiusdem pusillum Thlaspi propè Monspel. ad Castrum nouum cis Ladum amnem nascitur, aridis viarum crepidinibus, ramulos multos spargens, rectos, vimineos, palmares & sesquipedales, albidis: foliola polygonati, minora, aut centunculi, aut lauidulæ: flosculos albidos, Iberidis aut Thlaspi Cretici: Clypeolos non dissimiles ferr, sed duplò minores. Tota planta albicat, gustuq; Thlaspi aut nasturtium indicat. Hoc Itali Alysson fecere, sed doctiorum iudicio Thlaspi potius adnumerandum quàm Alyssò, cui aptior alia stirps inuenta est à sedulis herbaris, quàm in hortis alunt. Item aliud eiusdem Thlaspi est id, quod montosis fatis Narbonæ ad Lupi montis radices oritur, Maio & Iunio flores muscosos, umbellisque confertos, superioris non absimiles edens, sed albidos, semenq; minus multò, sed admodum acre, foliola exiliora, diuisura nasturtij hortenfi, per totos cauliculos numerosos, grandes, è radice non profunda, nec multū fibrosa, sapore acerrimo, Thlaspeos postrema

addo ex eodem Pena bouam plantam, propter communes inter sinapi, buniadem, & Thlaspi figuram ac vires. Prouenit non procul à Magdalenæ fano, in excelsis illis cautibus Gallicæ prouinciæ, floresq; Augusto pronunt luteos eiysini, nec siliquis dispares, in gracilibus ramis ad summum & imum, vna è radice digitum crassa, densa, pedem longa capistris folia, Thlaspi, aut drabz, leuiter laciniata, albida & hirsuta, sapore crysimi aut buniadis barbarex.

AGERATVM,

CAP. LV.

Locus.

Forma.



GERATVM secundum & ferulaceum Plinii in pinetis gignitur, ac fruticat, arido macroq; solo, radice nigra, rugosa, contorta, lignosa, dimidij pedis longitudine: folio ferulæ aut forniculi, statim ab radice copioso, per caulem impari exortu disposito: caulibus multis, angulosis, cubitalibus, ferulaceis: flore aureo, inodoro, senecioni simili, in umbellæ rotunditatem formato, licet ramuli floculos sustinentes, & in umbellæ orbē coeuntes diuersis caulis partibus attollantur: pertinaci in floribus aurei coloris fulgore, & gratia, vnde Agerati, idest, non senescentis nomen, gustu subamaris. Odor foliorum, dum teruntur, artemisiæ leptophyllon vulgarem refert. Floret Iunio mēse. Ageratum purpureum, herbariis quibuscum dictū, in nudis ferè cautibus gignitur,

AGERATVM Ferulaceum.

AGERATVM Purpureum.



vbi putris saxi puluisculus subest, vel riuius aliquis illabirur, aut scaruriētis aque guttis, vel aspergine rupes madescit: radice breui, capillata, subflaua: foliis paruis, numerosis, circa radicem sparsis, Agerato similibus, gustu subamaris, antrotrōni obtusis: ob quam similitudinem Ageratum vocant: cauliculis plurimis per saxi crepidines pendulis, saxumq; angorum instar ornantibus, & conregentibus: flore violæ, purpureo, copiosissimo, suauissimè olente, vt vetea sola dote mirū in modum placeat, tanta scilicet odoris gratia violis non postponenda: semine minuto, in oblongis vasculis. Germani quidam Moschatellam cæruleam vocant. De Agerato multò plura diximus in libro de Umbelliferis.

SYNAN

SYNANCHICA, CAP. LVI.

ERA hæc in sabuleis & mactris locis puenit, radice nigra, lignosa, *Locus.*
 sex digitos longa, fibrata, tenuissimis villis capillata: ramis multis, pē-
 dalibus, quadratis, infernè rubentibus, geniculatis: foliis multis, lino
 vel galio similibus, ad geniculorum interstitia nodosque exorienti-
 bus, quinis, lenisve: flore in summis caulibus, cauliumque ramulis copioso, prin-
 cipio rubro, post candicante: nullus in ea gustanti sapor deprehenditur. Siccat
 absque morfu. Ad angustias utilissima est sumpta, & admota, quæde causa Synanchi-

SYNANCHICA.

SYNANCHICÆ Species, Iuncaria
Salmanticensis, Clusij.



eam nominarunt. Synanchicæ species videtur planta, quam Clusius ait à Salman-
 ticensibus Iuncariam vocari, à iunceorum cauliculorum forma & gracilitate. To-
 ta enim iunceæ est, inquit, sed equiseti modo aspera, & geniculata, foliis vtrinque
 lini, & frequentibus ramulis ex alarum sinu prodeuntibus, copiosos & paleaceos,
 candicantesque flores proferentibus, semen deinde exiguum, nigricans: radix te-
 nuis & candida. Tota herba subdulcis est. Prouenit locis arenosis inter vineta se-
 cundo à Salmantica lapide. Floret Iulio, semen fert Augusto.

LONCHITIS, CAP. LVII.

LONCHITIS in iis quoque est quæ in asperis & siccis locis prouenit, *Lib. 3. c. 144*
 foliis valde porri similibus, inquit Dioscorides, latoribus, subrubris,
 plurimis, ad radicem circumfractis, velut terram versus paucis in caule,
 in quo flores seu pileoli, figura verò commicis personis hiantibus
 similes, nigri quidem, sed album quidpiam ab ipsis eminet, ex hiatus ad inferius la-
 brum velut ligula: semē simile est lanceæ, triangulare, inuolucris clausum, vnde no-
 men accepit. Radix similis est dauco. *Lib. 27. c. 22* Plinius, Lonchitis, inquit, non, ut plerique
 existimauerunt, eadem est quæ xiphion, aut phasganion, quamquam cuspidi simi-

lis semine. Haber enim folia porri, rubentia ad radicem, & plura quàm in caule, capitula comies personis similia, parua excrentibus linguam, radicibus prælongis. Nascitur in siccantibus. Sed galeculata ista herba herbariis ignota est, quam tumuis diu multumque in montibus & aridis locis eam vestigant. Herbariorum quidam Lonchitir esse volunt Helleborinen Dodonæi: descriptam cap. 29. lib. 3. à nobis libro de plâris. Quæ in umbrosis, &c. Alij, Helleborinen nostra v ferrugineam, descriptam supra, cap. 30. Vtriusque flos, sed præcipuè Ferrugineæ, comicæ personæ simile quidpiam ostendit, de altera lonchitidis specie diximus, libro modo citato.

POLEMONIVM, CAP. LVIII.

Nomina
Lib. 4. c. 1.

Lib. 4. c. 2.

Forma.

Locus.

Lib. 3. c. 6.

Lib. 3. c. 11.

POLEMONION Græcis & *φολέμων*, siue *φολέμων*, & *χιλιοδυναμης* à Cappadocibus, auctore Dioscoride, vocatur. Latinis Polemonium, & Polemonia, & Philetæria. Polemonium quidem, quasi in bellis virile dicas, adeo vt de eius inuentione sibi vendicanda certatum inter reges sit, quod herba esset chiliodynamis, id est, mille viribus prædita. Ramulos habet, inquit Dioscorides, renes, pinnatos: folia paulò maiora quàm rutæ, sed oblongiora, ad polygoni aut calamitæ folia accendentia: In summo velut corymbi sunt, in quibus semen nigrum, radix cubitalis est (*πυρραία*: alij *πυρραία* legunt, id est, crassa, limbalbida, similis struthio. Nascitur in montibus, & asperis locis. Plinius ita depinxit. Polemoniam alij philetariam, à certamine regum inuentionis appellant, Cappadoces autem chiliodynamin: radice crassa, exilibus ramis, quibus in summis corymbi dependent, nigro semine, cæterò rutæ similis. Nascitur in montosis. Sed quænam planra

POLEMONIVM,
Dodonæi.



Cap. 29.

pro polemonia statuenda sit, dubitatur a multis. Dodonæus duas polemonij species depinxit, prius cauliculis tenetis, geniculatis, foliis latiusculis, binis semper in singulis geniculis exaduerso. In summis caulibus flores oriuntur conferti, candidi, deorsum vergentes: deinde semē nigricans caliculis rotundis concluditur, radix est candida, levis, longa. Spumum papauer vulgò putatur, propter spumeam & spum similem asperginem, quæ non raro albicans foliorum & geniculorum sinibus insidet, fortassè Melandryō Plinij, lib. 16. cap. 7. inquit Lobellius. Alterum Polemonium cauliculis proferet etiam geniculatos, sed longiores: folia in eis longa, imò parte latoria, in angustum desinentia: flores rubellos in umbellis, ferè valerianæ. Vtrumque locis asperis montosis & saxosis prouenit. Iunio & Iulio mensibus florent. Ocimastrum Valerianthes vocant Pena & Lobellius, aliis Valerianam rubram, Saponariam alteram & Struthium Vlysses Aldrouandus. Recentiores nonnulli prius, Behen album esse putant, alij Ocymocides Dioscoridis alterum Behen rubrum, quæ tamē cum Behen Serapionis minimè conuenire videntur. Sic enim scribit, Aben Mesuai. Species Behen sunt duæ, scilicet rubri & albi, & sunt ambæ venæ in magnitudine radicis pastinacæ paræ, quarum quædam sunt rortuosæ, deferuntur ab Armeniâ, odor eius est bonus, & eis viscositas quædam: & ambæ species sunt calidæ humidæ, & augmentū faciunt in spermate. Polemonium aliud accuratè pingedum curauit

POLEMONII, Altera

figura.



curavit Dalechampius, dudumque descripsit, quod sponte vbiuis in agro Mompeliensi gignitur, Lugduni verò in horris solum, pergulis vestiendis, & hortorum sepius contegendis, ab olitoribus dicitur lasminum luteum, quod albi iasmini modo in vicina scandat: fruticat hæc planta flagellis multis, longis, lentis, rotundis, in adminicula propinqua reptantibus foliis: folio ruta, sed obscurius virente: flore luteo, lasmino simili, specioso: baccis postquam defloruit, nigris, purpureo succo tingentibus, si quid imbuatur. Pena non aliam polemoniam exhibet, non multis ab hinc annis Academix Mompeliensis notam ac vires experientia compettas. Frutex, inquit, ipse vndeunque exquisitè quadrat delineationi Dioscoridis. Virgultis enim multis fruticat, lignosis, rectis, rotundis, gracilibus, cortice in pullo viridi, ternos & quaternos cubitos altis, in quibus ad usq. summum hærent vtrimque pinnatim tamuli, & folia ternaria, citysi aut ruta, maiora, saturè virentia, crassiuscula, & rigida. Flores Maio & Iunio emicāt lutei, pusilli, vt iasmini, qui cedūt baccis nigris,

vnà circinatim collectis, plenis, paribus, ligultri, aut corni sceminx, succo ianthino vel atro, purpureo inficiente prægnantibus: radice prolixa, lignea, implexa & vario flexu sparsa, intus alba, saporis nonnihil acris & amari, euulsu difficili. In Mompeliensi agro ad castrì noui aridos colles, & æstuosas margines oliuetorum,

POLEMONII Species,

Dodonæi.



POLEMONIA Mompel.

Iasminum luteum.



& in

Ibid. & in luci Gramuntij cāpestribus saxosis, quā plurima. Polemonij tadix, teste Dio
Vires. scoride, bibitur in vino contra serpentes, & dysenteriam: & ex aqua aduersus vring
 difficultatem, & coxendicum cruciatus. Datut ex aceto drachmę pondere lienosis.
 Eadem scorpionis plagę alligatur. Tradunt eum qui radicem gestauerit, (non vt
 legitur, qui gustauerit, τὸν ἔχοντα,) à scorpione non feriri, eumque si ictus sit, nihil
Lib. 8. sim. molesti passurum. Dentium dolorem manā mitigat. Polemonium, inquit Galenus,
 tenuium partium est, & desiccandi vim habet: quā obrem quidam radicem eius
 cum vino ad ichiadicis, dysenteriam, lienemque induratum potui exhibent.

HOLOSTIVM,

CAP. LIX.

Nomen.*Lib. 4. c. 10.**Forma.*

Forma. **H**OLOSTION herba, id est, tota ossæ dicta est per antiphrasin, quod
 nihil duri ossæve habeat: tota enim tenella & graminea est. Parua
 est herba, inquit Dioscorides, tribus aut quatuor digitis eminens su-
 pra terrā, foliis & viticulis coronopo aut gramine proximis, adstrin-
 gentibus, radice valde tenui pili instar, alba (vulgares codices habent λευκή τὸ
 ἔλκει, quod est albam speciem, qui sensus videtur friuolus. At in veteri legitur, λευκὴν,
Locus. ἡδὲν, id est, albam, fibrosam, longitudine quatuor digitorum. Nascitur in editioris
Lib. 37. c. 10 terrę locis. Plinius, holosteon, inquit, sine duritia est herba, ex aduerso appellata à
 Gtæcis, sicut fel dulce, tenuis vsque in capillamenti speciem, longitudine quatuor
 digitorum, ceu gramen foliis angustis, astringens gustu. Nascitur in collibus terre-
In cap. 30. nis. Pro qua molli herbula aliam atque aliam herbarij depingunt. Mathiolus etsi
Lib. 4. genuinum Holostium nulli dum in Italia notum esse putet, tamen nullam plātam
 se reperisse ait, quæ verum referat, quā ea quę vulgō à Goritiensibus Serpentina
In cap. 127. vocatur, de qua in Horto egimus, Capite De Coronopo. Est enim herba exigua hu-
Lib. 1. mi procumbens, quæ foliis cauliculisque coronopi modo exit, gustu adstringenti-
Pena in bus, radice tenui lignosæque. Nascitur quoque in collibus & sabulosis locis. At hoc
Ado. Matthioli holostiū à multis improbatut, quod eius radix minimè capilli tenuitate

HOLOSTIVM,
Matthioli.HOLOSTIVM,
Quorumdam.

fit

quod vult Dioscorides, imo et assitit lignosa, fusca, minimi digiti crassitudine: reliquaque planta capitulis & semine plantaginis, non mollis aut tenera, sed durior rigidaque, quam ut holostio datum sit, folia illi iuncea, angusta, crebra, in terram procumbentia. Matthiolus ipse mutata sententia in postrema commentariorum editione Holostium aliud pictum exhibuit, nulla adiecta aut figuræ aut virium declaratione. Longè diuersam pro legitimo holostio proponit Pena, quæ multò breuioribus & crebrioribus gramineis, vix palmaribus viticulis, & foliis exit, coronopi diuisura, in superiore ambitu ex fusco virentibus, delicatioribus, setmè vt capillarium, sparsis: radix tenuissimis cirris, & capillis pluribus adianti veti, ternos vel quaternos digitos prolixa, pulla, & albicans fuscèdine. In Narbonensi prouincia ad Veganium, & propè Lugdunum, etiàmque in Alsatia Germaniæ se vidisse ait, saxosis & incultis, sterilibusque collibus. Gustu exsiccat & adstringit, grata satis, & cuiusdam lenitoris non immunis. Eisdem facultates Dioscorides holostio tribuit. Potest, inquit, si simul coquantur, carnes compingere: bibitur & ad rupta cum vino. Sic & Plinius. Vñus eius ad vñsa, rupta in vino potæ. Vulneta quoque conglutinat. Nam & carnes coguntur addita. Quæ ex veteri codice sic legit Cotnarius. Nam & carnes, cum coquantur

HOLOSTION,

Loniceri.



HOLOSTIVM Salmanticensè, Clusij.



addita. Item Galenus, Holostium desiccadi vim habet cum adstrictione. Quamobrem ipsam ad rupta potui exhibent. Sed id Penæ holostium filix laxatilis Tragi videtur esse, quam pictâ dedimus in lib. de plantis, Quæ in vmbrosis, &c. Aliud holostium quorundam sententia hic appinximus. Nascitur in terrenis collibus, apicis & perfatis, tadice quatuor digitos longa vel citciter, paulatim gracilescente ad pili vique tenuitatem: foliis coronopi siue herbar stellæ, paulò latioribus, villosis, incanis, sed instar coronopi minimè per ambitum fissis ac laciniatis, cauliculis dodrantalibus, spicam gerentibus seminibus grauidam, gustu adstringentibus. Lonicerus plantam aliam omni ex parte mollissimâ, quam Ruellius Denticulam canis Gallis vocari scripsit, pro Holostio depinxit, adscripta Dioscoridis delineatione. Clusius aliud Holostium Salmanticensè demonstrauit, his setè verbis. Herbula est, inquit, foliis setè plantaginis angustifolia, verum minoribus, angustioribus, crebris, per terram stratis, & incana lanugine obsitis, subaltringente gustu: inter quæ quiniæ aut seni cauliculi nudi exiliunt, palmum alti, qui à medio setè ad summum vique, multis & sese mumo contingentibus flosculis ex herbaceo candicantibus ornati sunt, vti in coronopo, quibus deinde semen plantaginis succedit theculis inclusum: radix est longa

In Adver.

Ibidem.

Vires.
Lib. 17. c. 10
Embl. 9.
lib. 4.
Lib. 8. sim.

longa tenuis, lignosa. Collibus aridis Salmanticæ vicinis provenit, maior & candidior iuxta Valentiam Hispaniæ secus vias. Floret illic Maio. Valentiz verò Martio & Aprilis initio. Salmanticenses Holoſtium vocant.

CATANANCE *Quorundam,*

CAP. LX.

Nomina

Locus.

Forma.

Vires.



lib. de maritimis plantis.



ERBAM hic adpictam Catanacem priorem herbarij quidam esse volunt, coniectura quidem nō aspernanda moti, quod multæ in historia Diotcoridis commemoratz notæ illi cōueniant. Gignitur in aridis & sabulosis locis, radice tenui, iunceæ, nigra, non altè descendente, foliis crebris, albicantibus, coronopo similibus, cauliculis gracilibus capitula sustinentur quina senave, cyano ferè similia, latiusculis & acerosis laminulis compacta, albicantibus. Flos est puniceus, semen minutulum. Herbz totius gustus adstringens. Quare vtilem esse aiunt ad cohibendas sanguinis, aliorumq; humorum ex quavis corporis parte eruptiones, ad gargareonis inflammationes, & aphthas, si eius decocto os colluatur, ad maligna tibiæ ulceræ. Hanc itaque plantam si pro Catanance agnoscamus, haud verum fuerit ad amatoria tantum expecti, cum experientia docuerit variis hanc morbis prodesse. Catanance alia descripta est à nobis in

STATICE,

CAP. LXI.

Nomen.

Locus.

Forma.



STATICE à præsentissima vi qua pollet, sistendæ sanguineæ & cutis alius fluxionis nominata est hæc herba, à Statice Plinii diuersa, perpetam etiam cantabrica eiusdè, Caryophyllus montanus alter nonnullotum. In aridis & pettosis nascitur, quinetiam ex lapidum saxorumq; rimis emergit, vt integram euellere volentibus saxum diffringendum sit. Catanances alterum genus Patisienses herbarij esse putant. Radices agit solidas, crassas, flexiles, nigras, in vetusta planta proximè folia multas, rugosas, nodosas, in vnam grandiore & ampliorem ex variis partibus coeuntes, folia fert multa, humistrata, lanceolata vulgari similia, angustiora, venosa, crassa, in cauliculis nulla, quos multos emittit, iuncea, rotundos, plerumq; cubitales, glabros, in quorum fastigio capitulum insidet rotundum, alucolis multis pertusum, fauorum cauernis similibus, in quibus strobili cæphæneo candicantes nitent, quibus delapsis, capitulum velut

hæc velut tomento lanuginosum cernitur, & in cellulis illis minutum & exile semen coarctetur. Sapor totius plantæ adstringens, facultas ei ad miraculum vsque deficcandi, & erumpentium humorum impetum cohibendi siue trita admoueat, siue succus eius bibatur. Dysenteris succurrit, mensium abundantiam, sanguinis è naribus profluvium sistit, sanguinem excreantibus opitulatur. Denique vulneraria est, & maligna ulcera ad cicatricem perducit.

Locus.

SCORPIOIDES MONTANVM,

CAP. LXII.



SCORPIOIDES montanum herbariis quibusdam dictum in altis & asperis montibus nascitur, radice principio crassiuscula, nigra, in horas multas & breues se diducente: foliis multis, longis, angustis, lanuginosis, leucoio purpureo similibus, sed margine non incis, caule palmum alto, foliola pauca mitteate, stoculis tribus vel quatuor, cæruleis, in exiguum, rotundum, virgarumque capitulum siue corymbum conglobatis. Rara hæc planta est, montiumque solitudinibus inaccessis tantum familiaris.

Forma.

Locus.

TUNICA MINIMA,

CAP. LXIII.



TUNICA minima, aridis locis & murorum suggrundiis Tunica minima nascitur, radice candida, in multas partes fissa, valde fibrata, cauliculis quamplurimis, dodrante non altioribus, genicularis, furculosis, flexilibus: flore parvulo, quinque foliolis constante, ex albo puniceis, ex paruo allabastro, vt in caryophyllo nostrate prodeuntibus, gustu austero. Holostium quidam esse putant.

Locus.

Forma.

Locus
Forma.

IACEA montana in apricis & glareosis montium locis gignitur: radice ferè rotunda, veluti ex foliis in sese coëuntibus coagmentata, fibris multis capillata: foliis statim ab radice multis, erucæ modo diuisis, sed laciniis maioribus & latioribus, incanis lanuginosis: caule pedali, capite in eius fastigio, Acano simili, pro reliquo plantæ habitu, crasso, corticosis laminis & vnguibus substructo, Cinaræ instar, sed minimè pungentibus: flore albo: semine oblongo. Floret Aprili mense. Semen Iunio maturefcit. Quidam Iaceam Acanophoram vocant. Iacea alba in lapidosis & saxosis prosilit: radice ferè pedali, conrorta, lignosa, extrinsecus propè nigricante, fibrata: foliis paruis, minutim insectis, absinthio marino non dissimilibus, exilioribus, & magis incis: caule cubitali, anguloso, lanuginoso, in multos ramos supernè diuiso, quorum in vertice capitellum exiguis laminulis compactum extat, Iacææ nigræ modo, ex quo flos ruber prodit. Sapor in tota planta perquam amarus est. Floret Iunio mense. Ad affectus ventriculi frigidos commendatur, ad hepatis & lienis obstructions, & ad menses prouocandos. Iaceas alias demonstrant Lobellius & Pena. Maiorem folio multùm laciniato, in segetibus Gallix & Angliæ potius quàm in pratis nascentem, caules cubito & sesquicubito altiores proferentē, circa quem folia multa multùmque laciniata Hieracij modo

IACEA, Montana.



Vires.

IACEA, Alba.



IACEA Maior, Lobel.



Lui 6.

sunt, globulos duplò maiores, turbinatos, ex squamulis compactos gerit, apicibus
florum purpureorum obduetos Cyani maioris. Radix digitum æquat, lignosa: se-
men crisci, minus. Cyani floris est congener. Nonnunquam Mechlinix in hortis,
floribus albis & capitulis spinosis visitur, auctore Lobellio. Huic nouam subdit

IACEA, Montana
Narbonensis, Lobell.



IACEA, Incana folio
olea, Lobell



IACEA, Maior
Lutea Pena.



IACEA Humilis, hieracij
folio Pena.



IACEA, *Incana.*

idem Lobellius Iaceam montanam Narbonensem propter aliquam inter se similitudinem. Cautibus & collibus Caltri noui conterminis agri Monspeliensis ab eo reperta cauliculo riget dodrantali & pedem alto, rotundo, folia Iacæ luteæ & chamæleonis lævis Theophrasti media edente, altera parte incana, glauca, tantillum hirta: flores Iacæ aut cirsiij, sed minores: radicem sesquipalmarem, gracilem, minus fibratam, gustu cyani amaricat. Addit Lobellius Iaceam pusillam incanam folio oleæ, ptarmicæ specie. Est alteri Stœbe Salamanticæ Clusij per omniâ similis capitulis & floribus exotica Syriaca plantula: sed cauliculus minus diuisus, palmaris & sesquipalmaris: folia maiora oleæ, magisque incana, minimè ferrata: capitula item habitiora, nitidis argenteis squamis, gustu insipido, minimè amaro. Iacæ aliâ tradidit Pena. Iaceam lutea maiore, quæ in segetibus Monspeliacis reperitur, floribus luteis, venustis, à cartamo siluestri nullo modo distans capitulis, foliis, caulibus, nisi quòd tota asperiuscula est. Altera minor est, serpens, rarior, & fe-

re Narbonensium est, in marginibus satorum nascitur, ad pontem à Monspelio miliari distitum, via qua Frontignanum itur, foliis paruis, hieracij modo laciniaris, minoribus, retusioribus, vnâ cum cauliculis dodrantalibus humi stratis: capitula gerit prorsus cyani, cærulea, minus obsoleta: flores purpurascences, vel albos: radix est crassior: semen cæteris non dissimile. Tertia propior est cyano quàm Iacæ: vtrique tamen non absimilis. Lobellius Ptarmicam vulgarem Herbariorum vocat, propter saporem acriorem, amarum, halitumque tetrum, sternutamenta crebriùs extorquentem. A radice duriore multos caules emittit, folia crebra, gnaphalij triplo maiora, leuiter ferrata, ab imo multa, ad summa vsque, oblongiora, acutiora, graciliora: capitula ex squamulis albidis compacta, cyani aut Iacæ, apices villosos, ex purpurascence colore in pallidum languescences. Tota pilosa est, & hirsutie incana. In Narbonensibus vinetis, & non procul à Monspelio nascitur. In hortos etiam translata est.

PHYLLVM,

CAP. LXV.

Nomina

Lib. c. n.

Genera

Locus.

Forma.

And. Lac.



VM φύλλον nihil aliud quàm folium significet, vix vllam herbæ notionem in animis informar. At ἐλαφοφυλλον, id est, oleæ folium, herbam foliis oleæ similem designat, quæ & vel foliorum eruptionis argumento vel à Musci similitudine, Bryonia dicitur, auctore Dioscoride, qui duo eius genera assignat. Thelygonum, id est, Fœminiparum, & Arrhenogonum, id est, Mariparum, & vtrumque describit his verbis. Phyllum, quod Elæophyllum vocant, alij bryoniam (sunt qui βρύον legant, quod musci modo exeat qui βρύον Græcis dicitur) nascitur in petris. Est autem quod thelygonum dicitur, veluti muscus, oleæ folio, viridiore: caule tenui, breui: flore albo: semine papaueris, maiore (vulgares enim codices habent, καρπὸν μέγιστον, ὡς περ μίχινον, cum legatur in exemplari veteri, καρπὸν λεγόν, μικρόν, id est, fructu tenui atque pusillo.)

Arrhen

PHYLLOM *Thelygonum*,
Dalechamp.



Arthenogonum verò in cæteris quidem prædicto simile est, sed fructu differt. Habet enim fructum racemosum, similem flori oleæ quæ defloruit. Dicitur Arthenogonum porum masculos parrus facere, Thelygonum femininos. Hæc de illis narrat Cræteus, sed eorum historiam hæcenus mihi produxisse visum est. Quibus verbis Dioscorides, inquit Pena, non plantas quin sint, qualēsve sint in dubium renocat, sed duntaxat ambigit num sexus optionis competentem quempiam facere possit earum vtrius, nempe maris aut feminae, quod Cræteus prodidit, & fabulæ affine esse Theophrastus monuit. Dioscoridis igitur sunt descriptiones non Cræteæ, aut saltem non solius, sed ex aliis quos legerat Dioscorides auctoribus. Plinius ex iisdem mutuatus eadem ferè prodidit his verbis. PhylloM à Græcis vocatur herba in saxosis montibus nascens: femina magis herbacei coloris: caule tenui: radice parua: semine rotundò, papaveri simili. Hæc sui sexus facit partus. Mas autem semine tantum differens, quod est incipientis oliuæ. Vtrumque bibitur in vino. Plin.

In Ada.

Lib. 7. c. 11

Lib. 16. c. 15.

nus alio in loco, Arsenogonum & Thelygonum herbae sunt, inquit, habentes vvas oleæ floribus similes, pallidiores tamen, semen album papaveris modo. Thelygoni potu feminam concipi narrant. Arsenogonum ab eo semine oleæ, nec alio distat. Huius potu mares generari perhibentur, si credimus. Alij vtrumque ocimo simile tradunt. Arsenogoni autem semen geminum esse, restibus simile. Quibus verbis Plinius partim eadem quæ supra ex Dioscoride, partim diuicia ex Theophrasto genera designare videtur. Sic enim Theophrastus. *ὁ δὲ καὶ χαλκὸς φαλόν, τὸ μὲν ἀρσενόγονον, τὸ δὲ θηλυγόνον, διὰ τὸ δὲ ἀμφω, καὶ μετὰ τὸ ἕχοντα, αἰκίμα, ὃ δὲ χαλκὸς τῷ μὲν θηλυγόνῳ, καὶ τῷ ἀρσενίῳ βρῖον: ὡς ἑτέροις δὲ τῷ ἀρσενόγονῳ, ὅταν περὶ λαοὶ ὅπου ἀρτί φέρται ἐκ τῷ βρῖον, δάκρυον δὲ ὡς περὶ ὄρχεος ἀνθράκων.* Id est, Quare PhylloM aliud mariparum, aliud feminiparum vocant, similia ambo, & speciem habentia ocimi, fructus feminipari est instar oleæ florentis musci, tamen pallidior: Maripari verò instar oleæ iam primùm ex muscoso flore emergentis, & geminus, testiculorum hominis modo. Hinc suspicantur quidam duarum herbarum eandem & repetitam esse delineationem, quare Dioscoridis caput de phyllo irreptitium esse, alij minimè, sed utroque phyllo vtramque mercurialem marem & feminam exprimì. Alij ex diligenti peruestigatione & descriptionum collatione alia phylla adinuenerunt, Phyllumque thelygonum Dioscoridis esse, quod in saxis & rupibus apricis Allobrogum & Sequanorum, non aliter quàm muscus quidam innascitur, per aridam terræ squallidæ crustam: radicibus exilibus, breuib, & atris, serpendo huc illuc se spargens, magnùmque tandem spatium occupans: folia densissimè congesta, procul intuentibus nonnihil aizoum æmulantur similiter crassa, non tamen similiter acuminata, sed tanquam in summo retusa, oleæ similia, magis tamen virentia, in ambitu crenata, & notis candidis ad singulas incisuras signata, quæ humi iacent, & largè terram operiunt: caulis tenuis & plerumque humilis, nonnumquam procerior, ut terram nactus est, vel

Lib. 9. hist. cap. 9.

sicciores, vel humoris illapsu madidiorem, in tenuibus furculis: florem album, copiosum, violæ similem edit, suauiter olentem. Sapor totius plantæ aquosus est ac dulcis. Sunt qui semperuiuum montanum appellant. Quidam Lichenem primum Plinij esse arbitrantur, descriptum cap. 4. 26. foliis imis ad radicem latis:

PHYLLUM Thelygonum,
Matthioli.



PHYLLUM Arrhenogonum,
Dalechampi.



PHYLLUM Arrhenogonum
maius, Dalechampi.



caule vno, paruo: longis foliis dependentibus: qui cum melle tritus delet stigmata. Aliud Phyllum Thelygonum ostendit Matthiolus à Cortuso mistum, quod genuinum esse putat ad stipulantis notis omnibus. Quibus in locis Thelygonum, in iisdem reperitur & arrhenogonum, musci modo saxi hærens: radice pro plantæ habitu crassiuscula: foliis numerosis, minimis, in ea exiguitate oleæ similibus: flore luteo: fructu simili oleæ, quæ flore evanescente formari tantum incipit, & adhuc minutula est, in summo ferè gemino instar testiculorum hominis. Alterum Arrhenogonum hic appictum est, quod quidam maius vocant, ut à superiore discernatur, in Sequanis ad Sillij fluvij originem, haud procul à cœnobio Balmensi, in exigua & tenui terræ crusta proveniens, quæ nudos alioqui scopulos contegit: radice longiuscula, candida, paulatim gracilescente, fibrata: virgulas præternes huc illuc in orbem mittente, quibus aizoï modo, folia radiatim ex quibusdam veluti globosis

PHYLLOM *Arrhenogonum*
Theolygonon, Theophrasti.



bolis capitulis prodeuntia, stellæ au oculi figuram referunt, oblonga, carnosâ & crassiuscula, rigidis villis eorum margines ambientibus, & in circuitu præfixis, qui tractantium manus blandè pungunt ac vellicant: cauliculis dodrantalibus, nudis, teretibus: flore albo, fructu oleæ nascenti simili, ferè semper gemino, instar testiculorum hominis, semine minutulo. Sapor qualis Aizoi tatus & subausterus. Phyllum Theophrasti in aridis Monspelio vicinis agris frequens nascitur, notis ab eo traditis prorsus convenientibus: fruticosa planta: radicibus multis, fibratis: caulibus cubitalibus, hirsutis: foliis ocimi, lanuginosis, tactu mollibus: semine vel in racemosum pediculum congesto, vel gemino, testiculorum modo, non alièr quàm in mercurialis utroque genere: gravis tetèrque odor in tota planta nares offendit.

PHYTEUMA,

CAP. LXVI.



T *quædam* Græci, sic etiam Latini Phyteuma vocant, fortassè quòd ad amorem, gignendàmque proleth aptum sit, quod ad amatoria convenire nonnulli scriptum reliquerunt, ut tradit Dioscorides, atque ita describit: Folia habet sturhij, minora: copiosum semen,

Li. 4. cap.
Forma.

PHYTHEUMA, Matth.



perforatum: radicem parvam, tenuem, per summa terræ nitentem. Ex qua brevi descriptione difficile est certi aliquid de vero Phyteumate decernere. Matthioli scribit quibusdam Herbariis visum fuisse plantam hinc appictam Phyteumam esse: quæ nihil aliud est, quorundam sententia, quàm Campanula siue Cerujcaria Fuchsi; Thraehelioni *matris*, siue Vuularia Dodonæi, de quo & Trachelio minori diximus in libro de plantis. Quæ flore placent. Dodonæus, libro de Floribus, putat Campanulam hortensem à Matthiolo pingi pro Phyteumate. Sunt qui Phyteuma esse volunt plantam tenui radice, gracilibus fibris capillata, saporis & odoris, si teratur, acris & vehementis, caulibus multis, palmum altis: foliis propè radicem in orbem per humum sparsis, betæ primùm nascendi similibus, longioribus, per caules impari situ dispositis, priuatim singulis, non multis in vno pediculo hinc inde ordinatis, ut in Resedis: flore herbaceo, luteis apicibus decoro, in spicam

Cap. 4.
hult.
Li. 1. ca. 10.

denſam non coaceruato, ſed ex ſuperiore caulium parte exeunte, longis pediculis ſubnixo: ſemine in membranofis conceptaculis, amplis, quibus herbacea ſoliola ſex, ſtellatum diuiſa ſubſternuntur: florēt Maio. Aliud Phyteuma viſitur

PHYTEUMA *Quorundam,*

Dalechampij.



PHYTEUMA *Narbonen-*

ſum, Pena.



hodie, inquit Pena, in Gallorum provincie & Narbonæ oliuetis propè Monſpelium, effigie Valerianæ minimæ: verùm folia illi in imo infectotiz luteolæ ſunt, ſuperiora autem diuiſura & magnitudine puſillæ Valerianæ: pluſculi ſunt flores muſcoſi, albidī, oleæ: ſemina puſilla, & inſtar vnionum rotunda. ſed paululum compreſſa, veſtigium parui foraminis impreſſum habentia, incluſa folliculo Plinianæ Reſedæ, in cauliculis palmaribus & ſeſquipalmaribus, reptantibus. Radix exigua Valerianæ minimæ.

RESEDA

RESEDA,

CAP. LVII.

PLINIVS Resedæ herbæ meminit his verbis. Circa Ariminum nora Lib. 17. c. 11.
est herba, quam Resedam vocant. Discutit collectiones, inflammationēsq; omnes. Hanc nonnulli Herbarij esse opinati sunt quæ hic picta est, & Resedam luteam vocant. Radice est fibrata, minimi digiti crassitudine, intus lignosa, cortice crasso vestita, & saporis, & odoris, cum teritur, actis & validi, nasturtij aut raphani modo: caulibus multis, pedibus, angulosis: foliis cruxa fere instar diuisis: flore spicato, luteo, petquæ exiguo semine minutulo, copioso in membranosis folliculis, angulosis, in extremo tussis, ocellus & conniuentibus, non ut in phyteumate radiatim diductis. Hanc Resedam Pycnocomon quidam esse putauerunt, conueniente profectò & historia & facultate, si radix raphano similis, exiguum malum figura imitaretur cyclamini modo. Alia est Herbarius quibuldam Reseda candida, quam etiam nostro sæculo propè Ariminū rustici

RESEDA Lutea.



RESEDA Candida.



Resedam vocant. Radicis figura, odore, sapore superiori est similis, item caulium multitudine: folia simpliciora sunt, & simplicius diuisa, in vnoquoque pediculo plurima: flos in spica densissimè congestus, exiguus, è cinereo candicans: semen minutulum in vasculis oblongis, pariter ut & alterius angulosis, summo verticè non compressis, sed velut hiantibus & multifidis. Sponte nascitur in agris propè Ariminum: apud nos in hortis satum semine. Plinius de hac ita scribit. Qui curantea addunt hæc verba. Reseda morbos Reseda, scissine scissine, quis hic pullos egerit radices, nec pedes, nec caput habeant. Hæc ter dicunt, totiesque despuunt. Hæc Plinius. Quæ plena sunt plusquam anili superstitione.

MYCONVS medicus perdoctus plantam hanc misit ex Hispania, & Sucudum Auicennæ appellauit, tum quòd Mauritanii Valentini, qui Gandiæ oppidum incolunt, nomen id ad hæc vsque tempora seruant, Sugudum nominantes, tum quòd Gentilis Sucudum, filicem interpretatur, quæ interpretatio huic plantæ maximè conuenit, cuius folia filici mari persimilia sint. Planta est cubiti altitudine, multos & rectos ex radice proferens caules, quadratos, lignosos, geniculatos, qui in ramulos etiam geniculatos & quadratos sparguntur, aliquantulum hirsutos. Ex geniculis folia prodeunt, propè radicem maiora, caulium summitati propiora, minora, serrata, filicis maris æmula.

SVCVDVVS *Auicenna,*
Myconi.



L. 11. Scirp.
Hisp. c. 60.

In caulium fastigiis capitula sunt, ex purpureo cærulea, odorata, stœchadis Arabicæ capitula representantia. Radices ei multæ sunt, candidæ, lignosæ: semen minutum, candidum, planum, acerosum, insipidum. Nascitur in incultis, aridis, montosisq; locis. In hortis etiam colitur. Diu floret & in hortis præsertim toto anno. Herba est odorata, sapore cum acrimonia amaro, Græcis fortassè ignota, aut si nota fuerit, altera fuerit stœchadis species, id quod sapor, odor, vires eadem quæ stœchadis, demonstrant. Quam sententiam secutus Clusius Stœchadis alterius nomine pinxit & descripsit. Sucudus calefacit, auctore Auicenna, datur succus eius in potu aduersus dolores. Alphi illinitur, vlcera vetera ad cicatricem perducit, excrecentem carnem pulvis eius absumit, cum aceto podagræ imponitur, ex eo dulcibus, admistis fiunt eclegmata ad tussim, drachmi, duobus cum hydromelite bibitur ad cardiogmum: item duæ drachmæ cum hydromelite valent ad dysenteriam & difficultatem vri-næ: in pefso subditus menstrua ciet. Hæc Auicenna. Quæ omnia plantam hanc appictam præstare posse manifestæ eius qualitates satis probant.

SELAGO PLINII, SIVE CAMPHORATA,
CAP. LXIX.

L. 14. c. 11.



Lib. 1. c. 19.

SIMILIS herbæ Sabine est Selago appellata, inquit Plinius. Hanc contra omnem perniciem habendam prodidèrè Druidæ Gallorum, & contra omnia oculorum vitia fumum eius prodesse. Hanc Plinius Selaginem quidam esse volunt Ericæ prius genus, alij Hyssopum nemorosum, alij Chamæpeucen, alij Musci terrestris genus descripèrè à Trago, nomine Sabine siluestris, de quo tractauimus, libro De plantis quæ in vmbrosis, &c. maior pars herbariorum plantam hanc depictam, quam Monspelienfes Camphorata vocant, ob similem caphuræ odorem, quem trita vibrat, Selaginem vocat.

Locus.

Forma.

Arenosis & macris locis gaudet, in pinguib; tamen & humidis procerior fit. Radice est crassa, subnigra, caule cubitali, nonnunquam altiore, tereti: ramis multis, propè

SELAGO, Sive Camphorata.



propè radicē longioribus, quā propiores fastigio sunt, breuioribus opertis foliis, longis, angustis, Sabinæ aut Tamaricis æmulis: odore cū herba digitis friatur ac rumpitur, Camphoram referente: quam ob causam Camphoratam vocarunt, Officinis non prorsus neglectam, quòd in Martiari operosissimi medicamenti confectiōem à Nicolao Myrepsō descriptam admittatur: licet Græcorum Arabūve nullus, quod sciam, vires eius facultatēque tradiderit. Quidam Cneorum nigrum esse volunt.

CONYZA MONTANA,

CAP. LXX.



MYCONVS peritus Medicus & rei herbariæ studiosus, plantam hūc pictam à foliorum florumque forma, odore, sapore Conyzæ speciem esse iudicauit, & à natalibus montanam cognominauit. Nasçitur enim in saxosis, præruptis & montosis, præsertim inter saxorum rimas, radice lignosa, solida, intus candicante, foris nigrescente, minimi digiti crassitudine, gustu aliquantum adstringente, exsucca non minùs quàm suberis cortex. Ex hac stolones multi prodeunt, teretes, villosi, solidi, dodrantales, in quibus folia tenuia, hyssopi vulgaris, sed glutinosa Ledi modo, odore graui & viroso, & hircinum quid olente. In summo cauliculorum sunt stiloculi, soncho similes, luteoli, in pappos abeuntes. Gustu subamara est cum leui acrimonia, caput tentans. Floret Augusto maximè.

TRACHE



DE Trachelii aliis in libro de Plantis, Quæ flore placet, tractauimus. Nunc de Trachelio montano, quod in asperissimis montibus gignitur, radice nigra, superne crassa, in furculos inferne diuisa, fibris paucis capillata: foliis circa radicem multis, eam vndique cingentibus, longis anchusæ modo, hirsutis, caule vnico, paucis foliis vestito, alternatim dispositis: flore & semine reliquis Trachelii, figura coloræque similibus.

DORONICVM, CAP. LXXII.

DORONICVM Arabibus *Haronigi*, *Doronigi*, siue *Durungi*, dicitur. De Doronico vulgari siue Officinarum hic tractamus. Huius triplex differentia, non ita magna, imò potius varietas quædam à Pena assignatur, tribus Iconibus à Lobellio expressa. Primæ pusillæ caules teneri, folia molliuscula, oblonga vti plantaginis, nonnihil ex virente flauentia, perspicue hirsuta pilosellæ modo, siue cucumeris agrestis, sed attrectanti læuia, ambitu rotundo, nonnihil laciniato, & superne angusto, cucumeri agresti quàm Cyclamino similiore, ternæ vel quaternæ in pediculis enatis ex radice exigua terete, orbiculata, & sensim in angustum desinente, subtus & transversim quasi squamularum toruli: articulata, scorpionis cadaner & caudam exprimente, multum fibrata. Color illi candidus, sapor dulcis amaricat, & lentorem multum cum pauilla adstrictione coniunctum præfert. Caulis sesquipalmum altus: flores in summo fert luteolos, aut pallidos, radiatos, buphtalmi aut mediæ Consolidæ. Frequens nunc hæc in hortis Belgij, & prorsus eadem cum Doronico vulgari & minori Officinarum, quod in montibus reperitur, & collibus Pedemontanis, nonnullis etiam Franciæ. Secunda maiorem & multo longiorem radicem præfert, multis corticosis squamulis nitentibus, candidis, marmoreis, per transversum cinctam alam vtrinque vnam squallæ marinæ cancellive forcipulis non dissimilem, subdulcem gustantifolia, flores, & caulis maiora paulo & rotundiora. Umbrosis montibus gaudet, non solum Alpinois ad meridiem, sed etiam frigidis ad Septentrionem. Huic similis tertia, magnitudine tantum distans à Lobellio ex Dodonæo picta, dudum à nobis & picta & descripta. In umbrosis montium locis gignitur inter saxa & cautes, radice parua, candida,

DORONICVM *Mimus officinarum, Pena & Lob.*

DORONICVM *Brachiata*
radice, Aconitum Pardalian-
ches, Plinij, & Matth.



DORONICVM *Radice*
Scorpy figura, Dalech.



candida,geniculis velut articulata,fibris multis
vtrinq; donata serpentibus, Scorpion opti-
mè referente, ex cuius inferiore parte alia sub-
nascitur,quæ aliam similem procreat, tanta ra-
dicum in alijs procreandis fecunditate, vt in-
terdum plures duodecim cohareant folijs tri-
bus aut quatuor Melanio non dissimilibus,hir-
sutis,tactu mollibus,caule pedali,aliquot folio-
lis veitito : flore Chrysanthemi æmulo, & me-
dio velut disco,& orbiculato ambitu luteo. Ra-
dix tusa & cum axungia suilla mixta, scabiem
sanat, notissimo tusticis remedio. Dodonæus
Aconitum Pardalianches esse censet. Pena &
Lobellius, vt diximus, & multi alij Herbarij
Doronicum, Officinæ quoque passim Doroni-
nici vice, huius radicibus in compositionibus
vtuntur. Quod autem Arabes Doronicum di-
cunt,ab illo siue Aconito Pardalianche differt.
Nam Auicenna Doronigi calidum & siccum
in tertio gradu esse scribit,cui etiam assentitur
Serapio,Doronicum calidum & siccum in eod-
em gradu constituens, à quo temperamento
Doronici vulgaris, siue Aconiti Pardalianchis
radices multum absunt:nulla eniui acrimonia,
nulla amaritudo tanta, aut alia qualitas in iis
percipitur, quæ tam calidas esse & siccas de-
monstret,sed dulcis tantum sapor ignauior &
emplasticus,qui eas temperie niedia,aut ei pro-
ximas esse ostendit: quam ob causam medica-
mentis oculorum anodynus admisceat. Idem
Auicenna Aconito Pardalianchi, quod Stran-
gulatorem Leopardi vocat, seorsum alio in lo-
co suas vires ex Dioscoride & Theophrasto ad-
scribit. Matthiolus Doronicum secundo loco
pictum Aconitum Pardalianches Plinij facit.
Tertium yerò Doronicum vulgare à Cortuso
missum Aconitum Pardalianches minus, falsò
Doronicum, ab eodem Cortuso admonitus
Doronicum inter Aconita esse recensendum,
quod certò sciret sæpius factò à se periculo fa-
cilè extingui canes, qui huius radices deuora-
uerint: id quod etiam Matthiolus ipse expertus,
confirmat. Quare Doronicum istud tanquam
venenum execratur,& ex Officinis & Pharma-
copoliis omnibus eiiciendum censet. At Pena
Theophrasti, Dioscoridis, Plinij Thelypho-
num, Pardalianchen, Cammorum vnus huius

Li. 1. c. 109.
Cap. 315.
simpl.

Li. 1. c. 689.

Ca. 75. li. 4.

plantæ nomina diuersa putat, nec genere differre, sed Cyperorum ritu, magnitu-
dine tantum, situ, & numerosa radicum propagine, vt suprà declarauimus: alioqui
facies, sapor, odor omnibus idem, iudè que fermè natales. Doronico verò vim

*GLASTVM Montanum,
Dalechampi.**Locus.
Forma.*

inesse canes interficiendi non negat, sed respondet Aloë saluberrima, & amygdalis amaris vulpes necari etiam Plutarcho auctore: & nulli vnquam pernicioſa fuerunt quæ Doronicum recipiunt Electaria de Gemmis, de Aromatibus, Confectio de moscho dulcis, quibus frequētissimè vtuntur Medici. Qua de re & de Aconito fusiùs differemus in lib. de venenatis.

*GLASTVM MONTANVM,
CAP. LXXIII.*

GLASTVM montanum in niuosis verricibus montium gignitur, radice crassa, nigra, fibris multis capillaria: foliis circa radicem multis, longo, crassoq; pediculo subnixis, venosis, Glasto similibus, sed in summo magis obtusis: caulibus multis, pede altioribus, in quibus folia supradictis angustiora, & acutiora: flos copiosus in cauliũ verrice luteus nitet, oblongi valculi figura, supernè in cuspides diuisus, prominente ex eius medio sinu, tenui pilo.

MELANIVM MONTANVM, CAP. LXXIIII.

MELANIVM montanum in algidis montium verticibus prouenit, cauliculis multis, exilibus: foliolis multis, humi iacentibus: flore caruleo, duplo ampliore & maiore quàm in Melanio vulgari, rara quadà & eximia specie, si foliorũ exiguitatè cū inusitata floris magnitudine cõferas.

IASME Montana, CAP. LXXV.

PLANTAM hanc Iasmen montanam vocat ob eximiam odoris suauitatem, quæ Iasmini nostri flores æmulatur. In montiũ excelsorum iugis apud Rhætos crescit, radiculis breuib; subul-
teis, caule tres digitos

alto, hirsuto, nudo, simplici: foliis propè radicem multis, Aizooferè similibus, in orbem humi stratis, villosis: sum-
mum caulem foliola quatuor vel quinque coronant, è quorum medio flores emicant partim albi, partim puniceï, gratissimum odorem spirantes. Candidum principio florem æstate rubescere compertum est.

*Locus.
Forma.*

PERSICARIA SILIVATA,
CAP. LXXVI.

IN montibus & collibus asperioribus Germaniæ & Sabaudix gignitur, à Belgis in hortis colitur herba, quam Germani *Sprimickraut* vocant, quasi erupticem siue salientem, aut subsilientem herbam dicas, propter siliquam quæ teres, gracilis, longa, pendula, chelidoniij, semina parua, rotunda, balsaminæ foeminæ claudit, quibus turgēt, simul ac tantillum tangitur, in vultum proximi cuiusque quasi impetu vindicabunda, & se tangi queribunda, excludit. Idcirco, Noli me tangere vulgus Herbariorum vocat. Qua nota & nomine iam diu notissima est. Virgulta, folia, faciēsque ipsa Balsaminem, Mercurialem & Amaranthum expriment. Quare cauendum ne quis Mercurialem putet, neque eam in eisdem vsus colligat.

Locus.

Forma.

OSTEOCOLLVM HIEROCLIS ET ABSTRTI,
CAP. LXVII.

OSTEOCOLLON in mœnibus & faxis propè Sedunum Valestorum caput nascitur, ac dependet, radice candicāte, graminis instar geniculata, tenuibus fibris capillata, è geniculis & internodiis exorientibus ramulis permultis, pensilibus, iunci modo læuibus, tetetibus, sed geniculis distinctis, citrosus, tenuiوتي procerioriq; sparto similibus, perpetuò virentibus, nullo folio vestitis: flore in aceruum spicatum cōgesto, è fusco nigricante, ex cauliculorum articulis prodeunt, petiolo subnixo. Quidam Polygonium, alij Talcution, alij Symphytum vocant. Osteocollon quidem, quod fracta ossa ferrumina: Symphytum, quod dissectæ carnes coalescere: vulgus credat, si coquatur vnâ, efficacissima enim glutinandi facultate partium diuortia committere, & separata cogere. Viridem eruunt, vino coquūt, dum super sit liquoris pars tertia. Decocto veterina salinant Hispani, co medicamine morbos arcētes, & à vitis quæ

imminent, asserentes: tum etiam si quid intus ruprum esse suspiciātur, ab hac auxilium petentes. Hæc Abstertus & Hierocles memoriæ prodiderunt.



VCVLLATA, seu, vt quidam volunt, Crias Apuleij, altissimis & niuosis montibus gaudet: è saxis prosilit, riuulo quopiam præterhucnte madentibus, radiculis multis, perquam tenuibus, nigris, breuib; folijs propè radicem multis, læuib; crassis, in ambitu minimè crenatis, nec venosis, betz nascenti similibus, gustu amaris, priusquàm sese explicent alabastrimodo candicantibus, cùm sese explicuerunt, lætiùs & nitidiùs virentibus: cauliculis quinque aut sex, teretibus, nudis, subrubentibus, præsertim superiore parte: flore nunc albo, nunc purpureo, vertici caulium velut affixo, in singulis cauliculis vnico, figura quadam rara & eximia, colorisq; iucundissimi: semine minutulo in capitulis paruis, fastigiatis, angulosis. Floret Iunio, etiam antequàm niuib; liquaris montium cacumina detecta appareant. De Criade hæc prodidit Apuleius. Crias nascitur in Lucania: marmoris albi colorem habet, quatuor rubicundis

ornata cauliculis. Radix pista & promalagmate imposita, tertio die curat ischiadicos: eadem trita & imposita locis dolore affectis, quosuis dolores sanat.

SCORZONERA,

CAP. LXXIX.

Nomen



Iæci barbæ congener est herba, quam *Scorzoneram*, aut *Scorzoneram* appellat Hispania, quod Latine Viperinam siue Viperariam, aut Serpentariam sonat: sic dicta, quòd contra venena viperarum ac serpentum efficax habeatur: nam Hispani Viperam *Sorzo* vocant. Noua

Causa

hæc est planta, vt refert Matthi. inuenta primùm in Catalonia Hispaniæ à quodam seruo Aphro, à Ceruero Leridano pretio empto. Cùm enim quidam messores in agro à viperis demorsi fuissent, is qui in Africa plantam istam nouerat, propinato eius succo incolumes seruabat omnes, quòtque demorsi fuissent. Sed nemini plantam ostendebat, ne lucro fraudaretur. Tandem cum vafri homines locum obsensassent ex quo plantâ deferebat, illuc profecti eam nacti sunt, inuentis nuper rescissæ herbæ reliquiis. Ea eruta, factoque ipsius periculo euulgata res est, & Scorzoneram appellarunt. Hanc siccam primùm ad se missam fuisse, ait Matthiolum à Ioanne Odorico Medico paulò post viridem, viuentemque se vidisse ad Cæsarem Ferdinandum ex Hispania delatam: non multò post tempore copiosam quoque in Bohemia se comperisse Doctoris Riberæ Medici diligentia, in monte quodam siluoso vliginosoque, non longè à Poggebroth. Folia edit spithamæ longitudine, succiffe æmula, sed longiora, subcandida, carnosâ, acuminata, quæ solo propiora longo pressoque pediculo à radice prodeunt, humiq; accubant, quorum nonnulla leuiter sinuata spectantur. Caulem fert sesquidrantalem sæpè maiorem, rotundum, geniculatum, in quo folia breuiora angustioraq;: flores aureos, hirci barbæ proximos, vt alterum ab altero vix dignoscas. Hi flaccescentes in papposum mutantur orbem, in quo semen continetur album, longum, hirci barbæ semini

Forma

semini simile. Radix subest sesquidrantalis, pollicari crassitudine, raris adnatis
fibris, cortice subnigricante, vegeta, tenera, fractu facilis, succosa, alba intus pul-
pa, lacteo succo prægnans, dulcis, & gustatu iucunda. Nascitur in silvis & vligi-
nolis locis atque obscuris Hispaniæ. Nascitur & in Germania, Thuringia, ac

SCORZONERA

Hispanica, Math.



SCORZONERA

Boemica, Math.



Bohemia in silvis ac montibus humentibus. Flos in Hispania Maio mense præ-
dit, in Germania ferius, Iunio, videlicet ac Iulio mensibus. Foliorum aut radicis
succus datur præsentaneo remedio potandus aduersus viperarum, cæterorumq;
venenatorum animalium ictus: quinetiam ad quoscunque pestiferos morbos.

Tempus.

Deuorata radix quotidie pestilentiaæ contagia arcet, & venenis quibus-
cumque resistit. Datur eadem aut eius succus vtiliter quoque comi-
tialibus. Item cardiacis, vertiginosis, & animi deliquiis cordisq;
tremori obnoxii. Commanducata per se radix tristitiam
discutit, hilaritatẽque conciliat. Lacteus eius
succus oculorum aciem acuit. Denique
tota planta magni est ad
omnia vsus.

Vires.

HISTORIAE

OMNIVM PLANTARVM

LIBER VNDECIMVS,

643

Qui plantas omnes, quæ in Umbrosis, Vdis, vliginosis & pinguibus locis promeniunt, exactè & ad viuum representat.

ADIANTVM, CAP. I.



T FIDEM nostram liberemus, stirpium quæ locis palustribus lacustribusq; proximis gignuntur, nempe vdis vliginosisq; ac pinguibus, item vmbrosis, natura hic explicanda. Sunt autem quàm plurimæ: quare iis in locis paulò diutiùs immorari necesse fuerit. Quod si quædam libro superiore reperientur, quæ aptius hic collocari possent, aut contra, id nemini absurdum, aut mirũ videri debet: quod non solum nataliũ, sed foliorum aut cuiusvis alterius partis, aut virium, aut quouis alia similitudo, atq; affinitas proximas quasq; sibi adiungat atq; adfiscat. Hic verò vt in aliis, ab iis quæ notiores sunt, & magis vulgares exordiemur. Primũ à celeberrimo illo, & omnibus Officinis nomine porius quàm

ADIANTVM, Match.

Nemina

Lib. 7. cap.

Lib. 7. cap.

In Thera.



Clad. hist.

re, præterquàm in Narbonensi regione, non solum Capillo veneris, sic etiam à Latinis, Apuleio recte, nominato: qui à Græcis vocatur ἀδίατον, quod è δίατον, idest, quòd in aqua non madescat, vel, vt Theophrastus ait, è δία τῆς ἕρξης (δία τῆς ἕρξης, idest, quòd in aqua non madescat, vel, vt Theophrastus ait, è δία τῆς ἕρξης). Quæ Plinius sic reddidit. Aliud Adiantum miraculum: ætate viret, bruma non marcescit: aquas respuit, perfusum mersumve siccò simile est. Tanta dissociatio deprehenditur: vnde & nomen à Græcis. Nicander non ἀδίατον dictum significat, quòd in aqua mersum ac irrigatum, immadidum non permaneât, quasi verò longiore mora in aqua æquè ac aliæ herbæ non madescat: sed quòd imbris è czlo descendentis stillicidia foliis eius non insideant.

Ἀδίατον τὸ ἀδίατον, ὃ ἐκ ὑμετέρου παρὰ τὸν

Ἀντιόχου τῆς ἐν τῇ ὁδοῦ τῆς ἀντιόχου ἐστὶν.

Impollurũ Adiantũ, quod densò imbre cadet. Destillans renuis solus non insidet humor.

Vel quòd Fuchsiõ magis placet, ab interioribus putecorum

per eorum parietibus, & fontium marginibus, quas coronat, dictū est Adiantum, quod nimirum quasi sitiens illorum aquas, quas tamen odit & respicit, quatrat. Polytrichon autem, quasi mulcriconum, quod capillos multos ac densos faciat, eorumque defluvia expleat. Callitrichon verò, quasi pulchricomum, quod capillos tingat, pulchriorēque reddat. Nec alia ratione capillus veneris hæc herba dicta est, quam à speciosis reddendis capillis nec alio nomine Veneris vox adiecta est, quin quod hæc pulchricoma pingatur. Plinius, Adianton quidam Callitrichon vocant, alij polytrichon, vtrunque ab effectu, tingit enim capillum: & ad hoc decoquitur in vino cum semine apij, adiecto oleo copiose, vt crispum densumque faciat: defluere autem prohibet. Hæc Plinius. Latine Cincinalis, Teriæ capillus, Supercilium terræ, Crinira, Arabibus *Bergermafen*, seu *Bersaufan*, *Culbare albi*. Gallicè *Chenue de venus*, Germanicè *franwenhar*, Hispanicè *Callantrillo de pozo*. Theophrastus scribit esse γένος ἀνθῶ ἀδινῶν εἰς τὸ μέγαν λεῖψαν, τὸ δὲ μέγαν γένος οὐκ ἀνθῶν ἀδινῶν ἀποκαλεῖται. ἴσχυον, ἢ ἰσχυρὸν τριχόμανα, φύει δὲ ὁ μέγας πρὸς τὴν ὑπὸ τῷ ὄρει. Id est, Gaza interprete Genera adianti duo, candidum, atque nigrum. Ambo ad defluum capillum vtilia, oleo tria. Nascuntur maximè locis humidis. Quæ Plinius conuicere voluisse, sed Theophrasti sensum assecutus non fuisse videtur. Duo, inquit, eius (adianti) genera candidius, & nigrum, breuiusque. Id quod maius est polytrichon: aliud trichomanes vocant. Vtrique ramuli nigro colore nitent, foliis filicis, ex quibus inferiora aspera ac fusca sunt, omnia autem contrariis pediculis densa inter seæ aduerst: radix nulla. Vmbrosas petras, parietumque aspergines, ac fontium maximè specus sequitur, & saxa manantia, quod miremur, cum aquas non sentiat. Quibus verbis perspicuè declarat Plinius se trichomanes alterum facere adianti genus, scilicet candidum. At Theophrastus cum de vtroque Adianti genere dixisset, eo quem modò citauimus loco, subiicit de trichomane, diuersa planta quæ sequuntur. ἆς δὲ θύονταί τινες, καὶ πρὸς τρυγανέω τὸ τερχόμανος ποτὶ. ἔχει δὲ τὴν ἑσπέρην ὅμοιον ἀδινῶν τῷ μέγαν, φάλας ὁ μέγας σφίλτρα, καὶ πικρὰ, καὶ τριφύλλα καὶ τριφύλλα ἀλλήλων, ἢ ἑκατέρωθεν ὑπὸ τῷ χυμῷ δὲ ποτὶ σκῆρα. Id est, Trichomanes vrinæ stillicidiis confert, caulem similem haber adiantro nigro: folia parua admodum & densa, & ex aduerso opposita, radix nulla subest. Opacis locis gaudet. Hic Theophrasto trichomanes Adianti genus non est, sed sui generis planta, præterea cum dicit cauliculos habere adiantro nigro similes, appetè demonstrat trichomanes Adiantum candidum non esse. Matthioli credidit aliquando, Adiantum candidum eam esse plantam, quæ vulgò salvia vita, & suta muraria vocatur, quæ cum trichomane in petris, parietum ac fontium asperginibus nascitur. Deinde mutata sententia eam paronychiam Dioscor. fecit, de qua paulò post dicemus. Alij, quorum potior sententia, Adiantum nigrum & album Theophrasti siue Plinij, putant esse duas hæc Adianti differēcias, quibus omnes Belgij, Germaniæ, Burgundix, Franciæ & Sabaudix Officinæ, non solum hoc tempore, sed omni ferè hominum memoria semper nigri & albi Adianti nomine vsi sunt. His radix pusilla, capillamentis densis compacta, nigris, rectis: cauliculi iuncea, paulò crassiores & prolixiores quàm trichomane, ex herbido pallentes, aut albicantes: foliola vtrinque & altriusculus planarum distata, filicis maris diuisura, & situ, sed multò minor, altera facie virentia, altera in glauco punctulis rubescentibus notata, series geminas habent, sesquipalmum, aut paulò magis alta, quæ nihil planè differunt, nisi quod nigro adiantro cauliculi nigrescant polliore nitore, foliaque sunt saturatiore virore, albo minis. Vires prorsus eadem, à doctis quamplurimis multis annis exploratæ ad quotidiana: nas & consuetas poriones, magno commodo, nullo detrimento, vt eos errare hinc perspicuum sit, qui filicis maris species, aut dryopteris esse autumant, cum nihil calidi, aut acris, nedum septicæ hæc temperatæ & innoxie capillates habeant. Sed vt

Lib. 11. cap. 13.

Lib. 7. bull. 1. cap. 13. Genera.

Lib. 11. cap. 13.

In cap. 13. lib. 4.

Pet. Pe. 13. Ad.

Adiant. alb. & nigr. Forma.

Adian. Ve-
rom.
Forma.

Loco.

Vires.

Lib. 4. c. 11.

Lib. 21. c. 11.

Lib. 6. f. m.

ad verum Dioscoridis Adiantum redeat oratio, id, eodem auctore, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa, cauliculi quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, palmum alti: radice superuacua, neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Vmbrosis & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur. Ex qua descriptione liquet, neque saluiam vitam, neque Adiantum nigrum, aut album Officinatum, verum esse Dioscoridis Adiantum, sed id quod hic pinximus. Fibris prætenuibus, capillaribus, nigris nititur, compactis, vnde prodeunt numerosi cauliculi, iuncea, valde tenues, veluti cincinni, palmum aut sesquipalmum alti, sericeo colore & nigro nitentes. Folia anisi vel coriandri diuisura, latiuscula, alterno situ tenuissimis pediculis appensa, tenella, vtrinque lateribus rectis clausa, trianguli specie, sed superiore ambitu laciniato & circinato. Hoc est verum Dioscoridis Adiantum, nullibi quàm Narbonensi regioni frequentius: faxis riguis, vmbrosis, petrosisque locis in cemenis illic montibus finitimis, ac rupium, fontium & puteorum labris vel asperginibus Monspelij, Nemausi, raro alibi in Gallia, Germania, Belgio, Anglia, aut nusquam prouenit, quin ne Italix quidem multis locis. Quare ex supradictis locis Lugdunum, Lutetiam, Antuerpiam, & in alia celebriora emporia asportatur, caroque à seplasiensis emittitur ad Syrupi capilli veneris dicti apparatus. Eundem syrupum Galliz ditiores & aulici quotannis Monspelij sibi conficiendum curant, indeque adferendum, quo recentiore ac præfentiore vrantur. Mirum enim quantum thoracis affectus, hepatis, renumque iuuat, quas vires cum pluribus aliis insignibus, Dioscorides assignat his verbis. Decoctum herbe potum prodest spirandi difficultati, suspensiosis, lieni, & felle suffusus, & vrinx difficili, calculos frangit, aluum sistit, serpentium morsibus auxilio est, contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet & menstrua, sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit: furfures & manantia capitis vlcera ex lixiuio emendat: defluentes capillos continet cum ladano & myrtino, & susino aut hyllopo (sic enim vulgare habent exemplaria, *χρὴ συσίνῃ ἢ ὑλποῦρου*, vt & Ruelius conuertit, sed in vetere rectius legitur, *συσίνῃ ἢ ὑλποῦρου*, quod est, susino, aut celypo) vinoque. Decoctum eius cum lixiuio & vino insusum idem præstat. Cornucines & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia vtillaritis pecorum circa ouilia. Eadem serè de Adiantis suis scripsit Plinius. Calculos è corpore mirè pellit, frangitque vtique nigrum. Qua de causa potius quàm quod in faxis nasceretur, à nostris saxifragum appellatum crediderim. Bibitur è vino quantum terni decerpere digiti. Vrinam ciet. Serpentium & araneorum venenis resistunt. In vino decocti aluum sistunt. Capitis dolores corona ex his sedat. Contra scolopendræ morsus illinuntur, crebro auferendi, ne pereant hoc & in alopeciis. Strumas discutunt, furfuresque in facie, & capitis manantia vlcera. Decoctum ex his prodest suspensiosis & iocinori, & lieni, & felle suffusus, & hydropicis. Strangurix illinuntur, & renibus cum absinthio. Secundas ciet & menstrua. Sanguinem sistunt ex aceto, aut rubi succo poti. Infantes quoque exulcerati perunguntur ex iis cum rosaceo & vino prius. Folium in vrina pueri impubis, tritum quidem cum aphronitro, & illitum ventri mulierum, ne rugosus fiat, præstare dicitur. Perdices & gallinaceos pugnaciores fieri putant, in cibum eorum additis, pecoribusque esse vtilissimos. Sed breuius & distinctius de his Galenus. Adiantum in caliditate symmetrum est. Verum desiccatur & extenuatur, & digerit. Etenim caput ex alopecia glabrum capillis conuestit, & strumas & abscessus digerit, lapidesque frangit epotum, & viscosorum crassorumque è pectore pulmonisque excreationibus non mediocriter confert, & ventris profluuium sistit: non tamen vllam manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsum

quispiam

quodammodo secundum hanc oppositionem & temperiem in ordine medio. Mefues etiam ad hanc temperiem & vires insanes recenset, inter quas & vim purgatoriam et tribuit, Graeci vero & Plinius nullam. Illius haec sunt verba. Capillus veneris temperatus est, aut temperato proximus. Constat substantia aquea & terrea, sed terrea modice, eaque styptica, altera verò superficialia, calida tenui admodum, ob quam virtus eius facile resolvitur quia virtus imbecilla à subiecto imbecillo promptè dissipatur. Hac autem tenuant, obstruata aperiant, digerunt, ventrem solvunt, praesertim recentes: sicci enim constringendo fluxum sistunt, bilem verò flauam & picuam ventre toto & hepate, humoresque crassos quatuorvis imbibito etiam ex thorace & pulmone secreta educunt, respirationem ob id liberam efficiunt, sanguinem clarum reddunt, & inde colorem commendant, & parium praedictarum dolorem leniunt, obstructions hepatis ac lienis tollunt. Ob id ictero & morbis omnibus obstructionem sequentibus infusi, praesertim in aqua apij & intybi, aut decocto cicero nigrorum, aut semiquatuor, aut sero lactis. Cum oleo autem chamomelino strumas delent. Syrupus ex his pleuritidis, peripneumoniarum prodest. Vrinam movet: decoctum eorum calculum frangit: purgat vterum à partu. Parte vero styptica fluxiones cohibet, sanguinem sistit, ventriculum & ventrem roborat, ne excrementa promptè recipiant, roborat etiam capillorum radices, ob id eorum defluuium sistit: quinetiam parrem pilis replet, praesertim cum oleo myrtino, aut oleo ladani, & vino styptico. Idem praestat pulvis eorum vstorum: cinis ipsorum vel decoctum ex vino tursures lotionem abigit, fistulas lacrymantes sanat. Imbecillitatem eorum in purgando corrigunt violæ, cassia fistula, manna, serum lactis, parum sustinent decoctionem. Meliores bene habiti, foliis virentibus: strigosi enim & foliis flavescentibus inutiles. Datur decocti ad aluum subducendam libra vna.

Lib. Simp.
parz.

TRICHOMANES, CAP. II.



TRICHOMANES Græcè, Latine etiam trichomanes dicitur, & capillaris, à Gaza filicula, Officinis Polytrichum, quod nomen est adianti herbæ Dioscoridis, & veterum aliorum testimonio, Gallicè *Polytrich*, Germanicè *Pulderrot*, & *Aluham*. Trichomanes autem Græci à vi sua vocaverunt, quòd rara cune fluentem capillū explet, & subnasci facit. *parva* enim illi rarum vocant, & *rex* à capillum. Hoc etiam nomine capillarem Latini dixerunt. Nascitur, inquit Dioscorides, uside in locis quibus adiantum, filici simile, sed exilis: foliis lenticula, tenuibus, acerbis, fusco colore splendentibus.

Nomina

Lib. 4. c. 12
Locus.
Forma.

Quæ descriptio aperte demonstrat herbam hodie Officinis ubique omnibus polytrichi nomine non minùs vnitatam quàm cognitam, verum esse Dioscoridis & veterum trichomanes, radice parva, fibris nigricantibus comante, à qua penè statim foliati cauliculi iuncea prodeunt, nigri, nitidi, rigidiusculi, gemina utrinque foliorum serie, quæ rotunda sunt, & lenticulæ figura, ex atro aduersa parte virentia, aversa maculis ferrugineis notata, rure murarie ritu, sine flore, sine semine. Palustribus & umbrosis locis vberissimum, humentibus muris & saxis, & fontium

specibus

POLYTRICHVM Aureum
maius & minus.

Polytr. Au-
reū. Fuch.
cap. 40.
Dodo. lib.
p. cap. 72.

Nomina

Genera.

Forma.



Locus. in summo capitula lentis aquaticæ ferè forma, eiusdem cum cauliculis coloris. Minus superiorem prorsus simile, nisi quod omnibus partibus est minoribus. Maius nascitur in pratis humidis, & viginosis, minus in petris ac muris humidis. **Tempus.** Iulio vtrumque reperitur. In caliditate & frigiditate symmetra sunt: desiccant tamen, extenuant & digerunt. **Temper.** Decoctum vtriusque in aqua aut lixiuo, capillorum radices firmat, ideòque in alopecia caput glabrum capillis vestit, potum viscosorum crassorumque è thorace pulmoneque excreationibus non mediocriter confert, lapides frangit & urinas ducit, morbo regio correptis, & lienosis auxiliatur: strumas discutit, denique eadem quæ adiantum præstat. Recentiores vana superstitione ducti multa & incredibilia illis tribuunt. His ob magnam cum capillaribus

ROS SOLIS, Dodon.

Dodo. lib.
p. cap. 71.
Pet. Pen.
in Ad.
Nomina



affinitatem adiungenda herbula, admirandis viribus, multis plantis apud antiquos celeberrimis proculdubio præferenda, quibus fortassè ignota fuit. Ros solis & Rorella herbariis dicitur, Germanis *Sondau*, Gallis *Roufee de soleil*, à mirabili natura nomen adepta, quantumvis diu sol feruidus æstare eam illustret, eius tamen folia semper rore & humiditate madent, eorumque lanugo guttulis aspersa manet. Et quantò sol feruidior, tantò magis humiditatem eius augere & fouere videtur, tantum abest vt exhauriat. Radice est fibrata, foliis rubescentibus, in rotunditate oblongis, hirsutis, cauis, pusilli cochlearis, aut auriscalpij instar, inter quæ proueniunt cauliculi, ternos, quaternosve digitos longi, rubescentes, in summitate inflexi, candidos flosculos gerentes. Sabulosis & vdis scrobibus gaudet, aliquando vmbrosis siluis. Totius gustus acris est, subadstringens, nonnihil acidus, & acerbus, admodum resiccās. Herbulæ hæc corpus tabescens roborat, ad salix pietuitæ decubitus in pulmones efficacissima. Quare eorum vlcera sanat. Aqua ex foliis & flosculis destillata, quæ fulua auteaq; est, propina tur phthisicis, asthmaticis, tussiculosis, aut quouis alio pulmonū vizio laborantibus.

RUTA

RUTA MYRARIA, Paronychia, CAP. III.

Nomina

A MEDICIS & pharmacopœis exercitatoribus in capillarium numero, & iure quidem habetur, quæ vulgò Salvia vita dicitur, petiti-
 ribus muralis siue muraria Ruta, ob quandam foliorum similitudinē,
 & quod albicet pallido colore Rutaceo, Gallicè *Rue de mur*, & *Sauve*
vie Germanicè *Maurauten*, & *Steinrauten*, Belgicè *Steinruyt*, id est, petra Ruta.

SALVIA VITA.



Forma.

Locus.

Temper.

suppetit. Gustum consulentibus eodem quo ceteræ capillares temperamento esse videbitur, quæ re moti petiti viri in veri adianti inopia, ad pectoris & pulmonum

PARONYCHIA Altera,
 Matthioli.



Matth. in
 Cap. 49.
 lib. 4.

Ibid.
 Paronych.

Lib. 4. c. 49

Ibid.
 Forma.

Quibus enim locis verus capillus veneris, aut ceteræ capillares defunt, aut aliunde asportatæ, vietæ redditæ sunt, Salvia vita viuntur, certissimo felicissimoq; euentu. Sunt qui ab effectu inter saxifragas recenseant, & ob natales empetron vocent. Radice est nigra, tenera capillata, superuacua: cauliculis siue iuncis tenuibus, non ita dissimilibus adianti, nisi quod atro colore non nitent, tenuibus & breuib; pediculis foliola hærent, quadantenus rutæ hortensis similia, minora tamen & parùm crenata, aduersâ parte læuia, auersâ punctis quibusdã notata. Hæc etiam folia adianti nõ parùm referunt, sed minora huic, crassiora, & incisuris pluribus atque altioribus: sine caule, sine flore sine semine, vti ceteræ capillares. Vetusis parietibus, humentibus, & inter ceterach, polytrichum, ceterasq; capillares, locis saxeis lubens provenit: nec solum Vere & æstate, sed etiam autumnò & hyeme eius copia. Mattheus in Cap. 49. lib. 4. Ibid. Paronych. Lib. 4. c. 49 Ibid. Forma.

Forma.

PARONYCHIA *Alfines-*
*folia, Lobellij.*Paronych.
Lonic.To.
2. cap. 74.

Nomina

Forma.



nuntur, succulenta, pallida, subrubra: flores albi: semina parua in folliculis Scorpioi-
dis myosotidis non disparibus. Vtraq; ex eunte hyeme, Vere primo flosculos edunt:
Vires. deinde minimo æstu marcescunt, vt nusquã toto anno cõpareant. Hæc Pena. Pato-

PARONYCHIA *Altera, rutaceo*
folio, Lobellij.

Lib. 3. 6m.



partium, & exsiccatiora morsu vacans: talia enim
sunt oportet, quæ Paronychias sanant. Porro satis
constat tale esse idoncum ad digerendos affectus
omnes qui digeti postulant: talia enim sunt
quæ cum ex tertio sint ordine exsiccantium
& desiccantium, velut & hoc, essentia in super
subtilis sint.

nychia, inquit
Dioscorides, il-
lita Paronychias
atq; fauis reme-
dio est. Similiter
Galenus Parony-
chia, inquit, ab
effectu nomi-
nata est, sanat
enim Parony-
chias, & vt re-
fert Dioscorus
fauos quoque. Vis
eius est tenuium

tentiam nec probat, nec improbat. Habet hæc
folia peplo longiora, flores paruos, copiosos, ra-
cematim coherentes, albos. Paronychias aliam
representat Lonicerus, quæ dicitur alias Luna-
ria Italica, quod noctu folia eius luceant, Italica
verò ad differentiam alterius Lunaria Germanica.
Illi lunaria descriptionem Dioscoridis
non admodum repugnare scribit. Nascentur enim
locis saxosis, foliis peplo, sed maioribus, & aliquan-
tum incisissimis, noctu lucentibus: floræ fert luteum,
quadrifolium, paruum: radicem hirsutam. Planta
est odorata. Paronychias alias pictas dedit Lo-
bellius, prior est pusilla planta Alfines figura,
raris foliis, alfines vel lenticulæ, sed ad imum cau-
liculæ dodrantalem, albidum, admodum exilem,
humistrata & maiuscula sunt. In summo floscu-
li candidi & folliculi minimi Thlaspi pares, sed
compressi & foliacei, gustu aliquantulum acri.
In tectis & parietinis reperitur. Altera etiam in
parietinis locisq; vmbrosis & petrosis cum su-
periore nascitur, cauliculis dodrantalibus, cras-
siusculis: foliola rutæ bifida, interdum trifida in-
cisura, eademq; magnitudine quadrantenus cer-
nuntur, succulenta, pallida, subrubra: flores albi: semina parua in folliculis Scorpioi-
dis myosotidis non disparibus. Vtraq; ex eunte hyeme, Vere primo flosculos edunt:
Vires. deinde minimo æstu marcescunt, vt nusquã toto anno cõpareant. Hæc Pena. Pato-

MEDICA SILVESTRIS
Altera, Lunetæ.

ASPLE

ASPLENV M, CAP. 1111.



ΣΠΑΗΝΟΝ quod splenē iuuat, Græcis dicitur, & σπληνίτιον, *Nemina*
& σπληνός, & ἡσπίνος, Theophrasto ἡσπίνος, & ἡλίου, non ἡλίου, ut in
vulgatis codicibus legitur, Latinis similiter Asplenum, & scolopendrium,
Gæzæ Mula, Mauritanis scolofendrium, scolofendrium, Officinis Ce-
rach, Italis Aspleno, Scolopendria, & Herba inodolata, Hispanis Doradillo,

ASPLENV M.

Gallis *Cetrac.* Asplenū, inquit Dioscorides, fo-
liis est multis. scolopendrac animali similibus, *Forma.*

ab radice vna prodeuntibus. Nascitur in parie- *Locus.*

tibus, saxifq; filiceis & opacis, nec caulem, nec
florem, nec semen habet, folia filiculæ modo
dividuntur. subter flauiscentia, hirsuta, supernè

videtur, et notae nascuntur, similesque sunt
viridae. Plinius. Apilenum sunt qui hemionum
vocat, foliis trientalibus, multis, radice limosa,
cauernosa sicut filicis, candida, hirsuta nec cau-
lem, nec semen, nec florem habet. Nascitur in
perris, in creta. Theophrastus. *ἡμεῖς τὴν ἡμεῖς φέρ-* Lib. 2.

ἀνὴρ σκαλὸς καὶ δόλιος (sic vulgati codices habent, sed cap. 19.

verum esse Dioscoridis & aliorum veterum Asplenum siue scolopēdrium, suscribente etiam peritiorum huiusce temporis herbariorum iudicio, contra maiorum nostrorum tum medicorum, tum pharmacopœorum perniciam, qui phyllitini siue linguam ceruinam vulgò dictam, verum scolopendrium esse credebant, eamq; aspleni vice medicamentis immiscebant. Sunt præterea qui contendunt *ceterach* Asplenum non esse, quòd eius folia Dioscoridi. polypodij foliis conferat, quæ sunt illis planè dissimilia. At is illa scolopendræ, non polypodij similia dixit, sed *ὡστὶς ἴσμεν* esse ait, *ὡς τὸ πῦ πολυπόδιον*, id est, incisa vt polypodij folia, quod præcipuè in eo polypodio cernitur, quod in mōtibus prouenit, cuius folia foliis *ceterach* sunt perquam simillima, nisi quòd paulò ampliora. Ad hæc Asplenum à scolopendrio differentum esse aiunt auctoritate Galeni freti, sic scribentis. Nam quæ maiores sunt lienis obstruções vehementiora desiderant, nempe capparis corticem, radices tamaricis, scolopendrium & scillam, & eam quæ idipsum nomine representat Asplenum appellaram. Quibus respondet Matthiolus deprauatum hunc esse Galeni locum, & præter eius sententiam nimia scioli cuiusdam diligentia, vocem scolopendrium in contextum irrepsisse: quo niam sequentibus libris, in quibus de simpl. medicamentorum quæ nouerat, facultatibus differit, nusquam scolopēdrii, sed Aspleni tantum meminit, aut, quod verius fuerit, scolopendrii aut Aspleni nomine hemionitium intelligit, vt ipsemet testatur, cum recenset pharmaca ab Andromacho conscripta, quæ splenicis opem ferunt, hemionitis à veterum quibusdam Asplenū, ab aliis scolopendrium nominata est. Quare nihil mirum si Galenus illo loco As-

Lib. 4. sim.
cap. 12.

In cap. 134.
lib. 4.

Lib. 9. c6.
polphas.
loc. cap 1.

plenum vel scolopendrium pro hemionitide vsurpauerit, cum præferri hæc vi-
lienem absumendi prædita sit, vt paulò post dicitur. Cererach quibus locis nasca-
tur diximus. Præstantissimum in Creta, & ibi repertum Vitruius assestmat, circa
Poreum amnem, qui duas vrbes Gnoson & Corryn timerit, parte quæ ad
Corryn timerit spectat pecoribus sine liene inuenitis, quia herbam eam roderent. Ex al-
tera parte quæ ad Gnoson est, lienem habentibus, quia ibi herba illa non appareat.

Vires.

Lib. 2. cap. 14.

Tota hyeme viret. Vinum habent folia, auctore Dioscoride, in aceto seruata, vt per
dies quadraginta pota lienem absumant: quibus etiam contritis lienem ex vino
illini oportet. Strangurix & regio morbo prodest, singulum sedat, calculos in ve-
sica comminuit. Conceptum adimere creditur per se, aut cum muli liene appen-
sa. Tradunt noctu silente luna, huius rei gratia effodiendam. Eadè sic breuiter Pli-

Lib. 2. cap. 15.

nus, tradit. Huius foliorum iure in aceto decoctum per dies quadraginta pota,
lienem absumi aiunt. Et, illinumur aurem, eadem sedante singulus (sic in vulgatis
legitur, emendatius in veteribus. Et illinumur eadem, sedant & singulus). Nò dan-
da feminis, quoniam sterilitatem facit. Theophrastus. τὸς δὲ ἡμῶν τὸ φύλλον τοῦ

Lib. 9. hist.

cap. 19.

γυναικὸς εἰς τὸ ἔχοντες (πᾶσι φασὶν subaud.) μέγιστον δὲ φασὶν τὸς ἄνδρας τὸ ἡμῶν, καὶ
τὸ διπλάσιον (alij σπέρματι legunt) χαίρειν ὃ σπέρμα καὶ τὸν ἡμῶν ἀνδρῶν. ἡ δὲ καὶ
πρὸς τοῖς σπέρματι, ὡς πρὸς τὸ ἐλκυστικόν. Id est, Hemionij folium mulieribus sterilitatem
adferre aiunt. Miscendum aurem esse aliquid vngulæ muli, & pellis eius, siue femi-
nis. Mulas hac herba plurimùm delectari. Vfus eius ad lienes, vt clymeni. Hic Theo-
phrastus an ad conceptionem impediendam folium hemionij alligari, an potari
velit cum vngula, aut pelle, aut semine muli, non distinxit. Et quod eius rei gratia
tradit Dioscor. silente luna effodere oportere, Serapio aliter expressit, nempe opor-
tere ipsum suspendi die aliquo in cuius nocte luna non apparuit. Galenus breuibus
aspleni vires perstrinxit, his verbis. Asplenum tenuium est partium non tamè ca-
lida est herba. Hac itaque mione & lapides frangit, & lienes liquat. Auteus pul-
uis, inquit Matthiolus, qui in Aspleni aversa foliorum parte inuenitur, drachmæ
Lib. 6. sum.

In cap. 134.

lib. 3.

pondere cum albi succini pulueris semi drachma ex succo portulacæ aur plantagi-
nis potus gonorrhœa laborantes mirificè iuuat.

ASPLENVM, Siluestre.

Aspl. silue-
stris.
Lib. 2. cap. 15.

Locor.

Forma



Herbæ rotius decoctum datur vriliter potandū
ad omnes melancholicos affectus, præsertim ad
eos qui ex Hispanica lue prouenerint. Alterum
asplenum siue scolopendrium exhibet Tragus,
& siluestre appellat, quod in vmbrosis & humi-
dioribus siluis nascitur, radice nigra, villosa, cō-
pacta, ac cespitis instar contexta, è qua supra se-
xaginta aliquando folia, primo eortu lingux
cetuinæ modo recurua, postea cum se explica-
runt, non tam lata quàm illius, sed adstrictiora,
vrinq; profundis, mediàmque venam, quæ pu-
nicei est coloris, & vicem caulis tener, aringen-
tibus incisuris diuisa, nequaquam in altum ere-
cta, sed humi procumbentia, vermèmq; per
omnia longum imitantia, exeunt. Iunio mensè
appetente alia multa longè angustiora priori-
bus foliis subnascuntur, polypodij instar incisa,
in altum se attollentia, longissimis gallinaceo-
rum pennis simillima, altora parte exiguis & lu-
reis punctulis notata, sicut & polypodij. Au-
tumno accedente hæc, quæ iam diximus, folia,
protinus

prolious pereunt, reliqua verò quæ subinde noua erumpunt, humi per totam hyemem illata procumbunt. Elegantissima sanè planta, sed quæ non passim occurrat. Vbi tamen inuenitur, ibi magna copia prouenire solet. Dodonæus, vt paulò post indicabimus, Lonchitina asperam esse iudicauit.

HEMIONITIS,

CAP. V.

HEMIONITIS & *σπλην* Græcis, Latinis similiter Hemionitis, *Nomina* quasi mulariam dicas, & Splenium dicitur, ac rectè, vt quidam volunt, quòd eius folium, sicut & Phyllitidis, medicorum Splenia, nimirum oblongas plagulas figura imitetur, folium, inquit Dioscorides, dracunculi emitit, lunatum: radicibus multis cohaeret, tenuibus: numquam flores, neque semen, neque caulem gignit, in petrosis nascitur, austero sapore. *Lib. 1. cap. 1. Forma. Locu.*

HEMIONITIS, *Marb.*



Quam descriptionem Leoniceus, Manardus, Ruellius, & eos secutus Fuchsius, ad eam accommodarunt, quæ vulgò lingua ceruina, de qua proximè dicemus, falso scolopendria dicitur. Verà enim scolopendriam, siue scolopendrium asplenium esse diximus. Aiunt enim illi folia esse dracunculi, seu ari, instar lunæ corniculantis falcata: etsi enim interdum in altum surgunt, tamen inter initia potissimum incurua, & lunæ crescentis modo falcata sunt: radicibus etiam cohaeret multis, exilibus, nunquam florens, neque semen, neque caulem proferens. At recentiores quidam, in quibus sunt Matthiolus, Dodonæus, Anguillara, aliam Hemionitim, eamque veram sefe reperisse asserunt, à Dioscoridis biflora nihil prorsus dissidentem, quæ Romæ nascitur in quibusdam rudibus, ædificiorumque ruinis propè magnum amphitheatrum, vnde herbarij eam in suos hortos transulerunt. *Fuch. cmi.*
Pena tamen atque alij recentiores etiam dubitant adhuc, num ea quæ ex Matthiolo hic pingitur Hemionitis, sit specie diuersa à lingua ceruina *In cap. 19. lib. 5. Lib. 1. c. 67.*

vulgò dicta, quod ei perquam affinis & germana videatur: quisque in quibusdam Italix hortis eandem hanc, sed aliquantùm loco latiore, diuersam cum iudicent, frustra Romæ in rudibus collapsorum ædificiorum vna cum multis etiam quæ fuissent Anguillara sedulo herbario nihil refragari, qui monuerat plātam indidem se habuisse, sed adeò obscuris notis distantem, vt perparum aut nihil prorsus differre videretur à vulgari lingua ceruina. Nec enim minùs fibrosam radicem nigricantibus villis, summo cespite hærentibus huic inesse, folia autem auersis exarata decliuibus lineolis, seu obliquis lris, vt in lingua ceruina, basim tamen latorem habere, & circum pediculum falcatam arcuatamve volubilis modo. Hæc Anguillara. Idem Pena in Anglia occidua ad rupes antroscisque cautes. D. Vincentij vno aut altero miliari ab vrbe Bristoia, vberrimè luxuriantem quandam facie linguæ ceruinæ plantam inuenisse se scribit, cui terna quaternave sunt folia, minora multò, vix enim maxima tres digitos longitudine excedunt, minimè crassa aut rigida, sed mollicella, inter quem & alias plantas capillares, alioqui lætas & benè adultas ita exilis nascitur, nec vllis à tergo situris asperata, ad mucronem lateribus

HEMIONITIS,

Minor Penna.

Locus.

Vires.

Lib. 3. cap. 19.
Lib. 6. lib.Roell. lib. 3
cap. 6.
Lib. 4. cap.

utrinque ad medium sinuatis & reductis, basi latiore sinuata, segmento quasi utrinque interius recuruo, gustu à lingua ceruina non diuerso. Clusius Hemionitidem peregrinam ostendit, petegrina elegantia, quæ natuæ luxu foliis duplicatis ad basim latioribus falcatas apophyses vtring, lateribus mucronatas exerit. Modus, orrus & parilitas superioris Hemionitidis hic picta in vmbrosis, vdis, saxosis & gelidis crescit. Ex aceto pota, auctore Dioscoride, lienem absumit. Galeno vero Hemionitis simul & adstrictionem & amaritudinem habet, quamobrem cum aceto pota lienosis auxilio est. Nec rectè quibusdam Hemionitis videtur esse quam Plinius Teucrium, quod eam Teucer inuenerit, quidam Hemionium vocant, spargentem iuncos tenues, folia curua, asperis locis nascentem, austro sapore: numquam floret, neque semen gignit. Medetur lienibus, &c. Eadem, inquit, Hemionitidis fete à Dioscoride tributa sunt. Nam quod Plinius iuncos tenues spargentem describit, Dioscorides multiplici & exili radice demonstrauit, quod ille foliis curuis, is foliis dracunculi lunæ modo incutis delineauit, id est, *μυρσολύ*. At si integri sunt hoc loco Plinij codices, teucrium cum Hemionio siue Hemionitide petperam confudit: sunt enim prorsus diuersæ plantæ, vt in teucrio demonstrabitur. Ex vetustis exemplaribus quidam legunt, Inuenit & Teucer eadem ætate Teucrium, & quam quidam Hemionion vocant, &c. Læctione facili & perquam commoda. Alij non Hemionium illic, sed Hemion ex veteribus & emendatioribus libris legendum esse affirmant. Ex quorundam herbariorum sententia aliam Hemionitidem hic pingendam curauimus, quæ in Ilia provenit, radicibus multis capillacea tenuitate, breuib, subnigris: cauliculis pedalem altitudinem vix attingentibus, in folia septem fete aut nouem diuisis: quorum quaterna vel sena vtring; caulem pari ordine vestiunt, terna verò in summo caule extantia inferiorum foliorum versum claudunt. Sunt autem ea omnia longa, angusta, in ambitu nonnihil crenata, obliquis incisuris vtraque parte distincta, quas per medium folium procedens & eminens costa separat.

HEMIONITIS Altera,

Dalechampi.



Vires.

Vis ei eadem quæ alteri hemionitidi: flos nullus, nullum semen, atque adeò ne auctsam quidem foliorum partem subflauus puluisculus contegit, qui in alijs id genus plantis cernitur.

PHYLLITIS,

CAP. VI.

Nomina

Lib. 3. cap. 19.

Forma.



Væ Græcè *φυλλίτις* quasi foliosam dicas, vt quæ caulis, floris, seminis expers, nihil nisi folia aut foliosus cespes appareat, Latine quoque Phyllitis nominatur. Officinis Lingua ceruina, petperam scolopendria, vt proxime diximus, Gallicè *Langue de cerf*, Germanicè *Hirsch zung*. Phyllitidem describit Dioscorides folijs esse ramici similibus, longioribus, & viridioribus,

PHYLLITIS.



PHYLLITIS, *Laciniata*,
Clusij.



dionibus, senis aut septenis, rectis, quæ parte anteriore lævia cernuntur, à tergo autem peniles quasi vermiculos ostendunt. In umbrosis & opacis horrorum locis emicat, gustu acerbò, neque caulem, neque florem, neque semen proferunt. Quas notas omnes, qui propius inspexerit, minimè ambigit Phyllirida eam esse quæ lingua ceruina & scolopédria vulgò nuncupatur. Primùm umbrosis, opacis, humentibusq; locis prouenit, fontium & puteorum patieribus, veterum aliorum patietum & siluarum vdis, deinde foliis est vulgaris lapathi, maioribus, longioribus, viridioribus, rectis, senis, septenis, aliquando pluribus, è radice multis capillamentis fibrata, nigricante, adianti simili, anteriore parte læuib; & virentibus, à tergo multas transuersas lineolas seu liras extantes, subrubentes habentibus, ab ima & latiore parte secus mediū netum digestas, ad summum vsque quâ in mucronem desinunt, lapathi vulgaris aut linguz similem, vnde ei linguz ceruinæ nomen Officinæ indiderunt, quæ lineolæ, vt Dioscorides ait, pensiles vermiculos referunt. Adhæc gustu est acerbò, subaltringente, exsiccante, non ingrato. Denique caule, flore, semine caret. Quod si eiusmodi plantæ quædam reperiantur, quæ multò plura senis septenisve folia emittant, ne id quidem Dioscoridi repugnat. Nam ab vna radice non multò plura quam Dioscorides ait, folia eriguntur, sed à multis coniunctis, quas si separe non plura senis septenisve prodire conspicias. Quare à Leoniceni, Manardi, Ruellij, Fuchsij sententia, qui Phyllirida linguam ceruinā non esse, sed hemionirida cõtendunt, plerique omnes docti herbarij dissentiunt. Hemionitis enim erit caule, flore, semine caret: folia tamen lapathi minimè habet, sed dracunculi, curua, & lunæ crescentis ritu falcata. Deinde alia reperta est Hemionitis, legitimè ac veram notis omnibus referens, vt superiore capite declarauimus. Non omitenda hic est propter elegantiam Phyllitis Clusij, quæ sola foliorum forma à vulgari differt, alioqui per omnia similis sunt verò ea palmari longitudine, sena aut septena, ex radice multis nigris capillamentis fi-

Locus.

Marb. in
Cap. 104.
lib. 2.

brata prodeuntia, eiusdem læuoris & viroris interna parte, ac externa nullis aut rarissimis transuersis lineis notata, & extrema parte multipliciter dissecta. Hanc in Cantabria non procul à monte D. Adriani nuncupato, qua per eius specum & fornicem transitus est in Hispaniā, locis umbrosis in rupibus se obseruasse ait, raram tamen inter plerasque alias vulgares, Folia Phyllidis, inquit Dioscorides, in vino

Lib. 2. c. 104.
Vires.

Lib. 3. sim.

Matthioli.
in cap. 224.
lib. 4.

potat serpentium moribus aduersantur, quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria aut resoluta aluus excercet, potui datur. Eadem breuiter sic Galenus. Phyllitis cum qualitatibus sit acerba, non absurde diarrhoeas & dysenterias pota iuuat. Phyllitida vulgus vsurpauit ad lienis affectus, quibus prodesse experimento constat. Nec desunt qui eiusdem stillatitia aqua vtantur ad cordis affectus, & contra singultum. Eandem gargarisandam quoque præbent ad prolapsam columellam. Refrigerari iocinoris & ventriculi ardores siccorum foliorum farina eadem aqua excepta & illita. Eadem quoque aqua os colluendum præcipiunt ad palati deliquamationes, & cruentas gingiuas.

LONCHITIS,

CAP. VII.

Nomina

Genera.

Lonchitis
aspera.
In cap. 247.
lib. 4.

Forma.



ONCHITIS Latine dicitur vt Græcè λονχίτις à seminis triangula figura cuspidi lanceola v'e mucroni simili, id nomen sortita. Dioscoridi duplex est. De priore, in libro de Plantis quæ in asperis, &c. tractabimus. Altera vero Lonchitis τρασχίς, id est, aspera dicta, quam Dioscorides tradit foliis esse scolopendrij, sed asperioribus, maioribusque, ac multo magis diuisis, ex Matthiolo hic proponitur, quod folio sit scolopendrij proximo, longiore tamen & magis diuiso, & ad polypodij formam potius accedente, spithamæ longitudine, vtinque disparibus incisuris dissecto, te-

LONCHITIS Aspera

maior, Matthioli.



LONCHITIS Aspera

minor, Matthioli.



nibus aculeatisque denticulis serrato, & ybique aspero, vnde illi nomen. Caulem nullum, profert, neque flores, neque semen, polypodij & asplenij ritu, quorum imaginem refert. Radice nititur multiplici, tenui, subrubente sicuti Phyllitis. In Italix locis quibusdam nascitur humectis & vliginosis. Duo eius genera depinxit Matthiolus. Vnum maius, quod à Luca Ghino, minus quod à Iacob.

Locus.

Genera.

lib.

PSEVDOLONCHITIS Aspera,
Marb. Lonchitis aspera, Marantha.

LONCHITIS Aspera,
Dodonæ.



LONCHITIS Aspera lucensis.



Iacob. Anto. Cortuso nactus est. Præterea Pseudolonchitin asperam, quæ est Lonchitis aspera Maranthæ. Cauliculus est spithameis, nigris, fuscis, rigidis, foliis Adianti Pliniani, sed gemino situ, filicis scemina ritq, crassioribus multò, altera parte virentibus, altera Aspleni modo rubiginis. Radix pusilla, capillamentis crebris fibrata. Aliam Lonchitin asperam exhibet Dodon. & a quibusdam Longinam & Calabrinam nominari ait, ab aliis recentioribus Asplenium magnum & silvestre, Germanicè *Speant*, & *Milzkrant*, filicibus similem, memotatam supra ex Trago, & luculentè descriptam, cap. De Aspleno. Lonchitis aspera alia in Ilua c. escit, radice numerosa, foliis multis, dimidio pede longioribus, è rufo subnigris, in alia foliola diuisis, nostrati Aspleno similia, supernè viridia, infernè rufa & pulverulenta lanugine obducta, saporis austeri, qualis in aspleno deprehenditur: quapropter ea iuuari lienosos quidam affirmant. Lõchitidis pri. nẽ radix, auctore Diosc. ex vino pota urinã ciet. Lõ. hitis aspera

Lõchi. asp.
Dod. lib. 4.
cap. 66.

Nomina
Forma.

Locus.
Lõch. Iluẽ.
Forma.

Vires.
Lib. 5. cap. 45.

Li. 7. simpl.

vulneribus mirũ in modũ prodest, in eĩsq, inflãmationes excitari nõ patitur. Pota ex aceto lienẽ absumit. De vtraq, etiã sic scribit Gale. Lõchitidis eius videlicet quæ semẽ habet triãg. late, figura lanceę simile, radix poris inũ quodãmodo similis est radici dauci: proinde urinã ciet. Porro eius q̃ scolopèditiĩ similia habet folia, ea ad glutinãda vulnera vtilia sunt viridia: sed sicca cũ aceto pota lienes induratos sanat.

Nomen



RARCIS *αλις* & *αλιον*, Latinis Filix nominatur, Arabibus *Sarax* & *Sarachi*, Italis *Felce*, Germanis *Vwaldsfarn*, Hispanis *Helechoyrua*, Gallis *Fougere*, & *Fenchere*. Officinæ Latino nomine vtuntur *αλις* autem & *αλιον* à Græcis dicitur ab alis auium, quarum speciem in ramulis disposita eius folia referunt: pennatus enim & pennatis foliis frutex Filix est. Dicitur & Plinio auctore Blechnon: quanquam alij non *βλάχων*, sed *βλάχων* dicant. Nicander *βλάθρον* appellat hoc versiculo.

Li. 17. ca. 9.

In Theca.

Εν τῇ περὶ αἰσθητικῆς βλάθρον περιεχόμενος χυρῖσιν.

Genera.

Vbi Scholiaſtes *βλάθρον* interpretatur *αλις*, & *βλάχων*, idest, Filicem. A qua Latinis Filicæ, vt à carice carecta nominantur, & Filicones à veteribus pro malis & inutribus accipiebantur. Filix duplex est Dioscoridi, Theophrasto, Galeno, Plinio, *αλις* simpliciter dicta, quæ Latinis Filix mas nominatur, *Fougere masle*, & Filix fœmina, quæ ἡδυνάλις, & νυμφαία *αλις*, *Fougere femelle*, vtræque quamuis sterilis planta vulgatissimæ cognitionis. Filici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno pediculo cubitali longitudine exeunt, multitudine, alarū auium

Forma.
Diosc. li. 4.
cap. 78.

FILIX Mas, Math.

FILIX fœmina, Math.



Locus.

Lib. 17. ca. 9.

modo expassa, subgravi odore radice per summa cespitum nigra, oblonga, adnata siue propagines multas fundente, subadstringente gustu. Nascitur in montibus vmbrosis & saxosis. Filix fœmina foliis est superioris Filicis, quæ non vno, vt illa, pediculo nitantur, sed furculos siue ramulos multos & altiores habentia: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flauescunt: aliquæ etiãnum rubræ inueniuntur. Plinius sic fere descripsit. Filicis duo genera, nec florem habent nec semen. Perin Græci vocant, alij Blechnon: cuius ex vna radice complures exeunt Filices, (Dioscorides dixit ἡδυνάλις & ἡ νυμφαία, idest, multas habere radículas adnatas, binâ etiam cubita excedentes longitudine, non graues odore, (Dioscoridi solum est ἡ περὶ αἰσθητικῆς, idest, odore nonnihil graui.) Ex vetustis quidam

quidam legunt, subgravi odore, hanc marem existimant. Alterum genus The-
lypterin Græci vocant, alij Nymphæam Pterin. Est autem non singularis atque
fruticosa deprauata hic sunt exemplaria, in quibus legitur, Est autem singularis,
atque non fruticosa breuior, molliorque & densior, folijs ad radicem canaliculata.
Vtriusque radice suæ pinguescunt. Folia vtriusque lateribus pinnata. Vnde no-
men Græci imposuere. Radices vtrique longæ in obliquum, nigrae. Dioscoridi fœ-
minæ radix è nigro flauescit, & interdum rubra est præcipue cum inaruerit. Siccari
autem eas sole oportet. Nascuntur vbiq; sed maxime frigido solo. Hæ descri-
ptiones Filices nostras adamusim delineant, atque euidenter distinguunt. Mas
enim statim ab radice multis compacta appendicibus, crebros emittit & proli-
xos bicubitales, vel proceriores non caules, sed pediculos, pennatim foliosos.
Fœmina verò sæpius vnum, interdum aliquot promit caules, ferè à medio in mul-
tos diuisum, pennatim etiam foliosos ramos, & radice est minores quod discrimen
Theophrastus expressit his verbis. Διαφέρει δὲ τῆς ἀνδρῆος ὁ γυναικῆος, τὸ τὴν μὲν
ἐκδομένην ἔχει μόνον ἑνὸς (fortasse μόνον ἑνὸς, vt in Dioscoride legitur) ἢ δὲ τὴν μὲν
ἔχει πολλὰς, καὶ μὲν ἑνὸς. Id est, Differt fœmina Filix à mascula, quod folium hæc ha-
beat ex vno membro suæ pediculo, & radicem magnam, & longam, & nigram.
Sed de semine Filicis ambigitur. Quamuis enim Theophrastus, Dioscor. Galenus,
Plinius eam ἀγρῶν esse affirmauerint, id est, sterilem & sine semine: quinetiam
medici Arabes & Persæ ad magicas vanitates nari, huius seminis nō meminerint,
tamen non solum Agyræ vulgi ignorantiæ ad questum impudenter illudentes, sed
etiam neoterici quidam, qui se naturalium rerum indagatores profitentur, Filicæ
semen ferè asseuerant, auersis folijs inhærens, sed adeo minutum, vt visum ferè
fallat: legiq; abscissis propè radicem folijs, & in domo suspensis, substrato linteolo,
aut papyro, circa finem Iunij: hoc enim ferè tempore maturescere. Alij vna solsti-
tiali nocte florere, eademq; hora cum defloruit, maturum semen in terram cadere:
ideoq; nū quispiā tunc affuerit, nec videri florem, nec colligi semen posse. Agyræ
cuncta illa heri & obseruari natali nocte D. Ioānis Baptista nugantur. Quæ com-
menticia sunt & superstitiosa. Verumtamen rudimentum quoddā feminis edunt
puluerulentæ foliorum Filicis simbriz & rugosæ: ac istas atomos admodum exi-
les tenuissimas veluti araneorum filis de summo earum ramo pendentes, passim
Filicis fœminæ semen esse dicunt, & plebi persuadere conantur. Filicem locis
asperis nimis frequentem, & humentibus locis, atque in agrorum marginibus vi-
demus. Fœminam in siluis & montibus. A prili mensē folia erumpunt, Septembri
marescunt. Filicis radix, auctore Dioscor. latus lubricos excutit sumpta drachmis
quatuor ex aqua mulsæ: melius si cum scammoniz, aut veratri nigri rotidem obo-
lis detur: sed qui sumunt, alia præsumpsisse debent. Laborantes lienis incremento
recreat. Radix & pota & illita cum axungia vulneribus sagitta apudinea factis est
auxilio: cuius rei probatio talis est. Peribit Filix quam per ambitum sita copiosior
arundo coronet: contrā evanescens abibit arundo, quam obsepiens multa Filix in
orbem cinxerit. Qui postremus locus in vulgatis Græcis ita mutilus est, vt verba
aliquot desiderentur, ita restituenda, ἡ δὲ ἰστὶ πάλιν χρῶμας τὸ ἰσχυρὸν φαίνεται, ἡ φαι-
νέται ἰσχυρὸν: καὶ ἡ δὲ πάλιν ἰσχυρὸν τὸν χρῶμα φαίνεται ἡ φαινέται χρῶμας. Filicis fœ-
minæ radices latum lubricum expellunt, cum melle in eclegmate sumptæ: potæ
cum vino drachmis tribus rotundum lubricum eiiciunt: datæ feminis sterilita-
tem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergradiantur (sic enim conuertenda
Græca, καὶ ἔγκυος ἀποβῆναι, καὶ ἀποβῆναι). Lacuna tamen legit ex vetere codice, καὶ ἔγκυος
ἀποβῆναι, καὶ ἀποβῆναι: id est, & si prægnans sumpsit abortum facit: farina humidis vlce-
ribus & cicatrici repugnantibus inspargitur. Iumentorum ceruicibus medetur.
Folia recentia in oleribus cocta manduntur, vt ventrem emolliant. Plinius eadem

Lib. 9. hist.
cap. 20.Pet. Penin
Ad.

Locus.

Tempus.
Lij. c. 17. 8.
Vires.Luj. c. 9.
magna

magna ex parte habet. Vñs radicis in trimaru tantum neque ante, neque postea
 pellunt intera neorum animalia, ex his rēnias cum melle (sic rectē verus codex ha-
 bet, vulgari falsō tineas) cētera ex vino dulci triduo pota: vtraque stomacho inuti-
 lissima: Aluum soluit, primō bilem rrahens, mox aquam: melius tēnias cum scam-
 monij pari pondere. Radix eius duorum obolorum pondere ex aqua, post vnius
 diei abstinentiam bibitur, melle pręgustato contra rheumatismos. Neutra danda
 scēminis: quoniam grauidis abortum, ceteris sterilitatem facit: farina earum vlce-
 ribus tētris inspargitur, iumentorum quoque ceruicibus: folia cimicem necant,
 serpentem non recipiunt. Ideō subterni vtile est in locis suspēctis: vñs etiam fu-
 gant nidore. Hęc Plinius: quorum nonnulla partim ex Dioscoride, partim ex
 Theophrasto mutuatus est sic scribente: ὃ ὁ γυνήκειος χρῆσθαι πρὸς τὰς ἰλαμνας,
 τὰς τε παλῆϊας, καὶ τὰς λεπτὰς πρὸς μὲν τὰς παλῆϊας ἀνὰ δόσιν μίλιον, πρὸς δὲ τὰς
 λεπτὰς ἡμισυ γλυσσῖ μετ' ἀλφίτου διδουμένην. γυναικὶ δὲ ἐάν γε διαβῇ, ἐάν μὴ ἐγκύμει,
 ἐκώσθη φασὶν, ἐὰν δὲ μὴ, τὸ ὄλον ἀτρεκεῖ γίνεσθαι. Id est, vtilis Filix scēmina contra latos
 ventris lumbricos, & contra tenues: contra latos quidem cum melle, contra te-
 nues verō ex vino dulci cum polenta. Quin etiam si mulieri derur, grauidis qui-
 dem abortum, simpliciter autem scēminis sterilitatem facere dicitur. Theophra-
 & Plinius Filicis scēminæ cibo potūve scēminas sterile scere, grauidas abortum fa-
 cere tradunt: neuter autem si grauida supergrediatur abortum fieri tradit. Quorum
 auctoritas locum Dioscoridis supra citatum, rectē à Lacuna emendatum esse con-
 firmat. Scribit item Theophrastus: ὃ ὁ τῆς παλῆϊδος ρίζα μόνος, τῷ χρυτῷ γλυκύς, νεφρός,
 ἰλαμνας δὲ παλῆϊας ἐκώσθη, ἀνέμω δὲ ὑπερχεῖ, ὅς ἐστι σπένδιον. (nempe lacteum succum me-
 dicatum, & catharticum, vulnere & incisura stillantem, qualem mittit scammo-
 nium, cuius proximē antea meminerat, & cum quo Filicem aliqua ex parte con-
 fert.) τῆς μὲν δὲ ὕδατος μεσπόμεν φασὶν. Id est, filicis radix succo dulci & acerbō simul
 est. Latum lumbricum pellit: semen non habet, neque lacteum succum: serunt
 rempestium Autumno secari: Quod verō de disidio inter filicem & arundinem
 Dioscorides tradit, legitur etiam apud Plinium his verbis. Filix biennio moritur,
 si frondem agere non pariaris. Id efficacissimē contingit germinantis ramis ba-
 culo decussis. Succus enim ex ipsa defluens necat radices. Aiunt & circa solstitium
 euulsas, non renasci, nec arundine sectas, aut exaratas arundine vomeri imposita.
 Similiter & arundinem exariari filice vomeri imposita. Repetit idem alio in loco.
 Arundinis radix contrita & imposita filicis stirpem corpore extrahit: item arun-
 dinem filicis radix. Sed hoc prior ipso Celsus tradidit. Pessima ex furculis, inquit,
 arundo est, quia aspera est, eademq; offensā etiam in filice est. Sed vñs cognitum est
 vtramque aduersus alteram medicamentum esse, si contrita superimposita est.
 Extirpandę verō & prorsus abolendę filicis rationem aliam Theophrastus docet,
 his verbis: ὃ ὁ κέρως χρῆσθαι, ὃ μόνον τοῖς περὶ τὸν σπένδιον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις, πάλιν
 πάλιν δὲ ἐκείνης φασὶν ἐκώσθη ἀνὰ δόσιν μίλιον, ἀπὸ δὲ καὶ ὁ πάλιν καὶ ἡ ποσειδάμων
 τὴν ἀποβλήν. Id est, sterco ratio vtilis non solum frumentis, verum etiam aliis her-
 bis, pręterquā filici est: hanc enim fimo superiniecto interire affirmant: interire
 & pecore incumbente. Galenus breuiter Filicum vires sic declarat. Filix radicem
 habet maximē vilem: latum enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor
 drachmis cum melicrato ebibat. Ad eundem modum partum vium quidem ne-
 care, mortuum autem eiicere mirum non est. Est enim amara paulum habens ad-
 strictionis. Quamobrem vlceribus imposita vim habet valenter desiccandi, non
 tamen mordax est. Similem ei vim habet thelypteris. Armoricos, & Neustriorum
 vltimos, qui vastas silvas colunt, in frugum inopia, ē radice Filicis panem confice-
 re notum est, eiusdemque cineribus nitri loco iniectis, fixa liquare, & vitrea vasa
 fingere, colore viridi, & subobscurō, quibus vinum album, dulce turbidum potare
 Andes,

Alex. Vnili, Cenomani gratissimum habent. Recentiores herbarij plantas alias filix nomine donarunt. Imprimis eam quæ Filix aquatica, & Osmunda, siue Osmunda regalis, à regijs & præclaris viribus nuncupatur, à nonnullis filiquastrum, à Chemistis Lunaria maior, à Gallis Osmunde, siue *Feugere aquatique*, à Germanis *Vuatter-van*. Filicibus supradictis similis est, nisi quod folia crenata non habet:

FILIX Aquatica, Dodon.



caulem emittit triangulum, rectum, tenuem, cubitalem, interdum bicubitalem, quem folia vtrinque æquis interuallis alarum ritu expansa stipant, sicuti in polypodio incisa. In caulium, & ramulorum, ex caulium lateribus prodeuntium vertice, granula rotunda, aspera, seminum speciem ostendentia. Radix magna, crassa, ex multis radiculis implexis compacta, in cuius medio albū quidpiam inest, quod cor Osmundæ vocant. Hanc Pseudolanchitidem asperam vocat Matthiolus, eoque nomine depingit. Locis humidis, vmbrosis, & nemoribus gaudet. Aprilis mense folia sicut aliarum filicum erumpunt, hyeme ineunte pereunt, viuaci tamen radice in terra manente. Calida primo gradu, sicca secundo, nonihil acris, odoris non ingrati. Radices ad contusa, rupta, luxata: item ad hernias peritiles esse constat experientia certissima. Quinetiam colicis & splenicis plurimum conferunt. Tragus aliud Filicis maioris genus exhibet, quæ & forma & colore reliquas omnes antecellit. Osmundā vocat Lobellius, cum

Forma.
Dodonæus
cap. 62.

In capite
lib. 4.
Locus.
Tempus.
Temper.
Vires.
Pet. Pen. an
Aduch.

FILIX Florens, Tragi.



FILIX Arborea, Tragi.



tamen

tamen ab *Osmunda* superiore differat. Habet enim caules longos, viri proceritatem attingentes, virides planè: radicè crassam, nigram & pilosam. Folia in utroque caulis latere pinnata, & incisuris distincta instar foliorum polypodij: florem tert in vertice candidum, copiosum, qui circa diem sacrum D. Ioannis Baptistæ nullo post se relicto semine decidit. Raro, inquit *Tragus*, hoc filicis genus reperitur, nec multis cognitum est. In *Vuaigoix* altissimis silvis propè *Circulum* arcem ducis *Bipontini* prouenit. Ea fortasse *Dryophonon* *Plinij* fuerit. *Dryophonon*, inquit, similis *dryopteridi* herba est, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circundatis vtriusque foliis, pollicari amplitudine, qualia *oxymyrsines*, sed candidioribus mollioribusque, flore candido sambuci. Idem *Tragus* duo alia *Filicis* genera exhibet. Vnum quod in veterum & cætorum roborum caudicibus nascitur, folio *Filicis*, multò tamen minore incisura diuisum, caule non altiore polypodio, sed multò tenuiore. Passim non occurrit, sed in altissimis tantùm montibus. Alterum est *Felix* nuda seu saxatilis, folio orbata, caulem proferens digitum longum, multiplicem & copiosum, vnà è radice, eaq; capillata, sicut & *ruta muraria*, in cacumine binis vel

Locus.

Li. 37. ca. 9.

Li. ca. 13.

Forma.

Li. ca. 14.

FILIX Saxatilis,
Tragi.



CHAMAÆFILIX Marina
Anglica, Lobelij.



ternis corniculis, aut si mauis incuruis quasi setis, quæ purpureis aliquando notantur punctis, còspicuum. Gustu & odore cum filice vulgari còuenitè saxis prompit. Capilli veneris, seu polytrichi *Apuleij* genus esse existimat *Tragus*, nempe eius quod ramusculos habet quasi setas porcinas. Hic *Chamaefilicem* marinam Anglicam ponemus, quam non nisi saxorum rupiumve interueniis aut petrosis asperginibus *Cornubiæ* innatam reperit ad maris alluiones. E' pusilla multis implexa cirris pullis & compacta radice, foliola emitte binùm ternùmve vnciatum numerosa, rigida, carnosà, ex atro virentia, lucida, filicis maris diuisura, ortu, positu, & gustu, lituris etiam aduersà parte extantibus, ferrugineis, quorum pediculi & medius neruus sericeo nitore ex fusco lucent. Hæc *Lobellius*.

DRYOP

Filicis species à foliorum figura & loco natali *Sporellis* Græcè dicitur, Latinis Filix quærna, & Filix quercus, Gallis *Feuigne de chesne* Germanis *Eckenfarn*. Dryopteris, vt describit Dioscorides, filici similis est, multo minore foliorum incisura, radicibus inuicem implexis hinc inde, gutta acerbis, in dulcedinem vergentibus. Nascitur in veteri quercuum misco. *As has* descriptione hanc protulit Dryopterida Matthiolus, quæ filicem

DROPTERIS, Matth.



DROPTERIS *Asa*,
Dodonei.



foliis optimè refert. Nascitur etiam, inquit, in humenti solo inter vepres circa quercuum caudices, seq; in Goritienſi agro multis locis inueniſſe extra quercuum caudices affirmat, nullis repugnantibus notis. Sunt qui aliam Dryopterem, eamq; veram ſic pingunt ac deſcribunt. Folia huic polypodij proſus, aut filicis fœminæ, minoratamen multò, non minoribus lacinis, tenuiora, & teneriora, in iuncis exilibus pedem altis, pennatim & aduerſo ſitu exorientia, auerſa parte notulis aſperſa, non extantibus, rubiginolis, ſed candidis apertis, ſetie gemina ſecus foliorum neruulum medium. Radix longa, variè inſlexa, humi decubrens, fuſca, ſubhirſuta, & villis fibrata, polypodij (niſi multò gracilior eſſet) ita ſimilis, vt aliquando minùs peritos pharmacopœos in periculolum errorem induxerit, miſcentes hæc decoctis polypodij radicis vice. Dodonæus Dryopterides duas pinxit ac deſcripſit, hanc candidam, illam nigram. Candida filicem nonnihil haud abſimilis, ſed multò minor, palmarum tota excedens, caule, flore, ſemine orbata: folia candida, tenera, multum ſeuſſa, crenis totius ſuperficie denſioribus & minutoribus quàm in Filice, te, à tergo punctis notata: radix ſpiliſſa, non ex radiculis multis & implexis compoſita. Nigra Dryopteridi foliorum pediculi nigricant, creni folia, ſuperioris minora & breuiora, non tam crebris inciſuris, cætera ſimilia, & auerſa parte notis paruis ſignata, tota hyeme virentia. Virago Adiantum eſt officinarum album & nigrum, quibus adianto vero deſtituta, innoxia, ſaniora nigra vtuntur, ac fortaliſſè adiantum aliſum & nigrum Plinij, vt in vero adiãro diximus. Vmbroſis viis circa quercuum radices, non tamè ubiq; proueniūt. Dalechampius verà hanc Dryopterida exhibet, quæ in editiſſimis montibus perſeitur ad quercuum muſcoſas radices, foris per terram vagantes, radice capillata fibris denſis, valde renuib; inter ſeſe implexis, ſubartis guttu adſtringentibus cum pauca dulcine,

M M m

DROPTERIS

Nigra, Dodon.

Ll. 4. c. 131.
Urti.

DROPTERIS, Dalech.

Lib. 7. c. 9.



quæ cum aliqua andiu mensæ fuerint, percipitur: foliis malis, obliquis, vitentibus, & herbaceum virorem constanter seruantibus, etiam dudum collecta planta, unico pediculo adnexis, altius incisus, pennarum ritu explicatis, supernè læuibus & glabris, infernè exiguis & subluteis punctis, & quasi vermiculis puluerulentis & asperis maculata: sine caule, sine flore, sine semine, nisi quis (vt vulgò multi de filice nugatur) sessiles & pensiles in aduersa foliorum parte quasi vermiculos, dum flauis adhuc hærent florem esse putet, cum nigricantes decidunt, fructum ac semen. Dioscorides Dryopteridis facultates tradidit, his verbis. *Αὐτὴ ἰσχυρὰ καὶ ὀφθαλμοῖς καὶ οὐλοῖς καὶ τῇ κεφαλῇ καὶ τοῖς μέλεσιν ἐκ τοῦ πυλίου καὶ τοῦ σπυρίου καὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ τοῦ ὤτου καὶ τοῦ στόματος καὶ τοῦ θυμῆος καὶ τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ σπυρίου καὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ τοῦ ὤτου καὶ τοῦ στόματος καὶ τοῦ θυμῆος καὶ τοῦ πνεύματος* (alii *καὶ τοῦ πνεύματος* legunt) *τὸ σπύριον μὲν ὅτι ἰσχυρὰ τὸν χυμὸν, καὶ ἰσχυρὸν ἰσχυρὰ δὲ αὐτὴν.* Hæc interpretes Plinium potius secuti, quàm verba & sensum Dioscoridis, malè conuertebant. Sic enim Ruellius. Psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum usque dum sudores euocet, mox sudor abluitur, & recens imponitur. Sic verò Cornarius. Hæc vnà cum radicibus trita imposita pilos abolet. Oportet autem postquàm corpus exudauit, priorem deradere, & rursus recentem imponere. Plinius verò hoc modo. Dryopteris filici similis, in arboribus nascitur, tenui foliorum subdulcium incisura, radice hirsuta: vis ei caustica est, ideo psilothrum est radix tusa. Illinitur enim usque dum sudores euocet: iterumque & tertio, vt ne sudor abluatur. Primum foliis dulcedinem quandam tribuit, Dioscorides verò non folia, sed radices in dulcedinem vergere scribit: deinde *πύλας διαστέλλει*, id est, densas & crebras, Plinius hirsutas dixit, præterea radicem rufam psilothrum esse, Dioscorides verò herbam ipsam cum radice rufam. Adhuc adhibendi psilothi modum videtur non rectè expressisse, vertit enim, *ἰσχυρὰ*, sudorem euocare, cum scribit, illinendam esse radicem, usque dum sudores euocet, &c. cum *ὑμεῖς* sit humectare & mollire, vt Dioscorides intelligat corporis partem depilandam aquæ tepidæ fotu prius humectandam esse, quod est *ὑμεῖς*, deinde pilum deradendum, si *καὶ πύλας* legas, vel auellendum, si

καὶ πύλας, quod huic loco optimè conuenit, quoniam efficacior est vis psilothi profundius subeuntis auulso pilo, ut potè via magis patefacta, & postremo recentem Dryopteridem, non radicem solum, sed cum ea herbam ipsam cataplasmatas, aut emplatri modo imponendam. Sic igitur Dioscoridis locus conuertendus. Dryopteris cum radicibus trita & imposita pilos abolet. Oportet autem cum pars pilosa aqua humectata fuerit, primum eam deradere, vel pilum auellere, deinde recentem Dryopteridem cataplasmatas modo imponere. Quibus verbis Dioscorides

Dioſcorides, id quod plerumque facit, non ſolùm Dryopteridis depilatoriam vim, ſed vtendi quoque modum declarare voluit. Siue enim pſilochrum, id eſt, medicamentum quod pilos detrahit, cauſtica & ſeptica vi id efficiat, quod prius eſt pſilochri genus: ſiue inſigniter & extremè frigida, aut à totius ſubſtantie proprietate, quod alterum genus eſt, capillum renaſci prohibens, primum oportet vt cutis repentis aquæ ſotu rareſcat, & relaxetur, deinde pili auellantur, vel deſcendant nouacula, aut ſeptico cauſticòve aliquo detraherentur: quod hodie Turcæ illius ſui Rhufina faciunt, cum alterum pſilochrum parti imponatur, ne pili renascantur, quem ordinem hic docet Dioſcorides. Vult enim prius $\chi\omicron\sigma\epsilon\alpha\ \epsilon\kappa\upsilon\alpha\iota\zeta\eta\iota$, deinde pilos $\acute{\alpha}\nu\phi\epsilon\lambda\iota$, poſtremo $\nu\epsilon\alpha\rho\alpha\ \delta\iota\upsilon\omega\pi\tau\eta\varsigma\ \epsilon\iota\delta\alpha\ \epsilon\pi\alpha\tau\eta\delta\omicron\varsigma\epsilon\phi\iota$. Galen. item ſcribit Dryopteridem guſtu mixtam qualitatē præ ſe ferre, dulcem, acrem, amaram, in radice vero etiam acerbam: facultatem habere ſepticam, proinde etiam pilis glabram cutem efficere. Dantur, inquit Marthiolus, Dryopteridis radices in puluerem contritæ, & cum furfuribus mixtæ, addito ſalis & furfuris momento equis deuorandæ aduerſus inteſtinorum vermes: namque potenter illos expellunt & interimunt.

Li. 6. ſimpl.

Caſt. li. 4.

POLYPODIUM, CAP. X.

PΟΛΥΠΟΔΙΟΝ Græcè, Polypodium & Filicula Latinè, Catoni felicula, niſi mendofi ſint codices, Gallicè *Polypode*, Germanicè *Engelſuſe*, & *Baumſarn*, Italis *Polipodio*, Arabibus *Busberg*, *Aibeig*, *Beſſaig*, Officinæ Græcum nomen retinuerunt. Polypodij nomen à radice quæ cirros & acetabula polyporum modo habet, inditum eſt, filiculæ verò à foliorum cum filice ſimilitudine. Polypodium palmi eſt altitudine, ſimile filici, ſubhirsutum, inciſum, non tam adeo tenui diuiſura: radix ſub eſt piloſa, citros veluti Polypus habens, caſ irudine minimi digiti, deſcendens in uis viridis eſt, auſtera guſtu & ſubdulcis. Naſcitur in muſcoſis petris, & in vetuſtis caudicibus quercuum. Hæc Dioſcorides. Eadem ſerè Plinius tradit. Polypodium, quod noſtri filiculam vocant, ſimilis eſt filici. Radix eſt in uſu, piloſa, coloris intus herbacei, craſſitudine digiti minimi, acetabulis cauernoſa, ceu polyporum cirri, ſubdulcis, in petris naſcens, aut ſub arboribus vetuſtis. Hic altera radice qualitas à Plinio omiſſa eſt, nempe adſtringēs. Adde etiam folia auerſa parte ſuluis maculis norata eſſe. Ex his notius eſt quàm vr probatione egeat, Polypodium noſtrum, id eſſe de quo veteres ſcriplere, quo frequentiffimè hodie, præſertim querno, in dilutis & decoctis medici vtuntur. Marthiolus duo eius aſignat genera. Vnum

Nomina
Ca. 1. 2.

Forma.

Locus.

Li. 4. ca. 80.
Li. 6. ca. 3.

POLYPODIUM Primum,
Marthiol.



id de quo diſſecuiſimus, quod omnibus norum eſt, & quod ubiq; frequens provenit. Alterum niſi paucis cognitum, inquit, folio aſplen ni, ſed longiore, viridiorè, magiſq; per anibum laciniato, radice priori ſimili, ſed paulò graciliore. Hoc plurimum naſcitur in montium ſiluis. Sed diſſimilitudo iſta ex loci non ſpeciei diuerſitate pendet loco enim macilen-

Genera.
In ap. 180.
lib. 4.

riore natum, gracilius & strigosius, lætiore amplius & vegetum magis. Sic etiam quibusdam opacis nemoribus folio est adultiore. Non sunt tamen ista specie diuerſa. Sic & Ilea thyrreni maris insula Polypodium gignit ab aliis diuerſum, ſicut & alias quasdam raras plantas veluti Lonchitum aſperam, & hemionitin, de

POLYPODIUM Secundum,

Marthioli.



POLYPODIUM

Iluense.



- Forma.** quibus dixi mus. Polypodium Iluense in faxis nascitur, radice vq̃ in aliis generibus velut polyporum cirris nodosa, fibrata caulibus pedalis, è ruto nigrescentibus, lævibus, interne hissuris: foliis oblongis, pinnatis, inæquali situ in caule dispositis, altera parte virentibus, altera pulvisculo obsitis, gustu subdulcibus, & nonnihil austers, nullo flore, nullo semine. Ad eadem valere aiunt, ad quæ alterum Polypodium, nisi quòd magis siccet, ob aëralium ariditatem, cum soli natura, cum maris afflatu, maiorem. Quid autem Polypodium præstare possit, declarat Dioscorides, his verbis. Radix purgandi vim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut betæ, aut malis ad purgationem. Aride farina aquæ mulæ insparſa detrahie bilem & piritum. Trita efficaciter luxatis illinitur, & aduersus rimas, quæ inter digitos hunt. Plinius eadem, sed paulò plura tradit. Exprimatur succus aqua inadactæ: & ipsa minuta concisa inspergitur oleri, vel betæ, vel malis, vel falfamento, vel cum pulicula: coquitur ad aluum, vel in febrī leuiter soluendam. Detrahie bilem & piritum: stomachum offendit. Aride farina indita naribus, polypum consumit. Florem & semen non fert. Quæ autem hoc loco non habet, alibi recenset. Radix Polypodij illita luxatis medetur. Et alio in loco. Digitorum in pedibus rimis Polypodij radix prodest. Sic enim ex vetere codice emendat Cornarius, cum in vulgatis legatur, cubitorum ac pedum rimis, &c. In Dioscoride tamen rimæ in μετέωρον, & ad pedum & ad manuum digitos referri possunt. Theophrastus, δὲ διὰ πολυπόδιον διαστέτα, καὶ ὅχι καὶ πολυπόδιον, ἀπὸ τῶν πολυπόδων πελαγίων. καὶ θάλατταν, καὶ διὰ κατὰ, καὶ περὶ τῆς, ὡς φασὶν, ἐμφανὲς πολυπόδιον, καὶ διὰ φύλλον
- Ures.**
Lib. 4. cap. 20.
Lib. 16. cap. 1.
Lib. 16. cap. 2.
Cap. 2.
Embl. 164.
Lib. 4.
Lib. 9. hist. cap. 14.

ῥαλλοει ὕμνον ἀνιέσθαι τὸ μέγαλον, καὶ φῶς) in τῇς πύργαις, Idelt. Gaza interprete, Filicula
 verò hirsuta, & acetabulis cauernosa, ceu polyporum cirri: purgare inferiùs apta
 est: vbi quis eam contigerit polypum innasci affirmant. Folium filicis magnæ
 proximum est. Sententia vna in tanto auctore tam absurda necessariò efficit vt
 locum deprauatum esse dicamus. Quid enim à ratione magis alienum quàm con-
 tingere Polypodium, vt polypus, idelt, morbus narium, siue polypus piscis inna-
 scatur. Quare legendum tis παρὶν ὡς ὑπόμειν, & περιέχει, hic non significat con-
 tingere, sed pro amuleto appendere, adalligare, vt sit is verborum Theophrasti
 sensus. Polypodij radix hirsuta est, & acetabula habet, veluti polyporum cirri.
 Purgat deorsum: & si quis adalliget aut appendat, polypum innasci negant. Fo-
 lium habet simile filici magnæ. In pettis nascitur. Galenus breuiter Polypodij
 facultates sic declarat. Polypodium dulcem simul & austeram habet vincentem
 qualitatem, vt facultatis sit admodum quidem desiccantis, citra morsum tamen.
 Mesues eadem fusiùs explicat. Polypodium quòd lapidibus innascitur humidi-
 tate excrementosa, cruda, flatulenta, ventriculum ad nauseam euertente abundat:
 præstantius quòd arboribus, præsertim glandiferis innascitur, præcipuè quòd
 magnum est, recens, solidum, nodosum, foris ex nigro rubescens, colote intus
 herbaceo, vt pistacium, sapore dulci, austero, tandem subamaro, nonnihil aroma-
 tico. Dioscoridi calidum est tertio gradu, siccum secundo. Humores crassos, len-
 tos terget, digerit, siccat, bilem atram & pituitam vel crassam, vel lentam purgat,
 etiam à iuncturis. Affectibus ob hæc melancholicis prodest, vt quartanis, præser-
 tim cum mulsâ, e pithymo, sale in dextrocolico etiam dolori, & splenis, duritiei quo-
 uis modo vsurpatum. Contra rimas quæ inter digitos sunt tritum illinitur: cor-
 pora enim extenuat & siccat. Ne verò ventriculum ad nauseam euertat, vtque ci-
 tiùs vacuet, datur ex mulsâ vel aqua hordei, vel decocto vuarum passatum, vel ex
 iusculo gallorum & gallinarum, vt suasit Hamech, coctum, vel sero lactis. Bibitur
 vtilissimè mixtis seminibus odoris, vel aliis aromaticis, vt Dauco, aniso fœni-
 culo, zingibere, vel simili, animam & facultatem ventriculi naturalem corrobora-
 nte. Longam satis coctionem sustinet. Datur à drachmis duabus ad aureos
 quatuor. Quod Mesues Polypodium magnum alij præfert, Dioscorides & Plinius
 crassitudine minimi digiti esse aiunt. Quod scribit Dioscoridi calidum esse ter-
 tio gradu, siccum secundo, id falsum est. Bilem enim, inquit ille, & pituitam tra-
 hit sine graduum mentione, quorum nec meminit Galenus. Auicennæ calidum
 est secundo gradu, siccum tertio. Paulo Ægin. Polypodij radix læuis mulsâ in-
 spersa, aut cum ea contrita, eundem quem colocynthis effectum præstat. Præterea
 quod ille ait Polypodium corpora extenuare, & ventriculum ad nauseam euer-
 tere, item Plinio stomachum ab eo offendi, negat Auerroës, qui censet Polypo-
 dium securum esse medicamentum, & epithymo præstantius, cui assentitur Ma-
 nardus afferens Polypodium imbecilliter & leniter purgare: quare corpora exte-
 nuare non posse, idemq; per se exhibitum nullam stomacho inferre iniuriam. In
 eadem est sententia Actuarius. Filicula bilem & maximè atram, ac pituitam du-
 cit. Dantur purgatæ radices semi scrupuli affusa aqua mulsâ: purgat quoque me-
 dioctiter & citra molestiam, in gallinaceo iure, & in pistanz cremore cocta ra-
 dix. Hæc Actuarius. Quantum ad dosim attinet, vncia vna nostratis vacuat pa-
 rum & sine molestia.

Cornas.
Embl. 164.

Li. 8. simpl.

Li. 2. medi.
purg.

Li. 2. c. 112.

Li. 6. meth.

ALSINE.

CAP. XI.

Nomen



ΑΣΙΝΗ Græcè & μυσώρις, Latine etiam Alfine, & auricula muris, & recentioribus quibusdam Hippia dicitur, vulgò Morsus gallinæ, inde Gallis *Morgiline*, quòd gallinis & auriculis cibo grata sit, exq; caueis inclusæ, ac cibum fastidientes herba ista tectentur, Germanis

ALSINE, Matthioli.

Genera.

Lib. I. c. 34.

Cap. 7. hist.

Forma.

Locus.

ALSINE Maior,
Dodonai.

Vogelkraut, Italis *Centone*, *Pizza gallina*, & *Panama*, quòd iunioribus anseribus gratum sit pabulum. Alfine autem quòd lucos, quæ Græci ἀλὼν vocat, vmbrosaq; loca & nemorosa amat. Auricula muris, quòd muris auribus folia similia habeat, siue ob magnam admodum cum vera Myosotide foliorum similitudinem. Quâvis Dioscorides, Galenus, Plinius vnus tantum Alfinem mentionem fecerint, tamen recentiores multo plura eius adinuenerunt genera. Dodonæus quatuor, maiorem scilicet Alfinem, mediam, minorem, & marinam. Fuchsius tria, maiorem mediam & minorem. Alij maximam seu maiorem aliam addiderunt: Præterea vernam, nodosam, muscosam. Alfine, vt breuiter describit Dioscor. herba est similis helixiaz, sed humilior, foliis longioribus, vel, vt quidam, nõ absque ratione, legunt, minoribus, (μικροφύλλα) & non hirsuta, quòd Plinius ostendit, cum minorem esse testatur. Cum teritur odorẽ cucumeris reddit. Vmbrosis locis, lucisque gaudet: vnde illi nomen. Ita

ALSINE Media, siue minor
Dodon. maior Fuchsy.

Plinius

ALSINE Minor sive minima, Dodon.



ALSINE, Maxima.



Plinius, planè ex Dioscoridis sententia. Alsine quam quidam myosorida appellant, nascitur in lucis, vnde & Alsine dicta est. Incipit à media hyeme, arescit ætate media: cum proreperit, musculorum aures imitatur foliis. Sed aliam docebimus esse, quæ iustius myosoris vocetur. Hæc eadem erat quæ helxine, nisi minor nihilque hirsuta esset. Nascitur in hortis & maxime in parietibus, cum teritur, odorem cucumeris reddit. Quæ primo loco hic picta datur, Martioli sententia Alsine est Dioscoridis, & aliorum veterum. Cauliculis serpit rotundis, geniculatis: foliis circa singula genicula ex aduerso collocatis, helxines, multo minoribus, non hirsutis, cum teruntur herbaceum cucumeris odorem, non illam peponis maturi iucunditatem subolentibus: flore exiguo, candido, foris herbaceo, stellato: semine exiguo in siliquis rotundis, oblongis. Hæc Alsine est media Dodon. maior Fuchsij, cuius folia cum videret multo minora helxines, id est, parietariæ foliis, Dioscoridem (non rectè) censet illa helxines, quæ cissampelos alio nomine dicitur, foliis comparasse. Alsine maior Dodon. plurimos ramulos rotundos, geniculatos, rectos, non humi repêtes, vt prior, edit, ex singulis geniculis bina folia sibiipsis aduersa, satis ampla, aliquando duorum digitorum ferè latitudine, helxines, id est, parietariæ foliis haud dissimilia, longiora, minus hirsuta. In cauliculorum fastigio inter folia exêut petioli cum capitulis exiguis, quæ in stiloculos exiguos, & incisos dehiscunt, quibus dilapsis reperis siliquula, longiusculas & rotundas, in quibus semen. Tota herba ad parietariæ faciem saris accedit. Sunt enim in ista cauliculi æquè pellucidi, circa genicula rubescences, folia eiusdem ferè amplitudinis. Ex quibus effici vult Dodon. genuinam hanc esse Dioscoridis Alsinen, scribentis eam helxinem ferè, ni humilior esset, foliis longioribus & non hirsuta. Tertia Dodon. Alsine

In cap. 32. lib. 4.

Lib. 6. 34. Cap. 7. hist.

Alsin. maior. Dodon. Forma.

Alsin. minor. Dodon.

Forma.

quæ minor est, & dicitur, ab ea quæ primo loco descripta depictaque est, quam mediam Dodonæ esse diximus, parum differt, sed omnibus suis partibus multo minor est, ita vt cauliculi capillari sint tenuitate, folia haud maiora foliis thymi, cætera supradictæ similis. In vmbrosis & humidis locis proueniunt, & in sepibus & dumetis cum cæteris herbis. Aliorum herbariorum Alsine maior, sine maxima, radice est supernè crassiuscula, paulatim gracilescente innumeris fibris capillata: caulibus multis, pedalis, foliis Alsinæ primæ, per interualla sicipè quaternis, interdum singulis, interdum binis, ramulis multis, breuib, copiosum florem producentibus, antequam hiet oblongo & acuminato capitulo inclusum, cum apertus est, candidum, exiguum, radiatum, sex foliolis constantem, ac totidem filis tenuissi-

Loos. mis. In opacis gignitur. Alfine verna appellata in agris humentibus & vitibus cre-
Alfin. ver- scit, radícula breui, exili, candida: foliis cæterarum Alfinarum similibus, læuibus, è
na. viridi pallentibus, circa radicem multis, terræ instratis, cauliculis multis, tres digi-
 tos altis nodosis, foliis binis ex singulis articulis

ALSINE, Verna.



Alfin. Mus-
cosa.

ALSINE, Nodosa.



Alfin. vil-
losa.

caulibus multis humi iacentibus, rotundis, ima parte subtubentibus: foliis Alfine
 vulgarisimilibus, crassioribus, lætiùs virentibus, ordine dispositis, gustu amaris: flo-
 re pusillo, luteo, ex quinque foliolis composito: semine minutulo, in caliculis ro-
 rundi: foret Iunio. Aliam tradit Alfinem Clusius, quam Corniculatam nominar.
 Palmatis herbula est, vnico caule, in ramulos aliquot fissò, geniculato, teneto, hir-
 suto vr in Alfine vulgari: folia alfinis paulò oblongiora, hirsuta etiam, inret sese
 opposita, & ex interuallis gemina: alarum cauis insident pusilli flores candicantes,
 quibus

prodeuntibus, cauliculum amplectentibus, in-
 tertum quaternis, interdum senis in singulis
 cauliculis: flosculis albis, quinque foliolis con-
 stantibus, Alfinis reliquis similibus, sapotis
 aquosi & fatui. Nondum prorsus exacta hyeme
 Februatio mense floreret, appetete Vere, aliz me-
 dia æstate, quamobrem Alfinem vernam herba-
 rij nuncuparunt. Alfine nodosa in agro Mon-
 speliensi plurima gignitur, radice simplici, lon-
 ga, parum capillata, ex candido flauescente: fo-
 liis propè tetram multis, longiusculis, angustis,
 Alfinis haud multum dissimilibus: caulibus
 multis, pedalis: flore albo, ex quinque folio-
 lis composito: semine in nodosis striatisq; glo-
 bulis multis, sese ordine consequentibus, & quasi
 verucula transfixis, peculiari omnino figura.
 Alfine muscosa in truncis putrium arborum
 mucosis, in vdis aspergine patietibus, & aliis
 opacis humidisque locis prosilit, radice tenui,
 breui, capillata, ramulis multis, per humù spar-
 sis, à tetra modicè sese attollentibus: foliis par-
 uulis, exilibus, capillati tenuitate, densis: flore
 albo, semine in loculis oblongis. Alfine villosa
 in lapidosis gignitur, radice parua, breui, can-
 dida, in fibras tenues fissà: foliis Alfinis, caulem
 per interualla æquis spatiis alarum modo am-
 plectentibus, hirsutis, vnde ei cognomen tum:
 caulibus multis, pedalis, lanugine quadam
 obductis: flore albo, decem foliolis constante,
 Bellidi non absimili. Floret maio mense. Alfine
 purpurea in agris pinguibus propè Monspeliu
 nascitur, radice tenui sublutea: caulibus multis:
 foliis Alfinis, paulò amplioribus, læuibus, pari
 ordine caulem vtrinque amplectentibus: flore
 putpureo, quinque foliolis constante: semine
 in caliculis membranosis, oblongis, infernè tra-
 cilibus, supernè crassioribus. Alfine lutea in vm-
 brosis abietum siluis, & niuosis montium cacu-
 minibus nascitur, radice multis fibris capillata,

ALSINE, Muscosa.



quibus succedūt cornicula membranæ & trans-
parentia, gallinaceorum calcarum forma, quæ
lento quodam conspersa humore tangētibus de-
prehenduntur: semen in illis exiguum, cum ma-
turiuit nigrum: radix inutilis & annua. Tota in-
sipida est. Inter segetes agro balmanticensi fre-
quens, ubi Maio floret, & semen percipit, fortasse
Nigellæstri genus. Alsine, auctore Dioscoride,
refrigerandi astringendique vim habet, oculo-
rum inflammationibus cum polenta illita con-
uenit. Succus eius aurium doloribus instillatus
prodest. In vniuersum eadem quæ helxine po-
test. Vfus eius, inquit Plinius, ad collectiones
inflammationesque; & ad eadem omnia quæ
helxine, sed inhiuiss Epiphoris peculiariter
illinitur: item verendis, vlceribusque cum fa-
rina hordeacea. Succus eius auribus infunditur.
De quibus apertius Galenus. Alsine aut myo- Lib. 6. sim.

Lib. 4. c. 12.
Vires.

Lib. 37. c. 4.

ALSINE, Purpurea.



ALSINE, Læta.



sota facultatem helxines obtinet, nempe refrigerantem & humectantem. Est enim essentia aquea, frigida: quare & citra adstrictionem refrigerat. Quocirca ad feruentes phlegmonas & mediocria erysipelata competit. In quibus Galenus aperte Dioscoridi contradicit scribenti Alsinem *διουρακὴν ἢ χεῖρ ἢ ποδὸν*, & *καλὴν*, id est, vim habere refrigerantem & astringentem. Sed vocem *καλὴν* pro qua non absurdè quidam legunt *ἰσχυρὴν*, temerè, & præter Dioscoridis mentem in contextum insertam fuisse, perspicuum est ex iis, qui ex Dioscoride & Galeno plantarum historiam & facultates excerpserunt, qui eam vocem non habent.

Sic

Lib. 7.

ALSINE Corniculata,

Lib. 7.

Clusij.

Cap. 7. hist.

Dodo. lib.
cap. 34.

Nomina



Lib. 15. cap.

rom à fleurs rouges & blanches, Germanis *Gauch begel*, quali salus fatuorum: quod nomen forte à Germanis inditum est, quod Anagallis in limine vestibuli suspensa contra maleficiorum introitum pollere credita sit. Plinius corchoron à quibusdam appellari tradidit: Et corchori vox habetur etiam inter nothas Dioscoridi adiectas. Sed an id de corchoro Theophrasti sic accipiendum iure dubitari potest, & an is corchorus sit Anagallis. Is enim corchorum inter olera quæ ciuda coctæve eduntur recenset his verbis. *ἰν οἷς καὶ παλαιὰ καὶ νέαι εἰσι διὰ τὴν ἀντοχὴν καὶ ὀρεχθὸς, ἔχον τὸ φύλλον ἀκανθώδες.* Id est, In quibus & corchorus est, ob amaritudinem in proverbum translatus, folio ocimi figura. Est & apud Græcos frequens proverbum, καὶ κόρχος ἐν ἀρχαίοις. Id est, Etiam corchorus inter olera, dici solitum in homines nullius pretij, qui tamen in numero aliquo studeant haberi, ut corchorus genus oleris vilissimi habeatur, quod Plinius inter herbas in cibis vulgares numerat, supra citatum Theophrasti locum exprimens. Dioscorides duo anagallidis genera esse tradit, quæ tantum flore distant. Nam quæ cæruleo flore est, semina dicitur, mas quæ phæniceo. Totidem genera herbarij omnes constituunt, & norunt ex Dioscoridis descriptione, quæ est huiusmodi. Anagallides frutices sunt parvi, in terra iacentes, folia in quadrangulis cauliculis pusilla habentes, & subrotunda, ad helxines folia accedentia: semen rotundum. Eadem Plinius

ANAGALLIS, Mas.

Lib. 7. hist.
cap. 7.

Lib. 15. cap.

Lib. 1. cap. 34.

Genera

Forma.
Idem.

Lib. 15. cap.



ANAGALLIS, CAP. XII.



ΝΑΓΑΛΛΙΣ Græcè, ut & Anagallis Latine, Officinis inusitata, non morsus gallinæ, ut vult Matthiolus, qui est alsine, Galis *Mou-*

chorus sit Anagallis. Is enim corchorum inter olera quæ ciuda coctæve eduntur recenset his verbis. *ἰν οἷς καὶ παλαιὰ καὶ νέαι εἰσι διὰ τὴν ἀντοχὴν καὶ ὀρεχθὸς, ἔχον τὸ φύλλον ἀκανθώδες.* Id est, In quibus & corchorus est, ob amaritudinem in proverbum translatus, folio ocimi figura. Est & apud Græcos frequens proverbum, καὶ κόρχος ἐν ἀρχαίοις. Id est, Etiam corchorus inter olera, dici solitum in homines nullius pretij, qui tamen in numero aliquo studeant haberi, ut corchorus genus oleris vilissimi habeatur, quod Plinius inter herbas in cibis vulgares numerat, supra citatum Theophrasti locum exprimens. Dioscorides duo anagallidis genera esse tradit, quæ tantum flore distant. Nam quæ cæruleo flore est, semina dicitur, mas quæ phæniceo. Totidem genera herbarij omnes constituunt, & norunt ex Dioscoridis descriptione, quæ est huiusmodi. Anagallides frutices sunt parvi, in terra iacentes, folia in quadrangulis cauliculis pusilla habentes, & subrotunda, ad helxines folia accedentia: semen rotundum. Eadem Plinius

ANAGALLIS, *Femina.*



ANAGALLIS *Lutea,*
Lobellj.



nus scribit. Anagallida aliqui corychoron vocat. Duo genera eius. Mas, flore phœniceo: fœmina cœruleo, non altiorem palmo, frutice tenero, foliis pusillis, rotundis, in terra iacentibus. Nascuntur in hortis & aquis. Prior floret cœrulea. Hic utraque Anagallis nostra passim fruticat teneris cauliculis, quadrangulis, geniculatis, per humum sparsis, & foliis Alſines medix, rotundioribus, superne viridibus, & minutis punctis nigricantibus signatis: floribus copiosis, in hac phœniceis, in illa cœruleis: semine pusillo, circinato in pericarpis. Virginosis locis lætior provenit. In arvis tamen, vineis, & secus vias etiam reperitur. Floret mense Maio usque in Autumnum, & per ætatem utriusque provenit maximus, potissimum mense Augusto. Pena luteam Anagallidē esse scripsit, visu pulchram & raram transmarinis regionibus, crebram in Angliæ nemoribus, locisque opacis. Mense Iunio & Iulio flores promit luteos: vmbrosis gaudet, cœtera mari & fœminæ similis. Utraque Anagallis Dioscoridis, vim habet mitigandi, inflammationē arceat, surculos extrahit, ulcera serpentia compescit. Succus earum gargarizatus pituitam capitis purgat, & naribus infusus, dentium dolores sedat, si in contrariam aurem iniiciatur. Argema cum melle Attico purgat, & oculorum caligines luat. Prodest & a vipera commotus cum vino potus: item nephriticis & hepaticis. Additur in vetere codice *ἡ ἰσχυρὰ πικρὴ*, id est, & hydropicis. Postremo, Dioscorides ex aliorum historiis recenset, Anagallidem quæ cœruleum habet florem, prolapsam sedem reprimere, quæ verò phœniceum illitu euocare: Quorum sententia Anagallides nō solum flore, sed & effectu differrent. Eundem usum medicum docet Plinius, his verbis. Utrinque succus caliginem oculorum discutit cum melle, & ex ictu cruorem, & argema, rubetis magis, cum Attico melle inunctus. Pupillas dilatat: & ideo hoc inungitur ante, quibus paracentesis fit. Iumentorum quoque oculis medetur. Succus caput purgat per nares infusus, ita ut deinde vino colluantur. Bibitur & cœtera angues succi drachma in vino. Mirum quod pecora fœminam vitant. At si decepta similitudine (flore enim tantum distant) degustauere, statim eam quæ Asyla appellatur, in remedio quaerunt: ea à nostris ferus oculus vocatur. Et, locinori Anagallides mirè profunt. Et, Aluum purgat Anagallis ex aqua mulla. Rursus, Anagallis cœrulea procidentia sedis retroagit, & diuerso rubens prorritat. Sed de his multò clariùs & distinctiùs Galenus locutus est. Anagallis utraque tam ea quæ cœruleum habet florem, quàm

Locus.

Tempus.

Lib. 2. c. 74
Vires.

Lib. 2. c. 10

Lib. 2. c. 7.
Ibid. cap. 8.

Lib. 6. sim.

ea quæ

eaquæ purpureum admodum extergentis sunt facultatis. Habent verò quandam etiam calorem attractorium, ita ut & infixos corpori aculeos extrahant. Succus earum ex naribus purgat eadem de causa. In summa autem desiccandi vim habent citra mordacitatem, quamobrem & vulnera glutinant, & putrida adiuuant. Hæc Galenus, ex quibus colligere licet errare eos, qui anagallidas frigidas & humiditas esse statuunt, cum sint calidæ siccæq; ac detergentis facultatis, ita ut mulieres quæ asperiores ac decolorem à natura cutem acceperint, ad leuorem nitoremq; vultus harum succo utantur. Paulus in compositionem ex corallio podagricam, recipit anagallidis russeum florem habentis, quam vocant corallium, vnciam. S. his verbis. *Αναγάλλιδος τῆς τὸ ρόσσεον ἄνθος ἰχθύος, ἢ ἐγλῆσι κοράλλιον Γο.* S. Hic russeum Latina voce puniceum vocat colore, & anagallidem corallium ex colore floris puniceo. Sunt tamen qui ex vetustissimorum exemplarium fide *καλλὰρον* legendum esse censent, & ipsam compositionem *διὰ καλλάρου* inscriptam esse, non *κοράλλιν*, ut nonne collarij ex glutinandi vi anagallidum accepisse intelligatur. Minime tamen absurda fuerit vulgata lectio.

ib. c. n.
Cor. Emb.
163. lib. 2.

ELATINE,

CAP. XIII.

Nomina
Lib. 4. c. 16.
Forma.



Lib. 17. c. 9.

Lib. 2.

In cap. 16.
lib. 4.

ELATINE Prior, Dodon.

ELATINE, Matthioli.



numulariam

nummulariâ quam vocant, item eos qui pimpinellam Elatinen esse cõsent. Etenim nummulariæ folia pilosa non sunt, neque in segetibus, neque in culis proveniunt, sed in serobium marginibus, præsertim vlagine madentibus. Pimpinella verò multo plures tenuis ramulos edit, in terram procumbentes, folia toto ambitu laciniata.

ELATINE Altera,
Dodon.



ELATINE Polychides,
Dalechampy.



Ruellius Elatinem vulgò campestre rapistrum vocari scribit, cuius sententia Matthiolo minime placet. Idem Ruellius eorum refellit opinionem, qui pilosellam Elatinen esse putant, reclamantibus aperte naturalibus, totâque facie. Matthiolus penultima editione ingenuè fatetur se plantam, quæ veram Elatinem referat nõ vidisse, picturam tamen exhibet plantæ hirsutæ, cuius folia notulis signata sunt, & ad foliorum helxines cissampeli figuram accedunt. Postrema editione eandem depinxit Patauius, à Jacobo Antio. Cortuso ad se missam, cui nihil deesse ait, quod desiderari possit. Eam tamen nec describit, nec vires explicat. Hic oritur quæstio, cum folia elatines foliis helxines comparat Dioscorides, helxinene cissampelos accipienda, an helxine parietaria vulgò dicta? Serapio Elatinem volubilis minoris speciem cõstituens, eiusque foliis Elatines folia similia esse scribens, helxinen cissampelon intelligere videtur. Pauli interpretes helxinen parietariam. Elatine, inquit, herba est parietariæ similis. At verò probabile est Dioscoridæ similes plantas similibus cõiungere solitum, & Elatinen helxinæ cissampelo subiicientem, huic illius folia comparasse. Dodonæus Elatines genera duo describit & depingit. Vnâ quæ à quibusdam Morfus gallinæ nuncupatur, similiter à Germanis *Hunerbyse*, & à Belgis *Handerbert*, id est, morfus gallinæ. Alteram quæ à Germanis *Hunerferb*, à Belgis *Handerme*, id est, hereditas gallinæ. Prior elatine cauliculis multis fructicat, hirsutis, auriculæ inuris modo: foliis subrotundis, aspetis & hirsutis, sæpius parùm incis: cætera alsinæ nõ multum dissimilibus, flores cæruleos aut purpureos edit, deinde parua capitula, in quibus semen includitur. Hanc Fuchsius nomine Allines medix depinxit. Morfum Gallinæ folio hederulæ vocat Lobellius. Altera Elatine similes priori cauliculos edit, sed longiora folia, angustiora, toto ambitu crenata: flores cæruleos semen in binis folliculis iunctis: radicem fibratam. Vtraque locis umbrosis, incultis, secus vias & in agrorum marginibus frequens. Maio mens-

Lib. 294.

Cap. 42.

Lib. 7.

Lib. 2. 57.
Genera.

Forma.

Lib. 7. hist.

Locus.

Tempus.
Pens in
Adoct.

se & Iunio florent. Recentiorum quidam, iudicij periti, & admodum in hac scientia exercitati, veram ac legitimam antiquorum Elatinen viribus & figura consentientibus eam esse credunt, quæ à Germanis præsertim à Fuchsio Veronica formi-

ELATINE, *Triphyllus*.LAPPULA *Ruffi. Elatine Tragi.*VERONICA Famina,
Fuchsy.Elatine tri
phyl.Lib. 1. c. 64.
Lappula
Ruffi elati
ne Tragi.

agris frumentariis nascitur, surculosus, surfectioni non dissimilis, folio non prorsus rotundo, at minori, foliis parietariæ exiguae, aspero, ita ut vestibus facile adhærescat, lanuginoso, cærulei coloris, lithospermi instat, sterculos gerit cæruleos, qui tandem in echinos lappaccos vestibus adhærentes abeunt, quod & semen eius est, coriandrum

navocitatur, mirificè ad cruenta, ac vetera vulnera & vlcera sananda, scabiem denique, & omnia cutis vitia commendata, de qua diximus libro de Palustribus, cap. 35. Neutram verò illarum quas proposuit Dodonæus, Elatine Dioscoridis esse contēdunt, quod prior, figura plurimum distat ab helixine posterior, nec foliis sit villosis, nec helixinæ similibus: verius Elatine dici posse, quàm is pro myosotide secunda depinxit, de qua hoc libro tractauimus. Cæterùm secundæ Dodonæi Elatine herba hic depicta congener est: foliis tamen discrepat maioribus, crebrius, profundiusque incis, unde ei cognomentum, circa caules densioribus. Nascitur in aridis & sabulosis. Habetur & alia Elatine à quibusdam herbariis, quæ dicitur triphyllus, squallidis & sabulosis gaudens, radice gracili, quatuor digitos longa, candicante, modicè fibrata, foliis parvis, simul ternis, ut in loto: quam ob causam triphyllon cognominarunt: flore pusillo cæruleo, per ramulos sparsos semine minuto in loculis Elatinarum modo, tãquam geminis. Trago Elatine est fructus exiguus qui in

coriandrum magnitudine æquantes. Qua ex causa Germani quidam *Klettenkraut*, id est, lappaceam herbam nominant. Vim habent Elatines folia, auctore Dioscoride, cum polenta illata, inflammatos, & fluxione infectos oculos iuvandi. Ipsa herba cocta & absorpta dysenteriam sistit. Plinius eadem prorsus tradidit. Elatine gustu acerba, & ideo oculorum fluxionibus efficax, foliis cum polenta tritis & impositis, subito linteo. Eadem cum lini semine cocta sorbitionis usu dysenteria liberat, quorum effectuum rationem breuiter docet Galenus, cum scribit. Elatine modice tum refrigerat, tum adstringit.

Ibidem.
Ures.
Lilij. ca. 9.

Lib. & Gen.

HELIXINE, CAP. XVIII.

P'AZINH & *τροπαιχον* Græcè, Latine etiam Helxine, Perdicium, Vrecolaris, herba muralis, & Parcheniū Celso dicitur, aliis fideritis, aliis heraclea, Officinis parietaria, Gallis *Paruire* & *Parietaire*, Germanis *Tagundnach*, *Glasckraut*, Italis *Parietaria* & *Vitriola*, Hispanis *yerna del muro*. Dicta autem est Helxine, quòd aspera foliorum hirsute, asperòq; semine tenaci nexu vestimentis obuiis adhæreat. Perdicium, quòd perdicæ ea libenter vescantur. Vrecolaris, quòd detergendis vrecolis vasifq; vitreis efficax sit. Muralis & Parietaria, quod muros ac parietes natales locos sibi elegerit. Nominari autem par-

Nomina
 Lib. C. 14

Lib. 4. c. 148.

Lib. 44.630.

Lib. 4. c. 84.
Lib. 22. c. 17.

Ibid.
Forma.

Lib. 11.6.17

Locus



VRTICA, CAP. XV.



ΚΑΛΥΦΗ & κισλὺ Græcis, Vrtica Latinis nuncupatur, Atabibus *Nomina*
Hunware, Vrauhlatum, Angara, Gallis Ortie, Italis Ortica, Hispanis Ortiga,
Germanis Nessel. Officinæ latino nomine videntur. Acalyphe, auctore
Athenæo, καλὴ ὑπομυσαδὸν τῆς ἀνιφθορίας ὠδυνώσας. ἢ γὰρ πρὸς τὴν ἑστὴν, καὶ
ἀπαλὴν τῇ ἀσπίδι, καὶ χαλκῶδι καὶ ἀσπίδι. Id est, acalyphe bo-
no nomine per antiphrasim nominata est, neque enim

VRTICA I. Martb.



tactu suavis & mollis, sed aspera & iniucunda, vel ὅτι
ἢ καλὴν ἀντὶ τῆς ἀσπίδος, id est, quod iniucundo sit tactus:
pruriginē enim ciet. Cnide autē, quod vellicet, pun-
gat, & suo morfu sensum laceflet, à verbo καίω, *Lib. 4. c. 89.*
quod pungere ac vellicare significat. Vrtica ab vren-
do, quod pruritus pustulæque igni similes excitet.
Dioscorides duo Vrticæ genera esse ait. Vnam, quæ
siluestrior est, asperior, latioribus & nigrioribus fo-
liis, semine lini semini simili, sed minore. Alteram
non æquē asperam minuto semine. Plinio differen-
tiæ plures. Ex omnibus his generibus, inquit, Vrtica
maximè noscitur, acetabulis in flore purpuream la-
nuginem fundentibus, sæpè altior binis cubitis. Plu-
res eius differentiæ, siluestris, quam fœminam vo-
cant, mitior. Et in siluestri quæ dicitur Cania (Cor-
narius legit canina,) acrior, caule quoque mordaci,
fimbriatis foliis. Quæ vetò etiā odorem fundit
herculeana vocatur. Semei omnibus copiosum, ni-
grum. Mirum sine vllis spinarum aculeis lanuginem
ipsam esse noxiam, & tactu tantum leut pruritus
pustulæque confestim adustum similes existere.

VRTICA II. Martb.



Notum est & remedium olei. Sed mordacitas
non protinus cum herba ipsa gignitur: nec nisi
solibus roborata. Incipiens quidem ipsa nasci
vere, non ingrato, multis etiam religioso in ci-
bo est, ad pellendos totius anni morbos. Silue-
strium quoque radix omnem carnem tenerio-
rem facit simul cocta. Recentiores alia adiece-
runt genera, de quibus ordine dicitur. Vrtica
prima Dioscoridis est quæ siluestris & mæ, &
Romana dicitur, non ob natales, est enim ca-
lidioribus regionibus vt Hispaniæ, Narbonæ,
Italix frequentior & vulgarior, sed propter se-
minis maioris maiorem efficaciam, caulibus ro-
tundis, cauis, flexuosis, asperis & hiscitis: folijs
longis, asperis, mordacibus, vrentibusque, altius
quàm ceteræ Vrticæ incisus, inter quæ & cau-
lem è petiolis paruis pèdent pilulæ villosæ echi-
num referentes, plene semine fusco, compresso,
lubrico, lini, sed rotundiore & minore. Rara in
septentrionalibus regionibus, nisi ab herbariis
in hortis colatur. Secūda Vrtica communis,

Lib. 4. c. 89.

Lib. 4. c. 89.
Genera.

Lib. 4. c. 89.

Embl. 79.
lib. 4.

Forma

Vrtica. 2.
canina.



VERTICA, Oleophyllas.



Locus.

Vertica.
Hercu.

Forma.

Lihacapa.
Vertica oli-
goph.
Ibid.

Forma.



vertica fœmina, Vertica maior, supradictæ æqualis
caulium proceritate atque asperitate, interdum e-
riam procerior, foliis hirsutis, punctoriæ vstionis
dolorem inurentibus, nigrioribus, interdum rube-
scentibus, non tam altè ferratis: semine in filamentis
racemosis deorsum vergentibus, milio simili, sed
minore, subrufo: radice longa, gracili, lutea, huc il-
luc serpente. Maximo importunoque prouentu hac
cômuni vertica tota scætet Europa. Vertica tertiã mi-
nor, Canina Plinij, acrior, similis planè maiori com-
muni, sed minoribus foliis, & viridioribus, & caule
breuiore, rotundo, hirsuto, magis mordaci & vrente
vi: semine crassiusculo: radice breuiore. Formosissi-
ma ea est Vertica, quæ in siluis ac dumetis nascitur,
caule & herba vulgari confimilis, grauissimi odo-
ris, attamen grari quemadmodum & melissæ, pur-
pureis floribus circa caulem vsque ad summum ve-
stita, instar spicæ vel ocimi. Semen huius quoque in
folliculis continetur retes, nigrum, minutius semine
rapi, per omnia ocimi semen referens. Herculeam
Verticam Plinij Tragus esse arbitrat. Inter ma-
gnas & vrentes Verticas ponitur à Trago ea quæ à
foliorum paucitate meritiò oligophyllos dicenda est, radicibus longis, in sese con-
rortis & implicatis, humi serpentibus, coloris crocei. Aduentante Vere quotannis
nouas cymas emittit, vnde nonnunquam vna de radice quini, seni, aliquando plu-
res, interim & pauciores asperrimi, lanuginosi ac quadrati caules prodeunt, quo-
rum alij asperrimis & spadiceis, alij nigrioribus, & vndiq. instar ferræ incisus folijs
vestiuntur. Semen cauli inter folia expansis fibris adnascitur, quod vbi autumnii
tempore

tempore maturuerit, & extritum fuerit albidum esse, & ad figuram unilij (licet minus illo sit) accedere apparet. Hæc Vrtica vehementer adurit, sua sponte affatim luxurians, agricolis vt & cæteræ omnes vrentes inaximè inuisa. Sed Vrtica: id vnicum vitium multis aliis commodis pensant. Folia enim imposita cum sale canis morsus sanant, inquit Dioscorides, gangrenas, carcinomata, sordida vlcera & cacothemitum luxata, tubercula, parotidas, panos, abscessus. Eadem lienosis cum cerato imponuntur. Faciunt & ad sanguinis è naribus eruptiones folia cum succo trita iodata. Menses cient trita cum myrrha subdita. Vterum prolaptum restitunt folia recentia admota. Semeo ex passò potum ad venterem concitat, & vterum aperit. Idem cum melle delinctu orthopnoeæ, pleuritidi & peripneumoniz prodest. Educti & quæ in thorace hærent. Admiscetur quoque erodeoribus medicamentis. At folia cum conchis cocta aluum emolliunt, vrinam mouent, inflationes discutunt. Verum cum pituita cocta quæ in thorace hærent educit. Decoctum foliorum cum modica myrrha menses mouet. Succus gargarizatus vnam inflammata reprimat. Sic enim conuertere oia hæc Græca: ὁ δὲ χυλὸς ἀνταρραγιστὴς ὁ δὲ καὶ κωνιδία φάρμακον ὡς ποτὶ τὸν σπλῆν: non quemadmodum vertit Ruellius, Inflammatione turgentem gargarizatus succus exprimit. Nam reprimere est vna ipsam, humorè quæ illapso repellere ad loca vnde fluxere, id quod expedit in partis illius inflammatione. At exprimere contra est ad externa premere, quod est maxime noxium partibus inflammatione teoratis. Plinius Vrticæ vires & vsum medicum exponit plane ex Dioscoridis sententia, sed fusiùs, vt Dioscoridi intelligendo non parum lucis adferat. Vrtica, inquit, quid esse inuisum potest? At illa præter oleum quod in Ægypto ex ea fieri diximus, vel plurimis scatet remediis. Semen eius cicuræ contrarium esse Nicander affirmat item fungis, & argento viuo. Apollodoros & salamandris cum iure decoctæ testudinis. Item aduersari hyosciamon, & serpentibus, & scorpionibus. Tum illa ipsa amantudo mordax vnas in ore, proidentè quæ, vulvas, & infantium sedes tactu resiliere cogit: lethargicos expurgat factis erubus, magisque fronte. Eadem canis moribus addito sale miscetur. Sanguinem trita naribus indita sistit, & magis radice carcinomata, & sordida vlcera sale admixto item luxata sanat & panos, parotidas, carnesque ab oculis recedentes. Semen potum cum sapa vulvas strangulantes aperit, & profluvia narium: sistit impositum. Vomitiões in aqua multa sumptum à cœna faciles præstat, duobus obolis: vno autem in viuo potu lassitudines recreat. Vulvæ vitis tostum, acetabuli mensura: potum in sapa resistit stomachi inflationibus. Orthopnoicis prodest cum melle, & thoracem purgat, eodem eclegmate. Et lateri medetur cum semine lini addunt hyssopum & piperis aliquid: illinitur lieni. Difficilem ventrem tostum cibo emollit. Hippocrates vuluam purgari potu eo pronunciat. Doloze leuari tosto acetabuli mensura cum dulci poro, & imposito cum succo malux. Intestinatorum animalia pellit cum hydromelite & sale. Desluvia capitis semine illito cohonestari. Articularibus morbis & podagricis plurimi cum oleo vetere, aut folia cum vrsino adipe trita imponunt. Ad eadem radix tusa cum aceto non minus vilis: item lieni. Et cocta in vino discutit panos, cum axungia vetere, salsæ eadem psilochrum est sicca. Condidit laudes eius Phnias Physicus, vtilissimam cibis coctam conditamve professus, arteriæ, tussi, ventris destillationi, stomacho, panis, parotidibus, pernionibus: cum oleo sudorem, coctam cum conchyliis ciere aluum, cum pituita pectus purgare, mulierumque menses: cum sale vlcera quæ serpunt cohibere. Succus quoque in vsu est. Expressus illitusque fronti sanguinem narium sistit: potus vrinam ciat, calculos rumpit: vnam gargarizatus teprimat. Semen colligi melsibus oportet. Alexandrinum maxime laudatur. Ad omnia hæc & mitiores quidem teneræque efficaces, sed præcipue siluestris illa in vino pota, quæ &

Vrtica.
بوالهنا

And.Laci.

Liliac.

amplius, lepras in facie tollit. Si quadrupes in initum non admittant, Vrtica naturam fricandam monstrant. Galenus euidentiùs & vires & effectus Vrticæ tradit, tanquam de vno genere loquens. Vrticæ herbe & semen & folia, (nam hæc potissimum sunt vsui) admodum digerentis sunt facultatis, adeo vt & phymata & parotidas sanent. Sed & quiddam flatuosum obtinent, quo & venerem extimulent, maxime si cum passo semen bibatur. Porro quod non vehementer exalfaciât, sed multum tenuium sit partium, testimonio est crassorum viscosorumque humorum ex pectore pulmoneq;eductio, cum quod partes quas contigerit, pruriant. Porro flatuosum eius cuius esse particeps dicta est, dum concoquitur, nascitur. Non enim actu flatuosa est, sed facultate. Ventrem autem subducit modicè, ipsâ duntaxat abstersione, ac veluti titillatione, non purgatione. Et gangrenosa, & canerosâ, & in totum quæ exficari citra mordacitatem postulant, ea conuenienter sanat, nimirum cum subtilium sit partium, & temperaturæ siccæ, non tamen tantum habens caliditatis vt mordicet.

LAMIUM,

CAP. XVI.

Nomina
Lib. 21. c. 27.
& 22. 14.



VRTICA iners & mortua, vulgò Archangelica, Plinij Lamium esse putatur. Sic enim ille cum de Vrtica tractasset, quæ innoxia, inquit, morsu carens Lamium vocatur. Gallis *Ortie morte*, Germanis *Todtnessel*, siue *Taubnessel*. Iners & mortua cognominata est, quod foliis sit non mordacibus neque pungentibus, & mitissima. Archangelica ab eximiis viribus. Lamium fortasse à florum figura, veluti cucullo laruarum Lamiam quandam representante. Itali *Milgastellum*, & *Herbam de la Milza* vocant, ab insigni

LAMIUM, Fusch.

Genera.

Forma.

Locus.

Temper.

Lib. 21. c. 14

Vires.



eius aduersus splenis obstructionem & duritiem efficacia, qui splen illis *Milza* nominatur. Ea duplex est, florum colore distans: alia enim albo, alia luteo constat. Est & alia Vrtica mortua, de qua môx. Lamium siue Archangelica flore albo, foliis est vrticæ vrentis similibus, simbratis, candidioribus, lanugine nequaquâ mordacicaule quadrato: floribus oblongioribus, maioribus, fabæ, per foliorum intervalia quasi cucullis, aut galeis apertis, siue anfis inflexis, caules amplexantibus, minùs graueolentibus, albidis, seu pallentibus, radice fibrata. Passim circa sepes & semitas nascitur. Est Lobellio Galeopsis Matthioli proximo capiti picta. Lamium luteum à superiore differre non videtur, nisi proceriore caule, numerosiore, hirsutioris folio: flore pereleganti luteo, non dissimili. In siluosis & opacis potius reperitur. Dalechampio est Galeopsis lutea proximo capite picta. Maio potissimum mensis floribus abundant, & tota ferè æstate. Calidum sicquæque est Lamium, vt & cætera vrticæ genera, id quod ex gustu & facultatibus eiusprehenditur. Plinius cum vires & facultates vrticæ fusius exposuisset, subiungit. Ea quoque quam Lamium inter genera earum appellauimus, mitissima, & foliis non mordentibus, medetur cum mica salis contulis, incusisq; inustis & strumibus tumoribus

tumoribus, podagris, vulneribus. Albuni habet in medio folio, quod ignibus facris medetur. Quidam è nostris tempore discreuere genera. Autumnalis radice alligata in tertianis, ita vt agri nuncupentur, cum eruitur illa radix, & dicatur quæ & cui, & quorum filio eximatur, liberari in orbo tradiderunt. Hoc idem contra quartanas pollere. Iidem radice vrticæ addito sale infixæ corpori extrahi: foliis cum axungia strumas discuti, vel si suppurauerint, erodi, completiq. Recentiores vrticæ mortua vtuntur sistendo ruentis à naribus sanguinis impetu, inæ ceruici vel scapulis alligando nam inde sperant in aduersum trahi, cruoris manans unperum. Vlceribus dentque, putredinibus, & fistulis mitificè conferre ac mederi tradunt & verumq. Lamium non dissimilibus viribus, sed lateum multò efficacioribus esse ad vulnera, vlcera, & tumores.

GALIOPSIS,

CAP. XVII.

ΓΑΛΙΟΨΙΣ vel γαλιόψις, & γαλιόβολος Græcis, Latinis etiam *Galiopsis*, vel *Galeopsis*, vrticæ labeo, Vrticæ foetida, Gallis *Orme puante*. *Nomina*
Dicitur autem *Galiopsis* si cum, i, scribatur à florum effigie Galeata, quod eius flores galeæ aspectum referant. At quoniam inusitatum fuit Græcis præferunt veteribus, Latina nomina cum Græcis componere, γαλιόψις potius per scribendum erit, vt & multa exemplaria habent, & Plinius ita legendum testatur, qui galeopsin hanc herbam nominat: à florum figura mustellæ faciem & ridum quadamtenus exprimente. Id quod etiam videtur innuere τὴν γαλιόβωλον nomen, id est, mustellæ foetidæ: quò & quænam sit herba indicatur, nulla videlicet descriptioni aptiore quam vrticæ mortuæ foetida.

GALEOPSIS,
Matthioli.



Nam *Galeopsis*, vt scribit Dioscorides, quam aliqui *Galeobdolon* nominant. Torus frutex cum caule & foliis vrticæ similis est, sed folia laxiora sunt, & dum teruntur valdè grauem odorem reddunt: flores tenues, purpurei coloris. Nascitur in sepibus & circa vias, & ædificiorum areas vbique. Sic Plinius, ita vt ex Dioscoride transcripisse videatur. *Galeopsis*, aut vt alij *Galeobdolon*, vel *galion*, caulem & folia habet vrticæ, laxiora, & quæ grauem odorem trita reddunt: flore purpureo. Nascitur circa sepes ac semitas vbique. Sic vrticæ foetida, vrticam aut foetidum marrubium foliis ac caule refert. Floribus ea purpureis, exilibus, oblongis galericulis, aliquantum mustellina effigie expressis visitur. Deinde iuxta sepes, rudera & vias oritur passim. Hæc à Lobellio sic picta est *Galeopsis* siue Vrticæ non mordax *Lamium Anguillæræ*, Purpurea *Galeopsis*, *Heraeleæ* Plinij Tragi: quamquam ab *Heraeleæ* Tragi hæc prorsus differt videatur. Quæ verò perperam Herbariis, Matthiolo, Lacunæ *Galeopsis* dicitur, Lobellio est *Lamium* siue *Archangelica* flore albo superiori capite explicata. *Scrophularia* verò maior, quæ opinione Fuchsij & Dodonzi *galiopsis* est, Vrticæ minus assimilatur, multò minus foetet, in locis riguis & viginosis, filnosis, & ab ædificiis multum disitis nascitur. Radicem habet magnam, albam, strumolam, adeò notatu dignam, vt hanc indicatam minimè præterisset Dioscorides. Præterea *galiopsis* folia, caules, succus, & semen vim habent dissipandi

Lib. 4. cap. 1.
Forma.

Locus.
Lib. 7. cap. 1.

Virtus.
duritias

duritias, carcinomata, strumas, parotidas, panos. Oportet autem cum aceto bis die imponere, & cataplasma tepidum facere. Sed & decoctum ipsius vtiliter in fomentum affunditur: facit etiam ad nomas, gangrænas & putredines cum sale imposita. Quas insignes facultates non solum antiqui, sed etiam posteriores & docti medici experti sunt, & literis mandarunt, qui vriticæ mortuæ & fœtidæ nomen indiderunt, quia nota facile dignoscitur à congeneri lamio & perquâ simili.

GALEOPSIS Purpurea,

Lobellij.



GALEOPSIS Lutea,

Dalechamp.



Lib. 17. c. 9.

Easdem vires Plinius ex Dioscoride videtur descripsisse, his verbis. Folia caulesq; duritias & carcinomata sanant ex aceto trita & imposita. Item strumas, panos, & parotidas discutiunt. Ex usu est & decoctæ succo fouere. Putrescentia quoque & gangrænas sanatum sale. Hic minimè prætermittenda Galeopsis lutea herbariorum, quam descripsit & depinxit Dalechampus. In asperrimis montibus provenit, radice fibrata, nigricante, inutiles, caulibus multis, cubitalibus, angulosis: foliis vriticæ, amplis, imo caule minoribus, medio latioribus, graue quidpiam subolentibus, tactu minimè asperis, villosis, flore in caulis vertice interuallis paribus exeunte, luteo, duobus foliis constante, quorum inferius falcato sinu in capacem aluum extuberat, superius autem operculi modo impositum cõteggit, pallidis staminibus in medio subrectis: semen, flore delapso, in herbaceis calicibus veluti fixum hæret. Inuenitur frequens hæc planta in montis Æguebelletij summo iugo, quâ Lugduno Cameriacum itur. Est & copiosa Galeopsis rubra in dumetis nostris opacis, huic cætera similis, flore tantum rubro diuersa. Vtrumque hoc genus à Lamio Plinij & inodoro & fœtido plurimum distat. Pena & Lobellius Lamium fecere à Lamio siue Archangelica specie non differens, flore albo, ut superiore capite delaratum est.

CARDIA

RECENTIORES rei herbariæ studiosi, huic herbae (vetere eius nomine nondum comperto) Cardiacæ nomen dederunt, ab eximius viribus aduersus cordis affectus. Galli *Agripaum* vocant, & *Crenace*, à crenatis foliis, Germani *Hertse gspan*, siue *Hertse gesser*. Dodonæus Sideritis primam speciem esse existimat. Alij marrubij genus. Caulem emittit quadratum, geniculatum, nigrum, folia ferè vrticæ, aut marrubij, latiora, nigrotota, longioribus, crebrioribus, & altioribus multò incisuris, per intervalla in caule ex singulisgeniculis prodeuntia: flores purpureos, vrticæ foetida non dissimiles, sed minores, verticillatim caulem ambientes, odore quadàtenus marrubium referentes: radicem luteam, intortam, capillamentis fibratam. Passim in rudibus, circa sepes nascitur. Cum amara admodum sit, calidam secundo ordine, siccam tertio esse constat. Recentiores rectè contra cordis palpitationem, conuulsionem & resolutionem conducere tradunt. Decoctis cordi amicis vtiliter miscent. Potest enim cum amara sit, sua caliditate & siccitate crassos humores qui in venis & aliis partibus, nervosis potissimum sunt, incidere, extenuare, discutere. Hac etiam ratione morbo comitiali confert, urinas mouet, menstrua educit, pectus à pituita detergit, obstructions aperit, quas frigida causâ induxerit, lumbricos necat: in puluerem contrita, & cochleatis mensura ex vino hausta difficilè parientibus mirum in modum opitulatur. Imposita vulnera ferruminar.

Nomina

Lib. c. 87.

Pet. Penin

Aduers.

Forma.

CARDIACA, Marb.



Locus.

Temper.

Fuch. cap.

148. h. h. h.

Marb. in

ca. 90, lib. 4.

CHELIDONIUM MAIUS, CAP. XIX.

CHELIDONION *μῆλιν* Græcis, Chelidonium maius, & Hirundinaria maior Latinis, Officinis Celidonia, Arabibus *Kauroch*, *Callidonium*, *Chilodomonoma*, & *Memiram*, Gallis *Chelidoine*, & *grande Esclaire*, Italis *Celidonia*, Germanis *Schellwurte*, & *Schlekraut*, Hispanis *Celiduenha*, & *tercia de las golandrmas*. Chelidonio autem siue Hirundinariæ auis hirundo, quæ Græcis *χελιδών* dicitur, nomen dedit, vel, ut auctor est Plinius, quòd hanc primùm auis illa monstrauit, & ea oculis pullorum in nido restituit visum, ut quidam volunt, etiam erutis oculis: vel quod florer aduentu hirundinum, discessu marcescit, quod de minore verè dicitur. Quam Græci nominis vim ignorantes imperiti quidam, præsertim Chymistæ, non Chelidonium, sed calidum vocitant. Ac ea falsâ nominis præstantia freti, ex hac herba quandam quintam esse fieri prædicant, non modò ad vanas illas chymicas metallorum medicationes accommodatam, sed ad tuendam etiam hominum sanitatem, morbosque plurimos profligandos vtilem. Genera eius duo. Chelidonium maius & minus: de minore diximus. Maius caulem emittit cubitalem & maiorem, gracilem, adnata, foliis plena habentem: folia ranunculi similia, teneriora tamen, & colore sub cæsis, iuxtaq; singula folia florem leucoio similem. Succus illi croceus, acris, mordax, cum aliqua amaritudine, & odoris grauitate: radix superne singularis, inferne

Nomina

Lib. c. 8.

Genera.

Forma.

CHELIDONIUM

Mains, Matth.



Locus.
Tempus.
Temper.
Lia. c. 176.

Lia. c. 181.

Lia. simpl.

In cap. 176.
liba.

Lia. c. 181.

ferne autem plures. Fructus cornuti papaveris instar tenuis, longus veluti comis, hæc tamen verba duo, tanquam superuacua, quidā delent: in quo exigua semina sunt, papaveris semine maiora. Hæc Dioscoridis delineatio Chelidonio huic nostro planè conuenit. Est enim fruticosa herba cubitali altitudine: cauliculis rotundis, lanuginosis, teneris, surculosis: foliis rannunculi, siue aquilegiæ tenuioribus, magis incisif, & magis angulosis, aduersa parte cæsis, auersa incanis: floribus in surculorū summitate venustis, luteis, leucoio similibus: semine papaveris exiguo, pallido, quod in corniculis seu siliquis longis, exilibus includitur. Vulnerata succū croceum emittit, gustum vellicantem: radix superiore parte vna, inferiore multis luteis fibris capillata. In locis opacis, parietinis, hortorum scrobiūque marginibus passim obuia. Mense Aprili florere incipit, atque adeo toto deinceps Vere & æstate floret. Tertiij ordinis est in calcaciendo & desiccando. Succus eius mixtus melli, inquit Dioscorides, & in æneo vase ptunis decoctus, contra oculo-

rum caliginem prodest. Exprimitur succus ex foliis, radicibus, & floribus ineunte æstate, siccaturque in vmbra, & in pastillos conformatur. Radix cum aniso & vino albo pota, impositaq; etiam cum vino, regio morbo, serpentibūque vlcetibus medetur: manducata autem dentium dolorem sedat. Eadem Plinius tradit. Florentibus succus exprimitur, & in æneo vase cum melle Attico leniter cinere feruenti decoquitur, singulari remedio contra caligines oculorum. Vtuntur & per se succo in collyriis, quæ Chelidonia appellantur. Galenus enucleatius eadem docet. Chelidonium extergentis admodum & calidæ facultatis est: sed & succus eius ad acuum visum commodus est, vtique in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur, digestionem atque disculsionem indigens. Vbi sunt radice eius quidam ad auriginem ab obstructione iocinoris proficiscentem, in vino albo potui exhibentes cum aniso. Similiter mansa confert dentium doloribus. Herba in calceis delata, inquit Matthiolus, si nudis pedibus contingatur, ictericos sanare creditur. Eadem mammis mulierum admota mensium abundantiam sistit. Tusa herba vnā cum radice & oleo chamæmelino seruata, & vmbilico illita, tormina ventris, & veteri dolores tollit. Totius plantæ puluis vulnera vlceraq; sanat. Succus ad oculorum maculas, argema, nubeculas, & cicatrices plurimū præstat: verum cum acerrimus sit, adhibendus non est, nisi iis additis quæ eius acrimoniam retundunt, cuiusmodi est lac muliebre. Idem cauis dentibus inditus eos frangit & eiicit. Cadunt quoque verticæ & atescunt, si frequenter eo illinantur. Quod Plinius & Dioscorides in capitis calce scripserunt hitundines pullis Chelidonio visum restituere, etiam etutis oculis, Cellus fabulosum esse scribit: id enim sponte naturæ per se fieri. Eius hæc sunt verba. Extrinsicus verò interdum si oculum ictus lædit, vt sanguis in eo suffundatur, nihil commodius est quàm sanguine vel columbæ, vel palumbi, vel hirundinis inungere. Neque id sine causâ ht, quum horum acies extrinsicus læsa interposito tempore in antiquum statum redeat, celerimeq; hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, per parentes id herba restitui,

restitui, quòd per se sanescit. Id quod ab Aristotele Celsus mutuatus est, qui lib. de animal. ortu, inter aves quæ cæcos pullos excludunt, recenset etiam hirundines, quarum si quis, dum adhuc iuvenes sunt, oculos pungat, rursus sanantur: dum enim fiunt, nondum perfecti sic corrumpuntur: quare rursus nascuntur, & producantur. Id enim significant Aristotelis ipsius verba: Τῶν χελιδόνων τὰς ἑταίρας οὐκ ἔτι νέων οἶον ἐκείνησαν τὰ ὀμμάτια, πάλιν ἐγναί(σιν). γνομῶναι δὲ, ἀλλ' ἔργον ἐγναί(σιν) φθείρε(σιν). διὰ τὸ πρὸς τὴν αἰχμήν βλάσκειν οὐκ εἶναι ἀρχῆς.

EUPATORIUM,

CAP. XX.

Nomina

EΥΠΑΤΟΡΙΟΝ vel *ἑπατόριον* Græcis, Latinis Eupatoriū, siue Hepatolium, Arabibus *Casul*, *Casil*, seu *Gasel*, Officinis Agrimonia, Gallicis *Eupatoire*, & *Agrimoine*, Germanis *Odermennig*, & *Bruchwurte*. Eupatorium verò ab Eupatore rege, qui illud primus inuenit nominatum esse volunt. Hepatorium autem, quòd iecori potissimum medetur. Eupatorium, describente Dioscoride, herba est fruticosa, (vel melius sarculosa, *φρυγανόδης*: non enim fruticat quæ vno tantum scapo surgit,) vnum effereus scapum, tenuem, lignosum, rectum, nigrum, hirsutum, cubitalem, aut etiam maiorem: folia ex interuallis filsa in partes maximè quinque, aut etiam plures, quinquedulij aut cannabis potiùs folijs similia. Sunt & ipsa subnigra, & serræ modo in extremitatibus diuisa: legendum Græcè *περὶ τὸν σῆμα ἐν τῇ ἀκμῇ*, non *περὶ τὸν σῆμα*, idest, ilicis modo incisa: quamquam, si se legatur, non mutatur sententia, sunt enim ilicis folia serræ instar incisa: semen à medio caule enascitur subhirsutum, deorsum mutans, vt etiam siccatum vestibus inhæreat. Similiter Plinius. Eupatoria quoque, inquit, regiam auctoritatem habet, caulis lignosi, nigricantis, hirsuti, cubitalis, aliquando & amplioris: folijs per interualla quinquedulij, aut cannabis, per extremitates incisis quinquepartito, nigris & ipsis, plumosisq: radice superuacua. Ex hac delineatione notisq: omnibus planè constat nostratē Agrimoniā, verum esse Dioscoridis Eupatorium. Præterea nomen argemone in agrimoniam detortum idem testatur, quod argemonen errantes quidam Eupatorium esse arbitrabantur, vt in fine capituli scribit Dioscorides: quo loco tamen codices Græci corrupti sunt: *ἔνιοι τὰς ἀγρίων ἀγρίων, ἐν αἰσῇ, ἀγρίων*: non enim legendum est *ἀγρίων*, sed *ἀγρίων*. Hanc enim aliam esse quàm Eupatorium iam dixerat. *ἔνιοι ἀγρίων τὴν ἀγρίων ἐν αἰσῇ* *ἐν ἀγρίων*. Idest, Sunt qui errore ducti argemonen Eupatorium nominant. Vires etiam agrimonix cōsentiunt multò magis, & multò plures quàm quas Dioscorides enarrauit. Verum tamen attentiores Herbarij in Dioscoridis & Plinij historia non abs re dubitant, & hærent quoniam pacto in Agrimonia folium obseruari possit, vt monstrat historia, Cannabi vel Pentaphyllo simile, & pariter vt in vtraq: illa planta, in quinque partes, vel etiam plures diffusum, cum Agrimonix folium vnicum sit, & portectum simplicitet, nisi fortè existimandum sit, in Græcia plantam hanc folia mittere illo modo diuisa, vt multarū speciei figuramq:

Lib. 4. c. 6. Forma.

Lib. 1. c. 6.

EUPATORIUM

Verum, Math.



Lib. 1. c. 12.

Pena in
Adact.

videmus loci diuersitate mutari. Planta hæc est vulgaris notitiæ, frequentissimè
vñs & commodi, fruticosâ, cubitum & sesquicubitum alta, caulem producens sæ-
pissimè vnicum, durum, lignosum, tenue, rectum, striatum, angulosum, hirsutū,
subpurpureum, cuius ramulis folia quasi pediculo innixa foliorum vlmariæ, aut
potentillæ, aut rosæ effigie, hirsuta, nonnihil incana: flores à medio caule ad sum-
mum vsque exigui, lutei, stellati, pentaphylli minores, vbi seminum series lapposa
hirsutâque pannis hærens, quos vel tactos mordicus tenet: medulla intus alba, sa-
pore non ingrata, vti nec tota planta: radix crassa, satis longa, fusco rubore, dura.
Huius legitimi Eupatorii vice pharmacopœi ferè omnes in decoctis suis, & me-
dicamentorum cõpositionibus Eupatorium illud cannabinum siuè potiùs pseu-
doeupatorium vsurpant: de quo iam diximus. Alij quòd plantas istas distinguere
non norint, alij vel quòd pseudo-eupatorio suo maiores inesse vires experientia
compererint, vel quòd et si agrimoniam verum Dioscorides Eupatorium esse non
ignorent, tamen à consuetu errore deduci nolint. Agrimonia in satorum & via-
rum marginibus, & circa sepes, & in pratis prouenit. Æstate floret, Autumno se-
men maturum est. Maio mense colligenda est & siccanda, quæ in medicos vsus
asseruatur. Huius folia, auctore Dioscoride, cum adipe suillo vetere trita & im-
posita vlcera difficilè, cicatricem contrahentia sanant. Herba & semen in vino pota
dyfentericis, iocinorosis, serpētium moribus auxiliatur. Idem de semine Plinius.
Semen dyfentericis in vino potum auxiliatur vnicè. Galenus *μεθοδικός* easdem
facultates exponit. Eupatorium herba ipsa tenuium partium, incidendi, extergen-
di que facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Quare obstructions iec-
oris expurgat. Inest iridem ei & adstrictio quædam, per quâ robur visceri addit.
Radix exsiccat, & moderatè adstringit: quare externis & internis affectibus peru-
tilis: pota enim viscerum, hepatis præsertim tonum restituit, intemperiem ferè
omnem corrigit, obstructions aperit. Præterea decoctum dilutūmve eius co-
lore limpidi vini gilui placet. Serapio in iis recenset, quæ primo ordine cali-
da siccâque sunt.

Locus.

Tempus.

Lib. 4. c. 37.

Vires.

Lib. 26. c. 6.

Lib. 6. simpl.

Pet. Pen. in
Ad.

Cap. 77.

BALLOTE,

CAP. XXI.

Nomina



ΒΑΛΛΩΤΗ & *μύλαν παρασίτου* Græcis, Latinis Balloite, Officinis Mar-
rubium nigrum, Marrubiastrum, Prasium fœtidum, Gallis *Marrube*
noir, & *Marrube puant*, Italis *Marrobastro*, & *Marrobio bastardo*, Germanis
Schwarz Andorn, Hispanis *Marroio negro*. Marrubium à foliorum
similitudine, nigrum à colore, qui ad colorem fuscum magis vergit quàm in Mar-
rubio, dicta est Balloite: Prasium fœtidum ab odore graui, & fœtore. Balloite caules
edit quadrangulos, nigros, subhirsutos, ex vna radice plures: folia marrubio similia,
sed maiora, rotundiora, hirsuta, vel, vt alij, densâ, (Orbasius addit *μύλαν*, idest, ni-
gra: nec abs re, quod alteri eius nomini bellè conueniat, quòdque ita descripserit
Plinius, Balloite foliis est marrubij, maioribus, & nigrioribus,) per interualla in caule
disposita, similia apiastro, graueolentia, vnde etiam apiastrum vocauerunt. Flo-
res in rotâ speciem caules ambiunt. Plinius similiter depingit. Balloite alio nomi-
ne *Μύλαν παρασίτου* Græci vocant, herbam fruticosam, angulosis caulibus, nigris,
hirsutis: foliis vestientibus maioribus quàm porri & nigrioribus, graueolentibus.
Sed quod *μύλαν παρασίτου* pro *μύλαν παρασίτου* legis, & *μύλαν παρασίτου μετρίον* foliis maio-
ribus quàm porri conuettit, ita vt Prasium, idest, marrubium in *παρασίτου*, idest, in
porrum sæpius commutarit, in hoc, vocum similitudine deceptus, vehementer
etrat. Ex his veram Balloitem hic depictam esse cõstat, quod illa sit fruticosa herba,
quadrangulis caulibus assurgens, nigris, hirsutis ferè. Folio marrubij, sed maiore,
pilofo,

Forma.

Lib. 2.

Lib. 27. c. 8.

Idem.

BALLOTE, *Matthioli*.



piloso, cingente caulem per intervalla, odore gravi: floribus purpureis, verticillatim caulem circumplectentibus. Nascitur vmbrosis in locis, propè sepes, cœmeteria, vias & domos. Floret in fine Iunii mensis & initio Iulij, quo tempore commodè carpi potest. Amara & acris est, ideo calfacit in secundo ordine iam cõpleto, aut tertio remissodesecat autem in tertio. Huius folia, inquit Dioscorides cum sale trita canis moribus medètur. Feruenti cinere flaccescunt, vt condylomata repi inant: sordida vlcera cum melle purgant. Quæ Plinius iisdem ferè verbis retulit. Vis eius etnax aduersus canis morsus ex sale foliis tritis impositis: item ad condylomata, coctis cinere, in folio oleris. Purgat & sordida vlcera cum melle. Galenus Ballothes ne meminit quidè in simpl. medicamen. censu. Sed Paulus acrem & absterforia facultatis esse ait. Vnde cum sale impositam ad canis morsus prodesse, non rabiosi, sed eius qui aliàs momordit, vt idè alibi testatur. Est alta doctis herbariis dicta Ballothe minor, seu crispa, circa

Locus.
Tempus.

Temper.

Lib. ca. 10.
Vires.

Lib. 7. c. 8

Lib. 7.

Lib. 7. ca. 4.

sepes, ædificiorum areas, semitas, rudera, nascens: solo gracili & macro: radice candida, fibris quâ plurimis tenuissimis capillata: cauliculis multis fruticans, quadrangulis, palmum altis: foliis subrotundis, priori Ballothe similibus, læniùs virentibus, minus crassis, rugosis, grauitè olentibus, per intervalla in caule dispositis, & orbicularim eam circulantibus: floribus purpureis, verticillato ambitu caulem coro-

BALLOTE Crispa.

BALLOTE Crispa maior.



nantibus: semine in oblongis caliculis, minutulo. Ante hyemem exactâ appetente Vere floret, longè tempestivius quàm Ballote maior. Quidam Coronopum vocauerunt. Est altera Ballote crispâ maior, alioqui valde similis, quæ in locis cultis propè hortorû areas & semitas nascitur, radice cãdida, plurimis fibris villosâ, brevibus caulibus in ultis, quadratis, dodranralibus, ramosis, foliis rotundis, laciniatis, venusta incisurarum specie, orbiculatim caulem ex intervallo circumdantibus: flore copioso, verticillatim inter folia prodeunte, puniceo, exiguo: semen in oblongis caliculis minutulum continetur. Floret Febuario. Quidam etiam Coronopum nominarunt.

PLANTAGO,

CAP. XXII.

Nomina



ΠΝΟΤΑΩΣΣΟΝ Græcis, Arnoglossum & Plantago Latinis, Arabibus *Lifen*, aut *Lesan alboamel*, Italis *Piantagine*, Hetruscis *Centnerbia* corrupto ex quinqueneruia vocabulo, Germanis *Uuegerich*, Hispanis *Lhanten*, *Tamehagê*, Gallis *Plantain*. Officinæ nomen Latinû Plantaginis retinuerunt. Arnoglossum quòd folia eius agninz linguæ sinullima sunt, appellarunt Græci, Latini autem Plantaginem ducto à planta vocabulo. Sunt qui à similitudine neruorum, quibus quasi costis in dorso per longitudinem folia distincta sunt, Polyneuron vocant. Duo Plantaginis genera, inquit Dioscor. maior & minor. Totidem genera Plinius agnoscit. Recentiores herbarij plura fecerunt, Plantaginem mediam, Plantaginem roseam, Plantaginem aquaticam, de qua diximus, Plantaginem marinam. Matthiolus Plantaginem maiorem eam esse scribit, cuius folia septem fibris tanquã neruis distinguuntur, quã ob id Græci *ἑπτάπλοκον*, idest, septineruiam nuncuparunt: mediam in cuius foliis quinque apparent costæ, *πεντάπλοκον*, idest, quinqueneruiam ab iisdem appellatam. Officinæ quoniam folium arctius definit in acumen, & velut in lanceæ mucronem fastigiatur, Lanceo-

Genera.

Li. 2. ca. 219.
Lib. 24. c. 3.
Lib. de pal.
cap. 40.
In cap. 19.
lib. 1.

PLANTAGO *Vulgaris* latifolia, Matthioli.



PLANTAGO *Maior*, Matthioli.



laram

laram, vulgus Lanceolam nominat. Minimam verò, cuius folia, quæ leuiter hirsuta sunt, tres tantum neruos habent, quam obtem *τρεῖς νεῦροι*, id est, trineruia dici potest. Verumtamen iconibus postremæ editionis Arnoglossa nominibus aliis distinxit. Plantaginem enim mediam pinxit septineruiam foliis latissimis, cauliculis

PLANTAGO Minor,
Longa. Matth.



PLANTAGO Minor,
Dodonæi.



longis, à medio floribus spicatis, caudas muriû referentibus. Hæc est Plantago vulgaris latifolia. Deinde Plantaginem maiore, & septineruiam foliis similiter latis, cauliculis longioribus, in quibus flores vertici propiores. Tertiâ Plantaginem longam, quam quinqueneruiam & Lanceolatam appellari diximus. Dodonæus Arnoglossa exhibet: Maius, medium, de quo in Cynoglossis, minus, & marinum. Alij aliter ex foliorum magnitudine & modo Plantaginum varietates & appellationes, distinxerunt. Plantago maior amplior & latiores latius constat foliis, oleracei, generis (Ruellius sic conuertit *ῥουελαδης*, quod alij potius vertendum censent betæ similis: sæpè etenim Attici *ῥουεον* pro beta vsurpant: quare Dioscor. eo vocabulo maiorem Plantaginem betæ similem esse indicauit, vt reuera illi maximè assimilatur, cum in exprimenda similitudine speciatim loqui non generatim conueniat.) Caulis in hac est angulosus, subruber, cubitali altitudine, à medio ad summum vsque tenui semine circumdatus, radices subsunt teneræ, hirsutæ, candidæ, digiti crassitudine. Plantago minor folia habet angustiora, minora, molliora, leuiora & tenuiora: cauliculos ad terrâ inclinatos, flores pallidos, semen in summis cauliculis. His descriptionibus Plantago nostra maior latifolia, & minor pulchrè respondent. Pro minore Matthioli eam, opinor, pingit, quam longam vocat. Dodonæus quinqueneruiam, cuius folia angustiora, rigidiora, quibusdam raris per ambitu denticulis, mucronata: radix rotundior, breuior, pluribus capillamentis depacta: cauliculi angulosi, iuncea: flores albi, stipati in glomerosis & breuioribus spicis. Est & plantago incana, Lobellij & Penæ, cui folia incana superficie pubet, rigidiora, crassiora, & in ambitum humi, neruulis magis extantibus refracta: radix crassior, longior, minusq; fibrata: rectioribus, altioribus cauliculis, floribus breuioribus, sed magis sparsis & speciosis, albis, caudatis. Iunio & Iulio fluentibus. Præterea Plantago quædam in hortis ad voluptatem colitur, cui omnia Plantaginis maioris similia præterquâ cauliculus summus, eleganti ambitu, foliolis multis, sibi equali

Lib. c. 61.

Forma.

Lib. c. 61.

PLANTAGO Rosa, Pena.

Locu.

Lib. cap. 19.
Vires.*PLANTAGO Rosa, Lob.*

Lib. ap. c. 8. collo suspensa ad strumas discutiendas vtuntur. Verba Plinij totam hanc rem, & Dioscoridem ipsum declarant. Celebravit & Themison medicus vulgarem herbam Plantaginem, tanquam inuictor, volumine de ea edito. Duo eius genera, minor angustioribus foliis & nigrioribus, linguæ pecorum simillimis, caule anguloso, in terram inclinato, in pratis nascens. Altera maior foliis laterû modò inclusa, quæ

serie mutuò incumbenibus, atq; sensim in fastigiû coeuntibus, vbi quasi imbricatim squar matimve sese decussantia folia umbellam elegantem, quasi florem constituunt herbidum, vt in quadam specie primulæ veris cernere liceat. Semen è medio foliorum interstitio exilit, sed priori simile. Ab hac Plantago alia à Lobellio picta, distat sola panicula spicatum sparsa, onusta innumera fortui hæbaceorum flosculorum racematim cohærentium, in Belgicis hortis. De Plantagine marina alibi dicendum. Plantago maior nascitur in ece nosis, sepibus & humidis locis. Minor itidem circa aggeres, sepes, prata, & lacunosa loca. Herba & flores æstatis initio, Maio & Iunio mensibus, semen Augusto carpitur. Vim habent folia, auctore Dioscoride, exsiccantem atque adstringentem, ideò ad omnia vlcerata maligna, elephatica, quæ humore scatent, & sordida conferunt. Eruptiones sanguinis, nomas, carbunculos, herpes, epinyctidasq; cohibent. Vlcerata vetera & inæqualia cicatrice obducunt, chironia sanant, sinus glutinant. Morsibus canis, ambustis, inflammationibus, parotidibus, panis profunt. Stomus & ægilops cum sale illita conferunt. Oculi cum aceto coctum & sale dysentericis & celiacis sumptû subuenit. Datur & in locum betæ cum lenticula coctum. In leucophlegmatia post aridas epulas in medio herba decocta datur. Comitialibus & asthmaticis data proficit. Foliorum succus oris vlcerata continua colutione putgat. Cum creta citinola & cerussa erysipelatis medetur: fistulas infusus sanat. Aurium doloribus & lippitudinibus succus instillatus, & collyriis additus prodest: gingiuis sanguinolentis, & sanguinem reiiciendis potus confert: dysentereticis clystere infunditur: bibitur contra tabem. Aduersus vteri strangulationes in lana apponitur. Item vuluæ fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Radix decocta colutione & manducata dentium dolores sedat. Eadè cû foliis in passo ad vesicæ renuq; vlcerata præbetur. Ferunt tres radices, cû tribus vini cyathis, & pari aqua potas, tertianis auxiliari, & quatuor quartanis. Sunt qui radice è

et quia septena sunt, quidam eam heptapleuton vocauerunt, sic *πλεπτον* vertit Plinius, re nō ita explicat vaptiū et al, folio tanquā coctis distincto, quæ quia septenarius sunt, & c. Huius & caulis cubitalis est, & angulosus (sic ex vetere codice legit Cornarius nō, napi similis, ut in vulgatis habetur) nascitur in humidis multo efficacior. Vis nō ita in siccado densandoq; corpore, cauterij vicem obtinens. Nulla res æquæ sit fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. Alias eius facultates & multo plures id Plinius variis locis tradit. Stomachū corroborat plātago per se sumpta in cibo cum lente, alicæ ve forbitione. Strumis medetur. Semen eius in vino tritum, vel ipsa ex aceto cocta, aut alica ex succo eius sumpta, dysentericis datur. Lichenis sūdo mōlomedetur trita. Vitia sedis & atteritus celestirimē sanat. Ex aqua mulsa duabus hotis ante accessionem pota duabus drachmis, tertianas leuiores facit, vel succus radiceis madefactæ, vel tulgæ, vel ipsa radix trita in aqua ferro calefacta. Quidā ternas radices in tribus cyathis aquæ dedunt. Iidē in quaternis quaternas fecerunt. Hydroticos sanat in cibo, cum prius panē siccum comederint, sine potu folia podagras refrigerant, & in primo impetu podagræ tubentis, hoc est, calidæ conueniunt. Oris vlcera succus emēdat, & folia radiceq; cōmanducata, vel si rheumatismo laboret os. Vitio reiectionis sanguinis idē medetur, phthisimi sanat si bibatur, & ipsa decocta in vino cum sale & oleo à somno matutino refrigerat. Luxatis dolores & tumores tollunt folia tulgæ, addito sale modico, fistulis infusus succus auxilio est. Sanguinis profluuiū sistit semen, si ore reiciatur, siue aluo fluat, siue foeminarum vtero. Succus vomentibus sanguinē datur. Contusis, euersis omnibus modis ipsa sumitur. Medetur omnium generū vlceribus, peculiariter foeminarū, senum & infantium igne mollita, melior & cum cerato. Sed ut eas vites habeat plātago, quas Dioscor. & Plinius ipsi tribuunt, repetamētum eius mixtū facit, quod declarat Galen. his verbis. Plātago mixtæ est repetaturæ, habet enim quiddā aqueum frigidū, & austum quiddā, id quod tectū est, siccum, frigidum. Itaq; refrigerat simul & desiccatur, & in vtroq; secūdi excessus à mediis est. Porro medicamenta quæ cum hoc quod refrigerant vnā etiā adstringunt ea & ad vlcera rebellia omnia, & ad fluxiones & putredines conueniunt, ac proinde & ad dysenterias. Nam & sanguinis profluuiū sistit, & si quid aduratur refrigeranturum genus quoq; glutinant, & alia vlcera recētia simul & vetera. In omnibus ferē id genus medicamētis primas tenet, aut certe nulli secunda est plantago idq; tepetaturæ symmetria & cōuenientia, siccitatē enim obtinet morbus expetē, & frigiditatē quæ nondū obstupefaciat: & fructus & radix similis sunt facultatis, nisi quod tum siccioris, tum minis frigidæ. Sed & semē subtilium est partium: radices verò crassiorum, atq; herbæ folia exsiccata subtilium partium existunt, & minis frigidæ facultatis: nepe diffilat ex eis ac digesto extremēto aqueo. Hac ratione & radicibus vtuntur ad dentiū dolores, tum mandentes, tum collusionibus incoquentes. Prætereā ad iocinoris & renum obstructions nō has tantūm adhibēt, sed folia quoq;, & multo magis semina. Hæc enim omnia quandam in se abstergerendi facultatē obtinēt, quam & in tota herba vitidi inesse satis conici potest, verū ab humiditatis copia diuinci. Insignes alias eiusdem facultates neoterici prædicāt, maioris & minoris semen tritum oiaq; exceptum, & calente tegula inassatum, dysentericos iuuare frequenter deuoratum. Succus ex rosaceo fronti adhibitus capitis dolores à causa calida ortos mulcet. Datur quoque vtiliter ad cruentā sputa cum atmenia bolo, aut hærmarite lapide. Idem cum millefolij succo mixtus cruentā vtiā reddentibus miscicē mēdetur potus, præsertim addita philonij petisci drachma. Illinitur quoque rectē erysipelatis cum aceto & solani sedique succo. Stillatitia plantaginis aqua cum equali aceti acerrimè portione sanguinem è naribus fluentem cohibet, si linteola in ea madefacta pedum plantis, manuum volis, & iocinori applicentur.

Emblm.
lib. 2.

Lib. 6. Em.

Marthap
c. 119. lib. 2.

Nomen



GENTIANH Græcis, Latinis & Officinis omnibus Gentiana, Germanis

Entzian & Butterwurzel, Gallis Gentiane. Sic à Gentio Illyriorum Rege, qui in

Forma.

bello primus eius vires reperit dictam fuisse testantur Dioscorides & Plinius. Alij, inquit Apuleius, Aloen

GENTIANA.



Lib. 1. c. 7.

Locus.

Tempus.

Temper.

Lib. 2. c. 188

Lib. 4. ca. 3.

Vires.

Lib. 1. c. 7.

Ibid. cap. 3.

Ibid. cap. 11.

Lib. 1. c. 14.

odore, aquosis montibus sub alpinis plurima. Vfus in radice & succo. Nasctur in altissimis montium cacuminibus, in locis vmbrosis & aquosis, elleboro albo foliis

ac natalibus adeo affinis, vt parum exercitatum eminens fallat. Floret ætate, Iunio potissimum mense de in Iulio semen producit. Auicenna Gentianam calidam esse

scribit ordine tertio, siccam secundo. Radix calfacientem & adstringentem vim habet, vt tradit Diosco. Venenatorum moribus succurrit duarum drachmarum pōdere cum pipere, ruta, & vino pota. Succus drachma laterum doloribus, ex alto cadentibus, ruptis & conuulsis opirularur. Hepaticis, stomachicis pota cum aqua subuenit. Radix collyrij modo subdita partus eiicit. Vulneraria est imposita vt lycium: vulneribus sinuatim depascentibus potissimum succus medetur: oculis inflammatione laborantibus illinitur cum meconio collyriis acerbis miscetur succus. Apud

Dioscoridem μετὰ loco ἀντι, legēdum esse res ipsa monstrat. Non enim medicamentum frigidissimi loco substituitur, quod calidum & sicū est: radix vitilignes absterget. Plinius hæc quidem breuiter. Radicis natura est excalfactoria, sed prægnantibus non bibenda. Reliqua verò à Diosco. tradita sparsim idem Plinius habet. Gentiana præcipue aduersus angues, duabus drachmis cum pipere & ruta, vini cyathis sex, siue viridis, siue sicca. Et, Adiungunt & Gentianæ succum, quem collyriis acrioribus cum meconio miscēt. Item, illinitur autem gentiana vlceribus quæ serpunt, radice rufa vel decocta in aqua ad mellis crassitudinem, vel succo vulneribus ex ea factum lycium. Sic enim habent vulgati codices, & sic locus intelligi potest. Sicut lycium ex sua planta expressum, ita succus ex Gentiana velut lycium expressus vulneribus imponitur, quod dilucidius Dioscorides expressit. ἡ δὲ καὶ σαματικὴ καὶ τριβελίνα

τὸ πλεονέκτην ἄνθος. Aliis in locis. Tanta huic vis est, vt iumentis etiam non tufficientibus modo, sed illa quoque trahentibus auxilietur pota. Stomachum corroborat ex aqua pota, farina eius ex aqua tepida fabæ magnitudine pota, interaneorum vitis occurrit. Radix trita vel decocta, à ruptis, conuulsis, & ex alto deiectis potatur. Galenus omnem vim Gentianæ radici ex amaritudine attribuit. Gentianæ radix, inquit, multū est efficax, cū opus extenuatione, abstersione, purgatione, obstructionis liberatione. Nec mirū si hæc possit, cū impense amara sit. Hęc Galenus. Gentianæ radix urinam & menses ciet, aduersus scorpionū ictus cæteris antidotis præstat. Eius aqua stillatitia febres ab infarctu tum viscerū, tum nasorum excitaras mirifice sanat. Alui lumbricos necat, maculas in facie quasq; deterget, si ea frequentius abluantur. Eadem radix in vinum immissa ad lassitudinem discutiendam, & appetitum excitandum commendatur. Putredinis hostis est infestissima, & veneni mors. Pesti adeo remedium præfens, vt non modò homini, sed etiam brutis incomunitatem tueatur, & amissam instauret.

Lib. 6. simi.

Math. in
cap. 3. lib. 3.Pet. Pen. in
Adu.

CRUCIATA, CAP. XXIII.

GENTIANÆ & facultatibus adeo affinis est Gentianæ hæc planta, vt docti Gentianæ speciem faciant, quare Gentiana minor à quibusdam dicitur, vulgò Cruciata, prisco nomine nondum comperro. Sic autem nūcuparam quidam existimant, quòd radix secundum longitudinem tripartito aut quadripartito fissà sit, sed foliis cruciatim cauli incumbētib; nominis

Nomina

CRUCIATA siue Gentiana
minor, Math.CRUCIATA siue Gentiana
minima, Math.

erymum potius debetur, Gallicè *Croissette*, Germanicè *Madelgeer*, nominatur. Caule *Forma.* est rotundo, dodrantali, ac etiam maiore, in summo rubescēte, paribus serè interuallis ab imò ad summum geniculis interfecto, à quorum singulis alis bina prodeūnt folia, crassa, angusta & oblonga, vulgaris saponarix æmula, & gentianæ foliolis in summo caule erumpētibus similia: flores purpurei vel caerulei diluti in summitate circum

Locus. circum caulem in orbem ex cauliculis herbacei coloris exeunt. Radix alba, longa, amarissima, locis aliquot ab utroque latere crucis instar perforata. Multa & passim oritur locis incultis, sed non ita arduis ut Gentiana: floret Iulio mense. Ex summa amaritudine calidam & siccam esse colligere licet, & vitibus Gentianæ proximis præditam. Recentiores magnum eius contra pestilentia venena usum esse affirmant: item ea quæ in thorace hærent educere posse, hausto foliorum aut radice decocto, aut sumpta eius siccatæ farina. Menses mouet, comitialibus prodest. Vino in quo inferbuerit vulnera & vlcera maligna lauasse & fouisse prodest, aut puluerem in ea iniicere: deterget enim & glutinat. Est alia Cruciatæ minor cognominata, quæ ad Rubiæ & Aparines similitudinem quadatenus accedit, sed mollis & hirsuta herba, cauliculi tenelli, quadrangulares, geniculati, folia è singulis inter nodiis quaternis, decussata, breuiora, sed latiora ferè quàm Aparines. Flores exigui verticillatim cauliculos ambiunt, dilutè lutei: radices subsunt perquam tenues. Iuxta fossas, riuulos, & quandoque agrorum margines, inter fentes, à Maio ad finem vsque æstatis reperitur, & cum flore. Matthiolus addit Cruciatam minimam.

V. VNIFOLIUM,

CAP. XXV.

*Nomina**Forma.*

Est etiam plantaginis est vnifolium, Germanis *Einblat* dictum, Gallis *Unesuelle*. Quare *monopetalon* possumus appellare. Gramen est Parnasi Cordi & Loniceri. Foliū vnum per initia ab imo promit. Deinde semine iam perfecto in cauliculo rotundo & tenero, duo prodeunt

VNIFOLIUM.

*Locus.**Tempus.**Temper.**Uires.*

folia priori similia, sed minora, plantaginis figura, & nervulis striata, supernè acutiora, alterum superiore est loco: flores supereminent albi, galij odori: deinde acini parui, rotundi, pallidi initio, dum maturuerunt rubentes, gustu amaro & ingrato, radix gracilis & geniculata, trāsuer sim euagatur. Umbrosis lucis & nemoribus frequens. Maio mense floret. Temperie est calida siccatque. Recentiorum quorundam sententia vnifolij radix aduersus pestem, & omne genus veneni singulate est remedium, hausta statim initio pulueris eius semidrachma cum vino generoso aut aceto, aut utroque, ita ut cum æget hauserit in lecto sudet. Folia cum radice recentibus vulneribus admouisse prodest, quod ea ab inflammatione & suppuratione tuantur.

BIFOLIUM SIVE OPHRYS

Plinij. CAP. XXVI.

*Nomina**Libas. c.ij**Forma.*

Rtv, folio quoque, plantagini simile est Germanorum *Zeyblat*, id est, bifolium à geminis foliis, Gallicè *Double feuille*, à nonnullis ob foliorum cum plantagine similitudinem, & quòd locis humentibus familiaris sit, Damatonium creditum: à quibusdam Gramen Parnasi, à Dodonæo Pseudorchis bifolium, ab aliis perfoliatæ species, ab aliis Ellebotine, ab aliis, & rectius quidem, Ophrys Plinij: non quòd fucandorum supercilliorum facultate, hanc plantam præditam esse compertum sit, sed à binis foliis. Caule est rotundo, læui, duo duntaxat proferente folia, utrinque vnum ex aduerso, plantagini

OPHRYS.



tagini maiori similia, viridantia, secundum longitudinem fibris distincta, à medio ferè caule ad summum vsque caliculi vtrinq; multi sunt, & in his velut linguæ dissectæ, nudentes flosculi, ex pallido siue ex flauo herbacei, quos etiam muscis, siue paruulis volucribus plumis exutis comparare possis, nec non testicularum quorundam floribus. Radix subest tenuis, cum adnascensibus radiculis multis, oblongis & odoratis. In montibus, pratis vdis & frigidioribus frequens nascitur. Maio & Iunio mensibus floret, dein statim euanescit, quare hoc potissimum tempore colligenda. Gustanti glutinosae esse apparet, & quodammodo dulcis, ideò calidam & siccam esse coniicere licet. Cum igitur facultate non sit adstringente, darnasonium esse nequit, tamen ad fracturas & vulnera conglutinanda hac herba recentiores vtuntur. Capillum denigrat Ophrys herba, inquit Plinius, denticulato olei similis, foliis duobus: quidam hoc loco censent legendum, lenticulato, betam expolientes, quam ideò sic dictam volunt, quòd ea sepiissime cum lenticula vescerentur olim, cibum eiusmodi *τιντοφάειν* nominantes.

Locus.

Tempus.

Temper.

Fuchs. cap.

Per. Pen.

in Ad.

Lib. 16. cap.

CYNOGLOSSVM,

CAP. XXVII.



T arnoglossò ab agnina, ita Cynoglossò à canina lingua nomen derunt antiqui. Græcis igitur *κυνόγλωσσος* & *κυνόβλωσος* dicitur, Latinis Cynoglossum & canina lingua, Officinis Cynoglossa, & lingua canis, Gallis *Langue de chien*, Germanis *Hundszung*. Quænam autem ex aliquot plantis, quas ad caninæ linguæ speciem natura effinxit, verum sit & facie & viribus Cynoglossum, magna est inter herbarios contentio, cum ne veteres qui-

Nomina

CYNOGLOSSVM,

Quorundam.



dem in huius herbæ delineatione contentiant.

Dioscorides enim Cynoglossò caulem adimit, quem Plinius eidem tribuit. Sic igitur describit

Lib. 4. cap. 2.

Dioscorides. Cynoglossum folia plantagini latifolia similia habet, sed angustiora, minora, & lanuginosa, caulem non habet, & humi stentur. Plinius vetò. Iungitur & Cynoglossos caninas imitans linguas, copiaris operibus gratissima. Aiunt, quæ tres thyrsos feminis emittat, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodesse, quæ quatuor ad quartanas. Est alia similis ei quæ fert lappas minutas. Eius radix pota ex aqua ranis & serpentibus aduersatur. Recentiores ad vires attenti, & ad eos effectus quos catapotia de Cynoglossa inscripta pollicentur, aliud atque aliud Cynoglossum ostendunt. Nonnulli plantam eam, quæ Plantago media à Dodonæo nominatur, ab aliis plantago villosa seu sessilis, quæ plantagini maiori seu latifolia similis est, nisi quòd folia habet angustiora, minora, parum hirsuta, caules quoque hirsutos in summo spicas profertentes

Lib. 1. cap. 2.

Lib. 1. cap. 1.

Forma.

Locus.

Temper.

Cynogloss.

Monsp.

Per.Pen.in

Ada.

Forma.

proferentes breuiiores quàm in maiore plantagine: flores ex albo purpureos: radicem candidam & longiorem. Locis humidis & herbidis, secusque vias nascitur, frigido siccoque est temperamento ad tertium vsque ordinem. Est aliud Monspe-
CYNOGLOSSVM Pusillum,
Narbonense.

Locus.

Vires.



CYNOGLOSSVM Vulgare floridum
Matth. secundum Pliny.



CYNOGLOSSVM,
Matthioli.



nues

nues fluxiones: magis tamen spissat quàm refrigerat. Quare catapotis adacrem & tenuem fluxionem sistendâ Trallianus immiscet, quæ recipiunt myrrhæ drach- Lib. 2. 4.
mas septem, hyoscyami, opij singulorum drachmas quatuor, corticis radice Cy-
noglossi herbæ drach. quatuor & semiss. Ea similiter descripsit Mesues ad catar-
rhum, coryzam, ruisim, aliosq; his succedentes affectus, addita croci drach. vna &

CYNOGLOSS. Vulgare Matth.
Lycopsi Lacuna.



LYCOPSIS Anglica,
Lobellij.



semisse. Matthiolus legitimum & Dioscoridis Cynoglossum quod neque cau- In cap. 24.
lem, neque flores, neque semen gignit, se adinuenisse putat, sæpius à se tum visum, lib. 4.
tum lectum Romæ post Adriani molem in sabulosis quibusdâ locis enatum, quod
à vulgari Cynoglossio quo passim Officinæ vrûtur, longissimè distat: quippe quod
in radiantis Solis morem folia fert suppinguia, tenui lanugine albicantia, humi strata,
caule perpetuò viduum. At Penz & Lobellio hæc planta non Cynoglossum
sed Lycopsis, vel degener anchusa Æginetæ esse videtur, non perpetuo caule ca-
rens, verum toto quidem anno caulem florémque nullum edens, sed vno & inter-
dam altero anno post, æstate caulem sesquicubitalem gignens, rotundum, hirsu-
tis alis multis diuisum, iuxta quas & folia erumpunt ex interuallis, florésque echij
hmbriati, diluta purpura, exili stamine: semen borraginis, minùs nigrum: radix
crassior digito rufescit lignosa, parùm aut nihil atreclantem insiciens. Huic iun-
gie Lobellius Lycopsis alteram Anglicam, quæ via qua Bathonia & Bristolia Lon-
dinium itur, per messes multa & læta visitur, hilari aspectu, floribus tantùm distans,
quos non secus foliorum & alarum interualla, sed in summis caulibus habet saturati-
ore purpura.

QVINQUEFOLIUM, CAP. XXVIII.

QUINQUEFOLIUM Græcis, Quinquifolium Latinis & Officinis & *Nomina*
Pentaphyllum, Gallis *Quintefeuille*, Germanis *fünffingerkraut*. Nomen à nu-
mero foliorum habet: in vnoquoque enim pediculo quinque esse depre-
henduntur. Dioscorides vnicum Quinquifolij genus posuit. Ab herbariis aliis *Genera*
Lib. 4. c. 38.

QUINQUEF. Luteum,
maius.

Hidra.
Quinque-
folium
maius.
Forma.



Lib. 9. hist.
cap. 14.

QUINQUEF. Luteum,
minus.

Lib. 21 c. 9.

Quinque-
folium lu-
teum minus.
Forma.

quod obscurum est & ambiguum, quæ enim fraga gignit herba, alia à Quinquefo-
lio est, nec quina in singulis pediculis, sed terna folia habet. Quinquefolium luteu
minus superiori persimile est foliis, per terram serpendi modo, caulibus, floribus,
nisi quod multò minus est, nec ita faciliè cauliculis terræ hærentibus propagatur,
folia

tria, ab aliis quatuor, vel quinque animaduersa
sunt genera, florum colore & foliis distantia.
Quinquefolium, ita describente Dioscoride, ra-
mulos fert festucarum similitudine graciles, do-
drantales, & in iis semen: folia mentis similia,
in singulis pediculis quina, raro plura, in ambi-
tu serrata: florem ex candido pallentem, au-
ri xmulum: radicem subrubram, oblongam ele-
leboro nigro crassiore. Quibus verbis Dio-
scoridem Quinquefolium maius luteum deli-
neasse perspicuum est. Etenim ex vna radice ob-
longa & subrubra ramulos emittit tenues & fe-
stucaceos, sese quæ solum subierint propagan-
tes, in singulis folia quina, in ambitu serræ mo-
do crenata, mentis similia: flores luteos vel au-
reos, in quina folia diuisos, qui cum depercut
in parua veluti mora vertuntur, fragis similia,
in quibus semen. His accedunt natales, & insi-
gnis adstringendi facultas, de quibus mox dice-
mus. Præterea radix quadrata cum arida facta
fuerit, quod verissimè obseruatum est a Theo-
phraсто sic scribente. ὅτι τῷ πενταφύλλῳ, ὃ πεν-
ταπέτῳ (καλῶσι γὰρ ἀριστοτέλης) ὀρυζαίνῳ ἱρὺν γὰρ,
ἔχοντι πέντε ὃ μάλιστα γέεται, καὶ τεύχευτος. ἔχει δὲ
τὸ μὲν φύλλον ὡς περ ὄνικον, μικρὸν ὃ καὶ τὴν χροίαν
ἔχοντι, καὶ ἐκτείνεται καὶ φησὶν ἕμια τοῦ ἀμπελίου πέντε
δὲ τὸν ὅλον τοῦ φύλλου, διὰ δὲ ὃ περὶ στρογγύλην καυλὸν ὃ περ
ἀπὸ τοῦ λαγού, καὶ καύματι ἔχει πικρίας. Id est, Ra-
dix Quinquefolij siue quinque peti (nam hoc
etiam nomine appellatur) cum effoditur rubra
est, arida verò nigrescit, & quadrata fit. Folium
habet Arbuti ὀνίκεον paruum, colore illi simile,
augetur & desinit vnà cum vite, folia omnia
quina, vnde ei nomen, caules emittit super ter-
ram, tenues, & crebris internodiis constar. His
similia Plinius tradidit. Quinquefolium nulli
ignotum est, quod etiam fraga gignendo com-
menderetur. Græci vocant Pentapetes, siue Cha-
mazelon, vel, vt alij, chamamelum, siue penta-
phyllum. Quum effoditur rubram radicem ha-
bet. Hæc inarescens nigrescit, & angulosa fit.
Nomen à numero foliorum habet. Ex ipsa her-
ba incipit & desinit cum vite. Adhibetur &
purgandis domibus. Hæc ex Theophrasto con-
uerſa esse constat, præter illud quod Quin-
quefolium fraga gignendo commendari dicit,

QVINQVEFOLIUM,
Album.

QVINQVEFOLIUM,
Rubrum.



folia ferentibus minora, quàm terram spectant, albicantia. Quinquefoliù candidum magnitudine ferè par Pentaphyllo luteo maiori, cauliculis repentibus, teneris, gracilibus, & foliis in quinque diuisis simile, nisi quòd caules hirsuti sunt, folia longa, antèrius duntaxat crenata, flores candidi sunt: radix non simplex, sed adnata & ra-

Forma.

PENTAPHYLLVM Album,
Martholi.

PENTAPHYLLVM
Rubrum, { Dodonæi.



diculas multas habens huc illuc vagantes. Quinquefolio rubro Pentaphyllis alius haud absimili, præsertim luteo maiori folia quinque partita, toto ambitu crenata, infernè candicantia, supernè nigricantia: caulis palmum vnum aut pedem altus,

PENTAPHYLLVM *Flora*
albo & rubro, Lobellij.



PENTAPHYLLVM
Supinum, Tormentilla facie,
Lobellij.

Locum.

Tempus.
Lib. 4. c. 18.
Vires.



colore fusco aut rubescente, genicularatus, lævis, in cuius summo flores sæpius bini, saturato rubore: deinde veluti mora parua, rotunda, fragorum instar rubescencia, sed duriora, in quibus semen includitur: radix tenera huc illuc dispergitur. Sunt apud Penam & Lobellium duo alia Pentaphylli genera. Maius flore subluteo, interdum albo, & rubro. Caulibus rectis, firmis, pedalibus & cubitalibus, in quibus folia quinque partita, sed altioribus & crebris incisuris, Geraniij robertiani vel Alceæ modo: floribus candidis, interdum purpureis, radice foris nigricante intus rubescente, digitum lara, palmum longa & sesquipalmū. In Narbonensis Sauenæ pingui solo, Iunio & Iulio flores edit candidos, in Apennino Italix purpureos. Aliud Pentaphylli generi facie cognatum est: medium enim est inter Tormentillam, Pentaphyllum, & Potentillam. Flosculos ex luteo pallentes, summa folia, caducos cauliculos, & radicem Pentaphylli habet, sed folia ima ex atro virentia in longo pediculo aptantur, Argentinx siue potentillæ æmulatione: fructus autem fragaria sterilis simillimus. Hæc Lobellius. Pentaphyllum nascitur in riguis, inquit Dioscorides, & in aquariis ductibus. Sic Pentaphylla nostra locis opacis & decliuibus proueniunt, & aquis, præcipuè rubrum, quod solum in scrobium marginibus, & scrobibus ipsis, & stagnantibus aquis reperitur. Florent Maio & Iunio potissimum mensibus. Quinquefolium plurimis polere remediis scribit Diosco. Radicis decoctum ad tertias, si ore contineatur dentium dolores sedat: putredines in ore si colluatur sistit: arteriæ asperitates si gargarizetur emendat. Contra alui profluvia & dysenterias auxiliatur: item articulorum & coxendicū dolores potum sanat. Cocta radix in aceto, & illita herpetas cohibet. Strumas discutit, duritias, & demata, aneurysmata, abscessus, erysipelata, pterygia digitorum, cōdylomata, scabiēsque, sanat. Teneræ radicis succus cōtra iocinoris & pulmonis affectiones, & venena prodest. Folia cum hydromelite aut vino diluta, aut exiguo pipere contra febrium circuitus bibuntur, in quartana quidem quaternū ramulorum folia, in tertiana verò ternū, in quotidiana vnus. Tricenis diebus

pota

pora comicialibus auxiliantur. Foliorum succus per dies aliquot trium cyathorum mensura potus celeriter morbum regium sanat. Vulnere quoq; & fistulas cum sale & melle sanant: intestinorum ramice laborantibus succurrunt. Quinquefoliū sanguinis profluua sistit potum & illitum. Plinius eadem quæ Dioscorides variis locis tradit. Quinquefolium strumis medetur, inquit, & pectoris vitis. Idē ischia- dicis bibitur & imponitur: panos sanat, impositum articulis vtilissimū, fistulis quæ in omni parte serpunt auxilio est cum sale & melle, phalangio aduersatur, lichenas emendat. Succus de quinquefolio potus ciathis tribus anginae medetur. Idem ioci- noris & pulmonis vitis, sanguinemque reiicientibus, cuiusq; sanguinis vitio in- tus occurrit. Multi supra omnia laudant ad deploratos dysentericos Quinquefoliū decoctis in lacte radicibus & potis. Idem decoctum ad tertias in vino ictericis dari atq; illini vtilissimum est. Eius folia ex aqua comiliales sanant. Item contrita ex vi- no sumpta triginta diebus in beronica farinae pondo denariorum tredecim cum aceti scillitici cyatho, comicialibus morbis liberant. Celestine succus regio morbo medetur tribus cyathis cum sale & melle potus. Quinquefolij folia quidam terna tertianis dedere, quater na quartanis, plura ceteris, omnibus obolis tribus cum pi- pere ex aqua in usula. Galenus Pentaphylli radicem scribit desiccare vehementer, minimum verò acrem esse, ob id multo esse vsui, velut alia quoq; omnia, quæ cum sint tenuius partium, citra mortuum desiccant. Est enim hæc radix, inquit, desicca- toria ex tertio ordine minimum habens evidentis caliditatis. Idem Quinquefolij radicem in vino coctam dentium dolores leuare tradit.

Lib. simpl.

Lib. 1. med. local. ca. 9.

TORMENTILLA, CAP. XXIX.



ΠΤΑΦΥΛΛΟΝ Græcè, Septifolium Latine, vulgò Tormentilla nominatur, Gallicè *Tormelle*, Germanicè *Rothwurz*, & *tormetull*. Hepta- phyllum à septenario foliorum numero, Tormentilla verò quia tor- mentum cruciatumve dentium fixissimum placat, atq; venenatarum

Nomina

TORMENTILLA.



quarundam rerum compesci furorem crucian- tem. Quinos, senos, octonosve ramulos, graci- les, rotundos, humi repentes & subrubentes ex vna radice profert: folia parua, quina, sæpius se- ptena, in singulis pediculis crenata, quinquefolij minoris lutei similia, flosculos luteos, radicem crassam, bistortæ similē, modicè inortā, atq; in- tus rubrā, foris nigricantē. Ex hac descriptione cōstat falli eos, qui Tormentillam Dioscoridis pentaphyllum esse putant: hoc enim quina tan- tum, illa septena sæpius folia fert, hoc radicem oblongam, rectam, elleboro nigro crassiore, illa breuem, cōpactam, inortam, bistortæ ferè instar. Propius ad Chrysogonum Dioscoridis accedere videtur, quod densè fruticat, quernis foliis, flore coronarij verbalci: radix vt rapum extuberrat, intus tuberrima, foris nigra. Tormē- tilla nemoribus opacis, montosis etiam, siccis macilentisque locis gaudet. Serò & æstate flo- ret. Desiccatoriā esse tertio ordine, nullatenus ramen manifesta caliditate participare vires ef- fectusque demonstrant: nam vulnera glutinat,

Forma.

Lib. 4. cap. Pena & Lobel.

Locus.

Tempus.

farina herbæ vel radice cum succo plantaginis pota urinæ incontinentiam supprimit. eadem insparfa vulnera ad cicatricem perducit, cum oui albo subacta, & higli-
no decocta datur cholericiis, foliorum succus deploratis fistulis instillatur, neque
non oculis ad discutiendas maculas. Ad putrescentia oris vlcera herba & radix cõ-
manducata, & ore retenta valent. Herpetas, strumas, duritias, tumores, aneurysmata
sanat. Denique easdem quas quinquifolium facultates habet. Quare venenis resis-
sit, dysenterias & omnes sanguinis eruptiones compescit. Radicum pulvis cauis
dentium inditus cum aluminis & pyrethri momento, non modò dolorem sedat,
sed fluxiones cohibet. Heptaphyllo herba trita, inquit Apuleius, & cum oleo mixta
pedes perunges id tertio die dolorem tollit.

S A N I C U L A,

CAP. XXX.

Nomina
In cap. 38.
lib. 4.

Genera.

S A N I C U L A, Mas,

Cap. 160.
38.

Forma.



Lib. 4. cap.

Locus.

Pena in
Ado.

Tempus.

Temper.

Virr.

Ibid.

VETERVM nullo descripta, sed à recentioribus inuenta quemad-
modum & multæ aliæ vulnerariæ herbæ, censetur herba hæc, cui à
potiore medici inuenerunt, nempe sanandi, nomen saniculæ datum: sa-
nat enim vulnera. Germanis *Sanniker*, Gallis *Sanicle* dicitur, à nonnul-
lis Diapentia. Matthiolus hanc quartum pentaphylli genus facit, minimè ex aliorum
etiã peritorum herbariorum sententia. Sed
cùm herbis aliquot Saniculæ nomen positum
sit, hic de duabus duntaxat tractabimus, quarum
vna est, quæ propriè Sanicula, & Sanicula mas
nominatur, altera quæ cùm forma & facultate
ad veram Saniculam, quæ mas dicitur, proximè
accederet, Sanicula femina à Fuchio, & aliis
herbariis nominata est. Sanicula mas folia fert
vitis aut apij, rotunda, in quinque partes dissecta,
altiore diuisura, fimbriata, ex atro virentia, leuia,
numerosa, singula è singulis pediculis purpura-
scentibus, ex radice prodeuntibus, ex qua & cau-
les folia superantes, glabri, teneri, graciles in quo-
rum verticibus rotunda capitula, floribus albis
referta, deinde semen hirsutum & asperum: ra-
dix fibrata ellebori nigri modo, foris nigra, intus
alba. Sanicula femina cauliculos emittit tene-
ros, glabros, flexiles, in quibus folia quinquepar-
tita, parùm crenata, geranij columbini aut sani-
culæ incisura, aspera, nigricantia, in quibus sum-
mis flores in umbella congesti, candidi, aut cæ-
rulei diluti: semen striatum, oblongum: radix
quamplurimis fibris longis, nigris constat, ex vno nexu appensis, ellebori nigri
radici planè similis. Quare nonnulli, in quibus est Dodonæus, elleborum nigrum
esse voluerunt. Cordus Astrantiâ nigram appellat. Sanicula mas nascitur in sil-
uis vdis, & vmbrosis locis septentrionalium regionum magis quàm calidiorum,
copiosissima & notissima Anglis & Germanis, à quibusdam etiã in hortis colit-
tur. Sanicula femina vmbrosis quoque, montosis, sed celsioribus & Alpibus de-
lectatur. Iunio & Iulio mensibus florent. Sanicula mas adstringit simul & amara
est, ut hoc nomine calfactoriam & exsiccatoriam esse nulli dubium sit. Statuunt
autem calidam & siccam esse ordine secundo Dodonæus siccam ordine tertio, &
adstringentem esse scribit. Saniculam vulneribus conferre mirificè experientia
compertum

SANICVLA Femina, Fuchf.



compertum est:quare Gallis, inquit Ruellius, ^{Li. 1. ca. 47.} in adagium venit vulgò iactatum, eos non egerè chirurgo, qui Saniculam habuerint. Germani chirurgi ad interna vulnera, enterocelas & fistulas maximè vtuntur, eius puluerem vel decoctum potui exhibentes. Vis est eius eximia ad internorum excrementorum commotionem inhibendam, sistendamq; ne in partes, imbecilliores corruant. Tumores enim reprimere decoctam herbam, aut impositam, aut eius succum illitum tam in homine quàm in pecudibus constat: neque aliud præsentius est auxilium, cum ad pulmones vel fauces vitium decumbit, folijs & radice in aqua melle addito coctis, & potui datis, malignis & putridis oris, gingiuarum, & faucium vlcibus collutione & gargarizatu medetur. Denique omnia, quæ symphytum, præstat etiam Sanicula potissimum verò sanguinis sputo dysenterix, renùmque vitijs medetur decocta in aqua vel vino & pota.

CORTVSA,

[AP. XXXI.]



ATTIHOVS herbam quandam eximiis viribus insignem celebrat, ^{Ca. 17. li. 4.} quam Cortusam ab inuettore Cortuso Patritio Patauino nominauit. Lobellius Veronensium Caryophyllatum flos Saniculæ vrsinæ. Prouenit hæc folijs ferè vitis, sed minoribus, subrotundis, atque sub-

CORTVSA, Matthioli.



asperis, adstringente quadamtenus sapore, in longis pediculis. Caules editi tenues, rectos, folijs nullis vestitos, qui in cacumine magno naturæ artificio flores gerunt extrema parte purpureos, intima aureo fulgore splendentes, aureisq; staminibus intus repletos. Est etiam quæ violaceos, & quæ candidos flores ferat, sed prima frequentior. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, prolaxis. Nascitur vmbrosis locis, nunquã à Sole illustratis, cretaceo & albicante solo. Nusquam ab inuettore Cortuso visã est præterquam in agro Vincentino, in eo tantum tractu, quem vulgò appellant *Valleflagna*. Tota planta dum recens est gratissimum odorem spirat, mellis fauis similem, sed multò gratiorem, qui in secca euanescit. Experientia compertum est valere hanc plantam ad mulcendos neruorum & articulorum dolores, à quacumque causâ exortos. Nam ipsius floribus in amygdalino oleo recente ac rosaceo, quod completum vocant, pari pondere commixtis ac diu insolatis, fit ad hoc

Forma.

Locus.

Vires.

medicamentum præstantissimum, si egelidum illinatur. Nec dubium quin tota planta adstringere, ac roborare, & vulnera vlceraque sanare possit. Ea recentiores vruntur pota ad thoracis vulnera interna. Eius succum admixta æruginè cuniculosus contumacibusque vlcibus vtuliter iniiciunt: olfactu spiritus re-
Temper. ceat, frigidum cerebrum roborat. Epota prodest cæliacis, dysentericis, feminatúmque profluuiis, & cruenta expuentibus. Tam intus sumpta, quàm foris illita enterocelis auxilio est. Quæ omnia efficit temperamento excalescente & exsiccante, quod radices perspicuè indicant, vtpotè quæ gustu odoratæ adstringentésque sint. His nimirum facultatibus attenuare, discutere & adstringere, atque roborare valet.

CONSOLIDA SARRACENICA,
 CAP. XXXII.

Nomina



VIGAREM ac tritam Herbariorum nostri temporis appellationem secuti cum nullum à veteribus huic impositum nomen esse videatur, Consolidam siue Solidaginem Sarracenicam nominamus. Consolidam quidem siue Solidaginem à coniungendis, siue claudendis vulnerum labris (Chirurgi barbari Consolidare dicunt.) Sarracenicam verò quòd Sarraceni & Turcæ quamuis barbari, opinionè magnæ peritiz in medicamentis, præsertim vulneratis, apud nos aliquàdo essent assecuti. Dicitur & Herba fortis, Gallicè *Consoude*, & *Consolide* Sarrazine, Germanicè *Heiduschwundk.* aut. Ex radice multis & crassioribus fibris capillata caulem erigit rectum, rotundum, tubescens, cauum, trium aut quatuor cubitorum altitudine, circa quem folia longa, foliis salicis similia, aut amygdali, leuiter crenata: flores in summo pallidi, qui in auras euanescent. In locis vdis & depressis, siluis vmbrosis & humentibus, & in

Forma.

Locus.

SOLIDAGO Sarracenicæ,
 Fuchsij.



SOLIDAGO Sarracenicæ
 Lobelij.



montosis

montosis viginosis fruticat. Siccat tertio propè gradu. Gustu amara est & adstringens. Potui datur cæterarum Consolidarum modotam internis vulneribus & vlceribus medetur, quàm externis, imposita cum vnguentis, oleis, emplastris. Decoctum eius in aqua hepatis dissoluto tonum reddit, id ipsum & vesicam fellis obstructione liberat. Quare ad ictum febrilemque diuturnitas vtile, & ad incipientem hydropem. Eiusdem decoctum gingivarum, gutturis, & oris vlcera & fæctorem sanat. Aliud genus Sarracenice Solidaginis ponit Tragus, quod nascitur in asperis & lapidosis agrorum limitibus, radice, caule, & foliis quæ habet, cinerea Balsaminæ acutæ, id est, mæchastro per omnia simile. Floret Iulio & Augusto mensibus. Flosculi lutei è rotundis valculis erumpunt. Mirificè sanandis vulneribus, si decocto herbæ colluatur, prodest. Est etiã Consolidâ Sarracenica maior ab Herbariis dicta, quæ in locis vdis & vmbrosis provenit, radice valde fibrata: caule bicubitali, terete: foliis per intervalla singulatim è caule prodeuntibus, latis, crassis, per ambitû crenatis, venosis, in acutum desinentibus: flore senecioni ferè simili, luteo, in pappos abeunte, saporis amari & adstringentis. Consolidam aliam auream nemorum protulit Pena ex Aureliæ Gallicæ siluosis densissimis, quæ folia habet betæ nigre aut Limonij, ex atro virentia, carnosa, aliquantum hirsuta, crassa, venosa, herbæ Aureæ

Temper.
& Vires.

CONSOLIDIDA Sarracenica,
tertia Tragi.



CONSOLIDIDA Sarracenica,
maior.



CONSOLIDIDA Aurea
nemorum, Pena.



Narbonen

Narbonensium similia, cauliculos amplectentia binos aut ternos, in quorū summitate flores sunt radiati, Calendulæ similes & concolores, scitè peſtinatim conſerſis & commiſſis foliolis antequàm dehiſcant, eleganti ſpectaculo. Radix multis capillamentis ſparſa per ſummum ceſpitē Bellidis modo, ſaporis Cōſolidæ mediz tantillum acrimoniz prodentis, aut herbæ Aureæ, cuius etiā vires, & aromaticum quid æmulatur. Conuenit, inquit Lobellius, cum Aliſmate Marthioli, & Chryſanthemo latifolio Dodonæi. In Friſia ſecus Zurphon & Hackfort frequentiſſima. De Cōſolidis aliis diximus, in libro de Paluſtribus.

VIRGA AVREA,

CAP. XXXIII.

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.

Vires &

Temper.

F S T & hoc nomen recentiorum Herbariorum inuentum, veluti fortallè & herba ipſa, apud vulnerarios tantoperè celebris, Gallicè *Verre d'or*. Initio folia per terram ſpargit, longa, latiuſcula, perſicæ foliis latiora, tenuia, tantillum crenata, coſti hortēſis modo, multò anguſtiora, inter quæ prodiit caulis tenuis, gracilis, leuiter ruſcens, cubitalis & ſeſquicubitalis, foliis ſimilibus veſtitus, ſed minoribus, qui circa ſummum in multos ramulos ſinditur, conſertim floribus luteis ſive aureis ornatos, tandem in auras euaneſcentibus, Cōſolidæ Sarracenicæ modo: radice ſuſca, fibrata. Nemoroſis & ſaltuoſis opacis Germaniæ, Galliz, Angliæ copioſiſſimè prouenit. Auguſto menſe floret. Vis eius adſtingendo efficaç, ſed ſiccando multò efficaçior. Chirurgi iis ſcèliciter exhibent, quibus intrò inſlicta ſunt vulnera, & ad fiſtulas. Eſt enim glutinandis vulneribus, & vlceribus tam externis quàm internis, atque ſanguini ſiſtendo efficaçiſſima. Arnaldus hanc ſummoperè laudauit ad vrinam ciendam & ad calculos exterendos. Pota alui fluxiones cohibet, & clyſteribus inſuſa. Eius decocto ſanantur oris vlcera, firmanturq; dentes. Item gargarizata anginam & columellæ inflammationem arceat, & fauciu morbis medetur. Verbaſci genus quidam

VIRGA Aurea, Matth.



VIRGA Aurea, Dodon.



effe

HERBA Aurea, Pena
& Lobelij.

DOREA, Sive herba Aurea
Narbonensium, Pena.



VIRGA Aurea altera, Lobel.



esse volunt. Aliis est Leucophragis Plinij, & Herba scripta Anguillare; à conspectis quibusdam notulis locis, nonnullis potissimum conspicuis. Huic atroxenda Herba Aurea Narbonensium, vulgò *l'Herbe doree*, foliis Limonij aut Lapathi, flore luteo tripolij. Radix ei parua pro plantæ magnitudine, radici ellebori albi par, capillamentis & fibris, & toto habitu similis: caulis rectus, procerus, circa quem, vt & à radice, numerosa exeunt folia, longa, crassa, rigida in imo angusta, in medio palmæ latitudinem æquantia, intensæ viriditatis, extantibus in eis transuersis & purpurascensibus nervis: flores sunt in summo caule in ramulos diuiso senetionis aut tripolij marini in pappos abeuntes. Sapor, odor radici & foliis aromaticus & medicatus, Angelicæ siluestris, & nonnihil nitroso gustu minimè acri. Plurimè hac vtuntur vulnerarij, & eam plurimi faciunt Medici quidam. Quæ coniectura cæteris congruentibus notis, magis persuadet esse Theophrasti Chironium, Lapatho simile, aut certè vnum

eorum quæ ad Theophrastum Plinius retulit, vt Pharnaceum. Galloprouinciæ & Narbonæ annibus non admodum rapidis, & iisdem natalibus quibus Limoniū gaudet: vnde in hortis Belgij & Angliæ translata fuit. Hæc Pena. Priori Virgæ aureæ similis est Virga aurea altera Lobelij serrato foliolo, & tantoperè illi effigie totoq; habitu conuenit, vt neutram ab altera discernere queas, nisi magnitudine & foliorum

& foliorum diuisura: affurgit enim procerioribus duplò caulibus, maioribus, magis serratis foliis. Belgis hortensis est, Italoq; semine orta putatur.

HERBA TRINITATIS,

CAP. XXXIIII.

Nomina



Forma.

Locus.

RABEIS & Mauritanis incognita videtur fuisse hæc quæ hodie ab Herbariis Hepatica, quòd hepaticos iuuet, & Herba trinitatis à foliorum figura nominata est, & Hepaticū Trifolium, Gallis *Heparique*. Folia fert ampla, in tria diuisa, trifolij acetosi foliis haud ab similia, sed maiora, longis pediculis appensa, auersa parte Cyclamini modo subpurpurea, aduersa albis quibusdam maculis respersa. Cauliculos emittit tenues, in singulorum verticibus primo statim vere flos emicat cæruleus, è quo capitulum exoritur echinata specie, in quo semen oblongum, subcæruleo colore. Radicibus nritur numerosis, tenuibus, nigris vel subrubentibus. Locis prouenit vliginosis, & inter fruteta: gaudet enim opacis. Probatum maxime à recentioribus medicis ad vulnera glutinanda tam foris illita, quàm intus sumpta: item ad enterocelas, in quem vsum puluerem dimidij cochlearis mensura ex vino austero propinant. Totà planta decoquitur in vino eodem ad columellæ fauciumq; inflammationes. Refrigerat enim

HERBA Trinitatis,
Martholi.HEPATICA Polyanthæ,
Lobellij.

siccatur & roboratur. Quare aduersus intemperies calidas, & inflammationes hepatis & febrium calores perutilis. Huius flores colore variant, aliàs cærulei purpurei & quandoque niuei. Nonnunquam etiam folia maiora maculis notulisve variegata spectantur. Alia Hepatica Polyanthæ cognominata à Lobellio exhibetur, floribus in purpureo cæruleis multiplicibus stipata peregrina elegantia. Alioqui folia, radix superiori haud ab similia. Hæc Lobellius.

GERA

GERANIVM, CAP. XXXV.

GERANIVM Græcis, Latinis similiter Geranium, Gruina & Gruinalis aptissima similitudine nominatur, quod in eius vertice fastigia confurgant nutantia capitulis Gruum cum rostellis similia, in quibus semen occluditur. Diuersæ species diuersa fortiter sunt nomina. Dioscorides duo duntaxat tradit Geranij genera: sed cum multis Europæ regionibus tres quatuorve alia differentia, Dioscoridi, & fortasse priscis aliis ignotæ copiose proueniant: quibus ob rostrata semina rostrati capitis gruini referentia effugiem, herbarij meritò geranij nomē indiderint, de omnibus hic dicemus. Ac primum de iis duobus quæ à Dioscoride prodita sunt, non ut reliqua passim obuia. Primum, inquit, folium habet anemonæ simile, fissum, longius, radicem subrotundam (alia exemplaria & Oribasius habet *τροχιλῶν*, idest, rotundam) dulcem, quæ editur. Hoc Geranium Ruellius esse putat, quod Acus pastoris, Acus muscata, Rostrum ciconix, & Rostrum gruis hodiè Officinis & Herbariis dicitur, Gallicè *Bec de ciconie*, & *Bec de grue*, Germanicè *Storkenschnabel*. In eadē sunt sententia Fuchs. Dodon. Sed cum huic radix mali modo rotunda non sit aut subrotunda, nec folia anemones, aliq aliud atque aliud exhibent. Matthiolus quidem ubique Ruellij sententiam infestatur, scribitq; primum Dioscoridis Geranium in Ananiz vallis agro & passim ferè prouenire, foliis anemones modo laciniatis, floribus in purpura albicantibus, è quibus gruum capitula prodeunt, radice alba, ferè rotunda ac dulci. Verumtamen prima Lætinorum commentariorum editione, Geranij primi pictura nullū aliud exprimere videtur, quàm Acum pastoris, siue Muscatam, Ruellij, Fuchsi, Dodonæi Geranium primum. Postremis verò editionibus posita nihilominus superiore Geranij primi descriptione, aliquantò post longè aliud Geranium describit ac depingit his verbis. Primum Dioscoridis Geranium folia gerit anemones, longioribus tamen diuisuris, in vnoquoque folio senis. Caulem mittit ab ipsa radice rectū, tenuem, geniculatum: flores è geniculis in caule prodeunt punicei vnà cum foliis, rosarum ferè figura, sed longè minores, qui quinque tantum foliis constant, è quibus rostellum oriuntur, inferna parte lunata. Radice rotunda nritur, nucē pontica maiore, subnigricante, & dulci sapore prædita. Nascitur incultis locis. Copiosum in Dalmatia prouenit. Cui delineationi

Li. 2. ca. 114.
Genera.

Geran. I.
Dioscor.
Forma.

Li. 3. ca. 62.

Ca. 76. lib. 2.
Lib. 4. ca. 31.

In cap. 14.
lib. 4.

GERANIVM I. Matth.



GERANIVM I. quorundam, Dalechampi.



GERANIVM II. Diof.

III. Matth. *Pes Columbinus.*Pena in
Aduerf.GERANIVM Tubero-
sum, Dodon.Geran. II.
Diof.
Ibidem.
Pes. Penia
Ad.

Ca. 14. li. 3

pictura quam apponit, prorsus responderet. Alij id pro Geranio primo Dioscoridis habent quod in maritimis, circa Toloneni & Antipolim Galloprovinciæ oppida nascitur, radice rotunda, pruni aut exigui mali magnitudine, intus candida, cortice crasso vestita, è nigro rufescente, plurimis villis & tenuissimis capillata, ex radice capite prodeuntibus, longiusculis, rufis: folijs aquilegiæ, minoribus, longò & gracili pediculo nixis: caule dodrantali, foliolis tribus media parte cincto, cætera nudo: flore puniceo, elegantissimo, foliolis multis radiato, apicibus intus nigricantibus. Pena bulbosum & paruum Geranium primum Dioscor. describit radice pallida, subliuida, rotunda, sapore insipido, insulso & vesco: foliis in longis petiolis ab vno centro quinquepartitis, diuisura Geranii Robertiani: floribus non ita intense purpureis: rostellis multis, Oeniponti à se visum, rarum in Gallia & Italia. Geranium primum radice tuberosa aliter depinxit Dodonæus, & vt opinor, fidelius quàm Matthiolus. Folia huius vti ranunculi, in multas finduntur lacinias: ad anemones folia accedunt, maiora tamen, & profundioribus incisuris dissecta: cauliculi tenues, ramosi, in quibus flores quinque, foliorum, exiguas rosas mentientes, diluti ruboris, oblongum, tenuem, acuminatumq; instar rostri gruis fructum post se relinquentes, vnde nomen: radix crassa, rotunda, & tuberosa non absque fibris nonnullis. Geranium alterum Dioscoridis cauliculos habet tenues, lanuginosos duorum palmorum altitudine, folia maluarum similia, & in summis alis eminentias quasdam rursus spectantes, veluti gruui capita vnà cum rostris, aut dentes caninos. Geranium istud secundum Dioscoridis, Fuchsij, Dodonæi & aliorum sententia, idest quod Geraniū columbinū, & Pedem columbinū vulgus vocat, Galli *Pied de pigeon*. Germani *Tanberfusz*. Nam caules tenues, rubentes, à radice statim lanuginosiq; obtinet, folia maluarum minoris, candidiora, vel faniculæ, circinata, senis octonisve incisuris laciniata, flaccida: flosculos subpurpureos, capitella gruui capitis modo rostrata, radicem tenuem & oblongam. Matthiolus non dubitat Geranium secundum Dioscoridis eam esse herbam, quæ Pes columbinus vocatur, quod nullis prorsus reclamantibus notis hæc illi respondeat: eamq; pro secundo Geranio, prima commentariorum editione depinxit. Idem in postremis editionibus initio confirmat, deinde hæc subiungit. Aliam ab his (primo scilicet Geranio & Pede

GERANIVM Aliud,
secundum, Matth.



GERANIVM Tertium
Plinij, Acus muscata.



acutæ. Folia etenim fert myrthidis aut cicutæ, minoribus tamen diuisuris, humi iacentia, quæ senescencia rubescunt: cauliculos multos, breues, rotundos, graciles, teneros, subpurpureos, hispidos, præsertim cum adulti sunt: Rosculos in summo venustos, purpureos, stellæ figura, deinde capicula gruum aut ciconiarum

& Pede columbino.) Geranij plantam vidimus in multis hortis ac viridariis satam, foliis rotundis, secundi Geranij modo per ambitum laciniatis, maluum magnitudine æquantibus, fructu gruinis capitulis simili. Hanc herbariam nonnulli Momordicam nuncupant quemadmodum & balsaminam: alij eodem nomine vocant, eamque cæteris præferunt in porionibus ad interna vulnera glutinanda. Hæc mea quidem sententia, inquit, magis respondet alteri Dioscoridis Geranio, ut quæ foliis ad maluum propius accedat. Quare & hanc magis eandem esse cum illo putauerim. Verumtamen haud eam inficias quin Pes columbinus idem sit geranium: sed id quis rectius fortè geranium minus dixerit. Paulò post geranium illud secundum aliud à Pede columbino ita describit. Secundum foliis est malux minoribus, ped. culis tenuibus, longis & subrubentibus appensis: caulibus gracilibus, flexilibus, rotundis: floribus puniceis, ex quibus acuminati apices oriuntur gruinis capitibus similes. Radicem habet tenuem, palmarem & fistulosam. Nascitur secus itinera, locis incultis, ac etiam in hortis. Idq; secundi geranij nomine appinxit, quod prima eorumdem commentationum editione pro tertio posuerat. Duobus Græcorum geranij Plinius tertium Latinorum geranium videtur addere, his verbis. Geranium aliqui Myrrhin, alij Myrrhica appellant, similis est cicutæ, foliis minutioribus & caule brevior, rotundo, saporis & odoris iucundi. Noliti sic eam tradunt. Græci foliis candidioribus paulò quàm malux, caulibus tenuibus, pilosis, ramosam ex interuallis, binum cubitorum, & in his folia, inter quæ in cacuminibus folia sunt gruu. Alterum genus foliis anemones, diuisuris longioribus, radice mali modo rotunda, dulci: Geranium Latinorū et si myrrhis, Plinio auctore, à quibusdam nominetur, tamen à Dioscoridis myrrhide differt, cuius historiam Plinius etiam alio loco tradidit. Sed Matthiolus cum quibusdam aliis rectè cæset esse, id quod à Fuchsio & Dodonæo pro primo Dioscoridis geranio positum fuisse diximus, & rostrum ciconiæ, Acupastoris & Muscatam appellatum, Gallis *Bec de*

Li. 16. ca. 11.
Geran. 3.
Plin. 3.

Li. 24. c. 16.

Form. 1.

HERBA Roberti. Geranij
1111. genus, Matth.

Ca. 14. li. 4.
 Gera. III.
 Herba Ro-
 berti.

Forma.
 Fuch. cap.
 76. Hist.
 Pte Pen. in
 Adocif.



GRVINALIS, Dodon.

Gera. V.
 Grunialis.

Forma.



Gera. VI.
 Hamarod.
Forma.

Li. 4. ca. 14.

Gera. VII.
 Battach.

terna quaternave simul cum rostellis, longitudine acus: vnde Acus pastoris nomen, & muscata ab odore iucundo, ut ait Plinius, cicutarie veræ aut myrrhydis: radix est digitum longa, rotunda, candida, dulcis. Id pro tertio Geranio pinxit Matthiolus in postremis commentar. editionibus. Huius Geranij species, eodẽ Matthiolo auctore, est herba geraniæ etiam adnumerata, quæ à caulium, foliorum & florum rubro colore primùm Ruberta dicta est, deinde Herba Roberti, Herba Robertiana, & Geraniũ Robertianũ haud dubiè à superstitione aliqua Diui, quæ superior ætas mirificè imbuta fuit, Gallicè *l'Herbe Robert*, Germanicè *Ruprechtskraut*. Cauliculos spargit multos, graciles, hirsutos, purpurascens, vel phæniceos, geniculatos: folia chærephylli vulgaris aut coriandri, siue pentaphylli, aut artemisiæ diuisura, sed profundiore, subhirsuta: flores multi in summo quinque foliolis constant, purpurei, circinati, qui desucentes rostratos mucrones aut acus ex latiore basi in rectum desinentes relinquunt, in quibus veluti siliquis parvis subhirsutis & subasperis pusillum semen includitur. Radix ex flavo viret. Hanc Matthiolus postremis commentar. editionibus quinti Geranij, Fuchsius & Dodonæus tertij nomine depinxerunt. Robertianæ species est quæ gruinalis & geranium gruinalis à Dodonæo nominatur. Germanicè *Kramchasse*, cauliculis hirsutis, rubentibus: floribus purpureis, capitellis gruini capitis instar rostratis, superiori similis. Floribus maioribus duntaxat differt, & foliorum altioribus incisuris. Radix eius est intus candida, foris sublutea. Fuchsius & Dodonæo quartum est geranij genus. Tertia item Robertiana cauliculis multis, teneris, nonnihil hirsutis, foliis altius insectis, floribus purpureis, capitellis gruini capitis formam referentibus, secundæ Robertianæ similis est, præterquàm quòd huius tertie caules proceriores sunt & longiores, folia maiora, flores item maiores, roseo colore & ambitu: radix sanguineo intus & foris colore, à quo geranium hamarodes à quibusdam, & à Germanis *Blutwurte*, radix sanguinea, aut à mirifica eius in sistendo sanguinis profluio facultate. Periti quidam herbarij hanc terriam censent esse Dioscoridis Achilleam sideritum, tum quia descriptioni quadret, tum quia præter planè ea quæ Dioscorides eidem reddidit. Anguillara Panax Heracleum. Dodonæus quintum, Fuchsius sextum geranij genus faciunt. Aliud geranij genus quintum Fuchsi, sextum Dodonæi, quartum Matthioli in postremis commentar. editionibus, Battachoides & magnum à foliorum figura

& magni

GERANIVM Hamatodes.

GERANIVM Barrachoides.



GERANIVM Fuscum,
Lobellij.



& magnitudine, cæruleum à florum colore dicitur, à Germanis *Gottes gnad*, id est, gratia Dei, ab insigni in sanandis vulneribus effectu. Caudex similiter habet longos, rubentes, hirsutos, ramosos, aculeatos, qui copiosi à radice propagantur, & variè inclinantur atque huc & illuc procumbunt: folia cæteris maiora, rotunda, fissa, peramplis, multisq; diuisuris, ex pediculis glabris, pluribus ab uno caulum internodio ortis: flores cæruleos vel violaceos, qui cum deciderint gruina, ut in cæteris, prodeunt capirula cum rostellis crassioribus quàm superiorum, in summitate triplici apice coronæ instar fisis, nonnihil inflexis, cum iam præ ætate marcidi deorsum nutant flores: radicem cæteris crassiorem, longiorem, robustioremq; multis radiculis fibratam, colore rufescente, lignosa intus materie. Lobellius tradit alterum esse Geranium Barrachoidi cognatum, quod prolixiore serpit radice, flexibus variis in obliquum & cespitem summo sparsa, rufescente, subtus fibrata, geniculata & odorata, digiti parui crassitudine. Folia Saniculæ rotundiora, aut Geranij Barrachoidis, albidiora, nonnihil incana, pediculi & flosculi purpurei violacei, alterius minores. Angliæ & Belgij hortis inquilina. Huic Geranio longius radicato & Saniculæ figura, simile est geraniū fuscū ab eodè Lobellio descriptū his ferè verbis. Folia illi quàm Geranio supradictò maiora, maculis fuscis pullisve nigricantia. Incunte ætate pereleganti flore livido purpurascente, medio

diora, aut Geranij Barrachoidis, albidiora, nonnihil incana, pediculi & flosculi purpurei violacei, alterius minores. Angliæ & Belgij hortis inquilina. Huic Geranio longius radicato & Saniculæ figura, simile est geraniū fuscū ab eodè Lobellio descriptū his ferè verbis. Folia illi quàm Geranio supradictò maiora, maculis fuscis pullisve nigricantia. Incunte ætate pereleganti flore livido purpurascente, medio

GERANIVM *Batrachoides*
alterum longius radicatum, *Lob.*

GERANIVM *III.*
Matthioli.



GERANIVM *VI.*
Matthioli.



Locus.

candicante, reflexo, cauliculis pedalis, multis, exilibus, alis donatis fruticat, & propagines fundit è radice oblonga. In hortis Belgij viget. Hæc Lobellius. Matthiolus in postremis commentar. editionibus sextum idq; novum geranij genus cæteris addidisse se putat, foliis althææ proximis. Sed cum in eodem commentario plantam hanc in hortis sibi visam, & herbariis quibusdam momordicam nuncupatam dixisset, & pro secundo Geranio Dioscoridis pinxisset, ad eiusdem commentarii finem tanquam rerum incertus vel oblitus, eandem, quasi alterius generis planta foret, ut Calzolarij donū, pro sexto Geranio describit & appingit. Folia illi althææ proxima, caules multi, læti, hirsuti, geniculati: flores parvi, rubetes balauftij seu cytini figura, è quibus græna prodeunt capita, rostro ut in cæteris acuminato. Radix sesquidodrænalis, digiti crassitudine, quæ humo tenus rubescit. Hæc Matthiolus. Geraniū hoc vocant Pena & Lobellius *marx* *rossii*. Geranium columbinum cultis & incultis passim inodorum prouenit. Acus pastoris siue moscata in ruderibus, circa sepes, secus itinera, saxoso & extenuato solo. Geranium Robertianum in vmbrosis locis & dumetis, in ruderibus patietinis, & fuggrundiis tectorum, deniq; in segetibus & aruis. Secunda Robertiana in agrorum limitibus & iuxta sepes. Tertia, locis montosis & saxosis. *Batrachoides* in pratis

in pratibus. Acus pastoris inter initia veris Aprilis mense floret. Pes columbinus, Robertiana prima, & secunda Maio mense florent. Geranium hæmarodes & Batrachoides Junio & Julio mensibus. Geranii primi radix, auctore Dioscoride, pota in vino, veri inflationes dissolvit. Eadem radix, tradente Plinio, reficentibus se ab imbecillitate utilissima. Bibitur contra phthilim drachma in vino cyathis tribus bis die. Item contra inflationes, quæ & cruda idem præstat. Succus radices auribus medetur. Opisthoronicis semē, drachmis quatuor, cum pipere & myrrha potum. Rursum, Radix è geranio peculiariter secundis, inflationibusque vulvarum conueniens. Geranium secundum inutile esse scribit Dioscorides. Galenus utrumque omisit. Paulus verò Dioscoridem secutus eadem planè de utroque tradidit. Sed si secundum Dioscoridis geranium sit pes columbinus, posterior ætas quotidiana experientia in sanandis vulneribus ac fistulis eius ac reliquorum etiam mirum esse effectum comperit. Quare eas herbas his ipsis in potu mirificè conferre tradunt. Antiquus quoque herbarius prædictorum geraniorum folia, magnam vim obtinere in glutinandis vulneribus, & articulorum doloribus leniendis tradit. Peculiariter pedem columbinum balneis perutilem asserunt præciti: ad ventris tormina utilissimum esse certum est. Acus moschatæ radicem mouendi vrinam facultatem habere ait herbarius ille: idèoque calculosis, stranguria & difficultate vrinæ laborantibus prodesse. Robertiana vulneribus perefficax, quod docet sapor adstringēs, non ingari odoris, ad mamillarum, pudendorumque vlcera sananda mirificè conducit. Nullum ad sanguinem vnde cumque emanantem compescendum præstantius Geranii genus, quàm tertia Robertiana, ob id sanguinaria radix dicta. Geraniū batrachoides dictū adeò vulneribus efficax est, vt inde Gratie Dei nomē inuenerit.

STELLARIA, CAP. XXXVI.



Ee vulgò ab herbariis Leontopodium, id est, Pes leonis, & Planta leonis, à foliis instar leonini pedis latis, & rotundis, nominatur: minime verò est Dioscoridis Leontopodiū, id quod ex descriptione constat. Dicitur & Alchymilla, quòd Alchymistarum præconiis celebrata sit, Drosiū à Cordo, & à Germanis chirurgis Sanicula maior, quod sit illi, tum facie, tum viribus admodum affinis. Stellaria etiam à foliorum expansorum & florum figura, Gallicè *Pied de Lion*, Germanicè *Synauu*, Louentapen, & *grosz Sanikel*. Folia huic ex pediculis hirsutis qui statim à radice exeunt rotunda, lata, sensu pluribusve angulis quasi plicis distincta, serrata, antequam erum pant vnà sarctæ, & conuoluta, diapsisæ haud absimilia, sed multò minus altè incisa, seu malux, virentia, polita, duriora, inter quæ cauliculi exeunt, hirsuti, selquipedum & pedem alti, albi, rotundi, in quorum verticibus flosculi stellati, ex herbido lutei racematim cogeruntur: in siliquulis herbidis semen luteum, exile, portulacæ vel papaueris, radix est crassa, digitum longa, foris nigra, fibrata umbrosa, montosa, & rigua editiora, vt prata amat. Maio mense erumpit, Iunij initio floret: folia & radix adstrictione vehementi participant, atque adeò exsiccant, minùs calida quàm sanicula, quare vulneribus, si inflammationis suspitio desit, ad-

Nomina

STELLARIA.



Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

Vires.

modum opportuna, non solum externis, sed etiam interioribus, atque etiam sinuosis vlcibus. Eam ob causam Germani Chirurghi miris eam laudibus celebrant, & positionibus vulnerariis admiscunt, decocto eius omnia vulnera lauant, linteam quoque in eo madefactum imponunt. Mulierum mammas impenſe laxas linteam decocto eius intinctum & impositum duras solidasque efficit, præsertim hypocistide, equisetis, alumine, & rosis siccis admixtis. Aridæ pulvis in suo ipsius decocto aut stillatitia aqua sumptus, tamices inestimatorum in pueris potissimum sanat, tâta cibus in glutinando vis est. Datur idem pulvis ex vino, aut iure, cochlearis mēſura, quindecim aut viginti diebus iis quibus adempta sit concipiendi facultas, à nimia veteri humiditate, ob quam iniectum semen contineri non potest. Stillatitia aqua pota, tum in vuluam iniecta, alba mulierum profuua mirifice sistit, adeo ut eius quoque diutina iniectione corrupta ab incorrupta vix dignosci possit constrictis valde locis, quod tum citius, tum efficacius præſtatur, si decocto eius feminæ insideant.

BETONICA, CAP. XXXVII.

Nomina



Ἑβρον Græcè, Betonica, Vetonica & ferratula Latine: Officinæ Betonica nomen retinuerunt. Dicitur etiam ψυχροφον, quoniam frigidis in locis reperitur. κίσρον autem à floris spicatis & mucronata acutis veruculum, seu, ut apud Plinium in vulgatis exēplaribus legitur, viriculū *πυκνότερον*, sic enim ille cestrum interpretatur. Encausto, inquit, pingendi duo fuisse antiquitus genera, cera, & in ebore cestro, id est, viriculo. Et paulo superius dixerat. Penicillo pinxit, & cestro in ebore. Suidas quoque cestron dixit genus esse teli bello persico inuenti. Sophocles etiam cestron dixit pro stimulo siue stylo.

Lib. 3. c. 11.

Lib. 2. p. 8.

Lib. 7. 6m.

Lib. 5. de sit. nat.

Lib. 4. c. 30.

Lib. 7.

Genera.

Lib. 4. c. 1.

Forma.

Lib. 2. p. 8.

Arabicè Chastara. Gallicè *Betaine*, & *Betaine*, Germanicè *Braunbetonica*. Galenus vno loco cestrum & Psychotrophon Romanis Betonicā dici scripsit. Alibi tamen cestrum à Betonica distinguere videtur, & cestrum quod apud Gallos nascitur, sarxiphagum vocari ait. Verba eius hæc sunt. *ἡπειροβάλλεται δὲ τῶν ὄντων περὶ τὸν ἀνθρώπου τοῦτο τοῖς ἀσθενοῦσι. ἐπὶ δὲ τῶν λιγνῶν, ἔτις τῆς βετονικῆς τὴν πρὸς μύνηται, καὶ κίσρον τοῦ παρὰ τοῖς κλῖνις γεννημένη. καλεῖται δὲ τὴν βοτάνην ταύτην σαρξίφαγον.* Id est, Coniicitur autem in vinum petroselinum, atque id solum articularibus satis faciat: iis verò qui calculo laborant, aliquid Betonicæ & cestri quod in Galliis nascitur. Vocant autem herbam eam sarxiphagon. Apud Aëtium quoque locus hic transscriptus ita legitur *ἐπὶ δὲ τῶν λιγνῶν καὶ βετονικῆς μύνηται, καὶ κίσρον τὴν τῆς καλμίνης σαρξίφαγον.* Ex quibus colligitur non solum Latinorum Betonicam, sed etiam Galorum Sarxiphagō, Cestron nominatum fuisse. Paulus perspicue duplicem Betonicam statuit: Vnam ramulis exilibus, pulegio similibus, sed tenuioribus, & prope modum, si gustes, nullam qualitatem referentibus, nascentem potissimum petrosis locis, qua in renum medicinis vtuntur. Alteram Romanorum betonicam, quam Dioscorides nominat cestrum, alij psychotrophum, eò quod frigidis locis gaudeat, quæ nihil simile cum prædicta habet, præter vires, & facultatem, &c. Hæc Betonica, ut describit Dioscorides, herba est caulem ferens tenuem, cubiti altitudine aut etiam maiorem, quadrangularem: folia longa, mollia quernis similia, per ambitum fissâ, odorata, ad radicem maiora. In summis caulibus semen est, thymbræ modo spicatis. nam apud Dioscoridem *ἡραχουμήνην*, sub *καυλῶν*, legendum est, non *ἡραχουμήνην*. sub *πύρραι* radices subsunt tenues velut ellebori. De eadem sic breuiter

thi,

BETONICA.



thi, ferrata, semine in summis caulibus, spicatis, thymbræ modo flore purpureo: sic prorsus legendum. Hæc est omnium consensu Betonica illius omnibus notissima delineatio, frequentissimi hodiè in medicina, & maxime varij vsus foliis longiusculis & latiusculis, ex atro virentibus, serratis, odoratis, inter quæ caulis erigitur, quadrangulus, rectus, pedalis, & cubitalis, asper, in summo ferens breuem spicam, floribus odoratis confertam, elegantibus, purpureis, deinde semen longum, nigrum, angulosum, radix albi-
cat, multas spargens fibras ellebori nigri modo.

Locus.

Tempus.

Temper.

Lib. 4. ca.

Vires.

Nascitur in pratis, siluis, montosis, frigidis & opacis locis. Maio & Iunio mensibus floribus abundat. Calida & sicca est in primo ordine completo, aut in medio secundi, folia, ut tradit Dioscorides, carpuntur & siccantur plurimos ad vsus. Radices cum hydromelite potæ pituitosam vomitionem prouocant, folia dantur utrisque, conuulsis, vuluæ affectionibus, & eiusdem strangulationibus drachmæ vnius pōdere, cum hydromelite. Ternæ in vini sextariis duobus
contra serpentium morsus ebibuntur. Herba ipsa illita venenatis morsibus prodest, aduersus etiam venena drachma in vino pota conuenit. Hanc si quis præsumpserit, letale haustum venenum nihil nocebit. Vrinam cit, aluum subducit, medetur comitalibus, & furiosis cum aqua pota. Locinoris & lienis vitiis drachmæ pondere cum aceto mulso pota succurrit. Concoctionem adiuvat, si quis à cœna eam fabæ magnitudine cum melle cocto deuorauerit. Eodem modo & acida ructantibus propinatur, stomachicis eam manducare, & succum deuorare proderit, si postea dilutum vinum forbeat. Datur sanguinem excreantibus trium obolorum pondere, cum diluci vini egelidi cyatho vno: ischiadicis, renum & vesicæ doloribus ex aqua: hydropicis autem binis drachmis, febrientibus cum hydromelite, non febrientibus cum mulso. Regio morbo laborantes tereat, mensēs dicit drachmæ pondere cum vino pota. Aluum purgant drachmæ quatuor cum hydromelitis cyathis decem potæ cum melle tabidis, purulentis auxiliatur: folia cum inaruerint trita fictili vase recunduntur. Easdem vires, & quasdam alias eidem Plinius assignat, his ver-
bis, folia siccantur in farinam plurimos ad vsus, sit vinum ex ea & acetum stoma-
cho, & claritati oculorum, tantumque gloriæ habet ut domus in qua sita sit, tuta existimetur à piaculis omnibus. Et aliquantò post. Morsibus imponitur Betonica præcipue: cui vis tanta perhibetur, ut incluse circulo eius serpentes, ipsæ sese interrimant flagellando. Datur & ad ictus semen eius denarij pondere, cum tribus cyathis vini: vel farina drachmis tribus cū sextario aquæ, farina & imponitur. Obolis tribus in aqua contra purulentas, contraq; cruetas excreationes facit, faciles præstat vomitiones radix eius, ellebori modo, quatuor drachmis in passo aut mulso. Ischiadicos dolores & spinæ leuar eiusdē farina ex aqua mulsa. Aluu soluit drachmis quatuor, in hydromelitis cyathis nouem. Paralyin sanare dicitur. Eadem torpentibus membris prodest. Ad lateris & pectoris dolores farina eius bibitur. Galenus vim habere incidendi scripsit, ut gustus indicat. Amariusecula enim est, & subacris herba, id quod ostendit particulatim edita eius actio. Nam consistentes in tenibus calculos rumpit, pulmonem, pectus, & iecur expurgat, abstergitque: mensēs quoq;
ciet,

Lib. 4. ca.

Ibidem.

Varis in locis.

Lib. 7. 6m.

ciet, & comicialibus prodest, tum rupta conuulſaque curat, & in omnibus bestiarum moribus vlceri illita auxiliatur, postremò acidum ruſcantibus & iſchiadicis pota auxilio est. Multò plures eâſque perexcellentes eius dotes celebrant alij herbarij, vt Apuleius. Scripsit & de iis proprium libellum Antonius Muſa clariffimus Auguſti Cæſaris medicus, in quo hæc de ea memoriæ prodidit. Herba Betonica naſcitur in pratis, & montibus mundis & opacis, circa frutices. Animas hominum & corpora custodit, & nocturnas ambulationes à maleficiis, & periculis. Loca ſacra & buſſa à viſis metuendis tuetur, & defendit: denique res omnino ſancta eſt. Ceſtron vocatur, & Psychoſtrophon, ſiquidem frigidis reperitur in locis, radicibus tenuibus, thyrfò pariter tenui, cubiti altitudinem excedente, quadrangulo, folia proſert quercus, odorata ſemen in ſummitate thyrfi ſpicati thymbræ modo. Pollet vniuerſa planta dotibus ſerè innumeris quandoquidem tuſa, capitîſque vulneribus illita, ea mira celeritate conglutinat. Præſtat id tamen efficacius, ſi tertio quoque die iterum atque iterum imponatur. Aiunt prætereà tam valentis eſſe facultatis, vt oſſa quoque fracta extrahat. Radicum ex aqua decoctum ad tertias, ſortu, oculorum doloribus medetur, quod item præſtant contrita folia, & fronti ſuperimpoſita. Succus à folijs per ſe tritis expreſſus, aut priùs aqua maceratis, aurium dolores mulcet, ſi addito roſaceo in aures egelidus inſtilletur. Idem drachmæ pondere hauſtus in aquæ calidæ cyathis quatuor ſanguinem illum per inferna trahit, cuius redundantiæ caligines oculis offundit, quò fit vt etiam viſum acuant comeſa folia. Eadem cum ſalis momento contuſa, naribûſq; immiſſa ſanguinem inde fluentem ſiſtit. Betonica decoctum ex vetere vino, aut ex aceto dentium dolores ſinit, ſi eo oſ ſapiùs colluatur. Herba ipſa ex tepère aqua pota ſuſpirioſis & anhelofis maxime proficiat, folia melle excepta rabidos iuuant, præſertim qui putulenta extuſſiunt. Eadem tribus diebus continuis deuorata drach. quatuor pondere, aut ex frigida aquæ cyathis quatuor ebibita ventriculi dolores mulcet, iocinoris verò, ſi ex calida hauriatur. Ex vino decocta lienis vitis medetur. Sanat & renû vitia ex mulſo bibita duarum drach. pondere: ex vino autè vetete trium drach. pondere, additis piperis granis ſeptem & viginti ad lateris lumborûque dolores vtiliſſimè bibitur. In duobus aquæ calidæ cyathis ſumpta, alui & inteſtinorum tormina remouet, ſi tamen à crudis non fiant ſuccis, foliorum quatuor drachmis in aquæ mulſæ cyathis octo epotis, commodè citatur aluus, ſananturq; iis ex vino ſumptis coli inflammatione vexati. Betonica in eclegmate ex melle ſumpta nouâ dieb⁹ tuſim ſedat. Pota in aquæ calidæ cyathis quatuor duarum drachmarum pondere, addita plantaginis drachma, febres quotidianas expellit, quod tamen in acceſſionibus tantum fieri debet. Idem præſtat etiam in tertianis, ſi cum pari pulegio aſſumatur. Sanat ipſo quoque ordine etiam quartanas in quatuor aquæ calidæ cyathis hauſta, quatuor drachmarum pondere: addita mellis vncia calculi franguntur. Betonica ex tepère aqua ſœliciter bibitur hydropicis. Pariendi celeritatem adfert, vrerique cruciatus à frigidi-tate conceptos mulcet, ſi ex calida aqua, aut mulſo duarum drachm. pondere propinetur. Contrita folia & illita præciſos glutinant netuos, & reſolutos iuuant. Eadè trium drachmarum pòdete ex caprillo lacte ſumpta tribus diebus, ſanguinem ore reiectum cohibent: pari vini vetetis meſura, medentur ruptis, & ab alio deuolutis. Præſumpta, ebrietatem arceat. Ex vino frequenter hauſta ictericos ſanat: ſuillo adipi admiſta carbunculos curat. Pota ex aceto mulſo vnius drachmæ pondere viatoribus longo itinere deſatigatis vires mirificè telicit: ſaſtidia abſtergit, & ſtomachicos recreat. Aduerſatur venenis, & ſerpentium, & venenoſorum, tabidorumq; quoruincumq; animalium moribus, non modò intus ſumpta, ſed etiam extra emplaſtri modo impoſita. Cuniculoſa ſinuoſaque ſanat vlcera cum ſale indita. Ex vino hauſta menſes ciet. Potu dolores podagricos lenit, præſertim radicum decoctum

potum, idemq; præstant cōtrita folia imposita. Hæc Anton. Musa. In hac herba id obseruandum, radicū facultates longè dispares à foliorum & florum viribus, vt potè quæ multū stomacho orique ingrata, nauscam, rugitus, vomitumq; cieant, folia contrā odora, aromatica, & grato sapore nonnihil roborante, cibo & medicamento naturæ amica.

BISTORTA, CAP. XXXVIII.

HERBARIJ & Officinæ Bistortam appellant & Serpentariam, Galli *Nomina* Bistorte, Germani *Natternwurte*. Bistortam quidem, quod radice sit serpentis iacentis modo in se cōtracta & intorta: serpentariā verò, quod ubi primū ē terra erumpit, linguæ serpentis tenui pelle vestita formam obtinet. Sed diligenter cauendum ne hæc serpentaria cum Græcorum *Δρακονίς*, Latinorum Dracunculo siue serpentaria confundatur, quod hæc ab illa forma & viribus plurimū discrepet. Quo verò peculiari nomine à veteribus Græcis medicis & latinis appellata sit Bistorta, inter herbarios nondū constat. Quidam

BISTORTA, Martia.



BISTORTA, Maior.



Britanicā Dioscoridis ex foliorum similitudine & viribus iisdem esse contendunt. Quod si qui *μελάντερα* & *διασύντερα* folia obiciant, aiunt illi, *μελάντερα* saturatiore esse colore, & quasi purpura nigricante, vt in viola martia, quam idem *μελάνος* vocat, folia aduersa parte, idē significari: *διασύντερα* verò non hic pilosiora intelligi oportere, sed rigidiora, densiora, & firmiora. Quod addunt radicem britanicæ *λεπτή* esse, respondent alij Dioscoridem aut minoris Bistortæ radicem intellexisse, quæ non admodū crassa est, aut locum hunc à quopiam rei ignato temerè immutatum, qui cū radicem breuem legisset, *παχὺ* in *λεπτὸν* mutauit: quia quæ sunt breues radices, sæpius sint etiam tenues, breuem verò esse videre licet cum lapatho aut minoribus collatam. Duo sunt herbarijs & Officinis Bistortæ genera *Genera* *Forma*. Vnum, Bistorta maior, & serpentaria scemina, quibusdam Colubcina. Aterum Bistorta minor, seu Bistorta mas. Adiiciunt quidam Bistortam minimam. Bistortæ maiori folia sunt longa, rumicis acuti simillima, aliquantò

Genera
Euch. cap.
196.

aliquantò minora, non tam læuia, sed rigidiora & parùm rugata, ambitu paululùm sinuata, auersa parte cæsia, aduersa ex atro virètia: cauliculi teneri, glabri, tenues, pedales aut cubitales, rotundi, in summo spicati cum floribus purpureis, semine anguloso, fusco: radix longa, intorta, foris nigra & fibrata, intus rufescens, sapore glandis, nimirum perquã austero, & adstringere. Huic minor & minima planè similis, nisi quòd hęc folia angustiora, læuiora, radix breuior, minorque, ac magis in sese conuoluta, & contorta, sine vllis fibris, foris fusca, intus ex atro rubescens, eodem quo maior sapore. Nascuntur locis montosis, vmbrosis & humidis. Florent mense Maio & Iunio. Omnium radices minuscè adstringunt, vr refrigerandi & exsiccandi facultate præditas esse nemini dubium sit. Antiquus manuscripus herbarius frigidus & siccas esse in tertio ordine censet. Quare vulnera glurinant, sætum in vtero retinent, vomitum biliosum reprimunt, dysenteriam sanant. Efficacissima ad vlcera serpentia, & ad fungosa polyporum in naribus & palato inreiora flagella absumentia aqua earum stillatitia, quæ etiam ad hepaticam sanguineamque resudationem plurimum pollere pota.

Locu.

Tempus.

Temper.

¶ Vires.

Furh. cap.

276.

Pec. Penin

Ada.

CENTAURIUM,

CAP. XXXIX.

Nomina

Genera.

Lib. 4. c. 6.

Lib. 4. c. 6.

Lib. 4. c. 7.

Lib. 4. c. 6.

Ibid.

Cornar.

Embl. 7.

lib. 4.

Ibidem.

Lib. 4. c. 6.

Cap. 1. lib. 4.

hist. & cap.

9. lib. 4. c. 6.

dem.

CENTAYPION Græcè, Latine similiter Centaurium, Arabicè *Kanturion*, in Officinis Centaurea nominatur. Dioscorides, Galenus, & ceteri, omnes præci medici centaurij genera duo statuerunt, effigie & natura multum diuersa. *κενταύριον τὸ μέγα*, Centaurium magnum, ab aliquibus dicitur, teste Apuleio, Maronion, Nesson, Pelethronia, Limnites, Heme- roten, *αἰμα ἡρακλίδης*, id est, sanguis Hercules, Polybidion & Vnesira, Arabicè *Kanturion Kibur*, siue *Sacurion habre*, in quibusdam Officinis non sine errore Raponticum. Alterum *κενταύριον τὸ μικρὸν*, Latine Centaurium paruum, Limnesion & Limnæum, Libadion Plinio, febrifuga, fel terræ, multiradix, Arabibus *Kanturion sege* & *sege*, seu *kanturion sager*, Officinis Centauria minor, Gallis *petite centauree*, & *fil de terre*, Germanis *klein Tansende*, Irælis *Centaurea minore*, *Hetrascu Biondella*, quòd detergere, & flauos reddere ex luxiuo mulierum capillos possit. Dictum est Cetaurium, teste Plinio, quòd eo Chiron Centaurus curatus sit cum Hercules excepti hospitio tractantiarum, sagitta excidisset in pedem, quare aliqui Chironium vocant. Limnesium & Limnæum, quòd secundum aquarum scarebras & paludes, quas Græci *λίμνας* vocant, nascatur, sic enim Dioscorides scribit. *κενταύριον τὸ μικρὸν* (additur in vetere codice *ἢ λεπτὸν ὅτις λευκαῖον καλεῖται*, ἐπεὶ τὸ *ἰνίκιαιος* φησὶ τὸ πρῶτον. Id est, Centaurium paruum & tenue, quòd nonnulli Limnæum vocant, quoniam humida loca amat. Ruellius, Centaurium limnesium aliqui vocauere, &c. Quæ cum Plinius conuertisse videatur his verbis. Est alterum Cetaurium cognomine *lepton* minutis foliis, quòd aliqui libadion vocant, quoniam secundum fontes nascitur, &c. pro limnesium & limnæum (quamquam hæc vox tolerabilior quam Limnesium) libadion vox in Dioscoride reponenda videtur, quòd circa *λιβάδας*, id est, locos irriguos nascatur. Fel terræ propter summam quam habet amaritudinem: febrifuga, quòd febres pellat e corpore. Præterea Plinius Exacon Gallis dici Centaurium minus scribit, quoniam omnia mala medicamenta potum e corpore exigit per aluum, quæ vox Exacon an rectè legatur dubitari potest, & an Gallica sit, & non supposita ab aliquo ad Græcam formam ab *ἐξέγειν* efficta, his enim verbis sententiam Dioscoridis hanc expressisse videtur. *ἀφ' ἧς ὅσα δὲ καὶ πεπομένη ἄγει εἰς κοιλίας χαλάρου καὶ παχύνει*. Id est, Decocta autem & pota, biliosa ac crassa per aluum ducit. His Plinius terriam Centaurij speciem subiungit ex Theophrasto, quæ centauris & triorchis appellatur. Verba eius hæc sunt. Tertia est Centauris cognomine triorchis, qui eam secarum est vt non vulneret sese. Hęc succum sanguineum mittit. Theophrastus defendi eam impugnat;

pugnatiq; colligētes tradit à triorchæ accipitrū genere, à quo & nomē accepit. Im-
perin cōfundunt hæc omnia, & primo generi assignāt. Sed Plin. ex suo, ipsius iudi-
cio hanc tertiā speciē excogitauit contra Græcorū omnium sententiā, qui, vt dixi-
mus, maius & minus duntaxat Centauriū, agnoscūt. Et Theophr. de Cētauride nō
vt de tertiā aliqua specie scripsit, sed simpliciter centauridē nominauit, non trior-
chen, sic enim ait. φυλάττεται καὶ τὴν κενταυρίδα τέμνειν, ὥστε χρῆν, ὅπως αἱ φύλεις ἀπὸ τῆς
Quæ malè cōuertisse Gaza videtur his verbis, febrifugā quoq; secātes accipitrē tri-
telligerū nuncupatū cauere, vt sine vulnere possint discedere. Videtur enim cētau-
rida Centaurium minus accepisse, quod febrifugam appellari diximus, cūm aper-
tè Plinius hanc ab illo distinguat. Postremò Plinius alios reprehendens qui succum
sanguineū, & cætera primo generi assignāt, ipsemet errat. Primū enim genus succū
sanguineum emittit, subrubente succo plena radice, vt Dioscorides scribit. Herba-
rij recentiores centaurij minoris duo genera faciunt, quæ foliorum duntaxat inci-
sura differunt. Id quod ferratis est foliis Dodonæus depinxit, quo vireta Belgica

Cor. Emi.
7. lib. 4.Lib. 9. hili.
cap. 9.CENTAURIUM, *Maius.*

abundant. Præterea centaurij lutei duo alia ge-
nera. Centaurium magnum describit Dioscori-
des foliis iuglandis, oblongis, colore viridibus
vt in brassica, in ambitu ferratis, caule seu lapa-
thi, duorum aut etiam trium cubitorum, qui
à radice multas propagines habet, in quibus capi-
ta sunt papaueri similia, in ambitu oblonga, flos
est caeruleus, semen cnico simile, ceu lanceis qui-
busdam floribus inuolutum, radix crassa, solida,
grauis, bipedalis, succi plena, acris cum quadam
adstrictione ac dulcedine, subrubra. Codices
quidam vetusti habent, ἄμειος καὶ ὀξύλης ἱερὸς, id
est, similiter autē & succus rubet. Hanc Dios-
coridis descriptionē declarauit Plinius his ver-
bis. Folia sunt lata & oblōga, ferrata in ambitu,
densa ab radice: caules ternū cubitorum, ge-
niculati. In his capita ceu papauerū. Radix va-
sta, rubescens, tenera, fragilisq; ad bina cubita,
madida succo, amara cum quadam dulcedine
(amaritudo, Cētaurij minoris radici potius cō-
uenit,) est enim alterius radix ex Diosc. δρυμῆς
καὶ ποτῆς ὀξύλης καὶ γλαυκῆς, id est, acris cum

Forma.
Lib. 4. c. 6.

Lib. 4. c. 6.

quadam adstrictione & dulcedine.) Nascitur in collibus pingui solo. Laudatissima
in Arcadia, Elide, Messenia, Pholoë, & Lyceo, atq; in Alpibus, pluribúsque aliis lo-
cis. Dioscorides scribit amare solum pingue & apricum, ac siluas & colles. Copio-
sissima est in Lycia & Peloponeso, in Arcadia, Elide & Messenia, pluribúsque locis
circa pholoen, Lyciam & smyrnam. Herbarij multi diligēter hodie colūt in hortis.
Hoc Centaurium nihil aliud est quàm insignis illa planta cuius vastam radicē pa-
tres nostri rhaponticum esse crediderunt. Floret Maio & Iunio mensibus, Iulio se-
men profert. Alterum Centaurij maioris genus Clusius ostendit, quod folia habet
oblonga. Annoraciæ similia, & ad Glasti foliorum similitudinem accedentia, non
in particulas diuisa, vt vulgare maius, sed per ambitum duntaxat ferrata, intenso vi-
rore & amariuscule sapore. Caules inter folia prodeūt cubitales aut ampliores, ro-
cundi, in summo bifidi aut trifidi, scabra capita sustinentes, alterius Centaurij ma-
ioris æmula, & florem villosū, sed colore candicante, deinde semen Cnico ferè si-
mile, seu potius alterius maioris. Radix crassa admodum, dura & longa, denso cor-

Locus.

Tempus.

CENTAURIUM MAIUS
alterum, Clusij.

Temper.

Lib. 3. c. 6.

Vitis.



scor. exemplaria non habent. *ἡ δὲ ὅλη ἐστὶν πανάκη, ἡ περὶ τὴν πανάκην τὴν φαρμακείαν παλαιὰ καὶ χρίσθησαν παλαιῶν.* Id est, Est autem vocata panacea, quod sanet omnes inflammatorum affectus, ac vulnenum contusiones. Quibus Ruellius de suo quedam addit. Cognominata est, inquit, & panacea, quoniam medetur omnium morbis, ubi aliqua inflammatio timetur omninoq; multis morbis opifera est. Illita vulnenum labra consolidat. *ἡ φαρμακεία τὴν πανάκην ἡνιόχευσι, καὶ λυθιῶντας. συνάγει δὲ τοὺς ἄλλους μάλιστα ἀνατίλλειν ὡς ἀγνῶν, ὅτε φαρμακείαν ἀπανάκη.* Quæ sic Ruellius. Scilicidia vrinæ calculosq; sanat iniectione. Legēda præcipitur cum in eo sol est, vt emergat, hora pura, dum luce sideris erumpentis vniuersa complētur. Alij sic interpretati sunt. Legitur marutinis sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia complētur. Sic verò Andr. Lacuna. Colligitur autem hæc ad exortum solis, purissimo vere aduocante, quo tempore vniuersa cōplentur. Plinius centaureij huius maioris facultates eisdem recenset, sed diuersis in locis. Vis in vulnetibus tāta, vt coherescere carnes etiam eriant, si coquantur simul. In vsu radix tantum duabus drachmis bibēda, quibus dicitur, si febris sit, in aqua trita, cætetis in vino, medetur omnium morbis decoctæ succis. Alij omium legunt non omnium. Et medetur serpentium ictui centaureij maioris radix drachma in vini albi cyathis octibus. Eadem vulnæ doloribus potu forisq; prodest. Derafa verò & apposita extrahit partus emortuos sanguinem reicientibus in edetur, stomacho & dyspnœæ eclegmare, pleuriticis & peripneumonicis bibitur, maiori centauro tormina discutiuntur. Ruptis conuulsisq; & ex alto deiectis datur. Vlcera quæ cacoethē vocāt sanat in sparsum vel illitum. Oculorum aciem centauro maiore putant adiuuari, si addita aqua foueantur. Galenus ex Centaureij contrariis in gustu qualitatibus contrarios eiusdem effectus colligit his verbis. Centaureij magni radix sicut gustu cōtrarias qualitates, ita in vsu contrarios effectus præstat. Gustu itaq; acris simul adstringēsq; apparet cum leuicula dulcedine. At in actionibus, acrimonia quidem caliditatis opera ostendit menses prouocans, & fortum mortuum detrahēs, viuumq; corrumpens atque eiiciens. Adstric-
ticio

tice tegitur, foris nigro, intus flauescente, succumque croceum residante, qui cum quodam amore atomaticus est. Supra Olyssiponem, lapidosis iuxta Tagum collibus du nitaxat inuenit Clusius, ubi Lusitani Tagi accolæ Rapontis vocant. In Belgio peregrinum est. Dodonæus in Historia stirpium Rha, in Purgantium Historia Centaurium alterum magnum vocat. Calidum id siccumq; est ad tertium vsq; ordinem, simul & adstringens. Radix eius conuenit ruptis, inquit Dioscorides, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, tussi antiquæ, sanguinem spuentibus, non febrientibus cum vino, febrientibus cum aqua, ita vt radicis duæ drachmæ trita, similiter ad tormina & vteri dolores. Ducit etiam menses & fortus, in collyrij formam derafa, & vtero apposita. Eadē succus præstat. Vulnerebus prodest, humida quidem contusa, arida verò prius madefacta, atq; ita contusa coniungit enim ipsa & glutinat. Quin & carnes dum coquantur inter se committit, si quis ipsam contusam simul coquat. In Lycia succum ex ipsa exprimunt, quo pro lycio vtuntur. Quæ sequuntur quædā Dio-

Lib. 3. c. 6.

Lib. 3. c. 8.

Lib. 3. c. 9.

6. 7. 8. 9. 14.

Lib. 3. c. 10.

Lib. 3. 7. 10.

strictio verò opera crassæ terrenæq; frigiditatis cum vlcera glutinet, & sanguinem reuicentibus prosit. Exhibentur autè eius drachmæ duæ febricitantibus quidem cum aqua, non febricitantibus cum vino. Porro secundum omniũ simul qualitarum actionem ruptis, conuulsis, dyspnææ inueteratæ tussis cõuenit. Nec enim in talibus euacuare solum quod præter naturam est, oportet, sed partem quoque euacuaram roborare. Vacuationi itaq; accommoda est acrimonia, vtrique cum non sola sit ac purior, sed aut dulcedini iuncta, aut certè non prorsum auaritudini. Si quidem vehementiam hanc atque violentiam mixta illi temperata quædam substantia cuiusmodi est dulcis, non obinebit. Porro ad ea quæ euacuata sunt, roboranda, contrahendaque, adstrictione est opus. Eadem quæ radix & succus ipsius efficit. Arabes, vt *Mesues*, Auicennas, Alcanzi vires maioris & minoris centaury ferè contrarias cõfuderunt, vt dicemus. Datur Centaury maioris radix, auctore Matthiolo, hydropicis, içtericis, & iccinorosis, tum vino macerata, tum in puluerem trita. Eiusdem recentis succus vncie pondere haustus, ac etiam vulneri illitus auxiliatur à serpente demortis.

In cõm. c. 6
lib. 3.

CENTAURY M. Minus.



Centaury minus hyperico aut origano simile est, caule anguloso, palmum excedente, flores è puniceo colore ad purpureum inclinantes, ad lychnidis similitudinem: folia parua, prælonga velut ruta: semen simile tritico: radix parua leuis, inutilis, gustu amara. Huic descriptioni multum lucis adfert Plinius his verbis. Est alterum Centaury cognomine lepton, minutis foliis, quod aliqui libadion vocant, quoniam secundum fontes nascitur, origano simile, angustioribus & longioribus foliis: anguloso caule, palmum alto, fruticante: flore lychnidis: radice tenui & superuacua, succo efficax. Hoc Centaury nostri sel terre vocant propter amaritudinem summam. Id verum legitimumq; esse quod in Officinis passim vsurpatur, notius est quam vt probatione egeat. Propter lacus & rigua loca crescit auctoribus Dioscoro. & Plinio. Apuleio verò in solidis & pinguibus quoque locis. Floret æstate & Autumno, quo maxime tempore, quia semine prægnans est, colligitur. Herba recens contusa, inquit Dioscorides, & imposita vulnera glutinat, vetera vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Decocto & potu (legendum enim *temperatè* non *exacerbatè*), id est, si deuoretur) biliosa ac crassa per aluum ducit. Docetum ipsius conuenientissime ischiadicis infunditur, sanguinem ducès & dolorem leuans. Succus ad ocularia medicamenta vtilis est, purgans cum melle quæ pupillis tenebras offundunt. Idem subdit menses & fetus extrahit. E potus autem peculiariter neruorum affectibus prodest. Horum quædam Plinius tradit sparsim. Purgat aluum succus Centaury minoris drachma in hemina aquæ cum exiguo salis, & aceti, bilèmq; detrahit. Eiusdem succus potu fortiusque mensis ciet. Articulis succus ex Centaury minore prodest, idem neruis vtilissimus. Succo eiusdem cum melle culces, nubeculas, obscuritatem discuti, cicatrices extenuari putant. Sed succi exprimendi modum Plinius nec rectè, nec perfectè tradidit. Quidam, inquit, caules concisos madefaciunt diebus xvij. atque ita exprimunt. Dioscorides contrà dilucidè & integrè non huius solum, sed omnium succorum extrahendorum rationem exponit. Galenus distinctius Centaury minoris temperamentum & vires perssequi-

Forma.

Lib. 24. c. 6.

Locus.

Temper.

Vires &

Temper.

Lib. 3. c. 7.

Lib. 26. c. 8.

37. 12.

Lib. 24. c. 12.

Lib. 7. sim.

tur his verbis. Centaurij minoris radix planè inefficax est, sed caulis eius extremus & folia potius quæ illic inhaerent, & flores vtiliora sunt. Vincit in eis qualitas amara, pallulum habens & adstrictionis, atque ob eiusmodi temperamentum, admodum exsiccativum est medicamē, expers mordacitatis. Vlcera itaq; magna herba ipsius recentis illitu glutinantur, & vetusta, quæque ægrè ad cicatricem perducunt, cicatrice eodem modo videntibus obducuntur. Arescēta verò glutinatoris & desiccatoris miscetur medicamētis, iis scilicet quæ sinus & fistulas sanare possunt, veteresque duritias emollire, tum ulcerum maligna & cacoethe curare. Miscetur etiam iis quæ rhumaticis affectibus medentur, In quibus ea medicamenta præstantissima sunt, quæ vehementer desiccantia cum quadam adstrictione nulla habent mordacitatem. Decoctum herba quidam ischiadicis infundunt, seu biliosa & crassa ducens: nam & talia purgant, quamquam cum adeò vehemēter operabitur ut cruenta euacuet, tunc plus proderit. Succus porrò eius cum similis sit facultatis, hoc est exsiccativæ & absterforiæ, &c. iam comprehensā pulchrè præstare potest: & cum melle oculis illinitur, mensesque acfretum euocat. Sunt qui ipsum præbeant & iis quibus nervi affecti sunt, ut euacuet & desiccet innoxie quæ impleta sunt: quippe quum iocinoris quoq; obstructions optimè expediat, bonumque sit lienis indurati remedium foris impositum, nec secus si quis bibere sustineat. Extat libet de virtute centaureæ Galeno falsò inscriptus, in quo permulta & permagnæ eius facultates enarrantur. Mesues, ut diximus, temperamentum vtriusque Centaurij & facultates confundit, & vtrumque purgare pituitam crudam, & bilem scribit, sed minus magis, cui soli vis hæc à Dioscoride, Galeno Paulo tribuitur, nō etiam magnosanguinem quidem vacuare, si clystere in ischiade iniicitur, Galenus minori tribuit. Datur Centaurij minoris decoctum vtiliter potādum tertiana febre laborantibus, quod bilem per inferna deiiciat, vnde febrifugæ nomen. Idem aut succus iocinotis & lienis obstructions ac duritias tollit. Alui lumbricos pellit drachmæ pondere ex melle potus, tum umbilico illitus. Herba comæq; decoctum lentiginis, varos, al-

Li. i. simpl.
cap. 10.

Marth. in
cap. 7. lib. 3.

CENTAVRIVM, Luteum prius.

Forma.

Locus.



phos, & cætera cutis vitia exteriora adhibitu, instillatur succus verniculosis auribus, quinetiam illinitur cœtra papulas, & manantia capitis ulcera. Centaurium luteū radice nititur exigua, fibris crispis, tenuibus, candidis capillata. Caulis ei est sesquipalmum altus, rotundus, viridis, sed albo quodam veluti pulvisculo pubescens, qui digitorum affricu facile deraditur: folia ex intervallis bina, aut potius vnicum binis apicibus vtrinque donatum, crassa, carnosā, centaurij minoris similia, latiora, non ita venosa, concauo alarum sinu lacunosa, & displici modo velut alucum effluentia, quo ros imberve contineri possit. Ex alveolorum medio furculi assurgunt nunc plures, nunc pauciores qui florem sustinent aureum, foliolis octo constantem. In asperis & saxosis gignitur. Tota planta gustu est amaro. Huic simile est caulibus foliisq; Centaurium aliud luteum, hoc discrepans quod nullos furculos edat ut superius, quibus flores insideant, sed in summo caulis fastigio florem singularem mittit chrysanthemum similem. Iisdem in locis reperitur, eodemq; est gustu. Est & Centaurium nothum in humidis Alpium vallibus proveniens, radice crassa, nigra, ligrosa, huc illuc sparsa, intus alba, gustu amaro: caulibus multis, cubito altiorib; densa



densa lanugine obstitis, angulosi: foliis cannabis, utrinque dissectis, in vno pediculo villosi & ferè cubitali multis, ordine collocatis, numero semper imparibus, ut ferè tredecim aut quindecim singulis sint pediculis, quia pediculi florem sustentantes è caule prodeunt, ipsum caulem utrinque amplectentibus, & illic in longum & angustum diuisis, floris capitulo, scabiosæ vulgari simili, hirsutis erectisque squamis compacto, flore luteo.

FUMARIA,

CAP. XL.



ΑΨΙΝΟΣ Græcis, ψάριον & ψάριος, Latinis Fumaria, potest & fumus & fumida dici, Arabibus Scheitree, Officinis Fumus terræ, Gallis Fumeterre, Germanis Erantrauch. Dicitur Fumaria à flore Dioscoride, Galeno, Plinio, quod eius succus oculis inditus veluti Fumus lacrymas moueat. Dioscorides vnius duntaxat, Plinius duorum Fumarie generum meminit. Herbarij recentiores ad Fumarie genus tres alias species referunt. Fumaria tradente Dioscoride, herbula est fruticosa, coriandro similis, valde tenera, foliis candidioribus, cineracei coloris, vndique numerosis, flore purpureo. Ea est Fumaria hodie multo vsu, & restibili fertilitate omnibus notissima, quadratis surculis, fruticosis, foliis plurimis, mollibus, teneris, ex viridi in cinereum pallorem languentibus, crebris incisuris: stolis purpurascens, interdum albidis, interdum rubellis: semine minuto admodum, rotundo, virente ex fusco, radice singulari, paucissimis fibris. Nascitur in segetibus, hortis, vineis, sepibus & maceris, aliisque locis incultis ac pinguibus. Plinius duas herbas capni nomine proponit. Capnos prima, inquit, quæ pedes gallinæos vocant, nascens in parietinis & sepibus, ramis tenuissimis sparsis: flore purpureo, viridis, succo caliginem discit. Itaque in medicamenta oculorum additur. Similis & nomine & effectu, sed alia est capnos, fruticosa, prætenera, foliis coriandri, cineracei coloris, flore purpureo, nascitur in hortis & segetibus hordeaceis, claritatem facit inunctis oculis, delacrymationemque

Nomina

Genera.

Lib. 4. c. 105

Forma.

Lib. 1. ca. 25.

Cap. 10.
Folia. 10.
Forma.

Tempus.

lib. 1.

In cap. 10.
lib. 4.

Pena in
Ad.

FUMARIA Phragmites,
Dodonæi.

Fumaria
lutea.
Forma.
Morb. in
cap. 10.
lib. 4.

Locus.

In cap. 10.
lib. 4.



cei fumus, vnde nomen accepit. Posterior vulgaris nostra & Dioscoridis, Galeni, Pauli, Fumaria est. Prior ex Dodonæi sententia hic depingitur quæ multis ramulis fruticat, teneris, in quibus folia numerosa, incisa, colore, sapore, & quadatenus forma alteri fumarie similia, præterea, viticulis & capreolis herba ipsa sepius & vicinis plantis pertinaciter adherens. Flosculi eius candidi, caruleo colore nonnihil distincti: in siliquis parvis semina: radix singularis, longitudine digitali. Vere primo vt & nostra vulgaris prodit, Maio & Iunio utraq; floret & carpitur. Hæc capnos, inquit Dodonæus. Plinii imitatione, *Pied de geline* dici potest. Hermolaus *χρῆται φραγμιτῶν* nominat. Certe Hermolaus in Corollariis hanc capnon Plinii Chelidonium phragmitem vocari ab Aetio scripsit, ad exanitiones partium iocunore curuarum vitalem dictam, vt putat: quoniam succo discuit caliginem vt chelidonium, & ob id in medicamenta oculorum additur, vt in collyrium Marciani eam Chelidonia capnitida cognominantis. Aliis Fumaria lutea siue mōtana, Illyriorum Splith, capnos seu chelidonium phragmites Aetij creditur, quibusdā Galeni Corydalis. Crescit hæc planta foliis chelidonijs maioris, vel Fumariæ bulbosæ, sed minoribus multo, glaucis cineritiis, pluribus, sesquipalmariibus: cauliculis exilibus & pedaliibus: floribus luteis, stellatis, chelidonijs minoris: radicibus numerosis, tenuibus, latius sparsis, subalbicantibus: semine rotundo, depresso, abro virente in corniculis Fumariæ bulbosæ, vel chelidonijs maioris, minoribus multo, cui admodum similis facie & colore est. Vnde rectè conuicere videntur nonnulli, vt diximus, esse capnon chelidonium Aetij. In calidiorum regionum montibus Illyriæ, Dalmatiæ, Hetruriæ & Narbonæ provenit. Serius quàm Fumaria nostra, nempe Iulio & Augusto floret. Marthiolus cum legerit in nothis simplicium appellationib; Dioscoridi ascriptis capnon quibusdā corydalion dici, & cum Galenus de Galerica scribens quæ Corydos Græcè dicta valde colicis cōfert, herbarum meminerit quæ corydalis appellatur, magnæ quoque aduersus colicum dolorem utilitatis, quam facultatem Capno vulgari alibi minimè tribuit, suspicatus est aliam capni speciem hic corydalem intelligi, nimirum Splith Illyricam capno congenerem, quam colicis valde prodesse sese expertum esse affirmat. Sed anceps valde & infirma est hæc ratio. Etenim nostras etiam Fumarias non instrenuè colicis opitulatur, digerendo ac discutiendo viscidam pituitam, eamq; crenibus eliciendo, quæ non

FUMARIA lutea montana
Corydalu, Matth.

FUMARIA Bulbosa,
Matthioli.



non tarò colici doloris speciem efficit. Quare aliis potiùs Corydalis videtur esse Fumaria bulbosa, ab effigie alaude auicula, cuius capitis galericulatum verticem emulantur flores cristati, tubinataq; cornicula. Mollis in vniuersum planta est, quæ vere primo vnà cum chelidonio exoritur, & Maio, vel ad summum Iunio contabescit: tenellis subalbidisque foliis coriandro vel ranunculo primi generis proxima, luore exsiccato & diuisura ad Fumariæ folia accedentibus, maioribus tamen floribus purpureis, & aliquando albis, radice tuberosa, inferiore parte sessili, superiore muciculi instar elata, intus caua, nigro exterius cortice, buxæ interiùs pulpa, odore aristolochiæ, gustu amara, semine pellucido in corniculis. In vmbrosis, decliuis, & nemorosis saltibus frigidioribus nascitur. Maio & Aprili mense fleret. Hanc plantam herbarij quidam aristolochiam rotundam esse prodiderunt, eandemque etiam tanquam veram rotundam vsurparunt. Fuchsius minimè genuinam esse aristolochiam rotundam scribit, sed Plinij pistolochiam, ab illa multum differentem, vt scribit Matthiolus. Nam Plinianæ pistolochiæ radix, tuberosa & inanis non est, sed clematide tenuior, densis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Quare rectius veriùsque, inquit Matthiolus, dicenda Plinij Fumariæ genus alterum, quod his depingitur verbis. Alia est capnos fruticosa, preterea, &c. At hanc Dioscoridis Fumariam & nostram vulgarem esse testatur hæc Plinij delineatio ex Dioscoride ita expressa, vt eius descriptionis verba totidè Latinis verbis perspicue reddiderit. Addit Matthiolus eandem esse de qua locus sit Actius in curatione obstructi iocinoris, vbi chelidonijs capni meminit, quod vna cum chelidonio primum erumpit, hirundinum aduentu. Contra doctis alijs scriptoribus placere diximus Fumariam luteam siue montanæ & Splith Illyricæ Actij potiùs esse capnos chelidonium. Diuersum ab his omnis Fumariæ speciem pictam Doct. Myconus misit, & sic ferè delineauit. Eius folia sæpius humi stentuntur cinerea, multum ad Fumariam accidentia, maxime quæ in uno

Pen. in
Adoerf.
Fumaria
Bulbosa.
Forma.
Matth. in
cap. lib. 4.

Locus.
Tempus.

Cap. hist.

Lib. 4. cap. 13.

Lib. 4. cap. 13.

sunt: nam quæ in caulibus visuntur, tenuiora & fœniculærea sunt. Cauliculos proferunt multos, quadratos, cauos, geniculatos, surculosos, palmum altos, in quibus folia tenuia admodum, vt diximus. In horum fastigiis flores multi congesti sunt, Fumariæ similes, singulis candido, purpureo, luteo variegatis: radicem tenuem, candidam non profundam. Floret Aprili mense. Totius plantæ sapor subamarus est cum leui acrimonia. Cùm forma & ferè qualitatibus à Fumaria non distet, Fumariæ genus ille putat esse, quamuis ab ea amaritudine vincatur, & hæc illam acrimonia superet. Vulgus etiam Fumariam vocat. Passim in vinetis segetibusque pullulat. Eandem Cladius depinxit & descripsit Capni tenuifoliz nomine. Inueniri ait in plerisque Hispaniæ regionibus in agrorum limitibus, & iuxta vias, nonnullisque Narbonensis Galliz locis, præsertim supra Arelatem. Quidam in Hispania Sideritum tertiam sine ratione facere voluerunt. Vulgò à nonnullis *Palomilla*, & *Palomina* dicitur, quemadmodum Fumaria communis. Huic iungen-

Lib. Scrup.
Hispan. ca.
46.

FUMARIÆ Species.

Myconi.



CAPNOS Fabacea radice,

Penæ & Lobellij.



da Capnos alba latifolia, à Lobellio tradita Splith album quorundam. Floribus albis, & latioribus foliis in segetibus Cornubiæ, & siluosis agrorum marginibus Brabantiz prouenit: capreolis sepes arripit. Nec omittenda Capnos alia fabacea radice, cui singularis radix, & Fumariæ bulbosæ radici Penæ par, sed minor, sine vlla cauitate. In Belgio, Germania, Sabaudia, vti Geneuz, aruorum quorundam margines & sepes hac scatent. Nunc singularum vires declarandæ. Fumariæ succus, auctore Dioscoride, acris est, visum acuit, lacrymas ducit, vnde nomen habet. Illius cum gummi euulsos palpebrarum pilos renasci non sinit. Herba ipsa cum cibo accepta vrinas ducit biliosas. Eadem planè de posteriore sua Fumaria Plinius habet. Claritatem facit inunctis oculis, de lacrymationemque ceu fumus. vnde nomen accepit. Eadem euulsas palpebras renasci prohibet. Et alio in loco. Capnon herbam, inquit, qui edere, bilem per vrinam reddunt. Galenus non alias ei qualita

Lib. 4. cap. 1.
Vires &
Temper.
Lib. 4. cap. 1.
Lib. 4. cap. 1.

CAPNOS *Alba*
lanceolata, Lobellj.



ei qualitates virēſque aſſignat his verbis. Acris ſimul & amaræ qualitatē eſt particeps, neque tamen planē expers eſt acerbitatis: quā ob rē vrinam multam, bilioſamq; prouocat, ſanāque iocinoris obſtructiones & debilitates. Succus eius oculorum aciem acuit non parum trahens lacrymarum, velut ipſe fumus: naſt hinc ei appellatio indita. Plebeius quidam ea vti ſolebat ad ſtomachum roborandum, vnaq; ventrem lubricandum: ſiquidem herbam primum deſiccata condebat: cū verò vti volebat, ſubductionis quidem gratia, melicrato aſpergebat, roborandi verò cauſa vino diluto. Arabes vetò multò plures eāque inſignes doctes ei tribuerunt. Meſues, Fumaria inquit, in ſuperficie calida eſt, in profundo frigidior, non abſolute frigida cum quibuſdam, ſicca ordine ſecundo. Ab illa autem ſubſtantia calida (quæ ſemini maior ineſt) & amara & ſubacris, purgatoria, attenuans, obſtructa aperiens. A frigida autem ſtyptica conſtringendo ventriculū, hēpat, & cætera viſcera laxiora & molliora roborat. Quapropter ad actionem nullo externo

Li. 7. ſimpl.

Li. 2. ſimpl. cap. 14.

eget auxilio, cum per ſe purget ac robotet. Purgat verò bilem & viſtos humores etiam ex venis: clarum ob id & purum efficit ſanguinem. Quare mirè prodeſt morbis omnibus hos humores ſequentibus, lepræ, ſcabiei, pruriti, impetigini, ſerpigini, & ſimilibus cutis vitiis. Quia autem obſtructa liberat, morbos omnes inde natos ſanā, vt febres bilioſas, putridas. Herba eſt innocens, quia tamen magna ubiq; copia luxuriat, vileſcit. Flore eſt nunc ſubalbo, nunc cinericio, nunc pallido violaceo. Optima eſt viridis, tenera, ſoliis teneris, planis, non criſpis, flore ſubuiolaceo. Herba & ſuccus eius veris initio ſunt efficaciffima: ſemen veris exitu. Quoniam verò imbecillius purgat, fortior euadet cum myrobolanis, ſenna, ſero lactis viuis paſſis exacinat, & illarum melle. Succus datur ab vncia dimidia ad vncias duas: puluis à drachmis tribus ad drachmas quinque: decoctum ab vnciis decem ad vncias quindecim. Auicēnas frigidam eſſe primo gradu, ſiccā ſecundo ſtatuit, & reliqua quæ Meſues attribuit. Fumariz luteæ ſive Splith ſapor ferme qualis vulgaris Fumariz, efficacius tamen ea videtur craſſos humores tenuare, & incifoſ per lotium educere, vnde laus magna ad hydropem: robur etiam addit viſceribus, reliquæ præſtat quæ Meſues de Fumaria vulgari tradit. Aerius, præclare, inquit, obſtructione liberat ſimulq; firmitatē tum hepatis, tum ſtomacho addit Capnium, quod & chelidoniz nomen inuenit, ſucco eius expreſſo & deſiccato: reponitur autem in paſtillos coactus, & ſemel quidem exhibitus dolorem omnem tollit, iter autem datus in totum ab affectione liberat, præterquam quod & firmitatem viſceribus addit. Decoctum quoque huius herbæ potatum ſimilem vim habet, etiam ſi valde febricitent ægri: aliquando herba ipſa efficcatur, conuſa, & cribrata cochlearis menſura exhibetur.

Per. Penſin Ad.

Lib. 10. c. 1.

DENT!

Nomen.

Forma.



OETIS Herbariis Denticulata hæc dicitur à radice velut è denti-
bus parvis coagmentata, paulatim gracilefcence, albicantibus fibris
capillariab hac cauliculi multi proſiliunt dodranta les, in quibus fo-
lia apij, ſiue potiùs fumarix luteæ, ſiue bulbofæ, in ambitu minimè

DENTICVLATA.

Locus.

Cap. li. 4.

DENTARIA Maior,
Matthioli.

Eiſdem.



ferrata. Flos non in folia explicatur ranunculi
modo, ſed vt in pimpinella, in capitula angu-
loſa conglobatur, ex viridi ſubluteus: ſingulis
capitulis quini ferè ſunt ſtoſculi, ſiue ſepteni,
gultu amaro & ſubacri. Ad fontii ſcaturigines,
riuuloſq; præta rigantes, & in vmbroſis ſepibus
naſcitur cū ranunculo nemoreniſi primo vere,
ſtatimq; perit. Sunt qui alabaſtrem vocent,
ob radicis ferè pellucidæ ac nite ntis ſplendo-
rem, & candorem alabaſtro ſimilem: alij Moſ-
chatellam prætenſem. Alia eſt à nonnullis
Dentaria maior appellata, auctore Matthiolo,
à quibuſdam æquales, quòd ſine folijs proue-
niat. Naſcitur in opacis ſiluis aut aliis vmbro-
ſis locis. Germinat primo ſtatim vere. Caules
profert dodranta les, teneros, fragiles, ſuccoſos,
orobanches æmulos, in quibus à medio ad
ſummum flores exeunt in purpura albicantes,
& hirsuti, foliolis eiufdem ferè coloris in late-
re concomitantibus: è floribus caliculi oriun-
tur, in quibus paruum concluditur ſemen pa-
pauetis modo. Radice nititur albicante, ma-
gna, ſuccoſa, fragili, ex compactili ſquamarū
congerie, miro ſanè naturæ artificio conſtans,
gultu acerbo cum quadam amaritudine. Cor-
di Amblatum videtur eſſe. Aliam tradit Mat-
thiolus Dentariam minorem, quæ Germanis
Sanicula vocatur, & inter ſymphyti geneta
recenſetur. Folia habet pentaphylli, maiora,
radicem candidam, admirando naturæ artifi-
cio ex nodulis quibuſdam & incifuris cōſtru-
ctam, dentium ſpeciem quandam repreſen-
tantibus. Dodonæus eaſdem plantas aliter de-
pinxit & deſcripſit. Priori cauliculum dodran-
talem tribuit, folia cannabis aut Pentaphylli,
quinque vni hærentia pediculo, oblonga, lata,
in ambitu ferrata: ſtoſculos leucoeis ſimiles co-
lore, ex puniceo ſubpurpureos: ſiliquas etiam
quales leucoeis, in quibus ſemina radice ob-
longam, inæqualem, multis craſiſ exaſperatā
ſquamis. Alterius Dentariæ folia non Penta-
phylli, ſed fraxini modo digeſta, coſtam ha-
bentia mediam cui annectuntur. Sunt verò ea
oblonga, lata, & in ambitu crenata, crebrò ad
vnam coſtam ſeptena: flores candēdos, ſiliquas
prioti

priori similes : radices quoque asperas & squamosas, sed quàm prioris minùs. Dodonæus petegrinas esse ait, & ad Leucoij genera referri posse. Matthiolus inter symphyta ac solidagines utràmque reponit. Alia Dentellaria a quibusdam nominata hic exhibetur, à Dalechâpio collecta in vertice montis per quem Geneua

DENTARIA Minor,
Matthioli.



DENTELLARIA Rubra,
Dalechampij.



DENTELLARIA Rendel.



LEPIDIVM Annuum, Lob.



itur

itur ad Sequanos, proximè Pagum quem Incolæ vocant *Saint Sargue*, quasi Diuum Sergium. Serpit inter saxa & silices, radice sic eminentibus articulorum vertebri compacta, vt ex coniunctis dentibus contexta videatur, mirabili naturæ in ea struenda artificio, vnde Dentellariæ nomen: caule læui, pede altiote, foliis eius plantæ quam Saniculam fœminam Fuchsius appellat: flore violæ, copioso, rubente, pulchro aspectu, semen in oblongis siliquis. Dentariam aliam Pena pinxit, Rondeletij & Narbonensium, quæ passim, inquit, propè sepes & sata in agro Romano & Monspelienfi fruticat, radice longiusculâ fibrata, caule, bicubitali, furculoso, foliis imis maioribus, cauli incumbentibus latis drabæ ve ritæ floribus purpureis dilutis, extremo caulis ambitui confertum aggestis, quibus defluentibus semina gemmeis, villosis & hirsutis, & aliquantulum tenacibus folliculis includuntur, nigra. Tota planta gustu est acerrimo, & vrentis facultatis, quæ tantoperè pollet, vt aliquândo manu detenta, volæ manus vibicem inurat liuidum. Quate viri quidam docti Molibdænam esse Plinij opinati sunt, aut Lepidium Aeginetæ. Vulgus studiosorum Dentariam putabat vocatam à Rondeletio: qui hac, vt pyrethris, aut similibus vrentibus utebatur ad seuos dentium cruciatus mitigandos. Aliam tamen nouimus in agri Mospelienfi aridis locis satis frequentè, quæ etiam vulgò Dentellaria vocabatur, de qua diximus in lib. De plantis, quæ in asperis nascuntur. Herba est alia quæ à simili cum figura tum ortu foliorum, Dentellariæ Mospeliacivæ Lepidij cauli incumbentium Herbariis Lepidium dicitur. Caulis bicubitalis, multifidus: flores albi, & semen foliaceis Thlaspi inuolucris clausum, acce gustu: radix fibrata. In Belgio hottense, hyeme vitens, foliis Lepidio maioribus. Hæc Lobellius.

VERBASCVM,

CAP. XLII.

Nomina



ΛΟΜΟΣ Græcis & τὸ ὄνομα Galeno auctore, Verbascum Latinis dicitur, Officinis Tapsus barbarus, Apuleio Lyncitis & Pycnitis, nonnullis Candelæ regis, Candelaria, & Lanaria, Gallis *Bouillon*, Germanis *Uuskraut*, Ita-

VERBASCVM I. Matth.

Fig. ca. 99.
L. 3. simpl.
Genera.

L. 3. ca. 10.

Forma.



lis *Verbasco*, & vulgò *Tasso Barbasso*. Phlomon autem dixerunt Græci ἀπὸ τῆς γλῶσσης à flamma, quòd eius foliis & caulibus in laternis pro elychniis vterentur. Candelariam quoque recentiores nominarunt, quòd caulibus adipe, seuo, vel pingui aliquo illitis nonnulli pro candelis siue funalibus vrantur, Officinæ Tapsum, aut potius taxū, quia toxiacis aduersetur, barbarum à densa lanugine. Dioscorides & Galenus quatuor Verbasci geneta assignarunt. Verbascum album marem, *Bouillon blanc mâle*, Verbascum album fœminam, *Bouillon blanc femelle*, Verbascum nigrum, *Bouillon noir*, Verbascum silvestre, *Bouillon sauvage*. Plinius à Dioscoride dissentiens tria duntaxat posuit. Verbascum album marem, nigrum fœminam, tertium silvestre, anxiam illam generū distinctionem superuacuum ratus. Distingui genera hæc penè superuacuum est, inquit, cum sint omnia eiusdem effectus. Recentiores herbarij alia repeterunt genera, quæ ordine hîc picta sunt. V. fœmina, folia habet brassicæ

brassicae similia, hirsutiora, multò latiora, & alba: caulem cubitali aut etiam maiorem, album, subhirsutum: flores albos, ὑπερχυρῶς, id est, ex luteo palléscentes, siue, ut legit Oribasius, ὑπερχυρῶς, id est, subnitrides: seminem nigrum, radicem nigram, gustu acerbam, crassitudine digiti. Verbascum mas, ἡδονοφυλόν Græcis dictum à fo-

Dioscoridi
cap. 99

VERBASCUM II.

Matthioli.



liorum candore, oblongius est, folia alba & angustiora habet, caulem quoque tenuiorem. Verbascum nigrum, albo prorsus simile est, latiora tamen & nigriora folia habet. Siluestre, virgas producit altas & lignosas, siue arborea specie, folia saluix similia: ramos habet circa virgas, velut marrubium: florem luteum, auri specie. Sic enim exprimenda Dioscoridis verba, ut in vulgatis exemplaribus leguntur: quæ in vetere codice aliter legi affirmat Andr. Lac. Γόβλας δὲ ἡ λεγόμενη ἑστὶν ἡ ἡδονοφυλὸν φέρουσα, καὶ δὲ ἡδονοφυλὸν: φέρουσα δὲ ἡδονοφυλὸν ὅμοια ἔχει, καὶ αὐτὴ τὰς ῥιζὰς, ὡς καὶ τὸ μαρριβίον. Quod est, Nascitur etiam & Verbascum agreste, altas ferens virgas & lignosas: folia saluix similia circa ipsas in orbem, ut marrubium: quæ lectio doctis multis summo perè placet. De his brevius & indistinctius Plinius scribit his verbis. Verbascum Græci Phlomon vocant. Genera habet prima duo. Album, in quo mas intelligitur, alterum nigrum, in quo tæmina. Tertium genus non nisi in silvis inuenitur. Sunt folia brassicae, latiora, pilosa: caulis erectus cubitali

Lib. XI.

VERBASCUM III.

Matthioli.



VERBASCUM Nigrum

Salusolium, Lobell.



VERBASCVM IIII.

silueſtre, Matth.

*Cap. cyp.
Verb. ſil.
lumb. hem.
fl. luteo.*

*Cap. p. 6.
hillo.*

*ſilueſtre.
Verb. ſil.
nigr. Dod.*

lia maiora habeat, flores luteos roſam paruaſ referentes, erectis è medio ſtaminibus rubris. Id propter ſimilitudinem cum ſupradictis non appinxiſſimus, pro Verbaſco nigro Fuchſius deſcripſit & depinxit quemadmodum pro ſilueſtri id quod Dodonæus pro nigro Verbaſco poſuit. Folio id eſt amplo, ſcabro, nigro, tactu

VERBASCVM Fœmina,
Lobellij.



VERBASCVM Album fœmina,
flor. albo. Dodon. & Fuchſ.



alpero

VERBASCUM Album
mas, Fuchs & Dod. flore luteo.



aspero, grauis odoris, flore luteo, cæteris simili, sed minore, similibus item caulibus & radice. Silvestre verò Dodonæus tam caulibus quàm foliis saluiam refert scribit, ramulos multos habere quadrangulos, lignosos, binos semper ex aduerso, ex eodem geniculo prodeuntes, folia læuia & candicantia, foliorum saluix emula, sed maiora & læuiora: ramulorum fastigia flores lutei verticillatim ambiunt, vt in marrubio. Longe diuersum ab his Verbascum depinxit Matthiolus foliis laciniatis: cuius folia, inquit, cornuti papaueris faciem exprimunt. Ideò nihil mirum si Dioscorides eius papaueris folia, Verbasci foliis compararit. Lobellus aliud Verbascum silvestre ostendit, folus saluix tenuifolia: item Verbascum silvestre saluix folio, exoticum, foliis rotundioribus, candidioribus, densioribusq;, minùs tamen lanugine canis, sed saluix emula concretionem, alioqui lignosa fibratâque radice, caule & facie non ita dissimilibus: isdem gaudet Syriæ natalibus, quibus phlomos Syriaca, de qua mox, flores ille non vidit, quia maridi. Verbascum album & nigrum

Verbascū
saluæ. Dod.

Ca. 99. li. 4.
Verbascū
laciniatū.

Locus.

Tempus.
Vires.

in campestribus, aggeribus agrorum, & secus vias provenit. Silvestre in campestribus potissimum siccis & lapidosis. Verbasca Iulio & Augusto mensibus potissimum florent: silvestre etiam serius. Radix Verbasci albi & nigri, ita tradente Dioscoride, adstringit, vnde alui profluuiio laborantibus tali ludicri magnitudine

VERBASCUM Silvestre,
Dodonæi.



VERBASCUM Silvestre folio
Saluix tenuifolia, Lobel.



VERBASCUM Siluestre
exotium, Lobelij.



Li. 3. ca. 10.

VERBASCUM Laci-
natum, Matthioli.



Li. 3. simpl.

In cap. 99.
lib. 4.

cum vino vtiliter bibenda datur. Decoctum ruptis, conuulsis, contusis & antiqua tussis auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum cui flos aureus, capillos tingit (sic in vulgatis exemplaribus, ὁ δὲ χρυσοῦς τὰ ἀνθῶ, in vetere autem, τὸ δὲ χρυσοῦς τὰ ἀνθῶ, idest, aurei Verbasci flores capillos tingunt) & vbiq; posuit fuerit, blattas in se colligit. Cocta folia in aqua ad oedemara, & oculorum inflammationes illinuntur, & ad syderata vlcera cū melle aut vino, cum aceto autem vulnera sanant. Contra scorpionum ictus auxilio sunt. Siluestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt fœminæ folia caricis interposita à corruptione eas immunes seruare. Plinius multis Verbascorum vires explicat his verbis. Aiunt in foliis eius quam fœminam diximus, ficus omnino non putrescere. Contra scorpiones bibitur radix cum ruta ex aqua, magna amaritudine, Galeno tamen acerbata est, sed effectu pari. Et variis in locis. Verbascum priuatim tonsillis in aqua potum medetur. Tribus obolis bibitur Verbascum cuius flos aureus est, contra omnia pectoris vitia, tussim, & purulenta excreantibus. Tanta huic vis est, vt iumentis etiam non tussientibus modo, sed illa trahentibus auxilietur potu. Latetis & pectoris dolores verbascum cum ruta ex aqua sedat panos sanat cum sua tadice tulum, vino aspersum, & ita cinere calfactum, vt imponatur calidum. Semen ex vino decoctum & cõttitum luxatis medetur, dolorem & tumorem tollit. Radicis medulla collyrij tenuitate in fistulam additur. Cõtufis, euerfis, & si febris sit, potatur in aqua verbascum, cuius flos auro similis est. Folia ex aceto imponuntur in strumis. Semine ac foliis decoctis ac tritis omnia corpori inhiæ extrahuntur. De quibus breuiter sic Galenus. Radix priorum duorū acerbata gustu est, & fluxionis effectibus prodest, sed & ad dentium dolorem quidam eam colluunt. Attamē folia digerendi vim habent: sic & aliorum folia, maxime eius quod aurei coloris flores habet, qui etiam capillos flauos reddunt. Omnium enim folia siccandi, & modice detergendi vim habent. Experientia cõstat, inquit Matthiolus, omnia Verbasci generis omnibus ferè sedis vitis mirifice subuenire: adstringunt enim & exsiccant. Quamobrem seminis & florū puluis additis chamæmeli floribus, & laricis resina, procidentem sedem suffitu cohibet, & tinefinum, præsertim dysentericis, tollit. Verbasci fœminæ folia inter lapides cõtusa, si equi claudicatis ex clauorum

ex clauorum noxa, vngulæ prius excavatæ imponantur, mirum dictu quam breui tempore is liber euadit. Radicis eiusdem succus antequam caulem proferat, duarû drachmarum pondere ex vino cretico haustus ipsa accessionis hora, vt Arnaldus refert, quartanam fugat, cum hoc tamen quod tribus aut quatuor iteratis vicibus

PHLOMIS *Lychnitis,*
Maritima.



PHLOMIS *Lychnitis,*
Pena.



hauriatur. Succus tam florum quam foliorum asperis verrucis illitus, eas facile delet, etsi lacuibus nihil proffit. Idem facit sicca radicis farina. Dantur flores commodissimè in puluerem triti, contra ventris tormina, & colicos dolores. Folia & summitates eius quod minoribus est foliis, in aqua decoctæ vel illitæ, podagricis auxiliantur. Stillatitia florum aqua oculis iniecta destillationes cohibet, eadem illita faciei ruborem tollit, quam Arabes guttam rosaceam vocant, præsertim addito caphuræ momento. Illinitur eadem ad erysipelara, ambusta igni, serpigines, vitiligines, impetigines, & cætera cutis vitia. Verbalci flores vna cum oui vitello, mica panis & foliis illiti, optimè faciunt ad cohibendas hæmorrhoidas. Idem præstant eiusdem folia sutata ex molari lapide accenso. Phlomis phlomidis, idest, verbalcis verbascula subiungit Dioscorides. De duabus alibi dicitur, de tertia hic dicendum, quæ Lychnitis appellatur & thryallis, quod propius ad verbalca accedat Folia terna aut quaternaria, aut etiam plura habet, hirsuta, crassa,

Phlomidis.

Lychnitis. Folia. Dioscorides.

VERBASCVLVM
Quorundam.



Ca. 9. 4. pinguia. Vtilis est ad ellychnia in lucernis : unde Lychnitidis ei nomen : ex Matthiolo hic pictam damus. Aliam ostendit Pena, quæ plerisque agri Narbonensis collibus glareosis Monspelio vicinis fruticat, rara alibi in Italia & Gallia, peramæno aspectu florum luteorum fabæ, caulem verticillatim ambientium, vt in Marrubio secundum foliorum exortus, pallidis staminibus. Folia sunt scabta, crassa, densa, lanugine, incana, tactu aspera, Saluix angustifolix foliis angustiora, sed longiora, & ad ellychnia valde accommodata. Clusius aliam profert, cui folia sunt serabra, crassa, Saluix tenuifolix similia, oblongiora tamen & angustiora, candicante, inferiore parte densa, lanugine omnino cana: cauliculi dodrantes, quadranguli, hirsuti & candicantes: quorum geniculis folia bina, oblonga, superioribus similia, inter sese opposita nascuntur, & in caulis fastigio breuiora, & sedelatiuscula: flores lannij circa extremos cauliculos verticillatim ex densa lanugine & veluti villis pallidis prodeunt lutei coloris, coma plerumq; inflexa & nutante: radix nigricans & lignosa. Oritur in collibus siccisque & petrosis locis per totam Hispaniam, Lusitaniam, Narbonensem Galliam. Floret Maio & Iunio, semine subrassum, verbasco siluestri ferè simile profert. Monspelienfes Verbasum siluestre vocant, Castellani Candilera, Granatenses Menchera. His interferit Lobellius Lychnitin altera Syriacam,

PHLOMIS Lychnitis, Clus.



*PHLOMOS Lychnitis altera
Syriaca, Lobellij.*



*VERBASCVLVM
Minimum.*



nouam

novam plantam nec minus speciosam, à superiore dissidentem florum ortu & modofunt enim Lychnidis siluestris, vel Chalcedonica, coloris flauifolius item angustis, & virgultis quadratis tomento crasso incanis, & radice lignea. Verbasculus annuerant quidam plantam quam nomine Veronicæ fœminæ descripsit & depinxit Fuchsius, ite Lonicerus, quæ per terrâ serpit caule lanuginoso, foliis torûdis instar herbæ quæ centimorbia & numularia hodie vocatur, in ambitu minimè incisissioribus in luteo purpureis, semine in vasculis rotundis, radice tenui. Dodonæus hanc nomine heliotropij minoris exhibuit. Aliud hic pictû est, quod Minimum dicitur: In sepibus ac dumis prouenit, radice nigricante, lignosa, breui, nodosa, fibris albis, crassiusculus capillaris, caryophyllatæ modo, gustu adstringente: caule vnico, cubito altiore, rotundo, inferne rubente, fungoso, nonnihil villosos foliis paucis, non pluribus ferè quam septicem aut nouè in caule alternatim dispositis, violæ propemodû similibus, longioribus, per ambitû crenatis, auersa parte lanuginosis, saporis adstringentis, & subamari: flore in caulis vertice senetionis, luteo, copioso, in pappos auolante. Floret tardissimè Septembri circa æquinoctium ad initium vsque Octobris.

In Epico.

BLATTARIA, CAP. XLIII.



ST herba inquit Plinius, similis verbasco, quæ sæpe fallit pro ea capta, foliis minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abiecta Blattæ in se contrahit, ideoque Romæ Blattariam vocant. Hæc Plinius. Eundem verò effectum Dioscorides illi verbasco generi assignauit, quod floribus aureis descripsit. Quæ res multis persuasit Blattariam Plinij & verbascum illud Dioscoridis, cui flores sunt aurei, vnâ & eandem plantam esse. Fuchsius & Dodonæus pro Blattaria proponunt eam, quæ hic picta est, quæ Germanis *Schabekraut*, Gallicis *Herbe aux mites*, *Herbe vermineuse* & *Blattæ* nominatur. Foliis est viridantibus, minimè hirsutis, nec candidis, crenatis, per humum sparsis, ex quorum medio duo tresve emergunt caules venustis floribus, aureis interdum & purpureis, ornati, verbasco simillimis: semen folliculis inclusum, minus quam verbasci: radix brevis & lignosa. Nascitur iuxta aquas & fluminum ripas. Floret Iunio & Iulio mensibus. Vehemens amaritudo ejus satis docet calidam & siccam esse, quare qui ea vti voluerit, eadem quæ alia amara in corpore nostro efficiet. Sed cum calida siccatque sit, & vehementer amara gustanti, qua vi nisi arcana & occulta Blattæ allicit? num potius abigie?

Lib. 4. c. 99.

Lib. 4. c. 99.

BLATTARIA, Marth.



ST herba inquit Plinius, similis verbasco, quæ sæpe fallit pro ea capta, foliis minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abiecta Blattæ in se contrahit, ideoque Romæ Blattariam vocant. Hæc Plinius. Eundem verò effectum Dioscorides illi verbasco generi assignauit, quod floribus aureis descripsit. Quæ res multis persuasit Blattariam Plinij & verbascum illud Dioscoridis, cui flores sunt aurei, vnâ & eandem plantam esse. Fuchsius & Dodonæus pro Blattaria proponunt eam, quæ hic picta est, quæ Germanis *Schabekraut*, Gallicis *Herbe aux mites*, *Herbe vermineuse* & *Blattæ* nominatur. Foliis est viridantibus, minimè hirsutis, nec candidis, crenatis, per humum sparsis, ex quorum medio duo tresve emergunt caules venustis floribus, aureis interdum & purpureis, ornati, verbasco simillimis: semen folliculis inclusum, minus quam verbasci: radix brevis & lignosa. Nascitur iuxta aquas & fluminum ripas. Floret Iunio & Iulio mensibus. Vehemens amaritudo ejus satis docet calidam & siccam esse, quare qui ea vti voluerit, eadem quæ alia amara in corpore nostro efficiet. Sed cum calida siccatque sit, & vehementer amara gustanti, qua vi nisi arcana & occulta Blattæ allicit? num potius abigie?

Cap. 66. lib. 4. c. 3. Blattæ. Fuch. & Dodon. Nomina.

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

Uires.

AETHIOPIA, CAP. XLIIII.



T Græcè *ἄθιοπος*, ita Latine Aethiopia dicitur, quod nomen herbæ dedere magicæ vanitates, quod ea herba, inquit Plinius, amues ac stagna siccantur coniectu, tactu clausa omnia aperiantur, tamen verisimilius est quod optima ex Aethiopia adueheretur, sic dictam esse, vel quod fuliginosa & veluti cinere aspersa sit. *ἄθιο* enim fuligo est, siue fauilla adusta. Verbasco folia similia habet, sed valde hirsuta, & densa, in orbem circa radicis inum: caulem quadrangulum, crassum, & scabrum, similem apiastro aut arctio, multis alis

Nomina. Pena in Ada. Lib. 26. c. 4.

Forma. Dioscor. Lib. 4. cap. 20.

AETHIOPIS.

Locus.

Lib. 27. per
lat.

Lib. 24. c. 27.

Pena in
Ada.

Vires.

Lib. 4. c. 100.

Lib. 7. c. 4.

Lib. 7.



concauum: semen erui magnitudine geminum in vno conceptaculo: radices ab eodem cespice multas, longas, crassas, gustu glutinosas. Hæ siccaræ, nigrae ac duræ fiunt, cornibus similes. Plurima nascitur in Messenia, ac Ida. Eadem prorsus habet Plinius, vt ex Dioscoride transcripsisse videatur. Aethiopidem herbam, inquit, ab exulto syderibus axe rerum natura ostendit. Et aliquanto post. Aethiopsis, folia habet phlomo similia, magna & multa, & hirsuta à radice: caulem quadrangulum scabrum, similem arctio, multis concauum alis: semen eruo simile, candidum, geminum: radices numerosas, longas, plenas, molles, glutinosas gustu. Sicca nigrescunt indurescuntque, vt cornua possint videri. Præter Aethiopiâ nascuntur & in Ida monte Troadis, & in Messenia. Rursus alio in loco tradit Aethiopida in Meroe nasci, ob id & Meroida appellari, folio lactucæ, hydropicis vtilissimam è mulsio potam. Hanc diu ignotam ex Græcis & Illyricis montibus maritimis allatam, iam satis vulgatam alunt horti multi Italix, Gallix, Germanix, thapso barbato admodum similem, magis tamen incanis foliis, mollioribus, delicatioribus & longiore lanugine, vt in dictamno. Cretensi, eorundem vnde eim laciniatis oris, circa inum caulem accubantibus, & ipsum ambientibus quadratum, hirsutum, binum pedum, & sesquicubitalem, multas alas habentem, quem verticillatim flores ambiunt, scilicet, aut hormini, sed candidi, & semen non dissimile. Radix verbascois cognata. Huius radix, auctore Dioscor. cocta & pota, ischiadicis, pleuriticis, sanguinis sputo, arteriæ asperitati auxiliatur, fumitur etiam cum melle in eclegmate. Plinius eadem ferè tradit. Radices medentur vuluis potæ in vino albo, ischiadicis, pleuriticis, faucibus scabris decoctæ, potui dantur. Sed quæ ex Aethiopia veniunt, eximie atque profunt. Atque hæc recta & veteris codicis lectio est. Hanc herbam Galenus in simplicium catalogum non retulit. Paulus verò ex Dioscoride hæc exscripsit. Aethiopsis similia verbasco folia habet. Radicis decoctum, potui datur ischiadicis, pleuriticis, & sanguinem reicientibus, & arteriæ asperitates cum melle lenit.

ARCTIVM,

CAP. XLV.

Nomina

Lib. 4. c. 201.

Forma.

Lib. 27. c. 1.

Locus.



ARCTIVM siue ἀρκεῖον Græcis, Latinis similiter Arctium vocatum, affine etiam est verbasco foliis, vt scribit Dioscorides, nisi quòd hirsutiora & rotundiora habet radicem teneram, dulcem, albam: caulem mollem, longum: semen cumino paruo simile. Quam Dioscoridis descriptionem planè expressit Plinius his verbis. Arctiū aliqui arcturum vocant. Similis est verbasco foliis, nisi quòd hirsutiora sunt: caule longo, molli: semine cymini. Nascitur in petrosis, radice tenera, alba, dulci. Plātam, quæ hic depingitur, arctium esse putant docti herbarij, quæ nascitur in asperis montibus Allobrogum, radice crassa, longa, tenera, candida: foliis multis verbasco similibus, auersa parte candidis & valde lanuginosis, aduersa viridioribus, & minùs villosis, venosis: caule molli, & in hac, quæ hic pingitur breui, densa lanugine pubescente: flos luteus in capite

ARCTION, *Quorundam.*



ARCTION *Dodonæx*
Codice Cesario.



capite niter, crasso, scolymo simili non tamē aculeato, squamis compacto, qui tandem in pappos auolat: semen oblongum cymino non dissimile. Quidam in Dioscoride legunt *μακρὸν δὲ μαλακόν, μικρὸν, καὶ πρὸς ὃ μακρὸν κυλινδρῶδες*, vt voces *μακρὸν* & *μικρὸν* locis permutatæ fuisse videantur, & ita legit Marcellus. Præterea quid paruum cyminum Dioscorides hic appellet, non satis constat, nisi fortasse siluestre intelligat. Vulgatam tamen Dioscoridis lectionem secuti sunt Galenus, Plinius, & Vires. Otibasius. Verbasco foliis simile est, quod Arctii dicitur, lanuginosis videlicet ac hirsutis, sed tamen hirsutioribus ac rotundioribus (Plinius hirsutiora tantummodo esse tradit:) caulis longus & mollis: semine vt parui Cymini: radice tenera, alba, dulcique, vt auctor Dioscorides. Et hac quidem forma depingitur Arction in vetusto Cæsareæ bibliothecæ Codice: foliis videlicet latis, ambitu crenatis: caule tenero erecto: capitulis aliquot in fastigio mollibus ac lanuginosis, vt primi Cymini sylvestris. Nasci ait Plinius in petrosiss. *Ἀρκτίον* Græcè: Latine similiter Arction: item & *Ἀρκτούρον* & Arcturon appellant: Ab vtro nomen habet, qui Græcis *ἄρκτος* dicitur. Allucinantur qui Arction idem cum Arceo siue Personata faciunt, multo verò magis, qui & cum Vngula caballina confundunt. Inter Vngulam enim caballinam, quæ Græci *Βόχμη*, & Arion Plurimum est desctimini. Facultatis autem Arction est admodum tenuisū partium, vt Galen. & ob id exsiccatis, extergentis tamen modicè. Decoquitur in vino (inquit Plinius lib. 17. cap. 5.) radix ad dentium dolorem, ita vt ore contineatur decoctum. Bibitur & propter Ischiada & Stranguriam è vino. Ambustis & Pernionibus imponitur: fouetur eadem cum radice semine trito in vino. Arctij radix & semen in vino decocta, dentium dolorem mitigant, si decoctum ore contineatur. Ambusta & perniones eodem decocto fouentur. Bibitur item ad coxendicum dolores & stranguriam è vino. Eadē Plinius tradit. Radix decoquitur in vino ad dentium dolorem, ita vt contineatur ore decoctum. Bibitur & propter ischiada & stranguriam è vino. Ambustis imponitur & pernionibus, fouentur eadem cum radice semine trito è vino. Et rursus. Ambusta sanantur plantagine, arctio, ita vt cicatrix fallat, folia eius in aqua decocta & contrita illinuntur. Galenus idem confirmat his verbis. Arctium quod verbasco est simile, radice tenera, candida, dulci, caule oblongo & molli, semine cymino simili, facultatis est admodum tenuium partium, & ob id exsiccantis, extergentisque, tamen modicè, quamobrem radix ac semen cocta in vino

Lib. 17. c. 5.

Lib. 16. c. 13

Lib. 6. lib.

quadan

quadantenus dolores dentium mitigant. Porro ambusta & perniones non harum modo decoctum affusum, sed & caules teneriores sanare possunt.

* CACALIA,

CAP. XLVI.

Nomina

Cornu.
Emb. 106.

Lib. 3. c. 46.
& 7. c. 16.

Lib. 4. c. 118
Forma.

Locus.



AKAATA & λεονταύ Græcis, similiter Latinis Cacalia & Leontice. Gale. in simpl. medicamentorū numero Cacaliā non recenset, sed Cananū eam appellare videtur, prætermiſſa Calicæ voce, quod tamē facere nō solet in variis plantarū nomenclaturis, utpote qui vnā atq; alterā semper adiciat. Quod autē Cananū, legendum sit in Galeno, & non Cancaniū, vt in vulgatis exēplarib⁹ legitur, ex

CACALIA.



Paulo perspicuū est, qui apertē λεονταύ habet, de quo eadē planē tradit quæ Galen. & eadē prorsus vterque quæ Dioscorides de Cacalia, ita vt Paulus qui post Cananum scribit Cacaliā viribus & vsū Cacanō similem esse, eandem omnino dicere debuisset videatur, cū Galenus eandem fecerit, vt dicetur. Exiisdē intelligi licet bacanum pro Cacanō mendosē legi locis aliquot apud Paulum, quibus medicamenti hepatici ex Cacanō meminit. Cacalia, ita describente Dioscoride, folia fert alba, bene magna, caulis ē medio ipsorum prodit rectus, albus, qui florem habet quercui aut oleæ similem. Nascitur in montibus. Ex qua delineatione Dalechāpius Cacaliā esse quæ hīc pingitur opinatus est, in summis excellorum montium iugis prouenientem, radicibus multis, candidis, implicatis, crassiori cuidam velut caudici circumpositis, fatuis & gustatu lentis tragacanthi modo: caule cubitali, recto, lanugine candicante: foliis multis, latis, amplis, crassis, subrotundis, in ambitu crenatis, longo crassoque pediculo nixis, venosis, auersa parte candida lanugine hirsutis:

Lib. 27. cap. 23.

Lib. 4. c. 118

Vires.

Lib. 7. sim.

Lib. 7.

Lib. 27. c. 11.

Lib. 26. c. 6.

Ibid. cap. 19.

flore copioso, puniceo, in pappos abeunte. In florum vmbilico granum rotundum prominet niueum, margaritæ simile, cui rectē Plinius comparauit, quod excusso flore nudum nitidūque dependet. Cacaliæ radix, inquit Dioscorides, in vino macerata vt tragacantha, & per se ipsā delincta, aut manducata, tusses & arteriæ asperitates sanat. At grana quæ postquam de floruit, enascuntur, trita, cerato excepta & illita, faciē extendunt, & à rugis cōseruant. Quibus vide num similia de cacanō scripserit Galen. vt eadē dicenda sit planta quæ cacalia. Cacanī radix facultatem habet mordacitatis expertem, & modicē exciccantem, essentiam crassā, & emplasticā. Quapropter macerata vino sicut tragacantha, & linctā asperitates arteriæ sanat: nec minus si quis eam mandat, succus eius defluens prodest arteriæ similiter vt glycyrriza, quæ solum transcripsit Paulus. Eadem etiā & quædam alia de Cacalia tradit Plinius. Cacalia siue Leonticē vocatur, semen margaritis minutis simile, dependens inter folia grandia, in montibus ferē. Huius grana quindecim in oleo macerantur, atq; ita aduerso capillo caput vngitur. Et rursus. Radix Calicæ cōmanducata, & in vino madefacta, nō tussi tantū, sed & faucibus prodest. Et alio in loco. Calicæ grana mixta ceræ liquide extēdunt cutem in faciē erugantq;. Loco verò supra citato non intelligendum semen inter folia grandia folia dependere, hoc enim falsum est, sed caulem in cuius surculis & adnatis semen dependet, ex grandiiū foliorum congerie sese attollere.

CHAMÆ



KΑΜΑΙΚΙΣΣΟΣ Latinè etiam Chamæcissus, id est, humilis siue pusilla hederæ. Sed quænam sit planta quæ verè Chamæcissus Dioscoridis dici possit, inter herbarios ambigitur. Sunt qui hederam terrestrem Officinis dictam Chamæcissum esse volunt, effigie, viribus, vulgari appellatione consentientibus, quæ de re paulò post dicemus. Alij horum reiecta sententia, Chamæcissum esse contendunt eam quam pro consolida media Matthioli & Fuchsi exhibuere, bene cõuenientibus notis omnibus quæ Dioscorides Chamæcisso assignat. Ea, inquit, folia habet hederis similia, longiora tamen, & tenuiora, multa: ramulos palmi altitudine quinque aut sex, à terra foliis plenos: flores violæ similes, minores tamen, & gustui valde amarus. Radix tenuis, alba, inutilis est. Nascitur in locis cultis. Sic, ut à natalibus incipiamus, quæ hic picta est. In cultis gignitur, scilicet in agrorum marginibus & aggeribus, radice candida, & nui, inutili, quaternos & interdum plures cauliculos mittit, dodrantales, foliosos: folia circa cauliculorum verticem hederæ folia prorsus referentia, prope radicem longiora, & utrobique tenuiora, subhirsuta, quod Dioscorides non habet flores violæ similes, (sic enim conuertit *λευκὰ*, non violæ alba speciatim: nam etsi *λευκοί* nomine violæ alba significetur, tamen pro lutea, & carulea, & purpurea solet vsurpari) minores non candidiores ac tenuiores, ut vertit Ruellius, nam hæc in Græcis non legimus, quæ habent *ἄγνη λευκὸν ἔχει, μὴ ποτὶ παρὰ γὰρ τὰ πρὸ & cætera*. Iç candido caruleos

Nomina

In c. 9. lib. 4. c. 14. lib. 4.

Forma.

CHAMAECISSVS,

Quorundam.



quod Dioscorides omisit, amarissimos. Quod si his vires suffragentur, & quemadmodum Chamæcissi Dioscoridis folia ischiadicis vtilissima sunt, trium obolorum pondere in tribus cyathis aquæ ad dies quadraginta aut quinquaginta pota, & eadè morbum regiù purgant eodem modo pota sex aut septè dies, ita si ea quæ hic exhibetur, facultates habeat ad iocinosos, lienosos, ischiadicos sanandos insignes, magnum fuerit tuenda illorum opinionis argumentum. Plinius aliter de Chamæcisso quàm Dioscorides scripsisse videtur, ut hanc cum alia cõfuderit, aut de diuersa herba scripserit. Sic enim ille. Est & rigens hederæ quæ sine adminiculo stat sola omnium generù, ob id vocata orthocissos. E' diuerso numquam nisi humi repens Chamæcissos. Rurfus. Iidè (Græci) Chamæcissum appellant hederam nõ attollentem se à terra. Ethic cõtusa in vino acetabuli mèsura, lieni medetur: folia ambugtis cù auxungia. At hunc Chamæcissi vsum Dioscorides nõ tradit. Et alio in loco. Chamæcissos spirata est tritici modo, ramulis quinis ferè foliosis: quum floret existimari potest alba violæ, radice tenui. Bibunt ischiadici folia tribus obolis in vini cyathis duobus septè diebus, admodum amara potione. Quæ non in totum, sed aliqua ex parte tantum cum his quæ Dioscorides tradit, cõsentiant. Item Plinius alibi etiam tertium cyclamen non sibi demonstratam esse dicit cognomine Chamæcissum, vno omnino folio, &c. Dioscoridi Galenus assentitur his verbis. Chamæcissi flos cum sit admodum amarus, iecur obstructione liberat, daturque ex coxendice laborantibus.

Vires.
Diosc. lib. 4.
cap. 111.

Lib. 10. c. 34

Lib. 14. c. 10

Ibid. c. 37

Lib. 16. c. 5.

Lib. 5. simi

PRUNEL

Nomina



MAV D compertum adhuc est, quòd nomen huic herbæ à veteribus tum Græcis tum Latinis positum fuerit, quare vulgarem medicorum & herbariorum nomenclaturam secuti, Prunellam siue Brunellam, siue cōsolidam minorem hic vocamus. Germani *Braunnellam*, & *Gotheyl*, Galli *l'herbe au charpentier*. Sunt qui symphytum petrzum esse credant, quorum opinio peritioribus parum probatur. Solidago minor quam Germani Prunellam vocant, inquit Matthiolus, caulibus exit quadrangulis, hirsutis, spithamæ longitudine: foliis oblongis, in extremo acuminatis, menthæ proximis, ac etiani subasperis, flores gerit in caulium, ramusculorumque fastigiis spicatos, purpurascens, & quandòque candidos. Radix subest parua, prolixior, fibrata. Nascitur in pratis & siluis opacis. Maio & Iunio mensibus floret. Calidam siccamque esse scribit Fuchsius, quòd gustu glutinosa sit, & modicè amara. Dodonæus sicca quidem esse, sed caliditate & frigiditate temperatam, seu modicè frigidam. Vulneraria est herba, nam vbi vulnera glutinare, adstringere, & reprimere sit opus, feliciter hanc vsurpant. Succum eius cum aceto & rosaceo mixtum, vehementes capitis dolores sedare, recentiores vno consensu tradunt, si tempora eo inungantur, aphthas & oris vlcera, fauciumque vitia succus eius sanat. Iisdem viribus quibus Bugla & cochlearia pollet, inquit Lobellius, sed efficacius siccatur, adstringit, cohibet & reprimat.

PRUNELLA Siue Consolidam
minor, Matth.

In cap. 9.
lib. 4.

Forma.

Locus.

Tempus.

Cap. 137.

lib. 4.

Lib. 4. c. 38.

Temper.

Vires.

Matth. ibi.

Fuch. &
Dodo. ibi.



pollet, inquit Lobellius, sed efficacius siccatur, adstringit, cohibet & reprimat.

MALACOCISSOS,

CAP. XLIX.

Nomina



MAAKOKIΣΣON in Geoponicis legimus, quæ Latinis est mollis hederæ. Eam periti herbarij quidam esse opinantur, quæ hederæ terrestris & terræ corona Latinis & Officinis nominatur, quòd ramulos suos per terram spargens, folioso veluti sermo eam coronare videatur, Gallis *Lierre terrestre*, Germanis *Gundelrebe*, vel potiùs *Grundrebe*, hoc est humi repens viticula. Qui hanc legitimam esse Dioscor. chamæcissum esse contendunt, præter vulgarem hederæ terrestris nomenclaturam: eius etiam vires easdem esse cum is quas Dioscorides chamæcisso attribuit, medicorum crebro experimento testatum esse volunt, utpote quæ amarore & cæteris qualitatibus ad obstructions, & ad arthriticos dolores plurimum sint efficaces. Quantum ad figuram attinet, is qui folia chamæcissi ex Dioscoride *μακροβρεπα*, id est, longiora obiciunt, respondent vnius literæ mutatione *μακροβρεπα*, id est, minora esse, ut folia hederæ terrestris, foliis hederæ quidem similia sint, sed rotundiora, atque adeo minora & tenuiora. Et hic lapsus in Dioscoridis exemplaribus frequens est, id quod aliquoties annotauimus. Vt res hæc habeat, planta hæc ex eadem radice fibrata, cauliculos multos per terram repentes emittit, quadrangulos, teneros, in quibus folia quadentenus rotunda, scabra, vbiq; crenata grauis odoris, gustu amara, minora, & rotundiora, teneriora, foliis hederæ inter quæ flores emicant gustu amari, cærulei, qui color etiam leuciorum

Dodo. lib.

1 cap. 10.

Forma.

leucotium est, vel purpurei. Vbiq; ferè, sed præcipuè opacis & vdis locis crescit. *Locus.*
Martio statim erumpit, & florere in magnam usque ætatis partem, sæpiusque toto *Tempus.*
anno viriditatem suam conseruat. Calidam, siccamq; esse præsertim florum amari-
tudo insignis demonstrat. Quare ad discutiendas obstructions iocionis & lienis, *Temper.*
& *Uires.*

HEDEEA TERRESTRIS

Malva ossif. Matth.



MALACOLISSOS Ex

psilura, Dodon.



& ad purgandi reterum præcipuè valet, & ad coxendicum, & ad alios arthriticos
dolores sæpius utilis, menses euocat, urinam mouet: manibus confricata & contrita, *Fuch. libid.*
auribulq; immista, earum sonitus & obtusum auditum sanar. Contra pestem etiam
tradunt efficacem esse, id quod equites quoque sciunt, hi enim quociens fibula dicta
peste equum corripuerit, hac contra eandem herba magna efficacia vtuntur. Fo-
lia hederæ terrestris, auctore Trago, exulcerationi vitiisq; colli & faucium gargarif- *Lib. 1. c. 37.*
satu conducunt. Idem decoctum scabiei atque oris & muliebrium locorum vitiis,
medetur. Succus eiusdem fistulis, aliisq; id genus malis purgandis maxime prodest.

ELLEBORINE.

CAP. L.

ΕΠΙΠΑΚΤΙΣ & **Ελλεβορίς** Græcis, similiter Latinis Epipactis & *Nomina*
Elleborine dicitur. Dioscorides breuissimè de epipactide tractans, non *Lib. 4. c. 304*
quia similis esset aut facie aut viribus Elleboro albo vel nigro. Ellebo-
rinem dictam fuisse ait, vt quæ nam sit hodie herba quæ genuina Elle-
borine dici possit iudicare perdifficile sit, sed quia Elleboro albo misceretur, & iis-
dem locis nasceretur, vt etiam Theophrastus auctor est, de Elleboro albo scribens *Lib. 9. hist. c. 21.*
his verbis. *μισγεται δὲ πρὸς τὴν αἰσὶν ὅπως θυμίσσῃ, τὸ τὴν ἑλλεβορίνης σπέρμα, τοῦτο δὲ
ἐστὶν ποσειδών.* Id est, Miscetur autem potioni, vt vomitus bene succedat, Elleborines
semen. Hæc herbula quædam est. Verùm Dioscorides *θαμνίσκον μικρὸν* vocat, id est,
fruticulum paruum, exigua foliola habentem, sed *θαμνίσκον* voce sæpe is abutitur,
quemadmodum & Plinius abuti poruit, hanc modo fruticem, modo herbam par-
uam appellans. In Asia & Græcia, inquit, nascuntur frutices, epipactis quam alij *Lib. 16. c. 16.*

ELLEBORINE, *Matth.*

Lib. 29.

In cap. 304.
lib. 1.

ELLEBORINE,

Dodona.

Lib. 304.

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

et Vires.

Lib. 304.

Nomina



Eleborinen vocant, parvis foliis, quæ pota cõrra venena profunt, sicut erices contra serpentes. Et rursus. Epipactis ab aliis Elleborine vocatur, parua herba, exiguis folus, iocinoris vitiis utilisima, & contra venena pota. Recentiores herbarij nominis similitudine adducti, existimantẽsque Elleborinen Elleboro facie similem herbam esse, hi Elleboro albo, illi nigro similem herbam commenti sunt. Quare si Epipactis Elleborine dicta est, inquit Matthiolum, quod cum Elleboro nigro similitudinem habeat, ea nobis epipactis erit, quæ nascitur in Goritienti agro, quam epipactida appellare libuit, non quod Dioscoridis Elleborine sit, sed quod Elleborum nigrum quadantenus representet foliis, floribus, atque etiam radicibus.

Alpinam Elleborinen Saniculæ & Ellebori nigri facie vocant Pena & Lobellius. Idem motosis, umbrosis, sed altioribus & Alpinis gaudet. Radice est fibris multis, ex vno nexu appensis donata, ex qua eriguntur pediculi teneri, glabri, flexiles, in quorum summitatibus folia quinque partita, parum crenata, Geranij columbin, aut Saniculæ diuisura: flores radiati, ex senis foliolis, gustu non ingrato sed acriore. Quia radicem habet Elleboro nigro simillimam, Elleborum nigrum esse voluerunt. Quæ ex Dodona hic picta est, Elleborum album refert, nisi quod omnibus partibus minor est. Caule est recto, foliis virgatis, Ellebori albi aut planraginis folia referentibus, sed minoribus, flores ex caule pendent albi, in medio caui, notis luteis & purpureis, miro modo variegati, in siliquis crassiusculis semen veluti fabulum continetur. Radices huc illuc sparse, succulentæ, densæ, ortice gustu amaro. Præter viginosis, locisque umbrosis & opacis gaudet. Iunio & Iulio mensibus floret. Calida siccaque est temperatura. Elleborine, auctore Dioscoride, iocinoris vitiis utilis est, & contra venena pota.

HERBA PARIS,

CAP. LI.



HERBA Paris recentiorum, & Vialupina, siue vua vetta, Gallis *Raisin de renard*, Germanis *Vuolffibee*, Lobellio & Penæ solanum tetraphyllum dicitur, quod herba

sit quaternis foliis, cyclamino aut cucumeri haud absimilibus, credidit Fuchsius aconitum esse pardalianches Dioscoridis. At cum notæ sint hodie aliq̃ & veræ aconiti diffidentia, nec huic herbae vlla venenata insit facultas, imo contra venena præstantissima ex ea parentur remedia, certum est à pardalianche longe diuersam esse. Solanum est monococon Gesnero, aconitum monococon Cordo, athenon

articus

HERBA PARIS.



atticus Trago. Caule est vnico, rotundo, leui, gracili, palmum aut sesquipalmum alto, à cuius plusquam medio quaterna exoriuntur folia, decussatim aut ex aduerso sita, crucis instar, nigricantia, rotunda, oblonga, tenuia, sanguinea simillima: totidem in caulis summitate, eodem situ, sed minima & longiuscula circa florem ex luteo herbaceum, è cuius medio purpureus vinosusque extat globulus, acino vix similis, in quo semen album, minutum: radix longa, gracilis huc illuc summo cespite spargitur. Siluas vmbrosas & frigidiusculas septentrionales amat. Aprili mense floret, Maio semen maturat. Bapista Sardus scripsit nouisse se quosdam, quorum aliqui morborum diuturnitate, alij verò veneficiis semistulti facti erant, hoc tantum Herbæ paridis semine, ad vigesimum vsque diem in puluerem hausto drachmæ pondere, pristinae sanitati omnino restitutos fuisse. Refrigerat insigniter, quare arsenici vim reprimat.

Locus.
Tempus.
Vires.

LUNARIA MINOR.

CAP. LII.



ETERIBVS ignota, aut certe nullo ab his nomine donata hæc à recentioribus Lunaria & Lunaria minor, & Lunaria racemosa dicta, à foliis lunæ crescentis modo falcatis, Gallis *Petite lunaire*, Germanis *Monkraut*. Serpit humi vnico vtriusque folio profundius diuiso,

crassiusculo,

LUNARIA Minor,
Marb.



vel foliis multis superne rotundis, inferne falcatis, quibus scolopendrium verum refert. è medio cauliculus exit, palmaris, ferens in summo racemosum florem ambrosiæ, aut botridis, & quadantenus ophioglossi similem, radix fibris multis constat. In scrobium marginibus & aggeribus vligine madentibus & secus vias plerumque nascitur. Maio & Iunio mensibus reperitur, deinde deperit. Gustu sicca est admodum & adstringens, quare frigida siccaque est temperatura, ophioglossi vt quodammodo aspectu, ita facultate similis, vel efficaciori, ad vulnera optimè glutinanda, vlcera cicatrice obducenda, luxata coniungenda.

Locus.
Tempus.
Temper.
Vires.

Constat etiam experientia ad supprimendos menses, & ad album muliebrem profluuium, mirifice hanc herbam conferre. Quidam Tragium secundum Dioscoridis esse putant, in montibus & præcipitiis nascens, folio Scolopendrij, radice tenui, candida, Raphano sylvestri simili, quæ cruda & cocta dysentericis prodest. Constat certe folia grauiter olere inclinante ætate, vnde nomen inditum putat Dioscorides. Alia est ab herbariis Luna-


Lunar. alia

Forma. tia minor nominata, siue cærulea à florum colore, & Lunaria Magorum Arabum, radice multiplici, fibrata, longiuscula, sublutea, amata, odorata, foliis multis parvis, rotundis, crassis, alaro similibus, longiusculo pediculo nixis: cauliculis sutrectis, lævibus, nudis: flore violæ in caulis fastigio nitente, cæruleo, venusto, in quinque foliola diuiso, quæ extrema parte radiatim velut in exilia stamina finduntur: semine in siliquis oblongis, in tenue filum desinen-

LVNARIA Alia minor
cærulea, Dalech.



LVNARIA Lutea,
Dalecham.



Locos.

Tempus.

tibus. In niuosis montibus provenit, etiam sub niue ipsa, ita vt niue liquata, statim exurgat. Floret mense Aptili & Maio. Quibusdam placet hanc esse Asclepiadem legendum, quæ apud Dioscotidem, *φύλλον μωρὰ* (non *μωρὰ*) *καρπὸς ὁμοῖον*: notis reliquis bene conuenientibus. Præterea, alia est Lunaria minor siue lutea, à Monspelientibus nominata, quæ in ptatorum & humidorum agrotum marginibus profilit, radice ferè simplici, modice fibrata, candida: caulibus tribus aut quatuor, sesquipedalibus patum aut nihil foliosis: foliis circa radicem multis, crassis, longis, per otas laciniatis, hirsutis, punctis albicantibus maculosis, gustu valde adstringentibus: flore luteo, tribus tantum foliolis constante: semine exiguo in latis vasculis Lunatix modo, per caules spatfis, Ancyliis Romanorum non dissimilibus, velut ex rotundis discis duobus compositis, è quorum medio tenuis pilus eminet. Pena thlaspi patuum hietacifolium vocat.

TELEPHIVM. CAP. LIII.



FABARIA, crassula, & crassula maior, & faba crassa vulgo, Germanorū *Nomina*
Vundkraut, Gallorum *Orpin*, seu *grasse*, & seu *esparse*, Telephium Dio-
 scoridis peritis multis esse videtur, Latinis etiam Telephium dictum.

TELEPHIVM *Floribus*
purpureis, Lobelii.



FABARIA *Marth. & Fuch.*

Telephium verò quod vlceribus malignis & de-
 ploratis, quibus Telephus Mysii Rex ab Achil-
 le vulneratus consenuit, quæ ob id etiam tele-
 phia vocantur, auxilietur. Cauliculum profert
 rotundum, spissum, fragilem, folis vestitum
 crassis, carnosiss, succo plenis, portulacæ hortensi
 haud dissimilibus: flores elegantes in vertice al-
 bos, vel luteos, vel purpureos in umbellis drabæ,
 radix alba est, carnosæ, tuberosa, compacta. Hanc *Lib. 3. cap. 1*
 plantam Dioscorides etiam delineasse videtur
 his verbis. Telephium herba & caule & foliis
 portulacæ similis est, alas binas in singulis folio-
 rum geniculis inhaerentes habet, a radice seni se-
 ptenive tamuli prodeunt, cæruleis, crassis, visco-
 sis, carnosiss foliis refertis: flores illi sunt lutei aut
 albi. Quæ Plinius transulisse videtur. scribens, *Lib. 27. cap. 19*
 Telephium portulacæ similis est, & caule, & so-
 liis. Rami à radice septeni Octonive fruticant,
 foliis crassis, carnosiss. Hæc Plinius. Nascitur, in-
 quit Dioscorides, in vineis, & locis cultis, vere.
 Sic crassula in vineis, cultis incultis, humidis, sil-
 uosis, & passim alibi abundat. Vere statim pro-
 filit, Iulio & Augusto mensibus floret. Præter *Tempus.*

Forma.

Lib. 3. cap. 1

Lib. 27. cap. 19

Locus.

TELEPHIVM *Purpureis, Fuch.*



Telephium, quod flores albos profert & lutos, ex Fuchſio Telephium quod purpurafcentibus floribus emicat, hic pictum damus, quod ad differtentiam ſuperioris, Telephium purpurafcentis appellauit. Præter flores qui in primo candidi ſunt, in hoc autem purpurafcentes, foliorum etiam colore differunt, qui in candido viridis &

TELEPHIUM *Hiſpanicum, Cluſij.*

Lib. I. ſup.
Hiſp. cap.



Lib. I. cap.
Temper.
& Vir.

TELEPHIUM *Minus ſemper virens, Lobell.*

Lib. I. ſim.



Pena in
Ad.

herbaceus eſt, in purpurafcente paulo pallidior. Cætera omnia in his ſimilia apparent folia potiſimum, quæ fabacea prorsus ſunt, niſi quod pinguiora & craſſiora. Huic Lobellius Telephium nonbus purpureis appiuximus. Aliud Telephium Hiſpanicum Cluſius deſcripſit, quod habet duos aut tres pluresve caules, ex radice prodeuntes, cubitales, ſucculêtos, procumbentes, in quibus folia ex intervallis bina ſemper inter ſe oppoſita, vt in myrto, craſſa & ſucci plena, quemadmodum Craſſula maior, ſed maiora, & magis carnoſa: ſlos in extremis ramis quali umbellam naſcitur, quemadmodum in craſſula, pallidus radices illi plurimæ, glanduloſæ, craſſulæ radicibus ſimiles. Viua admodum eſt, adeo vt rami eius in terram depaſti, ſtatim radices agant. Naſcitur in Hiſpania, vmbroſis quibuſdam, frigidioribuſque locis. Telephium vocant Hiſpani, Cluſio craſſulæ genus potius videtur, quandoquidem cærulea folia non habet, ſed ex herbaeco pallentia, portulacæ ſaturæ lxtioris triplo aut quadruplo maiora. Præterea Lobellius Telephium aliud pinxit minus repens, ſemper virens, folio rotundiore, flore rubro, radice hbroſa, cauliculis cepæ craſſioribus. Dodonæus craſſulam refrigerare tertio ordine, & iſdem viribus ſemperuium præditam eſſe ſcripſit. Dioſcorides verò folia ſenis horis illata, albas vitilignes ſanare, ſed oportere poſtea hordeacea ſarinalinare locum. Quinetiam alphas tollere cum aceto in ſole inuncta, ſed cum inaruerint, abſterguntur. Galenus verò Telephium exſiccandi & detergendi facultate eſſe, non tamen inſigniter calida. Verum in hoc forſan primi eſſe ordinis, deſiccare autem ſecundo ordine intenſo, aut certè principio tertij. Quare ad putrida vlcera conuenire, & leucas & alphas cum aceto ſanare. Cum igitur craſſula detergentis exſiccantiſque facultatis minimè particeps ſit, foliaque ferat portulacæ maiora, eorū ſententiam reiiciendam eſſe cêſet Marthiolus, qui Telephium eſſe putant, quamuis illa noris multis Telephium referat. At qui medicamentorum experientiam profrentur, reſpondent craſſulam multis viribus pollere, & plura præſtare quàm quæ Dioſcorides Telephio tribuit. Præterea caliditas illi non

non deest, nequo siccitas tanta, quantam Galenus & Paulus tradiderunt: nempe caliditas primi ordinis, quæ gustu vix perecipiatur: siccitas, cuiusmodi in semperuivis: absterio, qualis inest farinæ fabarum & portulacæ, quæ videtur potius lenire glutinoso succo, cum primo appulsu linguam tangit. Adhæc non solum calfacientibus, exsiccantibus & detergentibus, telephia vicera curantur, sed etiam portionibus, pulvis, fomentis ex crassula paratis, ad aerimoniam Lnici erodentis, & opus naturæ impediens rotundendum, ac cacochymiam corrigendam intus & foris. Plinius quantum ad usum contra vitiliginem attinet, à Dioscoride dissentit. scribit enim. Illinitur lentigini, & cum inaruit, deteritur. Illinitur & vitiliginis te- Li. 37. cap. nis fere mensibus, senis horis noctis aut diei: postea farina hordeacea illinitur. Medetur & vulneribus & fistulis.

AVRICVLA MVRIS, CAP. LIIII.

MΥΟΣΟΣ ὠτὴ vel μυδὸς ὠτος & μυδὸς ὠτριον Græcis, Latinis Auricula muris, Nomina
 Galis Orelle de souris, Italis Orecchia di topo. Germanis Mensegerlin. Diosc.
 vnius myosotidos meminit. Recētiore plura fecerūt genera, omnia Genera.
 à foliorū figura auri murinæ simili. Auricula nūtis, ita describente
 Diosc. caule, mittit ab vna radice plures, infernè subrubētes, cauos: folia oblōga, Li. 2. c. 179.
 angusta, dorso lato, nigricantia, ex interuallis gemina, in acutum desinentia: te- Forma.
 nues cauliculi ex alarum sinu nascuntur, in quibus flosculi parui, exrulei, velut
 anagallis: radix digitali est crassitudine: cum multis adnatis. Similiter descripta
 est à Plinio his verbis. Myosota siue Myosotis lævis herba, caulibus pluribus ab
 vna radice. aliquatenus rubenribus, concauis ab imo: foliis angustis, oblongis, Li. 37. cap.
 dorso acuto, nigris, per interualla assiduè geminatis: & tenuibus cauliculis ex alis
 prodeuntibus, flore exruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis

AVRICVLA Muris,
Macthola.

AVRICVLA Muris,
altera, Dodon.



In cap. 19.
lib. 2.

Locus.

Tempus.

Lib. 2. ca. 19.

Auricula

muris 1.

Forma.

Radem.

MYOSOTIS parva,
Dalechampt.



Myosotis
parva, Dalec.

Forma.

Tempus.

Temper.

Lib. 2. ca. 19.

Lib. 2. simpl.

Lib. 2. ca. 19.

scoride, Desiccat ordine secundo, inquit Galenus, ceterum nullam evidentem caliditatem habet. A quibus dissentit Plinius, qui cum iisdem planè verbis quibus Dioscorides Auriculam muris delineasset, vis ei septica, inquit, & exulceratix, ideoque agilopas sanat.

VERONICA MAS,

CAP. LV.

Nomina



ELEBERIMA est apud recentiores herba quæ Veronica mas ab illis dicta est, Græcis & Latinis scriptoribus fortassis incognita, Gal-
lis *Veronique masle*, Germanis *Ercubreiz*, & *Grundhyll*, ob mirificam
sanandi vlcera ac vulnera facultatem. Dodonæus Betonicam Pauli

Lib. 2. ca. 17.

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

vocat. Herba est per terram serpens cauliculis dodrantalibus, gracilibus, purpura-
scentibus, villosis: foliis longiusculis nigricantibus, parum hirsutis, serratis: floscu-
li in summitate diluti purpurei sunt: semen in loculis minutum: radix tenuis, fi-
brata, brevis. In marginibus agrorum & siluarum provenit. Iunio & Iulio mensi-
bus, floribus & semine abundat. Veronicam maiorem Septentrion alium narem
Fuchs & Dodon. Lobellius vocat. Amaritudinem quandam & vehementem
adstrictionem



VERONICA Recta
minima, Lobelij.



adstrictionem gustu præ se fert, vt hinc calidam siccâmq; esse conicere liceat. Mirificè ad cruenta & vetera vlcera, & vulnera sananda confert. Scabiei & omnibus cutis vitiis medetur. Tumores in quacumque corporis parte fuerint, potissimum autem in ceruice, discutere potest. Recētiore eius vsum sumimopere commendant in febribus pestilentialibus, propinantes sicca puluerem drachmarum duarum pondere cum theriace drachma ex vino meraco, ea tamen lege vt statim sudent ægri. Eadem datur potanda ex sua ipsius stillaciria aqua vtiliter contra tussim & vitia omnia pectoris & pulmonis : nam tabidos & suppuratos iuuat. Præterea aperit iocinoris & lienis obstructions, vterum, renes & vesicam expurgat. Lobellius Veronicam marem, Matthioli Veronicam rectam appellat, foliis & flore in surrectis pedalis caulis, aliis non dissimilibus, sed maioribus amœnioribûsq;. Huic appingit Veronicam rectam minimam, quæ vix vñ iam & sesquiunciam æquat, solus Veronicæ nostratis, aliquanto minoribus. Flosculi non dissimiles, sed densiores comoioresq; spicati, corniculis, crebris succedentibus. Hæc

Vici.

Lobellius.

COCHLEA

Norma
Dod. lib. 4.
c. 10, 78.
Forma.



ERMANORVM *Leffelkraut*, & Belgarum *Lepelkraut*, idest, Herba Cochlearis huc herba cochlearia nomen fecit, Gallicè *L'Herbe aux cailles*, à foliorum caua rotunditate, cochlearis connexam intimamque superficiem exprimente. Hæc foliis est latiusculis, crassis, umbilicatis, & nonnihil cauis, parui cochlearis more, ambitu interdum angulosis, oxalidis ro-

COCHLEARIA, Dodon.

Locus,
Tempus
Temper.
Pena in
Adact.



COCHLEARIA Britanica, Lob.

Lil. carn. 78.
Vires.
Dodon.



Tameis fluente, & qua Londinum præterlapsus est, & in Bristoiæ sinu Occidui Oceani prouenit.

tundæ ferè similibus, sed nec tenera sunt, nec candicantia, imo duriuscula, & ex fusco viridantia: cauliculi quadatenus angulosi, palmares aut pedales: strobili candidi, semen paruum, rubescens in siliquulis: radix tenuis, fibrata, albicans, gustu acri. In Frisia & Holandia, frequentissima locus sepes & in pratis. Aprili & Maio mensibus floret, per æstatem semen fert. Calida siccaque est herba, gustu acri, nasturtij, aut Sij cardamines. Quare sunt hodie eruditissimi herbarij qui Britannicam Plinij esse censent, quod iisdem locis reperiatur, iisdemque viribus prædita esse comperiat, quas Cæsar's milites, trans Rhenum promotis castris, aduersus Stomacacem edocti, à Frisiis colonis experti sunt, ut ex eodem Plinio fusiùs alibi diximus. Vetum cum hæc Plinianæ descriptioni minimè conueniat, & sint multæ, ut nasturtia, & Sium cardamine eidem persimiles gustu, nec facie multum dissimiles, ad eadem utiles, nullum inde errum sumi potest argumentum, quo Britannicam hanc esse probare quis possit. Quidam, inquit Dodonæus, hanc telephium Græcorum esse putant. Cochlearia in aqua decocta frequenter collutione, contra putrida oris vlcera, & cætera eius vitia summopere efficax est. Singulari etiam remedio est aduersus oris affectum, quem Plinius Stomacacem, Marcellus Oscedinem, Holandi Frisique *Sneerbych* nominant. Quod cum frequens experientia comprobaret, magno est apud Holandos & Frisios in vsu, & commendatione. Isti congener est vel similis, quæ Cochlearia Anglica à Pena & Lobellio dicitur, flore, semine, & sapore, sed foliis non tam umbilicatis, aut in Cochlear efformatis, potius Atriplicem aut Lapathum paruum referentibus, vnciam latis, & in sesquiuncie aut vnciarum duarum longitudinem porrectis, crassis, densis, succulentis, gustu & colore superioris Cochlearis: radice maiore. Æque ut superior laudatur ad Stomacacem. In anglia ad superior laudatur ad Stomacacem. In anglia ad superior laudatur ad Stomacacem.

PERFOLIATA,

CAP. LVII.



Vix affirmare quis possit, fueritne veteribus cognita descriptaq; hæc herba, quæ Perfoliatum & Perfoliata hodie vocatur, quod caulis singula eius folia perforet, & penetret, Gallis *Perseuile*, Germanis *Durchwachse*. Ambigitur hodie à nonnullis sitne Dioscoridis *Cacalia*. Eiusdem coryledon à nonnullis crederetur, nili radix obstat, quæ oliuæ instar rotunda non est. Perfoliata caulem mittit rotundum, gracilem, ramulis multis & tenuibus fruticantem, folia singula perforantibus rotunda, in acutum tamen desinunt, cana, tenera, læuia, colore ex glauco virentia: flores in ramulorum fastigiis pauci, inter toliola radiatim sita ex aureo pallidiflora, fuscum, radix vnica, candida, fiorata. Inter segetes, in pratis, agrorum marginibus prouenit, & à Chironio in hortis colitur. Iulio & Augusto mēlibus floret, deinde semina producit. Amara modice est, & adstringens, ex quo intelligere licet, calidam siccamq; esse. Decoctum eius in aqua aut vino, vulneribus medetur: quinetiam herba ipsius folia recentia trita, & inposita, cetera aut quopiam alio curandis vulneribus vtili vn-

Nomina

Dod. lib. II.

cap. 91.

Fuch. cap.

142.

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

& Vires.

PERFOLIATA,

PERFOLIATA Longifolia,

Dodonæi.

Dalechampi.



guento excepta, ramices puerorum sanant. Eadem herba trita & cum fatina vinoq; admota, prominentias umbilici infantium reprimat. Plurimus huius apud Chirorgos vsus. Perfoliata alia longifolia cognominata, in cōuallibus altissimorū Iurecaminum densis, vmbrosisq; siluarum solitudinibus, hominis proceritate crescit, radice nigra, crassa, dura, ex quibusdam tuberculis fibras mittente: caule simplici in virgas minimè diuiso, foliis oblongis, caulem amplectentibus, non autem vt in altera & vulgari per medium traducentibus, crassis, gustu amaris, flore è tubo nigrescente, non coronæ modo, vt in altero genere, caulis verticem ambi-

COTY.

Nomina

Forma.

Muzh. in
ca. 33. lib. 4.
Dod. lib. 2.
cap. 15.

Locus.

Vues.

Lib. 4. c. 33.

Lib. 1. c. 33.



ΟΤΥΛΗΔΩΝ ἰρίδα & κυμβάριον, Latine etiam *Coryledon altera* & *Cymbalium*, & *Vmbilicus veneris* alter, & *Acetabulum alterum*, Gallis *Le petit nombril de Venus*. Folia habet vmbilico primo latiora, pingua, densa circa radicem, veluti oculum medium describentia, quemadmodum *Aizoon* maius, gustu adstringentia, cauliculum tenuem, & in ipso flores & semina hyperico similia, radicem vero maiorem. Quæ hic picta est,

COTTLEDON II.

Martholi.



COTTLEDON III.

Dalechampy.



à doctis herbariis creditur esse verus ille vmbilicus Veneris alter, foliis latioribus, crassis, ferè rotundis, in orbè circa caulem latius sparsis, vr in *Aizoon* maiore: caulis medius eminet tener, flosculos ferens. Montosis locis creseit, & in hortis colitur ab herbariis. Facit ad eadem, ad quæ etiam semperuuum, inquit Dioscorides. Quæ in re ab eo dissentit Plinius, alioqui in delineatione magna ex parte consentiens, his verbis. Est aliud genus eiusdem (*Coryledonis*) sordidis foliis, latioribus, densioribusq; , circa radicem velut oculum cingentibus, asperrimi gustus, longiore caule, sed pergracili. Vfus eius ad eadem, quæ iridis. Sic omnia ex *plaria* habent, quæ ramen ex Dioscoride emendanda videntur, & iridis voci *aizoi* vox substituenda, quæ cum rursus sequatur, eam videtur aliquis perperam mutasse: est enim iris calida siccq; facultate, *Coryledon altera* refrigerante & humectante. Præterea folia τῆς ἰρίδος ὡς ἰρίδος vertit asperrimi gustus pro

CYMBALARIA.

Martholi.



alb. c. 33.

astringentis gustus: & folia fordida dixit, perinde ac si *ῥομπὰ* pro *ἀμπὰ* legisset. Herbarij quidam Coryledonem aliam siue Cymbalum diuersum à superiore designant: radice fibris multis nigrisque capillata, foliis multis, crassis, pinguibus, longo pediculo nixis, circa radicem in orbem circumiectis, & tanquam rotundū oculi ambitum describentibus, venosis, in ambitu crenatis: caule palmum alto, villosō, tenui: flore hyperici, candido. Vmbrosis & opacis siluarum recessibus, & latebris gaudet. Refrigerat & humectat vt aizoum. Saxifragiæ maiori, seu albæ persimilis est, non tamen eadem: differt enim viribus potissimum, & radicibus. Est apud Infubres vulgaris herba, quæ cum Cymbalaria vocetur, à Cymbalio videtur illis nomen duxisse, verūque esse veneris umbilicus alter. Venetijs Patavij, & vicinis pagis passim ex parietinis & maceris comæ modo dependet, cauliculis numerosis, tenuibus, lenris, tenerrimis, capillaceis, pedalis, & sesquipedalis, & quibus folia prodeunt hederacea, laciniata, mollia, læuia, logis tenuibusque petiolis nixa: flosculi ex luteo virentes, qui è tenuissimis quoque pediculis emergentes, clauicularum modo sese implicant. Illic Pharmacopœi veri umbilici Veneris penuria & ignoratione hac herba vtuntur, iisdemq; pollere facultatibus existimant. Valere eam ad alba vteri profluvia Matthiolus affirmat, si ipsa recens sepius in acetarij deuoretur, vt Itali solent, prima mensa.

Coryled.
tercia.
Forma.

Locus.
Temper.

Cymbalaria March.
in esp. 88.
lib. 4.
Pet. Persin.
Ad.
Forma.

Vires.
Ibidem.

MVSCVS,

CAP. LIX.

MYON & *μύκων* Græcis appellatur, qui Muscus Latinis, Arabibus *Axnee*, & *Vfnei*, Gallis *Mouffe*, Italis *Mofa*, Germanis *Moose* Sphagnō etiam Plinius vocat, item Ætius Sphagnum & Hypnum. Multiplex est Muscus: Arboreus, terrestis, saxatilis, marinus. De arboreo & terrestri hic tractabimus. Est autem Muscus præsertim arboreus, nihil aliud quàm villi, seu foliola incana minutius & profundius incisâ, nascentia, & pendentia ex arboribus sine radice, sine flore, sine semine. In cedro arbore, inquit Dioscorides, populo alba & quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum populneū, in quo genere candidum & odoratius præstat, nigricans improbatur. Plinius de eadem scribit his verbis. Sphagnos in Syrenaica provin-

Nomina
Lib. 1. cap. 13.
Lib. 2.
Genera.

Forma.

Lib. 1. cap. 10.

Lib. 1. cap.

MVSCVS Arboreus.



MVSCVS I. Terrestris,
Tragi.



cia maxime probatur, alij Bryon vocant: secundum locum obtinet Cyprius, retium phœnicis. Fertur & in Ægypto nasci: quin & in Gallia non dubitauerint. Sunt enim hoc nomine etiam arborum villi, quales in Græcia videmus, sed odore præstantes. Laurus prima candidissimis arque altissimis, secunda rutilus, nulla nigris. Et in insulis petrisque nati improbantur, omnesque quibus palmarum atque non suus odor inest. Galenus his addit Muscum, qui in picea arbore reperitur. Nascitur etiam in abiete, & aliis arboribus. Cæterum in eo genere quod in Italia prouenit, inquit Marthiolus, is nobilior & odoratior videtur, qui in larice nascitur: quare & viribus fortasse præstantior erit. Tragus aliud Musci genus facit, idque vulgatissimum in pratis & hortis nascens, villolum, sed reliquis generibus gracilius & tenuius, ex luteo viride. Idem & recentiores alij, Muscum quoque terrestrem appellant plantam quæ longis viticulis repit, numerosissimis foliis obsitis, funiculos esse dices, qui sæpe ad septem & octo vlnarum longitudinem protenduntur: multis vtrinq; adnatis ramulis, similibus foliolis obseptis, ut picæ arboris summitates esse videantur. A Lobellio Muscus clauatus dicitur, Pes leoninus, perpe-

L. 7. simpl.

In cap. 10.
lib. 2.
Lib. 2. cap. 1.
Musci. ter-
rest. r. 1.

Forma.
Musci. ter-
rest. r. 1.
Terribilis.
cap. 10.
Forma.

MVSCVS Terrestris II.



MVSCVS Terrestris III.



ram Chamæpeuce à Cordo. Tota planta ad tactum sicca est & subaspera, colore ex viridi pallescente. Serpit humi & inter saxa Musco scatentia, nititurque radicibus per intervalla multis, capillaribus quæ ex viticulis obsequiosos prodeunt, ut in hedera, quibus sese propagat, & gyros nectit, spirasque an fractuosas multas. Iunio verò emittit ex ramusculorum fastigiis iulos ferè corylaceos, sublauro colore. Nascitur in silvis, subulosis & inuis locis, præsertim inter musculos lapides. Terrestris huic Musco Tragus herbulam subiungit, quæ æstate & hyeme virens omnino sinuâ sabinâ refert, odore omni destituta, gustu planè amara, Musci terrestris superioris instar, luteos in cacumine iulos ferēs, qui & ipsi nullo post se relicto fructu, protinus pereunt. Quidam Plinij Selaginè esse volūt Sabinæ similē, Gallorū Druidis summo perè laudatâ cōtra omnia vicia oculorū, & omnem perniciem. Musco terrestris non absurdè subiungetur herba Græcis Latinisque veteribus forte ignota, quibusdam


Locus.
Musci. ter-
rest. r.
Lib. 2. cap. 10.
Forma.

Lycopod.
Dodon.

MUSCVS Alius terrestris
Lycopodium, Dodon.



MUSCVS Fœniculaceus.



MUSCVS Terrestris denticu-
latus, Lobellj.



quibuldam Officinis pro spica celtica non sine graui errore vsurpata, vulgi appellacione secutus Dodonæus *Autoris* nominat, idest, Pedem lupinum, Gallice *Pied de loup*, vel *Parte de loup*, Germanicè *Beerlap*, *Gurrelkrant*, & Musci quintum genus facit. Viticulis per humum serpit, foliolis veluti pilis densis admodum vestitis, radiculis in quibusdam partibus terræ infixis, & in hærentibus. Et his enascuntur alix in tres quatuorve particulas fissæ, in apices candidos desinente, lupinos vngues satis apertè referentes, producentisque cauliculos rectos, tenues, candicantes, rarioribus pilis hirtos, tenues veluti spicas ferentes, foliolis plenas, quæ strobulis candidis similes sunt. Vdis locis, & siluis umbr. sis, crescit. Muscum alium fœniculaceum vocant herbarij, quem gignunt arbores in frigidissimo Allobrogum tractu, locis asperis, & maximè saxosis educatæ, præsertim querens & fagi. Nascitur is non alterius Musci arboræi modo, sed spatium in variis arborum partibus, trunco, ramis furculis, fruticatque singulis priuatim quasi plantis: plurimi ex vna tanquam radice nigra ramuli prodeunt, duos digito alti, exiles, in tenuissimos villos fœniculo similes diuisi, candidi, iucundum quidpiam oleres, vasculis mulsis lacunatis, inanibus, ramulorum vertici affixis, in ambitu hirsuti, quæ ad seminis conceptaculum natura formallè videtur, vt in Androsace, licet vacua perpetuo sint. Quasdam alias Musci varietates tradidit Lobellius. Quædam enim denticulis, & viticulis paruis sarmentosis pinnatis, compressis, arguta naturæ soletia elaborata, rependo, serpendoque innumeris flexibus implicatur. Huic alia non dissimilis ortu & modo, sed ramulorum densissimis foliorum quasi denticulis compressis, vel squamulis. Illecebræ multò minoribus, attractu sericeis cõfetti sunt. Est Clusij Muscus terrestris, repens, Lusitanicus. Herbulæ, inquit, dodrantalibus aut interdum pedalis repens, viticulis filo tenuioribus, numerosis, vtrinque adnatis ramulis in obliquum expansis & capillaribus, terræ inhaerentibus quibusdam suis fibræ. Tota integitur numerosissimis foliolis, siue squamulis potius tenuissimis, pulcherrimæ fœcie digestis, dilutioræ & pallescere vitore, & tactu mollibus quidam, sed veluti siccis, gustu adstringente, cum

Locus.
Musci.

Forma.

MUSCVS Terrestris denticulatus,
alter Muscus terrestris r p̄s, Clus.



Vires.

Lib. 4. c. 10.

Lib. simpl.

Cap. 39.

MUSCVS Scoparius, Lob.



Trig. lib. 4.
cap. 19.

quadam tamen grata dulcedine. Nusquam hoc Musci genus se conspexisse ait Clusius, quàm in aggeribus vimbrosis oliuetorum, ad Colibriam urbem Lusitanix, trans flumen Mâdego, Latinis Munda nuncupatum. Lobellius Sommerseji Angliæ sterilibus montibus (Mendip vernacule) vbi plumbū effoditur, nonusquam magna prouenit copia, in aggeribus & saxis. Est & Lobellij alius Muscus Scoparius cognominatus, Musci-dorum & vdorum Belgij & Frisix Orientalis sectator, multis dodrantalibus, pedalibus, arque etiam amplioribus ramulis, purpurea aurea nitentibus, innumero cirrorum tenuium sobole comolis, è quibus singulis oriuntur capitula Lini, Ericæ aut Selaginis minora. Hæc Lobellius. Muscus arboreus vim habet adstringendi, vt tradit Dioscorides. Facit ad vteri affectus in decoctis ad infusus. Sic & Galenus. Vim habet adstringentem, inquit, inualidam: nec enim multum est frigidum, sed propinquum ferè mediis: quia videlicet & digerendi, & emolliendi facultatis est particeps, maximè quòd in cedrinis lignis reperitur. Scribit Serapio, vinum epotum in quo diebus aliquot Muscus is maderit, altum somnum inducere, ventriculum roborare, vomitiones compescere, & aluum sistere. Muscus, inquit Auicenna, vtiliter cordis medicamentis inseritur, quòd odoris fragrantia defectus animi iuuat. Muscus terrestris ad calculi affectus maximè commendatur: nam si vino incoquatur, eo epoto, renum calculi franguntur, pellunturque certissimo experimento. Nonnulli etiam aquam ex eo destillant ad eandem affectionem. Idem contusus & ex aqua decoctus, inflammationes & dolores, à calida causa exortos, mulcet: quare à multis vsurpatur ad podagram à calore prouenientem. In vinum vappescens pendulus impositus, breui restituit. Tantum autem Musci accipiendum, quantum vas ipsum siue paruum, siue magnum postulare videbitur.

PULMONARIA,

CAP. LX.

Nomina

Genera.

Forma.

Math. in

ex. 4. lib. 4.

Dod. lib. 4.

cap. 71.



Vt pulmonariæ nomen audit, statim aliquà cum pulmonibus similitudinem, vel insignem quidam ad iuuandos pulmones facultatem animo concipit. Plautas tres huius nominis describemus. Prima est quæ Gallis *Herbe aux pommans*, Germanis *Lungenkraut* nominatur. Læuanti herbe quadatenus similis, in quetuum aliarumq; siluestrium arborum caudicibus

PVLMONARIA *Fungosa.*



PVLMONARIA
Maior.



dumis collium, nonnunquam & in nemoribus, solo pingui, radice longa, nigra, mucositate fibrata: caulibus multis ex radice ima prodeuntibus, ferè cubitalibus, ro-

caudicibus nascitur opacis præsertim siluis, atidior, ambitu latiore, supernè virescens, infernè pallescens, maculis frequentibus ita conspersa, vt effigiem pulmonis præbeat, quæ caulis nominis fuit. Vtuntur hac quidam magis fortasse nomine quàm viriū experientia inducti ad tabem, pulmonum vlcera, & cruenta sputa. Nec desunt qui eam commendent ad vulnera sananda, ad pudendorum vlcera, & ad vtrūque muliebri profluuium. Præterea dysentericis eam exhibent, & biliosa vomentibus. Sunt quoque qui ea vtuntur ad suspicioso, asthmaticos cum glycyrrhiza succo, hyssopo, helenij radice, & scillino oxymelite. Valet ad ouium & cæterorum quadripedum tussim, & respirandi difficultatem: quamobrem pastores eam tundunt, morbosisque ouibus mane cum sale propinant. Huic multum dissimilis est recentioribus herbariis & medicis dicta Pulmonaria, siue pulmonalis, Gallis l'Herbe aux pouxmons, & l'Herbe de cœur, folio buglosi, latiusculo, hirsuto, nigricante, maculis lacteis, & quibusdam nigris asperso, quibusdam in regionibus sine maculis: inter hæc cauliculi erumpunt molliores, gustu oleraceo, palmares, & sesquipalmares, qui in vertice flores ferunt purpureos, & capitula in quibus nigra semina: radix longa, crassa, viscida, fibrata nigricat, gustu ingrato. Montosis, humidis opacis gaudet. Primo vere floret, mox: semen eius maturum est. Huic plantæ herbarij magnas vires tribuunt ad pulmonis vlcera sananda. Qua in re & sanguinis reiectione mirabili successu exhiberi prædicant, si decoquatur ad medias, deturque decoctum potandum addito saccharo, vel si succus ex ea expressus in serapiū cum saccharo coquatur. Iulculis miscent folia mulicreula, aut tula cum ouis in placentas formant, & ad pulmonis vitia, cordis que affectus conferre prædicant. Pulmonariam minorem herbarij quidam plantam hanc vocant, alij Echium primum Plinij. Gignitur in sepibus & Locis.

Vires.

*Pulmon.
maior.
Nomen
Forma.*

*Locus.
March. in
ca. 48. li. 4.
Vires.*

*Pulmo.
minor.
Li. 25. ca. 9.
Locus.*

PVLMONARIA Minor,

Dalechampij.

PVLMONARIA Gallorum.

sive Auricula muris maior, Tragi.



rundis, hirsutis, & subasperis: foliis per interualla ex caulibus exoritis, longis, mucronatis, senis aut septenis in singulis caulibus, nec ferè pluribus: flore in caulium vertice coaceruato, priusquam recludatur ex caeruleo rubente, cum apertus est prorsus purpureo, pulmonariæ simillimo. Alia est Pulmonaria Gallorum, quæ quanius eo nomine donata sit, propior tamen videtur in rubaceo generi, inquit Pena, flore luteo Hieracij, in parietibus & diruris musco obsitis, Lugduni & Montpelij, tenello cauliculo, intubaceo, palmari & sesqui palmari, gracili, & radice exiliore, betonice, nonnihil fibrata. Scribit Lobellius esse Auriculam maiorem Tragi. Eius tamen icon villos nullos repræsentat, quos habet pictura Tragi, qui tradit folia humi sparsa iacere, singula Auriculam muris alpini, seu leporis exprimere, pilosâ, & leuiter per ambitum incisâ.

CAUDA MVRIS,

CAP. LXI.

Nomina
Ded. liba.
cap. 6.
Pet. Pet. in
Aduer.
Forma.



Locus.
Tempus
Vires



RECENTIORIBVS perappositè *muodépos* vocatur hæc herba, Latine Cauda muris, Gallicè *Queue de souris*, Germanis *Tausent horn*. Humilis est herba, foliis angustis, gramineis, pollicem & sesqui pollicem altis, rigidis, gustu plantaginis: inter quæ è radice proueniunt cauliculi tenues, hofculis albicantibus, palmariibus, breui marcescentibus vestiti, qui in falcanum mucronem desinunt: teretem, oblongum, muris caudæ haud absimilem, in quo semina exigua, nigricantia. Pinguibus agris & pratis gaudet. Aprili mense flores: Maio semen maturum est. Refrigerat, nec multum à plantagine viribus differt. Gustu plantaginis esse scribit Pena, Lobellius legit gustu hydropiperis.

RVBIA



ΠΥΡΡΟΔΑΝΟΝ Græcè, quod etiam Erythrodanum & Rubia Latine, *Pauot* seu *al-sabagin* Arabicè, *Erythrodano*, & *Rubbia* Italicè, *Serberuet* Germanice, *Ruvia* Hispanicè, *Garance* Gallicè, Officinis Rubia incitorum. A rubore radicis quo lanæ & coria tinguntur: factum est

Nomina

RUBIA SATIVA.

Genera.

Forma.

Rubia silvestris.

Lib. 9. c. 3.



RUBIA, Silvestris.



illi Græcum Latinumque nomen. Dioscoridi & aliis duo sunt rubiæ genera. Vna sativa est, altera agrestis. Satiæ caules sunt quadranguli, longi, asperi, apertæ caulibus similes, sed per omnia maiores & robustiores, folia per intervalla in singulis geniculis stellarum modo in orbem circumiacentia: flores in caulium verticibus, ex pallido luteis: fructus rotundus per initia viridis, mox ruber, postea cum maturuit, niger: radix longa, tenuis, rubra. Agrestis illi similis est, sed minor, & minus aspera tota, folia minora, numerosiora, genicula crebriora stellarum ambientia: flosculi candicant. Sic Plinius etiam describit. Sunt etiamnum duo genera, non nisi sordido nota vulgo, quum quæstu multo polleant. Imprimis Rubia tingendis lanis & coriis necessaria. Laudatissima Italica, & maximè suburbana, etsi omnes penè provincias scateat ea. Sponsante provenit, seriturque similitudine ervilæ. Verum spinosus ei caulis, ac geniculatus est, sic enim legendum ex vetusto codice, quinis circa articulos in orbem foliis, semen eius rubrum est. Pingui fertilisq; solo seritur, multis regionibus, magni proventus & quæstus gratia. Silvestris ubique ferè provenit sponte in agris, & in sepibus. Floret verèque æstate, eiusque tum etiam radix effoditur. Rubiam minimam addit Lobelius, quam in rupibus Vincentij nõ procul Bristolio Angliæ enatam legit, foliis est Herniari; paribus mucronatis, positu rubiæ, cauliculis reipentibus, sesquiunciam altis, in quibus flosculi luteoli. Radix extilis rubræ, corallio concolor. Pinxit etiam Rubiam lævem Taurinensiu, cui Asperula ritu summis cauliculis, flores cædidi, stellati, verticillatim prodeunt. Folia quarerna decussatim posita, cacubalo Plinij paria, Solano tetraphyllo minora, in cauliculis sesquipedalibus, & bicubitalibus, ex intervalis geniculatis. Frequens hæc in Pedemontium collibus Taurino finitimis. Quot in medicina usus habet Rubia, tradit Dioscor. his verbis. Radix urinæ ciet, quamobrem morbo regio laborantibus, cum aqua mulsæ, auxiliatur. Itè ischiadicis, & resolutis. Ducit urinam multâ & crassam, nonnumquam etiam

Lib. 9. c. 45. Uves.

languinē, bibentes quidē quotidie lauari oportet, & extremētorum quæ redduntur differētiā spectare. Aduersus venenatorū morsus succū cum foliis bibere prodest. Semē ex oymelte potū, lienē absūmit. Apposita radix scetus, menses, & secūdas educit. Lib. 24. c. 21. Albas vitiligines ex aceto illita sanat. Plinius his multū lucis adfert de medico eiusdem vsū scribens. Alia res Erythrodanum, quam aliqui Ereuthodanum vocant nos Rubiam, qua ringuntur lanæ, pellēsque perficiuntur. In medicina vrinam ciet, regium morbum sanat ex aqua mulsā, & lichenas ex aceto illita, & ischiadicōs & paralyticōs, ita vt bibentes lauentur quotidie. Radix semēque trahunt menses,

*RUBIA Minima,
Lobelij.*

*RUBIA Lenu Taurinensium,
Lobelij.*



alium sistunt, & collectiones discutiunt. Contra serpentes rami cum foliis imponuntur. Folia & capillum inficiunt. Inuenio apud quosdam morbum regium sanari hoc frutice, etiā si adalligatus spectetur rātum. In hoc duntaxat Plinius à Dioscoride dissidet, quod contra serpentes ramos cum foliis imponi scrip sit. Dioscorides contra venenatorum morsus succum cum foliis bibi, vt videatur, in Dioscor. non legisse θερασδικὸν τε βοῦν τε ὁ γυλὸς μὲν τῶν φύλλων ποιεῖς, sed θερασδικὸν τε βοῦν τε γυλὸς μὲν τῶν φύλλων ἐπιτίθεις. Lib. 6. c. 60. Rubiz radix, inquit Galenus, acerbā est, & gustu amara. Itaque quæcumque agere dictæ sunt vbi eiusmodi coierint qualitates, ea omnia in hac radice luculenter conspicies: quippe cum & lienem & iecur expurger, & vrinās crassas, multāsque moueat. Quin & menses ciet, & mediocriter, quæ extersionem postulant, extergit, quare vitiligines albas, cum aceto illita iuuat. Sunt qui eam ischiadicis & resolutis, in potu cum melicrato exhibeant.

APARINE,

CAP. LXIII.

Nemina



ALDE affinis est erythrodano quæ ἀπαρὼν Græcis dicitur & φάειθρον, Gallis *Grateron*, Italis *Speronella*. Germanis *Klebkraut*. φάειθρον hominis amans, quod caulium foliorumq; asperitate prætereuntium vestes apprehendat, perinde ac si comitatis & humanitatis gratia retinere vellet. ἀμπαλὰς γρως ab umbilici similitudine, quam semē eius in medio caui refert.

cere plerique referunt, inquit Dodonæus: estur tamen à Gallinis & columbis, & hoc pastu oua pluta & citius excludere creduntur.

LINARIA, CAP. LXV.

Nomina
Pach. cap.
2. 6. hll.
Dodon. lib.
1. cap. 16.
Pet. Pen. lib.
Ada.

Forma.

Lab. 2. 4. 2.



OSTRIS, Linaria.



Locus.

Tempus.

Temper.

Uirus

Lib. 4. cap. 1.

Lib. 2. cap. 1.

Cor. Emb.

Lib. 4. cap. 1.

Lib. 8. sim.

Fuch. cap.

106.

LINARIA Officinis dicta, quod caule & foliis linum referat, à nonnullis Vtinalis, & Vtinaria, nominatur à vi diuretica, à qua etiā *ōsyrus* dicta. Vrina enim Græcis est *ōpōs*, *ōpōs* & *ōpōs* & *ōpōs* & *ōpōs* traho. quare cum linaria insigni facultate ducendi vinas prædita quemadmodum *Osyris*, eique figura maxime similis sit, minimè dubitandum est, quin illa vera sit Dioscoridis *Osyris*, quæ ut tradit Dioscorides, fruticulus est niger, tenuis habens viugas, ægè fragiles, in quibus foliola terna quaternave, aut quina, aut sena, ceu lini, nigra initio, deinde mutato colore, sub rubescentia. Plinius Dioscoridi nō omnino consentit, hæc de eadem scribens. *Osyris* ramulos fert nigros, tenues, lentos, & in his folia nigra ceu lini, semenq; in tamulis nigrum initio, deinde colore mutato, rubescens. Hic semini coloris mutationem tribuit Plinius, Dioscorides folius, de semine nullum verbum facit. Quæ si diligenter us expendas, nullam delineationis *Osytidis* notam in *Linaria* desiderabis. *Linaria* enim cauliculis fruticat tenuibus, lentis, nigricantibus, in quibus folia numerosa, longiuscula, & angusta lini facie, siue *Efulam* minorem adeo aptè referētia, ut herbarij isto versiculo utramque distinxerint alioqui valde affines,

Efula lactescit, sine lacte Linaria crescit.

Flotes in summis caulibus elegantes, lutei, à fronte latiusculi clausi, os rana imitantes, cauda angusta & inflexa. ut in *consolida* regali: semen quoque in siliquulis rotundis, inclusum nigricat tantisper dum maturefcit, postquam maturuent, rubescit, senescentes quoque ramuli nigrorem in ruborē vertunt. Passim locis incultis, circa sepes,

& in agrorum marginibus. Floret potissimum Iunio & Augusto mensibus. Amara est: quare qualida, vim inesse vinas mouendi scribunt herbarij, & stranguriæ remedium, quibus facultatibus prædictam esse *Osytidem* veteres testantur. Decoctum enim eius potum, inquit Dioscorides, morbo regio laborantibus auxiliatur. Plinius *Smegmata* mulieribus faciunt ex his radicum decoctum potum sanat arquatos. Exdem, priusquam maturifcar semen, concisæ, & sole siccata, aluum sistunt, post maturitatem verò collectæ, & in sorbitione decoctæ, rheumatismis ventris medentur, & per se trix ex aqua celesti, bibuntur. Dioscorides radicem non meminit, quibus tum alia tum illud attribuit, quod Dioscor. toti frutici. Sed & *smegmata* mulieribus fieri ex ramulis Dioscorides prorsus omisit. *Osytidi* herbæ, inquit Galen. ex qua fiunt & *coremata*, amara inest qualitas, & obstructions impediendi facultas, quare & in icore consistentes adiuuat obstructions. Quæ autem hic Galenus, & cum secuti Paulus & Aetius *κορηματίζα* vocant, alij *scopas* interpretantur, à verbo *κορῆν*, quod cum non solum verrete significet, sed etiam *κορῆν* & *καλλισκορῆν*, id est, ornare siue purgate & venustare, alij *κορηματίζα* intelligunt *κορηματίζα* Suida & Phavorino auctoribus, id est,

QVÆ IN VMBROSIS NASCVNTVR, LIB. XI.
 id est, comptoria, & venustantia faciē medicamenta, ē quorum sanē numero Osy-
 ris est, quæ cum amara sit, extergere etiam, faciei potissimum maculas potest, vt illi
 antiqui dixerint, quæ Plinius sinegmata dixit. Ex eo autem quod ex Osyride scoparia
 id est, scopas heri illi scripserint, colligunt nonnulli reiecta Linaria veram Osy-
 LINARIA Magna, Belueder.



LINARIA Valentina,
 Clusij.



SCOPARIA, Belueder.



ridem Italorum esse Beluedere, quod ad veren- Forma
 dum sit aptior, quod foliis crescat lini similibus
 amplioribus numerosioribus: caule singulari, an-
 guloso, cubito maiore, furculis plutinis fructi-
 cante: flore exiguo, rubro, semine minurulo,
 rotundo, ē cinereo nigrescente: radicibus nu-
 merosis, densis, capillaceis, nigricantibus. Qui
 formosarum plantarum aspectu delectantur,
 hanc ferunt, & adultam alunt in ædiū fenestris,
 densa eius coma umbram captaentes, & nitido
 virore oculos recreantes, ob foliorum venusta-
 tem Itali Beluedere nominarunt. In aridis po-
 tius quàm pinguibus luxuriat, tamē voluptatis
 gratia pridem coli cepit etiam in hortis nostris.
 Seritur & à multis ad scopas ex ea cōficiendas,
 vnde Scoparia à quibusdā nominata est. Quod
 si eam propius inspicias, videbis folia esse lon-
 giora quàm Linariæ, numerosiora, non amara,
 qualem tamē Galenus & Paulus voluerunt esse
 Osyridem, nec ioticis ac hydropicis perutilē,
 vt est Linaria. Quod si ex Osyride scoparia id
 est, scopas fieri voluit Galenus, non protinus
 hæc scopis accommodatissima, Osyris fuerit,
 cum

Peristereon prior est Dioscoridis, quæ vnico tantum caule, & vnica radice constat: nusquam se vidisse ingenue fatetur, quæ notis omnibus legitimam referat, etsi nō desineat qui eam esse velint quam inter sideritidas primo loco depinxit. At quum hæc ab vna radice plures edat caules, etiam sesquicubitales, folia haud subalbican-

VERBENACA *vulgaris*
Math.



VERBENACA *Recta*
sive mas, Fuchsij.



tia, flores in caule verticillatim prodeuntes venacis simile, eorum sententiæ minimè subseribit. Idem ait à se obseruasse is in locis quæ Verbenacæ plurimum sunt feraces, quasdam plantas, quæ caules rectos edere, quasdam humi serè procumbere, vt hinc fortasse differentiam sumperint ij, qui Verbenacam in rectâ & supinam diuiserunt, Plinio quoque his suffragante, qui à quibusdam hanc non distingui, vnumque omnino genus esse scripsit, quoniam vtræque eodem effectus habeat, Id quod est à Dioscoridis sententia alienissimum, qui alteram ab altera figura, natalibus, nomenclatura, facultatibus distinxit, vt faciliè perspiciet qui vtriusque historiam diligentius expendit, his verbis explicatam. Peristereon siue Verbenaca nascitur in aquosis locis. Ex eo nominata esse videtur, quod columbæ in ea libenter versentur. Herba est palmi altitudine, aut etiam maior: folia incisa sub albida è caule prodeunt: singularem plerumque ramo, ac radice reperitur. Sacra herba quam peristereona vocant, virgas emittit cubitales aut etiam maiores, angulosas, circa quas folia sunt ex intervallis, similia quernis, sed angustiora & minora, per ambitum incisa, subglauca, radicem habet oblongam, tenuem: flores purpureos, tenues. Hæc igitur ramulos multos producit, cubitales aut maiores, folia subglauca. Illi dodrantalis est & vnus è singulari radice caulis, folia *tridactyla*, natales aquatici. Iam verò si vires ab auctoribus tradidas perscruteris, eas diuersas esse comperies. Peristereonis folia cum rosaceo aut adipe suillo recenti imposita, inquit Dioscorides, vteri dolorem eximant. Herba cum aceto imposita erysipelata reprimat, putredines coerces, vulnera glutinat, & vetera cum melle ad cicatricem perducit. Hæc autem efficere siccando & adstringendo auctor est Galenus, scribens, peristereona vim habere adeò desiccantem, vt vulnera glutinet, assentiente etiam Paulo his verbis. Peristereon adeò desiccatur & adstringit, vt vulnera glutinet, & sanguinis profluvium sistat. At communis Verbenacæ siue Sacræ herbæ folia, & radix pota cum vino, aduersus ser-

Diosc. lib. 4.
cap. 11.
Locus.
Forma.

Diosc. lib. 4.
cap. 6.

Vires.
Temper.
Lib. 4. cap. 11.

Lib. 2. sum.

Lib. 7.

pentes valent. Eadem drachmæ pondere cum thuris obolis tribus in vini veteris, hemina quadragenis diebus ieiunis bibuntur, contra regium morbum. Veteres tumores & inflammationes imposita mitigant, & sordida ulcera purgant. Tota in vino decocta, tonsillarum crustas abrumpit: oris nomas gargarisatu sistit. Aiunt si aqua spargatur tricinium qua maduerit, lætiores compotiores fieri. Datur in tertiana bibendum tertium à terra geniculum cum circumpositis foliis, in quartana quartum. Hæc igitur Verbenaca siue sacra herba non modo ædemata antiqua & tumores non sistit, vt illa, & mitigat, sed & tonsillarum crustas abrumpit & exsiccat, nimirum calfaciente vi, qua etiam capitis dolores chronicos discutere ex frigiditate & crassis humoribus tradidit Galenus, his verbis. Omnium verò longe maximè discutit, & perfectè corroborat, Verbenaca recta, maximè viridis, imò & arida cum radicibus, & simul cum serpillio oleo incocta. Coniicienda etiam ad ea crocodiliadis, maximè iuxta aquas nascentis radix. Quin & ipsam per se Verbenacam si oleo incoxeris, oleoque inde rigaueris, omni capitis dolori antiquo, ex frigiditate aut ex crassis humoribus oborto mede-

Lib. 1. cap. 1.
p. 10. l. 10.

HERBA SACRA Quorundam,
Dalechampi.



VERBENACA Recta,
Dodonæi.



Sacra her-
ba alia.

Forma.

ris. Herbarij quidam pro Sacra herba aliam exhibent, quæ in nemoribus & siluis prouenit, radice tenui, longa, multifida: caulibus ternis, aut quaternis, angulosis: foliis per intervalla vtrinque æqualiter dispositis, quercui similibus, minoribus, pariter incisfis, ex quorum alis pediculi nonnumquam exeunt terna gerentes folia minora: flos ruber, candicans, ad tres vel quatuor superiores foliorum sinus, emicat ex calice virente oblongior, amœnus, Lamij lutei, semen in oblongo loculo affixum, vt in Ormino. Hanc pro Melissophyllo Fuchsi Lobellius pinxit, sed fallitur, opinor, nam Fuchsius pro Melissophyllo ostendit Calamintham monatanam præstantiorem eiusdem Lobellij, quemadmodum in Libro de Odoratis cap. De Melissa monuimus. Verbenaca recta Dodonæi caule est recto, pedali &

Lib. 1. cap. 1.

Forma.

maiore, ramulis multis fruticante, in quibus flosculi cærulei: folia viridantia, crenata,

crenata, & quadrantenus incisa: radix brevis, multum fibrata. Ea videtur esse Verbenaca supina siue fœmina à Fuchſio depicta. Verbenaca supina mas & Hierobotane eiusdem Dodonæi cauliculos fert teneros, hirsutos, angulosos, humi repentes, pedem longos, atque eo longiores: folia quadrantenus rotunda, in am-

Cap. 219.

Sacra her.

mas Dod.

Forma.

HIERABOTANE Mas,
Dodonæi.



HIERABOTANE Fœmina,
Dodonæi.



VERBENACA Supina &
tenuifolia, Clusij.



bitu crenata, quercus aut chamædryos foliis similia, his maiora, illis minora: flores elegantes, cæruleos in ramulis: folliculos latiusculos, radicem fibratam. Fuchſius hanc nomine chamædryos vulgaris fœminæ depinxit. Altera Dodonæi Verbenaca supina, siue Hierobotane fœmina, superiorem valde refert cauliculis, foliis, floribus, sed huius cauliculi rotundiores, folia paulò minora, ramuli plures ex vna radice, flores magis coaceruati. Fuchſius pro chamædry vulgaris mare depinxit. Clusio alia est ipsa βοτάνη id est, Sacra herba, & ~~verbenaca~~ ~~supina~~ ~~id est~~, Verbenaca supina, cui quaterni aut quini sunt cauliculi, angulosi siue quadranguli, uti in vulgari Verbenaca, tenuiores tamen, supini & in terram procumbentes: folia vulgari colore similia, & ex viridi cæſia, sed magis incisa & multifida: flos in summis virgis vulgari similis ex cæruleo purpureus, minor tamen: semen idem: radix tenuis & vulgari similis. Agro Salerniticensi frequens, & quibusdam aliis Castellæ locis, ubi minor & exsueca: & decliuibz fluminumque ripis,

Cap. 219.

Sacra her.

fœmina

Dodonæi.

Forma.

ibidem.

Lib. 2. flor.

Hilpæ c. 45

præsertim verè ad flumen Thormini quod Salmanticam, & Albam vrbes alluit, ubi maior & vegetior. Florebat istic Iulio & Augusto: deinde semen ferebat. Eadem est cum vulgari, temperamenti, quare ad eadem vtilis, & aliquanto forte efficacior.

CIRCEA.

CAP. LXVIII.

Nomen

Cena in
Ad.Lib. cap.
Forma.

IPKATA & *Σιπογία* Græcis, Circea & Direxa Latinis dicitur.

Circea fortallè quadam cum mandragora virium similitudine: nam mandragoras Circea nominata fuit, & forsàn veriusque ad amatoria vsus, id quod de mandragora Dioscorides scripsit. Circea, inquit idem, tona habet hortensii solano similia, propagines multas, flores nigros, mul-

CIRCEA, Dalech.

Locut.

Lib. - ex.

Cena in
Ad.

Vires.

Lib. 3. cap. 17.

Lib. 3. cap. 8.

Lib. 3.

Lib. 3. sum.

tos, semen inlij specie, in quibusdam veluti corniculis, radices dodrantes tres aut quatuor, albas, odoratas, exalfacientes. Nascitur in quibusdam pettosus locis, apticis, & perflatis. Eadem ferè Plinius tradit, Circea strychno satiuo similis est, flore nigro, pusillo, paruo semine vt inlij, nascente in quibusdam corniculis, radice semipedali, triplici ferme aut quadruplici, alba, odorata, gustus calidi. Hæc Plinius, qui radices gustas calidi dixit, quas Dioscorides *Σιπογίας*, id est, calfaciendi vi præditas. Quænam verò hanc Dioscoridis Circæam referat non parum ambigunt herbarij. Sunt & ij quidem perdocti, qui hic depictam pro Circea proponunt, quæ in perflatis & asperis gignitur, radice dodranti, candida, odorata, niueas & molliusculas propagines quotannis mittente, ex tuberculis quibusdam exeuntes: caule cubitali, folio solani maiore, acutiore: crebris agnatis: flore exiguo, copioso, priusquam pandatur nigro, cum apertus fuerit è rubro candicante: semine pusillo in corniculis oblongis, hirsutis. Alij Circæam esse putant quod salanum lignosum à quibusdam herbarijs dicitur, & Dulcamara, & Amara dulcis,

Germanis *Gelenge ioleber*, de quo alio in loco. Circææ radix minarum quatuor pondere tusa, inquit Dioscorides, & diem & noctem macerata in vini dulcis heminis sex, & triduum pota vterum expurgat. Semen in sorbitionibus sumptum, lac attrahit. Plinius. Diluic in vino, bibiturque ad dolorem vulvæ, & vitia. Macerati opottet in sextariis tribus quadrantem radice tusa, per noctem & diem. Detrahit eadem potio & secundas. Semine lac minuitur in vino, aut mulsâ aqua potio. Sed in hoc is à Dioscoride dissentit, quod quadrantem radice tusa macerati iubet, Dioscorides quatuor minarum pondus, quod fortallè etiam aquo maius est. Quod vero semen lac minuere dixit, planè contrarium est ei quod Dioscorides habet. *γὰρ καὶ τὸ σπῆ*, lac attrahit, hoc est *γὰρ καὶ γυνῆ* vt Paulus ait. Et Galenus ex Dioscoride scribit semen Circææ in sorbitione exhibitum ad lactis generationem conducere. Quidam Plinij locum hunc sic legunt, semine lac mouet, vino aut mulsâ aqua pota.

HERBA

HERBA MORA,

CAP. LXIX.



H TALIS plantam istam herbam moram *Forma.*
vocant, quæ secus vias nascitur, folio
absinthij, tenuiore, nigriore: flore in
summis ramis & caulibus exiguo, luteo,
copioso, tolia trita & imposta viceribus quæ veteratis *Vires.*
mirificè mederi aiunt.

CHAMAEROPS, CAP. LXX.

CHAMAEROPS hæc videtur esse, quæ in *Forma.*
siluosis gignitur, radice crassa & multi-
plici, caulibus multis & cubitalibus, fo-
liis myrti circa caulem geminis: flore
copioso, & foliorum sinibus nascente, semine in
oblongis vasculis. Eisdem effectus latetis dolori-
bus habet Chamærops, inquit Plinius myrtos circa *Lib. 6. c. 7.*
caulem geminis foliis, capitulis Græculæ rosæ ex vi-
no pota.

ANTIRRHINUM, CAP. LXXI.

CHAMAEROPS,
Plinij.



ANTIRRHINUM & *Antirrhinon*, Græcis, Theophras-
to etiam *Antirrhinon*, nisi locus mendosus
sit, Latinis similiter Antirrhinum, Cy-
nocephalis Apuleij, Germanis *Orant*,
Gallis *Mouron violet*, cuius insignis nota, nempe na-
rium vituli similitudo quam semen refert, fecit ut
hæc herba innotuerit. Sed cum aliquot sint plantæ *Genera.*
quarum semina aut potius caliculi seu capitula qui-
bus semina includuntur, vitulinam faciem aut quid
simile exprimant, herbarij diuersa fecerunt antirrhina.
Matthiolas scribit se quatuor obseruasse antirrhini
genera, quibus omnibus capita nascuntur, quæ se-
men minutum continent, vitulinis admodum simili-
lia, quæ non nisi magnitudine differunt. Dodonæus
duo, vnum maius alterum minus. Et sine varia est
apud veteres antirrhini historia. Theophrastus apa-
rinæ simile facit, Dioscorides anagallidi, quædam
eius exemplaria lychnidi, vnde lychnis siluestris nun-
cupetur, Plinius lino, nisi mendosi sint codices.
Antirrhinum, inquit Dioscorides, alij anarrhinum,
quidam lychnida siluestrem vocant. Herba est caule
& foliis anagallidi similis, flores sunt purpurei, simi-
les leucoio, minores tamè, ideoque siluestris lychnis
lib. 24 c. 10
lib. 4.
lib. 2. c. 17.
lib. 9. hist.
cap. 11
lib. 4. c. 118
lib. 7. c. 21.
lib. 34. c. 10.

nominata est, semen fert vituli naribus simile, russeum aspectu. Græca enim exem-
plaria habent *pluon id est*, quod ab interpretibus omnibus omisum fuit. Est autem
pluon idem quod russeum & russum Latina voce Græcis vsurpata. Sic Paulus an-
gallidum *pluon id est* *pluon* dixit. Plinius, Antirrhinum vocatur siue anarrhinum, *lib. 34. c. 10.*

ANTIRRHINUM,

Marth.

Lib. 9. hist.
cap. 1.Antirrh.
marth. ed.
lib. 9. c. 17.

Forma.



sive lychnis agria, similis lino, radice nulla, flore hyacinthi, semine vituli narium. Ex hoc perunctos venustiores fieri, nec villo malo medicamento ledi posse, aut veneno, si quis in brachiali habeat, arbitrantur magi. Similiter ea quam Eupleam vocant, traduntque ea perunctos commendationis esse sanæ. Theophrastus, *ἑυκλέαν γὰρ φασὶν ἀεὶ ποθεῖν ὁ ἀνθρώπος καὶ ἀλκυονας, τοῦτο δὲ ἔστιν ἐν τῷ ἀπαραίτητῳ δὲ ἔχει ὕψος, ὃ δὲ χαρπὲς ὡς πρὸς μόχθον ῥίπας ἔχει. τὴν δὲ ἀντιρρὴν ἀλκυονας ἐν δόξῃ.* Id est, Aiuur Antirrhinum gloriam perpetuo parere, id aparinx simile est, radicem non haber: semen vituli narium simile, eo perunctos gloriam consequi. Qui locus a Plinio conuersus est, & corruptus, quoniam mendose Euplea pro Euclea legitur, & *ἑυκλέαν* non herbam facit Theophrastus, sed Antirrhinum ad *ἑυκλέαν* conducere ait, & eo perunctos *ἑυκλέαν*, Dioscorides *ἑπικρατεῖ ποθεῖν*, quod Plinius dixit venustiores fieri. Antirrhinum magnum Dodon. cauliculos fert rectos, rotundos, ramosos, folia nigricantia, longiuscula & latiuscula, à foliis anagallidis non multum distantia,

bina semper ex aduerso vt in Anagallide. Circa summos ramulos flores spectantur longiusculi, & patte anteriore lari oris, ramæ figura, linariæ floribus non multum dissimiles, sed maiores, & pediculos carentes, in pallido lutei, quibus suboriuntur calices longi & rotundi, caput, oculos, nares, denique hiarum oris vitulini expri-

ANTIRRHINIMA II.

Marth.



ANTIRRHINUM III.

Marth.



mentes,



mentes, quibus semen concluditur. Est & aliud magnum Antirrhinum, foliis longis & angustis, osyridis ferè similibus, floribus roseis, aliquando candidis, cetera precedenti simile. Antirrhinum parvum eiusdem, caput simiae quorundam,

ANTIRRHINUM
parvum, Dod. sive Oronitium.

Antirrh.
parvum,
Dod. ibid.
Forma.



cauliculus habet tenuis, teneros, non ita ramosos: folia longa, angusta: inter haec & cauliculus flosculi oriuntur rubri, superioris similes, multo tamen minores, deinde capitula rotunda, membranacea, vituli aut simiae caluarie prorsus similia, quae semen continent. Quartum est Antirrhinum Matthioli. Istud Archigenis *ὀφθίλιον* esse multis creditur, cuius meminit Galenus, pharmaca recensens ab Archigene ad ictericos conscripta. Herbam oronitium, inquit, coquito, & cum decocto lauato, & decoctum confestim viride reddes. Qui locus Cornario diu suspectus fuit, donec tandem in eam opinionem venerit, oronitium herbam nullam aliam esse quam origanum, & fortasse etiam *ὀφθίλιον* pro *ὀφθίλιον* esse legendum. Antirrhinum utrumque in cultis & incultis nascitur, colitur etiam in hortis. Magnum Iulio & Augusto mensibus, parvum Iulio floret. Narrant id appensum, inquit Dioscorides, veneficis aduersari. Galenus similis esse cum hubonio fa cultaris scribit. Auctor est Matthiolus illius Antirrhini folia, flores etiam & semen cura

Lib. 9. ph.
local. ca. 9.

In cōmen.

Locus.

Tempus.

Vires.

Lib. 4. p. 113.

Lib. 9. compl.

Lib. 9. p. 113.

rosaceo & melle ad vteri præfocationes, & mensium difficultates. Herbam scor-
pionibus adeo contrariam esse, ut illico ea visa torrescant, eandem fronti alliga-
tam præstare ad delendas oculorum albugines. Tragus pro Antrirrhino Resedæ
speciem depinxit & descripsit, his verbis. Id in cultis, arvis, limitibus agrorum, &

ANTIRRHINUM,

Tragi.



Temper.

esse temperaturæ iudicat Tragus. Quidam herbarij herbam istam phyteuma
esse volunt.

LEONTOPODIUM,

[CAP. LXXII.]

Nomina



LEONTOΠΟΔΙΟΝ Græcis, similiter Latinis *Leontopodium*
dicitur, & *pes Leoninus*, propter villosam foliorum & florum effigiem:
crus pedi annexum aliquatenus referentem, & *χένυος*, Cemos ut in-
ter Dioscoridis supposititia habetur. Sic autem videtur appellari au-

In Coroll.
Tab. 4.

Lib. 4. Cap. 106.

Forma.

Tab. 45.

Lib. 3. Cap. 107.

ctore Hermolao, ex floris siue calicis figura, quoniam pyxidula Athenis ita nomi-
nabatur, per quam suffragia in subiectum vasculum quod cadiscum vocabant, de-
mitti consueverant. Duum digitorum herbula est, inquit Dioscorides, folia ferens
angusta, longitudine ternum quaternumve digitorum, hirsuta, ad radicem lano-
siora, & subalbida. In summis caulibus capitula sunt velut perforata, in quibus
flores nigri: semen autem eius vix conspici potest ob circumfusam ipsi lanuginem:
radix subest parua. *Leontopodium* istud non est herba quæ vulgo herbariorum
Pes Leonis, *Planta* & *Pata Leonis*, *Alchimilla* & *stellaria* dicitur, sed auctore
Lonicerò quæ hic depicta est, quam Ruellius, inquit, vulgo cruciatam vocari pu-
tat, diuersam tamen ab ea cruciata de qua diximus. Humi dicit eam serpere, digi-
tali longitudine, folio angusto, longo ternos ferè digitos, hirsuto, ab radice lanoso,
& canescēte in cauliculorum cacuminibus capitula tanquā pertusa, in quibus floscu-
li dehiscūt nigricantes: semen spissā occultitur lanugine, vix conspici queat, ra-
dice exili. Aliud *Leontopodii* exhibuit Marth. herbula duum ternumve digito-
rum, fo-

LEONTOPODIUM

Loniceri.



rum, foliis angustis, hirsutis, aversa parte canescentibus, iis præsertim quæ circa radicem sunt: capitulis in summo caule quasi foraminibus distinctis, floribus nigricantibus, semine densa, lanugine obuoluto. Ex Baldo monte misit Calzolarius. Idem opinor pinxit Lobellius, nonnihil tamen diuersum videtur, qui paruum Leontopodium adiecit, effigie totòq; habitu superiori simile, singulari dodratali cauliculo, & folio Gnaphalij montani, densa lanugine incauis: flosculis summo caule in luteo pallentibus, Gnaphalij montani, exili ligneaq; radice. Hæc Lobellius. Aiunt hanc ad amatoria philtrea commodam esse, *Vms.* inquit Dioscorides. Eam ob causam Cemos Plinij Leontopodium Dioscoridis esse creditur à doctis: sic enim ille. Eadem ex causa & Cemos silebitur nobis. Dixerat autem antea catanancem deferri superuacuum esse, quum sit eius vsus ad amatoria tantum. Eadem fortasse de causa neque Galenus, neque posteriores eius meminerunt. Affirmat Marcellus Vergilius vidisse se antiquissimos & optimos Græcorum Codices, in quibus nō Leontopodium, sed Camos huius capituli titulus erat. Et habere se vetustissimū Longobardis literis scriptum Latinum Dioscoridem, in quo pariter non Leontopodium, sed Camos est, eadem vniuersa prorsus historia. Sola in Græcis & Latinis tituli capituli, & plantæ appellationis diuersitas est, magno argumento non

Lib. 37. ca. 1.

LEONTOPODIUM,

Matthioli.



LEONTOPODIUM

paruum, Lobel.



differe

PSEUDOLEONTO-

podium, Matthioli.

Lil. 6. ca. 8.

Ibid. ca. 14.

Ibid. ca. 11.



differre Leontopodium à Camo, nisi sola appellatione. Ac vt idem sit Cemos Plinij & Leontopodium Dioscoridis, certè Leontopodium huius ab illius Leontopodio plurimum distat. Sic enim scribit Plinius. Leontopodium alij Leuceoron, alij Doripetron, alij Thoryberton vocant. Cuius radix aluum sistit, purgatque bilem in aquam mullam, addito pondere denariorum duum. Nascitur in campestri & gracili solo. Semen eius potum lymphatica somnia facere dicitur. Et rursus. Leontopodij semen tritum in aqua, & cum polenta illitum, spicula sagittarum extrahit. Et alio in loco. Omnia corpori infixa extrahunt, folia tussilaginis, daucum, semen Leontopodij tritum in aqua cum polenta. A superioribus differt planta quam ex Matthiolo hic exhibemus, passim in Bohemia proueniens, quæ etsi longiore sit caule, omnes tamen Leontopodij notas habet, inquit Matthiolus. Ideo Pseudoleontopodium appellat. Lobellio est Chrysocome Germanica, Heliochrysos siluestris Trago.

CHAMAEMELVM SILVESTRE, CAP. LXXIII.

Nomina



NOEMIS vulgaris siue siluestris, & χαμαίμελον vulgare siue siluestre dicitur ab herbariis, vt discernatur ab Anthemide vera & quæ scribitur in hortis. Vulgo & Officinis Camomilla, Gallis Camomille, vulgare, Germanis Chamull & Chamullen. Eius genera aliquot ab herbariis

Genera.

CHAMAEMELVM Silvestre, Math. siue Anthemis.

Lib. 2. cap.

Forma.



Cocula ferida.

Nomina

Forma.

obseruata sunt, quorum tria hic ponemus ex Dodon. Primum Chamæmelum vulgare siue siluestre albū, cauliculis tenuibus, duris, lentis, foliolis teneris, minutum incisus: floribus in singulorum summis, luteis in medio, foris foliolis candidis in orbem adiacentibus, veri hortensis Chamæmeli leucanthemi prorsus similibus, odoris iucundi, non tamen adeo suauiter, neque adeo vehementer fragrantis atque in horrensi Chamæmelo. Secundum genus est quæ hodie herbariis & Officinis Corula foetida nominatur, Thuscis Cauta, vnde diminutivum Cautula, tandem corrupta voce Cocula, foetida autem à graui eius odore, quibusdam Camomilla foetida, & Græcè καυδομήτης, & χαυδομήτης, id est, Camomilla canina, Germanis Krottendill. Cauliculis est crassioribus & viridioribus quam Chamæmeli vulgaris: floribus illi valde similibus, nisi quod media depressiora sunt & latiora. Tota herba insuauiter ingratoque odore, gustu amaricante. Hanc partheniū esse

CHAMAEMELVM

Silueſtre, Dodon.



eſſe Leptophyllum doctiores cenſent, cuius meminit Hippocrates, & de præputio puſtulas thymuræ deducere ſcribit. Tertium genus Cotula non fœtida vocatur, & Camomilla fatua, & Camomilla ſeu Cotula inodora, cauliculis gracilibus, teneris, lentis, multis ex vna radice prodeuntibus: foliis longioribus, maioribus, & candidioribus quam chamæmeli vulgaris, inodoriſ: radice craſſa, multum fibrata, quæ hyeme non deperit, ſed quotannis regerminat. Hanc pro buphthalmo depinxit ac deſcripſit Fuchſius. Hæc tria genera in agris luxuriant, iuxta feminas, & in hortorum ſepibus. Iunio menſe totaque æſtate florent. Chamæmelum vulgare ad calidum & humidum vergit, & à chamæmeli veri temperamento parum differt. Cotulam fœtidam calidam ſiccâque eſſe, odor ſiporque demonſtrant. Cotula inodora moderatè calida eſt, & ad chamæmeli vulgaris temperaturam quadamtenus accedit. Quæuadmodum autem chamæmelum vulgare temperie, ita facultatibus & viribus ſimile eſt, niſi quod illius imbecilliores ſunt, nec adeo efficaciæ.

Lib. de Vl-
cerib.
Cotula nū
fecunda
Nomina
Forma.

Cap. 42.
huſor.
Locus.
Tempus.
Temper.

Experientia tamen docuit aduerſus colicum dolorem, & renum calculum plurimum valere, lorium ciere, eodem modo quo chamæmelum hortenſe uſurpatur. Quod ex eo oleum conficitur, dolores omnes, attrita, contractiones, duntias ſanat, non aliter quàm oleum ex chamæmelo hortēſi paratum, cōque vtilius

COTULA Fatida,

Dodonæi.



COTULA Non fatida,

Buphthalmum Fuchſij.



febric

febricitantium enematis immiscetur. Cotula fetida vtero prolapsa, aut in alteram partem conuerso mirè succurrit, si eius decocto ægrotæ pedes lauentur: item vteri præfocationi si aut edenda, aut odoranda præbeatur, in hoc muliebri malo castorij viribus proxima.

CEPÆA,

CAP. LXXIIII.

Nomen
Lib. 3. c. 10.
Forma.
Vires.

Lib. 3. c. 2.

Embl. 19.
lib. 3.

Lib. 5. c. 22.



CEPÆA, Mattholi.



nera, carnosa, succo prægnantia. Radix exilis. In Belgij viretis luxuriat, Patavio delata. Hæc Lobellius.

ASTRAGALVS,

CAP. LXXV.

Lib. 4. c. 17.
Forma.

Locus.

Vires.

Lib. 5. c. 11.



ΣΤΡΑΓΑΛΟΣ Latine etiā Astragalus: parvus est, inquit Dioscorides à terra frutex, foliis & ramis ciceri similis: flores sunt purpurei, parui, radix rotunda, raphani modo grandis, propagines habens solidas, nigras, duras veluti cornua, inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in locis ventosis, vmbrosis & niuosis: multa in Phæneo Arcadiæ, (ita legunt Galenus, Paulus, Orisbasius, Plinius, vr corrupta sint Dioscoridis exemplaria, in quibus pro in quædam legitur in iuxta quædam) Radix in vino pota aluum sistit, vrinam mouet: facit & ad vetera vlcera, arida inspersa: sanguinem suppressit. Difficile tunditur propter soliditatem. Hæc Dioscorides. Galeno frutex est parvus, radices habens adstrictioras: quàm obrem etiam ex numero est non instrenuè desiccantium: vlcera vetera glutinat, aluum fluidam sistit, si quis in vino decoctam radicem bibat. Plurimus huius prouentus est in Phæneo Arcadiæ. Eadem Paulus & Orisbasius

& Orbasius habent, Galenum secuti. Plinius aliter quidem describit, sed eandem vires attribuit his verbis. Astragalus folia habet longa, incisuris multis, obliquis circa radicem: caules tres aut quatuor plenos: florem hyacinthi, radices villosas, implicatas, rubras, præduras. Nascur in petrosis apricis, & iisdem niualibus, sicut Phæneo Arcadiz. Vis ei ad spissanda corpora: alnum sistit radix in vino pota, quo fit ut moueat vrinam reperensso liquore, sicut pleraq; quæ aluum sistunt: sanat & dysentericos in vino rubro tusa. Difficile autem tunditur. Eadem gingiuarum suppurationi vtilissima est: totum colligitur exitu Autumni, cum folia amiserit. Siccatur in umbra. Pro Astragalo plantam hic appictam Marthiolus olim propoluit, quæ frequens nascitur in agro Tridentino, in vallis

ASTRAGALVS

Marthioli.



Ananiz montibus, folio ciceris maiore, floribus purpureis, radice raphani æmula, adnaris appendicibus firmis, nigris, præduris, inter sese implicatis, & gustu adstringentibus. In vltimis verò editionibus planta diligentius inspecta, cum quædam in ea desiderari perspexisset, quæ Astragali sunt propria, sententiam retractauit. Herbarij quidam Astragalum purpureum esse statuunt hic expressum, qui in lux montis saxosis collibus provenit, radice grâdi, crassa, nigra, lignosa, longa, furculosa: caulibus multis, lanuginosis, humi repentibus: foliis ciceris siluestris, in vno pediculo multis ordine collocatis, villosis, gustu adstringentibus: flore ex albo purpureascente, velut in capitulis coacervato: semine in siliquis. Pena Astragali descriptionem, nisi apud Dioscoridem corrupta foret, videri ait aptissime quadrare ei plantæ quam Germani *Aker*, *Rychel*, & *Grund rychel*, id est, Balanum terrestrem vocant, Galli *Gland de terre*, Sequani *Des Tarnotes*. Spargit humi tres quatuorve ramulos in imo rubellos, ciceris aut pisi folio & clauiculis donatos, quibus, si adsint, proximas quasque plantas amplectitur: flores item purpurei pisi sunt, & in siliquis paruis exiguum semen: radices verò oblongæ, oliuarum vel glandium instar, foris nigris, intus albidæ, multis quasi traiectæ vel appensæ veluti funiculis, varix inuicem implexis, & larè fuscis. Germaniæ, Angliæ, Normaniz siluosis opacis iuxta sepes, Narbonæ, Italiæ, cæterisque æstuosis regionibus, non nisi in arduis & niuosis eruitur. Sapor illis subdulcis, glandis, aut castanæ adstringens. Siccata multum durefcunt. Hanc in libro de Bulbosis pinximus ex Dodonæo Chamæbalani nomine. Primû Dioscoridis descriptionem

In cap. 17. lib. 4.

Astragalus purpur.

Forma.

ASTRAGALVS

Purpureus.



Y Y y

LXXV. 5. 177.
Hisp. c. 86.

vitiolam esse diximus, qua in memphi Atcadix pro in Phæneo nasci dicitur. Deinde Plinius paulum diuersam descriptionem tradit. Adhuc Galenus & Paulus scripserunt Astragalum paruum esse fruticem *ἰχθυόεισ τὰς ρίζας* adstringentes, quasi plates, nec raphani meminerunt. Quare ubi in Dioscoride habetur *ἰχθυόεισ* *ἀντὶ τῶν ὀφθαλμῶν*, legendum fortasse *ἀντὶ τῶν ὀφθαλμῶν*, id est velut glans. Clusius plantam altam elegantem & à nemine fortasse ex recentioribus cognitam depinxit, quam si facultates non refragarentur, legitimum Astragalum esse censeret, quod eius descriptioni plurimis notis conueniat. Cubitales & ampliores sunt illi caules, minimi ferè digiti crassitudine, pentagoni siue angulosi, duri, subrubentes, & lanuginosi: folia lanuginosa & incana, in longa costa ex aduerso semper inter se opposita, uti in vicia & cicete, gustu primum adstringente, deinde feruido: flores copiosi, lupini aut fabæ, secundum obliquos pediculos ex alarum sinu prodeuntes, ordine digesti, albi omnino, sed antequam aperiantur, ex luteo foris nigricantes. Fructum terre dicitur in siliquis faselo minori Dodonzi similem, qui gustatus fauces, os, & linguam inflammatione torqueat: radix pro stirpis magnitudine amplissima, brachiali interdum crassitie, palmari longitudine, deinde in duos aut tres ramos sese

ASTRAGALVS

Forte, Clusij.



ASTRAGALVS

Syriacus, Lobelij.



findens, foris nigra, rugosa, intus candida, dura & lignosa, ingrato sapore, quæ arefacta, cornu duritie superat. Primū eam in collibus quibusdam supra Vlysi ponē, quos Tagus alluit, inter vepres se obseruasse, Clusius ait, deinde frequentiorem siluosis locis nō procul Hispali. Lusitani *Alfabea* vocant, Bæticæ *Garaucancillas*, quasi Cicer exiguū dicas. Videtur ea quam Amatus Lusitanus Apocynon facit, & Lusitanis *Atrameços de can*, hoc est Lupinos caninos vocari ait. Perelegantē aliam leguminosam plantam Lobellio debemus, quæ Astragalis sanè cōgener est. Etenim foliorum & cauliculorum similitudine, & implexu radicum proreptantiū Astragalon refert. Sed florum denso exortu congestorum decore, effigie, elegantia, magnitudine & rubore ornatur amœnissimo. Ex Alepo Syriæ hanc plantam primū nactus est, postea in Vrceis pensilibus Brancionis ex Italo semine natam vidit.

ASTER



CVLVS Christi dicitur ab herbariis, qui à quibusdā lutei asteris genus habetur. In agris pinguibus Monspeliaci soli provenit, radice crassa, fibrata: caule sesquipedali, anguloso, ramofo, nigricante: foliis longis, angustis, lapathio hortensi utrumque similibus: flore aureo in squamulis capitulis micante, tamulorum verticem occupantibus, substrata foliorum novenum ferè aut denum ambientium corona, ut in Astersquā ob causam

Nomina

Forma.

OCVLVS Christi.

BELLIS Lutea, Dalechamp.



Asterem luteum nuncuparunt. Aliud Asteris lutei genus, pratens, vdisq; locis gaudet. Quorundam sententia hæc est Bellis lutea: alij oculum Christi vocant. Radice nititur valde fibrata, nigra: caules multos emittit, cubitales, foliis vestitis paucis, longis, acuminatis, venosis, in ambitu, nec serratis, nec insectis. Flos caulium verticibus insidet aureus, chrysanthemo similis.

Bellis lutea.

Forma.

HELIOTROPIVM,

CAP. LXXVII.

ETSI multæ sint stirpes quæ Heliotropiæ & Helioscopiæ merito dici possunt, quod ad Solem semper conuertantur, & cum eo circumagantur, tamè hic particularim de Dioscoridis Heliotropio dicemus, quod ut Græcis ἡλιότροπον, & ἡλιοσκοπον, ita Latinis Heliotropium & Verrucaria nominatur, Gazæ Solaris recentioribus Herba canceri, Gallis *Tournefol*, & l'Herbe au chancre, Germanis *Greefternyer*. Heliotropium verò quod, ut Dioscorides ait, folia vna cum solis inclinatione circumagantur, vel quod auctore Theophrasto, solstitio tantum floreat. ὅτε δὲ, inquit, τὰς ἀστρολογίας βλάπτειν ἀκαταστάτους τοὺς ἀγρίους, οἷον τὸ ἡλιότροπον ἡ γλῶσσοι, καὶ ὁ σκόδαμος (αἷμα δὲ τὰς τροπὰς καὶ ὥτας) Quæ cum mendosa sint in vulgatis exemplaribus, ex Gazæ conuersione sic emendanda videntur. ὅτε δὲ ἡ ἀστρολογία, ἡ βλάπτειν, ὡς ἀκαταστάτους τοὺς ἀγρίους. Id est. Quæ verò ita floret vel germīnat, ut alia sequatur, vel Heliotropiū & Ca. duus, nam id quoque solituo floret. Et aliquāto ante Heliotropiū tā iis numerat, quæ particularim & diu

Nomina

Lib. 4. c. 4.
Lib. 7. hist.
cap. 14.

florent his verbis. Τὸ τὸν δὲ ἵνα ἔμειροι, ὡς περὶ ἐλὲς καὶ περὶ τῶν ὠκύνων, οὐδ' ἔτι πολλὰ
 χεῖρον ἀλλ' ἔτι καὶ περὶ ἄλλα τι πολλὰ, ὡς δ' ἡλιοτρόπιον καὶ δ' οὐχ ὡς. Id est, Quædam
 particulatim florent, vt de Ocimo diximus: quare diutius florent sicut alia multa,
 & Heliotropium & Cichorium. Scorpionem vocarunt à tollendis verrucis, Verru-
 cariam. Eius genera duo assignat Dioscorides, maius & minus. Plinius duo idem genera
 vnum Tricoccum, alterum Heliotropium. Sed Tricoccum cum maiore Heliotropio Diosco-
 ridis, confundere videtur, vt dicemus. Dioscorides vero omisum tricoccū, videtur sub He-
 liotropio minore cōprehendisse. Heliotropiū maius vt describit Dioscorides, folia habet oc-
 imi, sed hirsutiora, candidiora (Græcè tamen le-
 gitur μιλόντιον, nigriora, & ita Oribasius ha-
 bet) & maiora: ramulos à radice ternos, quater-
 nos, quinosve, & in his alas multas: in cacumi-
 nibus florem album, subfulvum (legitur enim
 in vulgatis ὡς πορφυρῶν, in vetere ὡς πορφυρεῶν, id
 est subpurpureum) incurvum veluti scorpionis
 cauda: radix est tenuis & inutilis. Nascitur
 in asperis locis. Heliotropium minus folia ha-
 bet similia antedicto, sed rotundiora: semen ro-
 tundum, depēdens vt pensiles verrucae. Nasci-
 tur in locis palustribus & iuxta stagna. Plinius.
 Heliotropij miraculum sæpius diximus cum
 sole se circumagentis etiam nubilo die: tantus

HELIOTROPIVM

Maius, Matthioli.

Genera.
 Ibidem.
 L. 12. c. 32.

L. 12. c. 32.
 Forma.



Locus.
 Heliotro.
 minus.
 Forma.

L. 12. c. 31.

HELIOTROPIVM

Alterum, Matth.



HELIOTROPIVM

Minus, Matth.



fidetis

sideris amor est. Noctu velut desiderio contrahit cæruleum florem. Genera eius duo. Tricoccum & Heliotropium: hoc altius, quamquã utrũq; semipedalem altitudinem non excedat, ab ima radice ramosum: semen in folliculo melsibus colligitur. Nascitur non nisi in pingui solo, cultorũ; maxime, tricoccum ubiq; Et paulo post. Alterum genus quod tricoccum appellauimus, & alio nomine Scorpiuron vocatur, folia non solum minoribus, sed etiam in terram vergentibus. Semen ei est ethiæ scorpionis caudæ: quare ei nomẽ. Heliotropij magni fasciculus, vt scribit Dioscor. cum aqua coctus ac potus, pituitam & bilem per aluũ ducit. Vtile est & idẽ a scorpione cum vino potum & impositum. Ad alligatur ad conceptus arce-^{ibidem.}ndos. Tradunt seminis grana quatuor cum vino pota hora vna ante accessuẽ, quã tanas finire, tria verò, tertianas. Illitunt semen fornicatẽ verrucas peni-^{Vires.}lis, & thymos, & epinyctidas exsiccat. Folia podagris & luxatis, & pueris siriasi, idest, partium, circa cerebrum & membranas eius inflammatione laborantibus, vtiliter imponitur. Menses cient, sextus ducunt trita apposita. Minoris vero Heliotropij vires hæ sunt ex eodem. Herba cum semine addito nigro, lyllopo & nasturtio ex aqua pota, lasas tineas & teretes expellit. Tollit & peniles verrucas cum sale illita. Plinius præura confundit, & vni tribuit quod Dioscorides ad alterum refert. Sic eniur ille. Si decoquantur, inuenio cibus placere. Et in lacte iucundius aluum mol-^{ibid. c. 86.}lire. Si decocti succus bibatur, efficacissime exinaniri. Maioris succus excapitur æstate hora sexta: miscetur cum vino, sic firmior. Capitis dolores sedat rosaceo ad-^{Lias. cas.}mixto. Verrucas cum sale rollit succus e folio: vnde nostri Verrucariam herbam appellauere, aliis cognominari effectibus digniorem. Et paulo post de tricocco.

VERRUCARIA Alia Minor.



Vis ad omnia venenata & phalangia, & cõtra scorpiones præcipuẽ illita, non feriuntur habentes. Et si terram surculo Heliotropij circumferibat aliquis, negant scorpiones egredi. Imposita verò herba, aut inde omnino resper-^{L. 7. simpl.}sum protinus mori. Seminis grana quatuor pota quartanis prodesse dicuntur, tria verò tertianis, & c. Galenus Heliotropium in simpliciu medicamentorum catalogo præterit. Paulus Heliotropium magnum, inquit, quod & scorp-^{Lib. 7.}piuron vocat, calidam & siccam, & extergentẽ facultatem habet. Deinde cætera ex Dioscori- de transcribit. Heliotropiũ aliud minus, siue Verrucaria minor, est quorundã sententia quæ hîc appicta est. Nascitur in quibusdã pingui- bus & humidis locis Mõspeliaci agri, ramulis, folio, flore, fructuque maiori similibus, tamen si minoribus, nisi quod surculorũ supremæ parti, in exiles virgulas attenuatæ, fructus ordine col- locatus, insidet. Ad eadẽ valet ad quæ & Myr- mecias maior. Clusius Heliotropij maioris genus pinxit, quod χαμαίχουδον, vel χαμαίπεδον iure dici potest. Heliotropium supinũ ille vo-

Forma.

cat. Maiori Heliotropio perquam simile est, minus tamen. Etenim ramulos ferr- graciliores, multis alis concauos, aliquantum lanuginosos, humi stratos: folia ma- iori cum sapore, tum colore & forma similia, minora tamen, & ocimi foliis pro- xima: extremi ramuli scorpionis caudæ modo etiam incuruantur, eisque ordine insident, vt in maiore, bosculi candidi, quibus succedit semen, non quadrifariam

HELIOTROPIVM Humi sparsum, Clusij.

vti in altero digi-
sum, aut quaternis
femina iuncta, sed
vnicū ferē semper,
quandoq; geminū,
illo maius & oblon-
gus, fuscumq; , cor-
rice quodam & ve-
luti pericarpio in-
clusum: latent etiam
interdum parui pe-
diculi, cū tribus aut
quatuor seminibus

diminutis, & parua, foris nigricans: hyeme perit, & semine deciduo singulis an-
nis renouatur. In marginibus quorūdam agrorum, præsertim, vbi melopepones
fieri solent, Subiuncta reperitur. Florer sub finem Iulij, & Augusto, quo mensē &
& interdum Septembri semen perficit. Vt eiusdem cum maiore est temperamēti,
ita est, sed pollere viribus verisimile est. Idem Clusius Heliotropium minus Tri-
coccum pictum dedit, quod vnicō assurgit caule, pedali, multis ramis brachio-
folia superiori haud similia, sed ad Xanthij non nihil, solani verō somnifici folia
plurimum accedunt, mollia & candicantia: flos exiguus, racematim compactus,

*HELIOTROPIVM**Tricoccum, Clusij.*

luteolus, inuulilis, quippe qui sine semine perit,
vt in quibusdā aliis plantis, quæ non ex flo-
ribus femina sua proferunt: ex alarum ramen
cauis dependent ē longis pediculis, & folijs
quali occultātur sine flore enatæ siliquæ trian-
gulæ, vti tithymalorum, sed asperiusculæ, sca-
bræ & nigricantes, in quibus semen cineret co-
loris. Hæ siliquæ pannis affricatæ viuaci viri-
dique inficiunt colore, qui mox in cæruleum
elegantēque mutetur colorem: radix inuis
& minime viuax. Salmanticenci agro frequen-
tissimam esse hanc plantam ait Clusius, mul-
tisq; aliis Hispaniæ locis. Nascitur & copiose
in Narbonensi Gallia. Iulio & Augusto flo-
ret: deinde semē ad maturitatē perducit. Hoc
Plinij Heliotropion Tricoccū Galli vernacula
lingua *Tournesol* appellant, heliotropiis procul-
dubio adnumerandū, tametsi à Dioscor. videat-
ur præteritū, inquit Pena, aut minoris helio-
tropij descriptione cōprehensum, vt diximus.
Semina eius Tricocca capsula tithymali aut
chamaeææ proxima includuntur, sed scabra, ex
viridi nigricāte, affricatq; panis aut chartis, vi-

rotē viuacē impartiūtur, qui mox in cæruleū hilare & purpureū mutatur: quæ ma-
gno quæstu colligunt rustici Lunellæ, Masiliargues, alijsq; Narbonæ tractibus, in
oliuetis, vbi plurima maturaq; sunt septēbri, quæ vendūr insectoribus. Romani agri
vinetis etiā familiaria, Belgis, Frācis, Germanis, Anglis in hortis coluntur. Pānosæ
lacinie quæ in Officinis nomine *Tournesol* vneunt, ad gelatinas aliq; medicamēta
coloranda, potēleganti purpura huius succo vinoque remisto creduntur imbutæ.

SCORPIOIDES, CAP. LXXVIII.

Scorpioides Græcis, ita Scorpioides Latine dicitur, Plinio Scorpis. Herbula est, inquit Dioscorides, folia habens pauca, semina caudæ scorpionum similia. Ita Plinius. Ex argumento nomen accepit Scorpis herba: semen enim habet ad similitudinē caudæ scorpionis, folia pauca. Quæ brevis apud veteres delineatio fecit, ut aliam atque aliam

Nomina
Lib. 12. c. 25
Lib. 4. c. 16.
Forma
Lib. 12. c. 25.

SCORPIOIDES, Dodonæi.



SCORPIOIDES, Matth.



herbarum per Scorpioide herbarij exhibeant. Dodonæi Scorpioides herbula hæc est humilis, palmi altitudinem non excedens, cauliculis tenuibus, in quibus quina semine folia angusta: flosculi lutei: femina aspera & hirsuta, terna quaternave coherentia, nodis distincta, & inflexa instar caudæ scorpionis. Lobellius Scorpioides repens bupleuri folio vocat. Matthiolus Scorpioides aliud depinxit, quod siliquata fert cornicula, scorpionis caudæ instar reflexa, & articulis distincta: docti quidam telephij genus esse non sine magna ratione suspicantur: est enim folio portulacæ, flore luteo, gustu & facultatibus non multum diuersis. Monspelientibus cum latis tum viretis Lattensis portæ admodum familiare, non est colutea Scorpioides de qua diximus. Scorpioides, inquit Dioscorides, impositum ictis à scorpione summo perè auxiliatur, Plinius. Scorpis valet & aduersus animal nominis sui. Galenus verò exalfacere ordine tertio, deficcare secundo scribit.

Lib. 4. c. 41.
In cap. 187
lib. 4.
Ibidem
Vires.
Lib. 12. c. 25.
Lib. 8. sim.

TRIPHYLLOM,

CAP. LXXIX.

DE Triphyllis quibusdam in Agro diximus, nunc de aliis quæ vdis locis gaudent, primum de eo quod τριφυλλον in ἡχοπλακτέλιος γένος ὀνόματι dicitur, Latine Trifolium pratense, Gallicè Treffle des prés & Triplet, Germanice Vayssenkler. Caulem gerit rotundum, tenerum, ramulos exiles, folia quadrantenus rotunda, terna semper in vno pediculo, flores in summo ferè purpureos, vel in breuem spicam coagmenratos, deinde semen rotundum in parvulis siliquis, radicem longam & fibratam. Trifolium pratense alterum, super-

Nomina
Forma
Trif. prat.
alterum.
Forma

Locus.
Vires.
Fach. cap.
34 h. fl.

reriori proximum est, nisi quod cauliculos paulò asperiores & hirsutiores habet, folia longiora & angustiora, in quorum medio nonnumquam macula alba apparet, crescentis lunæ figura: flores candidos, cætera superiori similes. Scatentius præta ferè omnia. Maio & Iunio mensibus florent. Adstrictioris cuiusdam qualitatis sensum

TRIFOLIUM Præense,
l. Matth.



TRIFOLIUM Præense
alterum, Matth.



TRIFOLIUM Luteum mini-
mum Pena, & Lobellij.



Forma.

in gustu præ se ferunt, non tamen multum admodum, ut nihilominus sint tenuium partium & exsiccatoria, quâdoquidè etiam exigua quâsi acrimonia prædita videantur. Quare haud dubie mediocriter concoquendi & exsiccandi vim habent, ut non temerè quidam ex recentioribus herbariis tradant trifolia hæc albo multorum profluuii mirificè conferre. Eadem etiam inflammationibus imposita, eas cōcoquant, & ad maturationem perducunt. Est Trifolium luteum omnium minimum, & non ita ubiq; obuium, inquit Pena, gracilibus pusillis, cauliculis reptantibus, iunctis folio terio, aliquantū crenato, luteolis floribus in orbem compactis. In pratis & cultis reperitur. Antuerpiano agro frequentissimum esse ait Lobellius. Est trifolius adnumeranda planta, quæ à vulgaribus herbariis panis cuculi vocatur, vel quod cuculus aus ea vescatur, vel quia hac erumpente, cuculus vocem suam edere incipiat, & Alleluya, in Officinis Trifolium acetosum ab acido sapore, à Plinio Oxys eandem ob causam, Gallicè Pain de Cocu, Germanice Sauerkleer. Cauliculos siue po-

tius

TRIFOLIUM Pratense
lutum, Fuchsj.



TRIFOLIUM,
Acetosum.



rius longos pediculos ab radice fundit per multos, quorum singuli in summitate terna folia sustinent perinde atque Trifolium, cordis figura, & in pediculi fungi modo plerumque reflexa, mollia, acido gustu. Flores edit albicantes, in quinque diuisos apices, stellæ figura, qui peculiare pediculos habent ex eadem radice enaros, singulique singulos flores sustinent. Radicem habet subrusam, veluti squamis cunctam, quæ nucamenti speciem referunt. Opacis locis maxime provenit, & in silvis. Aprili & Maio mensibus floret. Obseruasse autem sese scribit Fuchsius, atque adeo mulorum experientia cognitum, quod eius herbarum copiosi flores crebras illius anni pluias, & aquarum inundationes certo portendunt, pauci contra siccitatem. Tota planta auctore Matthiolo, refrigerat oxalidis modo. Quare deuorata, sitim & ventriculi ardore extinguit, iecur refrigerat & cor corroborat. Stillaticia huius aqua datur vtiliter potanda acuta febre laborantibus, sed multo magis præstat succus ex saccharo potus. Illinitur idem per se erysipelatis & inflammatis locis: osque eo colluitur, cum lingua, palatum, faucibusque calida fluxione laborant. De ea hæc Plinius. Oxysfolia terna habet. Datur ad stomachum dissolutum. Edunt & qui euterocelen habent. Diuersum ab his Trifolium pratense protulit Clusius, quod

Locus.

In cap. 106.
lib. 5.

Viret &

Temper.

OXYIS LUTEA CORNICVLATA

Repens, Oxys lutea, Clusij.



Lib. 17 c. 11

Lab. 1. stirp.
Hispa. cap.
59.

non

HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM, TRIFOLIUM PRATENSE

Salmanticum, Clusij.



prodeunt, sustinentes capitula flosculorum elegantissima purpura rubentium, quibus succedunt membranei folliculi, & in his semen exiguum, subrusum: radix uti vulgaris trifolij. Tota æstate floret. Hispani *Trebol de prados*, & simpliciter etiam *Trebol* quemadmodum alia omnia Trifolij genera vocant. Oxys alia à superiore & eius veluti genus allusio ostenditur, ramulis dodrantalibus, interdum longioribus, gracilibus, rotundis, rubentibus, per terram reptantibus, & ad singula internodia radices proferentibus, nouisq; inde furculos & ramulos: folia illi Oxys vulgaris, terna in singulis petiolis, sed minora & pallidius virentia, sapore acido, quæ sub vesperam aut imminente imbre complicantur, & veluti umbonem quandam faciunt: flores in oblongis petiolis terni aut quaterni simul nascuntur, quinque foliolis stellatim decussatis conspicui, vulgari minores, lutei: oblongiora deinde mucronataque capitula, semine exiguo, rufo plena: radix tenuis & capillata. Umbrosis quibusdam circa Hispalim locis nascitur, atque etiam Monspelij, Hec Clusius.

BETONICA AQUATICA, CAP. LXXX.

Nomina

Forma.

Locus.



BETONICA Aquatica Septentrionalium, quibusdam Clymenum Dioscoridis, Scrophularia secunda Dodonæi lib. 1. Hist. stirp. non picta quidem sed descripta Terebintharia Dilij, à Terebenthinæ dote similis Ocimastrum alterum Tragi, Belgis *Breck* (suum cruyt, & *S. Antoni* cruyt, id est, S. Antonij Herba, Anglis *Uruater Betony*. Caulem edit quadratum, fuscum, bicubitalem, geniculatum, cauum, rectum & crassum, folia ex viridi nigricantia, ambitu, figura & crenis Betonicæ, aut Scrophulariæ, sed maiora: alis nonnullis in summo, floribus nigricantibus purpureis, pusillas cassides emulantibus: seminibus pusillis in lagenulis pusillis Blattariæ, aut digitalis purpureæ: radice fusca, multum fibrata. Amat, quemadmodum Beronica, umbrosâ & frigida, sed magis humida, ut margines fossarum qui hac scatent in Nortmannia & Anglia. Hanc summo opere celebrauit Vigonus Chirurgus;

gas miscetur enim vtiliter medicamentis vulnerariis & rypicis ad fordida vlcera deſtergenda, & propter inſignes dotes quidam Clymenum eſſe putauerunt.

Vires.

SERRATVLA, CAP. LXXXI.



ST & alia à Betonica quæ Serratula dicitur, à foliis minutim serratis. Caule conſtat purpureſcente, tenui, & in multos ramulos diuiſo: folia habet antequam in caulem euadat, betonica ſimilia, toto ambitu tenuiter ſerrata, ſed cum caulem protulit, faciem immutanti: nam exortis multo profundioribus inciſuris, maioris Phu ſimilia ſunt: quæ vero in caule ſunt, multo minora & breuiora viſuntur: flores in ramulorum ſummitatibus, ex ſquamolis capitulis purpurei. In ſiluoiſ Bohemix & pratis naſci ſcripſit Matthiolus. Pena etiam in nemoroſis & decliuibus Pedemontis & Septentrionalium Nortmannix & Angliæ. Ad vulnera & enterocelas commendatur.

Nomina

Forma.

Locus.

Vires.

CLYMENVM MINVS, CAP. LXXXII.

CLYMENVM Minus, Dalechampi.



LYMENVM minus ab Herbariis dicitur planta hæc, quæ in humidis, riguis & opacis gignitur, radice geniculata, modicè craſſa, in plures fibras diuiſa, caulibus tribus aut quatuor, pede altioribus, quadrangulis, foliis Clymeni maioris, anguſtioribus, venoſis, grauiter olentibus, aulteri ſaporis: flore in pallido purpureſcente, ſuperne ſpicato, betonica modo, infra cacumen foliis binis, veluci alis vtrinq; erumpentibus.

ALOPECVRVS MONTANA, CAP. LXXXIII.



HÆC plantam, Alopecurum montanum vocant herbarij, à fructus villoſi quadam ſimilitudine: cum eius animalis cauda. Naſcitur in altorum montium opacis cõuallibus, arborum frequentia vmbroſis, & illapſu aquarum vdis: radice nigra, tuberoſa, fibrata: caulibus multis, cubitalibus, rotundis, ima parte veſtitiſ, corticis quibuſdam extantibus, veluti laciniis, partim virentem

tim viren

ALOPECURI, Genus.*CHRYSANTHEMUM*
Latifolium, Dodonai.

tim virentibus, partim è nigro rufis densius cōgestis, desinentibus in cuspidem: foliis betonicæ, rotundioribus, breuioribus, lazioribus, venosis, qua medius neruus protenditur, nigris, ad extremam oræ marginē valde crenatis, magnis interuallis per caules prodeuntibus, geminis, ex aduerso politis: in caulium vertice ex geminorum foliorum tanquam ala caput exoritur, oblongum, metæ figura, innumeris villis hispidū, densissimè stipatis, candicantibus, eleganti prorsus huius congeriei figura, emicanti omni ex parte illa pilorum cælaria: quorum situs, ordo, & densitas, vtrūmque Vulpinæ caudæ speciem æmulatur, vnde nomen impositum est: qua facultate prædita sit, & ad quas ægritudines valeat, nobis compertum nondum est.

CHRYSANTHEMUM Latifolium,
CAP. LXXXVIII.

LATIFOLIUM Chrysanthemū mox à radice folia promit oblōga, lata, virentia, superiore parte aliquantulum aspera, inferiore verò læuora, dilutiusque colorata, inter quæ scapi exeunt tenues, cubitales, aliquantulum hirsuti, duobus aut tribus geniculis articulati, à quorum singulis bina contra se posita folia, atque subinde pediculi exeunt, in quorum fastigiis amplius orbiculati flores, Bupthalmi aut Chrysanthemi æmuli, sed maiores coloratioresq̃, & medio Disco, & circumambiētibus foliolis, luteo resplendentes colore, quorum medius discus tandem in pappos vanelescens, oblonga, tenuia, nigricantiaq̃, semina mittit, radix fibrosa est. In Germaniæ incultis ac syluosis locis frequenter reperitur. Iunio mense in hortis Belgij cum flore conspicui potest: sequenti mense semen cum pappis à vento rapitur. Germanis *Uvaldiblum* dicitur. Sunt qui Alisma Dioscoridis esse velint: sed vbi Plantaginis similia sunt folia, & caulis? Alimati siquidem, quod Damafonium etiam dicitur, Plantaginis similia sunt folia, & caulis thyrso similis, quæ huic nō adsunt. Chrysanthemum idcirco Latifolium citius appellandum, quàm temerè Alismatis nomen ei tribuendum.



HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM LIBER DVODECIMVS,

(647)

In quo omnes planta, quæ ad Mare & in ipso Mari
nascuntur, ad vñum depinguntur.

PLANTAGO MARITIMA, CAP. I.



DE PLANTARVM quæ in aquis ipsis proueniunt, ac earum quæ locis aquosis, & sui natura, aut quauis alia de causa vdis ac vliginosis gaudent, historia, satis multa fortasse dixerimus, si ad illas de quibus iam tractauimus, has quæ ad mare, vel in ipso etiam mari nascuntur adiunxerimus, ab iis more nostro exordientes, quæ frequentius illic sunt obuiæ, atque eam ob causam multis notiores. Maritimas verò plantas omnes nobis cognitæ breui hac tractatione non complectimur, quòd harum quædam aut consecutionis

PLANTAGO Maritima.



ordine, aut tanta affinitate aliis minimè maritimis ita coniunctæ sunt, vt ab iis disungi minimè possint, vt cum cathartidis non possumus non empetron, alypon, scammonium, peplium recensere. Inter olera cum brassicis hortensibus & siluestri, brassica, atriplex, portulaca, marinæ sedem occuparunt: umbelliferis crithmum, bulbosis pseudomoly, spinosis, Tragus Matthioli, hippophaes, hippophaetum, eryngium sese sociarunt. De plantagine marina primum dicam, quæ Græcis *Αρθυλασσι βαλυσσεν*, Gallis *Plantain de mer* nominari potest. Radice est crassiuscula, fibrata, ex qua folia crebra, longa, angusta, spissa proueniunt, porraceis tum colore, tum consuetudine similia: cauliculi palmum alti à medio sui floribus & semine spicatis, plantagini vulgarissimæ notioni simillima. Lito-

Nomina

Dodo. lib.

i. cap. 61.

Pet. Pen. in

Adu.

Forma.

Locus.

Forma.

Leuc.mar.
minus.

Forma.



LEVCOIVM maritimum minus, in litoribus mediterraneis Narbonensis provincie frequens, folia longa, angusta, humi spargit, ad cichorij vel eruce modum diuisa, crassa, albida, parua hortensis, sed magis lanuginosa, & gustu acriora, florem puniceum edit leucoiis similem, semine minutum in siliquis. Iisdem in locis Leucoium multo minus prouenit, radice parua, breui, candida, foliis multis humi procumbentibus, Leucoto purpureo similibus, minoribus, angustioribus: caule humilis, flore puniceo: semine paruo in siliquis. Nivea lanugine tota planta operata est, vehemētiore acrimonia linguam vellicante. Est Hesperis Theophrasti quibusdam. Aliud Leucoium marinum latifolium protulit Lobelius, non ita diuersis foliis, sed latioribus, rigidioribus, hirsutioribus, flores ex ætuleo purpureascent in palmaribus & sesquipalmaribus cauliculis. Semen in siliquis minoribus multo Leucoij lutei.

LEVCOIVM Maritimum, minus.



LEVCOIVM Marinum alterum latifolium, Lobelij.



CISTVS



LYCHNIS Marina
Anglica, Pena.

A FLORIS specie dicitur Cistus frutex hic, in maritimis proueniens, cubitalis, nonnumquam altior, densis, numerosisque radicibus, caulibus multis, furculos, cortice ex rufo rubente, foliis longis, in ambitu laciniatis, acuminatis, supernè obscuris virentibus, infernè candicantibus, & parum lanuginosis, flore Cisti, rosæ ve siluestris, albo, vel ex albo purpurascente.

LYCHNIS MARINA,
CAP. IIII.

LYCHNIDEM marinam Anglicam pictam dedit Pena, in aggeribus maritimis Vectis insulæ Angliæ, totòque illo tractu frequentem. Herbula est ab ima radice multis foliis cincta, crassis, minoribus & angustioribus quam portulacæ marinæ, caules creberrimi, flexiles, humi fusi, cubitales & sesquicubitales, in quorū summo caliculus albus ocimastri aut Lychnidis est, cui hgerent stoculi candidi, perquam elegantes, ocimastri non dissimiles, apiculis intus nigris. Semen in folliculis fuscum, Lychnidis aut ocimastri. Salso est gustu non tamen insuauis, esu tenera, non nisi inter silices & brassicas marinas qua ferme vndæ alluant, nascitur. Floret mensè Iunio, Iulio, Augusto & Septembri.

ANDROSACES, CAP. V.



ARYNIS Androsaces ut Græcis *Nomen* *Androsaces* dicitur, forte, ut putare quis possit *Androsaces*, ab vrina & hydropticorum aquis educendis. Herba est, inquit Dioscorides, alba (legendum *Lid. 2. c. 13.* in Dioscoride *ἀνδρῶν* pro *ἀνδρῶν*, Oribasio & Plinio auctoribus) tenui ramulo, amara, sine foliis, *Lib. 2.* folliculum in capite habens, quo semen cōtinetur. Nascitur in Syria in maritimis locis. Plinius *Lib. 27.* accuratius hanc historiam quam quamuis aliam *c. p. 4.* ex Dioscoride, vel alio herbario exscripsisse videtur, his verbis. Androsaces herba est alba, amara, sine foliis, folliculos in cirris *Lib. 27. c. 4.* habens, & in his semen. Nascitur in maritimis Syriæ maximè. Verum Androsaces *In cap. 13.* Pitis à doctissimo Ghino ad se missum Marthiolus in commentariis depinxit. Ghino doctissimi herbarij assentiuntur. Sed in illis commentariis quadruplo maior *Lib. 4.* *Pet. Pen. in* *Adu.*

quam vicia planta sit, depicta est, per pusilla etenim & petelegans est planta, vnde licata, e fundo in ipsa aqua, ideo a Dioscoride proxime nymphaeas descripta, non in aëre crescens & vivens, sed plus chamæ conchæ quæ humi obvoluita sit, dorso striatoinnascens, pediculis, cirrisve glabris, nudis, exilibus, crebris, rectis, binos pollices altis, singulis singulos clypeolos medio cetero sustinentibus, circumdatum umbilicum vrachis appensis referentibus: quam ob causam Monspelienfes umbilicum marinum nominarunt. Viret primum

ANDROSACES.

Forma.



in aqua exsqualido cinereoque postea eiectiondus, & liore exceptum, albescit, gustu subsalfo, & amaro. In illis videri solent quos *βυλακια* vocat Dioscorides, Plinius folliculos, semen vix unquam reperias, qui

cum penolorum siue simpliciū & sine villo capitulo summuani inhaereant, videbitur Plinius legisse in Dioscoride, vel in eo auctore ex quo vterque manserit, *βυλακια* non *πυλακια*, sed *ἀνδρῶν κεφαλῆς*, id est, folliculum pro capitulo. Vnde laudat hæc herba, inquit Dioscorides, duarum drachmarum pondere in vino pota, ut vrinas multas in hydropicis educat, sed & herbarum decoctum & semen potum

ANDROSACES Alterum, Matthioli.

Lib. 4. c. 4.



Lib. 6. sim.

idem facit (legitur tamen in vetere codice, *καὶ τὸ ἀνδρῶν κεφαλῆς διὰ τὴν πόαν, καὶ ὁ καρπὸς ἀνδρῶν μὲν οὖν πρὸς ἡμᾶς, τὸ αὐτὸ ποτὶς*. Id est, ipsius etiam herbarum decoctum, semenque, abunde potum cum, vino eundem effectum præstant) Imponitur etiam vtiliter podagricis. Eadem planè Plinius habet. Datur hydropicis drachmis duabus tusa, aut decocta in aqua, vel aceto, vel vino: vehementer enim vrinas ciert. Datur & podagricis, alliniturque. Idem effectus est & seminis. Galenus, Androsaces, inquit, humida & acris est herba, potest autem siccata & pota cum ipsa tum semine eius vrinas abunde ciere, & discutere, ac siccare. Sed Paulus & Oribasius pro voce *ὑγρὰ*, id est, humida, habent *πικρὰ*, id est, amara, quo modo etiam Dioscor. & Plinius describere, re ipsa etiam id comprobante, est enim plantula ficior actu & tactu quam calidior, & multum diu retica, ut in Galeno *πικρὰ* quoque legendum esse videatur & non *ὑγρὰ*, nisi *ὑγρὰν* recentem intel-

ligat, eamque *τὸ ξηρανθῆσαν*, id est, siccatæ opponat. Matthioli in iisdem commentariis aliam plantam à superiore longè diuersam à Cortuso missam pro Androsace altero exhibuit, quæ minimè androsaces, sed morsus gallinæ, vel alfinis potius species est, non ex Syria, sed ex vetere quadam macerie decerpta.

CNEORVM de multis dici plantis tellis est Plinius, qui thymelæam Cneorum à quibusdam appellari scripsit. Et alio in loco Cneorium casiam ab Hygino vocari, & mox, Cneori duo genera sunt, inquit, nigri atque candidi, hoc & odoratum, ramosa ambo, florent post æquinoctium Autumni. Quæ ex Theophrasto trāsata sunt, de Cneoro à thymelæa longè diuerso hæc scribete. *Δύο δ' ἔστιν τῶ κνεορί. ὁ μὲν γὰρ λευκός, ὁ δὲ μέλας. ἔχει δὲ ὁ μὲν λευκὸς ὅ φῶλον διερμυῖδες, περιέκτες, ὁμοόχρητον ὅσον τὰ τῶ ἱλαίου, ὃ μέλας οὖν ὁ μινεῖον, σαρκοῦδες, ἐπὶ γένος ὃ μέλλον ὁ λευκός. ἔστι δὲ ὁ σμυῖδες, ὃ μέλας ἰσόμοι, τὴν ἥραν τῶν τοῖς βάθος ἀμφω μεγάλαν ἔχονσι, καὶ ἐκρίμονας πολλὰς ἔχει παχέας, καὶ ξυλῶδες ἀπ' αὐτῶν τῆς γῆς ἢ μακρὸν αὐὰ χυμῶδες. ξυλῶδες αὖτο δ', γλῆχρος ὃ σφόδρα. Δύο δ' ἔχουσιν αὖτος ὃ παρὰ δέν, καὶ παρὰ δέν, ὅσπερ τῶ ὁσφ. βλαστῶν δὲ καὶ ἐπὶ μὴ ἰσημερίαν μεσημερίαν, καὶ ἀνθὶ πολλὰ χροῖον.* Quæ sic cōuertit Gaza, Cneoron casia interpretatus. Calix quoq; duo generat alia enim cādida, alia nigra. Candidæ folium modo cutis oblongum, figura quodāmodo oleagineo simile nigra, quale tamarici, carnosum. Cādida magis se humi spargit, odoratāq; est nigra odore caret. Radix ambabus quæ alrē descendit, grādis, ramiq; permulti, crassi, surculosiq; ab ipsa protinus tellure aut paulo superius sparsi, lenti admodum constant, quamobrem hisce ad colligandum iunci modo vruntur. Germinant florētque post æquinoctium autumni, & multum denique temporis florent. Quæ sic emendatiùs legi possunt. Cneori genera duo. Vnum album, alterum nigrum. Albo folium est cutaceum, oblongum, figura oleæ quodammodo simile, nigro quale tamarici, carnosum. Album supra terrā minùs se atollit, & parum quid olet, nigrum valde odoratum est (vt legatur, ὁ δὲ μέλας ἰσόμοι, nō vt legit Gaza ὁσμοῖς) radix vtriùsq; in profundum descendit magna: rami multi, breues & lignosi, qui à terra vel paulò supra diuiduntur, lenti admodū (nam Græcè legendum βραχέας καὶ ξυλῶδες. ἀπ' αὐτῶν τῆς γῆς, ἢ μακρὸν αὐὰ χυμῶδες, γλῆχρος ὃ σφόδρα, &c. voce ξυλῶδες ἀπὸν expuncta, quam etiam omisit Gaza) Quam ob causā hisce ad colligandum & comprehendendum (παρὰ δέν, βλάσιν, non παρὰ δέν, vt in vulgatis legiunt) vtuntur vitilium modo ὡς περ τῶ ὁσφ, non τῶ χροῖον. Germinant florētq; post æquinoctium autumnale, multoq; tempore florent. Hæc à Theophrasto tradita Cneori albi delineatio plātx hic appictæ quadrat, quorundam herbariorum sententia. Locis lapidiosis & siccis maritimis prouenit, radice grandi in profundū subeunte, folio argenteo, cutis modo crasso, oblongo, angusto, oleæ simili, interdum longiore. In ramos multos, breues, lignosos statim ab ipsa terra diuiditur, eosq; valde flexiles, quamobrem ad ligandum & nectēdum iis vti licet, amerinz modo. Germinat & floret post æquinoctiū autumnale, florifq; prouentū in multis dies prorogat, flos autem in summo ramorū vertice velut in corymbos acervatus emicat, semen nigrū, crassum, in folliculo tāquam gluma reconditū. Matthiolus plantam aliam se obseruasse ait in Bohemiæ siluis, cuius iconem hic expressimus,

Nomina
Lib. 14. c. 11.
Lib. 14. c. 9.

Lib. 6. hist.
cap. 1.

CNEORVM Album,
Dalechamphy.



Locus.

Forma.

CNEORVM Album,
Matthioli.

Lib. 2. c. 130

**CNEORVM** Nigrum,
Myconi.Cneorum
nigrum.

Nomencl.

Lib. 2. c. 131.

Lib. 2. c. 132.



quæ omnibus notis Cneorum candidum referat, quia cutaneum illi folium est, oblongum, ramis flexiles, lenti, furculosi, ab ipsa protinus terra aut paulò superius emergentes, & per humum sese diffundentes: flores in furculorū cacuminibus purpurei, odorati testiculi odore: radix alte descendens, non tenuis. Sed vere floret. Franciscus Myconus medicus Barcinonensis, rei herbariæ studiosissimus, istud Matthioli Cneorum albu fruticem esse ait, quem in Pyrenæis montibus frequenter obseruauit, ab incolis Gauechs nuncupatum, notis omnibus Matthiolus non minuit ei adstipulantibus, dempto fructu, qui in hoc frutice rubet, cuius Cneorū tamen esse non arbitratur, sed Auicennæ alteram oleandri speciem, quam siluestrem vocat. Siluestris, inquit, folia sunt sicut folia portulacæ (vel alcannæ ut Bellunensis) sed sunt strictiora, & eius thyrsi sunt longi, expansi super terram, & apud folia sunt spinæ, & nascitur in domibus desertis. Hæc Auicenna. Quæ si quis, inquit Myconus, cum Matthioli Cneoro modo descripto cõferat, oleandrum siluestrem Auicennæ esse comperiet. Præterea nascitur in desertis locis, & summis montium iugis, foliis myrti maioris, acutis, quæ non multum à foliis portulacæ vel alcannæ distant: item per terram frequenter serpit, aut non multum attollitur. Ad hæc flore, forma, colore, odore ad oleandrum vulgarem accedit. Est vero id notatu dignum, quod obseruauit Myconus à nullis animabus, fruticem hunc attingi aut aradi. Et cum mille huiusmodi plantas foliis & floribus onustas viderit, nullam vnquam repente potuisse asserit, in qua præcisum aut arrosum aliquid fuisset. Sed nigrum Cneorū multò est ignotius. Quidam id non sine probabili coniectura herbam eam esse suspicantur, quæ herbariis præsertim Monspelienfibus Caphorata maior nominatur, quod radice magna altè descendit, ut è terra producit, statim in ramos finditur, vitilium modo lentos, folio est carnoso, tamarici simili, validum spirat odorem, qualis ferè est caphuræ, vnde & Caphuratæ nomen. Quæ omnia in Cneoro nigro Theophrastus adnotauit. Alij selaginem Plinij esse volunt, alij ericæ prius genus, alij hyssopum nemorensem, alij musci terrefricti genus depictum à Trago, cuius alibi meminimus. Lib. quæ in Vmbros. cap. 19. & lib. quæ in Alperis cap. 71. Franciscus Myconus plantam aliam Pala marina vulgo dictam, à Barcinonensibus ad nos misit pro Cneoro nigro depictam, ut videtis, & descriptam lus ferè verbis. Frutex est duorum cubitorum altitudine cum multum adoleuit,

adoleunt, et ad rostando, flexili, aliquantum aspero, & fere nodoso, qualis in Aizoon foliis detractis cernitur, ramulis multis similiter nodosis brachiato, in quibus folia minuta perpetuò virentia, quæ quo fruticis summitati propiora, eò minora compiciuntur, ut quæ in summitate sunt eupressi foliis similia sint, paulò tamen latiora: omnia nonnihil rassa sunt, carnosæ, incana, caulem complectentia. Flores in viridi luteæ: radices crassæ, digitales, lignosæ, albo cortice vestitæ, saris in terram descendentes. Totus frutex & maximè cortex manu tritus, grauis est odoris: sed vigente panicula folia, si confricentur, zibeti odorem quadamtenus spirant. Baici noue nascitur locis arenosis, & maritimis, aut non multum à mari distanti. Floret Autumno, & floris prouentum ad Maium vsque producit, foliis aliis deciditibus, aliis renascentibus. Foliorum sapor cum lentore subadstringit. Fori huius herba hæmorrhoidum inflammationem sedari asserunt: quod & iusu præstat. Hanc plantam Cneori descriptioni à Theophrasto traditæ optimè quadrare putat Myconus. Ea esse videtur quam libro de cathartici nomine Sesamoidis minoris depinximus. Clusius Sanam vndam secundam fecit. Anguillara Lauandulam vulgo vocatam Cneorum album esse arbitrat: nigrum verò rosmarinum coronarium à Theophrasto usquam memoratas plantas, quamuis tota leloponneso & Hellade, utrâque copiosa gignatur. Eius opinionem pleribus refellit Matthiolus, quod Cneorum utrûmque floret post æquinoctium Autumni, rosmarinum bis anno, nempe post æquinoctium vernum, & ante æquinoctium Autumni. Lauandula æstare tantum. Præterea utrîq; Cneoro Theophrasti radix est grandis, altè descendens, Lauandula & rosmarino minimè, cum per summa fetè cespitum mediocres radices fundant, & ob id frigoris impatientes plantæ. Ad hæc utrîusque Cneori rami lenti flexilisque sunt, & ad ligandum apti, cuiusmodi non sunt lauandulæ, nec rosmarini. Idem Matthiolus in postrema commentariorum Latinorum editione

L. 12. c. 23.

In cōmē.
ca. 11. lib. 1.In cap. 56.
lib. 4.

CNEORVM Aliud Theophrasti, Matthioli.



scribit, Cneorum Theophrasti Roma ad se missum nullis deficientibus notis: sed eas nec describit, nec addit sit ne candidum, an nigrum Theophrasti Cneorum, quod hic expressimus.

Locus.

Forma.

Nomina
Lib. 4. c. 49.
Forma.

CATANANCE, Dodon.

Locus.

Lib. 4. c. 49.



Lib. 7. ca. 3.

nancem Thessaliam herbam qualis sit, à uobis describi superuacuum est, quum sit eius vsus ad amatoria tantum. Illud non abs re est dixisse, ad detegendas magicas vanitates, electam ad hunc usum coniectura, quoniam arefcens contraheret se ad speciem vnguium milui exanimati.

PN MARITIMIS crescit hoc Conyza genus, quod à foliorum longitudine macrophyllū cognominarunt, radice sicca durāque, caule dodrantali, surculoso, foliis in eo multis, longis instar plantaginis angustifoliis, aut etiam angustioribus, gustu farcis simul & nonnihil amaris: flore luteo in luteis corymbis, surculorum vertici insidentibus, qui in pappos tandem abit.

CATANANCE, DODON.
CAP. VIII.

KATANANKH Græcorum, & Latinorum Catanance, quasi coactrici, à vi & necessitate adigenti ad amorem, Dodonzi sententia valde attinis hæc est: foliis angustis, longis, gramineis, sed minoribus, quæ arefcencia in terram recuruantur: cauliculos fert teneros, graciles, breues, in quibus flosculi & siliquæ rotundæ, tenues, longiusculæ, semine rufescente refertæ. Eiusdem generis est altera, quæ non rotundas siliquas sed compressas & laniusculas habet, cætera superiori simillima. Hæc in litoribus marinis reperitur, illa etiā quādōque in agris. Videtur, inquit idem Dodon. prior esse Catanances species à Dioscoride descripta, quæ folia Coronopi habet longa, radicē iunci modo prætenuem, capitula sena septenave, in quibus erui semen inest: arefcens in terram flectitur, & milui exanimati vnguibus similis euadit. Eruū siluestre Dodonæus in frument. Historia. Lobellius & alij Herbarij faciunt. Vt res habeat, hanc nosse minimè necesse est, satiusq; est de hac amatoriis tantum illecebris dicata silere, quàm diligentius de ea inquirere, sicuti Plinius consuluit, & Dioscorides non vires, sed alienam duntaxat historiam citat, nec Galenus posteriorésque medici de hac quicquid tradiderunt, eadem fortè ratione ducti quæ Plinius, qui de ea hæc literis mandauit. Cat-



TRIBVLVS. Mammam plantam hanc quidam vocant, alii pallinaciam mammam, alij Hippophaes Dioscoridis esse contendunt. In sabulosis & maritimis nascitur, radice crassa, molli, cortice rufo & labatro cetera, sapore amari, caulibus multis, angulosis, late dispersis foliis longis, cetera caulibus, verum angustioribus & longioribus, qualia floribus sub

Nomina
 Lib. 4. c. 94.
 Locus.
 Forma.
 Lib. 4. c. 95.

TRIBVLVS Marinus
 quorundam.



strata cernuntur, albis, spinosis, spinarum aculeis, sicuti & caulis, angulosis: flore corymbis hederæ non dissimili, ac veluti racemosis, tenuifculo, candido, leuiusculè inuoluto. Quæ res omnia Hippophæis historiæ respondere videntur: sic enim Dioscorides aliud del. Hippophæis nascitur in maritimis & arenosis locis. Frutex est siccior, densius, vndiq; amplius, folia habens longa, ad oleæ toliæ accedentia, sed angustiora, tenuiora, & inter ea spinas siccas candicantes, angulosas, inter se distantes: flores corymbis hederæ similes, & racematim inter se coherentes, sed tenuiores, & molles, & cum candore puniceo ex parte coloris: radix crassa, mollis, succi plena, gustu amara. At hanc Dioscorides non folia spinosa, sed præter folia, spinas siccas, albas, angulosas tribuit. Præterea eius succo vim purgandi libiosa, aquosa ac pituitosa deorsum, quod de superioris succo neminem adhuc experientia comprobasse arbitror. Quare sit ne hæc Dioscoridis hippophæis, lectotibus, & maritimis locis vicinis, diligentius disquirendum reliquimus.

MUSCUS MARINVS, CAP. X.



BRYON. Ὠαλφόνιον, Latinis Muscus marinus vocatur, Thalabel, siue Thaleb Arabibus, Gallis Mouffe de mer, Germanis Mermuse. Nascitur, inquit Dioscorides, in lapidibus & testis iuxta mare, capillaceus, gracilis, sine caule. Plinius eundem Muscum ita describit, vt in quibusdam a Dioscoride differat. Bryon marinum, inquit, herba sine dubitatione est, lactucæ foliis similis, rugosa, veluti contracta, sine caule, ab vna radice (nō ab ima, vt in vulgaris codicibus habetur) exeuntibus foliis. Nascitur in scopulis maximè testisq; tetra comprehensis. Idem alio in loco. Aliud genus fruticum Bryon vocatur, folio lactucæ, rugosiore tantum iam hoc interius nascens. Plinius itaque Muscū herbam & fruticem facit, ipsiq; lactucæ folia attribuit. Dioscorides pilos pro foliis dicit enim esse πειχιδίαι, quod fortassis Plinius πειχιδίαι legit, & lactucæ folio conuertit, in ceteris notis, præsertim in viribus consentiens, nisi fortè Muscum marinum cum Fūco marino, siue alga Theophrasti confuderit, de qua mox dicemus. Plinio vetetè codicem suffragari scribit Andr. Lacuna, in quo πειχιδίαι legitur, et si Muscus marinus, inquit Lacuna, capillorum quā lactucæ maiorem similitudinem referat. Matthioli eorum probat sententiam qui Muscum marinum veterum plantam eam esse censent, quæ hodie Corallina vocatur, & ab iis frequentius reperitur, qui corallia piscantur, corallis, sicuti scopulis, & piscium

Nomina
 Lib. 4. c. 94.
 Locus.
 Forma.
 Lib. 4. c. 8.

Lib. 12. c. 11.

Comar.
 Embl. 3. 4.
 Lib. 4.

In cap. 94.
 Lib. 4.

testis,

*MVSCVS Marinus Plinij,
Matthioli.*

*MVSCVS Marinus siue
Corallina, Dodon.*



Lili, ca. 71.

*MVSCVS Marinus vulga-
rissimus, Muscus marinus can-
didus Coralloides.*



Vires.


Lt. 4. ca. 94.



testis eodem modo quo Muscus arboribus in-
nascens cæteris ea præfertur quæ coralina unde
ei corallina nomen inhaeret: quæ taxis, lec-
do loco probatur, colore rubefcente: cinerea
improbatur. In eadē est sententia Dodonæus,
qui Corallinam Officinarum pro Musco ma-
rino pinxit, & descripsit. Constantinus
tius ista perscrutatus perspicue demonstrat
Bryon thalassion siue Muscum marinum Co-
rallinam non esse quam depinxit Matthi-
olus: Fruticosa enim planta & surculosa est Coralli-
na: Muscus verò marinus herbula capillacea,
& veluti villosa instar Musci arborum: con-
tiner siquidem huic est, & forma non
nomine similis: albicante autem colore est at
rufescente, non autem herbaceo, aliquanto
etiam glauco: scopulis qui mari alluuntur con-
crescit, radice nulla notabili, & sæpe ostreoru,
gammatorum aur mytutorum testis atque
operculis cum inueterauerint, adhærescere
firmiter obductus conspicitur: cum exaruit, fa-
cile confringitur, & friabilis est, quod è diuer-
so in fuceo marino accidit. Corallina autem
frutex est, & genus fuci marini, de quo proxi-
mo capite tractabimus. Matthioli Musci ma-
rini à Plinio descripti, effigiem hanc pictam
dedit, eique perbellè notis omnibus respon-
dere scribit. Dodonæus Bryon γαλακτοειδὲς Theo-
phrastī esse putat, viderique primam speciem
esse fuci marini siue Algæ, à Dioscoride de-
scriptæ. Lobellius appellat Bryon lactuæ foliis Plinij, Muscum Intybacum
crispum marinum, fuci primam speciem Dioscor. Lactuam marinam herbario-
rum. Idem Lobellius Muscum vulgarissimum exhibuit, intybacum, cristatis oris,
fruticulosum, surculosum: item Muscum candidum, Coralloidem, squamulis lorica-
tum. Muscus marinus multum adstringit, ut scribit Dioscorides, facit ad inflam-
mationes & podagras quæ adstrictione opus habent: nam in excusis omnibus
legitur,

legitur, τὰς φύκας διωκόμεναι tamen Ruellius vertit quæ refrigerare opus sit: perinde ac si φύκας legisset pro φύκας, vt & Plinius legisse videtur, qui eandem omnino vires huic Musco tribuit. Præcipua siccandi ei spissandiq; vis, inquit, & colliguntur omnes inflammationesq; colibendi, præcipuè podagræ, & quicquid reugeat, opus sit. Ab eadem sententia minimè alienus est Galenus, scribens Muscū marinū ex terrea & aquea essentia compositum esse, vtrâque frigida: an guineum enim adstringere, & calidis quibusvis impositum, refrigerare & adiuuare.

PHYCUS MARINVS, CAP. XI.

 Τ ΚΟΣ φυτόν, Latine Fucus siue Phucus marinus & Alga, vt etiam in Theophrasto rectè Gaza vertit, quicquid dicat Plinius non habere linguam alia nomen, quod Græci vocant Phycos, quoniam Alga herbarum magis vocabulum sit, Phycos autem frutex. Nam ipsemet alibi Phycos algæ conuerſit & Fucum marinum, vt ostendimus. In Oceano Normanico Bray, aut Brac vocatur, a voce Græca βρύον. Dioscorides tria Fuci marini genera ponit. Fucus marinus, inquit, nascitur partim latus, partim oblongus & puniceus, partim albus, quæ in Creta ad terram nascitur, valde floridus, & nō putrescens. Plinius de eadem re scribens, etiam quoque genera facit. Præcipuè vero liberat, eo malo Phycos thalassion, id est Phucus marinus, lactuæ similis, qui conchyliis subternitur, nō podagræ modo, sed omnibus articulorum morbis impositis priusquam areſcat. Tria autem genera eius, latum: & alterum longius quadamtenus tubens: tertium crispis foliis, quo in Creta vestes tinguntur: omnia eiusdem vsus. Nicander ea & aduersus serpentes in vino dedit. Hæc ita ferè etiam Dioscorides tradit, nisi quod Plinius lactuæ folia huic, veluti etiam musco marino attribuit, & similiter conchyliorū testis interini dicit. Idem Plinius. Non habet lingua alia nomē, inquit, quod Græci vocant Phycos: quoniam alga herbarum magis vocabulum intelligitur, hic autem est frutex: folia laræ, colore viridi gignit, quod quidam Prasōn vocant, alij Zoster. Alterum genus eiusdem capillaceo folio, simile sceniculo, in fax nascitur: superius in vadis, haud procul litore: vere vtrūmq; & interit Autumno. Circa Cretam insulam nato in petris, put puras quæque inficiunt, laudatissimo à parte Aquilonis, aut cum spōgiis. Tertium est gramine simile, radice geniculata, & caule qualiter calami. Aliud genus fruticum Bryon vocatur, folio lactuæ, rugosiore tamen, iam hoc interius nascens. Et alio in loco. Et Algam, inquit, maris theriacæ esse Nicander tradit. Plura eius genera vt diximus, longo folio, & latiore, rubēte, aliâque crispo. Laudatissima quæ in Creta insula, iuxta terram in petris nascitur, tingendis etiam lanis ita colorem alligans, vt elui postea non possit: è vino iubet eam dari. Nicander autem quem Dioscorides & Plinius citant, in Theriacis aduersus Trygonis venenum inter cætera remedia Algam matrinam tubentem numerat hoc versu.

Ἡ δὲ καὶ φανόσιν δὲ χρυσαλλέος φύκος.

Sed ad Plinium reuertamur. Is indistinctè & inconstanter Fuci marini genera tradidit, vt faciliè perspiciet qui locos supra citatos, item eum quem capite de Musco marino protulimus, inter se conferet. Præterea aperte Phycos thalassion algam vertit, quod tamen alibi in alia lingua nomen habere negat, modoq; herbam vocat, modo fruticem. Adde quod βρύον, id est Muscum, & φύκος cōfundit. Quæ omnia ex Theophrasto transcripsit, qui tamen multò clarius & diffusius eadem explicauit, non tria duntaxat, sed quinque Fuci marini genera assignans, his verbis. Τὸ δὲ φύκος τὸ μὲν ἐστὶ πλάγιον φύλλον, τετρανοθὲς, χρῶμα πῦδες ἔχον, ὃ δὲ καὶ πρῶτον καὶ λῦσι τῆς, εἰ δὲ ζῶσθαι βίβαν ὃ ἔχει διασθάν ἔχον, ἀνυθὲν δὲ λεπτὸν (legendum ex conuerſione Gazæ εἰσθὲν, siue εἰδῶθεν δὲ λεπτὸν) μακρὸν δὲ ἐπιφύκῳ, καὶ ὀπίσθῳ, πρῶτον.

παρήμενος τοῖς κορυμνοσθύοις. τὸ δὲ περιφύλλον ὡσπερ δὲ μάραθρον, ἢ ποῦδες, ἢ δὲ ἔξωθεν, ἢ δὲ ἔξωθεν αὐτοῦ, ἀλλ' ὁρθὸν πῶς ἐν αὐτῷ. φύε) δὲ τὸ τοῦ ἐπὶ τῶν σφραγίδων, καὶ ἐπὶ τῶν λιθῶν, ἔχ' ὡσπερ θάτεροι πρὸς τὴν γῆν (mendosē pro ἐπὶ τῆς γῆς) περιφύλαξιν ἢ ἀμφοῖν, καὶ τὸ μὲν περιφύλλον πρὸς αὐτὴν γῆν, πολλοὺς δὲ ὡσπερ ἐκκαλύπτει) μόνον ὑπὸ τῆς θαλάσσης. θάτεροι δὲ ἀνὰ τὴν γῆν) δὲ ἐν μὲν τῇ ἔξωθεν περιφύλλῳ φάλας, θάλασσαν δὲ τὸ μόνον, ἢς φασὶν, ἔ τὸ πλεονεξία μὲν ὡς πλεονεξία. φέρει δὲ τὸ τοῦ ἐπὶ τῶν θαλάσσης τῶν ῥῶν τῇ ἔξωθεν. χαλκοῖσι δὲ αὐτῷ περιφύλλῳ, ἐν ταύτῃ δὲ ἐν τοῖς τόποις ὡς ἐκείνῃ τῷ ὡφελῶν. λίγῃ) δὲ ἐκείνῃ ἐπὶ τῇ, ἢ φύε) μὲν τῇ ἔξωθεν ἀφ' ὧν, ἀμφοῖν δὲ τῇ θέρμῃ, τῷ μισοπύρῳ δὲ φθίνῃ. καὶ δὲ τὸν χυμὸν ἀπολλύουσιν. ἔκαστ' ἐπὶ. ἔκαστ' ἢ καὶ ἄλλα φυόμενα χερσὶ καὶ ἀμαυρότερα γίνεσθαι τῷ χυμῷ. ταῦτα μὲν ἢ οἷον περιφύλαξιν, περὶ γὰρ τῶν θαλάσσης, τὸ δὲ ἀνὰ τὴν θάλασσαν δὲ οἱ ἀσπρῆς ἀνακαλυφθεὶς πελάγῳ, καὶ ἐν κρήτῃ δὲ φύε), πρὸς τῇ γῇ ἐπὶ τῶν σφραγίδων, καὶ ἔξωθεν. ἢ βλάπτει δὲ μόνον τὰς πικρίας, ἀλλὰ καὶ ἔρμα καὶ ἡμέτερον καὶ ἔρμα ἢ πρὸς φάλας δὲ βλάπτει, πολλὸν χυμὸν ἢ χυμὸν τῶν πορφόρων. γίνε) δὲ ἐν τῇ πορφόρῳ καὶ πελάγῳ δὲ χαλκοῖσι (ἢ χυμὸν subaud. non χαλκόν, vt in excusis legitur) ὡσπερ αὖ ἀσπρῆς δὲ ἄλλα ταυτα. ἄλλο γὰρ ἐστὶν ὁμοίον τῷ ἀσπρῷ (perperam codices vulgati habent, ἄλλα γὰρ ἐστὶν ὁμοίον) ἔ τὸ φύλλον παραπλοῖον ἐστὶν, ἔ τὸ μίαν γονιῶν, ἔ πεφυκέναι πλοῖον ὡσπερ) πορφόρῳ τῆς ἀσπρῆς. ἔ τὸ φύλλον ἔ τὸ αὐτὸν χαλκοῖσι καὶ ὡσπερ ἢ ἀσπρῆς, περὶ δὲ ἔ τὸ αὐτὸν πλοῖον τῷ φάλας. ἄλλο δὲ βρόνχῳ (sic Plinius & Gaza legunt : quare mendosa sunt exemplaria quæ βρόνχον habent.) δὲ φύλλον ἔ τὸ ποῦδες τῇ χερσὶ, πλοῖον δὲ ἢ καὶ ἀνὰ τὸν πορφόρῳ, πλοῖον ὡσπερ σπασσασμένον. χαλκοῖσι δὲ ἢ καὶ ἔ τὸ αὐτὸν πλοῖον τῷ πορφόρῳ, καὶ ἀνὰ τὸν πλοῖον. φύε) δὲ ἐπὶ τῶν λιθῶν ταυτα πρὸς τῇ γῇ καὶ τῇ σφραγίδι, καὶ τὰ μὲν ἐλφίῳ χυμῷ ταῦτ' ἐστὶν. Id est Gaza interprete. Nam quoddam genus folio lato (addendum ex Græco τὸ πλεονεξία, id est distento, pro quo fortasse legendum ταινιοῖς, id est tæniæ modo exporrectum) colore herbido est, quod (πελάγῳ) porrum quidam appellant, alij (ζῆνῳ) cingulum, radice huta extrinsecus, squamata intrinsecus, longa admodum crassaq; plene, cepigethyis non absimili (melius, longa modice & bene crassa, crommygethyis, &c.) Aliud folio crinito, terræ ipsi adherens, fereq; à mari tantum alluitur, alterum altius degit. Hic multa omisit Gaza ex Græco sic reponenda. Aliud folio capillaceo sceniculi modo, colore nec herbaceo, nec valde pallido, caule caret, sed per seipsum quodammodo subrigitur: ostreorum testis innascitur & saxi, non quemadmodum alterum, zostræ scilicet, in terra ipsa defixum. Terræ quidem siue litori vicinū utrumque, sed capillaceum terræ siue litori ita propinquum est, vt à mari alluatur tantum, alterum à litore longius distat. Sic pergit Gaza. Nascitur quidem in mari externo circa Herculis columnas, mira magnitudine, latitudineq;, vt ferunt, amplius quam vt manu apprehendi possit. Fertur hoc ad mare internum fluxu extrinsecus, porrumq; id appellant: annum esse, &c. Quæ fidelius sic verti possunt. Nascitur quidem fucus sceniculaceus circa Herculis columnas in externo Oceano, mira proceritate, maioreque latitudine quàm palmæ vnus: ad internum verò siue mediterraneum mare externi siue Oceani influxu defertur: porrum id vocat. Ibidem & aliis quibuscumque in locis tam altè surgit, vt hominum vmbilicum magnitudine superet. Annum esse aiunt (vertit Gaza,) & nasci vere desinente, vigere æstare, minui (languescere fortè melius) Autumno, interire atque decidere Hyeme. Quin & reliqua omnia nascentia deteriora, obscurioraq; (staccidiora melius) hyeme fieri. Hæc itaque ceu terrena circa mare deprehenduntur (vel potius, Hæc igitur circa mare prope litus seu terram crescunt) Alga verò proueniens in alto, quam spongiatij pelagicam deferunt, in Creta insula iuxta terram super saxa, plurima optimaq; prouenit, quæ non solum vittas, sed etiam lanas vestelq; inficiunt, & quâvis recens infectio sit, color longè purpuræ præstat. Gignitur parte Aquilonia tum copiosior, tum melior, vt etiam spongiæ, reliquæque similia. Sunt alia

gramini

graminibus proxima, &c. Dilucidius sic reddi possunt. Alga verò marina quam spongijarj vrinantes referunt ex alto, in Creta quoque iuxta terram, super saxa, plurima optimaq; provenit, qua non solùm vittas, sed etiam lanas vestesque inficiunt, & quamdiu recens rinctura sit, color longè est præstantior purpura. Gignitur parte Aquilonia nūm copiosior, tum melior, vr etiam spongix, reliquæque similia. Est alius fucus graminis similis, quippe folio simili, radice geniculata, lōga, obliquè adhærente modo graminis, & caule calamaceo (arundinaceo) vr granien, magnitudine alga uultu minora (minor.) Est aliud Bryon dictum, folio coloris herbidi, amplo, nec lactucis dissimili, rugo siore tamen, & velur contracto, caret

FUCVS Capillaceus siue
Corallina.



CORALLINA Britan-
nica, Pena.



caule: sed ab vno inirio plura folia huiusmodi exeunt, & rursus ab alio. Nascitur super lapides scitiliæque iuxta terrâ. Et minora quidem hæc ferme traduntur. Hac oratione, vr diximus, luculenter Theophrastus quinque Fuci marini genera declarauit: Zostera siue Profon capillaceum, siue sceniculaceum, Tinctorium spongiariorū, siue Pelagicū, Gramineum, Lactuca-
ceum. Præterea ex eodem facili est intelligere Plinium non rectè scripsisse Fucum zostera & capillaceum vere nasci, & inter ire Autumno, cum de capillaceo solo scribat Theophrastus, vere desinente prodire, & non Autumno, sed hyeme perire. Zoster idem quod ζών, id est cingulum, siue baltheus, vbi vis in litore maris Northmannici visitur, lōgitudine vlnæ, aur etiā maiore, quamuis abruptus, digiri etasitudine, & trium digitorum latitudine, coriaceis mulionum baltheis similis, ambitu, præsertim cū inarior, sic crispus, vr laciniaius videatur. Northmannici Oceani litus hæc algæ specie virosum grauēque odorem spirante etiam si longius absis, constratum fere est. Fucum capillaceum siue sceniculaceum qui saxis & ostreorum testis innascitur, nostram Corallinam esse doctiores censent: vr enim ille, ita hæc frutex est, folio capillaceo, sceniculo simili, similiter saxis & ostreorum testis innascitur. Longe aliam Corallinam Britannicam exhibuit Pena, scribēs se in Angliæ litore mediterraneo insulæ Portlandiæ, ex aduerso Northmanniæ inter fluitantes Algas reperisse plantæ quoddam rudimētum, cuius si spectes & attrites surculos palmares, & sesquipalmares, pustularos, molles, flexiles, spongiam prorsus dicas, cui etiam cōcolor est, & viuere pures: sin habitum dicas: vnde quidam coniecerūt esse Plocamon Isidos, de quo sic Plinius. Circa Troglodyrarum insulas fruticem vocari in alto Isidos Plocamon, Corallio similem, sine folijs, præcisum, mutato colore in

Lib. c. 14.

Fucus Zo-
ster.

Locu.
Forma.

Fucus ca-
pillaceus.
Locu.
Forma.

Lib. c. 14.

CONFERVÆ Marinae genus, Lobel.

Fucus un-
guis.
Locus.

nigrum, durescere, cum cadat frangi. Hæc Plinius. Ea tamē, inquit Lobellius, videtur esse Antipathes Dioscoridis, de quo capite proximo. Fucus quem *αβύλιον* vocat Theophrastus, quem etiam Tinctoriū nominare possumus, in scopulis & petris nascitur, vnde avulsū vrinantes spongiarij referunt, foliis etiā est tenuibus, sceniculo similibus, rubris, sic tamen vt quædam intermixta spectentur adhuc albicantia. Huic similis est, fortasse idem Muscus marinus, foliis Abrotoni maris, Lobellij, folliculis non dissimilibus, sed nonnunquā triplo maioribus, radicem Asphodeli æquantibus, colore quadātenus rubentibus, vel ferrugineis. Fucus alius gramineus

dici potest, quod folio sit graminis siue arundinis minoris, sed æqualiter lato, ac molliore, nec mucronato, vel acuto, quale est agrostis, pollicari latitudine, vnde longitudine, vnde innatate, figura ligulæ, aut ræniæ vitæ. In vadis nascitur, vt & Zoster. Hæc est alga quā rustici litoribus eiectam & dispersam æstate, vt scensces (hoc enim scænū est marinum, & Monspelésium vulgus Paleam marinam vocat) rastellis accumulunt, & in cāpo exposita succillis veriant quoad petarefcat: deinde probè siccata fœni instar in metas construunt, aut important in fœnilia vel palearia: eaq; sunt quæ tum præparant pecorum & boum hybernæ stabulationi stramenta. Ex eo qui hinc cōicitur fimo, agros nimia defrugatione emaciatos, & exinanitos stercoreant, læto segetū proventu. Hæc pocula & cætera vasa vitrea qui procul asportare volunt, involuunt & circūtegunt, ne mutuo collisū confringantur. Eadem siccata rustici tomenti loco culcitra suas infarciunt: Quæ olim consimiliter cognita ipsius cōmoditas in faciendis centonibus in castris locum habuit, Lib. 20. c. 2. quod intelligitur ex Vitruvio de testudinis constructione hæc scribente. Circū tabulata collocentur crates ex tenuibus virgis creberrimè textis, maximeq; recentibus percrudis coriis duplicibus consutis, fæctis Alga, aut paleis in aceto maceratis Lib. 6. c. 97. circa tegatur machina tota. Hæc Algula est, cui Dioscorides in odore corallia cōparat, vt mox dicemus, cum ait: ἵτι δὲ ὀσμήν θρωόνη, καὶ φουκίος ἐν περὶ ἔχρη, de qua etiam intelligit Nicander cum scribit: βρύα λεπτὰ πλεονέχουσα θαλάσσης, qui etiam scitè admodū dixit φουκίους ἱγίους, algosias vias, id est litora. Huic iungendus Fucus ferulaceus Lobellij, sic dictus ob folia ferulacea, minutius diuisa. Scapum emittit pedalem, in quo Corallina candida sæpius innascitur. Hæc Lobellius. Quintum Alga siue Fuci marini genus Lactucæū, in litore aut vadis sicuti superiorea provenit, sed scopulis & saxis inhæret, foliis lactucæ latis, crispis, siue rugosis, virentibus, ex vno principio multis, nullo caule. Hanc Algā pro Musco altero pictam esse à Marthiolo postremis Commentar. editionibus supra diximus, à Dodonæο βρύον θαλάσσιον Theophrasti appellari viderique primam speciem esse Fuci marini,

F V C V S, siue Alga
Tinctoria.

Fucus lict.

Forma.

In cap 24
lib. 4.

Lib. 2. c. 7.

Lib. 2. c. 9.

siue Alga à Dioscoridæ descriptæ. Actius Lactucam marinam vocat de curatione eorum scribens, qui obtuenum fluxionem articulari morbo laborant. Et quoque, inquit, quæ in mari nascuntur plerumque talia sunt, vt potè quæ Lactucæ appellantur. Sunt aut in germinata, & oblonga, ac viridiora, tenuia, & subrugosa, ac velluti



FV CVS Ferulaceus, Lobelij.



FV CVS, Siue Alga
Inybaea.



veluti cōduplicata,
ad litora maris per
fluctus ciecta: prae-
statiores autē sunt
cum posca decocta.
Viridia itē, quae in
Fusco siue Alga tin-
ctoria ad radices si-
ta sunt. Haec de Fu-
ci marini generi-
bus. Nūc vires eorū
explicandae. Omnia
vim habent refri-

Temper.
& Vires.
Lib. 4. c. 25.

gerandi, inquit Dioscorides, vtilem in cataplasmatibus
non podagrae modo, sed etiam inflammationibus: ve-
rū iis humidis vti oportet priusquam siccantur.
Nicander Puniceum aduersus bestias venenatas vale-
re dicit, eo versu quem supra citauimus. Et Galenus,
Fucus, inquit, humens adhuc & virens ex mari exem-
ptus, desiccatur & refrigerat ordine secundo: habet enim
quiddam modice acerbum. And. Lacuna scribit in
veteri Dioscoridis codice pro *ψυχρὴν* legi *συνδυαίν*, id
est adstringentem pro refrigerantem, eamque lectio-
nem rationi esse consentaneam, quod herbae omnes
marinae ob saluginem insitam, non tam refrigerare
quam adstringere cogeretque videantur. Fucum

Lib. 8. simpl.

capillaceum siue ferniculaceum, id est, Officinarum Corallinam recentiores ad necandos lumbricos maximopere commendant, cæterisque medicamentis præferunt, quod eos non modo interficiat, sed etiam eodem die expellat, magna sæpe spectantium admiratione: qua virtute muscum aut Fucum marinum pollere veterum nullus, quod sciam, memoritæ prodidit.

CORALLI FRUTEX, CAP. XII.

Nomina

Lib. 1. c. 57.

Genera.

Lib. 1. c. 97.

Forma.

Lib. 1. c. 97.

Emblema
Lib. 1.

ΟΡΚΑΛΙΟΝ, Latine Corallium similiter, dicitur frutex marinus, cuius natura non ita omnibus est perspecta, ut ipsum vulgò est notissimum. Aliqui *Μυόδενδρον* vocant, inquit Dioscor. quasi lapideam arborem dixeris, Arabes *Bassad*, *Mergen*, *Besd*, siue *Morgan*, Galli *Coral*, Itali & Latini *Corallo*, Germani *Coraln*. Genera eius rubens, candidum, nigrum.

Candidi ramus neque Dioscorides, neque Plinius meminere, nisi hoc fuerit quod Dioscorides ex quorundam interpretatione colore pallidum dixit, & ut viriosum improbatur. Corallium, inquit idem Dioscor. planta marina videtur esse, durari autem cum ex alto extracta fuerit, extra mare posita, & tingitur, siue compingitur tanquam a circumfuso nobis aëre: quibus verbis expressa sunt hæc Dioscoridis Græca. Καλλίον δὲ καλεῖται τὸ ἐν τῷ ὕδατι. τὸ ἐν τῷ αἵματι δὲ τῶν ὀφθαλμῶν βυθῶν ἰατρῶν, ἵνα γινώσκουσιν, ὅτι τὸ παλαιὸν ὡς τὸ πρῶτον ἐστὶν ἀπὸ τοῦ αἵματος, ὅταν γινώσκουσιν, ὅτι τὸ παλαιὸν ὡς τὸ πρῶτον ἐστὶν ἀπὸ τοῦ αἵματος, ὅταν γινώσκουσιν, ὅτι τὸ παλαιὸν ὡς τὸ πρῶτον ἐστὶν ἀπὸ τοῦ αἵματος.

In quibus voces duas decisse putat Cornarius, ὕδατι σιδῆρος, ut sit legendum, ἵνα γινώσκουσιν, ὅτι τὸ παλαιὸν ὡς τὸ πρῶτον ἐστὶν ἀπὸ τοῦ αἵματος, ὅταν γινώσκουσιν, ὅτι τὸ παλαιὸν ὡς τὸ πρῶτον ἐστὶν ἀπὸ τοῦ αἵματος.

quæ sic conuerit, & extra mare posita, ut quæ a circumfuso nobis aëre velut ferrum ab aqua tingitur, siue compingitur. Cuius emendationis occasionem illi dedit, opinor, vox *Βαπτίζω*. Cum enim *βαπτίζω* tingere, intingere, immergere significet, inde suspicatus est Dioscoridem intelligere Corallium in aquis molle, inde extractum, ab ambiente aëre statim solidari, quemadmodum ferrum igni emollitum in aquam immersum, statim durefcere. Et certe vox *βαπτίζω* à Ruellio omissa est, qui sic locum hunc conuertit. Corallium marinum esse fruticem constat, qui alto extractus, duratur statim atque emergit, tanquam ossufo aëre protinus concrefcet. Idem Dioscorides locum, delectum, odorem & effigiem Corallij sic describit. Plurimum inuenitur ad Syraculas, in promontorio, cui pachyno nomen est. Optimum est, colore rubès, & colore simile antherico, aut sandyci saturatæ, quodq; facile rertur, æquabileque est roto concremento: præterea quod odore est musci marini, & simili algulæ siue Fuci marini. Ad hæc quod ramo-

CORALLI Frutex.




Indem.


sisimum est, & forma cinnamomum fruticem referat quod verò concremento lapidosum est, scrupulosum (sic Ruellius interpretatur τῷ χεῖρι *ψευδὲς*, id est scabrum, Plinium opinor imitatus, qui scabrosam conuertisse videtur. Cornarius legit *ὁ χεῖρ*, cum nullus color, inquit, *ψευδὲς* dictus, verumq; colore pallidum (cauernosumq; ac inane vitiosum esse putandum est, Plinius de eod. ita tractat. Quantum apud nos Indiciæ margaritis precium est, tantum apud Indos Corallio: namq; ita persuasio

Lib. 1. c. 97.

persuasione genrium constant. Gignitur quidem & in rubro mari, sed nigrius: item in Persico vocatur *Iace*. Laudatissimum in Gallico sinu, circa Stæchadas insulas, & in Siculo, circa Heliam ac Drepanum (Cornarius Æolias pro Heliam emendat) nascitur & apud Grauiscas, & ante Neapolim Campaniæ, maximèque rubens, sed molle, & ideo vtilissimum Erythris (vox Erythris plane supposititia est, & delenda, eodem Cornario auctore) forma est ei fruticis, color viridis. Baccæ eius candidæ sub aqua ac molles: exemptæ confestim durantur & rubescunt, quasi (legendum quæ, eodem emendatore) corna latius specie atque magnitudine. Aiunt tactu protinus lapidescere, si viuat. Itaque occupari euelliq; retibus, aut acri ferramento præcidi. Hac de causa curallium vocitatum interpretantur: probatissimum quam maximè rubens, & quàm ramosissimum, nec scabrosum, aut lapideum, vel iursus inane aut concuum. Auctoritas baccarum eius, non minis Indorum viris quibque pretiosa est, quàm fœminis nostris vniones indici. Aruspices eorum vateq; imprimis religiosum, id gestamen amoliendis periculis arbitrantur. Itaque & decore & religione gaudent. Priusquam hoc innotesceret, Galli gladios, scuta, galeas, adornabant eo. Nunc tanta penuria est vendibili merce, vt perquã rarò cernatur in hoc orbe. Hæc Plinius de Corallio: quod in mari Ligustico circa Stæchadas Mafsilientes insulas nasci Solinus etiam testatur: atque hodie quoque nascitur, ac in mari Siculo ac Tyrrhenio magna copia, cum Plinius de eius penuria conqueratur. Quod verò is de baccis tradit, falsum esse aiunt, quod nullæ omnino in Corallo baccæ nascantur, sed ex ramis eius ab artificibus torno & lima estingantur pro materia, & vt quibusvis visum fuerit in vsum aliquem efformare. Ad hæc Corallia cum ex mari extrahuntur, muscosa sunt vndiquaq; nec rubent: deinde artificibus tradita ita poliuntur, vt nitescant & rubeant. Præterea quod dixit Plinius, quod euellatur retibus, aut acri ferramento præcidatur dictum esse Corallium, id intelligendum dici Corallium, quasi curallium, *καὶ τὸν χρυσόν*, vel quasi *τὸ χρυσόν*, id est tonsura & præfectione captum: nec aliter Theophrastus quàm curallium appellat, à radendo, scilicet. Certe Corallium in mari ex succo lapidescente concrefcere, & priusquam extrahatur sub aquis, molle esse, ac vitescere, cum extractum est, aliàs rubere, aliàs niueo candore albescere, aliàs atrum esse constat. Isdem in locis candidū reperitur, non tam cōpactum, neque tam ponderosum, quàm rubrum, sed leuius ac rarum, & spōgiarum modo inane, sub iisdem Thyrrheni maris vndis euellitur. Appingitur etiam à Lobellio Coralloides, siue Corallij albi varietas, stipite longè crassiore, brachium æquante, & materia magis fungosa, multis acerbulis insculpta, aut inscripta. Vniuersa planta pedem vnum longa est, vixque cutbitum proceritate superat. Is verò Corallij frutex quem depictum proponimus saxo adhuc in hærentem, altera sui parte & surculosiore candicabat, minutisque foraminibus pertusus erat, altera in pauciores virgulas diuisa rubebat, & tubercula quædam, veluti baccas tuberosas ferebat, cornis latius non dissimiles. Quare immerito reptehenditur Plinius, quòd huic frutici baccas tribuerit, vt aliis arboribus

CORALLIVM Album
& rubrum, Lobel.





libidem. suos fructus. Quod verò Antipathes vocant, inquit Dioscorides, Corallium esse putandum est, specie solum differens. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Tale se Neapoli vidisse affirmat Matthiolus, eburnum colore referens: plantam eius aliam postea sibi dono datam, propè radices brachij ferè crassitudine, à medio truncò in ramos sese diffundentem, rem quidem raram, & aspectu pulcherrimam. Masiliæ intet Corallia occurrit, insigni læuore perpolinum, colore nigerrimo. Deinceps de Corallij vsu & viribus dicendum. Coralliū adstringit & refrigerat moderatè, auctore Dioscoride, reprimat extuberantia, & cicatrices in oculis exteriorè replet etiam caua, tedundant hic voces dux *ῥῆγιδας* ex præcedente versu repetit: Cornarij sententia. Ruellius eas retinet: vertit enim, vlcerum caua & cicatrices explet.) Ad sanguinis reiectiones maximè efficax est, & in vniuersa difficultate conuenit. Splenem quoque liquat cum aqua potum. Antipathes eandem vim habet. Hæc Dioscorides. Candidum creditur longè magis quàm rubrum refrigerare. Plinius de eiusdem vsu partim etiam hodie vulgo nota, parum eadem quæ Dioscorides habet. Surculi, inquit, infantiz adalligati, tutelam habere creduntur, contraq; torminum, ac vesicæ & calculorum mala in puluerem igne redacti, potique cum aqua auxiliantur. Simili modo ex vino poti, aut si febris sit, ex aqua somnum adferunt. Ignibus diu repugnant. Sed eodem medicamine sepius poto tradunt, lienem quoque absumi sanguinem reicientibus, excreantibusve medentur. Cinis eorum miscetur oculorū medicamentis: spissat enim ac refrigerat: vlcerū caua explet, cicatrices extenuat. Hæc Plinius. Coralliū, inquit Matthiolus, comitialibus commodè adalligatur, hauriendūque præbetur. Aëdes, vt aiunt, à fulminum iniuria tuetur: mensium abundantiam cohibet, dentes comotos firmat, desquamatas gingiuas emendat, oris vlcera sanar: poru dysentericos iunat, seminis profluuiū in viris, in feminis alba vteri profluvia reprimat. Recèsetur ab Auicenna inter ea quæ cordi hilaritatē adferūt. Corallij Galenus in lib. simpl. medica. non nūcminit, sed lib. 7. de compos. medicam. local. multa describit medicamenta ad incipientem phthisim, ad hæmoptoicos, ad suppuratos, quæ Corallium recipiunt.

*In cap. 97.
lib. 4.*

*Viris &
Temper.
libidem.
Embl. 109.
lib. 4.*

Lib. 31. c. 1.

*In cap. 97.
lib. 4.*

KALI,

CAP. XIII.



AVITANT plantam quasdam Kali & Alkali vocant, ex quibus vltis sal fit, Salkali ab iisdem dictum. Tres huiusmodi cōgeneres & maritimas recenset Pena, quæ crithmum, inquit, representare quibusdam videri possent, nulla tamen antiquis videtur nota fuisse aut descripta

KALI Magnum, Pena.



KALI Maus, Pena.



tantum abest ut Salkali, quod vocat, ex vna istarum vltis, & quod magis mirum est, fusa fieri nouerint, vix tacituri si sciuisent. Quare ut nomen, sic & plantam ipsam, & modum salis istius parandi videmur Græcis recētoribus, aut philosophis Arabicis, Chymistis & Hyalurgis debere. Prima species hic picta notior est in maritimis Galliæ Narbonensis, vbi tum sponte, tum facta campos maritimos frequenter caulium rubentium operit purpura, fruticat caule cubitali & sesquicubitali, carnosio, portulacæ concolori, foliis densis, angustis, semperuiui medijs siue minoris, teretifolij duplo longioribus, acutioribus, inter quæ semina limacæ pusillum vel spiram imitantia, colore fusca, folliculis malux feminis ritu oclusa. Hanc dudum sic depinximus. Minus obuia hæc Septentrionalibus, imo nuspiam ferè. Istius copia per initia Autumnii coaceruatur mæxæ instar, super serobe cui ligna insunt decussatim instructa, quibus accensis herba vitrit, & biquatur, & in profundum serobis defluit, vbi cogitur in glebam coloris nigricantis vel cinerici, quod Kali & Alkali sicuti & herbam nominant, Galli Soude, ad vitrum conflandum, quod in Italiam & Septentrionem ex Gallia Narbonensi & Aquitania deferitur. Vitrit non secus ac Cauticum. Eosdē ad vsus sedulo colligunt maritimi coloni Narbonenses secundam hic pictam, iisdem natalibus, sed folijs & caulibus minoribus multo, minusque carnosius, angustioribus, nec ita rubentibus, sed ex pallido virentibus, vnde vulgo blanchette quasi Kali album vocatur. Semen exiguum, nigrum, vtricæ aut acetosæ. Non solum calidioribus regionibus, sed etiam ad Septentrionem, Angliæ, Northmanniæ, Belgio familiaris. Multo frequentissima est in quibuslibet maritimis oris tū Oceani tum mediterranei maris, quæ Salicornia vulgo vocatur, siue Kali geniculatum, sed effigie multum diuersa, & cuius folia videntur esse teneriores ramulorum. Sunt enim e radice fibrosiore permulti cauliculi cubitales, recti, densius geniculati, extremis quasi folijs crassis, pinguibus, carnosius, teretibus, rubentibus, per



SALICORNIA, siue
Kali, Mattholi.



Lib. 16. 76.

Enarr. 170.
in lib. 9.
Diosco.



In cap. 11.
lib. 1.

crebra genicula inferis, & pyxidatim quasi par-
uorum alabastrorum instrat, quadā equi-
mitudine, & cornua recta, obrusius mucina-
ta imitantibus, gustu non insulso, nec tempe-
mento aut vsu à cæteris dispari, sed vbique ne-
glecta. Semen nullum profert. Dodonæus uia
Kali assignat genera. Primum est, secunda An-
thyllis, secundū, Tragus Dioscoridis, Tertium,
Salicornia, cuius picturam dat ab ea quam hic
ex Pena expressimus, plurimum distantem.
Amatus Lusitanus scribit omnem cinerem qui
ex Syria aduehitur ad conficiendum saponem,
& vitrum, ex herba anthyllide combusta fieri,
hodièque multos ignorare cinerem istum Al-
kali esse: omnes istas herbas abstergendi vires
habere, ac stigmata & maculas faciei delere.
Quod ex istis dum vruntur, liquatur & tãquam
plumbum fluit, cum refrigeratum est, concre-
scere, & veluti cineres conglobatos esse, quos
etiam Alumen Catinum vocant, ex quo vitra
conficiuntur. Hos si quis an veri sint experiri
voluerit, in ignem coniciat: quod si eliquan-
tur ac ebulliant, verum Kali esse dicet, sin mi-
nus, contra. Ex horum cinerum lixiuio sal Alkali cõfici, & ex vitri materia fluit &
cogitur, æungia vitri hodiè nuncupatur, Gallicè *Sein de verre*. Matthiolus duas
Kali species tum sua deliniatione, tum pictura, in vnã cõfundit, scilicet Kali ma-
gnum sedi minoris folio, Gallis *Soude* nuncupatum, & id quo de hic agitur, quod
salicornia vel Kali geniculatum nominatur. Pictura hîc videtur, delineatio eius est
eiusmodi.

eiusmodi. Cum primum, inquit, è terra emergit, folium est tereti forma, minori se-
de non abfimile, atque deinde crescens caule erecto, geniculato, non multo post
tempore in digralem ferme longitudinem attollitur, cum vero amplius adoleue-
rit, geniculis folia mittit pingua ac crassa, in medio caua, & ex lata origine mu-
cronata, vbi denique planta adulta senescit, folia in caulium cacumibus longe
minori exilioraque conspiciuntur colore rufo: ex quorum ortu pilula prodeunt
rotundæ ac paræ, quibus exile semen includitur. Caules habet pingues & rufos.
Hæc Matthiolus.

CRITHMI SPECIES, Matthioli. CAP. XIII.

ILLI subiuagenda tertia Crithmi species à Matthiolo tradita, quæ in capitulis
lib. a. Formæ
in maritimis prouenit, & ab vna radice multos emittit caules, rectos,
circa quos folia habentur, per intervalla tamen plura ex vna origine
acuatim prodeuntia, longiuscula, crassa, & salso etiam gustu, sub ho-
rum caulis peculiariter quoddam erumpit folium, cæteris duplo longius, vnde pro-
pe caulis cacumem pediculus exit, è quo sex, sept. inue folia breuiora prodeunt, vt
etiam appata effigies ostendit, flores fert in cacumine orbiculatos villososque, colo-
re pallido. Radice nititur longa, tereti, non sine adnatis. Hæc est ex Matthiolo
huius herbe delineatio, quæ nihil prorsus cum Dioscoridis Crithmo similitudi-
nis habet. Crithmum enim foliis fruticat pinguibus, longioribus & latioribus

CRITHMI SPECIES
Tertia, Matth.

CRITHMV M Chrysanthemum,
Dodonæi.



quam portulacæ, salis, floribus candidis, &c. Quare alij herbarij minimè Crith-
mum esse censent. Lobellius litoreum Chrysanthemum appellat, Asterem Atti-
cum marinum. Crithmum Chrysanthemum Dodonæus exhibet huic simile, si
non idem, sed flore quantum ex Micone perspicere licet, differens: habet enim in
cacumine ramulorum florem Chrysanthemi æmulum, & medio videlicet disco,
& orbiculato ambitu luteum, & Crithmum verò tertium Matthioli scribitur habe-
re orbiculatum, villosumque, colore pallido.

ANTHYLLIS, CAP. XV.

Nomina

Genera.

Diosc. lib. 3.
cap. 146.

Fermus.

Lib. 2. c. 39

Lib. 2. c. 7.



Ἀνθύλλιον Græcis dicitur, & Latinis Anthyllis, Plinio Anthyllion quam alij Anticellion vocant, inquit. Videtur autem ἀνθύλλιον ἔπει τὸ ἀνθίσθαι dicta, nempe à floreſcendo, qualiſi florida, à lanugine cana qua pubet: vel à ſtoſculorum elegantium copia. Anthyllidis genera duo ſunt Dioſcoridi, Plinio, Galeno. Quædam enim folia lenti ſimilia habet, ramulos palmi altitudine, rectos, folia mollia, radicem tenuem, & parvam. Naſcitur in ſalſuginolis locis & apricis, guſtanti ſubſalſuginola. Altera foliis & ramulis chamæpityi ſimilis eſt, hirsutioribus tamen, breuioribus & aſperioribus, ſtoſ eſt purpureus, vehementer grauis odoris, radix velut cichorii. Plinius in paucis a Dioſcoride diſſentit. Eſt & herba anthyllion, inquit, quam alij anticellion vocant, duorum generum, foliis & ramis lenticulæ ſimilis, palmi altitudine, ſabuloſis, apricis naſcens, ſubſalſa guſtanti. Altera chamæpityi ſimilis breuior & hirsutior, purpurei ſtoſis, odoris grauis. Hic ſabuloſis dixit, quod Dioſcorides ὑπαλμυρίς, id eſt, ſalſuginolis. Anthyllidem priorem hic depiçtam Dodonæus eſſe putat, à lente foliis & caule parum diſtantiem, niſi candidior, mollior, & minor eſſet. Caulis eſt pedis altitudine, albus, tangenti ſuauiſ, folia explicata, mollia & alba, minora & denſiora quam in lente ſtoſculi: in caulis ſummitate congeſti, palliduli aut lutei: ſemen in paruis ſiliſquis: radix tenuis & lignoſa. Perquam affinis eſt aut eadem hic appiçta Medica

ANTHYLLIS Prior,
Dodonæi.ANTHYLLIS Altera,
Dodonæi.

marina à quibuſdā dicta. Anthyllis altera Dodonæi à rectioribus quibuſdā Borda dicta Kali ſpecies, vt multi exiſtimant, quinos, ſenos, pluſve ramulos emittit, graciles, per humū repentes, foliolis veſtitos, anguſtis, denſis, inter quæ & ramulos ſtoſculi emergunt purpurei, deinde ſemen, radix gracilis eſt, digitali lōgitudine. Tota ſucco plena eſt, eoq; ſalſo. Salſuginolis ſabuloſiſq; locis & litoribus marinis Zelandiæ frequens. Iunio meſe floret: Iulio ſemen maturum eſt. Deſiccatur, & vulneribus glutinandis

Locus.

glacinandis est utilis. Anthyllides alias Pena exhibuit: primam quæ in Angliæ insulis australibus, ea præsertim quæ Portlandia vocatur, litore Nortmanniæ obuerso plurima & pusilla prouenit in sabuletis & arenosis vadis depressis & apricis, ramuli palmum trësve vneias longis, angulosis, pallentibus, foliis lenticulam vel alfinem minorem referentibus, flosculi cauliculis summis insunt ex buxeo herbacei, denum stellati sedis minoris Iunio & Iulio: semen tithymali in petexiguis & triquetris thecis alit, radix prolixior est, exilis, geniculata, sabulo altè infossa foldanelæ modo. Tota farsa est, gustanti amaricat, & parum quiddam calfacientis indicat. Alteram quæ in maritimis agri Nitrobrigum ad vicum Peraus dictum, & Lacteria passim reptat vti superior, ramulis compluribus, setiquipalmaribus, foliolis al-

ANTHYLLIS Portlandia
lenticula, Pena.

ANTHYLLIS Marina Narbonens.
Alfinæ folio, Pena.



ANTHYLLIS Valentina, Clusij.



sinæ, aut potius lenticulæ, sed per intervalla quadam, quasi citè genicula exortis, numerosis: copiosisimisque item flosculis, in summo aggregatis, mucosis, albidis, floridum quasi nomen Anthyllidis ostentantibus & testibus, seminis etiâ pusilli feracissimis,

gustu amaricante, subfalso, nitroso, calidiusculo. Tertiâ quæ iisdem locis maritimis tepit, cæteris multò falsior, foliis & facie est herniarie aut chamæsyce, flosculi pusilli subter foliola ex albo purpurascètib; semina in florum calyculis quàm clinopodij

clinopodij minoribus multo occluduntur. Tota gustu salso, acidulo, lactei succi ex-
pers & exuccas, nec proinde Chamælycz statuenda, vt quidam prodiderunt. Ad
hanc accedit, aut eadem est Anthyllis Valentina à Clusio descripta & picta, quæ
cauliculos multos ex vna radice profert, dodrantes, ramosos, humi stratos, subru-
bentes: foliola Lentis exigua, seu potius Chamælyces, salso gustu, & plerumq; cum
suis ramis veluti quadam salugine respersa: flores inter ipsa folia pusilli, quatuor
foliolis constantes, ex albo purpurascens: radix singularis, nigricans. Tota cha-
mælycz adeo similis est, vt primo aspectu Chamælycen putarit, lacte tamen caret.
Hanc nusquam se vidisse meminit, quàm ad fossas vrbis Valentia in Hispania. Illic
Anthyllidem D. Placa vocabat, & ad primum genus à Dioscoride descriptum re-
ferebat: cui Clusius non assentitur. Etsi enim reuera inter Anthyllidas recensenda
sit, prima tamen esse non potest quæ rectis
ramulis assurgit, cum hæc repentes habeat ra-
mulos, totaque facie Chamælycem propemodum referat. Hæc auctore Lobellio, conimi-
li facie cum Herniaria & Chamælyce in vine-
tis & oliuetis Boutonetum versus, & Castrum
nouum fuscæ humi spargitur, cauliculis palma-
ribus & dodrantalibus, rosuli ex albo purpu-
rascunt, quatuor foliis constati. Hanc olim
cum aliis Chamælycen alteram putamus, sed
non lactescit, gustu salso, praticco. Anthyl-
lides, vt scribit Dioscorides, potæ drachmas
quatuor vrinæ difficultati, & nephriticis plu-
rimum auxiliantur. Tritæ vuluæ pituitas emol-
liunt cum rosaceo & lacte imposta (Sic Ru-
lius ex mendoso codice vertit. Legendum ve-
rò ἐκμαλφόνων φλεγμονῶν ἐν ὑγίειαν, id est,
rursus emolliunt vteri phlegmonas, &c. Quæ le-
ctio rationi magis consentanea est. nam pituitæ
expurgantur, phlegmonæ emolliuntur) vul-
neribus medentur. Quæ chamæpityi similis
est, præter alia etiam comitiales sanat cum ace-
to mulso pota. Plinius ampliorem eius usum
medicum descripsit, & nonnihil a Dioscori-
de dissentit. Prior Anthyllis, inquit, vuluis aptissima, & ex rosaceo & lacte imposta
etiam vulneribus. Bibitur in stranguria, renumq; doloribus tribus drachmis. Alte-
ra bibitur in duritia vuluarum, & in torminibus, & in comitali morbo, cum mel-
le & aceto quatuor drachmis. Repetit eadem alio in loco. Anthyllion est lenti si-
milissima, quæ in vino vesicas vitæ liberat, sanguinem sistit. Altera est Anthyllis
chamæpityos similis, &c. Scribit & idem Anthyllides duas esse vuluis vtilissimas,
torminibus, & more secundarum in vino potas. Dioscoridi Galenus assentitur.
Anthyllis, inquit, duplex est, sed vtræque modice desiccata, vt & vlcera glutinet. Ex-
terum altera chamæpityi similis quadamrenus subtiliorum est parrium, adeo vt
& comitalibus competat. Quin & ipsa magis quam altera extergere potest.

ANTHYLLIS Marina
altera Narbonens. Pena.



Lib. 4. cap. 16.

Lacum.

Lib. 4. cap. 19

Lib. 4. cap. 18.

Lib. 4. cap. 16.

Lib. 4. cap. 16.

ERVCA



FOLIORVM similitudine & odore hæc ab herbariis Eruca vel Artemisia cinerea nuncupata est, quæ in maritimis Corcix prope Aiacem gignitur, radice modice fibrata, crassa, caule setquipedali, anguloso, lanugine candida, & molli confecto foliis Eruca siluestris, aut Artemisiz minoris profundius incis, auersa parte candicantibus, aduersa cinereis, lanuginosis, densis: flore in vertice caulium, & ad superiorum foliorum exortum velut racemati congesto, spissa lanugine, incano, nigris punctis maculoso, odore & sapore Artemisiz, cui similes vires habere putatur.

Nomen.

Locus.

Forma.

CINERARIA, CAP. XVII.



TOTIVS plantæ colore cinereo vocata Cineraria, in maritimis prouenit, procera, furculosa, & ramis multis fruticante, lignosis, duris,

Nomen.

Locus.

Forma.

solo Artemisiz, sed crassiore & ampliore: flore luteo, senecioni simili, copioso, virgulis insidente, in quas caulis fastigium diuiditur. Qui procul hanc plantam aspexerit Cineseo candicantem, & tanquam lanugine opertam, eam cinere totam conspersam de industria obductamque iudicauerit, non iniucundo spectaculo, quare Cinerariæ nomen ei ab herbariis inditum est. Vnicum eius ramulum depinximus, Pena plantam integram, rariorem, & littorum marinorum indigenam, maiorem fru-

CINERARIA.

IACOBÆA Maritima, Pena.



BBB

IACOBÆA Marina,
Dodona.



ticosiorēmq; senecione, pluribus virgis duris, & foliis maioribus, profundiusq; incisīs & sinuatis vt Artemisiæ rigidioribus, crassioribus, cinereo romento obductis, vt & reliquæ partes. Flores sunt melini, iacobææ senecionis pappi diffuētes. Exsiccat valde, digerit, & inodora est, sed platarum maxima pars quæ in littore maris, aut non ita procul crescunt & aluntur, eum serè colorem cōtrahunt, siue falsi vaporis afflatu quem mare allidit, siue alimenti salugine id fiat: pereunte, non solum languescēte colore illo eum in hortos translata coluntur, vt in absinthio seriphio marinove obseruare licet, quod in littore maris albicat, in hortis educatum mutato colore, herbaceo virore pallet. Alius est Senecio marinus quorundam, iacobææ marina Dodonæ, quæ & Artemisia marina à nonnullis dicitur, iacobææ maiori quadantenus similis est, sed huic cauliculi non rubent: foliis est minoribus, cãdidioribus, profundius & minutius insectis, flores etiam similes, tamen pallidiores: radix est longa, fibrata, serpitque furculos multos producens. Locis mari proximis crescit.

ASTERIAS SIVE STELLARIA.

CAP. XVIII.

Nomina

Lib. 21. c. 17

Locus.

Forma.



ASTERIAS siue Stellaria nomen est multis plantis commune. Hoc enim nomine donantur Bubonium, Coronopus, Alchimilla, Cardui genus Theophrasti Myachantha, perdicij quoque alterum genus à Plinio Astericum quasi stellare nominatum. Præter omnes alias sua est Monspelienfibus Asterias siue Stellaria hic depicta herbula, haud procul à mari in salis fabuleris proueniens, radice superuacua, pilo vix crassiore: caule dodrantali, tribus aut quatuor exiguis ramulis furculoso: foliis galij, breuioribus & angustioribus, stellatim per intervalla caulem ambientibus, vt in aparine: flore rubro, minimo, in stellulis hirsutis micante. Siue foliorum ordinem, siue florem intuearis, vbique stellarum effigies occurrit. Quapropter Asteriam siue Stellariam nuncupant.

SPERG

SPERGULA MARINA,

CAP. XIX.

CASSIA Ligneæ,
Maritima.

SIMILITUDO quæ huic herbæ est cum *Nomen.*
Spergula vulgari locis vmbrosis, incul- *Locus.*
tis, atque etiam aliquando cultis na- *Forma.*
scente, fecit vt Spergula marina dice-
retur, quod in maritimis proueniat, hoc illi di-
similis, quod ad caulium articulos pauciora, bre-
uiora, & candidiora folia ferat, quodque gustu sal-
so sit, vt cæteræ plantæ quæ marinam aquam pro-
liciunt.

CASSIA LIGNEA MARITIMA,

CAP. XX.



CASSIAM ligneam herbarij plantam *Nomen.*
istam vocant, cuius nominis causâ mi- *Locus.*
hi adhuc est incognita. In mariumis *Forma.*
crescit, radicibus copiosis, densis:
caulibus multis ex vna radice prodeuntibus, fur-
culosis, lentis, fractûque contumacibus, virgatis:
foliis lenticulæ numerosis, per furculos inæqua-
liter dispositis, gustu adstringentibus. In ramu-
lorum & furculorum verticibus fructus exi-
guus eminet, oblongus, niger, vmbilicatus,
ita gustu adstringens, vt acerbicatis nonnihil
habeat. Quidam genistæ marinæ genus esse
putant, licet siliquas nullas edat.

ERYTHRODANVM Marinum,

CAP. XXI.



ESIMILITVDINE etiam erythro- *Nomen.*
danum marinū nominatur, quod *Locus.*
in litoribus arenosis gignitur, ra- *Forma.*
dice prælonga, è rufo rubescen-
te, lignosa, furculosa: ramulis multis in or-
bem humi stratis: foliis rubiæ minoris, ex in-
teruallis ramulos verticillatim ambientibus,
rigidis: flore pusillo, herbaceo, ex foliorum
aceruo prodeunte, filis tenuissimis subnixo.

ERITHRODANVM

Marinum, Dalech.

POLYGONVM MARINVM,

CAP. XXII.

Stem.

Leaves.

Flowers.



POLYGONVM Marinum

prur., Dalecham.

MARINVM Polygonum ab herbariis planta hæc vocatur, quod rami ut in Polygono alio per terram spargantur, folisque Polygonum vbiuis nascens imitetur. In littoribus & locis quæ maris fluctus alluit, gignitur, radice e rubro nigricante, crassa, lignosa, paucissimis fibris capillatata, sensim gracilecente: caulibus multis, humi stratis, in orbem diffusis: foliis densis, nigricantibus, intervallo dispari caules ambièntibus, Polygono affinibus, sed myrto proximioribus, singulotum foliorum exortum membranofus cortex & candicans cõtègit, quasi decidui aut renascèntis foliis folliculosa squama. Semen nòdum mihi visum. Aliud Polygonum in maritimis fruticet, radice lignosa, nigricante, modicè fibrata, caulibus multis, vno & altero cultu proceriorib⁹, cortice subrubro vestitis, amosis: foliis admodùm densis, ramos & furculos oporientibus, Polygono mari similibus nòntul angustioribus & longioribus, gustu in maricinus

POLYGONVM Marinum

alterum, Dalecham.

salso, alioqui adstringente. Herbarij quidam Polygonum silvestre a Plinio descriptum esse putant. Quartum genus, inquit, silvestre appellatur, penè arboris modo frutex, radice lignosa iturpe cedri rubicundo: ramis sparti binum palmorum, nigris gentianorum ternis quaternisve articulis, fuere qui Aizoum marinum vocauerint.

GNAPH

GNAPHALIVM MARINVM,
CAP. XXIII.

GNAPHALII nomine plantas aliquor donarunt herbarij, ob densam lanuginem qua operata sunt earum folia, cuiusmodi hæc est quæ in litoreis sabuletis provenit, radice lignosa, subatra, crassiuscula: caulibus multis, palmum alris, foliis satis densis, gracilibus, longis, angulatis, acuminatis, rarissimarini ferè aspectu, incanis. In caulium singulorum verticibus capitula emicant squamatis compacta, turbinata: flos luteus, in pappos abit prolixos, densos, pictorum penicillis similes. Num hæc impia herba Plinij potius fuerit? Sic enim ille. Herba impia vocatur incana, rarissimarini aspectu, thyriformi modo vestita, atque capitata: inde alij ramuli exurgunt sua capitella gerentes: ob id Impiam appellare, quoniam liberi super parentem excellant. Alij potius ira appellatam, quod nullum animal eam attingat, existimare. Est aliud Gnaphalii genus in

Nomen.
Locus.
Forma.
Lil. 14. c. 19

GNAPHALIVM Marinum,
Dalechampii.

GNAPHALIVM Marinum
Tomentosum.



mantimis quoque proveniens, tomentosum ab herbariis cognominatū à densiore lanugine qua totum oblitum est, vt si qua alia plāta, certè hæc Gnaphalii nomine sit dignissima. Radice nictitur crassa, longa, lignosa, sæpius exesa: caules edit multos, sesquipedales, foliis circūtectos mollissimis, albis, rutaceis, verum paulò amplioribus, cana lanugine contextis, gustu adstringenti: flores in summis caulibus congestos, luteos, corymborum specie. Ad dysenteriam vtiliter folia trita ex aultero vino bibuntur.

TRAGVS SIVE SCORPIO MARITIMVS,
CAP. XXIIII.

RAGUM & scorpionem de multis plantis dici ex Plinio intelligere licet scribente, In rorum spina est asparagus, scorpio, nullum enim tolicum habet, quod de scorpione Theophrasti accipiendum, qui Nepa Latine à Gaza dicitur. Er alio in loco. Tragon & Asia ferr (vulgati

Nomina
Lib. 2. c. 11.
Lib. 6. c. 11.
cap. 1.
Lib. 19. c. 11.

BBB 3

codices Tragion habet sue Scorpionem, veprem sine foliis, racemis rubentibus ad medicinę vsum. Ex rursus. Est & alia herba Tragos, quam aliqui scorpionem vocat, semipedem alta, fruticosa, sine foliis, pusillis racemis rubentibus, grano tritici, acutro cacum ine, & ipsa in maritimis nascens. Quib⁹ in locis de Trago loquitur de quo

Lib. 4. c. 45. *TRAGVS sine Scorpio maritimus, Dalechamper.*



Lib. 4. c. 45.

Lib. 4. c. 45.

Cap. 86.

C. 45.

Lib. 4. c. 45.

TRAGON, Marshallia
Lebellio.

Locu.

Forma.

Lib. 4. c. 45.



hic agimus. Item, Ex argumento nomē accepit Scorpion herba. Semen enim habet ad similitudinem caudæ Scorpionis, folia pauca. Est & alia eiusdem nominis affectusq; sine foliis, aspera rami caule, in cacumine aculeum habens, & inde nomen. Vbi prioris scorpionij nomine heliotropium magnum intelligit, quod tamen Dioscorides non Scorpion, sed Scorpionum vocat, & florem habere ad similitudinem caudæ Scorpionis, non semen scribit, ut ipsius etiam rei inspectio demonstrat. Postremo Thelyphonon etiam Scorpion vocat. Thelyphonon, inquit, ab aliis Scorpion vocatur, propter similitudinem radices, &c. Quod de Theophrasto manifestum est. Est & Tragos cerealis, de quo Dioscoridis lib. 2. Hic verò de Trago tractamus maritimo, de quo idem lib. 4. quem aliqui, inquit, Scorpion vocant. Dicitur autem Tragos ut & cerealis ille, non ab hirci aut odore, aut aliqua alia similitudine, sed à τῷ ἴσχυρι, id est, a comedendo, unde & trogonon vocari testatur Dioscorides, id est, edule, unde etiam τῷ ἴσχυρι. Latinis Bellaridicta, Gallis *Dragee*. Est autem Tragus verus primum à Dalechamperio cognitus, & amicus communicatus, atque ita descriptus antequam recentiorum vllus de eo quicquam literis mandasset. Herba maritima in arenosis tumulis & littoribus gignitur, fluctu maris allidi & obruitur, radice crassa, lignosa, longa, cortice fusco vestita: foliis nullis, ramulis quamplurimis, palmo altioribus, genistæ modo laevibus, & gracilibus, instar equiseti geniculatis, cacumine pungentibus, adnatis multis, vertice quoq; subulæ instar tractantium manus perfodientibus: flore minutulo, candido, in oblongum sertum coaceruato semine grano tritici magnitudine pari, anguloso, principio rufo, postea nigrescente, in singulis loculis herbaceis gemino, pediculo ad ramulorum alas subnixis, gustu adstringente. Quæ omnino cum Dioscoridis delineatione conveniunt. Tragus, inquit, nascitur maximè iuxta mare, frutex parvus, per terram oblongus, non magnus, palmi altitudine, aut maior, foliis caret. Verum in ramis adherent veluti acini parvi, rufi, magnitudine tritici, cacumine acuti, multi, gustu valde adstringentes. Plinius iis quos

supra

supra citauimus locis similiter feriè depingit, nisi quod veprem esse ait, & rubètes racemos edere, cum veteres, nec sentibus nec vepibus adnumerarint, licet extremo cacumine pungar, nec rubentem fructum ferat, sed *myrtus*, id est rufum. Huius fructus acini nimirum decem, inquit Dioscorides, in vino poti, cœliaci & feminis fluxione vuluæ laborantibus auxiliantur. Quidam ipsos tundunt, & pastillos ex ipsis fingunt, quos reponunt, & sic vtuntur. Plinius ramorum cacuminibus, quod Dioscorides acinis, tribuit scribens. Huius ramorum decem aut duodecim cacumina trita ex vino pota, cœliaci, dysenterici, sanguineni exereantibus, mensium abundantia auxiliantur. Matthiolus Tragum hunc maritimum, siue Scorpium Dioscoridis eundem cum scorpio facit, de quo hæc Theophrastus. *Eno aculeatorum alia ex toto aculei sunt, ceu corruda & scorpium nepam reddidit Gal.* hæc enun nullum præter aculeum folium habent. Similiter de eodem scorpio Plinium loquentem, citat duobus locis, videlicet. Est & herba Tragos quam aliqui scorpium, &c. Et spinosarum multæ species, &c. Cum hic de scorpio Theophrasti intelligendus sit, ille de hoc Dioscoridis scorpio, siue Trago longe diuerso. Tragus autem quem Matthiolus depinxit, (de quo in lib. De Spinosis) Dioscoridis Tragus non est, sed Kali spinosum propius ad eam speciem accedens, quam *crithmum* alterum faciunt est enim succulenta herba, nulli os acinos rufos habet, tritico pares, supernè acutos, numerosos, magnopere adstringentes: quæ omnia Dioscoridis Trago insunt, quem sine foliis & spinis ille descripsit. At Tragon Matthioli folia Aizoi carnosa habet, spinis horrida, astringentem penitus nullam. Hoc sic expressit Lobellius, hgura à Matthioli pictura & satis diuersa.

TRIPOLIVM DODON. CAP. XXV.



ΠΙΠΟΛΙΟΝ Græcis, similiter Tripolum Latinis, Serapioni *Turbuh* dicitur, non illud quidem Mesues & Aucennæ *Turbuh*, sed aliud quod ab illo plurimum distat. Vulgare eius nomen nullum, quod sciam, nisi quod nonnulli *Camomille bleue*, vel *Marguerite bleue*, c. 130, f. 107.

TRIPOLIVM, Dodon.



non recte vocant, cum neque in chamæmeli, neque in bellidum generibus sit: ferunt autem vocatum Tripolum, quod flores rei die colorem mutet. Hic ex Dodonæo depingitur, & describitur ab eodem foliis longis, latis, viridibus, læuibus & lubricis, glasti foliorum effigie, inter quæ caulis erigitur rotundus, sesquipedalis & maior, similibus foliis vestitus, nili minora essent, circa summum in multos ramulos fissus, in quo flores venusti, purpurei antequam dehiscant, hiantes verò lutueam intus coronam ostendant, foliolis cæruleis eam ambientibus, effigie chamæmeli floribus similes: quibus depereuntibus succedit semen hirsutum, candidum, quod in auris abieradix longa est, crassa, crassiusculo cortice amicta. In litoribus maris mediterranei & Oceani copiose provenit, quæ æstus maris reciprocus sæpe alluit, vt aliquando aquis obruatur, aliquando in secco hæreat. In Zelandia magna copia inuenitur. Tripolum vulgare, & Tripoliū litorèi vocat Lobellius & Pena. Iulio & Augusto mensibus Lib. 1, cap. 10. Formæ. Locu. Tempus.

TRIPOLIVM Vulgare,
Lobell.

Lib. 4. cap. 10.

Vires.

Lib. 16. cap. 7.



Lib. 16. cap. 7.

TRIPOLIVM Minus,
Lobell.

Lib. 9. hist.
cap. 11.

Lib. 9. cap. 10.



Coruar.
Embl. 17.
lib. 4.

floret. Quæ omnia satis apte Dioscor. Tripolio congruunt, sic scribentis. Tripoliū nascitur in maritimis locis, quos aluit mare, & refluit, neque in sicco, neque in mari. Folia habet, satidi similia, crassiora ramē, caulem palmi altitudine, superne diuissum. Narrant huius florem ter die colorem mutare, mane album, meridie purpureum, vespere Phœniceum. Radix alba est, odorata, calidi gustus. Hæc pora in vino drachmarum duarum pondere, per aluum aquam ducit, & vrinas. Secatur etiam in alexipharmaca. Plinius, Tripolium, inquit, in maritimis nascitur saxi, vbi allidit vnda, neque in mari, neque in sicco, folio satis crassiore, caule palmo alto, in mucrone diuiso: radice alba, odorata, crassa, calidi gustus. Datur hepaticis in farre decocta. Hæc herba eadem videtur quibusdam quæ polium, de qua suo loco diximus. Hæc Plinius. Qui sanè & ipse ex iis est qui polium cum Tripolio cōfundunt. Quod enim Theophrastus de Tripolio, id Plinius de polio scripsit, Muscum & Hesiodum citans his verbis, Saliuncā vestitus interponi grarissimum, sicut apud Græcos polium herbam, inclytam Musci & Hesiodi laudibus, ad omnia vtilem prædicantium, superq; cætera ad famam etiam ac dignitates proferri miram, si modo, vt tradūt, folia eius mane candida, meridie purpurea, sole occidente cærulea aspicuntur. Duo genera eius, campestre maius, siluestre quod minus est. Quidam Teuthnon vocant. Folia canis hominis similia à radice protinus, nunquam palmo altiora. Theophrastus verò. Καὶ ὅς ἐστιν φασὶν, inquit, το νεώτερον καὶ ἡσυχώτερον καὶ μεσώτερον, ἔστι τῶν ἀπὸ γῆρας ἀνδρῶν χρῆσιμον ἔστιν αὖ. Διὰ τὴν ὀπρὸν τὴν αὐτὴν νύκτιν, σκεπὴν ἀνελκόμενοι. Id est, Et, vt aiunt, Tripolium Hesiodo & Musco auctoribus, ad omnē rem sertam peragendam vtile: quare id effodiunt nocturna bernaculo structo. Sic aperte Plinius polium pro Tripolio conuertit. Gaza tamen Plinium fortasse secutus polium etiam reddidit. Quod autem Plinius adiicit, superq; cætera ad famam etiam ac dignitates, &c. Et quod rursus aliquot post ad idem polium refert, Polio, inquit, Muscus & Hesiodus perungi iubent dignationis gratia, gloriæq; audios polium tractare, colere.

Id, inquam, male intellectum, neque ad polium pertinens ex Theophrasto peruerit, vt declarāt ipsius Theophrasti verba, quæ modo citata proximè consequuntur. Καὶ τὰ ἀπὸ τῆς ἀλκίας αὐτὴ καὶ ἀπὸ τῆς ὀπρὸν καὶ μεσώτερον. Ἀλλὰ γὰρ φασὶν ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ ἀπὸ τῆς, &c. Qui locus vt rectius intelligatur, scire licet Theophrastum de cœno-

thera

thetæ cuius radices è vino datæ mores mitiores hilarioresque efficiunt locutum, subiungere. Non videtur autem hoc absurdum. Nam velut assumptio quædã fit eius quod vinosam vim habet. Verum stolidiora illa & magis incredibilia (legendum enim *Amphipragy à pedibus*) & amuleta, & omnino alexipharmaca, & quæ corporibus, & quæ domibus adhibentur: & vt aiunt, Tripoliũ ex Heliodi & Mufci sententia, ad omnem rem grauem aggrediendam vtile esse. Quare etiam noctu tentorio fixo ipsum effodiunt. Sed & ea quæ ad bonam famam, ac existimationem pertinent similiter, & adhuc magis. Bonam enim famam dicunt facere antirrhinum, &c. Præterea foliorum polij colorem ter die mutati scribit Plinius, quod de Tripolij floribus tradidit Dioscorides. Tripolij breuissime meminit Galenus his verbis. Tripolij radix gustanti acris est, & facultate calida in tertio excessu. Iste ille. Recentiorum quidam aiunt huius herbæ folia vulneribus omnibus perutilia. Scieorumque succum instillatum, aut ipsa contusa & imposita, ea conglutinare. Aliud Tripolium Lobellius pinxit, ad Padi ostia proueniens, longè minus Monspellico, minorem Conysam folio, radice, & flore vix æquans.

L. 3. suppl.

GRAMEN, OXYAGROSTIS MARI, CAP. XXVI.

GRAMEN hoc in maritimis prouenit, radice longa, rufa, geniculata, lignosa: folijs graminis, circa radicem multis: caule pedali, iunceo, læui, teteti, enodi, folijs nudo, corticoso, ac squamoso capite, ex luteo rufescente, foliolis duobus vtrinque subiectis, & veluti cornua prominentibus. Est & graminis marini species secundo loco picta, Oxysagrostis marina merito dicenda: in maritimis enim crescit, radice non geniculata, vt in superiore

Locu.

Forma.

GRAMEN Marinum,
Dalechampij.OXYAGROSTIS Marina,
Dalechampij.

Gramine, sed fibris multis capillata: caule pedali, surculoso, nodoso, folijs ad singulos nodos geminis prodeuntibus, longis, angustis, gramine similibus, atrociter prætereuntes pungentibus.

XTRAJS

Forma.



Nomina

Locus.

Forma.



PTER permulta & varia purgamenta quæ in littora fluctus eiciunt, planta hæc sepius reperitur, quam Xyrim marinam vocant herbarij. Radice est longa, crassa, geniculata, cortice rufo obducta, multum fibrata: caule pedali, foliis vndiq; aggestis operto, longis, virgatis, in cacumine mucronatis. In caulis fastigio tres quatuorve siliquæ prominent, & ipsæ rufescentes, angulosæ, seminibus farctæ velut compressu dilatatis, rufa membrana contextis, perspicua tamen vtrinq; macula in medio nigra, cum manduntur lignosis & duris, gustu subadstringentibus.

CICHORIUM BULBOSUM.

CAP. XXVIII.



ST & hæc planta maritima, quæ a foliorum effigie & a radice Bulbosa Cichorium bulbosum, iure dicitur, in arena maris prouenit, radice bulbosa, articularum veluti cingulis distincta, superiore & inferiore parte exilibus fibris villosa, oblongum, genicularum, & crassiusculum caulem ex se erigente, terræ instratum, quamplurimis, ac valde exilibus fibris ex geniculorum nodis huc illuc se spargentibus, & arenis se infigentibus: foliis Cichorij in ambitu dissectis, paucis, lacte manantibus, gustu non insuauis, flore luteo, hieracio simili in pappos abeunte. Quidam perdicium esse suspensum.

CICHORIUM Bulbosum,
Dalechampj.Lib. hist.
cap. II.

Lib. cap.

Kαι τὸ περιδικιον χαλκιδιον, καὶ τὸ τῆτο παχέας τι καὶ αὐχένος ἔχει τὰς ρίζας, ὃ φύλλα. χαλκιδιον δὲ τὸ περιδικιον, διὰ δ' τὰς ἀρίστερας ἑκατέρωθεν αὐτῆς ἀφ' ἧς. Id est, Et perdicium. Etenim id crassas & multas habet radices, aut folia: vocatur autem perdicium, quod perdicæ ad id se volutent, & id effodiant. De quo Theophrasti perdicio (hoc enim nomine diuersi auctores diuersas plantas nuncuparunt) statim post Cichorium vulgare loquitur Plinius. Cichoriū & similia circa terra folia habent, germinantibus a radice post Vergilias. Perdicium & alix gentes quàm Ægyptij edunt: nomen dedit auis id maximè eruens. Crassas plurimisque habet radices. Quæ ex Theophrasto Plinium conuertisse perspicuum est, nisi quòd ab Ægyptiis, aut ab aliis gentibus edi Theophrastus non scripsit. Sic nostrum istud Cichorium crassas habet radices, nempe bulbosas, & non solum plurimas, vt ait Plinius, sed & folia, vt scribit Theophrastus, si quis radículas innumeras ex caulis humi iacentis nodis prodeuntes intelligat.

NASTURTIVM MARITIVM, CAP. XXIX.



THLASPI Maritimum,
Dalechampj.

NASTURTIVM marinum in sabu- *Locus.*
lofis maritimis prouenit, radice *Forma.*
candicante, multiplici, caule pe-
dali, folio Nasturtij hortensis, acri:
flore purpureo, copioso, semine in loculis ha-
ste auspici similibus, rara mirabilique figura, &
huius plantæ penè dixerim peculiari.

THLASPI MARITIVM,
CAP. XXX.

THLASPI marinum idq; minimū *Locus.*
in maritimis profilit, radice ligno- *Forma.*
sa, longiuscula, in furculos diuisa,
candida: caulibus multis, dodran-
talibus, simplicibus, foliosis: foliis multis, exi-
guis, angustis, longis: flore in summis caulibus
copioso: semine flauo, lato, thlaspi simili, acri in
loculis turbinatis concluso.

CHAMAEMELVM Maritimum,
CAP. XXXI.



CHAMAEMELVM & arenis mari-
mis gignitur, radice nigra, crassius-
cula, in fibras multas diuisa: cauli-
bus multis, humi sparsis: foliis co-
tula: grandioris, in caulibus vtrinque dispari si-
tu dispositis: flore leucanthemi. Quidam coru-
lam marinam vocant.

CHAMAEPYCE Maritima,
CAP. XXXII.

CHAMAEPYCE MARITIMIS quoque nasci-
tur, radice crassa, oblique exporre-
cta, rota inferiore sui parte radicu-
las multas mittente, carnosas, su-
periore verò caules multos propè radicem, ve-
lut tubis in sese mutuo factis coagmentatos,
furculosos, foliis piceæ aut asparagi, disparibus
interuallis ex caule prodeuntibus, vno coalitu

multis, & tanquam in penicilli comam congestis: flore paruo, purpureo, ex furcu-
lorum alis emergente. Sunt qui asparagi marini speciem esse contendant.

CHA



ERVCA MARITIMA, CAP. XXXIII

Nomina



PLANTAM hanc Doct. Myconus Erucam marinam vocat, quod sapore Erucam æmuletur, & nō nisi in maritimis nascatur. Calicuti etiam *Rucas de mar*, id est, Erucam marinam, appellat. Ad cubitum altitudinem attollitur, folia habet crassa, lævia, laciniata, ad festonis folia accedentia, pingua, succola, humiliter

Forma.

ERVCA Maritima.



Locus.

Vires.

nis folia accedentia, pingua, succola, humiliter pentia, infernè quandòque rubescencia: ex quorum medio cauliculi tres, quandòque plures prodeunt, ab imo rubescentes, rotundi, striati, furculosi, læves, solidi, modo recti, modo humiliter iacentes: in quorum verticibus flosculi emicant purpurascens, raphani floribus similes: semen in siliquis triquetris concluditur minurum: radices longæ, tenues, candidæ, intus lignosæ, per summa arenæ sparsæ, gustu aliquantum acres. Nascitur in arenosis maritimis, ut diximus, flores Aprilis & Maio. Foliorum, caulis, denique totius plantæ sapor acris est, cum quadam amaritudine, & medius inter Erucam & sinapi. Hæc fere Myconus. Qui præterea scripsit se frequenti experimento observasse & comperum habere, aquam huius plantæ stillatitiam tepidam, quatuor unciarum pondere mane potam, colicis doloribus, nephriticis, calculosis, mirè conferre. Eadem planè, vel certè similis huic est planta quæ à Lobellio & Pena Cakile

Seiapon

CAKILE *Serapionis, Lobel.*



PARTHENIVM Ma-
ritimum.



Serapionis *Erucæ* folio, napi flore, vulgo *Erucæ marina* dicitur, quia non nisi in littoribus maritimis, aut inde in hortos translata reperitur: plurima autem prope Venetias & Magalonam, foliis laciniatis, diuisura crebra senetionem, vel *Erucam*, nisi crassiora, & candidiora essent, referens. Flores autem purpureos iuxta caulium ramulos sparios, magnitudine & similitudine napi habet: semen oblongum, mucronatum, fungosum, ex singulis floribus secundum caulem binos, sibiq; mutuo apicem duntaxat cohaesum iunctos, gultu *Erucæ* aut napi, salso radice lignosam. Srenue purgare asserit *Anguillara*.

PARTHENIVM Maritimum.

CAP. XXXIIII.

MARITIVM & minimum *Parthenium* siue *Cotulam* exhibuit *Pena*: quæ ad *Cestij* *Narbonensis* radices non procul a piscatorum atregiis oritur, & *cichorio* bulboso lubens associatur. *Exilibus* palmaribus cauleculis humi sternitur, quibus folia insunt *Caphthalmi* vulgaris paria, diuisura bellidis maioris, carnosæ, odore feriente, putidulo, cotulæ vulgaris, floribus non ita dissimilibus. Vires autem nec inferiores, nec dispares. Permultæ sunt aliæ plantæ maris accolæ, vt diximus, sed aliis eiusdem generis ita affines, vt ab iis disjungi, ac diuelli commodè non possint. Quare non hac, sed eadem cum illis tractatione comprehenduntur.

IVNCVS MARINVS,

CAP. XXXV.

IVNCVS marinus gramineus *Pseudoschenanthum* etiam dicitur, quod specie, magnitudine, culmo, colore vero *schenantho* similis sit, adeo vt illius congenerem esse quidam dixerint. Sed viribus quàm maximè differunt. Præ-

terea *Iuncus marinus* foliis est gramineis, flore multum dissimili, nimirum specioso, papposo, dense congesto in vulpinam caudam quincunciam & sex uncias longam, sericeo argenteo ve nitore alopecuri riu fastigiato. In Adriaticis littoribus frequens occurrit, & aliis mediterraneis, vt in litore mediterraneo

MARINVS Gramineus
Incens, Lobell.*PASTINACA marina* Pen.
& Lob. *Critimum* J. J. Matth.

agri Montipeliensis pone aquas marinas. Hac ex Lobellio. Maritimum alium depinxit Pena, qui tantum in littoribus, & arenosis Narbonæ & Galloprovinciæ reperitur, vix sesquipalmum & pedem æquans, foliis multis, tenuibus, candicantibus, angustis, & caule sesquipalmari duplo longioribus, lentis, sparsis, inflexis, è radice nigra, simpliciore cyperi longi modo, geniculata, longius serpente, multis fibris capillata, sapore grato. In summo caule foliola plurimum terna conspiciuntur, tres pedicels longa, flos globosus, luncis seminibus numerosis stipatis, asperiusculus, ex fulco & purpureo pallidulus, ampeloprasii magnitudine & figura.

PASTINACA MARINA,

CAP. XXXVI.



RITHMUM secundum Matthiolum facit plantam hic appictam, a Cortuso missam, quæ fœniculo marino, Critimo primo eiusdem, ferè similis est, nisi foliis esset angustioribus, & cacumine mucronatis, atque pungentibus, asperso & acuto sapore: caulibus magis succosis, vegetioribusque, in quorum cacumine rami exeunt bini, terni, quaternive, singuli singulas umbellas ferentes, albis flosculis refertas, è quibus semen oritur fœniculo quadamtenus simile, spinulis obsitum: cui similem quoque radicem profert. Dodonæus, qui etiam fœniculum marinum Critimum primum esse arbitrat, hanc plantam Critimum secundum statuit, & Critimum spinosum vocat. Rectius, opinor, Pena & Lobellius Pastinacam marinam, quia in maritimis sabuleris Narbonensis Prouinciæ, inter eryngia nascitur, cuius radices erutas plebecula esitit, & Pastinacam marinam vocat sunt enim prorsus eodem sapore, nec longè à figura absunt. De tertio Critimi genere à Matthiolo tradito diximus hoc libro.

LENT

LENTICVLA Marina Serapionis, CAP. XXXVII.

SERAPIO Lenticulæ marinæ meminit, quam ex Lobellio hic repræsentamus. Tyrrheni maris & Adriarici indigena est, inquit, foliis angustis Olyridis scopariæ dictæ, in flexilibus loricatis petiolis sesquipalmaribus refertis & onustis, copiosis bacis, vacuis, membranaceis, Cap. 38. simp.

LENTICVLA marina Serapionis,

¶ Vna marina quorundam.

LENTICVLA marina

ferratis foliis, Lobell.

tereribus, lenticulis similibus & patibus, vnde ei nomen. Est huic persimilis & eadem, nisi latiora & breuiora, nonnihil ambitu ferrata essent folia.

EX SVRCVLIS ARBORVM CONCHAE ANATIFERAE, CAP. XXXVIII.

MVLTA à veteribus Historicis literis mandata fuere, falsi suspecta, imo fabulosa & risu digna credita, quæ tandem à verò non abhorre cogimur fateri, à natura magis stupenda miracula nobis ob oculos ponente. Quid enim admirabilius quam ex putridis nauium lignis, aut ex arborum stipiribus surculisque in litus projectis, & maris alluionibus perpetuo irrigatis conchas, & ex iis aues generari? At id verissimum esse non solum testantur Septentrionalium rerum Historici, sed etiam harum rerum studiosi & curiosi viri, qui viderunt non solum in Scotia, ut illi narrant, aut Orcadibus maris Caledonij Arctici, olim à Romanis classe deuictis, sed etiam in Anglia, & Gallia Britannia. Scribunt Pena & Lobellius se ad Tamesim amnem, qua Londinum præterfluit, conchas pediculo rugoso, crassiore, è nauis annostræ carina auulsas habere. Sunt ex conchæ pusillæ, circinatæ ferè rotunditatis, foris albidæ, lucidæ, leues, renuitatèmq; testæ ouaceæ fragilem, biforem Mytuli modo præferentes,

EX *Surculus Arborum Concha
Anatifa.*



nuci Amygdalæ compressæ pares. Pendula autem hæc erant foris ad imum ventricose in-
nium carinæ, cui musco & limo semipontidæ innati erant, quasi fungi pediculi, quos sete vrachum vmbilici parui dixisses, cuius extre-
mum, fructuum ritu inferebatur latiusculæ basi conchæ, quasi vitam alimoniamq; inde sugge-
rent auiculæ, quarum auicularum tudimenta e summa parte conchæ hiantis conspiciuntur.
Pediculos istos ferunt Historici, primum è ver-
miculis concreari, quod non potuerunt illi sci-
re, neque adhuc credere. Præterea certo asse-
runt, easdem conchas elegantissimè efformatas è surculis arborum temerè quàm maris ælius al-
luit, proiectionum enasci. Earum conchas quæ hu-
mi & in secco manent, emori. Ex iis quæ in ma-
ris alluionibus rapiuntur, aues excludi, & in Anatem, aut ei congenerem auem adolefcere.
Has Angli, & Britanni Galli *Barnacles* vocant, Scoti *Claks*, qui his auiculis abundant, & ca-
piuntur dum per brumam gelu concreuerunt paludes. Sapiat nobis hesitantibus, inquit Lobel-
lius Anatem, aut Anserem siluestrem.

LIGNA LAPIDEA,

CAP. XXXIX.



SE & id permirum, sed verum, quod & vidi, & tradunt Pena & Lobellius, esse amnes & riuulos in quibus merfi pali lignei, radice, contive, aliquot mensibus lapidefcunt, mo fi-
re in ferri naturam abeunt, eadem petstante superficie, situ striarum, & fibrarum ductu pristino: & quas eminus assulas ligni dice-
res, attrectando & lapidi illidendo, dicas esse lapidem ferri metallo immixtum, soliditate, grauitate, duritie, & duratione lapidea, nec flammis obnoxia.

PHALLVS HOLLADICVS,
CAP. XL.



HALLVS, in maritimis Hollan-
diæ, ac Zelandiæ arenosis gigni-
tur, hominis pudendo suo præpu-
tio contexto adeò similis, vt inde nomen sit tributum. Siue integrum, & parti-
bus adhuc suis constantem, ac compactum, minimè diuisis, siue in partes è quibus componitur, iam discissum inspiciamus, ad verendum hominis figuram sic ac-
cedit, vt in eo generando lussisse natura videatur lasciuus, succo in arenis frigidis
sic is

siccisq; reperto, è quo penem hominis fingere meditari sit, afflatu etiam maris fortassis adiuta, cuius vim maxime genitalem esse periti rerum naturalium omnes testantur, & suis Poëta fabulis indicant, τὴν ἀνδρὸς ἀφ' οὗ ἀπποδῖται versibus celebrantes, nempe Venerem è maris fluctibus exorientem, ac emergentem. Posteriore parte velut inter duas prominulas nates, cauum patet: (malo enim cum podice comparare, quàm cum muliebri vulua) In id cauum, tanquam in Scroti fundum, tenue filum subit, bifidum, quo tanquam radice, in arenoso solo defigitur. Quod terræ proximum est, Bulgæ figura, inferiora Phalli operit, extremaq; ora lacinia- ta, in apices extantes diducta, vndique illum amplectitur, rugosi Scroti quadam imagine. Bulga detracta subest aliud inuolucrum, tanquam elytroides tunica in hominis testiculis. Superiore angustius, ac minus, Phallum circundans orbe im-

PHALLVS Barbauius
integer.

PHALLI Barbaui
separata partes.



plici linea circumeunte, non tamen continuato, sed intetrup- to rima, quæ veluti duorum testium interuallum, ac interstitium ostendit. In tuberculum subrotun- dum id definit, radici vicinum, cui radix inseritur. Inde penis in longum porrigi- tur, mentulæ specie, punctis quibusdam notatus, in summo, sub pteputio, pertu- sus, rotundo foramine, quod in extremo hominis veretro fissuram imitatur, qua vrina profluit. Munit summum illud fastigium, & vestit præputium, (sic enim aptissime vocari potest,) vndique circumuolutum, cutis plicati- lis modo. Extrema parte præputij, carnosus osculi rotundus, velut apex eminet, fistulosus, pelle circum crispata, humani præ- putij corrugato fini similis. Raræ huius & admira- bilis plantæ exactiorem & ampliorem histo- riam tradidit, vulgato de eius forma li- bello, Belga quidam, vir huius tra- ctationis studiosissimus, ac imprimis diligens.





HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS
TERTIVS,

In quo omnes planta, qua non nisi aliis innixa scandunt, describuntur.

VITIS, CAP. I.



S TIRIDIVM quidem plurimarum erecta est ad coelum, natura, nostrae perfectionis æmula, cœli appetens, longe quàm nos felicius, qui frustra spectamus ipsum, nec nisi terram sapiamus, ut ait Scaliger, tamen nonnullæ sunt natura tam imbecilles & caducæ, ut nisi tridicis & pedamentis fulciantur, vel nisi pergulis, sepibus, arboribus, fruticibus adnascantur, aut prope ista serantur, vel iis veluti adminiculis nixæ attollantur, & adolescant, per humum repentes aut aridæ & exucae permaneant, imperfectæque frutificent, aut breui emoriantur. Quæ res differentiam perspicuam parit, quæ stirpes istæ ab aliis discernuntur, quæ nullius fulcri ope sese attollunt, adolescunt, videntur, florent, & fructus perfectos edunt. In illorum genere vitis habetur, quæ sursum versus serpit, omnibus tum facie, tum liquore suavissimo quem fundit, notissima. Eam hîc intelligimus quæ Græcis *ἐμπυδος ἀνορόρος*, & *ἐμπυδος ἡμυρος*, Latinis Vitis vinifera, & fatiua seu cula nominatur, Arabibus *Harin*, *harin* seu *karni*, Italis *Vite vinifera*, Germanis *Vincureb*, Gallis *Vigne*. Dicitur autem *ἐμπυδος* quasi *ἐμπυδος*, vinea, quia *πυδος* olim vinuti significabar. Vitis verò à vino, vel, ut scribit Ruellius, quoniam inuitetur ad vvas partiendas. Innumera vitium reperiuntur genera. Quare singula perfecti qui supetvacaneum fuerit: quandoquidem varietatem accipiunt multiplicem à soli conditione, moræque, & solis ab æquatore inclinatione. Si quis tamen illa desiderare, rei rusticæ scriptores Pliniûmque legat, qui profecto non omnia, sed maximè insignia persecutus est: quippe quæ totidem pene sunt, inquit, quot agri. Hoc tantum dicam, vires quasdam esse simplices in provinciis quibusdam, quæ per se sine ullo pedamento, ut ait Plinius, artus suos colligunt, & breuitate crassitudinem pascunt: alias arbustinas, quæ Græcis *ἀνδρόλιπιδες*, & *ἀνδρόλιπιδες* dicuntur, ipsa verò arbusta quibus maritatæ fulciuntur, eisdem nominantur vocibus. In Campaniæ agro, ut ait Plinius, populis nubunt, maritæque complexæ, atque per ramos earû procacibus brachiis genicularo cursu scandentes, cacumina æquant, in tantum sublimes, ut vindemiator authoratus rogam ac tumulum excipiat. A radice vitis caudex vnus contortus exit, qui in ramos frequentes scinditur. Multiplici cortice vestitur, rimoso, membranaceo, flagellis longe latèque vagantibus, armentorum foliis latis, multifidis, platani aut aceris diuiliura, & per extremum

Nomina

Genera.

Lib. 14. c. 1.
& 3.

Lib. 14. c. 1.

Ibidem.

Forma.

VITIS *Unifera.*

Lib. 14. c. 1.

Vitis
Tempor.
Lib. 14. c. 1.Lib. 14.
proem.

ferratis, quæ ex longo pediculo pendula lasci-
uiunt: floribus fructum ambientibus, lanugi-
neis. Vua compluribus acuis acervata, semini-
bus tunica clausis. Acini numerosi, qui magni-
tudine, colore, saporibus multiplicantur in vi-
no, hic purpureo lucentes colore, illic fulgentes
roseo, nitentesque viridi. Candidæ enim vix
nigræque vulgares. Tument verò mamma-
rum modo Bumasti, ut scribit Plinius: prælon-
gis dactyli porriguntur acinis. Est & alia natu-
ra lasciui, ut prægrandibus adhaereant per
parui, mites, & suavitate certantes, Leptæ
vocat. Vini omnes in vniuersum facultates ex
Dioscoride, Plinio, Galeno, commemorare su-
peruacaneum & tedio plenum foret. Quare
alium vitis partium vsum medicum ex-
ponemus. Vitis vinifera folia caprioli que trita & o-
lita, inquit Dioscorides, capitis dolores stoma-
chi que inflammationes & ardorem cum potu
mitigant, folia etiam per se imposita, & pote-
quæ refrigerant & adstringunt. Succus & ipse
potus dysentericis, sanguinem expulsi-
bus,
stomachicis, & citra laborantibus mulieribus prodest. Madefacti in aqua cephali
& poti eadem efficiunt. Lachryma verò eius quæ veluti gummi in eius caudicibus
concreuit, pota cum vino calculos pellit. Illita lichenas, scabies & lepras sanat.
Oportet autem locum nitro antea confricasse. Eadem cum oleo frequenter inun-
cta pilos denudat: potissimum aquosus humor, qui ex incensis viridibus sarmentis
exudat. Hic etiam myrmecias inunctus eiicit. Cinis sarmentorum & vinaceorum
circa sedem quæ antea ablata amputatæ sint codyloinata & thymia, cum aceto
illitus sanat. Confert luxuris & viperarum moribus, lienis inflammationibus, cum
rosaceo & ruta & aceto illitus. Plinius ea ex Dioscoride referens, in paucis ab eo
dissentit, folia vitium, inquit, & pampini capitis dolores, inflammationesque cor-
porum mitigant cum polenta, folia per se ardorem stomachi ex aqua frigida: cum
farina verò hordei articulares morbos. Pampini triti & impositi, tumorem om-
nem siccant. Succus eorum dysentericis infusus medetur. Lachryma vitium, quæ velu-
ti gammi est, lepras & lichenas, & psoras pitro ante præparatas, sanat. Eadem
cum oleo sæpius pilis illitis, psilothri effectum habet, maximèque aqua, quam vi-
rides accensæ vites exudant: qua & verrucæ tolluntur. Pampini sanguinem excre-
tibus, & mulierum à conceptu defectioni diluti potu profunt. Cortex vitium & so-
lia arida vulnerum sanguinem sistunt, ipsumque vulnus conglutinant. Vitis albæ
viridis tuxæ succo & thuræ, impetigines tolluntur. Cinis sarmentorum vitiumque
& vinaceorum condylomatis & sedis vitiis medetur ex aceto: item luxatis & am-
bullis, & lienis tumori, cum rosaceo & ruta & aceto. Item igni sacro ex vino citra
oleum aspergitur: & intertrigines & pilos absumit. Dant & bibendum cinerem
sarmentorum ad lienis remedia aceto cõpersum, ita ut bini cyathi in tepida aqua
bibantur, utque qui biberit in lienem iaceat. Clauiculæ ipsæ quibus repunt vites,
tritæ ex aqua potæ, sistunt vomitionum consuetudinem. Cinis vitium cum axun-
gia verere, contra tumores proficit, fistulas purgat, mox & persanatiorem & neuro-
rum dolores frigore ortos, contractionesque: contusas verò partes cum oleo: car-
nes excrecentes in ossibus cum aceto & nitro: scorpionum & canum plagas cum
oleo.

oleo. Corticis per se cinis combustis pilos reddit. Quas mulieres Dioscorides Lib. 13. c. 7.
 ἡσυχαστὶς dixit, Plinius mulicrum a conceptu defectionem interpretatur. Id ma- Lib. 1. Ali.
 lum κατὰ dicitur, quod vitium auctore Paulo, accidere cōsuevit: tertio à conceptu
 mense potissimum, varia & à natura aliena mulieribus appetitibus, veluti carbon-
 es extinctos, cretam cinoliā, aliāque complura, ob vitiosā quæ in ventriculi tu-
 nicis continentur excrementa. Plinius Malaciam stomachi vocauit. Præterea cino-
 tem vinaceorum dixit τέρμα τῶν σφυφύλλων. Sunt enim σφυφύλλοι Galeno auctore,
 τὰ σφυφὰ λεγόμενα τῶν σφυφύλλων, ἐπεὶ οὕτως ἐν τοῖς ληνοῖς ἐκταλῶνται οἱ χυμοὶ αὐτῶν. ἃ καὶ ἀπὸ
 σφυφύλλων ἐν τοῖς ἀνθρώποις, σφυφύλλοις τε καὶ ἀπὸ τῶν σφυφύλλων, ὁμοίως τὰ σφυφὰ
 αὐτῶν τῶν, ὅπερ ἔγωγε σφυφύλλοις καλεῖται, τῶν δὲ σφυφύλλων ἀποσπασθέντων ἐκ τῶν αὐτῶν
 καὶ αὐτῶν ἐκπεσόντων, ὁμοίως τῶν καλεῖται. Id est, Sunt enim stemphyla id est vinacea,
 solidæ vuz reliquæ, quum in torculari succus ipsius omnis prorsus expellus fue-
 rit, quas etiam homines in dolis componunt, stupantes ipsas valde atque constrin-
 gentes: appellântque id ipsum τέρμα, id est, fecem, quod ego σφυφύλλων, id est, vina-
 ceos appellauit. Nomine autem σφυφύλλων id est, vinaceorum, acinorum radicem quæ
 ex palmute enascitur, appellant. Plinius sarmenta vuarum in quibus acini fuere Lib. 13. c. 1.
 nuncupauit. Columella, pedem & Scipionem acinorum: fructus verò vitis facul-
 tates hæ sunt ex Dioscoride. Vua (Græci σφυφύλλοι à Staphylo libeti patris filio ap-
 pellant) recens quævis aluum turbat, & stomachum inflat. Minus horum parti-
 ceptæ quæ aliquandiu decerptæ pe pendit, quod in ea copia humoris exaruerit. Sto-
 macho accommodata est, appetentiâque cibi excitat, & imbecillis conuenit.
 Quæ autem in vinaceis aut vinario vase seruata sunt, ori & stomacho grata sunt.
 Aluum sistunt, vesicam tamen & caput tentant. Profunt sanguinem expuentibus.
 inuiles ita sunt quæ in mustum coniectæ sunt. Sapa verò aut musto condita sto-
 machum magis infestant. Reponuntur & caelesti cum aqua, prius passæ factæ,
 minusque vinoz fiunt, siticulosis, at dentibus & longis febribus vitiles. Vinacei
 torum reconditi inflammatis, duris, turgentibusque mammis cum sale illinun-
 tur. Vinaceorum decoctum dysentericis, celiacis, & fluxui muliebri infusum
 confert. Ad insersiones quoque ac clysmata assumitur. Nuclei acinorum adstrin-
 gunt, stomacho grati. Testi autem & triti, & pro farina illiti, dysentericis, celiacis,
 & stomacho resolutis profunt. Plinius de iisdem eadem ferè tradit. Recentes vuz Lib. 13. c. 1.
 stomachum & spiritum inflant, aluumque turbant: itaque in febris damnantur, vi-
 que largiores. Grauedinem enim capitis, morbumque lethargicum faciunt. Inno-
 centiores quæ decerptæ diu pendere: qua ventilatione etiam vitiles fiunt stoma-
 cho ægrisque: Nam & refrigerant leuiter, & fastidium auferunt. Quæ autem in
 vino dulci conditæ fuere, caput tentant (Alij legunt, Quæ in vino aut dulci con-
 ditæ fuere &c.) Proximæ pensilibus palea seruata. Nam in vinaceis seruata & ca-
 put, & vesicam, & stomachum infestant. Sistunt tamē aluum, sanguinem excrean-
 tibus vitilissimæ. Quæ verò in musto fuere, peiorem vim etiam habent, quàm quæ
 in vinaceis. Sapa quoque stomacho inuiles facit: saluberrimas putant medici in
 caelesti aqua seruatas, etiam si minimè iucundas: sed voluptatem earum in stoma-
 chi ardore sentiri, & in amaritudine iecoris, fellisque vomitione in choleris, hy-
 dropicis cum ardore febrium ægrotantibus (Alias, fellisque vomitione, & in cho-
 leris, ac hydropicis cum ardore febrium. At in ollis &c.) At in olla seruata & os
 & stomachum & auiditatem excitant (in aliis exemplaribus scriptum est, & in os
 & stomachum auiditatem &c.) Paulò tamen grauioribus existimantur fieri vinaceo-
 rum haliu. Vuz florem in cibis si edere gallinæ, vuas non attingunt. Sarmenta
 earum in quibus acini fuere, adstringendi vim habent, efficaciora ex ollis. Nuclei
 acinorum eandem vim obtinent. Hi sunt qui in vino capitis dolorem faciunt.
 Tostititque stomacho vitiles sunt. Inspergitur farina eorum, polentæ modo,
 potioni,

- porioni, dysentericis, cæliacis, & dissolutis stomacho. Decocto etiam eorum fovere pforas & pruritus utile est. Vinacei per se minus capiti aut vesicæ nocent quam nuclei: mæmmarum inflammationi triti cum sale viles. Decoctum eorum veteres dysentericos & cæliacos iuuat, & porione, & fori. Hoc Plinius à Dioscoride dissidet, quod in ollis seruatas stomachum infestare dixit, Dioscorides ἰσχυαίχνης, id est, stomacho gratas. Interim varij seruandarum vuarum modi ab utroque indicantur, quos & declarat Galenus his verbis. In vinacea ollas nequas vuis refertas condunt, operculis exactè obturantes, ne alicunde diffentur, & qua operculum cum olla committitur, pice illinunt, perspiratus omnes obstruentes. Huiusmodi vua ventriculum dissolutum roborans, hominibus cibum fastidientibus appetentiam excitat, non tamen per aluum subsides: & si sumpta largius fuerit, caput ferit. Quæ in multo conditur, magis adhuc quam hæc caput infestat. Pensilis verò nihil prorsus caput lædit, ventrem autem nec sistit, nec ad cæctionem irritat. Sic Dioscorides χρημασθεῖς habet, & Plinius pensiles, & τῶν τῶν φησὶν, καὶ ἐν τῷ βροχῶν. Plinius primum in vinaceis, deinde in ollis seruatas appellat, addens has grauioribus existimari vinaceorum halitu, ut in ollis seruatas easdem esse ostenderet, quæ & in vinaceis seruantur. Vinacea autem vocat φέμψα, id est, vuarum expressarum reliquias, ut ex Galeno exposuimus: in ollis conditas & seruatas Cælius Aurelianus
- Lib. 14. c. 1. Ollares nuncupat, in palea, Paleares. Hunc modum seruandarum vuarum Plinius sic declarat. Durant alix per hyemem, pensili concameratæ nodo. Aliæ in suatantum continentur anima, ollis fictilibus, & insuper doliis inclusæ, stipatæ vinaceis circumsudantibus. Hic tamen annotat Hermolaus in codicibus vetustis legi ὀλλῖς non doliis ex Plinii ipsius auctoritate sic scribentis. Liguria maritima Alpibus oroxima vnas sole siccatas iunci foliis inuoluit, cadisque conditas gypso includit. Hoc idem Græci platani foliis, aut vitis ipsius, aut fici, vno die in vmbra siccatis, atque in cado vinaceis interpositis. Sunt & alij seruandarum vuarum modi præter hos tres, quorum Dioscorides & Plinius meminere. Nam & sapa aut passio condiebantur, & in aqua pluua componebantur. Est & id annotandum à Plinio sarmeta vitium: in quibus acini fuere φέμψα dici, & nucleos acinorū, γάργα. Dioscoridi, Latini vinacea, rursus vinaceos φέμψα, quorum decoctum dysentericos & cæliacos iuuare tantum dixit, Dioscorides addit καὶ ποικίς, subaudiendo γυναικείας, Ruellius feminina fluxione vuluæ laborantes interpretatus est, nec id absurde, iis enim vinaceorum decoctum apertissimum est remedium. Cornarius tamen ποικίς legit, & ποικίς τῶ παθῶν intelligit, quæ & fluidas alui affectiones conuertit, quod & confirmare videtur
- Lib. 14. c. 2. Galenus scribens. Vinacea secundo ordine siccant, refrigerant primo. Substantia eorum crassa est, & terrea, quod gustus indicat: nam omnibus ventris cum profluvio iunctis affectibus cõferunt. Est & Vua quæ Græcis παῖς & ἀπαῖς vocatur, passa latinis. A patientia nomen acinis datur passis, inquit Plinius. Aliis placet passum esse quod in rugas sole contractum, vnde vua passa dicta, quod sit rugis implicita, cum in sole suspensa fuerit, ut passa frons, & caperata, rugis exasperata. Sic myrtus nigra Catoni in vmbra perarefcit, dum erit passa. Vua passæ facultates hæc sunt ex Dioscoride. Vua passa alba adstringentior est. Prodest caro earum esicata arteriæ, tussi, renibus, & vesicæ. Item dysenterici, si per se cum vinaceis edatur, & cum milij & hordei farina, & ouo commixta, cum melle in sartagine fricta. Valet & ad pituitam è capite detrahendam per se, & cum pipere commanducata. Sedat testium inflammationes, imposita cum farina fabacea, & cumino. Epinyctidas, carbunculos, fauos, & putredines circa articulos, & gangrænas, sine vinaceis trita & cum ruta imposita, sanat. Podagræ convenienter cum panacis succo illinitur: mobiles vngues illita celerius extrahit. A quibus non discrepat Plinius nisi in paucis duntaxat. Vua passa quam Astaphida vocant, stomachum, ventrem, interanea tentaret, nisi

pro medio in ipsis acinis nuclei essentis exemptis vesicæ vtijs habetur, & tussis alba velio. Vtilis & arteris & renibus, sicut ex his passum, pinguem & serpeticibus, contra hæmorrhoida potens. Testis inflammationi cum omnia cumuni aut coriandri imponuntur: item carbunculis, a ticularibus morbis, siue nodelis trita cum ruta: fouere ante vino vincta oportet. Sauant epiphyctidas, & ceria, & dykenteriam cum nucleis. Et in oleo coctæ gangrenis illiuntur cum cortice raphani, & melle. Podagris & vnguium mobilibus cum panace, & perse ad purgandum os, caputque, cum pipere commanducantur. Vitis facit facultas, inquit Galenus, ad-
Lib. 6. sim.
 sumis est agrestis, sed ad omnia imbecillior. De eadem Symeon Sethi ex eodem fusius hæc prodidit. Vux plus nutriunt reliquis operis, minus tamen ficis: neque mali succi sunt, si maturæ fuerint exquisitæ. Tamen his non robusta nec densa, sed laxa & flaccida cito gignitur. Maximum quidem horum bonum, inquit Galenus, quod celeriter subeunt, atque adeo si retinentur, lædunt: neque enim tunc probè concoquuntur, sed crudum gignunt humorem, qui non facile in sanguinem transmutetur. Nucleorum natura sicca, & quodammodo astringens est. Pertranseunt igitur omnia intestina non alterati. Pensiles vero vux neque sistant ventrem, neque protrant, cæteris autem facilius concoquuntur. Neque vuarum parua est in dulcedine, & assiduitate, & acore & aciditate differentia. Dulces quidè calidiores habent succum, austera vero & acidæ frigidum. Alium subducunt dulces, & maxime quando humida fuerint. Omnium itaque tutissimus vsus est quando carnosæ fuerint, & maturæ, & mediocriter quis ipsis sumat. Vux albæ magis subducunt alium quàm nigræ. Omnes autem ciborum appetentiam excitant, & ventrem. Conuenit, cum eduntur, membranam & nucleos expuere, quod difficulter conficiantur. Quæ immaturæ sunt, ventrem sistant, at stomacho bonæ. Caliditatem à sana bile ortam, sedant, minus verò nutriunt. Oportet autem non solum vvas, sed etiam omnes fructus molli cortice præditos ante reliquos cibos apponere. Vva passâ, au-
Lib. 6. sim.
 ctore Galeno, satius quidem concoquendi, adstringendi, & leuiter digerendi facultate prædita est. At agrestis vehementer acrem obtinet, adeo vt ex capite purget, absistergâque valenter. Itaque ad psoram accommodata est: sed & vrendi vim habet. Idem vini vsus medicum beneiter perstringit his vethis. Vinum ex secun-
Lib. 8. am.
 do est ordine exalfacientium: sed quod admodum vetus est, ex tectio: sicut mustum quod vocant, ex primo. Caliditati eius proportione respondet siccitas. Vina vetusta neruos lædunt, inquit Dioscorides, & reliqua sensuum instrumenta: gustu
Lib. 4. 7.
 tamen iucundiora sunt. Quare ab iis qui partem aliquam internam debilem habent, cauenda sunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutum innoxie sumitur. Nonum inflat, ægtè concoquitur, graui somnia inducit, urinam ciēt. Aetate medium vtrâque vitia effugit. Quare ad victus sanorum ægrotumque vsurpatur. De eodem & hæc Plinius tradit. Vno aluntur vires, sang. iis colosque homi-
Lib. 13. 6.
 num. Et mox, Vno modico nerui iuuantur, copiosiore læduntur, sic & oculi. Stomachus recreatur, appetentia ciborum inuitatur, tristitia & cuta hebetatur, vrina & algor expellitur, somnus conciliatur. Præterea vomitiones sistit, collectiones extra lanis humidis impositis, mitigat. Aesclepiades vtilitatem vini æquati vix Deorum potentia posse pronuntian. Et alibi, Vno natura est hausto accedendi ca-
Lib. 14. 6.
 lore viscera intus, foris infuso refrigerandi. Nec alienum fuerit cômémorare hoc loco, quod Androcydes sapientia elatus ad Alexandrum magnum scripsit, intemperantiam eius colubens. Vinum potaturus Rex, memento te bibere sanguinem terræ. Sicut cicuta homini venenum est, sic cicutæ vinum. Quibus præceptis si ille obtemperasset, profecto amicos in temulentia non interemisisset. Prorsus vt iure dici possit, neque viribus corporis vtilius aliud, neque aliud voluptatibus perniciosius, si modus absit. Sunt in regno Menin oppidi Syriæ nobilissimæ magnitudinis
 cum

tum acini, tum racemi, quos ipsi lingua patria priuatim vocant *Alebb*: nam generi commune est nomen *Hanib*, nos à succo vuam. Illius vocis imitatione suas grandiores vuas corrupto vocabulo Prouinciales dicunt *Augbim*. Sunt & vuæ quædam ἀπύρτοι, id est, sine nucleis, quæ *Cornithia* vulgo vocantur, in Italicis & Pedemontanis hortis. Effigie nihil planè differunt à communibus: sed ægidioris cœli impatientes, gracilitate tantum racemorum, & exilitate acinorum superantur, qui piperina aut sambucina tantum æquant. In Madera quoque vuæ sunt sine granis vllis. Theophrastus auctor est ad Elephantinen & circa Memphim vites perpetua fronde vircere, tametsi annuas tantum proferant vuas. Vites quidem & tristes esse Plinius tradit, quas ob id insanas vocant quoniam in iis alia maturescunt, alia turgescunt, alia florent. Varro auctor est vitæ fuisse Smyrnæ apud mare biferam.

LABRUSCA,

CAP. II.

Nomen.



RAECIS ἀλεπτος ἀγρία, Latinis Vitis siluestris, & Labrusca proprie dicitur, Gallis *Vigne sauvage*, Italis *Lambrusca*, Germanis *Vulduemerech*. Labruscam dici putant, quod in marginibus terræ cœu labris quibusdam nascatur. Sed ne quem hominymia in errorem inducat, admonendus est lector aliam esse plantam quæ ἀλεπτος ἀγρία Græcis, Latinis vitis silue-

Forma

et Gene-

ra.

Lib. 6. ca.

Lib. 2. ca. 18

Vires.

Lib. 6. ca.

Lib. 6. ca.

Lib. 3. ca.

stris nominata est, de qua proxime dicetur. Labrusca viti satioræ sarmentis, foliis & capreolis similis, Dioscoridi duplex est. Altera vuam ad maturitatem non perducit, sed ad florè tantum vsq; oenanthem verò quam vocant, gignit altera quæ fructu perficit, sed paruos acinos habet, nigros, & altringentes. Oenante, vt idem paulo post inquit, vitis siluestris quæ fructum fert, flos est. Sic enim restitui debet veteris locus ille vitiosus. Recondi oportet in fictili non picato cum collecta est, & subiecto linteo in vmbra siccata. Optima est in Syria, Cilicia, & Phœnice. Plinius huic Oenantes historiam fusius exponit his verbis. Eodem & Oenante pertinet. Est autem vitis Labruscæ vuæ. Colligitur cum floret, id est, cum optime olet. Siccatur in vmbra substrato linteo, atq; in cados conditur. Præcipua ex Parapotamia, secunda ab Anthiochia, atq; Laodicea Syriæ, tertia ex montibus Medicis. Hæc vultor medicinz. Quidam omnibus iis præferunt eam, quæ in Cypro insula nascitur. Nam quæ in Africa sit ad medicos tantum pertinet, vocaturque Massaris. Omnis autem ex alba labrusca præstantior, quàm è nigra. Labruscæ folia, caules, & capreoli auctore Dioscoride, vim habent viti satioræ similem, quemadmodum contra Galenus dixit, vitis satioræ vires siluestris viribus similes esse. Quæ verba ad vitem siluestre, de qua proxime dixerat, referenda non sunt, vt mox dicemus, sed ad labruscam. Oenante autem eodem Dioscoride auctore, vim habet adstringendi. Quare pota stomacho utilis est. Ciet vrinam, aluum sistit, & sanguinis sputum. Sicca verò imposita contra fastidia & acorem stomachi efficax est. Capitis doloribus tam viridis quam sicca ex aceto & rosaceo infunditur. Cataplasma ex ea fit, cum melle, croco, rosaceo & myrrhatrita ad inflammationes arcendas in cruentis vulneribus, oris vlcerebus, incipientibus agilopis, & pudendorum nomis. Pessis miscetur ad sistendum sanguinem. Illinitur & contra oculorum fluxiones & æstuantem stomachum cum polentæ polline & vino. Vistæ verò intesta ad prunas, faciat ocularia medicamenta. Reduuias & pterygia, & abscedentes gingiuas cruentasque cum melle sanat. Eundem vsum medicum Plinius exponit his verbis, quæ multum lucis Dioscoridi afferunt. Omphacio coheret oenante, quam vites siluestris ferunt, dicta à nobis in vnguenti ratione. Laudatissima in Syria, maximè circa Antiochiæ & Laodiceæ montes, & ex alba vite. Refrigerat, adstringit, vulneribus inspergitur, stomacho illinitur. Vtilis vrinæ, iocinori, capitis doloribus, dyentericis, cæliacis, cholericis.

ncis. Contra fastidia obolo ex aceto pota. Siccat manantes capitis eruptiones, efficacissima ad vitia quæ sunt in humidis: idcircoque & oris ulceribus, & verendis ac fedi. Cum melle & croco aluum sistit. Genarum scabiem, vel, ut in manuscripto legitur, scabritiem, emendat, oculorumque lachrymationes: ex vino stomachi dissolutionem: ex aqua frigida pota sanguinis excreationem. Cinis eius ad collyria, & ad vlcera purganda, & paronychias & prerygia probatur. Vritur in furno donec panis percoquatur. Massæ odoribus tantum gignitur.

VITIS SILVESTRIS, CAP. III.

VITIS silvestris Græcis ἀμπελος ἀγρία nominatur ut & labrusca, quamvis hæc ab illa plurimum discrepet. Est enim labrusca viti viniferæ tam similis, ut solo cultu differat, At vitis silvestris sarmenta quidem vitis modo producit longa, ut describit Dioscorides, sed aspera, cortice in rimas delincente: folia hortensi solano similia, sed latiora & longiora: florem velut capillos muscosos: fructum parvis vuis similem, cum maturuit, rubentem, rotunda acinorum figura. De eadem vite hæc Plinius, Labrusca quoque cœnanthen fert, vitis dictam. Quæ à Græcis ἀμπελος ἀγρία nominatur, spilis & candicantibus foliis, gemiculata, rimoso cortice, fert vnas, ubentes cocci modo &c. Quibus verbis labruscam quæ etiam ἀμπελος ἀγρία vocatur, cum vite silvestri confundere videtur, nisi ita contextum distinguamus, ut verba hæc, Quæ à Græcis ἀμπελος ἀγρία nominatur & cetera, ad præcedentia non referantur, sicuti reuera referri non debent, sed ea velut a nouo principio legamus, ut de duabus stirpibus Plinium hic loqui accipiamus, priore labrusca, altera vite silvestri, quæ etiam ἀμπελος ἀγρία appellatur. Idem alibi vitem siluestrem aliam esse à labrusca prodidit his verbis. Probatur & vitis silvestris alia quam labrusca, & ipsa hederæ modo arborem scandens. Matthiolus pro vite silvestri herbæ pingit ab Herbariis Dulcamaroni & Solanum lignosum nuncupatam. Eam Theophrasti μάλαγρον esse Dalechampius & quidam alij periti esse coniiciunt, cuius fructus solano similis est. Sed cum repugnet florum figura, quod muscosi non sint, nec capillacei, verum racematim coherentes, ex Oribasio non βρωτύλις, id est, muscosos, sed βρωτύλις id est, racemosos legendum arbitratur. Præterea cum hæc planta rimoso cortice non sit, vocem φλαστρογαύωτα in Dioscoride expungendam esse, quod in Oribasio non legatur. Quæ omnia refelli possunt. Primum quod vel diuersum à nostro Oribasium nactus est, vel βρωτύλις flores legit non βρωτύλις. Sic enim ex Dioscoride vitem agrestem delineauit. Vitis agrestis sarmenta vitis viniferæ modo longa emittit, lignosa, aspera: folia hortensi solano similia, longiora tamen, & latiora: florem habet ut capillos muscosos: fructum fert exiguis vuis similem, cum maturuit rubrum. Rotunda est acinorum figura. Deinde tantum abest ut vox φλαστρογαύωτα in Dioscoride delenda sit, ut Oribasij descriptioni adscribenda sit potius: quoniam vitem siluestrem rimoso cortice esse scripserit Plinius, item Serapio Dioscoridis verba transcribens. Planta est cuius rami longè protenduntur, similes palmitibus vitis viniferæ, cuius lignum est grossum, & cortex separabilis ab eo, & cetera. Hic tamen monendi sunt studiosi Serapione eo loco, & Auicennam vitem hanc siluestrem cum labrusca siue vite silvestri turpiter confudisse. Dodonæus vitem siluestrem depingit, & describit eam quam Matthiolus pro vite nigra proposuit, alij pro cyclamino altera. Dalechapius diuersam ab his, Vitem siluestrem statuit, eam nimirum quæ hic picta est, Viralba nominata, Gallis *Viorne*, Germanis *Lynen* vel *Lenen*, quibusdam *Vualdreben*, quam Matthiolus Clematidem tertiam facit, Dodonæus Clematidis alterius speciem tertiam, Fuchsius Vitem nigram. Nam ea sarmenta vitis modo prælonga emittit, aspera, lignosa,

Nomina

Fertilia

Lib. 4. cap. 75

Lib. 13. ca.

Lib. 16. ca.

Lib. 3. hist. cap. 17.

Lib. 10.

cap. 35. sim.

Lib. 2. cap. 74

Lib. 3. hist. cap. 177

Lib. 2. cap. 7. Lib. 3. cap. 48. Cap. 35. hist.

VITIS Sylvestris, Dalechampt.

Clem. III. Maib.

In Aduerf.



culis ornati, odori, Maio & Junio, capillaceo tomento cinguntur carptæ lanuginis albidæ, levis, quæ etiam in multam hyemem durat, foliis amissis. Acini etiam complures confertim stipantur ab vno pediculo apti, rotundi, rubentes ex fusco, compressi tamen. Quare docti nonnulli ubi περιφρίτις τὸ χῆμα τῶν κόκκων legitur, id est, sphaerica figura acinorum seu grauerum, περιφρίτις leuiuscula immutatione &

Lib. 13. cap.

Lib. 16. cap.

Lib. 1. mod.

local. ca. 7.

Lib. 13. ca. 1.

Lib. 1. hist.

cap. 10.

Vires ac

tèperam.

cap. 11. sim.

commodiore sensu legi volunt, id est, rotundam sed compressam figuram. Plinius. Idem staphisagriam Vuam Taminiam quibusdam falso vocatam fuisse aut tamen alio in loco scribit, Nascuntur enim in sanguine ipso hominis animalia exesura corpus. Resistitur vuæ taminiæ succo, aut veratri, cum oleo petunæ corporibus. Taminiæ quoque in aceto decocta etiâ vestes eo tædio liberatæ quæ de Staphide agria Galenus & ipsemet alibi tradidere, vt in hac re parum sibi constare Plinius videatur, certe Cornelius Celsus Vuam Taminiâ καριδία ἀγρία à Grecis nominari aperte dicit. Virē sylvestrem Atragenam esse Theophrasti docti herbarii esse putant. Sic enim ille. Ἀγρίον μὲν ἐκ τῆς ἀγρίας καλεσμένης ὑπὸ τῶν, ταῦτα δὲ ἐπὶ τὸ διήρητον ὀνομαζομένην ἀπὸ τῆς ἀγρίας, ὡς περὶ ἐκείνην ἐκ τῆς ἀγρίας ἐκείνης. Id est, Igniatium optimum à quibusdam fit ex Atragena. Arbor est viri similis & labruscæ, & illarum modo arbores scandit. Idem autor cap. vlt. lib. 3. histo. Similacis asperæ fructum cum vitis Sylvestris (τῆς καρυλῆς ἀγρίας,) & Melothri vuæ comparat. Vitis sylvestris radix feruēfacta in aqua, auctore Dioscoride, & cum vini aqua marina diluti cyathis duobus pota, purgat aquosā. Sic enim Græci in vulgaribus exemplaribus deprauata, sunt restituenda. ταύτης ἡ ρίζα ἀποξηραθεῖσα ἐν ὕδατι, καὶ πηκνῆται μὲν ὅλην τετραποσειμένην καὶ ὕδατος, β. & cætera. Aliter legit Cornarius, ἀποξηραθεῖσα ἐν ὁρῶν τετραποσειμένη, καὶ μὲν ὕδατος πηκνῆται καὶ ὕδατος, β. Id est, feruēfacta in vino marinam aquam admixtā habente, & cum aquæ cyathis duobus pota, & cætera. Sed prior lectio melior, quam approbat Plinius, vt dicemus, itē Serapio his verbis. Radix huius vitis quando coquitur in aqua, & bibitur cum duobus cyathis vini quod sit cum aqua marina, laxat per vētrem humores aquosos. Durat

&

BRYONIA siue *vitia*
all. 4. Mart.



In c. 176.
 hb. 4.

L. 116.

Quaque tuas audax imitatur Nyctæ vitis
Nec metuit sentes : nam vepribus improba surgens
Achados, indomitas Bryonias alligat ulmos.

Tempus.
L. 176.
Vires &
Temper.

Floret æstate, Autumno fructum producit. Bryoniæ, in prima germinatione asparagi, auctore Dioscoride, elixi manduntur : vrinam & aluum cient, folia, fructus, & radix, acrem vim habent. Eapropter chironiis, goniicis, phagedænicis, & tibias purrefacientibus ulceribus cum sale illita, auxiliantur. Radix abstergit corpus, & erugat. Vitia faciei, varos, lentigines, & cicatrices nigras cum eruo, terrachia, & fenogrzeco emendar. Ad eadem prodest decocta in oleo usque dum liquefcat. Sugillata tollit, & digitorum pterygia compescit. Cum vino illita, inflammationes discutit, & abscessus rumpit. Ossâ extrahit trita & illita. Mifectur apte medicamentis quæ excedendo sunt. Bibitur comitialibus drachmæ pondere quotidie per annum. Attonitis & vertigine laborantibus consimiliter assumpta prodest. Contra viperarum ictus pota drachmis duabus prodest. Mentem aliquando subvertit. Cit vrinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, quod præfocatio ne oppressis, tussientibus, lateta dolentibus, & ruptis datur. Apposita vtero foetus & secundas trahit. Lienem trium obolorum pondere ex aceto triginta diebus pota consumit. Illinitur eadem vtiliter cum fico ad eadem. Ad infessus decoquitur : vulvas liquidem purgat, & abortum facit. Vere ex radice eius extrahitur succus, bibiturque cum melle ad eadem, pituitam ducens, fructus eius ad pforas & lepras illitus & inunctus facit. Lactis abundantiam efficit succus fructus eius, si cum tritico decocto sorbeat. His satis consentanea sunt quæ Plinius de eadem re prodidit. Bryoniæ asparagi decocti in cibo, aluum & vrinam cient, folia & caules exulcerant corpus : vtrique ulcerum phagedænis, & gangrænis, tibiarumque radio eum sale illiuntur. Semen in vua raris acinis dependet, succo rubente, postea croci (vetus codex habet crocino) Nouere id qui coria perficiunt illo enim vtuntur. Pforis & lepris illinitur. Lactis abundantiam facit coctum cum tritico potumque. Radix numerosis

Lib. 4.

rosis vitiliritibus nobilis, contra serpentium ictus trita drachmis duabus bibitur. Vicia cutis in facie, varosq; & lentigines, & sugillata emendat, & cicatrices. Eademque præstat in oleo decocta, Decocta datur & comitialibus potus (Vetus codex habet, Datur & comitialibus in potu) item mēte cōmotis, & vertigine laborantibus, drachmaz pondere quotidie anno toto. Et ipsa autem largior aliquanto sensus purgat (tur bar non purgat legēdum esse ex Dioscoride perspicuum est, qui habet *ὑποταρίσσει τὴν δυσίνοιαν*) Illa vis præclara, quod ossa infracta extrahit trita in aqua & imposita (Sic enim legēdum ex Dioscoride) ut Bryonia: quare quidam hanc albam Bryoniā vocant. Alia verò nigra efficacior in eodem vsu cum melle & thure (In veteri exem plari legimus, albam Bryoniam vocant aliam verò nigram efficaciorē in eodem vsu cum melle & thure suppurationes &c.) Suppurationes incipientes disciuit, veteres maturat & purgat. Ciet menses & vrinam. Ecligma ex ea fit suspitiosis, & contra lateris dolores, vullis, ruptis. Splenem ternis obolis pota trīginta diebus consumit. *Lib. 6. sim.* Utiur eadem cum fico, & pterygiis digitorum. Ex vino secūdas scēminarum apposita trahit: & pituitam drachma pota ex aqua mulsā. Succus radicis colligi debet ante maturitatem feminis: qui illius per se & cum eruo, latiore quodam colore & cutis reneritate mangonizat corpora, serpentes fugat / Dux postremaz voces in vulgaris codicibus redundant, nec in veteribus reperiuntur, nec huc pertinent) Tunditur ipsa radix cum pingui fico, etugaiq; corpus, si statim bina stadia ambulē: tur alias vrit, nisi frigida abluatur. Lucūdius hoc idem præstat nigra vitis: quoniam alba pruritu adfert. Bryoniz prima germuna, inquit Galenus, ab omnibus pro more edi solent, vīpote edulium stomacho propter adstrictionem gratum, sed & sub amaram & modice acrem adstrictionem habent: quare & vrinam modice ciet. At radix & abstergentem, & desiccantem vinū habet, & moderate calidam: quare & lenes induratos liquat tum epota, tum foris cum ficubus imposita: & lepram & pforam sanat. Porro fructus eius racemosus iis qui coria depfant, est vilis.

VITIS NIGRA, CAP. V.

ΑΜΠΕΛΟΣ *μύλαρα* Græcis, & *Βρυόνια μύλαρα*, & *χέτριώστα αμπέλος*, *Nomina*
 Larinus Vitis nigra, & Bryonia nigra, & Vitis Chironia nominatur,
 Arabib; *Fesfe festanim*, Italis *Vite nera*, Gallis *Couleuce noire*. Nigra vero
 vitis dicta est ab acinis radiceq; nigris, & quod vitis similitudinē ha-
 beat. Vitem nigram describit Dioscorides totius hederæ similibus, magis ramen ad
 similacis folia accedentibus, sed maioribus, ita & caulibus similibus. Clauiculis etiā
 hanc arbores amplecti, fructu esse racemoso, inirio viridi, cū maturus nigro: radi-
 ce foris nigra, intrus buxei coloris. Plinius cum de vite alba dixisset subiungit. Est
 ergo & nigra quam proprie Bryoniam vocant, alij Chironiam, alij Gynecanthen,
 aut Aproniam, similem priori, præterquam colore: huius enim nigrū esse diximus.
 Radix foris nigra, intrus buxeo colore. Fuchsius pro vite nigra Vitalbā seu Viornam
 Gallorum, Germanorum Lynen seu Lenem exhibuit, quam pro Vite siluestri po-
 suimus. Matthiolum Italorum Tamaro, à ramo, siue à Tano, quam in Italia edulem
 esse Plinius scribit cap. 25. 21. vocabulo, Vitem nigram Dioscoridis esse putat, quæ
 Herbariis & Officinis Sigillum beatæ Mariæ nuncupatur, Gallis *Signet de Nostreda-
 me*, & *Couleuce sauvage*, Dodonæo Vitis siluestris, vt diximus. Illius sententiz duo
 maxime refragari videntur, quod vitis nigræ radix foris nigra sit, intrus buxei colo-
 ris, quodq; racemos nigros ferat: vnde Viti nigræ nomen. At sigillum Mariæ si in
 prais, aut humidis aut vliginosis locis nascatur, radice est crassa Bryoniz instar, fo-
 ris subrusa, intrus alba, tactu viscida. Si in asperis, saxosis & opacis, tenuis, fibrata, per
 petuò alba, fructu semper rubente, nō nigro. Qui fructus color Matthiolum à sen-



Lib. 6. 46.

Lib. 4. 177
Vires
Temper.

Lib. 2. 62.

parum distare. Vvam Taminiam Plinij, diuersam a staphisagria, quā falsō quādam ita vocabant, hanc esse docti herbarij censent, rubentibus acinis, in apricis nentem, præsertim cum Tamaro Italicum vocabulum ad Vvæ Taminiz sonum addat, siue ad Tamum, cuius vvam, Taminiam vocarunt. Vitē nigram ab alba illis duabus notis discipatē, quas expressit Dioscorides in Vvestphalia, Saxonia, Hestia, Misina frequentem esse, ē Germanorum scriptis ac epistolis cōpertum esse Dalechampius ait. Quare Sigillum Mariz, non vitē nigram, sed porius Dioscoridis Cyclaminum Cissanthemon esse Ruellius & quidam alij docti Herbarij non temerē censent: Vitē vērō nigrā nondum planē notam, in qua est sententia Dodonæus. Pena leuioris momenti esse ait, quod duz supradictæ noræ Sigillo Mariz desint, nepe color rubēs in acinis, & buxeus internus radicis: quia alioquin totia sunt hederacea, similaci asperæ quam simillima, circa frutices & sentes flexuosi gyri, viticularum multiplici capreolo proxima quæq; amplectente, racemi multis aggesti acinulis, virentibus primū, deinde rubellis: de mū ad inauritatē quasi vitam progressis, ex fusco rubore in fuscedinem atram vergentibus. Cætera vti radix quæ Bryoniam magnitudine, figura, efficacia & teneritudine inuitatur, foris nigra, intus alba) planē tam vera, quā vulgo notissima sunt: etenim vbiq; in Gallia & Germania siluosis & asperis diuinetis arbores sepēsque scandit, & vuis speciosis, oblongis, floribūsq; muscosis labruscæ, vel oleæ, pallentibus conuestit. Hæc est Penæ sententia: cui addit, vires etiā satis cōuenire. Scribit enim Diosco. viticulas prima germinatione erūpentes olerum modo in cibi vsum venire, vinas ciere, menses pellere, splenē liquare: comitialibus vertiginosis & resolutis prodesse: radicē similem albæ vitis radicī vim habere ad eadem vulē, sed minus efficacē, folia cum vino exulceratis iumentorū ceruicibus, comodissimē illini, & luxatis similiter imponi. Plinius Vitē nigrā asparagos, inquit, Diocles prætulit veris asparagis in cibo, ciendæ vinx, lieniq; minuēdo. In frutetis & arundinetis maximē nascitur: radix foris nigra, intus buxeo colore. Ossā infracta vel efficacius extrahit quā supradicta. Cæterū eidem peculiare

possibile est, quod tumorem ceruicibus vni. e medetur. Aiunt si quis villā ea cin-
xerit, fugere accipitres, tutaque fieri villaticas alites. Eadem in iumēto hominēq;
phlegma, aut sanguinē qui se ad talos deiecerit, circūligata sanat. In aliis exēplari-
bus exararū est, sanguinē qui fereatur, talis circūligata sanat. Quā lectionē mēdo-
sam esse & decurtata putat Hermolaus. Id quod ipsa medicinz indicat absurditas.
Quid enim stultius, aut quæ nā est hæc antipathia, vt adalligata hominis, aut iu-
mēto talo herba, pituita, aut sanguine qui reiciatur curet. Et sane codices vetustos
hanc alter habere, etiam si corrosi & ipsi laceriq; sint: Dioscorides luxaros sanari
circūligata ea scribit, vt fortasse legendū sit, Talos circūligata sanat, videlicet qui
in iumēto sunt. Priora autē verba separata & facile sensum habent. Vitis nigra, inquit
Galenus, quæ propriè vocatur Bryonia, supradicta ad omnia similis est, nisi quod
imbecillior. Sic cōpertum est vel mulierculus, ait Pena, Sigillum maris vehemen-
tius vrinā, renūq; sabulū & mentiū saburram impellere potu. Verū quod scribit
Matthiolus, Vitis nigra radici vim præstantissimam inesse ad excitandam vene-
reā, si sub radicibus cinētib; decocta deuoretur, id ille negat: quin potius quos-
dam sio solo expellere fuisse lumbos enervare, sanguinem tenēque inflammare.

DULCIAMARA, CAP. VI.

PRÆTER ceterioribus Herbariis herba hæc quæ vt supra descripta, *Nomina*
sepibus & fruticibus sese intorquet, & circūuoluit, γλυκύπικρα & γλυ-
κύπικρος nominatur, Latine Dulciamara, siue Amaradulcis, a studiosis
vitiæ & Mōspelij præsertim, Solanū lignēū, vel lignosum, Germani
aus Jeleger Jeleber, id est dulciamara, & Hunsfinkraut, quod ad morbu pecorū, Die Hunsf
appellari facit. Sarmētis multis, lōgis, gracilibus, teneris, rotundis, lignosis, fruti-
cat, quibus vicinis arboribus, sepibus & dumis
hæret. Folia ei sunt lōgiuscula, obscurē virentia,
ferè hederæ, sed minora, siue solani, vel simila-
cis, vel Sigilli maris, sensim acuminata, quorū
nōnullis inferne vtrinq; foliolū vnū quasi ap-
pēdicula vel pinnula adnascitur, acetosē mi-
noris, vel saluic nobilis modo: flores multi aggesti
violaceis saturatiores, singuli in quina foliola
mucronata, recurua, angusta, diuisi, è quorū me-
dio luteus apiculus prominet, vnde succrescūt
acini oblōgi, teretes, cōferti, primum virides, cū
maturuerint, rubri, coralli rubri modo, granu-
lis intus miliaceis, cōpressis, ingrati planē sapo-
ris. Radix parua est & fibrata. Plantæ huius cor-
tex primū quidē gustatu amarus est, & insuauis,
deinde quo diutius mādatur, eo dulcior & iucū-
dior redditur: vnde ei nomē. Secus sepes & du-
mos vialq; viginosas luxuriat. Mōspelij etiā in
ruderibus, maceriis & macilentis. Floret Iulio
mēse, Augusto semē maturū producit. Calida &
sicca esse tēperie scribūt Herbarij. Quare deco-
cti foliorū eius, siue sarmentorū & radicū in
vino potu, hepar obstructionibus omnibus li-
berari, & renū morbū inde sanari. Idē decoctū ex alto delapsis, cōtusis, luxatis, ru-
patis, vulneratis prodesse, quod sanguinē concretum per vrinās vacuet. Hæc herba
peritis quibusdā herbariis Theophrasti γλυκύπικρος, Penæ & Mōspeliensisibus, circū
esse creditur, Dodonæo Cyclaminus altera, Matthiolo Vitis siluestris. Plinius,

DULCIAMARA, siue
Vitis siluestris, Matth.



Locus.

Tempus.

Lib. 1. hist. cap. 4.

quod antea monuimus, in Historia Vitis siluestris, Ampelon agriam in salictis nascentem, ideoque Salicestrum vocatam esse tradit.

LVPVLVS,

CAP. VII.



RYONIS & Viribus adiungenda hæc quæ in veterum Græcorum Larinotumque monumentis non extat, nisi sit Plinij Lupus salictarius inter herbas sponte nascentes, quibus pleræq; gentium vtuntur in cibis, numeratus. Officinis Lupulus dicitur, Latinis recentioribus

Lupulus salictarius, & Lupus salictarius, quia subit scanditque salices, & arbuta omnia circumuoluendo sese complectitur: hinc etiam Lupulus tepritius à nonnullis hodie nominatur, à Græcis hodie vernacule *Bryonia*, aliquot Italice rura ad Græcam appellationem alludentia Bruscandulam, quasi Bryon vel Bryonia seu-
Genera. filem vocant, Galli *Houbelon*, & *Houblon*, Germani *Hopfen*. Lupulus diuini est
Forma. generum, siluestris & satiuus. Siluestris sarmenta producit longa, hirsuta, tactu aspera, multis capiteolis virgula & frutices vicinos amplectentia, folia viri alba, asperiora, triangula: flores pallidos, foliaceos, ac multis tenuibus folliculis stru-
 serie compactiles, qui fetè allium vinumque suboleant: semen compressum, pulu-
 genitæ, sed minus: radicè nigram, longam, longius prorepantem & furculosam.

Lupulum ex siluestri satium sedulo cultu fecere septentrionales, multisque pe-
 damentis ac tidicis tenellos eius capiteolos ful-
 ciunt, quæ fulcra, quia ferè semper salignæ, ideo forte salictarium Lupulum vocant. Hæc
 siluestri ptolixis sarmentis foliis & floribus est
 per quam similis, sed lætior multo tota planta
 cultu euadit, florumq; thyrsis foliacei & squa-
 mosis aduolentibus, semine item multo maiori.
 Lupulus siluestris iuxta sepes & vepres pene-
 nit: item in hortorum & agrorum marginibus
 Satium colunt Germani & Flandi in hortis,
 atque in campis patentissimis vinetorum mo-
 do, solo humentiore, lætiore, pinguiore. Angu-
 sto mense floret & Seprembri. Lupulus autem
 Mesie, temperatus est, vel potius frigidus, prin-
 cipio ordinis primi. Sanguinem bile flaua pur-
 gat modicè, eumque claru reddidit, & sedato eius
 calore temperat, præsertim sero lactis insulis.
 Ictericum syrupus ex eo sanat, febribusq; biliosis
 & sanguineis prodest. Ipse quoque & succus
 eius cum hordei polëta, cephalalgiam calidam
 sanat, & ventriculi ac hepatis intemperiem ca-
 lidam. Cùmque tam efficax sit medicamentum,
 mirum subit cur à nostræ tempestatis medicis in usu tam raro habeatur. Hæc Me-
 sue. Quibus haud assentiuntur recentiores. Flores enim calidos & secos esse,
 odoris grauitas & notabilis amaritudo testantur, inquit Fuchsius. Antiquis etiam
 Herbarius calidum & siccum secundo ordine esse tradit. Denique constat radices
 quoque eius calidas esse. Item Dodonæus Lupulum, flores potissimè calidos sic-
 cosq; esse secundo ordine statuit. Matthiolus eiusdem flores, folliculos & radices
 calidas esse, aperire, extenuare, abstergere & expurgare. Turiones verò quibus elixis
 vtuntur in acetariis cùm plus humiditatis habeant, parè tum exallescere, tum sic-
 care: esse sumentibus & cibum & medicamentum, quoniam sanguinem mudant,
 ventrem solvunt, obstructions aperiant, palatoque grati sunt. Florum & follicu-
 lorum

LVPVLVS, Matthioli.

Locus.

Tempus.
 L. 1. inoph.
 cap. 24.
 T. mper.
 & Vnes.



Ca. fl. hild.
 Lib. 4. cap. 29.
 hild.

In cap. 24.
 lib. 4.

paucis euenit, vt vetustate cōmutentur, velut in populo alba, & Ricino. (Quæ sic expressisse videtur Plinius, Maximè foliorum vnitas in suo cuiq; genere permanet, præterquam populo, Hederæ, erotoni, quam & Cici vocari diximus) Sunt igitur Helicis genera multa, maximè verò nota & summa tria. Prima est virens siue herbacea, quæ plurima est, secunda candida, tertia versicolor, quam Thraciam quidam nominant. Et singularum differentiarum quædã sunt. Nam virētis alia tenuiore est, & longiore folio (Plinius habet, in ordinem digesto) densioræque. Alia minus hæc omnia habet. Et versicoloris alia maius, alia minus folium habet, & colorum varietatem in eo dissimilem. Similiter & magnitudine & colore differant candidæ folia. Facillimè augetur herbacea, & altissimè assurgit. Manifestum esse alunt Helicem in Hederam transire, non solum foliis quæ maiora latioraq; gerit, sed etiam germinibus: protinus enim recta gerit, non inflexa vel inclinata, cum ob tenuitatem, tum ob longitudinem. Nam aliis hederis (Gaza legit *ἡδῆς*, id est herbacea pro *ἡδῆς*) breuiora crassioraq; sunt germina. Nam Hedera cum semine parit, sublime & rectum germen edit. Est quidem Hedera omnis, radice numero, densa, intorta, lignosa, crassa, nec valdè in profundum acta, sed maximè nigra, & inter candidas quæ asperrima, maximeq; siluestris. Quare non sine damno arboribus adnascitur: omnes enim necat & arefacit, sublato ipsi alimento. Crassescit hæc maximè & arborefcit, ipsaq; per se arborefcit. Maiore autem ex parte super aliud vivere solet, caulibus suis vicinas arbores velut amplexando, tale quid statim habens sua natura. Etenim è germinibus assidue radices per media folia emittit, quibus quasi de industria à natura datis, muros & arbores subit, & iis pertinacius hæret. Arque ita sublato humore, atque exhausto, ipsas tabefacit. Quod si inferius succidatur, durat, nec emoritur. Est & huius non parua differentia à fructu sumpta. Nam aliis dulcis est, alius valdè amarus, tam candidæ, quam nigræ. Id demonstrat aues, quæ alio vescuntur, alio minimè. Hæc de Hedera Theophrastus litteris mandauit, cum quibus Plinij locum in quo eadem genera distinxit, conferre, nec iniucundum, nec inutile fuit. Duo genera Hederæ prima, inquit, vt reliquarum, Mas & semina. Maior traditur mas corpore, & folio duriore etiam ac pinguiore, & flore ad purpuram accedente. Vtriusque autem flos similis est rose siluestri, nisi quod caret odore. Hæc scilicet Plinius quæ *μας* & *τῆς ἡδῆς* sunt audienda, τῆς ἡδῆς, id est Hederæ incogitanter tribuit. Species horum generum tres. Est enim candida & nigra hedera, tertiæque quæ vocatur helix. Etiamnum hæc species diuiduntur in alias: quoniam est aliqua fructu tantum candida, alia & folio fructum quoque candidum ferentium alius densus acinus, & grandior, racemis in orbem circumactis, qui vocantur Corymbi. Item selenitium, cuius est maior acinus, sparsior racemus (Hæc aliter legisse videtur Plinius quàm in Græcis nostris exemplaribus exaratum sit, in quibus selenitium vox deest, & hederam Corymbiam vocari legimus) Simili modo in nigra. Alicui & semen nigrum, alij crocatum, cuius coronis Poëtæ vtuntur, foliis nunus nigris, quam quidam Nysiam, alij Bachicam vocant, maximis inter nigras corymbis. Quidam apud Græcos etiamnū duo genera huius faciunt, à colore acinorum Erythranum (rectius fortasse Erythrocarpum) & Chrysocarpum. Plurimas autem habet differentias helix, quoniam folio maximè distat. Parua sunt & angulosa, concinnioræque, cum reliquorum generum simplicia sint. Distat & longitudine internodiorum, præcipue tamen sterilitate, quoniam fructum non gignit. Quidam hoc atatis esse, non generis, existimant: primoq; helicem esse, deinde fieri hederam vetustate. Horum error manifestus intelligitur. At enim helicis plura genera reperiuntur, sed tria maximè in signia. Herbacea ac virens, quæ plurima est, altera candido folio, tertia versicolor quæ Thracia vocatur. Etiamnū herbacæ tenuiora folia, in ordinem digesta, densioraq; In alio genere

genere diuerſa omnia. Et in verſicolori alia renuoribus ſoliis, & ſimiliter ordinariſ, denſioribꝫque eſt aliteri generi neglecta hæc omnia. Maiora quoque, aut minora ſunt folia, macularumqꝫ habitu conſtanti: & in candidiſ alia ſunt candidiora. Adoleſcit in longitudinem maximè herbacea. Arbores autem necat candida: omnemqꝫ ſuccũ auferẽdo tanta craſſitudine augetur, vt ipſa arbor fiat. Signa eiꝫ, folia maxima, atque latiſſima ramos erigẽtis (non mãmãſ: nam *μαρτυρῶν* legiſſe videtur pro *βλαστῶν*) qui ſunt cæteris inflexi: racemꝫ ſtantes atque ſurrecti. Et quanquam omnium hederarum generi radicofa brachia, huic ramen maximè ramoſa, ac robuſta: ab ea nigra. Sed proprium alba, quod inter media folia emittit brachia vtrinqꝫ ſemper amplectens arbores: hoc & in muros, quamuis ambire non poſſit. Itaque etiam pluribus locis inter ciſa, viuit tamẽ duratqꝫ: & totidem inſtra radicũ habet, quot brachia, quibus incolumiſ & ſolida arbores fugit, ac ſtrangulat. Eſt & in fructu differentia albae nigrae qꝫ: hederæ: quoniam aliſ tanta amaritudo acini, vt aues non attingant. Eſt & rigens Hedera, quæ ſine adminiculo ſtat, ſola

In cap. 177.
ca. 1.

omnium generũ ob id vocata Ciffoſ. Hactenus Plinius. Matthiolo dux ſunt præcipuè Hederæ differentiæ, maior & minor. Maiorem vocat arboream, quæ non ſolum in ſiliſ excelfaſ arbores ſcandit ſtrangulatqꝫ: atqꝫ brachiorum compoſitu, ſed etiam antiquiſ ædificiſ, vrbium mœnibꝫ, ſepulchriſqꝫ: adeo pertinaciſ hæret, vt tandem ea diruat, & vna cum iſ collabatur. Minorem quæ ſteriliſ eſt, & dicta, raro arbores ſcandens, ſed aut humi repens, aut per ſaxa, maceriaſ, ſepes aggeret ſerpens. Duo quoque Hederæ ſumma genera noſtra ætate nota ſunt. Primum genus eſt Hederæ vulgaris arboreæ cunctiſ notè. Huiꝫ multæ varietateſ, inquit Pena, antiquiſ perſuadere potuerunt, vt plureſ differentiaſ, ſine ſpecieſ ſtatuere: tametiſ diſcrimen è bacciſ duntaxat Dioſcorideſ accerſat, vt in malis, nucibus, & aliſ fructibꝫ vulgò ſit. Quinetiam arboreſcit quædam, ſuopte qꝫ ſtat ſtipite, nulli innixa pedamento, qualem in ſiluoſiſ quibuſdam Angliæ ſe vididiſ a. Orthociffoſ antiqui dicunt. Inrerduſ etiam quibuſdam lociſ perampelino colore folia nitent. Piſiſ ſibi demonſtrataſ ab Herbariſ corymbiſ caſſiſ & albicanſ coloris melinoſ ſubfulcoſ corymbꝫ pleraſque plantiſ ſitaſ in hortiſ Italiſ & Germaniciſ ex Campania & Apulia hodie maturare. Alterum genus eſt humiliſ planè, minoris & infrequentioriſ hederæ, quæ concinne Helix vocata ſuit à quampluriſ clauiculiſ capreoliſqꝫ viticeaſ, quibꝫ ſerpit & propagatur. Duo iſta genera hic appinximus, tertium ex Dalechampo huc adieciſmus. Hedera alba, inquit Dioſcorideſ, album fert fructum, nigra nigrum, aut crocei coloris. Helix nullum fert fructum, ſed alba habet ſarmenta (Antiquiſ codex habet *ἀνὰ ἑλὴ τὰ κλημεῖα*, id eſt tenueſ viticulaſ habet) & folia renuia, anguloſa & concinniora. Hedera nigra vulgaris eſt noſtra arborea fruticofa ſtirpiſ, quæ brachia fundit dura, lignoſa, cortice cinereo, ſpiſſo contecta, quibꝫ arbores, parieteſ, & quicquid nanciſci poteſt, amplectitur. Folia primum cum pubeſcit, anguloſa, quampluriſ in triangulam figuram exeuntia, quæ cum vetuſtiora ſunt, rotundantur, pinguiſſima,

In Aduerſ.

*HEDERA Arborea,
Mattholi.*

Lib. 2. c. 177.

Fern.



lzuia, etiam in uita bruma virentia: flores cogerie muscarij glom: rosi, pallidi, non inodori, quibus æstate de lapsis baccæ racemose, primum herbaceæ, deinde acutæ incunte hyeme maturescentes, ex longiore pediculo in vix modum dependent, ligustro similes, corymbos vocant. Radicem spargit numerosam, densam, flexuosam, contortam, ac surculosam, nec admodum profundam. Helix, ut describit Pena, ex farnētis, seu viticulis capreolos emittit, qui humi panguntur, & propagatione quadam quasi in spiras & anfractus prouoluuntur: interdum etiā serpens muscidis truncis & caudicibus aduoluitur, gracilioribus sarmentis, folia minora, altius triquetra diuisura, sinuata edentibus, planè superioris, sed minora, minorisque vsus: nec enim vel folia eius decerpuntur, vel gummi vllum Officinæ ex hac colligunt. Quin nec fuctus quidem vllus in ea obseruatur: vnde sterilis putatur. Hedera Chrysocarpos dicta ab acinorum colore aureo, Dionysia aut Bachica, quod coronis ex ea Poëtæ vrentur. Dionysiacos enim artifices Græci olim vocabant, qui aut cantu, aut musicis instrumentis scenæ ludisque publicis inservient, ex congeneribus nigris folium habet minus atrum, minimè angulosum, crassum, carnosum, venosum, in acumen fastigiatum, nec admodum densum: in corymbis acinos luteos aureo nitore fulgentes, maximè ex congeneribus aspectu pulchros. Hæc radicosis brachiis reliquarum modo vicinas arbores enecat, succo earum exhausto. Raro in Gallia prouenit. Helix in siluis humi serpit. Nigra & arborea vulgaris, circa vda, & circa ripas humentium regionum, frigidarū, & temperariorum: nam calidissimarum impatiens est. Hedera omnis auctore Dioscoride, acris est, & adstringens, neruos tentat. Flores trium digitorū capti in vino bis die poti, ad dysentericos faciunt. Ambustis cum cerato illiti profunt. Tenuera folia cum aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborū succus cum irino vngueto, melle, aut nitro, naribus infunditur. Et contra veteres capitis dolores valet, atque eo perfunditur caput cum aceto & rosaceo. Dolentibus & purulentis auribus cum oleo medetur. Nigræ Hedere succus, aut corymbi e poti imbecillitatē pariunt, mentēque turbant, largius sumpti Pilulæ quinque corymborum tritæ calfactæ, in malicorio cū rosaceo, si instillentur in cōtra tiam aurem, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillos illiti corymbi. Folia in vino decocta, omnium

HEDERA Helix,
Martholi.



HEDERA Dionysias,
Dalechampj.



Locus.

Li. c. 12.
Vires &
Temper.

temperariorum: nam calidissimarum impatiens est. Hedera omnis auctore Dioscoride, acris est, & adstringens, neruos tentat. Flores trium digitorū capti in vino bis die poti, ad dysentericos faciunt. Ambustis cum cerato illiti profunt. Tenuera folia cum aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborū succus cum irino vngueto, melle, aut nitro, naribus infunditur. Et contra veteres capitis dolores valet, atque eo perfunditur caput cum aceto & rosaceo. Dolentibus & purulentis auribus cum oleo medetur. Nigræ Hedere succus, aut corymbi e poti imbecillitatē pariunt, mentēque turbant, largius sumpti Pilulæ quinque corymborum tritæ calfactæ, in malicorio cū rosaceo, si instillentur in cōtra tiam aurem, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillos illiti corymbi. Folia in vino decocta, omnium

ulcerum generi, etiam si cacoethe sint, illinuntur: vitia cutis in facie, & ambusta, ut iam diximus, decocta sanant. Mouent menses triti & subditi corymbi. Iidem poti post purgationes foeminarum, sterilitatem faciunt. Pediculus foliorum inelle irrigatus & vulux inditus, menstrua & foetus extrahit. Succus instillatus naribus graueolentiam & putredines expurgat. Lachryma eius depilat, pediculisque illita, necat. Radicum succus cum aceto potus, phalangiorum moribus succutrit. In veteri codice habetur *συν ἄξερ* ἰ-*σὺθες* καὶ *πυθες*, id est, cum aceto potus coctusque. Eundem usum medicum hederarum Plinius exposuit etiam prolixius his verbis. Hederæ genera viginti demonstrauimus. Natura omnium in medicina anceps. Mentem turbar, & caput purgat. Largius pota, neruis intus nocet. Iisdem neruis adhibita foris prodest. Eadem natura quæ aceto ei est. Omnia genera eius refrigerant. Vrinam cient potu, capitis dolorem sedant, præcipue cerebro continentiq; cerebrum membranæ vtiliter mollibus impositis foliis, cum aceto & rosaceo tritis & decoctis, addito postea rosaceo oleo. Illinuntur aurem fronti: & decoctum eorum fouetur os, caputq; perungitur Lienis & pota & illita, profunt. Decoquuntur & contra horrores febrium, eruptionesque pueritæ, aut in vino teruntur. Corymbi quoque poti vel illiti lienem sanant, iocinora autem illiti. Trahunt & menses appositi. Succus hederæ radia narium graueolentiamque emendat, præcipue albæ sariæ. Idem infusus naribus caput purgat, efficacius addito nitro. Infunditur autem purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo. Cicatricibus quoque decorem facit. Ad lienes efficacior albæ est, ferro calefactus, satiusq; est acinos sex in vini cyathis duobus sumi. Acini quoque ex eadem alba tetni, in aceto nullo poti, neas pellunt: in qua curatione ventri quoque imposuisse eos vtile est. Hederæ quæ Chelyocarpum appellauimus, baccis autem coloris viginti, in vini sextario tritis, ita ut tetni cyathi petentur, aquam quæ cutem subietit, per urinam educit. Erastatus. Eiusdem acinos quinque tritos in rosaceo oleo, calefactosq; in cortice punici, instillauit dentium doli à contraria autem. Acini qui croci succum habent,

THLASPI Hederaceum,
Lobell.



Lij. simpl.

præsumpti potu, à crapula rutos præstans aut sanguinem excreantes aut torminibus laborantes. Hederæ nigrae candidiores Corymbi poti, steriles etiam vitos faciunt. Illinitur decocta in vino omnium ulcerum generi, etiam si cacoethe sint. Lachryma hederæ psilochitum est, phthiasimq; tollit. Flos cuiuscumq; generis tritum digitotum captu, dysentericos & aluum ciam emendat in vino austero bis die potus. Et ambustis vtiliter illinitur cum ceta. Denigant capillum Corymbi. Radicis succus in aceto potus contra phalangia prodest. Huius quoque ligni vase spleneticos bibentes sanari inuenio. Et acinos tetunt, morisque combutunt, & ita illinunt ambusta, prius petrusa aqua calida. Sunt qui & incidant succi gratia, eoque vtantur ad dentes erosos, frangique tradunt, proximis ceta munitis, ne lædantur. Gummi etiam in hederæ quærun, quod ex aceto vtilissimum dentibus promittunt. Hæc Plinius. Galenus easdem vires distinctius docet. Hederæ, inquit, ex contrariis composita est facultatibus. Habet enim quiddam adstringentis substantiæ, quæ terrena & frigida est, habetq;

habētq; etiam nonnihil acris, quæ calida. Nec deest tertia, aqueam namque substantiam quandam tepidam habet, si viridis sit. Cum enim arefcit, hæc prima exhalat necesse est, manētque quæ est terrena, frigida & adstringens, & ea quæ calida est, & acris. Viridis foliis in vino decoctis, vlcera grandia glutinar, quæq; maligna sunt, ad finitatem reducit. Igne etiam factas exulcerationes, cicatrice includit. Cum aceto decocta folia lienosis profunt. Flores aurei quodammodo validores sunt, vt ad læuorem redacti cum cerato ambustis conueniāt. Præterea succus medicamentum est, quod naribus infusum, capiti purgando idoneum est. Verruſtas aurium fluxiones sanat. Adhæc vlcera vetera, tam in auribus, tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo, aut dulci oleo miscetur. Lachryma eius pediculos interimit, pilis nudat, vsque adeò calidæ potestatis, vt obscurè adurat. Plantam aliam Hederaceam ex Lobellio pictam damus, Hederaceam Thlaspi vocat. In Portlandiæ peninsula, Cornubiæ vicino portu Plimmoavve, alijsq; maritimis cautibus repit herbula, dodratalibus & spirhamis gracilibusq; cauliculis, stratis, punctis, foliis sinuosis Hederaceis, carnosiss. Floſculi cadidi & semen exile in folliculis gustu & habitu Thlaspi exprimunt. Hæc Lobellius.

SMILAX.

CAP. IX

SMILACIS vox valde est ambigua, vt quæ quasdam cognatas vel similes plantas, significet, quasdam admodum discrepantes, & vinbus planè cōtrariis pollentes, veluti taxū venenatā, (σμυλαξ enim Dioscoridi dicitur) & Smilacem asperam quæ venenis aduersatur, præterea Smilacem læuem, facultatis non admodum exploratæ, quandoquidem vtilitatem nullam, sed tantum incommodum turbulenti somnij parere Dioscorides scribit. De duabus hic agimus, quarum prior σμυλαξ πικρα Græcis dicitur, μύλαξ Gale-
no, Latinis Smilax aspera, & Hedera Ciliſſa, aliquibus volubilis aculeata, vel pun-
gens, Ital. s. *Hedera spinosa*, & *Rouo ceruino*, Gallis *Liser piquant*, Germanicè, inquit
Fuchsius, *stechendbunde* ab aculeis quos habet apte nominari potest: σμυλαξ vero
λεῖα, si. e. μύλαξ λεῖα Græcis altera vocatur, Latinis Smilax læuis vel læuis, Plinio
Conuoluulus, Officinis & Herbariis Volubilis maior, nonnullis Campanella, &
funis arborum, Ital. *Uoluchio maggiore*, Gallis *Grand Liser*, vel *Liseron*, Germanis
Vindendkraut. Læuis porro non alia ratione appellatur quàm quod aculeis careat.
Smilax aspera vt describit Dioscorides, folia habet periclymeno similia, ramulos
multos, tenues, paliuri, aut rubi modo aculeatos. Circumuoluitur arboribus sur-
sum deorsum se circumagens: fructum fert racemosum, paruum, cū maturuit ru-
bentem, gustu leuiter mordentem: radicem duram, crassam. Smilax læuis hederæ
folia similia habet molliora tamen, læuiora, & tenuiora: ramulos supradictæ simi-
les, aculeis carentes. Conuoluitur & hæc arboribus vt prior. Fructum fert lupino
similem, nigrum, paruum: flores circumquaque albi, copiosi, orbiculati per totam
Smilacem exeunt. Æstate tabernacula ex ipsa fiunt: Autumno folia decidunt. Smi-
lax aspera, vt Dioscorides ait, nascitur in palustribus & asperis, vt Plinius, in con-
ualtibus opacis, at Smilax læuis amat culta, & in iis potissimum gignitur. Nascitur
nobis passim per fruteta, & sepibus se aduoluit. De utrâque Smilace Plinius hæc
prodidit. Similis est hederæ, c. Cilicia quidem primum profecta, sed in Græcia fre-
quentior quàm vocant Smilacem, densis geniculata caulibus, spinosis, fruticosa,
ramis & folio hederaceo, paruo, non anguloso, à pedicelo emittente pampinos:
flore candido, olente lilium. Fert racemos labruscæ modo, non hederæ, colore ru-
bro, cōplexa acinis maioribus nucleos ternos, minoribus singulos, nigros, durosq;
infausta omnibus sarris, & coronis, quoniā fit ligubris, virgine eius nominis pro-
pter amorem iuuenis Croci mutata in hunc fruticem. Et mox. E. Smilace hunt

Nomina

Li. 4. c. 319.
Forma.

Locus.

Lib. 16. c. 31.

codicilli, propriūque materiz est, vr ad mota auribus leuē somnū reddat. Quæ Plinius ex Theophrasto sumpsit, sic scribente: ὁ δὲ σμίλαξ ἐστὶ μὲν ἰσαυλάγχρων. ὁ δὲ καρπὸς ἀγανθώδης, καὶ ὥστερ ὀρθάχων (mendosa hæc, sic enim legenda. ἰσαυλάχων, ὁ δὲ καρπὸς ἀγανθώδης, καὶ ὥστερ ὀρθάχων.) τὸ δὲ φύλλον κυττωδὲς, μακρὸν, ἰγνύνει, καὶ τῇ μίχρῃ περισφυσσι, καὶ παλινώτερον. ἴδιον δὲ ὅτι τὴν τε δια μέθῃ τῆς οἰμῆς ὥστερ ῥάχων λαπίην ἔχῃ, καὶ τὰς σπυμνίας διαλύει (Reclius καὶ τὰς σπυμνίας διαλύει) ἐκ ἀπὸ τούτων, ὥστερ τὰ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ παρὰ αὐτῇ περιφερῆς, ἡγνύνας ἀπὸ τῆς περισφύσεως τῶν μικρῶν φύλλων. παρὰ δὲ τὸν καρπὸν τὸν ἄνωγον, καὶ παρὰ τὰς διαλύει τὰς φυλλοκῆας, ἐκ τῶν αὐτῶν μικρῶν τοῖς φύλλοις περισφύσκειν καρπὸν λαπίον, καὶ ἰλακίον, αἷον δὲ λακόν, ἔξιδύοντες ἔσονται (Reponē ex Plinio λαπίον) τὸν δὲ καρπὸν ἔχῃ περισφυστὸν τῶν τρυχίνων, καὶ τῶν μηλῶν, καὶ μάλας τῇ χαλκιδόνι φυλλοκῆας, καὶ ἀκρίμασιν δὲ ὁ βότρυς κατὰ τὴν τρύπην, πατερνῆξ δὲ μάλλον πρὸς τῇ φυλλοκῇ, ἀπὸ γὰρ ἴσως σπυμνίας οἱ μίχρῃ οἱ ῥακκοὶ, ὁ δὲ καρπὸς ἰσχυρὸς, ἔχει πυρρῶτα, δὲ μὲν ἰσχυρὸν διὰ τὴν τοῖς μετέξουσιν δὲ τρυχίνων, καὶ τοῖς μακροῖς ἵνα σκληρὸς δὲ πυρρὸς μάλῃ καὶ τῇ χαλκιδόνι μάλας ἔξωθεν. ἴδιον δὲ τῶν βότρυν, ὅτι ἐκ παλαιῶν τὸν καρπὸν περισφύσκει, καὶ ὅτι ὥστερ ὁ βότρυς τῶν χαλκιδόνων, ὥστερ ἰσχυρὸς καὶ βότρυς, τῶν δὲ διὰ τὴν ὥστερ ἀκρίμασιν καὶ παλαιῶν ἀκρίμασιν, mendosē pro παλαιῶν γάρ, vel, παλαιῶν ἀκρίμασιν. Id est, Smilax caulibus suis sese aliis implicat, & obuoluit. Caulis eius spinosus, veluti rectos aculeos gerit. Folium hederaceum, oblongum, angulosum, quā pediculo annectitur, & latius. Propriū huic quod mediū ipsūm neruus, spinæ tenuis modo secat, & staminum diuisiones non ab ipsa spina, vt in altis foliis, sed circa ipsam in orbem circumactas ducit ab ipso pediculi annexu. Ad caulem verò imbecillum, quā folia velut interstitio quodam ab ipso seiunguntur, ex eodē sinu enascitur cum foliis cauliculus gracilis & conuolutus: flos est albus, odoratus, liliu olens. Sic Plinius. Ex quo perspicuum est λαπίον legisse, Gazam verò ἔσονται, sicuti habent vulgata exemplaria: vertit enim, Verno proueniens tempore. Fructus similis solano, aut melochro, & maximē viti siluestri, racemis vt hederæ pendebus, propiū tamen ad vix figuram accedenribus: quoniam ab eodem puncto pediculi acinorum exeunt. Fructus ruber sæpius quidem nucleos binos complexus,

SMILAX Aspera, Maith.



maior ternos, minimus singulos. Foris nigri sunt nuclei, & valde duri. Peculiare habent racemi, quod ex obliquo caulem sepiunt, & vnus omnium maximus est in summo caule, velut in rhamno, atque tubo. Vnde liquet Smilacem & in summo, & in lacere fructiferā esse. Hædæus Theophrastus. Smilacem asperam esse plantam hic depictam censent Herbarii, quæ, inquit Penna, non nisi montosis collibusq; feruidiorum tractuum, Romanæ, Hispaniæ, Lingæothicæ, prouenit. Vbi plurima horridis, aduncis, crebrisque spinis rubi ritu amplexatur proxima quæq; assurgitq; vltra supraq; parietes, & sæpes vicinas. Folia hederacea, longiora, hyroniz nigrae ambitu, & superficie, non incisā, sed læuā, & in medio secundum strias nervulorum spinulas habentia, ex atro virentia. Fert acinos rubros racematim copiosos, nubes vulgaris magnitudine & modo: nec flores dissimiles nubes verius suis, racemosos, sed albos. Radices tamen longius excurrant subter humum, ternis, aut quaternis vlnis longiores, non tantum tamen cum

cum Zarzā parilla similitudinis habent, quantum hæcenus persuasum fuit doctis quibusdam, qui scripserunt Zarzam parillam, nihil aliud esse quàm Smilacis asperæ radices. Qua de re suo loco dicemus. Ab hac Smilace aspera, foliis, viticulis, spinosis, floribus, vuis, radice, viribus, deniq; natalibus differt Smilax læuis, ab Herbariis vulgò dicta Volubilis maior, Italis *Volubilis maggiore*, Gallis *Liseron*, Germanis *Wundenkraut*.

SMILAX Læuis, Matth.



Consentiunt notæ omnes dempta collatione seminis huius, nigri & angulosi, cū lupino compresso & rotundo. Quare suspicatur Pena pro *ἵριον* legendum esse in Dioscoride nomē *ἵριον* ex Latino Græcum factum. Suspicionem augēt verba proximè sequentia, quæ neutiquam *ἵριον* coherent, Semen veluti lupini, paruum, & nigrum. At semē lupini, nec parvū est, nec nigrū. Non est igitur quod quis conuoluulūm reiciat, inquit Pena. Est enim nō modo sarmentis viticulis, mollioribus, longissimis, & aptissimis ad fornicatas opacationes, sed etiam foliis læuibus, hederaceis, flore albo, orbiculato, radice longa, sparsa, flexuosa. His accedit antiqui & manuscripti Herbarij testimonium, qui Smilacem læuē, Volubilem maiorē interpretatur. Quidam aptius pro re ipsa, nescio an verius, at melius, legūt apud Dioscondem, *χαρπύς δὲ ἔχει ἐπὶ θυλάκων, γαλάνων, μικρῶν*, alij verò, *ἐπὶ τῷ ἔργον*, id est, fructum nigrum & paruum habet, folliculi septo inclusum. Eius etiam pictura, Volubilem,

quam maiorem appellauimus, penitus exprimit. Smilacis asperæ folia, auctore Dioscoride, si ante & post bibantur, contra lethalia venena efficacia sunt. Tradunt sititum ex his aliquid nuper in lucem edito infanti bibendum detur, nullum illi postea venenum nociturū. Conciditur etiam in Alexipharmaca. Smilacis læuis semen, eodem auctore, cum Dorycnio, & utrūq; trium obolorum pondere potum, somnia multa & turbulenta facere traditur. De utrūq; viribus hæc Plinius scripsit. Smilax quoque, quæ & Nicophoros cognominatur, similitudinem hederæ habet, tenuioribus foliis. Coronam ex eo factam impari foliorū numero, aiunt capitis doloribus mederi. Quidam duo genera Smilacis dixere. Alterum immortalari proximum, in conuallibus opacis, scandentis in arbores, comantibus acinorum corymbis, contra venenata omnia efficacissimis, in tantum, ut acinorū succo infantibus instillato, nulla postea venena nocitura sint. Alterum genus culta amat, & in iis gignitur, nullius effectus. Illa est Smilax prior, cuius lignum ad aures sonare diximus. Galeno Smilacis folia leniter acria gustu sunt, alioqui vntibus calidæ, cui similes quodammodo vires Milax læuis obinet. Empirici hodie succo Volubilis maioris ad calidos vtuntur affectus, capitis porissimū, & oculorum.

Li. 4. ca. 71.
Vire.

Li. 14. ca. 10.

HELXINE CISSAMPELOS, CAP. X.

Ἑλξίνη κισσαμπελος Græcis, Helxine Cissampelos Latinis nominatur, Arabibus *Asfin*, vulgus Herbariorum & Officinæ Volubilem mediā, *Nomina* & vitealem appellant, Gallicè *Liseron de vigne*. Est autem dicta *Ἑλξίνη* ἐπὶ τῷ ἔλκεσιν, quod significat trahere & arripere. Cissampelos autem, quod cum folio sit hederæ, tum viticea propagine vicinis sese obuoluat, vnde

HELXINE Cissampelos,
Marthali.

L. 414. 3.
Forma.

Locus.



Cap. 174.
hilot.

HELXINE Cissampelos,
Dodonæ.

Lib. 40. 3.
& Purg. 1.
cap. 6.



Vires.

Lichmpl. nuncupatur, digerendi facultatem habet.

Conuoluuli nomen, & q in vineis potissimum nascatur, vnde & Viteal's. Hæc, inquit Dioscorides, folia habet hederæ similiha, minora tamen, ramulos exiguos, circumplectentes quodcumq; contigerint. Nascitur in sepibus, vineis, & frumento. Hæc, inquit Matth. satis declarat Helxinem Cissampelon eam esse quæ in aruis tū segetes ipsas, tū linū, tum legumina irretit, ac vincit, & in vinetis, palis, ac vitibus circumuoluitur, quam Hetrusci *Viluchio minore* appellant, Tridentina rura *Minuola*, Recentiores Volubilem minorem, & Conuoluulum minus, Galli *Petr Liferon*, Germani *Kleyn vundekeyant*. At Dodonæus & Lobellius Smilacis læuis speciem esse statuunt, & ad eam referunt. Ille Smilacem læuem minorem, hic cum Pena Smilacis læui maiori subiungens, Conuoluulum minorem purpureum vocant. Maiorem Smilacem satis refert, sed humilior, tenerior, ac acuminato minor est: tenues illi quoque & viticolosi cauliculi, quorum nonnulli humi repunt, alij herbas frugescq; scandunt, & crebris eas voluminibus vinctur: folia oblongiora, hederaceis minora, mollia, ac læuia: flos similiter calathæ figura, nonnihil odoratus, magna ex parte candidus, relucente tamen in eo diluto rubentis purpuræ colore, & radiantis stellæ effigie: semen exiguum, radices tenues, candidæ, velut prius sparguntur. Helxinem vero Cissampelon Dodonæus, tum in Stirpium, tum in Purgantium Historia eam esse censet, quæ ad Smilacis læuis genus quoq; pertinet, & Conuoluulum nigrum, & Volubilis nigra dicitur, à Democrito in Geoponicis *μολδακχουτος*, Latine Mollis hederæ, Officinis Volubilis media, Germanis *Schwartz vunde*, & *Mittel vunde*. Huic prætenues multæ cirrorum instar subrubentes viticulæ, quibus fructibus, & omnibus quæ contingit vicinis sese crebris circumuolutionibus implicat, ab imis ad summa proserpens: folia lata sunt, longa, acuminata, hederæ foliis molliora, tenuioraq; flores exigui racematim coherant, candiduli, semen triangulare, nigrum, tenuibus & subrubentibus membranis, veluti glumis integitur: radix exigua brevisq; est. Iuxta sepes & sæpius

VOLVVLVS TERRESTRIS, CAP. XI.



OLVVLVM terrestrem plantam istam nominarunt Herbarij, quod Nominat
 florem Voluulo siue conuoluulo, siue volubili similem proterat, ter
 restrem, quod caules perpetuò per humum spargat, nec conuoluulo-
 rum more in proxima adminicula scandat. Radice est crassiuscula, ni- Forma.
 gricante, modicè fibrata, caulibus multis, sesquipedalibus, humi iacentibus, villosis,

VOLVVLVS Terrestris,
 Dalechampi.



cùm franguntur nullum lac emittentibus, quo-
 rundam Voluulorum modo, gustu suauiteris:
 foliis longis, angustis, rugosis, non ita densis: flore
 Conuoluuli minoris, superiori capite descripti, e
 puniceo candicante, suauiter olète, ex decem ve-
 luti foliolis constante, sed quæ à sese minime dis-
 iuncta sunt, verùm lineolis tantum discretæ, alio-
 qui coherrentia. Prouenit in aridis, macris, sabu- Locus.
 losis, apricis. Alius est Voluulus siue Conuoluul-
 us hederaceus, siue cæruleus, omnium huius clas-
 sis rarissimus & pulcherrimus, inquit Pena, nec
 nisi hortis Italiæ, Galliæ, Belgij notus, vti antea
 purpura porrectis attextisque secus parietes, &
 perticas, longis viticulis, gracilibus, vmbacula
 concinnat, aspectu periucundus: visendus quoq;
 floribus è pediculorum calice exeuribus, Vincæ-
 peruineæ colore similibus, in ambitu quinis pro-
 minentibus angulis, Nolæ cæruleæ effigie: vnde
 Campana Lazura Italica dicitur. Folia ternis angu-
 lis singula, in teneriusculis pediculis Cyclaminû,
 hederamve annosam imitantia, nonnihil hirsuta:
 longa & gracilis radix. Nulla sui parte in vsum à

VOLVVLVS Cæruleus,
 siue Cipana Azura, Lobel.



Medicis assumitur. Serapio cap. 173. Granum Nil vo-
 cat, etiam ab Auicenna memoratum, & ita describit
 Conuoluulo similem esse: flagellis duobus, aut tribus,
 applicare sese arboribus: virèntibus ramis & foliis pur-
 pureo flore, oblongo, calathio simili, ad exortû folio-
 rum prodeunte: seminibus, flore delapso in suo capi-
 tulo tribus, nigris, leuibus, minoribus quàm Staphys-
 agris: quæ huic plantæ conueniunt omnia. Dodo-
 næus esse putat Ligultrum nigrum Columellæ. Alij,
 quod non est contemnendum, censent Virgilij, Co-
 lumellæq; vnum ac idem Ligultrum esse, album Vir-
 gilio dictum à colore floris, nigrum Columellæ à co-
 lore fructus. Quidam Pothon cæruleum Theophra-
 sti esse credunt, ornamento & vmbaculis sepulchro-
 rum laudatû antiquitus. Alij Pothon illum esse ma-
 lunt Cōuoluulum purpureum duplicè Cortusij, illu-
 stris viri, laudandique multis nominibus, caulibus
 prælongis sese viciuis perticis aduoluentem, in altero
 genere spinosis, in altero læuibus: folio lato, læui, mi-
 nimè angulosò, in ea specie quæ caret spinis, prona
 parte candicante: flore elegantiori purpura nitente: se-
 mine læui, nigro, splendido. Clusius Conuoluulum

Lib. 1. stir.
 Hilp. 4. 40.



incana, per ambitum crispa, nonnunquam serrata, & nonnihil lacinata, gustatū gummosa, subacria, & subamara. Flores ex alarum sinu promit, longis pediculis hærrentes, conuoluuli floribus similes, qui ita complicantur, vt pluribus foliis constare videantur, ex purpureo candicantes, interdum omnino purpurascens. Radix tenuis, exilis, fusca, per summos cespites repit, & alias plantas producit. In collibus iuxta Tagum læto solo, in Baetica, plurimisque aliis Hispaniæ locis frequenter capit, florereque Martio & Aprili. Ad quam stirpem à veteribus descriptam referri possit, ignorat, nisi fortè Iasionem, cuius meminit Plinius, esse quis existimet. Valentini Conuoluulum folio althææ, Hispani vulgari nomine *Campanula*, id est, Campanulam, Lusitani *Verdegilla* vocant, & ad vulnera curanda efficacissimum esse

CONVOLVULVS Minimus, Clusij.



ramulis, ex eadem radice prodeuntibus, humi procumbentibus, pedali aut cubitali longitudine, duris, flexilibus tamen, & lanuginosis, qui in summo aliquot flores proferunt purpurascens, inodoros, superiori similes, minores tamen, unico folio constantes, sed ita implicato, vt quinque constare videatur, foris margine in totidem angulos prominente: folia per ramulos nullo ordine sparsa, oblonga, angusta, tenui lanugine obducta, salicis foliis haud absimilia, gustu gummosa, & aliquantulum amara: radix candicans, singularis, perennis, infima parte ramosa. Nasceitur iisdem quibus superior locis, atque etiam in Gallia Narbonensi. Sunt qui Camtabricam Plinij esse putent. Conuoluulum minimum spicæfolium vocant Pena & Lobellius, cuius effigies minus scitè expressa est apud Penam, Scammonium tenue Plinij quorundam.

aliud peregrinum pinxit, qui vepribus atque fruticibus adnascitur, illisque aduoluitur, alioqui humi iacens, nec sese attollens, quod viticulis seu clauiculis sit infirmioribus, gracilibus, pedalis aut cubitalibus, subhæretis. Folia illi hederæ, sue althææ minora, aiunt. Conuoluulum peregrinum Clusij vocat Lobellius, & Conuoluulum Scammonij facie, Hæmone Cissampelō Dioscoridis. Aliam huc congenerem idem Clusius pinxit, quæ ad Voluulum terrestrem Dalechampi videtur accedere. Constat multis tenuibus iuncisque

PERIKAT'MENON Græcis, Periclymenum Latinis, Scribonio Sylva *Nomina*
 mater, Græcis hodiernis *περιελανθία*, vulgò, Officinis & Herbaris Ca-
 prifolium, Matriflyua, Volucrum maius, & Lilium inter spinas, Italis
Vincetoxicum, Getmanis *Geyssblatt*, & *Speck gulgem*, Gallis *Chœnefolium* Periclymenum autem
 dictum, quod circumnoluendo ad se vicinas arbores aut frutices vocet, & ab Italis
Vincetoxicum, quòd vicinas plantas vinciat. Periclymenum, vt describit Dioscorides, *Lib. 4. c. 13.*
 simplex frutex est, ex interuallis folia spargens ipsum amplectentia, subcandida, *Forma.*
 hederæ similia: iuxta folia erumpunt germina, in quibus est semen hederæ simile,
 flos albus, fabæ similis, subrotundus, quasi in folium procumbens: semen durum
 egre euellitur: radix crassa, rotunda. Oribasius, qui stirpium delineationes ex Diof-
 coride transcripsit, sic depingit. Periclymenum frutex parvus est, simplex, caule
 quadrato, per interualla foliolis circumdato, albicantibus, hederæ figura. Inter fo-
 lia surculi exeunt, in quibus fructus est hederæ similis, qui quasi in folium procum-
 bit, durus, & qui difficultè auellitur: radix longa. Oritur in aruis & sepibus, sese
 fruticibus adstantibus inuoluens. Eodem ferè modo Plinius. Periclymenos fruti- *Lib. 17. c. 11.*
 cat & ipsa, ex interuallo duo folia habens, subcandida, mollia: in cacumine autem
 semen inter folia durum, & quod difficultè euellitur. Nascitur in aruis ac sepibus,
 conuoluens sese adminiculis quibuscunq;. Hanc Periclymenon Officinarum esse
 Caprifolium, & Herbariorum Matriflyuam censent periti quibus minime placet
 eorum opinio, qui hanc in dubium reuocant, negantq; esse Periclymenum, quia ra-
 dicem non habet *πεχέαν, περιεπερή*, vt ait Dioscorides, id est, crassam, rotundam.
 At *περγύλη* is non dixit, nempe orbiculatam, siue tuberosam, sed *περιεπερή*, id est,
 rotundam, non angulosam. Alij locum corruptum esse censent, atque ex Crateua
 & Oribasio restituant, *πεχέαν καὶ μακράν*, id est, crassam & longam, vt iam omnis
 dubitandi & rixandi occasio sublata sit. Sed in hoc frutice duplex obseruatur va-

PERICLYMENVM
perfoliatum.



rietas foliorum, vt annotauit Pena. Nam folium
 Italice & Narbonensis vulgarioris surculis vnū
 cum sit, ac continuum, gemini tamen speciem
 præbet, quasi vmbilico medio traiectum, vt in
 Centaurio luteo, Perfoliata, & Tithymalo ser-
 rato: ideoque Periclymenum perfoliatum di-
 ctum, quasi pertusum aut perforatum. Extremo
 verò cacumine viticularum folium acetabuli
 forma vel vmbilici circinatam, florum delicias
 continet, ex purpura niueo candore nitentes,
 & alicubi luteo aspersas, sensim in longitudinē
 porrectas, quasi promuscides elephantorum,
 aut lagenulas, floribus sabaceis figura multum
 similes: semine rotundo, coccineo, byroniæ,
 succulento. Istud Dalechampius Periclymenum
 grandius vocat. In septentrionalibus verò re-
 gionibus, vt in Germania, Gallia, Anglia, Bel-
 gio, frequentius vsitatusque est Periclymenum
 non perfoliatum. Longis, tenuibus, lignosis, &
 in ramulos diuisis sursum repit cauliculis, circa
 quæ ex interuallis folia bina ex aduerso sita, ob-
 longa, mollia, dilute virentia, infernè magis ca-
 nescencia, non continua, nec à cauliculis pertu-
 sa: flores

Tempus.

Vires &
Temper.

Lib. 4. c. 19.



Lib. 4. c. 7.

Lib. 9. c. 29.

2.

Lib. 27. c. 11.

Lib. 8. sim.

Cap. 149.
hibo.

sa: flores in summis ramulis multi pariter emicant, oblongi, candidi, suave olētes, interius caui, vna parte prominētiore, staminibus aliquot ē medio exēutibus fructus acinis similis in exiguarum vuarum modum compactus per maturitatem rubet, in quo semen duriusculum: radix lignosa cum multis adnatis. Periclymenum Iunio & Iulio mensibus floret: semen Augusto & Septembri maturum est. Id postquam maturuit collectum & in vmbra siccātū datur Dioscoride auctore, drachmę pondere in vino quadraginta diebus, vt lienem minuatur absūma & lassitudinem discutiatur. Orthopnoeæ & sanguitui prodest. Vrinam cit a sexto die cruetam. Partum accelerat. Habent easdem vires & folia, quę triginta septem diebus pota sterilitatem cecere putantur. In periodicis febribus cum oleo inuncta, earum horrores mitigant. Quod interpretes verterunt, sterilitatem facere putantur, Gręcē legitur *ἡ ἀσθενὴς τῆς γυναικὸς ποτὶς*, quod est interpretare And. Lacuna, Impotentes facere viros ipsos produntur. Sterilitas enim, inquit, defectus est scēminarum, quas *ἀσθενὴς* perpetuo

vocat Dioscorides, dum ipsis notam sterilitatis inurit: quemadmodum *ἀσθενὴς* medicamenta omnia illa, quę vim concipiendi adimunt. E diuerso autem foliis vocare *ἀσθενὴς* eos viros, qui prolifico sunt semine destituti, aut illud adeo frigidum, languidum, inefficax quę habent, vt ex eo neutiquam gigni animal possit. Hoc vero Periclymeni facultatem Plinius ad Clymenum retulit. Cum enim Clymenum descripsisset, subiungit. Quibus morbis pota medeatur, dicemus. Sed hic indicandum est dum medetur, sterilitatem potu etiam viris fieri. Qua in re Theophrastum Plinius secutus est scribentem. *Ἀσθενεῖν δὲ φασὶν γυναικας, καὶ ἰσὺς τῆς γυναικὸς τὸν καρπὸν αὐτῆς σωεῖσθαι διὰ τὴν ἡμέραν ἐν ὧν λαλοῦσιν, καὶ ἰσὺς τῆς γυναικὸς τὸν καρπὸν αὐτῆς σωεῖσθαι διὰ τὴν ἡμέραν. ἴαν δὲ ἰσὺς τῆς γυναικὸς τὸν καρπὸν αὐτῆς σωεῖσθαι διὰ τὴν ἡμέραν. ἴαν δὲ ἰσὺς τῆς γυναικὸς τὸν καρπὸν αὐτῆς σωεῖσθαι διὰ τὴν ἡμέραν.* Id est, Gignere nequaquam posse aiunt eum qui Clymeni fructum biberit continuo triginta diebus in vino albo, collectum sextarii mensura, æqualibus quotidie portionibus, hac enim portione absoluta penitus sterilem fieri hominem aiunt. Alias Periclymeni vires tradit Plinius parum a Dioscoride dissidens. Semen eius in vmbra siccatum tunditur, & in pastillos digeritur. Hi resoluti dantur in vini albi cyathis tribus, tricenis diebus ad lienem, eumq; vrina cruenta, aut per aluum absūmit. Quod intelligitur à decimo statim die. Vrinā cient & folia decocta, quę & orthopnoicis profunt. Partum quoque adiuuant, secundasque pellunt pota simili modo. Galenus Periclymenitum fructus, tum folia, inquit, adeo vehementer incidentis & excoalscentis sunt facultatis, vt si pluseculum bibantur, vrinam sanguinolentam efficiant, principio quidem vrinam duntaxat mouentia. Porro foris cum oleo illita excoalsciunt. Iuuant lienosos & difficulter spirantes. Competens portio mensura est drachmę vnus cum vino. Porro desiccatur quoque semen: & quidam aiunt si copiosis bibatur, sterilitatem bibentibus adterre. Sed & sunt qui certum dierum numerum ad talem potionem præsternunt, vt Dioscorides, qui septem & triginta dies eos trādiderunt. Hic etiam vrinam cruentam reddi à sexto die memorat. Matris silua, inquit Fuchs, cum gustu acrimoniam præ se ferat, omnia quę veteres Periclymeno tribuunt præstat.

præstat. Quibus accedit quod recentiores Herbarij suo Caprifolio easdem vires assignent. Exsiccare enim ipsum tradunt vlcera humida & sordida: sanare impetigines, & alias cutis fœditates, lienem absumere, difficultati spirandi conferre, par-tus celeritatem facere, calculos pellere, faciei maculas abstergere.

CUCUBALVS PLINII, sine Ocimoides repens. CAP. XIII.

CUCUBALVM istam Cucubalum esse Plinij siue Cacubulū quasi male- Lib. 27. c. 8.
ficum, quidam esse arbitrantur, quam alio nomine, inquit, Strumum
appellant, alij Græcè Strychnum ob foliorum cum Solano similitu-
dinem. Est Cyclaminus altera Lucæ Ghini, Clusij Alfine repens, aliis
Ocimoides repens. Nasctur in sepibus radice cādida, crassā, ramosa: flagellis mul-
tis in vicinia adminicula scandentibus: foliis Ocimi vel Solani, in ambitu minime
divulsis, candicantibus, per intervalla semper geminis: flore candido, quinque fo-
liolis constante, per medium fissis: baccis rotundis, nigris, fructui Solani similibus, *Forma.*
quas foliola quinque herbacea sustinent & amplectuntur, fœtidi & ingratisimi
saporis. Sunt qui hanc Clymenum herbam esse putent à Plinio descriptam foliis
hederæ, ramosam, caule inani, articulis præcinctam, odore graui, & semine hede-
ræ, siluestribus & montosis nascentem. Alij Cucubalum Plinij Solanum hortense

CUCUBALVS,
Plinij.



OCIMOIDES Repens,
Polygami folio.



Græcorum esse credunt, nimirum cuius acini nigricant, quod in quibusdam Dios-
coridis exemplaribus legerunt, Solanum horrense à Romanis Strumum & Cucu-
balum vocari. Sed hæc & permulta alia huiusmodi notha esse, & Dioscoridi falsò
adscripta, à viris doctis dudum obseruatum fuit. Præterea cum Plinius aliis locis de
Solano tractarit, credibile non est eum in vulgarissimæ herbe cognitione lapsum
fuisse. Cucubali folia trita cum aceto scribit Plinius serpentum ictibus & scorpio-
num mederi. Quidam hanc alio nomine Strumum appellant, alij Græcè Strych-
num. Acinos habet nigros. Ex his cyathus succi cum nulli duobus medetur lum-
bis: *Vires.*
Lib. 27. c. 8.

bis item capitis doloribus cum rosaceo infusus. Ipsa strumis illita. Aliud Ocimoides repens polygoni folio pictum dedit Lobellius, quod, ut describit Pena, è cauliculis gracilibus, geniculatis reptantibus, teneris, flexuosis, Alsinæ maioris folia profert bina iuxta genicula, oleæ silvestris, myrti, aut polygoni similia, sed paulo latiora: flores in caliculis oblongis, saponariæ concoloribus, multò minoribus: radiceem exilem. In Taurinensium ad Padum collibus vmbrosis & siluosis & iuxta sepes frequens oritur, atque etiam in Veganij herbidis & vmbrosis marginibus, seculi riuiolos è saxorum commissuris.

I E S E M I N V M,

CAP. XIII.

Nomina

Cap. 176.



RABES vernacula lingua *Zambach* & *Sambach* appellant auctore Serapione, & Græcos imitari volentes *Iesemin*, à lāsine Græco nomine, quod violaceum significat. Qui cum Gelsemini siue lāsini (sic enim plantam istam nominamus, Itali *Gelsimino*, Galli *Iosemin* & *Iasmin*, Recentiores quidam *Apiariam*, quod apes eius floribus plurimum delectentur) flores odoratos, albicantes albx violæ modo conspicerent, ipsi violæ nomen indidere, quod est *Iesemin* Huius tria genera Serapio esse tradit. Vnum cui flos albus, alterum cui luteus, tertium cui cæruleus. Quartum adiecit Dalechampius flore puniceo. *Ioseminum* planta est pergularum ornamentis apertissima, & quæ industria & pedamentis ad fornices concinnè erigitur, à radice prolixissima fundens virgulta octo vel decem cubitorum longitudine, flexilia, viridia, ex quibus folia prodeunt, fere semper septena, ex atro virentia, mollia, oblonga, in mucronem sensim desinentia, superne acutiora quam lentisci, toto ambitu minimè crenata. Flores in virgultorum summitate racematim prodeunt, oblongi, suauiter olentes, albi, ex quibus rarissime semen oritur, in quibusdam tamen locis edere lupino si-

Genera

Forma.

IASMINVM Album,
Marthioli.

POTHOS Cæruleum,
Marthioli.



nule scribit Matthiæolus, quod à Cortufo ad se missum fuiffe ait. Calidos & amœ-
nos tractus amat, passimq; habetur in hortis & vindariis. Flores Iulio & Augu-
sto profert. De Iasmino luteo tractauimus in libro de iis quæ in asperis nascun-
tur. Tertium genus quibusdam Pothos Theophrasti purpureo flore, Clematis pe-
regrina cærulea & purpurea Penæ & Lobellij, Clematis altera Matthiæolo & Do-
donæo & in Scirpium, & in Purgantium, Historia. Prolixis admodum, tenuibus,
geniculatis & subrubentibus sarmentis, pet arbores, frutices, pergulas, pe-
damenta scandendo in altum proropit. Folia multa, prioris flammula: modo diui-
ta, sed tamen maiora latioraq;. Flores elegantes è tenuibus & longis dependent
pediculis, expansis quaternis ex aduerso fixis foliolis constantes, sæpe cærulei,
quandoque purpurei, staminibus aliquot mediis: semina plana, rotunda, lata,
acuminata in globulum congeruntur. Radices prolaxæ, tenues, in omnem par-
tem sparguntur. In hortis colitur, nec vspiam alibi se vidisse Penæ refert. Quare
Dodonæo imposuerunt, qui in Anglia iuxta sepes & agrorum margines sponte
prouenire perualuerunt. Plantam istam quidam inter Iosimini geneta numerant.
Sed cum nec foliorum figura, nec positus, nec floris species Iasmino quadret, hanc
ab illo diuersam esse multi credunt. Quartum Iosimini genus numerari potest,

In cap. 64.
lib. 3.
Locus.
Tempus.

Lib. 3. c. 43.

In Aduerf.

IASMINVM Puniceum,
Dalechampy.



quod Galli *Iosmin rouge*, & *Iosmin large* appel-
lant propter floris & colorem & amplitudi-
nem. E' Chio insula planta Genuam primum
aduecta, inde Lugdunum, fruticat recto proce-
ròque caudice, sambuco non dissimili, fungoso,
læui, non admodum crasso, eius corrice ima
parte rugoso, ramorum viridi & tenui. Flagellis
multis luxuriat in cameras & pergulas horto-
rum scandentibus. Folia in ramulis alarum mo-
do expansis septena aut nouena, ordine ex ad-
uerso sita, extremo quod impar est longo, acu-
to, molli tamen cuspide, nec pungente, cæteris
breuioribus & rotundioribus quam in Iasmino
albo, crassis, nigricantibus, minimè incis: flore
priusquàm dehiscat purpureo, cùm reclusus
est, intus candicante, foris verò putrescenti-
bus foliolis duobus, qui priusquàm haret, flo-
rem candidum contegebant, quàm in albo la-
tiore, ampliore, venosiore. Qui Byzantium
profecti sunt, affirmant plātam hanc in eo tra-
ctu, & multis Peloponnesi locis, à Græcis &
Turcis coli studiosissimè, & vbiuis in hortis
spectari. Sunt docti Herbarij, qui Pothon albū,

à Theophrasto memoratā inter coronarios æstiuos flores, Iasminum esse putant: Lib. 6. hist.
cæruleum verò, plantam à nobis demonstratam, & explicatam suprà ad finem ca-
pituli vndecimi. ἡ δὲ ἐστὶν ὁ ἑσπέριος καὶ ἡ ἀφροδίτη. ἡ δὲ ἐστὶν ὁ ἑσπέριος, ὁ μὲν ἵχθυος ὁ αἰθέρης ὁμοιοῦται τῇ
ἑσπέριῳ. ὁ δὲ ἑσπέριος ἄχρως, λευκός, ὁ χερνίκος περὶ τὴν τῆρας, καὶ χερνίκος ἑσπέριος. Quæ
Plinius sic interpretatus est. Sed maximè spectabilis Pothos. (Desiderium verūt
Gaza) Duo genera huius. Vnum cui flos hyacinthi est: alterum candidius, qui
serè nascitur in tumulis. (Rectius dixisset, quo circa sepulcra vtebantur, nimirum
prope ea ferentes, vt eius vaga fronde contegerentur, deciduisque floribus con-
spargerentur: id enim apud veteres in religione positum fuit, vt vita defunctorum

Lib. 6. hist.
cap. 7.

*Uuesit
Temper.*

Lib. ac. 66.

bulsa, & sepulcra, manēsq; floribus & coronis ornarentur.) quoniam diuturnior est. Diutius florentem Theophrastus intellexit ac viuaciorem, quia quotannis non moriatur, ut cœruleus. Pothon priorem vulgare Iasminum floribus albis, quod dixi, plerique esse credunt. Alterum supra descriptum, flore hyacintho simili, cœruleo, venustissimo: Iasminum album sicut odore fragrat, ita & viribus multis pollet. Setapio tradit calidum esse in principio secundi gradus, humores discutere, aduersus phlegma salsum valere, senibus frigidis vtile esse, doloribus à piruita viscida otitis & catarrhis prodelle: folia eius tam humida quam sicca impetigines & lentigines abstergere: dolorem capitis facere us qui calida sunt temperie. Ex floribus paratum oleum frigidis affectibus confert. Ex iisdem vnguentarij oleum conficiunt, quod Zambacinum siue Sambacinum vocatur, cum amygdalino oleo hominum barbæ odoris tantum gratia affundendum, quod tamen temperie calidis caput adeo exalfacit, ut quandoque sanguinem è naribus eliciat. Flores, Iasmini cum amygdalis dulcibus tamdiu & toties commisceant, quousque eorum humore odorato illz imbutæ fuerint. Tundunt deinde eas in mortario lapideo, & calidas succulo conclusas prelo committunt, unde oleum exprimitur perquam odoratum. Sunt qui vocum similitudine decepti Sambacinum oleum & Sambucinum à Sambuco dictum idem esse falso credunt. Dioscorides apud Persas Iasminum oleum fieri prodidit ex albis floribus Leucoij, quod inter epulandum odoris gratia vsurpabatur. Vnguentum hoc ex ea viola compositum intelligit Herimolus, quæ vulgò Gelseminum vocatur, distinctiones & arundineos parietes in hortis opere topiario conuestiens. Nec de vlllo alio violarum genere Iasminum Dioscoridis vnguentum intelligit Marcellus, Vergilius, quam de vulgari Gelsemino: cuius vnum genus cum sit flore cœruleo, quartum id violarum esse genus colore cœruleo à Dioscoride traditum is autumat. Quorum sententia ab omnibus doctis hodie improbat. Nam Gelseminum viticulis, foliis, ramulis, flore, radicibus, totius denique plantæ habitu ab omni Leucoio differt. Præterea Iasminum vnguentum ex Gelsemini flore quod cœruleum Leucoium Dioscoridis Marcellus esse vult, non fit, sed *ἡ τῶν ἀγῶν τῶν λευκῶν τῶ ἰω*, id est, ex floribus albis violæ. Ad hæc Iasminum grauius spirat: Dioscoridi, quam ut libenter à plerisque recipiatur, quod demonstrat ex nostro Ielsemino non fieri. Postremò Serapio Dioscoridis interpres, alterum ab altero diuersis capitibus distinxit, & seorsum de vtriusque tanquam de diuersis disseruit. Probabilius est quod existimant attentiores herbarij, vnguentum id parari ex Albæ violæ floribus, qui inter omnia *τῶν λευκῶν* genera iucundissimi & validissimi sunt odoris, ut suauitate & vehementia rubras, puniceas, cœruleas violas longè superent.

DE IASMINO RUBRO, Dalechampij.

CAP. XV.



VAM plantam Iasminum rubrum vocant herbarij, in hortis colunt ac serunt olitores, floris gratia pulchritudinēque inuitati. Radice ea nititur crassa, longa, carnosā, fibrosā, inæquali ac verrucosā, foris nigra, intus alba, cum manditur, sapore acri. Caulis ad altitudinem propè hominis surgit, iuxta radicem scabro & rusto cortice rectus, suprà herbaceo, ac virenti, maluz instar, quadrangulus, canaliculatus, medulla candida fæctus, statim nodosus, nodis alternatim & sigillatim protuberantibus, non ex aduerso, alarum modo, sitis. E' singulis nodis ramus pro-

DE IASMINO Rubro,

Dalechampi.



nascente caule, addito stercore munitam, perferre hyemem aiunt, vèrequè repullulascere.

mi prode unt, bicubitales, quadranguli caulis modo, atque medulla pleni, canaliculo exculpto striati, nodis per intervalla ad cacumen usque prominentibus, è quibus minores furculi nascuntur. Folia Anarauti purpurei, aut Bliti, sed in extremo acutiora, ordine sic digesta, vt perpetuò inuicem bina opponantur, nervo per media porrecto, venis hinc illinc ad medium nervum distentis, vela nervo ad extremam oram folij pertinentibus: in summo fastigio, quà flos exoritur, sena, ampliora nempe duo, minora quatuor: saporis principio fatui, deinde acris. Flos coccineus, coloris nigriflumi, Periclymeno similis, angustus infernè, suprà latiusculus, apicibus extantibus insignis, è quatuor decussatis granis emicat, compressis, quibus, delapso flore, semen continetur, rotundum, nigrum. Quod è sapore iudicare licet, aquosa & humida est quædam eius portio: ignea verò, calidâque, & sicca altera, quæ discutere valenter possit tumores frigidos. Alas eius facultates nondum cognitæ esse intellexi, aut proditas. Sequi

CLEMATIS ALTERA BÆTICA,

CAP. XVI.


PEREGRINUM herbæ genus Clusij industria nacta est posteritas, quod sarmenta longa, lenta & ramosa habet, quæ binos per intervalla capreolos contrariis semper inter se pediculis nascentes proferunt, quibus per vicinas arbores & frutices scandit: folia pyriserè, minora, dura, viridia, & per ambitum incisa siue ferrata, sapore acri & feruido, singula in singulis pediculis, sed plurima simul ex clauicularum alis prodeuntia: interquæ ex utroque sarmentorum latere pediculi exeunt calyculum sustinentes vt in tithymalis, ex cuius medio capitulum eminet è multis seminibus milio similibus congestum, quibus insident oblongi cincinnati, villosi, veluti plumulæ albæ. Hanc primum se inuenisse ait Clusius inter Asindum (vulgo Medina Sidonia) & Calpen secundum fluuenta, vicinas arbutulas operientem, & pondere suo deprimentem: deinde aliis Bæticæ locis, Ianuario iam suos cincinnos explicantem. Censet ad Clematida, cuius meminit Dioscorides, referendam esse, quia illi admodum similis est cùm forma, tum temperamento. Huic adiungenda Clematis altera minor, longifolia Lobellij, cui folia sunt flammulæ, siue Clematidis albæ, multò longiora, ex aduerso bina. Cubitales & bicubitales cauliculos humi spargit. Semen,

FFF 2

*CLEMATIS Batca,**Clusij.**CLEMATIS Altera minor**longifolia, Lobelij.*

radix, cæteroque facies non diuersa à Clematide vulgari. Hanc quidam Cly-
menum esse arbitrantur.

HISTO



HISTORIAE

OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS-

QVARTVS,

*In quo omnes Cardui & alia spinosa aculeataq; planta describuntur,
& ad vinum depinguntur.*

SPINOSARVM PLANTARVM DIFFERENTIAE.

CAP. I.



ONCE diuersam à superioribus plantarum differentiam prosequimur, eamque admodum conspicuam, ut pote quæ nobis inuicis se prodar, nec inultos abire sinat eos qui paulò imprudentius plantas huius classis vel colligant, vel cõtrecent. Hac differentia plantæ multæ ab aliis, spinis, sentibus, aculeis, muricibus, echinis discrepant. Eadem spinosarum siue aculeatarum caulibus, surculis, foliis, flore, fructu, carduorum & acanaceorum genus constituitur. Spina

Ruell. lib.
1. cap. 2.

Spina.

Sentiu.

Aculeus.

Echinus.

Murex.

luir, sic ut vellicet, vel stimulo quodam lacessat, non aliter quàm si quamprimùm à tangeneibus sentiatur, sentis consuevit nominari. Aculei, quæcunque duriuscula in cuspidem turbinata punctiõnem infligunt spiculorum modo. Quicquid numerosa congerie aculeorum stipatur, siue tegmen, siue caput, siue cacumen, echinus est, sic dictus quòd globofo spinarum agmine marinum echinum siue erinaceum imitetur. Nec longè secùs murer paucioribus sœuit aculeis. In istis autem producendis tantus fuit, & sic prodigus, ut ita dicam, naturæ luxus, ut ipsis etiam veteribus tam difficile fuerit omnes earum differentias nosse, quàm accuratè eas describere, & notis inter se discernere. Nobis verò qui multò plures spinosas plantas & carduos diligenti herbariorum conquisitiõne notiores, quàm de eorum lectiõne habemus, & quibus hodie cardui innotuerunt longè admirabiliores nostratibus, nusquam à veteribus memorati, longè difficilior fuit ex obscuris ipsorum delineationibus prisca nomina pàsìm obuiis accommodare, qualia sunt polyacanthos, onopyxos, myacanthos, tetralix, chalceios, leimonia, &c. atque iis quæ nominibus carent propria ponere. Præterea cùm inter sese dissidentes herbarij eandem plantam variis nominibus designarint, de hac controuersia iudicare arduum fuerit. Quare ut plantarum istius generis cognitionem capere possimus, primùm operæ pretium est ipsas exquisitè nouisse: deinde eas quæ ad veterum cognitionem referri, & priscorum nominibus nuncupari possunt, ita expendere, alias ab iis aut præteritis, aut ignotas neutiquàm omittere, sed & cum accuratis descriptionibus, tum aptè cõnectis appellationibus indicare. Quod ut rectè fiat, primùm ipsarum diuisionem vniuersè ponemus ex Theophrasto, deinde singulorù tractatione aggrediemur. Αἰγὶς γὰρ ἴδιον ἴδιον, id est, spinosa siue aculeata Theophrasto sunt,

Lib. 6. h. 1. cap. 3.

ἡ μὲν ἀγριοῦσθις δίκυς, id est, in totum spinosa, alia non in totum. In totum spinosa, Corruca, Scorpio. Non in totum spinosa sunt φυλλώσθη, id est, quæ folia omni ex parte sic in spinas diuisa habent, vt tangenti præter spinas vndique nihil occurrat, vt acorna, drypis, acanacea, spinosa foliata Gaza vertit. Alia ἐξ ὑποστάσεως, id est, ὑποστάσεως, id est, mucronatur, & habent latera angulose dissecta, vt simlax, phellodrys, ilexi in acutū producta, & in angulum depressa Gaza interpretatus est. Alia ἐξ ὑποστάσεως, ἡ μὲν παρὰ τὴν ὑπόστασιν, vt ruscus, hippoglossum. Alia sunt ἀγριοῦσθις ἐκ τῶν ἀγριῶν, ἡ μὲν παρὰ τὴν ὑπόστασιν, ἡ δὲ ἐν τῇ ὑπόστασιν, id est, mucronata, & insecta pectinum modo, vt abies, pinus, picea, cedrus, iuniperus. Alia παρὰ τὴν ὑπόστασιν ἐκ τῶν ἀγριῶν, ἡ δὲ ἐν τῇ ὑπόστασιν, id est, quæ spina foliis addita (id enim παρὰ significat) & mucrone pungunt & lateribus, vt ilex, phellodrys, simlax, agria, Gaza reddidit quæ cū extremo tum lateribus sinuata cōcidunt. Alia παρὰ τὴν ὑπόστασιν φύλλον ἐχούσα, id est, præter folium minimè spinosum aculeis horrentia, vt rhamnus, tribulus, ononis, stœbe. Gaza non rectè reddidit, quæ iuxta aculeum folium gerunt, cū præter aculeum dicere debuisset. Alia ἐκ τῶν χαλκῶν ἀκάνθια, ἡ μὲν παρὰ τὴν ὑπόστασιν, ἡ δὲ ἐν τῇ ὑπόστασιν, id est, spinas caulibus enascentes habentia, foliumq; insuper aculeatum: hoc enim ἡ μὲν significat, vt capparis Aegyptia Gaza reddidit quæ non solum caulem aculeatum, sed etiam folium habent hispidum. Quæδὰ ὀρθοστάσια, id est, arrectis spinis muricata, vt simlax, quædὰ voce ex superiore conficta καμπυλόσθη dicta, id est, vncinatis arcuatisq; spinis armata. Quæ Plinius sic expressit. Spinosarum multæ species. In totum spina est asparagus, scorpio: nullum enim folium habent. Quædὰ spinosa foliata sunt, vt carduus, eryngium, glycyrrhizon, vrtica: iis enim omnibus foliis inest aculeata mordacitas. Aliqua & secundum spinam habent folium, vt tribulus, ononis, phleas, quod aliqui stœbē appellauēre: hippophaes spinis angulosi. Quædam in folio habent, & in caule, vt Capparis. Tribulo (non tribula, vt vulgati codices habent) proprietas, quod & fructum spinosum habet. Hæc Plinius ex Theophrasto, corrigēda, vt adnotauimus. At nos de spinosis omnibus hic dicere non instituimus. Quædam enim superioribus libris spartim sui similibus coniunctæ sunt, alix hic explicabuntur, potissimum cardui & acanacea, à vulgarioribus & notioribus ad alia minus nota progrediendo.

SCOLYMVS, CACTVS, CYNARA, CAP. II.

Nomina



ΚΟΛΥΜΟΝ Græcorum, Latini Carduum interpretantur generatim. *κατάρας* autem à quibusdam per i, scriptam teste Galeno, ab aliis per ypsi-
lon, quidam corrupta voce Artococum, alij Alcocalum vocant, nunc vul-
gus herbariorum Artococalum, Arabes *Raxos, Harxos*, Germani *Strobildorn*, Itali *Artococa, Carcioffo*, Hispani *Cardo de comer*, Alexander Trallianus *ἄρτιον*, Galli *Artichaut*. Cynaræ nomen dedit puella eiusdem nominis, quam in hanc herbam conuersam fuisse fabulantur. Sunt qui à cinere dictam velint, quo, vt Columella & Palladius aiunt, lætatur. Hoc etymū Græcos nomē id à Latinis mutuo sumpsisse indicat, tamen contra huius vocabuli notionem, ex Græcia venisse in Latium vetustissimi quique Græci tum Poetæ tum oratores demonstrent, qui apud Athenarum cynaræ spinæ meminerūt, Sophocles, Hecataeus Milesius, Callimachus, & alij. Sunt qui potius à cane dictam malunt *κύναρις*, quod Apollinem consensenti Loco reddidit est oraculum, vrbem ibi conderet, vbi lignea cane morderetur, tandem in crure cynara vulneratus, oppidum cōstruxit. Sed Didymus apud Athenarum *Cynobaton potius*, id est, canis sentem intellexit. Dioscorides de scolymo tantum egit, de cynara minimè. Verum ne ambiguitate significationis deceptus lector vel hallucinetur, vel fluctuet, hic monendus, Scolymum Dioscoridis, alium esse quàm Theophrasti: amboque Plinium confudisse his verbis: Syluestrium genera sunt duo: vnum fruticosius

Lib. 1. hist. cap. 16.

Ibidem.

Lib. 2. hist. cap. 16.

Lib. 6. hist. cap. 16.

Lib. 7. hist. cap. 16. Lib. 11. cap. 16.

fruticosius à terra statim (Scolymus est Theophrasti) alterum vnicauale, crassius (Scolymus Dioscoridis iudicatur) vtrique folia pauca, spinosa, muricatis cacinibus: sed alter (nempe Dioscoridis: nam alterius luteus flos est:) florem purpureum mittit inter medios aculeos, celeriter canescentem, & abeuntē cum aura. Scolymum Græci vocant. Idem cum tradit Orientem Scolymum quoque in cibos recipere, & alio nomine Limonium vocare, fruticem nunquā cubitali altiore, cristisq; foliorum, ac radice nigra, sed dulci, Erato stheni quoque laudata in pauperis cœna, &c. de Scolymo Theophrasti illa sunt intelligenda, quamvis quod subiungit emedullatæ radicis vnciam vnam graueolentiam alarum emendare, & vitium id ex alis per vrinam effluere, petium sit ex Dioscoride. Quod vero ibidem alio loco tradit, Scolymum quoque vocari Limonium, apud Theophr. legisse videtur *σκολυμῶς, ὅς ἐστι Λιμονία*, cum tamen illic apertissimè *Λιμονία* Cardui genus à Scolymo discernatur. His ita distinctis prius Scolymum Dioscoridis proponamus, deinde alterum Theophrasti. Scolymus Dioscoridi folia Chamæleonis habet, aut eius plantæ quam albam spinam vocant, nigriora, crassiora longum caulem edit, foliis vndiq; plenum, cui spinosum caput inest: radix nigra, & crassa, cuius vis utilis est iis quorum alæ & reliquum corpus grauitur olent, si illinatur, (Cornarius pro *χρῆσις πολλοῦ σκολυμῶς*, id est illita, legit *χρῆσις πολλοῦ σκολυμῶς*, id est inspersa, cū in puluillum detrita fuerit, aut si bibatur in vino decocta: copiosa sic vrina & fecida expellitur. Herba recens nata, asparagi modo elixa manditur vt olus. Scolymus hic circa Mōspelium in lætis agris secus vias profilit, quem indigenæ vocant *Charidamere*, Officinæ Chamæleontam, nulla prorsus nota ex iis quas Dioscorides memorat reclamante: partu etiam cum adhuc tener est, in cibis grato, & germinibus, ac radicibus, quæ præsertim germinibus connectuntur (nam inferiores & alius depactas ob lignosam duritiem respuunt) esu suauissimis. Hanc plantam Pena Scolymum siluestrem, siue Cynaram siluestrem vocat quia tota facie Cynaram aculeatam refert. Hoc tantū interest, quòd foliis angustioribus, aridioribus,

SCOLYMVS *Dioscoridis,*
Cynara siluestris, Pena.



& multò densioribus spinis sit: flores item eleganti purpura multi, conferti lanugine. Huius delibratis caulibus teneriusculis & capitulis nodum in flores erumpentibus victitare rusticos Italos ait Pena. Eius flore lac dēfant in caseum: eiusdē florem vulgò credunt contra ferinarū sterilitatem valere, & grauidarum partus ad iustum vsque tempus continere. Scolymo Theophrasti hoc proprium quod nō solum elixa radix vescendo est, sed etiam cruda: quod tum esu iucundissima est cum planta floret: quòd durefcens lactescit: sed maximè peculiare florescēdi tempus, circa solstitium. In cibo grata est tumescētis capitis carnosā moles, oblonga, minimè aculeata, & omnino ei propria in illarum genere quibus spinosum folium, contrā quā in Chamæleone, cui folium aculearum, non autem spinosum caput. Scolymi flos senescens in pappos abit, velut Acornæ, ixines, & aliarum quæcumq; his similes. Ad ætatis vsque finem capita & florem parit indefinenter. Semini humoris & medullæ parum. Arescens folium elanguescit, desinitq; pungere. Hactenus Theophrastus.

Plantam hanc Græci etiãnum hodie vocant Scolymum: Vegetius libro de Veterinaria Eryngium nominat. Eryngium luteum Monspelienses, & Itali Bononienses appellant. Nasçitur prope Narbonam in maritimis: radici crassities pollicis, raphani figura: color sublaeus: succi lactei copia, vt denti leonis: estur illa

SCOLYMVS Theophrasti, Clusio.

L. 1. Sculp.
Hupacap.
78.



CACTVS, Matth.
Carduus Aculeatus.

L. 19. cal.



cruda & cocta à perquam multis: ex ea caules numerosi prodeunt, crassities digiti, cubiti altitudine, nonnunquam prociores, foliosis folia prope radicem maiora, longiora, obscure virentia, vt in aliis Carduis laciniata, albis maculis notata: per summos caules minora: flos luteus: semen compressum, in capitulis Cnici similibus, magnitudine nucis moschatae, aculeis præduris adeò tota planta horret, vt vix tractari possit illèsa manu. Clusius eandem plantam Scolymum Theophrasti esse censet, eoque nomine depinxit, quæ caules cubitales profert, admodum ramosos, ad quorum alas singulas folia intensius viridia, sinuosa, & albis spinis horrida: flos illi luteus Cnici ferè modò: semen in capitulis spinosis lacum, foliaceum, squamam coherens: radix longa, digiti crassitudine, carnosa, dulcis, qua libenter vescuntur sues, quemadmodum & Eryngij vulgaris radice, eaque de causa in agris vtramque rostru erunt. Tota planta dum recens est, lacteo succo manat. Salmanticensi agro & tota Castella frequentissimam esse ait. Tota æstate florere, & interdum etiam Autumno, deinde semen proferre. Similem etiam esse circa Monspeliũ, sed multò lætiorem, paucioribus ramis, & altius assurgente, neque flore adeò copioso, & foliis veluti lacteis maculis insignitis. Salmanticensis Silybum nuncupant, vulgus *Cardum Lechal*, siue *Lecher*, id est Carduum lacteum. Eadem tenellam adhuc plantam & primùm germinatam cum ipsa radice elotam, crudam aut cum carnibus coctam edunt: ipsius lacte omne lactis genus coagulat, & flore crocum adulterant. De hoc Scolymo legimus apud Plinium, gulã, quæ portenta terrarum in ganeam vertit, etiam ea quæ refugiant quadrupedes conscire, Scolymum in hortorum areas & puluinos transtulisse, vbi cultus mangonio domita feritate mansuescit, licet quidam de Carduis altilibus & Cactis exponat, ex agris in hortos transgressis, & ad hanc mitiorem naturam, qua hodie tantum placent, olitorum diligetia perductis. Scolymorum caulibus adhuc teneris, & capitulis nondum florem ostendentibus, Itali rustici etiãnum hodie vescuntur, vt diximus. Præter vtrumq; hunc Scolymum, sunt

CYNARA Non aculeata,
Matthioli.CARDVVS Vulgaris,
Matthioli.

sunt in hortis frequentes Cacti, ac Cynaræ cū cuius foliis albi Chamæleonis folia Dioscorides confert. Gallix vulgus Cactos appellat Cardons, Cynaras Artichautæ, hac differentia quod Cactorum capita non mandantur, sed radici. pars suprema, foliorum ima, cū tenellis germinibus, planta terra sepulta per multos dies, quoad

CYNARA Non aculeata,
Dodonæi.

tenerefcet, albefcat, dulcefcet, idque feret tota Hyeme, & Autūno iam progreflo: contrā in Cynara nullus earum partium vſus eſt, ſed capitulum ſolum. Præterea Cactis & folia & capita nunquā nō aculeata ſunt: Cynaræ veiō cūm duplex genus ſit, alteri, pariter ea, vt & Cactis, ſpinis armantur, alteri ſpinis carent, diuerſo hac in re palatorum iudicio, quibuſdam eam magis commendantibus quæ ſpinoſa eſt, aliis contra eam quæ ſpinis nullis pungit, Theophrastus utrāque hanc plantam Cacti nomine indicauit, nulla facta Cynaræ mentione. Galenus, Paulus, Aëtius Scolymum ſtomacho prodeſſe adnotarunt. Cynaram autem vitiolum ſuccum gignere, præſertim, vt Galenus ait, cū iam induit, nempe melancholicum, aliàs verò bilioſum & tenuem, ideoq; elixam adiecto coriandro potiùs edendam, ex oleo, garo, & vino: vel abſq; iis, ſi in patinis, aut ſarragine cocta fuerit, quo modo eius ſtrobilos, ſue capita multi præparant. De Cacto iam Theophrastum audiamus ſic ſcribentem: ὁ δὲ κάκτος ἐγγλυμῶν παρὰ σικελίαν μένει, ἐν τῇ ἰαλῶδι δὲ ἐκ ἔσθῃ, ἴσθαι δὲ παρὰ τὰ ἄλλα

l. b. d. l. u. l.
ca. 4.

CARDVVS *Altilis, Cynara*
sine capibus acuta, Dod.



τὰ ἄλλα τὸ φύλον. ἀρίσται γὰρ δὴ οὗτοι ἀπὸ τῶν ῥίζης
καυλὸς ἰκνηστὸς, τὸ δὲ φύλον ἔχει (adde ex Gaza,
Plinio, & Athenæo παλαιὸν καὶ ἀρχαῖος, καὶ οὖτοι δὲ
καυλὸς (deest vox καυλὸς, ex Athenæo & Plinio
addenda) ἰδιώδης δὲ ἔστι περιεργασίῃ (emenda
περιεργασίῃ) μακρὸν ἰκνηστὸς (lege ἰκνηστὸς ex
Athenæo) καὶ ῥηγεῖναι αὐτὸς ἐν αἵματι (mendo-
le, pro ἐν αἵματι) ἔτιτοι δὲ καυλὸν ὀρθὸν ἀρίσται, ἐν κα-
λῶσι πῆρεος γινέ) δὲ ὅς ἔστω ἰδιώδης, παλὸν ἀνα-
σάντες, τὸ δὲ περιεργασίῃ ἐν ὅς ἀρίστα, τὴν μὲν
μορφήν ἀναθώδες (lege ἀναθώδες) ἀφαιρέθῃ δὲ
τῶν παππῶν περιεργασίῃ, ἰδιώδης ὅς τὸ τοιοῦτον, καὶ ἰμπε-
ρίς τῶν φαικῶν ἐργασίῃ. καλῶσι δὲ αὐτὸν σκα-
λίαν. (Ascaliam legit Plinius, Athenæus Ascale-
ron.) Id est, Cactus in Sicilia tantum nascitur, in
Græcia nusquam habetur: planta est suæ pro-
prietatis: statim enim à radice caules emittit,
non in terram repentes, ut Gaza interpretatus
est, sed in terram vergentes, folium latum &
spinosum: caules vocant Cactus, qui delibrati
sunt edules, paulum subamari, quos & mœtia
seruant: caulem alium rectum edit, quem pter-
nica appellant: is quoque vescendo est, sed fer-

uari non potest. Fructus in quo semen acanaceam speciem gerit, sed detractis pap-
pofis seminibus, is quoque vescus est, & palmæ terebro similis. Scalam eum ap-
pellant. Plinius quoque hæc sic conuertit. Et Cactus quoque in Sicilia tantum
nascitur, suæ proprietatis & ipso, cuius in terra serpunt caules à radice emissi, lato
folio & spinoso. Caules vocant Cactus: nec fastidiunt in cibis inueteratos quosq;
vnum caulem rectum habent, quem vocant Pteruica, eiusdem suauitatis, sed vetu-
statis impatientem. Semen ei lanuginis, quam pappum vocant: quo detracto &
cortice, teneritas similis cerebro palmæ est: vocant Ascaliam. Hæc cum Theo-
phrastus scriberet, Cacti in Sicilia tantum, nusquam in Græcia, nec Italia fortasse
colebantur. Sed cum eò tandem colendi ratio manasset, nihilq; essent aliud Sici-
li Cacti quàm carduorum genus, Græci Cactus & Cynaras, Itali Carduos nomi-
narunt: quod auctoritate Athenæi comprobatur, sic scribentis: φαμίνας δὲ ἐν περιεργασίῃ
καὶ φύλῃ, καὶ οὖτοι σκελετὸν τὴν καλῶν ἀναθώδες φύλῃ, ὡς καὶ Θεόφραστος ἐν ἔχῃ περιεργασίῃ
τῶν. ὅς δὲ καὶ οὖτοι καλῶν, & cætera quæ modò citauimus ex Theophrasto: quibus
subdit Athenæus. τοῖς δὲ τούτοις ἔχει περιεργασίῃ παρῶν ἐν ἔχῃ τὴν καλῶν ἔχῃ τῶν
τῶν ὑπὸ ῥομαίων μὲν καλῶν καὶ ἔχῃ, ὡς καὶ οὖτοι δὲ σκελετὸν, περιεργασίῃ δὲ ὑπὸ τῶν
ἐλλήνων κυμαίνον ἀναθώδες, ἀλλὰ γὰρ δὲ οὖτοι ῥομαίων καὶ ἔχῃ τῶν τῶν ἐν ἔχῃ.

Id est, Phœnias lib. quinto de plantis Cactum appellat Siculam quandam plantam
spinosam, vel etiam Theophrastus in libro sexto de plantis. Quæ Cactus voca-
tur, &c. Quis non iis notis persuasus intrepidè dicat, inquit Athenæus, Ca-
cton eandem esse, quæ Romanis qui non procul à Sicilia absunt, Cardus nomi-
natur, & perspicuè reliquis Græcis Cynara? Siquidem mutatis duabus literis Ca-
ctus & Cardus in eandem vocem consentient. Cynaræ olitorum industria &
mangonio quædam est varietas, præcipuè capitis figura distincta. Nam omnibus
est non quidem echinatum, ut scribit Marthiolus, (echinatum enim esse non po-
test, quin sit etiam spinis horridum,) sed omnibus squamarum, seu laminularum
ordine structili coagmentatæ. Verum in quibusdam aculei sursum eriguntur, in
alii

Lib. 1. c. 16.

Lib. 1.

Cap. 14.
lib. 1.

alii deorsum inclinantur, quarumdam capita proæus aculeis carent, vt iam monuimus, ceterisq; vt vulgus credit, in cibis præstant. In hoc genete caput nonnumquam in longam & sensum gracilescētē metam fastigiatur, nonnumquam in compressiorem & rotundiorē globum extuberat, laminis interdum sponte dehiscētib; & sese recludētib; interdum artius coniunctis & compactis. Spinis carebunt Carduorum capita, vt ait Palladius, si cacumina seminum confringas, vel, vt olirores aiunt, si delibratis lactuæ radicibus & dissectis, semina integra condantur. Cynaram Columella pinxit his verbis.

*Hispida ponatur Cynara, * que dūllis laccho*

*Potanti * veniat, nec Phæbo grata canenti.*

Hæc modo purpureo surgit glomerata corymbo,

** Myrtilo mo d' crine viret, * deflexaq; collo*

Nunc ad aperta manet, nunc pinæ vertice punga,

Nunc similis calathæ est, spinisq; minantibus horret.

*Pallida nonnumquam * tortos imitatur Achanthos.*

Qui potius & arduum alcilem, siue Cacton, & Cynaram videtur delineasse: vt, æque pilata solis conspicitur albæ spinæ, vel Cardui siluestris, caulibus altis, quorum summi vertices in squarosum extuberant globum, corticosis vnguibus turgentem, spiculis squamatim compactilibus coagmentatum, quorum orbis exterior viret, interior niueo candore nitescit. Hæc struili nucleorum serie pineâ nucem videtur comprimere. Quare cū Galenus scribit Cynaræ capita *αποδύλλω* Græcis dicti, *εποδύλλω* potius legendum crediderim. Flos purpureo rutilat colore, & tandem euanciscit in pappos. Caput vetustate dissilit in corticeas laminas, semen ostendens Nicii figura. Hæc est Scolymi, Cynaræ, Cacti dilucidior, opinor, & magis enucleata quā ab aliis quibuscūq; tradita distinctio: quas plantas satis indistincte Matthioli explicauit & depinxit. Galenus scribit Scolymi radicem copiosam vrinam graueolentem elicere, si quis eam in vino coctā bibat, ac proinde graueolentiam sanare tum alarum, tum totius corporis. Atque hoc, sanè medicamento inest ex tota substantia, nimirum cū succus sit purgatorius. At quæ secundum qualitates editur actio, calidum in secundo ordine completo, aut tercio incipiente medicamen indicat, siccum verò in secundo. De Scolymi viribus plura Plinius habet. Scolymus vrinam ciere præcipue traditur: sanare lichenas & lepras ex aceto, vncem stimulare in vino, Hesiodo & Alceo testibus: qui florēte eo cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis audissimas, virosq; in coitum pigerrimos scripsēte, velut prouidentia naturæ, hoc adiumento tum valdissimo. Item graueolentiam emendat radicis emedullatæ vncia, in vini salerni heminis tribus decocta ad tertias, & à balineo ieiuno, itēque post cibum cyathis singulis pota. Mirum est quod Xenocrates promittit experimento, vitium id ex alis per vrinam effluere. Hæc Plinius. Nunc nullis non hortis cardueta spectantur, plurimæ hortorū areæ Cynaris refertæ sunt, nec iam sine cibo hoc, nisi tempus anni neget, opipura vel adicialis vlla sit cœna. Apponuntur capita nondum florēscētia Asparagi modo iuribus incocta, eorūque pulpa estur cum sale & pipete. Itali rarō decoquunt, sed cruda cum sale vorant. Hæc ob miram, tum raritatem, tum venustatem non omittendus carduus peregrinus, quem ex Pena depictum & descriptum hîc exhibemus. Hunc, inquit, sponte edunt noui orbis insulæ occidentæ, præsertim ea quæ D. Margaretæ sacra est, vnde reduces naucleri Anglicis oris Morgano pharmacopœo Londinensi attulerunt. Videtur autem hic quasi quidam naturæ cinnus ex pepone, melone, & carduo coaluisse. Ob id ille Echino-melocactum, siue melocardium echinatū, signata magis, quā recepta nomenclatura vocauit. Turbinata illi metæ effigies, torulis, callosisq; quatuordecim quasi costis

Lib. 13.

* Quilam:

hec non dolo-

cus lacchum.

* Quilam:

venit, non.

* Quilam:

laccho.

* Quilam:

toros.

Lib. 13. alim.

In cap. 14.

lib. 13.

Lib. 13. simpl.

Vires.

Lib. 13. c. 11.

In Aduers.

Locus.

Nomina

Forma:

costis

MELOCARDVVS Echinator, Pena.

costis canaliculata, à sessili & latiore basi secundum longitudinem in conu obtusiorē cœuntibus, ex quo quasi vertice emicat tomentosa, ut in cynara, ferricea bombax admodum farcta & delicata, ferè qualis lapidis amianthi, qua inuoluuntur mucronatæ vaginulæ, siliquolæ, sanguineæ, capsico concolores & similes, sed perquam exiles, semine pusillo, rotundo, amaranthi, plenæ, multis setis cro-

ceis supernè se exerentibus, sed rigidis & pungentibus. Dorsâ autem summa striarum, quâ latiùs proruberant, exerunt intestos hystricis, aut echini aculeos aduncos, corneos, denos & duodenos, quasi hamos, radiatim septenas ut plurimum stellas effigiantes: adeoq; vniuersum conum armant instar echini, vix ut inultus manu premas. Est autem cutis externa callosior, crassiorque tota, aloës aut cucumeris colore, & concretionē. Caro subtus albicæ, pinguis, flaccida, melonem, aut adipem referens, gustu insulso & acidulo, non ingrato, aqueo, refrigerante, innoxio. Quasi autem melo foret, interiore & superna sui parte, quæ flori subest, carduis simili, carnem firmiorem dissepit memb ranula per medium ducta, eâque lāmque efformans ferè qualis cucurbitæ, sed seminis vi fungosiore nimis cōpacta medullam ibi inuoluit. Eius natales qui viderunt tum naucleri, tum familiares quidam, maritima fabuleta esse referebant. Cū maturuit, peponem mediocrem, vel maximum melonem æquat. Nouem libras & vnius trientem hæc pendebat. Humi sessilis est, nusquam apparentibus ne minimis quidem foliorum vestigiis in ipsâ planta, aut radice, quæ exilis est, aliquot appendiculis vimineis, pullis, prolixis, firmis, nec fractu facilibus sparsa. Carduum non minùs admiranda

L. E. C. 14.

CARDVVS Pitahaya fructum ferens.

descripsit Ouiedus in Hispaniola insula nascentem. Pitahaya, inquit, fructus est pugni mediocris magnitudine. Hunc profert Cardui genus, spinis quidē horridum, sed aspectu iucundum & pulcherrimum: foliis enim caret, sed horum & ramulorum vice brachia quædam habet, sex pedes longa, quadrangula, in medio canaliculata, in quo medio & in angulis spinæ sunt valde pungētes, venenatæ, satis longis spatiis à sese distantes, ternæ simul, aut quaternæ digiti maximi longitudine. Inter hæc brachia fructus medius exoritur, qui Pitahaya illic nominatur, cortice crasso, spisso, & veluti squamoso contextus, qui tamen faciliè cultro inciditur, etiam si tota

interiore parte granulis carni permixtis sicuum nostratum modo sit refertus, coloris venustissimi, nempe chermesini saturati. Est & tota hæc pars edulis, manufq; iniecit mori modo. Qui comederit, non statim, sed duabus horis ab eo sumpto, vrinam reddite planè crudam. Est tamen innoxius & spectatu elegantissimus, sed qui cum profert Carduus horrendus, specie valde agrestis & admiranda, viridi, cinerea, candicante, qualem hic pictam videris ex Ouiedo.

ACAN

ACANTHVS,

CAP. III.



KANΘΟΣ & ἀκανθα Græcis, καλὸς καὶ ὠρεῖος & πάλσιος, Latinis Acanthus & Acantha dicitur: Officinæ à similitudine, quam eius folia cum anterioribus visorum pedibus habet, Brancam visinam vocant. Ad quam etiam similitudinem respicientes Germani *Bernkraut*

Nomina

ACANTHVS Sativus,

Math.

nominant, Galli *Branche visine*. Adnotavit Fuchsius hanc herbam olim etiam Romanis Marmorariam esse dictā, quæ vox in omnibus Dioscorid. exemplaribus inter nothas appellationes deprauata est, ac in Mamolariam detorta, quod eius, columnarū, maximè Corinthiarū folia capitulis insculpebātur, quarū identidē, tam scapi, quàm vertices matmore splēdebant. Antiqui etiam Acātho pateras & pocula alia ornabant. Acanthi genera duo Dioscorides tradi-

Lib. 4. bñ.

dit, sativum, siue hortensum, & silvestrem. Sativum describit folia habere multò latiora, longiora quàm lactuca, erucæ modo incisuris diuisa, nigricantia, pingua, lævia, caulem lævem, bicubitalē, digitali crassitudine: x interuallis verticem foliis quibusdam circumdatum, veluti nucamentis aculeatis, è quibus flos candidus promittitur: semen illi est oblongum, luteum, caput thyrsi specie: radices subsunt glut. nosæ, mucosæ, rubentes, longæ. In quibus hæc in Græcis sic exarata, *διὰ τὴν ὁμοίαν τῆς ἀκανθῆς*, vertit Cornarius, veluti pileolis oblongis, pro nucamentis: per *κατὰ τὴν* intelligens foliorum inuolucra illa ad oblongi pileoli figuram obtorta. Est enim *κατὰ τὴν* pileoli genus.

Genera.

Forma.

Embl. 17. lib. 4.

Est etiam id notandum in quibusdam exemplaribus Græcis scriptum inueniri *κατὰ τὴν ἀκανθῆν*, sed perperam: nam minuta caulis folia, nec figura, nec colore hyacinthinis respondent, quin potius exilia, & spinulis armata, quæ verò humi procumbunt, amplissima, vt quæ atearum puluinos possint vestire, nullis tamen aculeis rigentia. Acanthus silvestris eodē Dioscoride auctore, scolymo similis est, aculeatus, breuior quàm sativus & is qui in hortis provenit. Satiuus in hortis, pettosus, & humentibus locis nascitur. Iunio præcipuè & Iulio mēsisbus semine & floribus abundat. Plinius breuius duo Acanthi genera notavit. Acanthus est roptaria & vrbana herba, lato longoque folio, crepidines marginum, assurgentiumq; puluinorum toros vestiens. Duo genera eius sunt, aculeatum & crispum, quod breuius: alterum læve, quod alij *pæderota* vocant, alij *Melamphylon*. Hæc Plinius. Et si Acanthus, vel Acantha

Locus.

Tempus.

L. & c. 12.

GGG

ACANTHVS Silvestris,
Carduus pratensis, Tragi.

Spinam significet, & Branca vrsina omnium herbariorum sententia Acanthus Diofcoridis credita, rigidis spinis non horreat, non ob id tamen vera Acanthis non dicenda: spinosa etenim est, verum thyrso duntaxat ex Diofcoridis descriptione, & columnarū apud Vitruuium epistylus, sed mollibus duntaxat spinis, ideòq; à Vergilio mollis Acanthus dicitur: nec vlla alia est, cui Diofcoridis descriptio verius respondeat. Siquidem quinis senisve foliis extenditur, lactuca, longioribus multò, ac latioribus, ut quæ nonnunquam cubiti longitudinē æquant, pinguius, carnosius, erucæ ritu laciniatis, subnigris, caule tripedaneo, digiti crasso, laui, cuius vertex foliorum in aculeos molles exeuntium cingitur vallo, & veluti in dehiscentem paniculam nucamentū nive fastigiatur. Summatim caput erumpit thyrsi figura, flores candidi, semen oblongum, luteum, radices oblongæ, pingues, lentæ.

Lib. 1. cap. 1.

Trago & Lonicero ἀγρία ἀκανθὰ Diofcoridis videtur esse Carduus pratensis, Germanis *Umsenkeel*. & *Grafkeel*, id est Brassica pratensis nominatus, quod huius folia teneriuscula vere cum cæteris oleribus colligantur, & in cibos veniant, gustu suaui, nec molliusculis spinis linguam, aut palatum offendentia. Folio est satis longo latoq; ac vtrinque diuiso, exiguis tenerisq; aculeis, spinosis ve exasperato, ex vi idem penè albicante, ac diplaci quadamtenus consimili. Iulio mense caulem emittit cubitalem, nonnunquam proceriorem, nodosum, teretem, è geniculis hina folia fundentem, quæ diplaci modo imbrem exceptum retinent. In horum & ramulorum cacumine oblonga capitula, florem in pallorem languescens, sed purpureis staminibus oculis rubrum quid ostendentem sustinent. Flore marcescente semen maturatur, paruum, album, tenera & candida veluti & in aliis Carduis lanugine inuolutum, quæ in pappos tandem euanesceat. Planta est hyemis contemptrix, & quæ frigora faciliè ferat. In pratis nascitur, vbi rediuiua quotannis, Aprili mense folia emittit, radice candida, fibrata, crassa, plerumq; exesa. Ex locis natalibus coniecturam sumptere quidam hunc Carduum Leimoniam esse Theophrasti, à pratis sic dictam, quam nullis prorsus notis inter spinosas numerat, nempe ἀγρια, λευκοχάρακας, χαλκίφας, κνήκας, πολυάκανθας, ἀτρακτύλιδας, ὀβόπυκτον, ἔχοντες χαμαιλαϊνία, σκόδουροι, quibus additur ὁ λεμόνια. Ineptè Betam siluestrem Gaza interpretatur nominum similitudine deceptus, quia Leimonium minimè spinosis foliis à Leimonia valde diuersum est. Hic quoque Plinius bis lapsus est, scribens scolymū in cibos ab Oriente recipi, & alio nomine Leimonion appellati, tum quod Leimonium, id est Betam siluestre ἀπο τῆς λεμόνιας spinosa planta non separet, nisi fortè mendosus sit codex, tum quod Leimonias spinosam plantā à Theophrasto inter aculeatas acanaceasque proximè scolymum memoratā cum scolymo confundat. Est etiam planta alia

ACANTHVS Siluest.
alter, Dalechamp.

Lib. 6. hist. cap. 1.



Acanthus
silvestris.
Forma.

hic picta, quibusdam alter Acanthus siluestris, aliis Leimonia, quod ut & superior in pratis nascatur. Radice est foris nigricante, in multas appendices asphodelo pæoniarūve similes diuisa, quæ quotannis alias atque nouas, veluti sobolē recētem ex sese gignunt, exarcescente radice ex qua propendens folio crasso, incisuris sinuoso, oblongo, aculeis armato, sic à natura factus, ut aculei singuli ex tribus cuspidibus in vnum

in vñ coëuntibus videantur esse coaginètati, pallidè vitentibus, caule recto, pro-
cero, gracili, parù tamoso, capitulo echinato, vno fere tantùm vel altero: flore pu-
niceo, semine oblongo, paruo, lanugine confecto, quæ in auras tandem euolat. Ob
aculeos tetnos, quemadmodù suprà dixi, vna stipatos, heiharij quidam Carduum
τεταρλύνος vocant. Quidam Leucacanthā, de qua posthac nos agemus, esse vo-
lunt. Lobellius pinxit alium Acanthum siluestrem Scolymo similem aculeatum
Dioscoridis, vel potius nouam aculeatam Biancam vtinā, & subiicit, in agro Bo-

BRANCA Ursina aculea-
ta, Lobellij.



noniensi Lombardix, adeò flores & folia simi-
lia fuisse huic Acantho spinoso, vt crediderit
Dioscoridis esse Acanthum siluestrem, quem
asimilauit Scolymo siluestri, & satiuo Acātho
breuiorem & aculeatum dixit. Chamæleonta
Monspelensium esse non potest quia caput
habet echinatum. Acāthi satiuo tadices, aucto-
re Dioscoride, vstis & luxatis illis profunt. Por-
to vtinā mouent, & aluū sistūt. Tabidis, ruptis,
conuulsis mirè vtilis sunt. Eadē Plinius tradit.
Huius radices vstis luxatisq; mirè profunt: item
ruptis conuulsis, & phthisim metuentibus in-
coctæ cibo, maxime pristinæ. Podagricis quoq;
illuntur tritæ & calefactæ calidis. Galenus,
Acanthi folia, inquit, mediocriter digerentem
facultatem obtinēt: radix exsiccatoria est, & le-
uiter incisotia, & tenuium partium. At quoti-
diana & diuturna experientia constat nostri
Acanthi satiuo tadices emollire, vniuersamq;
plantam mucosā esse, ac ob id ad enematum
emollientium decoctiones duntaxat, in hortis
haberi. Quare mirū Dioscoridem dixisse radi-
ces τριμυκας, id est luxationibus prodesse, cū iis

Lib. 3. cap. 17.
Vires &
Temper.
L. 1. & c. 22.

L. 1. & c. 22.

obsit potius relaxando: aptius fortasse τριμυκας hinc cōuertas torsiones, ligamen-
torumve tractiones, quibus medentur initio suauia malactica, dolorem sedando,
& leuiter digerendo, si quid affectæ parti influxerit: hac enim ratione fractis &
conuulsis ptoderunt. Acanthi siluestris radix ad eadem ad quæ superior efficax
est, nihilq; à satiuo differt, nisi mollitie & magnitudine.

Pena in
Aduers.

ACANTHIVM,

CAP. IIII.

QUOD Græci ἀκανθών, Latini similiter Acanthiū nominant, Germani
Vnsz vuerge distel, Galli Chardon argém, cuius hæc est in vulgatis Dios-
coridis exemplaribus descriptio. Ακανθών επιφύει τὰ φύλλα ἔχει τὸ λευκὸν
ἀκανθών, ἐπ' ἀκροῦ δ' ἀκανθώδες: ἔχει δὲ συλλεγομένους, &c. Quæ ex Plinio,
multo verò tutius ex Otibasio viri docti sic restituerunt. Ακανθών επιφύει τὰ φύλλα
ἔχει τὰ λευκὰ ἀκανθών, ἐπ' ἀκροῦ δὲ ἀκανθώδες: ἔχει δὲ, καὶ ὡς ἀραχνώδες ἐπὶ χυτῆς, vel καὶ
ἐπ' αὐτῇ χυτῇ ἀραχνώδες, ὅς συλλεγομένους, & ὑφανόμενος βαμνικοφθὸς γίνεσθαι. Id est, Acan-
thium folia similia habet albæ spinæ in summis extremitatibus aculeata, in quibus
est lanugo, instar telæ ataneæ, quæ collecta & texta bombycis effigiem præbet.
Plinius. Spinæ albæ similis est spina illa, quā Græci Acanthium vocant, minori-
bus multo foliis, aculeatis per extremitates, & ataneosā lanugine obductis: qua
collecta etiam vestes quædam bombycinis similes fiunt in Oriente. Dioscotides
folia quidem Acanthij figura candoreve cum Alba spina confert, sed citra

Nomina

Forma.

L. 1. & c. 21.

ACANTHIVM, Matth.

Ca. 16. hñt.

*Acanthiū
montanū.*

Forma. lura, unde & hoc adiectū est, nascitur. Radice est crassa, numerosa, caulibus mol-
tis, in ras caulis, angulosis, densissima lanugine opertis, foliis alba spinæ similibus,
toto ambitu marginibus aculeatis, prominentibus, araneosa lanugine obdolis,
quā neri posse, & in vestes texti omnino credibile, cū digitis summis tradata non
abrupatur, & quam longissime ducatur, flore purpureo, lana candida & tam

*ACANTHIVM, Spina
alba, filuestris. Fuchsij.*



*ACANTHIVM Monta-
num, Dalech.*




spissa

spissa vndiq; per initia sic obuoluta, ac circūclufa, vt priusquā detegi possit, veluti lanæ glomus sit dilacerandus & euoluendus. Acanthij radix & folia, inquit Dioscor. in potu opisthotonicis auxiliantur. Eadem prorsus Plinius tradit. Ipsa folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur. Galenus verò radicem & folia facultatis esse exsclaficioriz, & iis qui conuelluntur auxiliari.

DIPSACVS,

CAP. V.

 **P**ΥΛΑΚΟΣ Græcis, Labrū veneris, & Carduus veneris Latinis, Virga pastoris Officinis, & Carduus fullonū vulgò dicitur, Gallis *Chardon à carder*, vel *Chardon à foulon*, Hetruscis *Cardo da cardare*, Foroiulientibus *Garzo*, Germanis *Kartendistel*, *Bubenstrel*, *Vueberkarden*. Dipsaci autē, id est sitibudi nomen à cōtrario inuenit, quoniam concavo alarū sinu rorē, vel imbrē recipiat, quo velut ad abigendas sitis iniurias abutitur. Labri veneris nomenclatura à carinato foliorum habitu contraxit, quæ se anfractuosa sinuantia ambage, peluis vel solij speciem constituunt, & intra se humorem retinent. Virga pastoris dicta est, ob longas virgas, quas detractis Carduis pastores fortē sumūt, & ea parte qua posuit manu capi aculeis indant, reliqua autē aculeata gregē ducunt. Carduus fullonius appellatus est, quod eo rudis pānos, velut echino quodā poliūt, detractisq; floccis carminat. Ceterum hic antequā aduertendū Auicēnz & Serapionis interpretes Virgæ pastoris nomine minime Dipsacum, sed Polygonū utrūque Dioscoridis intellexisse. Herbarij duo Dipsaci genera fecere. vnum satiuum, alterū qui sua sponte passim prouenit, eumq; duplicē, nēpē Dipsacū siluestre maiore, quē Dipsacū purpureū vocat Fuchsius, & Dipsacū siluestre minore. Dipsacū, vt describit Dioscorid. aculeatarū generis est. Caulem habet albū, spinis horrentē, folia caulē amplectētia, lactucæ similia, in singulis geniculis bina, oblōga, atq; etiā spinosa, quæ in dorsi medio intus & extri veluti bullas spinosas habent, cōcauo, quo se vtrinq; geniculis cōiungunt sinu, quo aquæ, rores & imbres asseruantur, vnde Dipsaci quasi sitientis nomen

Nomina

Lia. c. 796.
c. 31. simpl.

Genera.

Ca. 21. hist.
Lib. 3. can.
Forma.DIPSACVS Seu Labrum
veneris, Math.DIPSACVS Satiuus alter,
Mathioli.

DIPSACVS Siluestris
maior, Fuchs.

Li. 27. cap. 9.

*DIPSACVS Siluestris minor,*
*seu Virga pastoris, Matth.*Muth. in
cau. lib. 9.Lib. 9. cau.
Vires &
Temper.

Li. 27. cap. 9.



Lus. simpl.

In Adherf.

trahit. In cacumine caulis singulis furculis capitula singula echinus similia insunt, oblonga, aculeata: quæ postquam exaruerunt, candida apparere dissectum per mediâ medullam caput vermiculos habet. Plinius eadē breuiter & dilucidē tradit. Dipsacus folia habet lactuca, bullasq; spinosas in dorsū medio, caulem duū n cubitorū, uisdē spinis horridum, genicula eius binis foliis amplectētib; cōcauo alarū sinu, in quo subsistit ros la fus. In cacumine capitula sunt echinata spinis. Nasceitur in aquosis. Huic descriptioni si pastoris vrgā cōferas cōperies notas omnes optime respondere Dipsacus siluestris latius similis est, foliis tamen est angustioribus, & floribus purpureis. Nec solo cultu videtur euenisse, inquit Pena, vt satius Dipsacus aculeis a Iuncis, recius & rigidioribus à siluestri & spōte prodeūte rariam distet. Nam pleraq; omnia culta, molliora & teneriora, minusq; spinosa euadunt. At hi satius capitibus est reductioribus, oblongis spinis, cicbris, aduncis, terram versus reflexis, adeo rigidis, vt lamina carpando, & vellendo filimenta, non facile effingatur: siluestris verò mollioribus, minoribus, latioribus, nec aduncis, longioribus multo, in bec

bus: foliis itē mollioribus, minoribus, haud itē similibus, capitulis crebris, & bituminosis multo similibus. Nasceitur in agrorum & rororum marginibus, & in viis iuxta sepes. Dipsaci genus minimum, nec adeo frequens, si penitus siluestri sit simile est, non tamē ita bruto caule, nec tam spinis horrido, foliis itē infirmioribus, capitulis multo minoribus, vt quæ olus magnitudinem vix superent. Sunt autem capitula hæc tenuibus capillis referta, ita vt sericis vidi colore infectis floccis similia videantur. Quidam Plumbaginem esse Plinij credunt, nec temere fortassis. Dipsaciradix, auctore Dioscoride, cum vino decocta & tula vsque dum ceratū crassitudine accipiat, imposita rimas fistulasque sedis sanat. Oportet autem medicamentū hoc in pyxide recondere. Ferunt præterea formicis & verrucis pensilibus remedio esse. Vermiculi capitis eius in folliculo clausi, & collo aut brachio appensi quartanas sanare produnt. Eadem breuiter Plinius dixit. Sanat rimas sedis: item fistulas, decocta in vino radice, vsq; dū sit crassitudo ceræ, vt possit in fistulā mitti: itē verrucas omnium generū. Quidā & alarū, quas modō diximus, succū iis oblinūt. Dipsaciradix, inquit Galenus, est secūdo ordine exsiccatoria, habetq; nōnihil absteratoriū. Scribit Pena piora duo Dipsaci genera refringētis & siccatōis esse facultatis, & canectosis vlcerationibus multum conferre: testium vsui incompertum.

CNICVS

fert nigrum, magnum, amarum. Altera species hirsuta caules sonchi profert, & quodammodo humi accubat, nam propter caulium molliem in terrain inclinatur, fructum gignit amarum (αἰνός) pro αἰνός legit Gaza, & vertit frequentem) barbati semen omnibus radices multæ, densiores tamen silvestribus, & maiores.

CNICVS Silvestris prior.
Atractylis, Dalech.

Lib. 2. c. 11.



Lib. 2. c. 11.

Cap. 41.
hilo.
Lib. 4. c. 70.

CARDVVS Benedictus.
Cnicus silvestris alter.



Præ aliis silvestribus hoc peculiare est, quod cum duriora spinosioraque sint miribus, vrbani Cnicus mollior sit & laxior. Quæ ex Theophrasto sic transcripsit Plinius. Multas præterea ignobiles habent, sed maxime celebrant Cnicon Italiz ignotum, ipsis autem oleo non cibo gratam. Hoc faciunt è semine eius. Differentia prima silvestris & sativi. Silvestrium duæ species. Vna mitior est, simili caule, tamen rigido, itaque & colu antiquæ mulieres utebantur ex illis: quare quidam atractylida vocant. Semen eius candidum (hic Plinius contradicit Theophrasto, qui semē nigrum esse ait) & grande, amarum. Altera hirsutior torosior caule (αἰνός) Et caules legit Plinius, quos γυχνός Et Theophrastus) & qui pene humi serpat, magno semine. Aculeatarum generis hæc est. Hæc Plinius. Cnicus silvestris prior Ruellij, Fuchsi, Dodonæi Atractylis est. Is durus est & erectus, sativo non dissimilis, foliis asperis & pungentibus: capitula multis foliolis angustis & per extremitates aculeatis muniuntur, ex quibus hirsutus flos prodit, magis quam Cnici hortensis ex luteo pallescens. Semen Cnico par, oblongum & angulosum, sed subatrum, non ut Cnici album. Magnitudo ei quæ homini. Quamobrem perfecerunt mulieres, ut scribit Theophrastus, si locus mendo careat, pro colu uti poterant eius stipitibus satis firmis & longis ad lanam sustinendam quæ nebatur, ut pro fuso atractylide, humili planta, suis capitulis momentū & pondus præbente ad intorquendum & circumagendum filum. Alteram Cnici silvestris speciem, Carduum esse, qui Benedictus ob admirabiles eius vires contra varios morbos nominatur, iamdiu doctoris omnibus persuasum est, qui hunc cum alterius Cnici silvestris descriptione à Theophrasto tradita diligentius cōtulerunt. Herba est vsu & visu omnibus cognita, radice longa, tenera, valde fibrata, foliis longis, pinguibus, teneris, mollibus, hispidis, profundius incis: caules ei hirsuti villosi, γυχνός Et, id est, leues, inanes, fragiles sonchi modo, non αἰνός Et, ut legit Plinius, id est, torosiores, in tetrâ sparsi, quoniam ob comæ foliorumque molliem recti non stant, sed caduci solo procumbunt, & inclinatur, hirsuta

tura quoque, capitula foliis pungentibus circundantur. Flos ex luteo pallet, semen copiosum, oblongum, cinereum, pilis barbarum, amarum, lanuginosis pappis obvolutum. In arduis alpihus Galloprovincie teste Pena prope Monasterias quas Marignols vocant, ubi effodiuntur Crystallinae, Irides, & varij coloris alij lapides, crescit, in summis montibus, rigidior, & aliquantum minor hortensi. Nunc passim in hortis omnibus magno studio colitur ob eximias eius dores. Cnici satius flore prisci utebantur in obolus auctore Dioscoro. Semen tundebatur, & ex eo exprimebatur succus, ut tunc hydromelite, aut gallinaceo iure datus aluum purgaret. Stomachio tamen aduehsatur. Fiebant etiam placentæ ad aluum emolliendam, succo eius amygdalis, citro, aniso, & melli cocto admixto. Oportet autem ante cœnam in partes quatuor diuisas inglandis nucis magnitudine, duas aut tres sumere. Eas hoc modo concidere oportet. Sumatur Cnici candidi sextarius, amygdalarum tostarum & decorricatarum cyathii tres, anisi sextarius vnus, aphronitri drachma vna, caricarum triginta carnes. Seminis succus lac cogit, & ad soluendam aluum efficacius efficit. Cnici semine duntaxat utimur ad purgationes, inquit Galenus. Tertij ordinis est exalfacientium si foris admoueat. Sed de eius temperamento & facultatibus fusius disseruit Mesues his ferè verbis. Cnicus est agrestis & satius, idemque melior sentit, præsertim eo magno, albo, plano, pleno, medullæ pinguis, coactæ & nui. Nec inutilis est flos croci pilorum effigie. Calfacit ordine primo, siccat secundo. Agrestis flos minùs calidus ac siccus. Pituitam & aquas vomitu & deiectione vacuat sumptus, & clystere iniectus. Ob id morbis inde natis, vt colico affectui & similibus confert. Thoracem quoque & pulmonem expurgat, præsertim eclegmate sequente & oleo suo, vnde & vocem claram reddit: Iperima quoque vsu augeat, sed alimentum est prauum, stomacho valde noxium, in eo & mammis lac dicitur cogere, fastidiendum ac nauseabundum est, ac conturbans, facultate est laxariarum plantarum, sed remissa, terget, aperit, etiam flore cum mulsâ icterum sanant. Ne ventriculū lædat, ei misce stomachica, anisum, galangam, mastichen: acriora verò, vt cardamomum, zingiber, sal panis, sal gemmæ addita actione ipsius celescant, & intestinorum noxam prohibent. Sic medullæ eius drachmæ decem, cum cardamomi aureo vno in catapotia cicerum magnitudine drachmis quinque, sufficiens purgant Paulo auctore. Eadem medulla pauino ligata, oxymelini præsertim scillitico incoquitur mersa, & purgatoriū id efficit. Medullæ eiusdē aurei duodecim, penidiorum autem quatuor, cardamomi, zingiberis ana aureus vnus, cum melle forma bolus nucis magnitudine, da vnum vel duos. Medulla eadem ex iure galli vel gallinæ cum speciebus prædictis cocta, idem præstat: vel medullæ eius drachmæ tres, amygdalarum drachma vna, strobilorum drach. semis, cum melle cocto & sicco scillæ fiat eclegma, mirificum in thoracis affectibus. Hæc ex Mesue. Sed id animaduertendum orientalem Cnicum multò facilius & vtilius minori quantitate purgare. Nostrium multò imbecilliorē esse, vt pote qui non minore quam duarum vnciarum, vel saltem vnus & semissis mole, aluum subducit, nec obstructions mēstaraicarum æquè probè referet. Carduus verò benedictus obstructions interiorum viscerum tollit, vrinam mouet, calculum frangit, vlcera potissimum pulmonis sanat. Percussus à feris venenatis medetur tam interiùs sumptus, quàm venenatis ictibus aut moribus impositus. Negant etiam pestis sentire contagia, qui cum cibo aut potu præsumpserit. Iam quoque correptis magno fore præsidio vulgus sibi persuasit. Item contra capitis vehementissimos dolores, vertiginem, memoriam amissam, in cibo aut potu sumptum valere tradunt. Item ad putrescentia vlcera, mammarum potissimum, si in puluerem reductus inspergatur: caethe tam recēs quàm sicca herba, pota & admota sanat, cutemq; obducit. Quamobrem decoctis misceatur, quæ ex ligno Gaiaco parantur Hispanica lue laborantibus.

Confert

Confert maximè iis qui quartana febre aut aliis febribus laborant, quarum accessiones cum frigore redeunt, hausto eius decocto, aut stillatitia aqua, aut pulueris drachma pota. Profunt eadem comitialibus infantibus eodem modo pota. Herbarum decoctum ex vino sumptum, ilium & renum dolores mulcet, ventris tormina sedat, sudorem citatui tinea necat, & vteri vitii auxiliatur.

CHAMÆLEON, CAP. VII.

Nomina



ΑΜΑΙΛΕΩΝ λευκὸς Græcis, Chamæleon albus Latinis nominatur, Carduus varius, Carduus suarius, & Cardopatium, Arabibus *Chameleon leuce*, seu *Chamaliū*, Italis *Carlina*, & *Chameleone bianco*, Hispanis *Cardo pinto*, Germanis *Eberwurte*, eleganti allusione ad Carduum suarium. χαμαλέον ὀψιλλας, Latinis Chamæleon niger. Chamæleon autem à foliorum

Lib. p. c. f.

varietate dicitur Dioscoride teste: mutant enim cum terra colorem. Hic enim viridat, illic albicantia, alibi cerulea, nonnusquam rubra inueniuntur. Suarius autem carduus, quod sues, si in polenta exhibeatur, perimat. Carlina verò quasi Carolina quod credat vulgus hanc herbam Magno illi Carolo Regi olim ab Angelo demonstratam fuisse ad propulandam ab exercitu suo pestem, tanquam antidotum omnium præstantissimum. Quam ob causam multi ad arcendam pestilentiam huiusce herbarum radices miris effecerunt laudibus. Chamæleon albus à nonnullis Ixias vocatus, ut ait Dioscorides, quod quibusdam in locis ἱξος, id est, viscum ad radices eius inueniatur, quo pro mastiche vruntur mulieres. Folia habet silybo aut carduo similia, asperiora tamen & acutiora, nigroq; Chamæleone robustiora. Caulē caret, sed

Lib. p. c. f.

Forma.

è medio spinam echino marino aut cynaræ similem erigit: flores purpureos velut pilos, qui in pappos euanescent, semen cnico simile: radicem in pinguibus collibus crassam, in montosis graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graueolentem, & dulcem. Chamæleon niger & ipse foliis scolymo similis est, minora tamen & tenuiora, & robustiora hæc habet. Caulem emittit digitali crassitudine, dodrantalem, subrubrum, qui umbellam gerit, & flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, varios, radix crassa, nigra, densa, quandoque etiam corrosa, quæ dissecta subhæta est, & commanducata mordax. Prouenit in campestribus, siccis & cliuosis tractibus & maritimis. Plinius de iisdem hæc protulit. Chamæleonem aliqui Ixiam vocant. Duo genera eius. Candidiora, asperiora folia habet, serpit in tera echini modo spinas erigens, radice dulci, odore suauissimo. Quibusdam in locis viscum gignit album, sub alis foliorum, maximè circa canis ortum, quo modo thura nasci dicuntur: vnde & Ixias appellatur. Hoc ut mastiche vtuntur mulieres.

Locus.

Lib. a. c. d.

Quare & Chamæleon vocetur, varietate foliorum euenit: mutat enim cum terra colores, hic niger, illic viridis, alibi cyaneus, aliubi croceus, atque aliis coloribus. Et paulò post. Ex nigritis marem dixere cui flos purpureus esset, & feminam cui violaceus. Vno nascuntur caule cubitali, crassitudine digitali. Theophrastus de utroque Chamæleone hæc quoque Dioscoridi consentanea literis mandauit. χαμαλέον διὰ τὸ μὲν λευκὸς, ὁ δὲ μέλας. ἀπὸ δὲ λευκώμετες τῶν ῥιζῶν, καὶ αὐτὰ ὅτε ῥιζαὶ τοῖς ἰσθμοῖς διαφθορὰ τῇ γῇ γὰρ λευκὴ καὶ γλυκύτης, ὥστε παχέια, καὶ ὁσμήν ἔχουσα βαρύνεται. Et paulò post. φησὶται διὰ διαφορίας πανταχοῦ, καὶ ἔχει τὸ φύλλον ὁμοῖον σκολύμῳ, μείζον ὅ, ὅλλο δὲ πρὸς τὸ γῆ, τὸ δὲ κεφαλὴν ἔχει ὁμοῖον ἀπὸ γῆ, μεγάλων δὲ δὲ ἀγρίων ἐξελθόντων. ὁ δὲ μέλας τὸ μὲν φύλλον παρὰ μοῖον σκολύμῳ γὰρ ἔχει (non σκολύμῳδης ut habetur in vulgatis exemplaribus) πλὴν ἔλαττον καὶ λεπτότερον (λεπτότερον ex Dioscoride) αὐτὸς δὲ ἴσος ἔσται (lege ἔχει) ὥστε πρὸ σκολύμῳ. ὁ δὲ ῥιζὴ παχέια, ὥστε μέλας διαφθαρῆται διὰ τὸ πρὸς τὸ γῆ. φησὶ δὲ χαμαλέον ψυχρὸν, καὶ ἀγρίον. Id est, Chamæleon quidam est albus, alter niger, radicum facultate, atq; ipsæ etiam radices specie differunt: illius enim radix alba est, dulcis, crassa, & grauis odoris.

Lib. g. hist. cap. p.

Nascitur

Nascitur similiter multis locis, foliūque habet scolymō simile, sed maius, & terrę proximum, caput autem magnum acanō simile, quod nonnulli acanum vocant. Niger simili est folio, scilicet scolymi, sed minore & tenuiore. Tota planta habet veluti vmbellam, radix crassa est, nigra, & disrupta, subflaua. Locis gaudet frigidis & incultis. Gaza non ἀργή sed ὑγρὰ legitur, id est, humida, cui contradicit Dioscorides scribens plantam istam in campestribus & siccis locis provenire. Idem Theophrastus alio in loco Chamaeleonem album ἄλιν appellat, quam Carduum pineam interpretatus est Gaza, ratus fortasse diuersam hic à Chamaeleonis genere plantam describi. At si quis plantas istas diligentius expendat, & Theophrasti locos conferat, rem aliter habere comperiet. Nam Chamaeleonis facta mentione, alteram eius speciem, nimirum Ixinem accuratè omnibus suis patribus delineat, præterquam radice, quæ velut hic ommissa luculenter declaratur loco suprâ adducto. Quod autem Ixine, vel, ut in Dioscoride legitur, Ixia, Chamaeleon sit albus, eius historia fidè facit, tum ex Theophrasto iam descripta, tum ex his eiusdem verbis. ἡ δὲ ἄλιν φύσις μὲν πολλὰ χροῖ (lege φαίνεται μοι ὁμοίως πολλὰ χροῖ, ut & loco iam citato) ἡ δὲ ἔστι ἀπὸ τῶν ῥιζῶν μέσος ὁ σπειρματικός ἀκανθὸς ἐκτείνεσθαι, ὡς περὶ μύδιον, ἐξ ὧν πολλὰ ἐκασπερμύμενοι ἐπὶ τῶν φύλλων, οὗτος δὲ ἐκ τῆ ἀκροῦ φέρει τὸ δάκρυον ἑωσμον, ὃ, τοῦτο δὲ ἔστι ἡ ἀκρότης καὶ ἡ μαστιχῆ. emenda, ἡ ἀκροῦ θύκη μαστιχῆν, quod confirmat Plinius, ut diximus. Id est, Chamaeleon albus æquè locis multis nascitur, à radice folia emittit, ex qua media seminibus grauis acanum veluti malum exoritur, in foliis ipsis absconditus. (Videtur Theophrastus hic acanum dicere spinosum & echinarum caput carduorum, quod Dioscorides nunc echinū vocat, nunc ἀκανθὸς καλεῖται, nisi fortè pro ἀκανθὸν legendum sit ῥίζον.) Hic lacrymam ori gratam parte summa profert, quæ est acanthice mastiche. Qui hos duos Theophrasti locos cum Chamaeleonis albi historia à Dioscoride tradita conulerit, vnam & eandem plantam ab utroque describi iudicabit: hodie periti herbarij Carlinam esse credunt. Hæc, inquit Dalechampsius, vbiuis in Allobrogum montibus frequens est, Dienfibus Chardouffe dicta, quasi

CHAMAELÆON *Albus,*
Matthioli.



Carduus siluestris, radice longa, crassa, subrusa, cum gustatur principio farua, mox subdulci, tandem acri, foliis latis, albis, aculeatis, humi iacentibus. ex horum medio absque caule echinus prodit, cynaræ capiribus similis, in metam fastigiatus, cōpactili squamarum pungentium aceruo horridus, quo exsecuto, sicuti & diuulsis eius laminulis succus lacteus manat, vis i aut glutinis modo lentus ac tenax, sic contrectantium manibus inhaerescens, ut vix detegatur, ut ab eo ixiæ merito dici possit. Flos purpurascit, quod ilapso hiat echinus, papporumque densam lanuginem media orbis sui area complectitur, quæ in auras auolat. Semen cnico simile est. Huius echinus adhuc cōpressos priusquā floreat, indigenæ detractis corticosis vnguibus, struclitilique laminularum serie reuulsa, concidunt in orbes, & raporum ritu in cibos coquunt, vel cum butyro in prunis, vel super foculo parant, sale & pipere condiunt, gustu multo quidē palato suauiore & lauiore, quàm echinorum cynaræ, vel scolymi satui. Quare cum tam vulgaris sit in ea regione hic cibus, sentiendum

CHAMAËLEON Niger,
Math. & Fuch.

Lib. 4. c. 68.

In cap. 3.
lib. 4.

In Advers.

CHAMAËLEON Niger,
alter Math.

factorum marginibus obuium & frequentem esse hunc Carduum, figura & foliis Carlinæ, sed reus floribus laciniis, minoribus. Flores purpurantes, & capitula Carlinæ vulgaris, caule carentes, in pappos euanescentes Semen Cnico simile. Radices aliquantulum rubescentes, grauisimi odoris. Augusto mense floret. Tragus pinxit
alium

sentiendum viscidū hunc echinati capitis lentorem minimè venenatum, neque exitiosum esse, cum citra noxam cum suis globi frustulis comedatur, vel Allobrogū Chamæleonē innocentiorē esse quā Græcorum, vel igne, præparatione, conditura maleficam eius vim obtundi. Plurisque herbariis & Officinis ferè omnibus persuasum est, duplicem esse Carlinam, aliam caule carentem, aliam caule donatam, quam Leucacantham facit Dodonæus: Matthioli & Fuchsii nigrum Chamæleonta. Sed si uti nos, inquit Pena, utriusque radices, & utriusque gummi subflauum, vermiculosum, nonnihil pellucidum, odore viroso, gustu & visu explorassent: demūque eadem radice & flore, caulēque donatam, alias verò caule carentes: & alibi etiam proximè copiosè enatas, partim caule viduas, partim utroque præditas obseruassent, volentes sententiam mutassent. Id se expendisse ait non procul ab arido & gelido dæcto D. Bernardi monte, atque etiam via qua Ispurgo itur Tridentum locis lapidosis & siccis. Quare herbariorum Carlinam varietate non genere duplicem, non esse Leucacantham, sed Chamæleonem album Dioscoridis esse censet. Matthioli aliam Chamæleonis nigri iconem exhibuit à Marantha Neapoli ad se missam, quæ tamen, inquit, umbellæ similibus Hyacinthi floribus scærentes proferat, cum tamen folia rubris maculis distincta non sint, cum minimè rubeat caulis, cum mansa radix nullo modo sit acris, non exesa, non flauescens, nec caules digitali crassitudine, hanc plantam genuinum Chamæleonem nigrum esse minimè putat. Sed hæ notæ ne illi quidem insunt, quam Chamæleonem nigrum ipsemet statuit. Tragus Carlinam Officinarum, Chamæleonem vulgarem nigrum facit, alterum & exiguum eius genus sine caule, Cordus Chamæleonem album, Lobellius Carduum *αγανδον* Septentrionalium. Vbiq; ferè prouenit, inquit Tragus, potissimum in asperis montibus, ac forti albaq; terra, radice, foliis & semine Chamæleonis vulgari simile, sed minus. Flos eius aculeatus & purpureus humi procumbit, & caule caret. Lobellius scribit Angliæ collibus, Picardiæ & Gallobelgij

CHAMAELEON *Exiguus,*
Tragi, Dalech.CHAMAELEON
Niger verus, Dalech.

mo: folia numerosa, longa, angusta, candicantia, spinis horrida: summis ramis veluti umbellæ ex quinque aut sex caliculis seu capitulis spinosis constantes innascuntur, in quibus flos purpureus dilutior, qui maturo semine in pappos evanescit, reliquorum Acanaceorum more: semen Cnici, minus, dulce, intus candidum, foris subnigrum aut cinereum: radix nigra, dura, dulcis si mandatur. Tota planta firmis spinis vndique riget. Agro Salmanticensi frequens. Floret Iulio, semē Augusto maturum.

HHH

alium verum Chamæleonem nigrum, pallidulis cæterisque carduis similibus floribus, semine oblongo & capillato. Chamæleonem nigrum in Gallia nusquam reperit Dalechampius, sed ex eius planta integerrima ex Calabria à Reinerio Solenandro viro humanissimo & doctissimo medico delata, illi, dono data, effigies hæc ad viuum expressa est. Radix illi palmum longæ erat, digitum crassa, foris nigra, & quæ lacera ta hiabat, intus flavescent: folia Chamæleonis albi, angustiora, minora, tenuiora: caulis dimidio pede non procerior, in cuius summo umbella floris purpurei splendebat, Hyacinthi colorem prorsus æmulantis, nisi candor eximius intermischeretur, & quamvis exaruisset, vividum suum nitorem retinens, absque echino globosæ capite, quod videlicet ex omnibus plantis quibus aculeata folia sunt, id peculiare sortitus est Chamæleon, ut citra echinatum verticē flos emicet auctore Theophrasto duobus in locis, in quibus tamen litera ad eò depravata est, ut ex ea rectus sensus vix elici possit. Prior locus is est,

Lib. 6. hist. cap. 3.

Ἀλλὰ τοῦ γε τοιαῦτα παύται, οἷον ἀκάρια, λευκὴ γυνή, χαλκίος, κῆκος, πολυάνθος, ἀσπιδίως, ἀνέπητος, ἰξίη, χαμαίλιον, πλὴν οὗτος οὐ φυλλάνθος, σκιδάριος, θάλαμινος, φυλλάνθος, καὶ τὰ ἄλλα. In quo cum de Phyllacanthi loquatur, & Chamæleonem foliis aculeatis esse ex Dioscoride constet, falsò οὐ φυλλάνθος dicitur. Quare legit Dalechampius per parentheses (πλὴν οὗτος φυλλάνθος ἢ ἀκανθῆς) σκιδάριος, &c. Alter locus est. Ὁμοῦτος ὁ καὶ ἐπὶ οὐδαμῶς ὁ τοῦ ὄγκου κύριος, ἢ ἀκανθῆς, ἀλλὰ παραμένει καὶ τοῦτο ἴδιον μόνον ἔχει τῶν φυλλακίων, ἀνιστραμμένους ὅς οὐ χαμαίλιον, ὁ μὲν γὰρ ἀφυλλάνθος ὡς ἀκανθῆς, quæ sic restituit Dalechampius. ὁ μὲν γὰρ φυλλάνθος ὡς, ἢ ἀκανθῆς. Illi tamē corruptæ lectioni subscripsit Plinius scribens, Chamæleon in foliis nō habet aculeos, &c. Sed erroris vnicus non fuit: nam pro Cnico Cnidos ibidē, & bis Helxine pro vxine legitur. Diuersum à superiore Chamæleonem pinxit Clusius, quem Salmaticensem vocat. Planta est, inquit, ex Acanaceorum genere, caule pedali, interdum etiam cubitali, multis aliis siue ramis concauo, & quasi foliato, duro ramem & firmo: folia numerosa, longa, angusta, candicantia, spinis horrida: summis ramis veluti umbellæ ex quinque aut sex caliculis seu capitulis spinosis constantes innascuntur, in quibus flos purpureus dilutior, qui maturo semine in pappos evanescit, reliquorum Acanaceorum more: semen Cnici, minus, dulce, intus candidum, foris subnigrum aut cinereum: radix nigra, dura, dulcis si mandatur. Tota planta firmis spinis vndique riget. Agro Salmanticensi frequens. Floret Iulio, semē Augusto maturum.

Lib. 6. hist. cap. 4.

Lib. 2. cap. 16.

Lib. 2. hist. Hist. p. 79

CHAMÆLEON *Salman-
ticensis, Clusij.*



Lib. 3. c. 2.

*Vires &
Temper.*

PICNOMON CRETÆ
Salomonensis, Pena & Lobellij.



Lib. 9. hist.
cap. 16.

Vocatur à Salmanticēsisbus Chamæleon, & cum
referre videtur quem Anguillara pro Chamæ-
leone nigro Dioscoridis proponit. Verum hi-
storia non respondet. Huc fortasse Chamæleo-
nis nigri speciem referemus Carduum pusillum
& raram, qui in planitie illa, quæ est inter Are-
latem & Salonam, & Creta Salonensis dicitur,
prouenit, ideo à Pena & Lobellio Picnomos
Cretæ Salonēsis nuncupatus. Radice est exi-
gua, mansu glutinosi quidpiam præferente, fo-
liis longis, secus longitudinem cauli adhaerenti-
bus, Chamæleontæ Monspeliensis modo, sed
angustiorib*, in ramis magnitudine Calcitræ,
& illius modo in ambitu sparsis, spinosis, longi-
sque aculeis adeo stipatis, vt arrepturo nihil
pareat aditus: flosculi senecionis æmuli, sed ma-
iores in oblongis, spinosis & tomētosus capitu-
lis: semen exiguum, Cnico simile, paleaceum.
Picnomon esse nō asseuerat Pena, sed quia plā-
ta est spinis munitissima, significationi alluden-
tes ita vocauit. Radix Chamæleonis albi, vt do-
cet Dioscorides, acetabuli mensura pota latos
lumbricos expellit, bibitur autē in vino austero
cum origani decocto. Hydropicis cōmodē da-
tur drachmæ pōdere cum vino ipsos enim ex-
tenuat. Decoctum eius contra vrinæ difficulta-
tem propinatur. pro theriaca est cum vino po-
ta. Occidit canes & fues: mures item necat suba-
cta cum polenta, aut hydrelæo madefacta. Cha-
mæleonis nigri radix trita admixto modico
chalcantho, cedrino oleo & axungia, scabiem
abigit, deterget impetigines sulfure & bitumi-
ne additis, cocta in aceto & illita. Decoctū col-
lutione dentium dolores sedat. cum pari pipere
& cera radix dentibus oblita, ipsis dolētibus au-
xiliatur. fouentur etiā dentes ipsa cocta in ace-
to & affusa. dolenti denti per scalpellum calida
admota ipsum frangit. maculas cutis in facie à
sole contractas expurgat, & vitiligines cum sul-
fure. Miscetur & medicamentis erodentibus,
phagedenica vlcera feraq; in cataplasmate im-
posita extirpat ac sanat. Theophrastus de harū
radicum facultatibus hæc prodidit, primū de
Chamæleonis albi radice. χρυσόμαλλον δὲ φασὶν πρὸς
τοῖς ῥέουσιν, ὅταν ἐκρυθῇ χυλοπύρεξιν ὥστε περὶ
φαρῶν ἐντεταμένῃ (lege ἐντεταμένῃ) ἐφ' ἐλαχίστων, καὶ
πρὸς τὴν ἔλκεσιν τὴν πλάσσειν, ὅταν ἀραιώσῃ τὸν πυρεθρὸν (lege πύρεθρον δὲ) ἐκρυθῇ
ταύτην, ὅσον ὀξύσαρον ἐν οἶνῳ ἀνθρακῶ. ἀναιρεῖ δὲ καὶ κύμα, καὶ σπινθύνει μὲν ἐν ἀλφίταις ἀναι-
ρεῖ δὲ καὶ μὲν ἐλκύνει καὶ ὑδατοῖς: σπινθύνει δὲ καὶ μὲν ῥαφάων μετρημένων τῶν ὀρεῶν. γυναικὶ δὲ διδοῖται ἐν
τρύγῃ γλυκύτῃ, καὶ ἐν σπινθύνῃ. καὶ ἐν βύλλῃται τῇ ἀσθινομῶτος ἀνθρακῇ διαπεριέχουσιν
βαύοντες,

Βασιλική, καὶ κελύμενη βέτις ἡμέρας, καὶ πρὸς πικρὸν γὰρ, βασιλική. Deinde de nigri Chamæleonis radice. *Ἀνάται δὲ λίπραν ἐξελκύειν ἐν ὕδατι τριβόμενος, καὶ τριβέειν ἐν πελιδνίῳ, καὶ ἄλφον ὡσείως, πικρὸν δὲ καὶ τὸς κύνας.* Id est, Chamæleonis albi radix ad fluxiones vilis esse traditur, cōcisa raphani modo, & iunco velut clauo transfixa ac decocta: & aduersus latos lumbricos cum vna passa acetabuli mensura in vino austero pota. Occidit & canes & sues. Canes in polëta subacta cum aqua & oleo, sues mixta cum biassica mōtana. (Quæ sequuntur, Mulieri datur ex fece vini passæ, aut ex vino passæ, Gaza non expressit, fortasse ea notha ac supposititia esse ratus.) Quòd si quis experiri voluerit, moriturus sit arger nec ne, præcipiunt ea radice lauandum triduo, quòd si tolerauerit moriturum negant. Nigri Chamæleonis radix in aceto trita & illita lepram & vitiligines exterit. Occidit & canes. Plinius partim ex Dioscoride, partim ex Theophrasto hæc exscripsit. Chamæleon cādus hydropicos iuuat succo radicis decoctæ. Bibitur drachma in passo. Pellit & interaneorum animalia acetabuli mensura succi eiusdem in vino austero cum origani succo. Facit ad difficultatem vrinx. Hic succus occidit canes, suesque in polëta addita aqua & oleo. Contrahit in se mures, ac necat, nisi protinus aquam forbeant. Radicem eius aliqui cōcissam seruati iubent funiculis pendentem, decoquantq; in cibo contra fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. Et mox de nigris addit. Radicibus eorum lichenas curantur, cum sulphure & bitumine vna coctis: commanducatis verò dentes mobiles, aut in aceto decoctis. Succo scabiem etiam quadrupedum sanant, & ricinos canum necant, iuuēcas quoq; anginx modo: quare à quibusdam Vlophonon, vocatur, & Cynozolon, propter grauitatem odoris. Ferunt & hæc viscum viceribus vilissimum. Omnium autem generum eorum radices scorpionibus aduersantur. Atq; hoc postremum videtur innuere, quod Dioscorides theriacam esse dixit. Cum origani verò succo bibi ait, quod Dioscor. dixit, *καὶ ἐν γάλακτι ἀποβύβειν*, quibus cum origani decocto bibendum esse significatur. Galenus de iisdem radicibus hæc scribit. Nigri Chamæleonis radicē lethale quidpiam habere: quainobrem foris vsum eius ad ploras adhiberi, & lichenas, & vitiligines, & in summa quæ deterisionem postulant. Præterea digerentibus & emollientibus pharmacis commisceri, & phagædenica vlcera illitam sanare: esse enim siccam tertio ordine, calefacere secundo completo. Porro albi Chamæleonis radicē potius dari cum vino austero mensura oxybaphi contra latos lumbricos: exhiberi etiam aqua intercutem laborantibus, adimilēmq; habere temperiem ipsius nigri radicis, nisi quòd hac illa amarior sit. Paulus quoque, Oribasius, & Aëtius tradunt Chamæleonis nigri radicē si intra corpus sumatur, veneni loco esse, & cetera eadem quæ Galenus. At Dioscorid. Theophrastus, Plinius neutrius venenatam esse radicem dixerunt. Neque enim venenatam eam esse intelligas, quæ canes, sues, & mures perimat. Quædam enim sunt animalibus noxia, quæ nobis salutaria sunt: nam eandem ad pellendās latas interaneorum tineas propinquantem hydropicis, & contra difficultatem vrinx. Præterea Dioscorides de Chamæleone albo tractans, Ixiam venenum esse non ait, neq; Theophrastus, cum scribit, *καὶ δὲ δάκρυον καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἐν κρητῇ* Id est, Lacrymam fundit Chamæleon albus, qui in Creta nascitur. Sed Dioscorid. de venenis agens, Ixiam venenā incommoda & noxias vires, & remedia tradit ex Nicandro, qui *ἰξίον δάκρυον* vocat. Eius scholiasta fides habenda nō est, qui Ixiam genus blatæ esse scribit, quod sit colore nigrum, odore verò in potu ocimi semini simile, quum appetē Diolcor. viscum esse dicat quod ad radices Chamæleonis albi reperitur. At Paulus & Aëtius de venenis tractantes, cum de vtriusq; Chamæleonis veneno & curatione dixissent, seorsum de Ixii veneno eadem quæ Dioscorides retulerūt. Cum verò Chamæleon albus Ixias nominetur, ob viscidū illud gummi, quod ex radicibus manat, num etiā Chamæleonis nigri radices gummi fundunt: vt quæ de Ixii veneno veteres literis

In cap. 21. mandarunt, ad succum etiam è radicibus Chamæleonis nigri pertineant. Martialis non solum Ixiæ nomenclaturam utriq; Chamæleoni communem esse scribit, quod uterq; gummi visco simile proferat, sed etiam Ixiæ Dioscoridi de venenis agentis, nihil aliud esse quam Chamæleonem nigrum. Idem cum Carlinam in caulem assurgentem nigrum esse Chamæleonem sibi persuaserit, vè ex utriusque radice gummi exudare ex quorundam Cretensium oratione in utraque Carlina id cõferere narrantium, asserere nõ dubitavit. Quod verò Ixiæ Dioscor. Chamæleon niger sit, haud verum est: soli enim Chamæleoni albo Dioscor. Ixiæ, Theophrastus Ixiæ & Ixines appellatione perspicue tribuerunt, nusquam Chamæleoni nigro: quorum auctoritas maioris apud omnes ponderis esse debet, quam nothæ illæ ac supposititiæ Ixiæ appellationes, & Plinij oratio quæ est eiusmodi. Ferunt & hæc, inquit, viscum vlcibus utilissimum. Quæ verba cum de Chamæleonum generibus, de quibus promiscue supra tractauerat, citra distinctionem proferuntur, utriq; Chamæleoni videntur viscum assignare. Quod Ruellium movit ut eum locum aliter quam est in Plinij codice citaret ad hunc modum. Chamæleonem etiam nigrum ferre viscum vlcibus utilissimum Plinius cõmemorat. Verum hæc de albo, nõ de nigro, audienda esse ex iis quæ diximus perspicuum est. His adde Penæ perit Herbarij sententiam, qui gummi quod Ixiæ dicitur, è Carling caule carentis, & caule donata radice exudare virosum, & gustu ingratum se certò scire affirmat, venenu sit nec ne, nondum compertum habere. Id etiam asserit non nisi vnam esse plantam utramque Carlinam, ut dictum est, neque etiam Dioscoridem viscum vllum agnoscere in verò Chamæleone nigro. Ixiæ Græcorum Plinius locis quamplurimis viscum convertit. In causâ fortasse fuit utriusque confimilis lentor, inquit Ruellius. Nam sicut viscum cuiuscumq; rei cui hæserit, tenax est, ita si deuoretur Ixiæ, omnia glutinat interanea, omnesq; contrahit rectementorum exitus, & colligat. Sic forsitan cum pro veneno Plinij Latina defecisset appellatio, maluit uti largiuscula nominis ambage, quam vel Græcam sequi, vel nouam effingere nomenclaturam. Hoc utique pacto Plinius ab erroris suspicionem posset vindicari, quanquam Scribonius Largus antiquior eo, Græco contentus vocabulo, libellis suis Ixiæ vocem satis protulerat. Quare nomen hoc *ἐρυγγιον* ad viscum arboreum, & acupis dicarum vitio non caret, cum pugnent viribus viscum & Ixiæ, sitq; viscum in remediorum, Ixiæ vero in venenorum censu numerandum. Id quod pridem obseruauit doctissimus Leoniceus.

ERYNGIUM, CAP. VIII.

Nomina



ERYNGION Græcis & *ἐρύγγιον*, Latinis Eryngium, Officinis corrupto vocabulo Iungus vocatur. Plerique etiam Centumcapita nominant, à numero nimirum capitum quæ in summo obinet. Vnde Galli Eryngium vulgare vocant *Chardon à cent testes*. Græci philosophi, inquit Pena, Eryngium quasi *ἐρύγγιον*, id est, ruetum, dictum autumat, quòd capræ quæ morfu fureculum Eryngij præciderint, vel deglutierint, cunctum gregem ponere sequentem quasi stupore attonitum sistunt, donec Eryngium ruetum reiecerint. Dioscorides Eryngij vnus meminit. Plinius scribit aliud esse albicans, aliud nigrum: & satium quidem esse, & spòce nasci in asperis & saxosis: & in litoribus maris durius nigriusq; folio apij. Ex his cãdidum à Romanis Centumcapita vocari. Sunt, inquit, qui & acanon Eryngio adscribunt, spinosam, breuemq; ac latam herbam, spinisq; latioribus. Recentiores quoq; herbarij aliquot Eryngij genera obseruauerunt, ducti similitudine quæ illis est cum Eryngij descriptione à Dioscoride tradita. Est autem huiusmodi. In aculeatarum stirpium genere est Eryngium, cuius folia initio sale condita oleum modo comeduntur. Sunt autè lata, & in ambitu aspera, gustu odorata quum verò adoleseunt, in multis caulium eminentiis spinis aculeantur, in quorū summita

Lib. 4. cap.

Genera.

Lib. 4. cap.

8 & 9.

Lib. 4. cap.

Forma.

ERYNGIVM Montanum:

Martholi.



ERYNGIVM Marinum,

Martholi.



summitatibus globosa capita duriorum acutif-
sinarumq; spinarū ambitu stellæ instar circum-
uallantur, quorum color modò viridis, aut can-
didus, interdum cæruleus inuenitur. Radix illi
oblōga, lata, foris nigra, intus alba, pollicis cras-
situdine, & ipsa odorata, & aromatica. Nasctur
in asperis & campestribus. Hæc quamuis satis
dilucida sit à Dioscoride tradita delineatio,
quodnam tamen Eryngium propius represen-
tet, nondum inter herbarios constat. Aliis enim
Etyngium cāpestre designari placet: aliis Eryn-
gium marinū indicis omnibus propius expri-
mi, quod Dalechāpius luculenter sic descripsit.
In litoribus & sabulosis, quæ exundās maris flu-
ctus irrigat, sæpius hoc crescit: radice dulci, ex
internallis geniculata, decem duodecimve pe-
des longa, & nonnumquam longiore, ut inte-
grā extirpare vix liceat: folio magno, lato, sub-
rotundo, albicāre, crasso, per ambitum insecto,
& spinoso, cum manditur suauiter olent: caule
pedali, rotundo, ima parte rubente: in cuius cacu-
mine globosa capitula, pilulæ forma, nucis
magnitudine, aculeis horrida protuberant, cir-
cumfusis exquisitis floribus, tractu nostro cæru-
leis, quin is, lenisve foliolis spinosis, in orbem
subtus muricato spiculorum vallo stellæ modo
radiantibus, colore quoque cæruleo, quem cau-
lis, floris, foliorum colorē in aliis regionibus va-
riare quidam asserunt, quibus assentitur ille, sed
quale Eryngium in maritimis nostris vidit, tale
& descripsit in eorum gratiam qui procul à ma-
ri absunt. Hoc Eryngiū Plinius in litoribus ma-
ris folio apij esse dixit, quod aut falsum est, aut
deprauati codices, ut pto σκαλίου, σκάν, id est,
apij folia, alicubi legisse videatur. Apud Theo-
phrastum quo loco aculeatarum stirpium disce-
rentias ex caulium ramorumq; numero ac situ
inuestigat, ῥόζον, vel, ut Gaza legie, ῥόζον mendo-
se pro ῥόζον exaratum est, quod ex Pliniana lo-
ci illius Theophrasti interpretatione faciliè de-
monstratur: quanquam Plinius mentem illius
non omnino expresserit, neque is Theophrasti
locus ex Plinij conuersione integer esse depre-
hēdatur. Multis igitur enumeratis spinosis her-
bis subiungit Theophrastus. Διακρίνεται δὲ ἐν αἰ-
σῶσι τοῖς ἑτοιμοῖς, τὸ πρὸς τὸ πολυκαυλὸν ἔχειν, καὶ ἀποφύσσει ἔχον, ὡς περὶ ἰκνίανος, ἅμα δὲ ἀνὰ γὰρ ἔχον ἰξέου, ἡ γὰρ περὶ τὸ ῥόζον. Quæ sic
Plinius conuertit. Est & illa differentia, quod quædam in iis multicaulia ramosa
sunt, ut carduus. Vno autem caule, nec ramosum, enicos. Quædam cacumine tan-
tum spinosa sunt, ut Eryngium. Ex quibus intelligere licet legendū esse, καὶ ἀποφύσσει

Locus.

Fuch cap.
u. hist.
Pena in
Aduerf.Eryng. Ma-
rinum.

Lib. 22. c. 7.

Lib. 8. hist.
cap. 3.

Lib. 22. c. 6.

ἔχει, ὡς περὶ ὁ σκόλιος, καὶ διὰ μακρόν, καὶ ἀποπύρεται τὸ ἔχοντα, ὡς περὶ ὁ κύνυς, & προ-
 ῖδρος legendum ἐρύγγιον. Plinium tamen non rectè dixisse, quædam cacumine tan-
 tum spinosa esse: dicendum enim fuerat, quædam cacumine tantum ramos & adita
 ta fundere, quemadmodum Eryngium. Eryngium montanum in salebrosis mon-
 tibus nascitur: foliis multis, à radice prodeunti-
 bus, venosis, amplis, in ambitu crenatis, & leui-
 ter pungentibus, vrticæ similibus, albicantibus,
 longo pediculo subnixis: caule sesquipedali, vir-
 gato, quæ furculi echinos sustinentes prodeunt,
 foliis oblongis & valde muricatis stellatim co-
 ronato: echinis ovo similibus, foliorum spinoso-
 rum vallo munitis albæ spinæ modo, quod
 huic carduo peculiare est: dum maturescunt ex-
 ruleo colore nitentibus: radice ferè Helenij, fo-
 ris nigra, intus candida, odorata, gustu Eryngij.
 Aliud Eryngium montanum recentiores fece-
 re, scilicet Crithmum quartum Matthioli. Na-
 scitur in Bohemia inter segetes, in agrorū mar-
 ginibus & secus vias, foliis lōgis, angustis, firmis
 ternis ex pediculo longo prodeuntibus, vrticæ
 denticulatis, ius quæ in summis caulibus sunt mi-
 noribus & brevioribus. Caulē habet ramosum,
 alis cōcauum, geniculatum, in summo alis diui-
 sum, in quibus floridæ albicantēsq; umbellæ,
 in eis semen oblongum, paruum, acre, odoratu.
 Radix silvestri haud absumulis est, minor tamē,
 sapore primum dulci, deinde acri & odorato.
 Hæc Matthiolus. Pena scribit gustu & odore
 esse Eryngij, radice simili, Crithmo dissimili. In
 Fladria provenire scribit Lobellius. Aëcius aliud
 Eryngium montanum describit, foliis angustis
 & parvis, floribus aureis, & oculorum speciem
 præbentibus, ex cuius radice pharmacum cōfi-
 cit, quod qui per anni spatium sompserit, à co-
 mitiali morbo non corripitur. Huius Eryngij
 folia non solum contactu, sed etiam prope ad-
 inota, vi prorsus admirabili salamandras aqua-
 tiquas interficiūt. Matthiolus Eryngium aliud
 pictum dedit, quod planum vocat, omissa pro-
 prius eius descriptione. Potest Eryngium læue di-
 ei. Clusius aliud exhibuit, quod pumilum appel-
 lat: tenuifolium etiam dici potest. Hoc passim
 ferè in agro Salmanticēsi in colliculis nascitur,
 palmi, nonnunquam pedis altitudine, caule gra-
 cili, multis alis brachiato: folia secundum radicē
 mauscula, latiuscula & molliora, circa radicem
 rotæ instar humi sparguntur: sed quæ in ipso
 caule sunt sub alis, molliora sunt, tenuia & acu-
 leata: in ramulorum summitatibus globosi ca-
 pitula plerumq; octo, spinosorum foliolorum
 ambitu

Lecm.

Fama.

*ERYNGIUM aliud monta-
 num, Dalecham.*



*ERYNGIUM Planum,
 Matthioli.*

Lib. 6. c. 16.



Lib. 1. lib.
 Hippocr.

ambitu stellarum circumuallantur, & ipsa etiam sinuosa sunt: flos & rota capitulo cum suis foliolis ea ambientibus caerulei sunt coloris: folia statim exsiccantur, & decidunt, v: raro plantam cum foliis reperire liceat, præsertim, ubi defloruit: radix lignosa & tenuis, quæ singulis annis perit. Post menses plerumque inuenitur loco supra dicto. Huic subdendum aliud pusillum Eryngium planum Mutoni ex Lobelio, quod raro ruri, vel in hortis apud Belgas visitur, foliis quàm Diplacus lon-

ERYNGIUM *Pumilum,*
Clusij.



PUSILLUM *Eryngium*
planum Mutoni, Lobel.



gè minoribus, angustioribus, cauliculis dodrantalibus & pedalis, anfractuosis, & diuicatis, in quibus summis & secundum longitudinem flosculi minores quàm campestris Eryngij: radix Corruæ, aut Asparagi, sed minor multo, petennis. Nusquam se vidisse ait Lobellius, quàm in hortis Mutoni. Dioscoridi Eryngij radix calfaciendi vim habet. Pora menses & vrinæ pellit: tormina & inflationes discutit: cum vino iocinorosis, venenatorum moribus, & iis qui leriherum quid hauserunt succutrit. Bibitur aduersus plurima cum staphylini semine pondere drachmæ vnius. Appensa & illita tubercula discutere prodit: cum hydromelite pota opisthotonicis, & comitialibus medetur. Plinius, Clara imprimis aculeatarum Eryngium est, contra serpentes, & venenata omnia nascens. Aduersus ictus morsusq; radix eius bibitur drachmæ pondere in vino: aut si plerumque tales iniurias comitatur febris, ex aqua. Illigitur plagis, peculiariter efficax contra chersydros, ac ranas. Omnibus veto contra toxica, & aconita efficaciotem Heraclides medicus in iure anseris decoctam arbitrat. Apollodorus aduersus toxica cum rana decoquit, ceteri in aqua. Eryngium Galenus ait caliditate parum, aut nihil, quod temperatum est superare, ceterum non parum habere siccitatem in tenui essentia consistentem. Aëtius scribit potum radices decoctum colicis mederi: multo addito calculos, stillicidia difficultates vrinæ, & renum vitia sanare: quod per quindecim iugiter dies & ieiunos, & in lectum ituros hiberni oportet. Quod si cum eo sum quoque decoxeris, magis proficies. Affirmabat quidam assiduo Eryngij usu, nunquam postea minuisse calculos, cum prius eo morbo frequentissimè vexaretur.

Lib. 11. ca. 7

Lib. 6. simpl.

Lib. 4.

Nomina
Lib. & caps.
Forma.



ΚΑΘΑ ΑΕΥΚΗ Græcis, Latinis Spina alba, Arabibus *Bedeguar*, folia fert, vt Dioscorides describit, albo Chamæleonti similia, sed angustiora, & candidiora, aliquarum hispida, spinosa, caulem supra bina cubira altum, pollicari, aut ampliori crassitudine, albicantem, intus cauum, in cacumine capitulum inest spinosum, echino marino simile, sed minus, & oblongum, flores purpurei, in quibus semen ceu Cnicum, sed rotundius. Nascur in montibus & siluosis. Diuersi rei herbarii scriptores diuersas spinosas plantas pro Spina alba proponunt. Fuchsius Spinæ albæ genus vnum esse scribit, quod Carduus Mariæ hodie nominatur, & Spinam albam hortensem appellat. Alterum genus, siluestre, quod Acanthiū ex Dodon. & aliis esse diximus. Alij Spinā albam, Carduū benedictū, vulgò dictū esse putant: alij Carlinā, alij Cynarā aculeatā, alij Scolymum, alij alios siluestres carduos spinis rigētes. Dalechamp. Spinā albā esse arbitrat quæ hic picta est, notis omnibus à Diosco. traditis eia prorsimè quadrantibus. Gignitur in niuosis, asperis, & lapidosis montibus Allobrogem, locis ad Orientem solem, aut Meridiem couersis, quā celsi montium vertices in cliuosos tractus summittuntur. Planta cubito procerior assurgit, radice pedalis, intus candida, foris ex albo flauescēte, parum furculosa, gustu adstringente: caule anguloso, superne ramoso, inani, pollicis crassitudine: foliis Chamæleonis albi, candidioribus, angustioribus, altius incisis, spinosis, subhirsutis: echinis oblongis, ouatis, aculeis

Locus.

Caus. hist.

SPINA Alba, Dalechampij.

SPINA Alba, Matthioli.



innumeris rigentibus, displici satui echino prorsus similibus, horrido spinarum erectarum vallo cinctis, quod huic vni ac Eryngio caruleo ex omnibus spinosis plantis ab eo visus peculiare est: aspectu pulcherrino: flore purpureo, in echino sub aculeorum velut radice prodeuntē semine Cnici, minore. Hæc descriptio ex planta viua expressa omnibus notis Spinam albam, ita repræsentat, vt nihil desiderari queat, & eius cognitio herbariorum de Spina alba dissensionem dirimere debeat,

SPINA Alba altera, Mart. b.



debeat, ac in posterum medicamentarios docere Symplicio de Eupatorio indendā. Matthiolum legitumam Spinam albam Patavio à Costusō ad se missam ait, quā hic expressimus. Hæc, inquit, Spinā albā Dioscoridis, omnibus, quas modò ex eo recensuimus, refert. Est & altera plauti aculeata, inquit, cuius iconem hic exhibemus, quam quidam Spinam albam esse censent: sed multa in hac desiderantur. Hanc tamen depinxit Pena, nomine Spinæ albae, quā in horto Patavino vidit, indicante Melchior Guilandinio illi præfecto, Carduum scilicet totum albidum, infernè albidiorè quam supernè, habentem folia Chamæleonis, minora in regionibus siccioribus. Nam quē in Anglia seuit ille, latiora aliquantò habuisse ait. Fuit quidem illi caulis bicubitalis, etiam tricubitalis, digitū crassus, & incanus totus: echinos marinis similes rotundos habuit: quando florent ex albo purpurascētes, inter quos defluentes sese in summo, multò altius erigunt ternæ quaternæve, papposæ glumæ cōsertæ rigidis nucron-

aris tunicis, semen claudenibus oblongum, auenæ excorticatæ æquale & simile.

Hæc, inquit, posterioribus, & accuratioribus peritiorum sententiis omnium maxime quadrare videtur Spinæ albae: semen tamen, cuiusmodi dixit, auenæ aut scali similis, sed rotundius Cnico. Huius iconem capite de Spina Arabica ostendimus. Spinæ albae radix pota, ut tradit Dioscorides, sanguinē expuentibus, stomachicis, & cataplasmae prodest: et ad tumores in cataplasmae imponitur. Decoctum ipsius in dolore dentium collutum confert. Epotum semen infantibus qui conuelluntur, & à serpente demorsis auxiliatur. Aiunt & amuletum ex ipso appensum serpentes fugare. Inter Spinarum genera Plinius Spinæ albae meminit his verbis: Spinæ albae semen contra serpentes auxiliatur. Corona ex ea imposita capitis dolores minuit: nec alibi ipsam describit, nisi quod ait, in Papyris & Ferulis, Spinaque alba caulis ipse pomum est. Galenus scribit Spinæ albae radicē desiccatoriam esse, & modicè adstringentem: quamobrem catarrhos & dysentericos iuvare, & sanguinis refectiones cohibere, œdemataque illitu contrahere, ac dentibus dolentibus prodesse, si decocto eius colluantur. Semen tenuis essentia & calidæ facultatis esse, itaque potui datum iis qui conuelluntur convenire.

Vires &
Temper.
Lib. 3. c. 12.

Lib. 14. c. 12.

Lib. 3. c. 12.

Lib. 1. c. 12.

LEUCACANTHA,

CAP. X.



ΕΥΚΑΚΑΝΘΑ Græcis, Alba spina Latinis, non solum vocum transpositione & compositione ab *εὐκαλῶ* & *ἀκανθῶ* soluta compositione, idest Spina alba differt, sed etiam re ipsa maxime: quod aperte præci auctores demonstrant, qui seorsum & diversa de utraque tractant. Præterea Dioscorides, qui cum ea, quæ supra diximus, de Acantha leuce tradidisset, aliquantò post de Leucantha hæc breviter, quam nobis ad eius cognitionem comparandam necesse fuerat, scripsit. Leucacanthæ radix similis est Cyperi, amara, valida, vel, ut alij legunt, *εὐκρά* *ἰσχυρῶς*, idest amara valde. Nec fusiùs Plinius, Leucacantha, inquit, quam alij Phyllon, alij Ischiada, alij Polygonatō appellant, radice Cyperi, &c. Ex qua brevi mentione quæ sit hodie Leucacantha, haud facile est decer

Lib. 3. c. 12.

Forma.

Lib. 3. c. 12.

In cap. 19.
lib. 4.*CARDVVS Lacteus,*
Matthioli.

Lib. 4. c. 63.

Cap. 7.



Lib. 4. ca. 4.

LEUCACANTHA,
*quorundam.*Lib. 4. cauf.
cap. 10.Lib. 4. c. 19.
In cap. 19.
Temper.

hanc suspirionem, quod legitur in vetustis Dioscoridis exēplaribus, Leucacanthā Spinam quoque regiam nūcupatam fuisse. Dioscorides tradit Leucacanthæ radicem manducatam dentium dolores fidare. Decoctum ipsius cyathorum trium mensura cum vino potum auxiliari pleuritidis diuturnis, ischiadicis, ruptis, & conuulsis,

est decernere. Matthiolus Leucacantham suspicatur esse aculeatam illum Carduum, cuius folia albis maculis notata sunt, unde ab Italīs Carduus lacteus nūcupatur, ab alijs Carduus Maris. Nam præterquam quod coniectura quadam dici posset, inquit, ab albis maculis nomen inuenisse, radicis etiā ipsius tum durities, tum amaritudo, etsi formacyperi radicem non referat, satis cōsentire videtur. Dodonæus Carlinam quæ caulem profert, pro Leucacantha depinxit & descripsit, quam Chamæleonem album esse ostendimus. Aliam quidam pro Leucacantha monstrant, quæ hic picta datur. Hæc in agro Valētino Allobrogum, & in agro Sesteriensī, reliquaq; Galloprovincia frequē-
rissima nascitur, agricolis, messoribus & viatoribus infestissima, quod eorum crura spinis suis validissimis configat, & lauciet. Sesterienses *Auriele* vocant, à florīs aureo colore. Prouenit vbique in aruis & segetibus, radice subnigra, lignosa, perquam amara, terete, quasi geniculorum lineis virgata, cypero simili (nam, ut scribit Dioscorides, Cyperi radices nūc rotundæ sunt, cum quibus Leucacanthæ radicē comparare possumus, nunc oblongis oliuis similes inrer se cohærent) caulibus sesquipedalibus, foliis ferē cyani, oblongis, carnosīs, è cinereo virentibus, prope radicem altissimē laciniatis, in extremo caule nihil incisis, lauibis & exarmatis, flore aureo, spinis candidissimis (quam ob causam Albam spinam veteres nominarunt) stellatis, myacantho similibus, & pariter, vt in myacantho collocatis, tam rigidis, & leuis, vt prætereunrium caligis transixis sæpissime tibias dilanient. Huius folijs & myacanthi folijs in carduorum generibus, nullis spinis rigent. Monspelienfes hanc spinam Solstitialē nominant, quod æstiuo solstitio floreant, æque etiā ferius. Quidam *ἀργυρὰν βασίδαν* Theophrasti esse coniciunt, id est Spinam regiam, quæ ante æstatem non germinat, conueniente cum huius natura germinationis tempore, & hac insuper cōiectura, quod cū Theophrastus alibi τῆς ἀργυρᾶς βασίδος meminisset, nusquam mentionem fecerit τῆς λευκακάνθου plantæ veteribus nouissimæ, & ab altera diuersæ. Auger &

conuulsis:quin & succum radices potum eadem præstare. Plinius, Leucacanthæ ra-
 dix, inquit, commanducata dentium dolorem sedat: item laterum & lumborum,
 vt Hicelius tradit, semine potu drachmis octo, aut succo. Eadē ruptis, conuulsisq;
 medetur. Galenus Leucacanthi, quam aliqui Polygonarō, alij Ischiada nuncupāt,
 radicem amaram esse scribit, ac proinde incidere & exsiccare tertio ordine, calfa-
 cere autem primo. Leucacanthæ hic depictæ radicibus vtuntur hodie ad tollen-

LEVCACANTHA

Monspeliensium, Dalech.



noter radices multæ, confertæ, ex vno quasi nodulo aptæ, in multos oblongos glo-
 bulos diductæ, Asphodeli, Cyperive modo, mandēti multum glutinis exhibentes,
 nonnihil caloris, & tenuium partium, tametsi amaroris penè nihil. Quidam Car-
 dum Triglochina suprâ descriptum cap. 3. Leucacantham esse malunt.

SILYBUM,

CAP. XI.

CRÆCIS οὐδύων, Latinis similiter Silybum nominatum, tam breui-
 ter à Dioscoride delineatur, vt pronunciare difficile sit, quæ nam ex
 nostratibus aculeatis stirpibus hoc nomine sit donanda. Sic enim ille
 scribit. Silybum spina est lata, folia habens Chamæleoni albo similia.
 Et Plinius, Silybum, inquit, Chamæleonti albo similem, æquè spinosam ne in Ci-
 licia quidem, aut Syria, aut Phœnice, vbi nascitur, coquere tanti est: ita operosa
 eius culina traditur. In medicina nullum vsum habet. Quare cū breuitas ista
 obscuritatē nobis pariat, diuinare potius licet, quàm de eius plantæ aculeatæ no-
 tione certi aliquid statuere. Silybum igitur quidam esse arbitrantur plantā illam
 aculeatam quam Lonicerus nomine Leucacanthæ exhibuit & descripsit, & à Ger-
 manis *Unse distel* appellari scripsit, vel ad differentiam Spinæ albæ *Unse garten*
distel, *langkrauten distel*, id est Carduum puellarum, quod in virginum ferta & co-
 ronas veniat, *Zamgarten distel*, id est Carduum satium hortenslem. Spiræ, & in ali-
 quot alijs Germaniæ ciuitatibus inter coronarias plātas magna diligētia in hor-
 tis colitur & scribitur à puellis, quæ ex Libanotidis folijs, & huius cardui floribus

intertextis

Nomina

Lib. 4. c. 13.

Li. & c. 12.

In Aduers.

Farma.

SILYBUM, Sive Leucanthæ Loniceri.



In Advers.

intertextis corollas nectunt. Radice est longa, candida, amara, fibris villosa: caule procero, ramoso, aspero, & aculeatis carduis inter segetes nascentibus simili, altero demum anno post sationem emergente: foliis magnis, latis, Chamæleonti albo non dissimilibus, valde dissectis, spinosis, capitulis perquam multis, spinis rigentibus, flore candido, suaviter olente, semine Cardui benedicti, minore, alba lanugine concluso: cum deperit flos, tota planta moritur. Folia recentia in acetariis edunt, nec insalubria, nec insuavia. Pena pro Silybo, quæ lata spina proditur, non respuendum esse opinatur Carduum lacteum, seu Carduum Mariæ, seu argentatum, de quo infra tractabimus. Est enim foliis prægrandibus, latis, spinosis, maculis & ductibus lacteis, crebris, aspersis, viridibus. Caulis ei bicubitalis, crassus, spinosus, & echino donatus spinis cincto, purpureo flore referto. Semine Cnici compressum, lapidi extendo optimum etiam muliercularum expetimento. Imum caule pullulantem delibatum, & radicem in acetariis aliàs se in Italia esitasse ait. Plebecula muliercu-

larum copiam lactis illius esu prouocat. Dioscorides tradit Silybi radicem cum sale oleoque coctam edi: radicis succum drachmæ pondere potum vomitiones mouere. Sed de hoc Carduo aliquantò post plura dicemus.

SPINA ARABICA, CAP. XII.

Nomina

Lib. 3. c. 13.

Lib. 3. c. 13.

Lib. 3. c. 9.

Cant. lib. 3.

Lib. 3. c. 13.

Lib. simpl.

AKANΘA Ἀκανθα Græcis, & αἰγυπτία, Spina Arabica, & Ægyptia Latinis dicitur, Mauritanis *Suchaba*. Hanc Spinæ albæ subiicit Dioscorides, non tamen describit, sed similem naturâ videri ait Spinæ albæ, adstringentem, & ad fluxum muliebrem, ad sanguinis reiectionem, & ad alias fluxiones radicem eius similiter vtilem esse. Plinius Spinæ Ægyptiæ, siue Arabiæ laudes, inquit, in odorum loco diximus: & ipsa spissat adstringens, destillationes omnes, & sanguinis excreationes, mensiumque abundantiam, etiamnum radice valentior. Ita vetus codex, sed in vulgatis, Ægyptiæ siue, voces desunt. Quæ eadem planè sunt cum iis quæ Dioscorides tradidit, nisi quod *ποσὸν γυναικείας*, mensium abundantiam pro fluxu muliebri more suo conuertit. Locus autem quo se Ægyptiæ Spinæ laudes dixisse ait, est is. Nec minùs Spina celebratur in eadem gente, duntaxat nigra, quoniam incorrupta etiam in aquis durat, ob id vtilissima nauium costis. Candida faciliè putre scit. Aculeus Spinarum est in foliis, semen in filiquis, quo coria perficiuntur gallæ vice. Flos & coronis iucundus, & medicamentis vilis. Manat & gummi ex ea, &c. At non satis animaduertit Plinius aliam esse spinam Ægyptiam, ex qua Acacia præparatur, quæ etiam Acacia appellatur, de qua & hoc loco, & capite sequenti agit, scribens, Gummi optimum esse ex Ægyptia Spina conuenit, vermiculatum, &c. Item alio in loco suprâ à nobis citato, ubi Acaciæ spinam vocat, ab hac spina Arabica, quæ etiam Ægyptia vocatur, de qua primo loco à nobis adducto tractat, eisque eadem omnia quæ Dioscorides, attribuit, cum tamen hæc herba sit, illa arbor. Galenus quoque scribit Spinam Ægyptiâ, quàm & Arabicam vocant, similem esse Spinæ albæ nostrati, verum faciliore validius

SPINA Arabica.



ne par & angulosus, sed latoria, longiora & ampliora folia, echinus rotundior, rigentium spinarum cinctu non sic vallatus, flos vt in superiore purpureus. Quare cum potestate effectūque, & aliqua ex parte figura conueniant, nemini mirum videri debet Dioscoridem has duas plantas coniunxisse, & tanquam germanas à Melue in syrūpi de Eupatorio compositionem accitas fuisse.

ATTRACTYLIS,

CAP. XIII.



ΤΡΑΚΤΥΛΙΣ Græcis, Latinis quoque Atractylis dicitur, *Nomina* quod ea antiquæ mulieres pro fuso vterentur: ἀτρούλος enim fulum significat: quare Gaza fulum agrestem Latine appellauit. Vocatur etiā κνίκος ἀγρία, id est, Cnicus siluestris, quod ei similis sit: sic enim Dioscorides descripsit. Atractylis spina est Cnico similis, sed multo longiora fo- *Lib. 2. 91* *Forma.* lia habens in summo virgularum, caulem etiam magna ex parte nudum asperumque, quo foeminae pro fuso vtuntur: capitula in cacumine aculeata, florē pallidum, radicem tenuem, & inutile. Hanc Atractylidem quæ ex aculeatis & Acanaceis est, Dalechampiis circa Lutetiam & Lugdunum frequentem nasci tradit, in montosis scilicet, aridis, & macris, radice breui, valde fibrata, caule nūc vnico, pedali, & interdum altiore, recto, gracili, nunc multiplici, rotundo, lanuginoso, foliis longis, aculeatis, valde laciniatis, capitulis in summo plantæ vertice echinatis, floribus luteis, semine Cnici, minore. Totius plantæ odor grauis est: de qua hæc Theophrastus prodidit. Ἀτρούλης δὲ τις καλεῖται, ἔχει δὲ ἔχρη τοῦ φιλάν, ὅτι ἀφαιρῶν αἷμα, καὶ τὸ πρὸς τὸν πυλῶνα, ἀμύδιον ποιεῖ τὸν χυλόν. διὸ καὶ φάρμακον καλεῖται τὸ ἀφαιρῶν αἷμα, καὶ τὸ πρὸς τὸν πυλῶνα. ἔχει δὲ τὴν ὁσμὴν διήνην, ἢ φοινίκην. ὅφιν δὲ καὶ τελεῖται τὸν χυλόν πρὸς τὸν πυλῶνα. Id est, Quæ Atractylis vocatur, his (Cnico & Acorua) candidior est. Foliū eius id peculiare habet, quod decerpit, & carni admotū, sanguineum emittit succum: quam ob causam spina hæc à quibusdam nominata est φόνος, id est, cruor: grauis etiam odore, cruorēque representans. Serò perficit fructum, scilicet Autumno. Sic vertit Gaza ἔχρη δὲ τὴν ὁσμὴν, &c. sed auctoris mentem

ATRACTYLIS.

Lib. 1. cap. 15.

Lib. 1.

ATRACTYLIS flore
purpurea.

mentem affecutus non videtur, sicuti neque Ruellius, qui vertit odore grauis, & pestem denuntians: nam cum quotannis tepullulascens odorem suum vibret, oportet pestilentem quoque luem quotannis hanc minari. Alij exponunt, olere cadaveris trucidari, & in tabulam marcescentis foetidum virus, quod ad auctoris sensum aptius est, non tamen vetum. Atractylis enim tesinosum & iniucundum quidpiam spirat, non autem tam abominandum, ac putidum. Mendosus igitur locus est, & sic corrigendus. Ἰχθὺς τὴν ἀπομύρην ἀφίησιν, καὶ δὲ λυσιτελεῖν, id est graui est, & ingrato odore. Alij legunt, Ἰχθὺς τὴν ἀπομύρην ἀφίησιν, καὶ χυδοῖν ποσὶ δέ. Hæc peculiaris Atractylidis nota, quod foliis sanguineum succum effundat, ob id ἀνδρὸς ποσὶ γαῖαν ab Aetio nuncupata, Atractylidem huc appictam genuinam esse arguit. Si quis enim echinorum squamas euellat, è plaga manabit et uor: si verò distractum & dilaceratum capitulum manibus, vel panis albis affricet, colore sanguineo tingentur: quod experientia quæuis docete potest. Est & in agro Mōspeliēsi Atractylis purpurea frequēs, luteæ Atractylidi caule, folio, radice, echino, odore, succo similis, hoc verò distans, quod nec pubescit lanugine quemadmodum lutea, & florem edit putpureū, seu potius coccineum. Ad hanc accedere videtur Atractylis Cypria, quam descripsit Anguillara, foliis Cnici similibus, minoribus, nonnihil crispis: ex horum medio surgit caulis, in cuius fastigio echinus protubetat, ex quo dodrantales ramuli graciles, foliis nudi, huc illuc procedunt, echinos in vertice pusillos sustinentes, flore dum explicantur purpureo, Anemonæ simili. Horum simul omnium, nempe & caulis & ramulorum, cubitalis est altitudo: semē album, Cnico simile. Nascitur & hoc Cardui genus in agro Bononiensi prope montem, quem *Mangianigo* vocant, prope villam Medefanum, & in Maris prope oppidum, quod *Chieti* nominant, & in Narbonensi prouincia intet Masanum & Insulam oppidum, sed flore ad luteum inclināte. Est præterea Atractylis marina cognominata, quod in maritimis gignatur, Pena Pycnocomon appellat, radice vulgari Atractylidi simili: foliis paulò latioribus & longioribus, partim ex caule ramisque extortum distentis, partim, quod isti plantæ peculiare est, cauli & ramis pennarum riu natiuo coalitu sic agglutinatis, ut cohereant, & utrinque cauli ramisque incumbant, tanquam de industria admota & impacta: flore Cnici, croceo, in oblongis capitulis fulgente: semine quoque Cnici. Quidam sunt, inquit Matthiæolus, qui plantam

lidi simili: foliis paulò latioribus & longioribus, partim ex caule ramisque extortum distentis, partim, quod isti plantæ peculiare est, cauli & ramis pennarum riu natiuo coalitu sic agglutinatis, ut cohereant, & utrinque cauli ramisque incumbant, tanquam de industria admota & impacta: flore Cnici, croceo, in oblongis capitulis fulgente: semine quoque Cnici. Quidam sunt, inquit Matthiæolus, qui plantam

ATRACTYLIS Marina,
Pycnocomon Pena.

ATRACTYLIS quorun-
dam, Maritima.



plantam cuius iconem hic expressam videtis, Atractylidē esse existimus. Quorū opinionem approbaret, si folia sanguineum succum funderent, & caules rectiores essent. Sit itaque ea de re aliorum iudicium. Atractylidis folia, coma & semen, auctore Dioscoride, trita cum pipere vinoque pota, contra scorpionum ictus

In c. 9. l. 4.

CARDUNCELLVS,
Pena.



profunt. Sunt qui dicant à scorpionibus percussos quamdiu teneant eam herbam, non sentite dolorem, deposita verò dolore affici. Plinius de eadem hæc tradit. Nec de Cnico, siue Atractylide verbosius dici par esset, Ægyptia herba, ni magnū cōtra venenata animalia præberet auxilium, item aduersus fungos. Constat à scorpione percussos quamdiu teneant herbam, non sentire cruciatum. Et Galenus scribit Atractylidem, quæ ex spinosarum est genere, facultatem habere desiccandi, & modicè digerendi.

Vires &
Temper.
L. II. c. p.

L. 6. simpl.

CARDUNCELLVS,
CAP. XIII.



N NARONENSIS agri montanis ad montis Lupi ima, meridiem versus, scribit Pena oriti prope pusillum amnem, aut torrétem, hanc Cardui speciem omnium minimam; eoque Carduncellum ab ipso nuncupatam. Plantulæ huic radix est implexa, altè humi depacta, à qua mox foliola plusscula, exilibus & altis diuisuris

In Aduers.

Forma.

dentata. Caulis vix dodrantalis, lævis, gracilis, humi demissus: caput maius quam pro foliorum proportionē, spinis horridis, foliosis cinctum florem claudit, purpureum, Atractylidis, cui etiam folia, ipsaq; vniuersa planta valde similis est, sed longè sim hor Aëti; Atractylidi purpureæ à flore vocatæ, fortè & eadem. Vfus incognitus, quia planta vix nota. Hæc Pena.

CARDVVS STELLATVS, Dalecham.

CAP. XV.

Nomen.

Forma.



RAETER Carduorum genera partim dicta, partim dicenda, & ad prisca nomenclaturas coniectura quam maxime fieri potuit verisimili reuocata, quedam alia hodie nobis innotuerunt, specie non minùs quàm illa consideranda & explicanda: inter quæ primus occurrit Carduus stellatus, aliis à Myacantho Theophrasti, quem Officinæ nomine Cardui stellati ostendunt. Hic noster folius est breuibus & paruis, nec valde laciniatis, nec spinis aut multis, aut rigidis armatis: caule cibitali, parum furculoso: capitulo toroso & crasso, candicante, spinis vndique muricato, stellæ figura radiatis, ex aculeis septem vnaquaq; spinarum congerie coalescente, longissimo eo qui medius extat, breuioribus aliis vtrinque tribus qui medium ambiunt, elegantissima harum spinarum structura flore puniceo.

CARDVVS CHONDRILLODES, Dalech.

CAP. XVI.

Nomen.

Forma.



CARDVVS hic Chondrillodes cognominatur, quòd folius Chondrillam secundam valde imitetur. Crescit in asperis & saxosis, radice dodrantali, lig-nosa, dura, candida, obliqua, tenuissimis villis capillata: foliis proximè radicem multis, laciniatis, & circumrosis Chondrillæ modo, breuib; aculeatis, in superiore caule paucis, qui pedalis est: in ramos ferè duos tantùm diuisus, teres, angulosus, in cuius cacumine capitulum nullum, sed eius vice corticosus vertex, vt in Borragine circinatus, velut in radios dispersitus: flos aureus, in pappo euanes-cens. Quod itaque Scolymo proprium esse vult Theophrastus, vt spinoso capitulo, quod acanum vocat, is careat, id & huic Carduo commune est præter aliorum Carduorum naturam.

CARDVVS



ST ET Carduus alius, Aræophyllos dictus, quod caulis, qui etiam angulosus est, raris foliis vestiatur. Hæc ex interuallis singula longiuscula, angusta, oleæ similia, paucis & mollibus spinulis aspera prodeunt in caule terete, pedem alto, in cuius summo quatuor, aut quinque conspicias capitula, subalbida, minimè aculeata, sed laminularum positu, ordinibus, & scansili inæqualitate leuissimè tantum attrectantium manus scabentia: flos purpureus est: semen paruum, oblongum, inter omnia Carduorum genera mollissima & longissima lanugine reconditum.

Nomen.

ONOPTYXOS. (CAP. XVIII.)



NO' ΠΥΞΟΣ inter spinosas stirpes à Theophrasto numeratur, & à Plinio. Buxum asininum vertit Gaza, quod sit Carduus asinis in cibo gratissimus, & summo pere expetitus: quanquam non desint, qui

Nomina
Lib. 6. hist.
cap. 4.
Lib. 12. cap. 6.

non per *u*, sed per *u*, *ὄνυξος* legendum esse putent, quod ad eum pascendum asinus perpetuò defigatur & hæreat: qua ratione & *Διψάκων* *ὄνυξος*, idèò nuncupant, quod ad eum asinus magna alacritate feratur cum senserit, quasi asini coeculum. Cum verò asinos ubiq; obseruauerimus ad quosdam Carduos libentius accurrere, iis libentius, & maiori cum voluptate vesci, ab iisdem magis allici, merito *ὄνυξος* nominauerimus, atque impi-

ONOPTYXVS, Dodon.



mis eum qui nascitur passim secus vias, in agrorum limitibus, scrobium marginibus, siluarum aditu, & ubique ferè in campis obuius: radice longa, nigra, valde fibrata: caule bipedali, rotundo, ramoso: foliis Acanthio vulgari similibus, sed læuibus, nec lanuginosis, minoribus, nigrioribus, aculeatis: capitulis in summo caule spinosis, rotundis, atrociter pungentibus: quæ cum dehiscunt, purpureum florem Iulio & Augusto promunt, coloris venustate insignem: semen reliquis Carduorum generibus par. Notior est iste Carduus asinorum pabulo, quàm viribus, Dodonæo Cardui siluestris nomine descriptus, & depictus. Est & *ὄνυξος* alter, non in agtis tantum, sed in pratis etiam frequens, radice nigra, pedali: caule res quatuorve pedes alto, vel nudo, vel paucis ramulis vestito, tereti: foliis superioris, minoribus, angustiorib; vndique hamatis: capitulis initio rotundis, deinde oblongis, parum aculeatis: flore purpureo. Tertius quoque *ὄνυξος* dicitur, qui in macris

Forma.



& sabulosis agris nascitur radice crassa, nigricante: caulibus multis, cubitalibus, rotundis, rigidissimo spinarum vallo armatis, hinc inde in ramos diuisis: foliis longis, nigricantibus, in ambitu profundè laciniatis, atrociter pungentibus: echinis in caulium vertice horridis, florem egregiè rubentem explicantibus, deinde semen longum, exile, Cnico proximum.

ONOPORDON.

ONOPORDON,
CAP. XIX.

Lil. 7. ca.

Forma.



PLINIVS Onopordon memorat his verbis. Onopordon si comederint asini, crepitus reddere dicuntur. Id Cardui genus Onopordon rectè dici posse Dalechampi puræ, quod Parisienses seruata Græci nominis lignificatione *Pet d'asne*, vulgò vocant, aiuntque, & affirmant asinos eo gustato subfultare, crebròque pedere. In locis cultis & pinguibus pecudum morfu non violatum, ad hominis proceritatem crescit, duos serè trèse caules proferens, angulosos, lanuginosos, medulla candida sarctos: radicem pedalem, crassam, nigram, fibris paucis capillaram, gustu amaram: folia, quæ minorum loco sunt, pedis longitudi

longitudinem æquant supra radicem, prope verticem breviora, in foliola diuisa, oblonga, oleæ similia, ad exortum & in cacumine spinosa, gustu subamaro & subaustero: capitula è foliorum sinu prodeunt suo pediculo surrecta, rotunda, antequam florescant albo tomento lanuginosa, spinulis multis armata, extra lanuginem sese exerentibus, tubris: flos ex rubro purpurascit: semen est oblongum, vt in aliis Carduis.

POLYACANTHOS, Theophrasti. CAP. XX.



POLYACANTHOS quoque in spinosis stirpibus Theophrastus & Plinius recensuerunt. Theodorus Aculeosam Latine dixit. Sic autem nominatus est hic Carduus à spinarum infinito serè numero, quod nullum sit Cardui genus pluribus, magisque confertis aculeis contextum & armatum. Gignitur serè in pratis & madidis locis, radice tenuissimis fibris capillata, & quam fibras multas potius esse dicas quam radicem: caule tres aut quatuor pedes alto, recto, non valde ramoso, vndique spinis rigente: foliis Onopyxi secundi, angustioribus, & magis aculeatis: capitulis etiam minoribus: flore purpureo: semine minuto & candido. Dodonæus Cardui siluestris tertium genus facit.

Nomina
Lib. 6. hist.
cap. 4.
Lib. 2. c. 6.

Locus.

Forma.

Lib. 4. c. 72.

MYACANTHOS. CAP. XXI.

PLINIVS Corrudâ siue siluestre Asparagum à Græcis Myacanthum, Dioscorides Asparagum petrum Myacanthâ, Galenus eundem Asparagum Myacanthum vocari scripsere. Myacantham autem quidam dici volunt, quod in carnariis suspensa carnes a murium iniuria tuetur, quia propter eius aculeos mures itrepere non audeant. Alij quod sub cauis radicum huc illuc vagantium mures occultantur, easque alius cibi penuria arrodunt. Alij quod mures occidat, vt & canes. Sed ab hac Myacantho plurimum discrepat ea cuius meminit Theophrastus, & quâ Gaza Spinâ murilem interpretatus est. Nam cum Corruda tota spina sit, spinasque pro foliis gerat, vt & Scorpius siue nepa, in iis numerat Myacanthon, quæ, vt Ononis, solus exarmatis innoxia, aculeis præter foliorum comam rigent. Quod cum in hac spinosa planta nos spectemus, quam Officinæ Calcitrapam, alij Stellariam, quidam Carduum stellatum, Cordus Polyacantham, Galli *Chaussetrappe*, Germani *Urtwallendistel* nuncupant, vt in Leucacantha dictum, eam Theophrasti Myacanthon esse non sine ratione arbitratus est Dalechampius. Profilit in pratis & locis incultis, serptæque villarum & rudeta obsidet: radice longa, foris nigricante, intus candida, carnosa, subdulci, foliis hirsutis, profundè laciniatis: caule bipedali, ramoso: capitulis multis, quàm in aliis Carduis minoribus, stellæ modo in complures aculeos siue radiorum cuspides fissis, principiò ex viridi rubentibus, postea albicantibus: ea cum patefiunt, purpureus flos emicat, deinde semen paruum, nigrum, rotundum, carduelibus expetitur. Dodonæus Cardui stellati nomine proposuit, qui semen eius cum vino tritum porumque vrinam prouocare, & lapides exterere tradit. Adiciunt alij radicem eiusdem quotidie manè sumptam fistulis, in quacumque corporis patte sint, prodesse, & arcere pestis contagia. Huius generis est planta, quam

Lib. 19. c. 8.
Lib. 2. c. 6.

Lib. 6. sim.

Lib. 6. hist.
cap. 4.

Locus.

Forma.

Lib. 4. c. 60
Vires.

laceæ nomine depinxit Clusius: nam radiatis & aculeatis capitibus, foliis, floribus & semine cum superiore convenit: sed omnia longè maiora hæc habet: capitula quoque Cnicum silvestrem superant. Semen item & flos non dissimilia, quo marcescere è medio centro veluti gummi quoddam flori permixtum protuberat, ver-

MYACANTHOS,

Thcophra.



IACEA LVTEA,

Clusij.



miculorum modo conuolutum, aut veluti Officinarum Tragacantha, rufi coloris: vnde Tragacanthi nominis occasio Salmanticensibus, apud quos in vinetis, agrorūque marginibus frequens oritur. Est & huic cum Leucachanta nostra, seu Spina folstitiali supra descripta, magna affinitas, vt eadem videri possit.

LEUCOGRAPHIS.

CAP. XXII.

Lib. 17. c. 11.

LEUCOGRAPHIDOS meminit Plinius his verbis. Leucographis qualis esset, scriptum non reperi. quod eo magis miror, quoniam vili proditur sanguinem excreantibus, tribus obolis cum croco: item celiacis trita ex aqua & apposita: profluuiis foeminarum, oculorum quoque medicamentis, & ex plendis viceribus, quæ sunt in teneris partibus corporis. Hanc si non facies, quam nec descripsit, nec ab aliis descriptam reperit Plinius, saltem vires Dalechampio occasionem dedere coniiciendi esse Carduum Maris vulgò dictum, Germanicè *Mariendistel*, & *Frauwendistel*, Gallicè *Chardon nostre dame*.

Nomina

Lib. 4. c. 67.

Cap. 16.

histo.

Locus.

Forma.

Dicitur & Carduus lacteus ab albis maculis, vnde & à quibusdam Galaxias. Dodonæus Spinam albam, & Arabum *Bedeguar* esse credit. Fuchsius Spinam albam hortensem. Hunc Carduum prope olera in hortis, & in neglectis locis, præsertim si pinguis & lætus ager fuerit, sponte nasci videmus, siticulosum Diplaci modo: nam inter caulem & foliorum sursum tendentium concauos sinus aqua colligitur. Radice est crassa, longa, candida, facultate sicca & astringente: caule procerō, terete, surculoso, spinoso, digiti crassitudine: foliis latis, amplis, albicantibus, notis maculisque lacteis distinctis & aspersis, multis & acutissimis spinulis horridis, in ambitu pungentibus

LEUCOGRAPHIS Plinij,

Carduus Maris.



pungentibus : capitulis in summo caulium ramorumque globosis, squamis muricatis rigentibus, aspertrimis, in orbem rotæ instar spiculis prælongis munitis : flore purpureo : semine Cnico simili, longo, laxi, gustu dulci, nucis iuglandis ferè sapore, nigriore, lanugine tenera & candida obuoluto. Floret Iunio & Iulio mensibus, hiemæque moritur. Ea præstat quæ ex Plinio suprà recitauimus. Præterea aqua è foliis destillata caliditati hepatis, & animi deliquiis in linteolis extrinsecus admota opitulatur. Læteris morbo succurrit, pestilenti veneno, & multis aliis partium internarum morbis : efficaciusque id præstat addita seminis drachma dimidia.

Tempus.

Vires.

CROCODILIVM. CAP. XXIII.



ΚΡΟΚΟΔΕΙΤΑΙΟΝ Græcè, si- Nomina
militer Crocodilum Latine, cuius
nomenclaturæ ratio à nullodum,
quod sciam, explicata est, neq; de-
scriptio tam aperta, vt à tot aculeatis plantis fa-

cile sit genuinum Crocodiliū distinguere & internoscere: quæ descriptio à Dioscoride tradita est his verbis. Crocodilum simile est nigro Chamæleoni: nascitur in locis siluosis, radicem habens longam, leuem, aliquantum latam, odore acri veluti nasturtium. Radix seruata in aqua & pota sanguinem copiosum per nares pellit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen vrinam citiū vim habet, & rotundum, & duplum veluti scutum. Quæ Plinius sic videtur reddidisse. Crocodilum Chamæleontis herbæ nigrae figuram habet : radice longa, æqualiter crassa, odoris asperi. Nascitur in sabuletis. Pota sanguinem per nares pellit copiosum crassumq; atque ita lienem cōsumere dicitur. In quibus Plinius legisse videtur *in τοῖς ἀμυδαῖσι*, id est, in sabuletis, pro *in τοῖς ὑδρομαλίσι*, id est, siluosis, vt habet Dioscorides: deinde pro *ἰσοπλατέην*, aliquantum latam, *ἰσοπλάτην*, siue *ἰσχυρὰν*, id est, æqualiter latam, siue æqualiter crassam, Oribasius subcrassam legit. Quem verò *ἰσοπλάτην* Dioscorides, Plinius suo more odorem asperum dixit. Oribasius radicem acrem, odorēque nasturtio similem. Quod verò ad semen attinet rotundum, duplicis scuti figura, id à Plinio omisum est, & ab Oribasio, qui integras historias ex Dioscoride exscribere consuevit. Præterea id à Dioscoride præter morē additum fuisse videtur, absoluta scilicet historia & viribus explicatis, atque falso huic plantæ attributum, cum *ἀνὰ γαστρίν* ferè omnia semē edant Cnico simile. Quare adiectitia hæc viri docti censent, & ex Tordylii historia, cuius semini figuram hanc Dioscorides assignat, huc à sciolo quodam nominum vicinitate decepto ascita fuisse. His adde, quod in Crateuz fragmentis defunt verba illa, *πρὸς τὴν γαστρίν, καὶ διὰ τὴν ἀνὰ γαστρίν*, id est, rotundum, & duplum vt scutum. Quantum verò ex satis obscura delineatione colligi potest, cum præcipua Crocodilij nota ducatur ex similitudine Chamæleonis nigri, & altera Carlina, quæ in caulem attollitur, nigro Chamæleoni tam affinis sit, vt Matthioli, & plerique alij Chamæleonem nigrum esse contenderint. Carlina illam Crocodiliū esse non sine ratione Dalechampius indicauit. Etenim in siluosis sabulosiq; provenit : foliorum specie, & subrubro colore nigrum Chamæleonem

Lib. 3. c. 10.
Form. 1.

Lib. 27. c. 8.

Lib. 3. c. 14.

maleonem imitatur radice est longa, leui, non solida, sed exesa, non nihil lara, odoris vehementis & acris, ad nasturtium accedentis: semen Cnico simile, cinereum. quod enim de semine Crocodilij legitur in Dioscoride, falsum esse ac supposititium diximus. Sanguinem quidem per nares potu eliciendi vim nullus in Carlinæ agnouit, quæ si Crocodilio inest, tanquam insignis & eximia magnificienda est, verum optanda potius quam asserenda videtur. Nam in Dioscoride scribitur, ἡ ῥίζη ζοδιέειν ἐν τῷ στόματι καὶ πολλὰν πνοὴν προκαλεῖται: pro προκαλεῖται legunt quidam προκαλεῖται, id est, si per nares attrahatur, quemadmodum de Ocimo scripsit Dioscorides, πολλὰν πνοὴν προκαλεῖται ἐν τῷ στόματι διὰ τὸ σφοδρὸν εἶναι, id est, sternutationes multas excitat si per nares olfactu attrahatur. Alias Crocodilio vires assignarunt Galenus, & eu n secum Paulus & Aëlius, quas omnes de Tordyllo tradidit Dioscorides, vt hoc magis argumento consulam fuisse vtriusque historiam. Maranthæ & Anguillaræ Chamæleon, inquit Pena, videtur aut verum esse Crocodilium, aut certe genuinum opinionē sustinere posse, vsque dum doctis magis accurata descriptio, aut planta Crocodilio aprior occurreret. Adeo enim ad descriptionem accedit, vt illis nigrum esse Chamæleonem persuaferit. Hunc capite de Chamæleone pinximus. Aliud Cardui

CROCODILIVM, Carlinæ
caulem habens.



CROCODILIVM Monspelien-
sium, Dalech.



genus Crocodilium Monspelienſes vocant, in aridis & apricis proſiliens, radice palmum longa, nigricante, guſtu amara: caulibus ſerè duobus aut tribus, cubitalibus, anguloſis, lanuginoſis, ramoſis: foliis auerſa parte candida lanugine pubeſcentibus, aduerſa in viridi pallidis, multis, aculeatis, Carlinæ ſimilibus: capitulis multis, pilæ modo rotundis & globofiſ, pungentibus, aſpectu cinereis, flore copioſo, purpureo Hyacinthi modo, ſubamaro, ſemine longo, nigricante. Quidã Silybum eſſe volunt, quidam Galedragon. Lobellius Crocodilium Fuchſij & Cordi pinxit, plantam quam Dodonæus Spinam peregrinam vocat, Tragus perperam Chamæleonem verum, inquit Lobellius, cuius eſſigiem ſuprà poſuimus.

TRAGVM

TRAGVM, Matthioli. CAP. XXIII.



TRAGVM & Scorpionum de multis & diuersis plantis dici iam monuimus. Aculeatam verò stirpem hic depictà Matthiolus legitimum Dioscoridis Tragum, siue Scorpionum, siue Traganon esse credit: item Plinij Tragum, & eiusdem atq; Theophrasti Scorpionum. At alio in loco Tragum alium genuinum Dioscoridis ostendimus, qui à Scorpio Theophrasti, quem Nepam vertit Gaza, longè alius sit: præterea Matthiolum citatis duobus Plinij locis de Trago & Scorpio, Tragum Dioscoridis cum Scorpio Theophrasti perperam confudisse. Quod verò Tragus Matthioli à Trago Dioscoridis plurimum dissideat, de scriptio ipsa perspicue declarat. Tragus, inquit Dioscorid. nascitur maxime iuxta mare: frutex paruus, per tertiam, oblongus, non magnus, palmi altitudine, aut maior: folia non habet, verum ramis adhaerent velut acini parui, rufi, magnitudine tritici, cacumine acuti, multi, gustu valde adstringentes. At hic Tragus Matthioli, succulenta est planta, non frutex, vt dilucidè demonstrat Pena. nullo acino habet rufos, tritico pates, & superne acutos, numerosos, magnopere adstringentes: folijs nõ caret, carnosa enim habet, spinis horrida, astrictiorem penitus nullam. Quare fuetit ille illegitimus Matthioli Tragus, eodem Pena auctore, Crithmi falicornij, seu kalicogener, propius ad eam speciem spinosam accedens, quam Pastinacà marinà, aut Secacul, aut alterum Crithmum faciunt, pedem aut cubitum altam, intortis, crassis, densis ramulis diuisam, & adeò horridam, armatamq; folijs pungentibus, Aizoi colore & figura, carnosius, crassioribus, numerosis in imo, in summo muricatis, cuiusmodi in Tribulo terrestri & aquatico, vt impune effringere surculum nequeas. Hicce ad imam basim internorem flosculi herbacei, rotundi, ex quibus semen exit compressum. Radix cespitem summo exilis, lignosa, kali & herbaceo prorsus gustu, succoque multo glutinoso prægnans, minimè adstringente, salso, & nullius alioqui excellentis facultatis. Hæc Pena. Lobellius Tragum hunc Matthioli paulò aliter expressit quàm Matthiolus. Illius picturam posuimus in libro de maritimis.

Lib. de mat.
tic. cap. 22.

Lib. 4. c. 46

In Aduers.



TRAGACANTHA. CAP. XXV.



ΠΑΓΑΚΑΝΘΑ Græcè, Latine similiter Tragacantha, & Hirci spina, Arabicè Chirra, Itica, Chabeth, Gallicè Espine de boue, in Galloprovincia, potissimum circum Massiliam, Barbernard, & Ramboue, id est, Batha vulpina, & Surculus hircinus. Gummi ex eamans πρηνός, quoque Græcè nominatur, Latine Tragacanthæ lacryma, in Officinis gummi dragaganti. Tragacanthæ spinarum barbule nomen dederunt. Radix est lata, & lignosa, inquit Dioscorides, supra terram etiam apparens, à qua surculi humiles, robusti, plurimū sese diffundentes, in quibus foliola sunt multa, tenuia, quæ spinas albas, robustas, rectas inter se occultant. Eius iconem sic expressit Matthiolus. Est etiam

Nomen

Forma
Lib. 4. c. 46

Lib. g. c. 11.

Lib. g. hist.
cap. 1.

etiam Tragacantha la-
cryma, quæ vulnerata
radice concreuit. Pre-
stat pellucens, lævis,
gracilis, pura, & sub-
dulcis. Plinius. Eadem
& Tragacanthē Creta
gignit. spinæ albæ
radice, multum prela-
ram apud Medos, aut
in Achaia nascēte de
qua & Theophrastus
ait, ἡ ἀρχαία ὃν τρα-

γάκανθα πολλὰ, καὶ ὧδε χεῖρον, ὡς οἰοῖται τῆς κρητικῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ ὕψος χαλλίον. Hæc est
Tragacantha in Arcadia copiosa, & nihilo deterior, ut arbitrantur, Cretica, sed &
aspectu pulchrior. Sed hæc non solum in Media & Creta, sed etiam in Gallia pro-
vincia plurima fructuat, prope pomeria Massilia, ut asserit Pena, in marinis colli-
bus ad Austrum spectantibus aliisque finitimis locis passim multa. Frutex humilis,
densus, totus candideat, vno cespite copia multa aggestus, radice alba, longa, lignola,
digi ti crassitie, prolixis & flexilibus fibris subter humum meruaculis, cum maxi-
me procerus, cubitalis, ex quo spicula foliaria vtrinque quasi pinnis oriuntur, quæ
ima & vetustiora nihil aliud quam veprem ostendant. Superiora pallentia por-
tuo sunt. Is caulis ab vna radice multiplex, solidus, lignosus, cædibus, quem vestitus
spinæ foliatæ spinis rigidissimis. In summo inter spinosa folia & spinas stipatur ma-
ri flosculi inuicem collecti, genistellæ similes, sed albi. Siliqua etiam numerosa, recta,
eiceris aut genistellæ spinosæ modo, sed multo minor & cædida, in qua semina ex-
ilia, albicantia includuntur, sinapi magnitudine, angulosa. Hæc Pena. Et similia

TRAGACANTHA *Altera,*
sive Poterium, Clusij.



est planta, inquit Clusius, fructuosa admodum,
multos habens pedales ramulos flexibiles, late
circumquaque sese diffundentes, candicantes,
& dum adhuc tenelli sunt lanuginosos, multos
longis candicantibus spinis horrentes: foliorum
plurimarum simul iunctarum alarum lenticularum aut Traga-
cantharum proximarum, exiguarum, candidarum, lanuginosarum
primo vere per interualla exeunt, sapore dulci
foliis hieme deciditibus, nervi medij, quibus
folia inherebant, in spinas rigidas & acutas eua-
dunt, ut eo tempore rora planta sine foliis con-
spiciatur, contra quam in Tragacantha, quæ hie
me etiam folia viridia retinet: radix lenta, longa, in
multos ramos diuisa, nigro cortice obducta, ma-
terie intus cædida fungosæ, & dulci, cor ipsum
gummosum quiddam & subdulce refert. Neq. flo-
rentem, neq. fructum ferentem vidit ille, sed sub
ea plurimos folliculos bombycinis similes, aut
Hypecoi Matthioli ferè inuenit, inanes, quos ab
hæc planta exedisse, & florem ex similibus pro-
dire incolæ referebant, album, non magnum.
De semine nihil certi intellexit. Nascitur pluri-
ma circa Guadix & la Venda el peral, in colli-
bus arido

bus arido & inutuli solo. Cùm adeò sit Tragacanthæ similis, facili sibi persuaserit Clusius esse Poterium legitimum Dioscoridis. Hæc Clusius. Tragacantha, ut tradit Dioscorides, vim habet meatus obducendi gummi similem. Vfus eius est ad medicamenta ocularia, ad tusses, ad arteriæ asperitates, vocem interceptam, & destillationes in eclegmate cum melle. Subdita quoque linguæ liquefcit, sed & macerata in passo bibitur drachmæ pondere contra renum dolorem, & vesicæ rosiones admixto cornu ceruino vsto, & loto, aur modico alumine scisso. Galenus breuiter de Tragacantha scribit, similem gummi vim habere emplasticeam quandam, quæ acrimoniam obtundat, & similiter desiccare. Tragacanthæ lacryma, inquit Matthiolus, collyriis addita non solum humorum acrimoniam in oculos defluentium retundit, sed oculos quoque roborat, & magis adstringit quàm sarcocolla. Præterea lacte macerata & illita, oculorum vngues, palpebrarum pustulas, pruritus, & scabiem sanat. Valet ad pulmonum, pectoris, asperæ arteriæ morbos, & medetur eorum ulceribus, ad defluxiones omnes in fauces, guttur, pectus permeantes, & tussim excitantes. Datur vtiliter ulceratis renibus: auxiliatur quoque dysentericis tosta, & ex cydoniorum vino pota, tum clystinate infusa. Denique ubi læuigare, obtundere, ac reprimere opus est, præstantissimum fuerit medicamentum.

Vires.
Lib. 3. cap. 10.

Lib. 8. sim.

In cap. 11.
lib. 4.

DRYPIS. CAP. XXVI.

ΠΥΝΙΣ, Cardui species, à veteribus dicta fuit ἀπὸ τοῦ δριπνέειν, id est, **Nomina** ἀναπνέειν, ὑπνέειν, ἐπνέειν, à lancinādo, pungendo, vellicando, quòd aculeis suis attrèctantes & colligere volentes vulneret. Huius semel tantum, quod scit, solus Theophrastus meminit, scribens Acornam, Drypida, Acanum spinosis esse foliis, nihilque præterea. Quare cùm huius historia à nullo veterum tradita sit, Carduum istum in sativis & segetibus frequenter, diris aculeis rigentem, Drypida quidam nominant. In arvis inter fruges quasi earum vitium, & avenam præci-

Lib. 1. hist.
cap. 16.

DRYPIS.



puè, Carduus hic nascitur, interdum viri proceritate, interdum humilior, alba radice, & crassa: foliis caules ambientibus muricatis, dissectis & incisus: capitulis ut in Scolymo echinatis. Flore aliàs purpureo, aliàs candicante, aliàs puniceo: semine oblongo, lævi, paruo, rufescente. Agriculis & messoribus plerumque impedimento est. Nullus huius vſus in medicina ab herbariis traditus est, quanquam ob calidam siccāque huius naturam ad secundum vsque gradum varias utilitates quisque meditari & excogitare possit. Hoc Carduo tenero asini ut Onopyxo, libentissimè vescuntur priusquàm obduerit, & in caulem assurrexerit. furculos rustici effodiunt, & iumentis suisbſque pro cibo & pabulo obiciunt. Anguillarè Drypis, à superiore diuersa, in Marſis haud procul à mari nascitur, radicibus sub terra huc illuc serpentibus, graminis instar, exilibus: tenuibus ramulis, genicularis, cubitalibus: foliis aculeatis, Iunipero similibus: vmbella in summis caulibus: flore candido: semine, priusquàm cortex adimatur, orizæ

Forma.

DRYPIS, Theophr.

DRYPIS, Loniceri.

Angustifolia.



simili cum detractus est, Sertula campanæ, coloris valde lutei. Quibusdā Eryngium matrona Drypis Theophrasti videtur esse, alius, quoniam opinio magis arridet, Drypis est Acanos Plinii lib. 22. cap. 9. brevis herba, spinosa, lata, latioribusque spinis.

Guilandino Tragus Matthioli. Est & alia Drypis, seu Cardui sylvestris species, quam Gaza Aculeosam, Ruellius Agriachantam, Lonicerus Carduum sylvestrem, seu Scolymum his verbis: Præterea sylvestris est quidam Cardui species in agris passim impedimentum, cuius meminit Vergilius, Carduus & spinis surgit Paliurus acutus: Latine Scolymus, seu Carduus sylvestris, poterit appellari. Nasceitur in arvis maximè avenaceis bicubitali altitudine, sæpe maior, aut etiā minor: foliis aculeatis, incis, capitulis aculeatis: flore in quibusdam purpureo, in quibusdam albo, in quibusdam puniceo: quandiu tenera asinis gratissima, bobus vero non ingrata. calidum est in secundo completo aut tertio incipiente ordine, sicum verò in secundo. recens Asparagi modo in oleribus coquitur. Radices ex sale & pipere in secundis mensis hyeme eduntur: in cibis decocta urinam cit copiosam feridamque educit. Extrinsecus radix illita graueolentiam alarum totiusque corporis emendat.

CHALCEIOS. CAP. XXVII.

Nomina



ΧΑΛΚΕΙΟΣ Theophrasto, & Chalceios Plinio seruatō nomine Græco, Gaza Aeraria Latine dicta, inter spinosas & acanaceas stirpes ab eisdem recensetur. Eius historia quamuis apud Theophrastum Pliniumve nusquam extet, ac ne nomenclaturæ quidem ratio vlla ab illis tradita sit, si coniectura locus est, eam spinam sic vocatam fuisse arbitrantur quidam quod eius foliis vasa ænea detergerentur, vel quod ærei coloris sit, nempe virentis obscurius, intersperso flauescens nitoris paululo, splendentis. Posterius etymum magis placet, quod peculiare quiddam assignet, cum prius spinosis omnibus propter foliorum asperitatem congruere possit, nisi fortè egregia quædam detergendi facultas huic insit, ut Struthio. Herbam certè speciosam, raram, & elegantem, cuius figuram hic apposuimus, Chalceion esse suspicantur quidam quod

CHALCEIOS.



RVTHRVM, Theophrasti.



& alijs cubitum alto : folijs semper proportionē exiguis , & Spinæ albx modo profundè incisis. Echinus illi cæruleus, eximie purpurascens, orbiculatus, spectatu iocundus, & magnitudine quanta sphaerula lusoria. Semen & eius glumæ similia Spinæ albæ: nullas tamē sursum rectas procul aculeatas vaginulas porrigit, tamen si sunt acerosæ intus & lanuginosæ, ut in Spina alba. Ruthrum esse Theophrasti censet Anguillara, qui tamen proximæ, ut videtur, descriptionis immemor, ean-

quod tamen peritis herbariis disquirendū magis, quàm asserendum proponunt. Gignitur in macris & aridis locis: radicibus multis, foris nigricantibus: caule tereti, subarbo, quatuor vel quinque pedes alto: folijs magnis, latis, profundius incisis, per ambitum pungentibus, parte superna virentibus, sed obscuro, fusco ac tristi colore, qualis in aëre conspicitur, unde fortasse est illi nomen inditum: interna verò cinereis & villosis: capitulis rotundis, echinatis: flore in cæruleo candicante, qui ex capitulis undique promittitur, & lunio mense Iuliove prodit. Folia inter digitos trita odorem validū ac iniucundum vibrant, acriæque gustatu sunt. Hanc igitur plantam Chalceion vocant, quousque certiora de eius natura & specie herbarij compererint. Observandum apud Plinium in catalogo spinosarum plantarum pro Chalceio legi Chalceon, quemadmodum pro Ixine Helxinè, Chalacetumq; herbari ab eodem alibi memoratam, plurimum dissidere à Chalceio spinoso Theophrasti. Fuchsius olim Chamæleonem nigrum, sed postea rectius sentiens Spinam peregrinam nuncupavit. Dodonæus in stirpium historia Spinæ peregrinæ nomine pinxit & descripsit: in lib. purgantium Sphaerocephalum Cardum primum fecit, quam hic pro Chalceio exhibemus. Pena Ruthrum sive Ruthrum Theophrasti esse opinatur, quæ Spina peregrina fuit Dodonæo, Echinopus seu Cardus Echinatus Gesnero, Sphaerocephalus Cordo. Germanis *Urvelschedelstet*, Belgis *Rooschedelstet*.

Theophrastus vno tantum loco Ruthri seu Ruthri meminit, quo scilicet stirpiū aculeatarum differentias ex caulium ramorumque numero ac situ inuestigat. sed hic *ῥυθρος* seu *ῥυθρον* pro *ῥυθρον* mendose legi docuimus capite de Eryngio. Eius tamen iconē, quam Ruthrum vocat, ex Pena hic apposuimus, & descriptionē. Dupli-

Locu.
Forma.

Lib. 1. c. 16.

Lib. 16. c. 7.

Cap. 33. h. l.

Lib. 4. c. 44

Lib. 6. h. l.
cap. 7.

In Aduers.

dem Spinæ albae notis accommodat, iisdem ferè verbis. Altera, quam Crocodilium Fuchsius putauit, prorsus genere eadem huic est, sed magnitudine multò maior. In silua tamen Valena, quæ Gangem oppidum itur, se collegisse ait cæruleam, & hanc excaulem, aliam caule palmum alto præditam, quæ alibi ad duos, ternos, & quaternos cubitos assurgit. Echinus candidus est, non cæruleus, & cum maximus est & rotundus magnitudinem mediocris mali Arantij assequitur: semine alterius, sed multo maiore. Cauli imò secundum longitudinem striato adnascuntur permagna folia, Acanthi similia & spinosa. Belgici horti & Britannici

CARDVVS Sphærocephalus
acutus, Dodones.



hanc spectaculo alunt, vbi luculenta magnitudine Spina peregrina dicitur. Dodonæus descripsit Carduos alios Sphærocephalos. Secundus Sphærocephalus acutus folia superiore minora habet, ac spinosiora: capitula quoque globata, sed è quibus longè quædam, & duræ eminent spinæ. Tertius primò forma figuræque similis, sed longè minor, & eius stoculi ad cæruleum magis accedunt colorè. Quartus minimus est, foliisque acutissimis ac spinosissimis, capitulòque exiguo, cuius stoculi ut primi candicant. Huc referri alius potest, qui tamen capitulo est minùs globato, compressiore videlicet, ac superius latiore, è quo stoculi cærulei. Tenuis huic caulis exili lanugine candicat: folia oblonga, vtrinque similiter laciniata diuisa, ad singulos angulos spinis munita. Hunc plerique esse volunt, quem Matthioli pro Spina alba proponit. Anguillara prorsus diuersam ab his Chalceion memorat his ferè verbis. Ad Chalcei naturam accedere videtur ea, quam in Peloponneso & Zacyntho etiamnum appellant Chalcoma. Lignosa & humilis est planta, rubens, aculeata, tenuibus spinis, folio lentis, minore, in ramulis ordine digesto sicuti in Lente, qui fracti lacteum succum fundunt Tithymali modo. Quidam Hippophæstion Dioscoridis esse putant.

TETRALIX, CAP. XXVIII.

Nomina

Lib. 6. hist. cap. 3.

Lib. 2. cap. 54. in auct. est.

Lib. 1. cap. 10. Lib. 3. cap. 9.

Lib. 1. cap. 16. Lib. 3. cap. 9.

Lib. 6. hist. cap. 3.

TETΡΑΛΙΞ à Theophrasto cum reliquis aculeatis plantis Acarna, Leucacantha, Cnico, Chalceio, Polyacantho, Atractylide, Onopoxo, Ixine, Chamaeleonte numeratur: item à Plinio eum imitato, qui tamen alibi Ericam Atheniensibus Tetralicem appellari, in Eubœa Sisaron auctor est. Ex quibus colligere licet Tetralicem spinosam ab Ericæ diuersam esse: quia Ericam spinis armatam esse nullus vnquam herbariorum prodidit, id quod etiam perspicuum est ex Dioscoride & Plinio de Ericæ tractatibus. Deinde Tetralicem Ericæ post primos Autumnii imbres florere, nempe ad Idus Septembres, & Calendas Octobres idem Plinius testatur. Alio verò in loco Tetralicem & Ixinem florere tradit æstate: quanquam Theophrastus, ex quo hæc Plinius mutuatus est, Ixinem & Tetralicem non scribit florere æstate, sed germinare.

TETRALIX *Spinosa, Tragi.*

ACORNA, Theophr.



germinare. Caue igitur, Tetralicem hanc cum illa confundas. Spinofam Tetralicem putant esse quidam, quam Tragus pro vero Chamæleonte nigro pictam ostendit, post Carduum vulgarem, & Chamæleonem album. Ea radice crassa, longaque nititur, & fibrata: caule alto, anguloso: foliis latis, amplis, profundius incisus, vt ferè sinuosa videantur: flore pallidulo, in mitioribus globulis quibusdam, & læuoribus emicante, non cæterorum Carduorum modo horridius echinatis: semine oblongo & capillato.

Lib. 3. c. 108

Forma.

ACORNA. CAP. XXIX.



ΑΚΟΡΝΑ & ἀκρνα, (vtrouque **Nomina** enim modo legitur in nostris Theophrasti exemplaribus) inter spinosas & acanaceas ab eodem Theophrasto, & Plinio reponitur. Cuius etsi nulla, quod sciam, apud hos auctores extet amplior descriptio, præter hanc Theophrasti, Lib. 6. hist. cap. 4. ἡ δὲ ἀκρνα προσμεινέται, ὡς ἀπλῶς εἶπέν, καὶ τὴν προσοφάν τῷ κνίκῳ τὴν ἡμῶν χρῶμα δὲ ἐκκεῖνον ἔχει καὶ λεπτόν, vbi deest vox χυλόν, ex Plinio repouenda, id est, Acorna, vt paucis dicam, Cnico miti figura similis est, colore sublauro, & succo pingui: apud Plinium, Acorna colore tantum Lib. 16. c. 6. rufo distinguitur, & pinguiore succo: tamen Acornam esse hanc spinosam herbam suspicantur quidam, Fuchsius Atractylidem mitiorem, Dodonæus Carlinam siluestrem, Lobellius & Pena Sequanorum Cirsium luteum vocant. In atidis gignitur: radice alba, breui, non admodum crassa, fibrata: caulibus interdum multis, sæpius vnicò, rubentibus, lanugine teclis: foliis circa radicem multis, per terram in orbem statis, exarescentibus cum caules assurgunt per eosdè inæqualiter sparsis, spinosis, Atractylidi similibus, angustioribus, infernè candicantibus: flore in capitulis valde pallido, initio compresso, & cum dilatatur in arida flamina sese explicante, Carlinæ, aut Chamæleonis modo: semine Cnici, strigoso & tenui, capitulis aulis nullis cruor emanat, vt in Atractylide. Huic similem Clusius Carlinæ siluestris minoris nomine depinxit: seseque nusquam hanc alibi obseruasse ait, quàm in aridis petrosisque, & desertis circa Salmanticam locis, florentem Augusto mense. Ad Acornæ Theophrasti genus refectri posse, siue ad Eryngium, quod Aëtius de Archigenis sententia describit, foliis Atractylidis, durioribus, & ex candido pallidioribus, multis ramis ab

Forma.

ACARNA, *Carlina sume-*
stru minor, *Clusij*.



vna radice cubitalibus, floribus Buphrthalmi simili-
libus, sed oculi formam stamina in medio nascentia
perturbant. Huc referenda spinosa dux plantæ,
Lobellio depictæ. Prior est Acarna Theophrasti An-
guillatæ, flauentibus aculeis horrida: virentibus si-
nuatis foliis, aucta parte tomento incanis, vti tota
planta: plures fundit sesquicubitales caules: flores
lureolos: semen Cnici, sed minus in squamoso &
spinis horrido capitulo. Hanc Valerandus Doureus
Iustinopoli Illyrij rediens Venetias detulit, sicut &
sequentem eiusdem Valetandi Acarnam, foliis lon-
gioribus, spinis horridis caulem pinnatim secundum
longitudinem ambientibus, qualiq; pennis telo af-
fixis. Incana lanuginem ora pubet. Caulis dodranta-
lis, interdum cubitalis: flores Cardui benedicti, con-
fertim stipari minores, & Senecionis maiores: se-
men Cnici minus. Huc etiam Clusij planta noua, &
sanè perelegans adducenda, quæ dodrantalisis est, in
orbem per terram diffusa, spinis multis virentibus
sive aculeis horrida: flores Pili ex caruleo papu-
rascentes, minores, caliculis concluduntur hi-
pidis & villosis & ferè incanis, bini aut terni semper con-
iuncti: foliola interdum, sed rarò, producit dum

floret, eaque perpauca, lenticulæ similia, quæ cum breui decidant, tota planta
maxima ex parte sine foliis spectatur, & multiplici spinarum vallo erinaceum

ACARNA Theophrasti,
Anguillara, *Lo bel*.



ACARNA Valerandi
altera.



planè

ERINACEA, Classif.



planè refert : radix lignofa eſt, & magna pro
plantæ proportionē. Naſcitur in regno Va-
lentino, copioſe autem circa Siereagus, ſep-
timo ab vrbe Valentia militari, itinere Madritia-
no, aſperis locis, & ſecus vias. Florēt Aprili.
Incolæ *Erys* vocant, quoniam Erinaceum ani-
mal terreſtre, aut marinum aculeorum & ſpina-
rum vallo proſuſus æmulatur : qua de cauſa Eri-
naceæ nomen ei Cluſius dedit.

HIPPOPHÆS, HIPPOPHÆ-
STVM. CAP. XXX.



ΠΠΟΦΑΕΣ Graecis, & κρείον *Nomina*
& Galeno recte, Latinis quoq; in Gloss.
Hippophæis. Theophrastus ἵππο-
φαιος habet, mendose opinor, pro
καρπ., vel ἵπποφαιος. vt statim post eodē
καρπ.

in loco legitur, Lappaginē cōueitit Gaza. Eratio in loco Lab. hist.
ca. 16. ἐκ τοῦ τερμύλλου, ἔξ ἐς τὸ
κατοῖσιν, ἀπὸ τοῦ περὶ Τερμύλων, ait, id est, ex Tirhymalo optimum Hippophaē
conici apud Tegeam: quod Hippophai spinosae plantae conuenire non potest.

Quare hic non Hippophæes, vt Gaza legit & conuertit, legendum iudicari Cor-
narius, fed Hippomanes, vt in Græcis exemplaribus exaratum est: cæterum hic le-
gunt attentiores, τῶν ἵππων, καὶ τὸ ἐκ ποταμοῦ, vt nulla sit occasio tam anxie hunc lo-

cum examinandi. Plinius vno loco Hippophaë vocat, in alio Hippophyes, nescio an rectè, pro Hippophaë. *βασκίαν* Latini etiam Hippophaxillum dicunt, *Liban. cap. 11. Lib. 22.*

quod Plinius alterū Hippophaë appellasse videtur: cū enim de Hippophaë priore dixisset, statim subiicit quæ etiam à Dioscoride post Hippophaë de Hippophaëto feruntur. In vulgatis tamen exemplaribus corrupte legimus Hippope pro Hippophyes, vel Hippophaë. Est & altera (sub spina) Hippophaëto, in-

quit, &c. *Aliseriam* in locis idem *Hippophæstum* vocat. Quidam verò in *Spina* *fullonia Hippophæston*, &c. Et, *Hippophæstum* nascitur in *Spinis*, &c. Idem *Ph*

nus harum vocum etymum explicat, à iuvandis veterinariis has plantas nuncupatas fuisse indicans: *phos* enim vox non solum pro lumine, sed etiam pro auxilio & salute signatur. Hæc autem Græciæ plantæ Diogenides Codræo colligit.

lio & salute accipitur. Hæc autem spinosæ plantæ Dioscorides sic descripsit. Hippophaës, quo vestes poliunt, nascitur in maritimis & arenosis locis. Frutex est furculosus, densus, undiquaque amplius: folia habens longa, ad oleæ folia acce-

LI. CAN. 16.
& 17.
Forma.

urculolus, densus, vixquaquæ amplius: folia habens longa, ad oleæ folia accedencia, sed angustiora & tenuiora: & inter has spinas siccas, subalbicantes, angulosas, à sefe distantes: flores corymbis hederæ similes, & racematim inter se cohx-

ab, acie distinctas: non corimbis necuq; immites, & faciemini inter se con-
rentes, sed minores & molles, & cum candore ex parte rubescentes: radix crassa,
& mollis, succi plena, gustu amara, ex qua succus colligitur velut ex Thapsia. Hip-

pophæstum verò, quod & Hippophaës vocant, nascitur in iisdem locis, in quibus Hippophaës, estque Spinæ fulloniæ species. Est autem humilis herba, foliola

folium parua habens, spinosa, & capitula inania: neque caulem, neque florem proferat: radicem habet crassam & mollem. Plinius eadem paucioribus verbis complens est. *Minnopha* in Ghulafa maximifera vocatur. *Ginia* albis habere

plexus est. Hippophæsis in labulis maritimisque nascitur, spinis albis, hederæ modo racemosa est: candidis, & ex parte rubentibus acinis: radix succo mader, qui aut per se conditur, aut pastillis farinæ. Er mox. Est & altera. Hippopæstion.

qui aut per le conditu, aut paltillis farine. Et mox. Elit & altera, Hippopaxiton,
finecaule, fine flore, foliis tantum minutis. Huius quoque succus hydropicis
K K K 4

Lib. 17. c. 20.

Cap. 15.
Embl. 142.
lib. 4.
Lib. 4. hist.
cap. 3.
Cap. 4.Pen. in
Aduerf.Li. de ma-
rit. caud.Li. 4. c. 176.
Vires.

mirè prodest. Debent accommodatæ esse equorum naturæ, neque ex alia causa nomen accepisse. Quippe quædam animalium remediis nascuntur, locupleti diuinitate ad generanda præsidia, ut non sit mirari satis ingenium eius disponentis auxilia in genera, in causas, in tempora, ut aliis prosit, atque aliis horis, dièsq; nullus propè sine præsidio reperiat. Et alio in loco. Hippophæstum nascitur in spinis, ex quibus fiunt aenææ fulloniæ, sine cauliculo, sine flore, capirulis tantum inanibus, & foliis paruis, multis, herbacei coloris, radículas habens albas, molles. Hoc loco Hippophæstum scriptum est in Plinii exemplaribus, & ita habet etiam Paulus sub litera v. Quod verò dixit, ex quibus fiunt aenææ fulloniæ, corruptum est, quæ enim esse possunt aenææ fulloniæ? Quidam hic legunt, peccines fullonij: alij, venæ fulloniæ, &c. Quidam, Hippophæston spina in maritimis nascitur hæc implentur cortinæ fulloniæ, &c. auctore Hermolao, quemadmodum & lib. 24. Vulgaris quoque hæc spina, ex qua cortinæ fulloniæ implentur. Cornarius legendum putat, ex quibus fiunt pilæ fulloniæ Theophrastus Hippophææ inter τὰ πρὸ τῆς ἀρχαίας ἔχειν φύλλον recenset, id est, quæ iuxta folium spinas habent. Et paulò post ait esse ἀνάγκη τοῖς φύλλοις, μονόφυλλον δὲ καὶ ἐπὶ γῆν, καὶ χαμαὶ γαῖαν, id est, folia sine spinis habere, vnica niti radice, & deiectis in terram caulibus. Hæc delineationes quanquam perspicuè factis & scitè Hippophææ fulloniam plantam

HIPPOPHÆSTVM
quorundam, Dalech.



exprimant, nullis tamen, aut certè paucis herbariis, etiam diligentissimis inuestigatoribus, adhuc comparuit, nisi fortè Anguillæ huius historiæ peritissimo, qui sibi hæc visam assermat. Sabulosis Peloponnesi maritimis oritur, inquit, vocaturque vulgò Spina purgatoria, radicibus palmo longioribus, lacteum succum frangendo fundentibus, amarissimum, odore graui. Florem aut fructum tunc non vidit. Cetera similia Hippophæsto fuerunt. Tribulus marinus, siue Pastinaca marina, quædam cum Hippophææ similia habet, sed alia ita dissimilia, ut Hippophææ dici non possit: quæ de re alibi diximus. Hippophæstum notius non est Hippophææ. Spina hic depicta ad Dalechampia Hippophæsti nomine missa est à Melita insula, de qua nihil asserit, sed lectoribus liberam iudicandi potestatem relinquit. Est autem Spina candida, diffusis huc illuc ramulis, aut potius spinis, sparsa flore exiguo, albo, veluti racemâtim congesto. An cathartica sit, an succus lacteus purgatorius radice, caulibus, foliis exprimat, asseuerare non potest, quoniam arida

planta missa est, nulla adiuncta mirtensis historia. Hippophææ, auctore Dioscoride, succum ex radice emittit, qui syncerus pituitosâ, biliosâ, aquosâq; oboli pondere deorsum purgat, cui farina exceptus quatuor obolorum pondere cum aqua mulsâ. Sed & ipse frutex cum radicibus tunditur, & datur tritus cum aqua mulsâ sesquihemina. Exprimitur etiam ex radice & herba succus, velut è Thapsia. Huius drachma vna datur ad purgationes. Ex Hippophæsti foliis, radice, & capite expressum succum siccato, & pondus trium obolorum cum aqua mulsâ cui voles exhibeto: per hunc enim purgatio aquam & pituitam ducit. Priuam verò conuenit orthopnoicis, comitialibus, & neruorum vicis hæc purgatio. Plinius eadem

eadem brevius tradit. Radicis Hippophæsti succus ad detractiões in comitiali morbo utilisissimus habetur. Et succus earum (radicum Hippophæsti) exprimitur & flare ad soluendam alium tribus oboli, maximè in comitialibus morbis, & tremulis, hydropicis, contra vertigines, orthopnæas, paralyseis incipientes. Galenus Hippophæstis & Hippophæstum in simplicium censu omisit. Paulus ea, quæ Dioscorides de vitroque tradidit, exscripsit.

POTERIVM.

CAP. XXXI.

POTHYON & νόπας Græcis, Latinis Poterium & Neuras, & Phry- **Nomina**
nium teste Plinio. Poterium autem, quia potrix herba paludosum ri- **Lib. 3. ca. 16.**
guumq; solum amat, ut scribit Dioscorides: Neuras quod nervis amica **Forma.**
sit. Hanc sic depingit Dioscorides. Frutex est magnus, ramos habens longos, mol-
les, lori modo lenros, renues, Tragacanthæ similes: folia parva, rotunda. Totus
autem frutex tenui, lanosa lanugine obductus est, & spinosus (in aliis exemplari-
bus legitur, ὅλος δὲ ῥάμνος περιμεινόμενος) ὅλως λεπτός, καὶ πολλὰ χυνοῦ ἔχων. Id est, to-
tus frutex tenui cortice obductus est, & multa lanugine lanosa: flores sunt parvi,
albi. Fructum fert gustu odoratum, acrem, & inurilem (sic enim legendus is lo-
cus, ut in Aldino exemplari. ἀσπρὸν δὲ γλυκύμικτον δυνάσθη καὶ διερμυνόν, &c.) Nascitur in **Locus.**
palustribus & collibus. Radices subsunt duum, aut trium cubitorum, robustæ, ner-
uosæ, quæ prope terram rectis lacrymam emittunt gummi similem. Poterij
duobus locis meminit Plinius: priore his verbis. Sunt & ramis venena, ruberis ma-
ximè vidimusque Psyllos in certamine patinis candefactas admittentes, ocyore
etiam quàm aspidum petniciæ. Auxiliatur eis Phryniō in vino pota. Aliqui Neu-
rida appellant, alij Poterium, floribus parvis: radicibus multis, nervosis, bene
olentibus. Posteriore verò sic. Poterium, aut ut alij vocant Phrynium, vel Neuras,
largè fruticax, spinis tetorrida, lanugine spissa: foliis parvis, rotundis: tamulis lon-
gis, mollibus, lentis, tenuibus: flore longo, herbacei coloris: feminis nullius usus,
sed gustu acuto, & odorato. Invenitur in aquis collibus: radices habet duas, aut
tres, binum cubitorum in altitudinem, nervosas, candidas, firmas. Circumfoditur
Autumno, & præciso frutice dat succum gummi similem. Priore loco Plinius flo-
res parvos dixit, qui αἰθρη μικρὰ legerit: posteriore verò flores longos, eosque her-
bacei coloris, id est, αἰθρη μικρὰ καὶ χαλκρὰ, quum recta lectio sit, αἰθρη μικρὰ, λευκὰ,
velut Dioscorides habet. Postremò Plinius pro fructu semen dixit, & διερμυνόν acu-
tum pro acri reddidit. Poterium fruticem, quem Dioscorides ramulis & foliis
Tragacanthæ aptè confert, genuinum se pinxisse putat Matthioli. Peculiariter,
inquit, supremos ramos habet in vertice extuberantes, & tenui lanugine obdu-
ctos, quod in Tragacantha non cernitur. Pena hoc Matthioli Poterium nihil
aliud quàm Tragacanthum esse ait, aut ex eius icone depictum: neque enim spinæ,
neque correx similia, neque in spinis folia, neque multa alia à verò dissidentia.
Verum autem & legirimum vidisse se ait in horto Parauno, arque alibi. Sparsum
& latè potrectum fruticax multis cauliculis, exilibus, cortice nigricante, ac tenui
vestitis, etiam aridis, non rectis uti Tragacanthum, sed vltro citroque flexis, & or-
dine inorris ut Nepa, & Corrua: sic etiā spinulæ nullo ordine digestæ, sed mul-
tò delicatiores quàm Tragacanthæ, & minores passim cancellarim & reticulatim
implicantur foliis nudæ. Foliola non albida, sed nigricantia, quæ non ex aculeis,
sed è caule fibris exilibus, triplo quàm Tragacanthæ minoribus, Lenticulæ modo,
vel Astragali exeunte semem pusillum, rubellum, Rhoi simile, & minus. Poterium
in Allobrogibus, prope Muram oppidulum Gratianopoli vicinum, in siluosis
conuallibus reperitur. Poterij radices contusæ, & in cataplasmate imposi-
tas nervos dissectos & vulneta glutinant. Decoctum quoque ipsarum nervorum affecti-
bus pro



bus prodest. Eadem Plinius tradit. Radix mira vulneribus sanandis traditur, præcipueque nervis, vel præcis illita. Decoctum quoque eius cum melle potum dissolutiones nervorum, & infirmitates & incisas iuvat. Quibus suffragatur Galenus scribens. Neuras, quidam Poterium vocant: desiccandi absque morfu facultatem habet, adeo ut & nervis incisos glutinare credatur. Radices eius potissimum eiusmodi vim habent: quin & decoctum earum quidam exhibet iis quibus affecti sunt nervi.

CARDVVS Eriocephalus,
Dodonæi.

CARDVVS ERIOCEPHALVS.

CAP. XXXII.

Nomen.
In huius.
purgant.



CAPITVLO lanoso Carduum hunc Eriocepalum Dodonæus alio nomine destitutus nuncupavit, Lobellius Carduum romentosum Anglicum, Coronam fratrum Herbariorum. Caulibus altis assurgit, crassis: folia eius laciniosa, magna, spinosa, prona parte candidiora: capicula rotunda, multa, tenui, candida mollique lanugine vestiuntur, eminentibus vndiquaque aculeis exiguis, pungentibus, superius vero stamineis purpureis floribus. Semen oblongius, splendens ut multis Carduis. Aliunde in Belgium translatum fuisse auctor est Dodonæus: Lobellius Arthesiz & Neruensis agri collibus passim, non secus ac in Angliæ Sommerfeti præfectura, obuium esse.

CEANO



L HIEROPHRASTVS cū dixisset gramen ē geniculis oriri, quōd eius radices geniculatæ essent, atque ē singulis germen sursum, radicem subter erumpere, subiicit, ὁσείως δὲ τοῦ ἀγροῦ καὶ αὐτοῦ: ἀλλ' ἢ τοῦ λυμῶντος, ἢ δὲ γυναικὸς ἢ μὴ τούτου. Id est, Similiter & spina, quæ Ceanothus appellatur, germinat. Verū huius radix, neque arundinacea, neque geniculata. Hanc Ceanothon Anguillara opinatur esse, quæ in agro Patauino vbiuis nascitur: radicibus sub terra procul huc illuc serpentibus: folio Sonchi, magis spinoso: caule striato: multis in eius vertice capitulis, aculeatis: flore purpureo, in pappos abeunte: semine Cnici, paruulo. Vulgus *Astone* vocat. Acanus verò quamuis priuatim speciem nullam Cardui significet, sed spinosarum omnium echinatum caput, missum tamen ē Creta fuisse asserit Anguillara spinosæ plantæ semen, Acani titulo, quod cū herbam edidisset, humi sparsa eius fuerunt in orbem folia, minùs longa quàm lata, obscurè virentia, sed neruis per ea discursantibus caudidis: ex quorum medio caulis exit, in ramos exiles diuisus ferè tres, & nonnunquam plures, in vertice tribus foliis cinctos, ē quorum medio prodit echinus pusillus, Cacto similis, floris rubri, semine Cnici coloris cineritij. Harum plantarum quamuis figuræ desint, interea dum opera dabitur alicunde vt ad nos mittantur, historias ex Anguillara addendas hic putauimus.

CARDVVS FEROX, Lobell.

CAP. XXXIII.



C ARDVVM hunc totius acanacei generis facillè Phœnicem, Leonem & ferocem dixerè recentiores, Itali *Cardo fero*, *Leone* dicto, a spiculis & infestissimis spinis: nihil enim aliud ē foliis altius diuisis, & capitulorum exordiiis, quàm spicula & vepres vnciam & sesquiunciam longas videas: cauliculus vix palmum æquat. Flos Cnici siluestris, pallidus, spinis & aculeis sauientibus horridisque cinctus. Plantæ raræ, & vix notæ nullus vsus. Aiunt in quibusdam collibus Italix, ab Apenninis non ita disitis, magna copia prouenire. Hæc Lobellius.





HISTORIAE

OMNIUM PLANTARVM

LIBER DECIMVS-

QVINTVS.

*In quo describuntur & ad viuum depinguntur Plantæ bulbosæ,
carnosæ radicibus, & geniculatæ.*

LILIA. CAP. I.



EX DIFFERENTIS à plantarum partibus sumptis tum multæ, tum rei herbariæ studiosis. maximè cognitu necessariæ sunt, quæ à radicum diuersitate petuntur, quas diligenter Theophrastus explicauit. Nam vt arborum radices omittamus, in oleraceo genere alix sunt lignosæ, inquit, vt Ocimi (legendum enim *Εοι μὲν γὰρ αἰθουώδεις*, vt legit Gaza, pro *αρχουώδεις*) aliæ carnosæ, vt Betæ, & multò magis Ari, Asphodeli, Croci: alix ex carne & cortice cōstant, vt Raphani & Rapi: alix sunt geniculatæ vt Arūdinum & Graminum:

Lib. cap.
& 10.

alix ex tunicis multiplicibus & corticibus cōponuntur, vt Scillæ, Bulbi, & Cepatū. De quibus omnibus hic non agimus, sed de bulbosis: quo nomine tum eas intelligimus, quæ ex multis capitulis coherentibus coagmetatæ sunt, vnde etiam capitatæ appellantur, quæ capitula, bulbi, & nucleī, & spicæ Latinis dicuntur, sicut Græcis Gelges, Aglithes, & Aglidia grana, sicuti in Allio, tum eas quæ rotundæ suis membranis tunicantur, quæ radices etiam Bulbi nominantur, quales sunt Lilij & Narcissi. Tum de carnosis hoc libro dicemus, & de geniculatis, id est, iis quæ nodis quibuldam interstinctæ protuberant, rotundæ & leuiter capitatæ. Ac primum de iis quæ etiam vulgò notæ sunt, quale est quod *Λέγιον* Græcis dicitur, & *Λέγιον* & *καλλέγιον*, & *κεράνθιον*, Latinis Liliū & Iunonis rosā, Liliū album Officinis, Mauritanijs *Sufen*, Gallis *Lys*, Germanis *Vrweiss Gulgen*, & *Lilgen*, Italis *Giglis*. *Λέγιον* tamen, id est, blandum, suauē, ac concupitum, nō Liliū duntaxat, sed plures alios venustos flores, & bulbaceas herbas significat. Iunonis rosā dicitur, quòd veteres Poëtæ Græci sinxerunt ex Iunonis lacte respersa terra natum Liliū. Nam cum Hercules puer, quem ex Alcmene sustulerat Iuppiter, Iunonis dormientis vberibus admotus esset, & lacte se repleisset, post suū digressus mamma lacte copioso profluxit. Quod in cælo perfusum est, lacteā effecit viam: quod humi sparsum, Liliū lacteo flore nitens creauit, vnde Iunonis rosā dictum. Lilij genera sunt album & rubrum, testibus Dioscoride & Plinio, quæ sponte non arte oriuntur, etiam si colores Lilio candido mangonio quæsitos fuisse Plinius asse-

Nomina

Genera

LLL

LILIVM album, Marti.

F. 142.

Lib. c. g.

Lib. c. h. g.
ca. 6.

ueret. Lilium album folia fert longa, lata, car-
nosa, pallido virore nitentia, secundum longi-
tudinem striata: ex horum medio caulem rectū,
rotundum, cubitalem, & maiorem, foliis multo
minoribus vestitum, in cuius summitate flores
Ctoci, maiores, eximij candoris, odorati, senis
vt plurimum foliis ordine dispositis constant,
longiusculis, angustis, calachi vel nolæ effigiem
exprimentibus, repandis, è quorum medio fi-
bræ crocææ stamina exeunt lingularum effi-
gie. Inter hæc vnus omnium longissimus &
rectus apex, in extremo quadatenus rotundus,
herbacei coloris, nolæ plectro ferè similis: radix
rotunda, candida, cepæ magnitudine, compa-
ctili laminularum sursum spectantium serie,
infernè fibrata, viscido succo turgens. Huius
bulbaceæ plantæ vt notissimæ delineationem
Dioscorides prætermisit: quam tamen Plinius
affabre depinxit his verbis. Lilium rosæ nobi-
litate proximum est, & quadam cognatione
vnguenti oleiq;, quod Lirium appellatur. Et
impositum etiam maximè rosas decet, medio

prouentu earum incipiens. Nec vllis horum excelsitas maior, interdum cubito-
rum trium, languido semper collo, & non sufficiente capitis oneri. Candor eius
eximius, foliis foris striatis, & ab angustis in latitudinem sese laxantibus, effigie
calachi, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo & semine, stantibus in medio
crocis. Ita odor colorq; duplex, & alius calicis, alius staminis, differentia angusta.
Et paulò post. Est & rubens Lilium, quod Græci Crinon vocant. Alij florem eius
Cynorrhodon. Laudatissimum in Antiochia, & Laodicea Syriæ, mox in Phæli-
de. Quattum locum obtinet in Italia nascens. Sunt & purpurea Lilia, aliquando
gemino caule, carnosiore cæcū radice, maiorisq; bulbi, sed vnus Narcissum vo-
cāt. Huius alterū genus flore cæcū, calice purpureo. Differentia à Liliis est & hæc,
quod Narcissis folia in radice sunt, probatissimis in Lyciæ montibus. Tercio ge-
neri cætera eadem, calix herbaceus. Omnes setotini: post Arcturum enim florent,
ac per Æquinoctium Autumni. Inuenta est & in his ratio inferendi, mōstrificis
hominum ingentiis. Colliguntur namque mense Iulio scapi atscētes, Liliæque
suspenduntur in furno. Deinde nudantibus se nodulis, in facie nigri vini vel Græ-
ci mense Martio macerantur, vt colorem percipiant, atque ita in serobiculis se-
runtur heminis facis circūfusus. Sic sunt purpurea Lilia: mirūque ita tingi ali-
quid, vt nascatur insectum. Quæ partim ex Theophrasto translata sunt. τὰ δὲ

κεφάλαια, inquit, τὰ μὲν χρῶμα τὸν εἰρημῶν ἐχέει διαφοράν, μόνον γὰρ δὲ ἴσον, ὡς ἐστὶν, δι-
χρῶν δὲ ἀποίει, τὰ γὰρ δὲ τὸν χῶρον καὶ αἶρος διαφέρει. καὶ ἡ κεφαλή δὲ χρῶμα ὅτι μὲν
ἴση ἐστὶν, ὅτι δὲ ἀλλοτρία γίνεσθαι. βλαστὰς γὰρ τὸ αἶμα ἀποκρίνεται. διὰ ταῦτα, μῆλα δὲ ἔχει
πολλὰ, ὁμοῦ καὶ τριχίλη. ὁ δὲ κεφαλή ἀποκρίνεται ἀλλοτρία, καὶ ἀποκρίνεται τὸ κε-
φαλή, ἀλλοτρία γίνεσθαι. αἶμα δὲ τὸν χῶρον καὶ αἶρος (lege συρῶν) ἢ καὶ φυτῶν. Id est, Lilia lu-
prā dicta coloris differentia inter sese distant. Vnicum ferè caulem habent, dupli-
cem rarò: quam differentiam calum & solum efficiunt. Ex singulis caulis ali-
quando vnum, aliquando plura Lilia emergunt: pars enim suprema germinat. Sed
hæc rariora. Radice est copiosa, carnosā, rotunda. Fructus detractus germinat, &
Lilium emittit, sed minus. Reddit & lacrymarum confluxum quandam, quem
etiam

etiam ferūt Gaza, nescio qua ratione motus, vertit fecit & lacryma cæcum quod-
dam confluuium, quod etiam feruit. Cæterum quod dixit Plinius rubens Li-
lium Crinon vocari à Græcis, docti quidam legendum censent, *ῥοδῖον κρινον*, vel
composita voce *ῥοδῖον κρινον*; nam etiam albū Liliū Crinon vocant. Quod autem

Lilij florem Cynorrhodon vocari apud eundem legitur, alij ex Helychio lectio-

nem hanc retinendam, alij falsi suspectam, & Crinorrhodon legēdum censent: maxime cum Liliū paulò antè Crinon vocari dixerit, & Cynorrhodi appellatio nihil cum Lilio com-
mune habeat: & Crinorrhodon propriè Lilij
rosam & florem significet, voce ad experimen-
dum rubentis cocci splendore apriore, vt quæ
cum rosa Liliū comparat, non alba quidem,
sed rubente, & purpura fulgente quod Ctinor-
rhodon Hippocrates Crinanthemum nuncu-
pauit. Liliū purpureum, quod auctore Mat-
thiolo Chymistæ in Italia Martagon vocant,
Dodonæus Liliū siluestre, Germani *Goldtroutz*
à flauo Bulbi colore, Galli *Lys saunage*, Itali
Giglio rosso, caules edit bicubitales, aut altiores,
rotundos: folia longa, lata, acuminata, non per
caulem incerto ordine sparsa, sed quibusdam
intervalis stellar modo rad-atis eum ambientia:
flores è suis pediculis deorsum dependent, Lilij
diuisura, sed minores, colore purpureo obsole-
to, purpureisque aliquot maculis splendentes,
& staminibus eiusdem coloris in medio, quorū

foliola retrorsum reflexa in orbem sèrè incuruantur:
radices bulbosæ, veluti ex nucleis multis composi-
tæ, aurei vel flauī coloris, ex quibus fibræ dependent.
Nascitur Liliū istud in multis Germaniæ locis, in
siluis & montibus, Fuchsio & Gesnero testibus. Belgæ
cum aliis Liliis in hortis habent. Floret sub finem
Maij, aut Iunij initio, candida Lilia anteuerrens.
Fuchsius pro Asphodelo fœmina depinxit. Tragus
pro Hyacintho Poëtarum. Est Herbariorū Heme-
rocallis. Peruenusta alia planta à quibusdam Liliis
rubris adnumeratur, quæ florem vnum pulcherrimè
& suauissimè rubentem profert, magnum instar Li-
lij rubri, quam Turcico vocabulo *Tulipam* vocant: de
qua cum Tulipis aliis dicemus. Dodonæus Lilia alia
purpurea proposuit. Vnum maius, caulibus proceris,
longis, sæpe altioribus quàm Lilij albi: foliis nigri-
oribus & angustioribus, circa caulem multis, ante eius
exortum nullis: flores summo caule erumpunt co-
piofi, decem, duodecim, aut plures, vsque ad decem
& octo, & viginti, alij super alios incerto ordine di-
gesti, Lilij alterius forma & magnitudine, colore ru-
bro ad croceum inclinante, multis, exiguis, nigris
quasi punctulis, literarum quarundam veluti rudi-

De florib.
cap. & 31.



LILIVM Purpureum
maius, Dodonæus.



inertis reſerſi: radices Bulbi magni ſunt, ex multis quoque nucleis, vt Lilij candidi, ſed iniores. Dodonæus etiam Hyacinthum ſcriptum & Comoſundalon nuncupat, Fuchſius Liliū croceum, Lobellus Liliū cruentum, alijs ſilueſtre Liliū. Eſtq; aut Hemerocallis, aut eius congener. Negat tamen Dodonæus Hemerocallidem eſſe, cum enim Hemerocallis, auctore Dioſcoride, in ſingulis apophyſibus tres, aut quatuor flores proferat colore valde luteo, Liliū autem iſtud apophyſes, id eſt, ramulares propages nullas habeat, & flores in caule non modò tres, aut quatuor, ſed non raro decem & octo, & viginti, coloris non lutei, ſed purpurei crocei, Hemerocallis dici non poteſt, quin potiùs Liliū, quod Dioſcorides *απόφυτον* vocat, Plinius rubens. At hæc de apophyſibus & ſorum numero ratio leuis eſt momenti, vt ait Pena: nam ſi quis Liliū candidum contempletur interdum exortus iſtos edere, in quibus aliquādo complures flores congeſti ſunt, interdum ſinguli, non magnopere refragabitur. Alterum purpureum Liliū minus, caulo eſt multò breuiore, cubitali, videlicet tantum, aut minori: folijs ſimiliter nigricantibus, anguſtioribus & minoribus. Flores è ſummo caule erumpunt, ſinguli tamen ſuis pediculis, modò breuioribus, modò longioribus inſidentes, coloris quoque purpurei crocei, notulis ſimiliter quibuſdam nigris, & perquam exiguis ornati, Lilij etiam diuiſura, ſed paulò minores: pro radicibus & minores Bulbi ſunt, ſupra quos & infra fibræ adhærent. Floret ſub finem Maij, reliqua Lilia ante-

LILIVM Cruentum bulbos gerens, Lobellij.



LILIVM Cruentum aliud, Lobellij.



cedens. Liliū iſtud Dodonæus Ouidij Hyacinthum eſſe credit. Hæc duo Lilia cultu tantum diſtare videntur, vt maius ſatium ſit, minus agreſte. Neutrum verò purpureo eſt flore, ſed colore corticis mali aurei. Quædam alia pulcherrima Lilia Lobellius picta dedit. Prius eſt Liliū cruentū bulbos gerens, ſummo alis diuiſo, cui flores rutilant, & bulbos nucleis ſtipatos proferat. Alterum, Liliū cruentum, Lilio purpureo iniori minus, flore Martagi rutilo, & ſecundum caule ſesquicubitali bulbulis a medio ad ſummū vſq; ornarū. Tertiū, Liliū Perſicū, vulgò *Pennachi*



nachi Persiano, quod rarius Germaniæ, Galliæ & Angliæ: Lieræ solùm Belgarum visitur, inquir, in horto amœnissimo, stirpiùmque exoticarum ditissimo generosi viri Ioannis Dilij. Caulis est ternum cubitorum, quem fusc ambiunt folia ex cæruleo virenria, muc. onata, Liliis cruentis paria: flores nutantes, nolarum effigie obsoleta purpura nigricant: radix bulbosa, fissâ, minimè squamis loricata, albida, auersa parte scissilis & plana porrectis subrâ, obscure flauentibus. Nec multum à Liliis differt Chalcedonicum Lale, quod supradictis Belgij hortis provenit, sesquipedem alto caule, foliis longioribus Lilij montani. Flores rubentes, nutantes Lilij Persici ritu nolarum figura, quales pictura docet, se non potuisse observare ait: caulem quidem edidisse, sed qui summo statim marcescere cepit. Radix eepacea cœcretionem retri & virosi Colchici, uti tota planta, odoris. In Belgium missum Lale, Turfani & Coronæ Imperialis nomine. Myconus plan-

tam aliam ex Hispania misit, quam Lilium polyrrhizon nominavit. Lilium quidè, quod florû figura, colore, dulci & glutinoso sapore Liliû albû referat: polyrrhizon à radicum copia rectè, an secus, id peritis Herbariis æstimandû relinquens. Herba hæc Hastulâ regiam prorsus æmulatur, siue folia cõsideres, quæ illius foliis adeo similia sunt, ut priusquam florere incipiat, Hastulæ regis esse dicas. Radices multas habet non admodum crassas, albas, huc & illuc sparsas, nõ multum in terram demissas, dulces, glutinosas: ex quibus caulis erigitur, sæpius duos cubitos altus, cauus, sine medulla, in quo flores candidi, Lilij effigie, odorati, multo ramè minores,

LILIVM Polyrrhizon Myconi, Phalangium quorūdam.

Lib. p. c. 99.
Vires &
Temper.



stamina quædā lutea intus habentes : semen in vasculo triangulari cōclusum, nigrū, triquetrū. Nascitur in montibus, sed terrenis humidisque locis, quādoq; iuxta fluenta. Quibusdā Phalangium videtur esse, aut Phalāgij genus, diuersum à Phalāgij icone quā Matthiolus dedit. Ex Lilij flore, vt scribit Dioscorides, vnguentū fit, quod ab aliis Lirinū, ab aliis Sufinum appellatur, ad emolliēdos nervos, priuatimq; vuluarū duritias aptū. Folia herbæ illita serpentū morsibus subueniunt, seruēfacta ambustis prosunt, eadem in aceto cōdita vulneribus opitulantur. Succus soliotū cū aceto & melle in æreo vase coctus, cōtra vetusta vlcera & recētia vulnera medicamentum fit. Radix assa, aut cū rosaceo trita ambustis medetur, vuluā emollit, mēstrua ducit, & vlcēribus cicatricē inducit. Cū melle subacta neruorum præcisionibus & luxatis auxiliatur. Alphas, lepra, furfuresq; emēdat. Achotes abstergit, faciemq; expurgat, & erugat. Testiculorū inflammationes trita cū aceto, aut Hyoscyami foliis & farina tritici demulcet. Semē cōtra serpentū morsus potū valet. Illinuntur erysipelasibus se-

men & folia cū vino trita. Vsum Lilij medicū etiam Plinius prolixè exposuit his verbis. Lilij radices multis modis florē suū nobilitauere, contra serpentū iectus ex vino potæ, & contra fungorū venena. Propter clauos pedū in vino decoquuntur, triduoq; nō soluūtur. Cū adipe, aut oleo decoctæ, pilos quoq; adustis reddūt. E mulso potæ inuile sanguinē cū aluo extrahunt, lienēq; & ruptis vulsis prosunt, & mensibus fæminarū. In vino verò decoctæ, impositæq; cum melle, neruis præcis medentur. Lichenas, & lepras, & furfures in facie emēdant, erugat corpora. Folia in aceto cocta vulneribus imponūtur, epiphoris testium in melle cū Hyoscyamo & farina tritici. Semen illinitur igni sacro, flos & folia vlcērum vetustati. Succus qui flore expressus est, ab aliis mel vocatur, ab aliis Siriū, ad emolliēdas vuluas sudoresq; faciēdos, & suppuraciones coquēdas. Vbi pro Syriū, Seirzum, quasi sapā Dalechāpius legit: Cornarius falsò legi putat, Mel vocatur, & legendū esse, Phaselinū

vocatur, ab aliis Syriū, ex eodē Plinio demonstrat, qui hunc locū citat alibi his verbis. Lirinū, quod & Phaselinū & Syriū vocauimus, renibus vtilissimū est, sudoribusque euocādis, vuluæ emolliēdæ, cōcoquendisq; intus: quo tamen loco Dalechāpius legit, Lirinō, quod & Melinū & Seirzū vocamus. Sed & laudatissimū in Laodicea Syriæ, & mox in Phaselide Liliū esse Plinius ipse dixit loco à nobis primum adducto. Galenus distinctius hæc declarat. Lilij flos, inquit, temperaturā mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua vtiq; habet, vt gustu sit amara, partim ex aquea, eaq; tēperata. Itaque etiā quod ex ea cōficitur oleum, cicta morsum digerēdi, simulq; emolliēdi facultatē habet: vnde fit vteri duritiæ aptissimum. Porro radix foliaq; per se trita desiccāt & abstergunt, & digerūt moderatē: proinde ambustis quoq; cōpetunt. Radicē ergo tostā, deinde cū rosaceo contritā, ambustis, quoad obducatur cicatrix, imponūt: quippe cū alioqui & aliorū vlcērum omnium bonū sit inducēdæ cicatrici remediū. Quinetiā nervos emollit, mensesq; prouocat. Folia verò præcoquētes, & ipsa ad obductā vsq; cicatricē imponūt, non in ambustionibus dū taxat, sed aliis quoq; vulneribus. Sūt & qui aceto ea cōdiētes, ad vulneta

ad vulnera suo tempore vniuntur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quam in foliis: quamquam tamen nec in ea ipsa multum insit: nam primi ordinis abstergentium est medicamentum. Itaque cum aut vitiligines, aut ploram, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus ei aliquid aliorum medicamentorum validius extergentium, cuiusmodi est niel. Ceterum si id moderare illi ac conuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones competat, & ad alia vniuersa, quae valenter exsiccare postulant absque morbo. Impossimum vero etiam quandoque & foliorum succum cum aceto & melle coctum. Quinque partibus succi plus utroque erat, atque insigne medicamen ad omnia ea quae exsiccare postulant absque morbo: seu vulnera omnia ingentia, & maxime quae in capitibus musculorum eueniunt, tum ea quae nimis mollia sunt & diuturna, atque agere ad cicatricem perducuntur. Tradit Matthiolus elixam Lilij radicem, veteri axungia exceptam & illitam, pedum clauos tollere, sed ante triduum remoueri non debere. Eandem ex adipe & oleo adhibitam fluxus pilos replicare: cum multo aurem potam, sanguinem extra vasa concretum per aluum eicere, suppurationes moliri & concoquere, & duritias quascumque emollire. Stillariciam florum aquam dari vtiliter potandam agere parturientibus, & ad pellendas secundas addito croco & cassia. Oleum quod ex floribus paratur, valere ad omnes frigidos neruorum morbos, nempe ad conuulsiones, & resolutiones: praestat item ad emollienda articuloz impedimenta, & scirrhos quoscumque tumores. Illinitur quoque puerperis vteri dolore languentibus, addito oleo & Lini semine, praesertim cum succida lema iis calidis imbuta ventri superponatur. Additur clystinatibus cum induratas faeces mollite fuerit opus. Lilia, quae diu in oleo macerata fuerunt, illita, prius calefacta, apostemata calida citra dolorem maturant ac digerunt, praesertim ea quae sunt in articulis.

In cap. 99.
lib. 4.

HEMEROCALLIS. CAP. II.



RAFCIS *ημεροκαλλίς* & *ημεροκαλλίς*, Latinis similiter Hemerocallis & Hemerocalles dicitur, Gaza: Elixir, Italis *Giglio saluatico*, Gallis *Lys sauvage*. Hemerocallis, ut describit Dioscorides, folia & caulem habet Lilio similia, Porri modo viridia: flores in caule per singulas propagines tenuti aut quaterint erumpunt, Lilij diuisura quum hiare ceperint, colore perquam pallido: Graece legimus, *τὴν δὲ χυρὴν ὀχρεὰν*, id est, colore valde ochreo. Ochra autem, teste Dioscoride, *μέλαινα* est, id est, lutea, & melior quae saturata. Quare colorem florum Hemerocallidis Dioscorides intelligere videtur saturatè luteum, non valde pallidum: radix est bulbosa valde magna. Plinius Hemerocalles inter ea, quae folio tamen coronant, numerat. Alio in loco, Hemerocalles, inquit, pallidum è viridi & molle folium habet, radicè odoratam & bulbosam. Quae de Hemerocallide Dioscoridis accipienda esse perspicuum est. Theophrastus suffructices coronarios recenset, Rosam, Violam, Iouis florè, Amaracum, Hemerocalles, item Serpyllum, Sisymbrium, Helenium, Abroroniū. *ἀπαντὰ γὰρ ταῦτα*, inquit, *ἐν αὐτῇ καὶ μικροβουλῶν, διὰ τὴν φύσιν αὐτῶν*. Id est, Omnia haec lignosa sunt, & minutis foliis constant. Quare suffructices sunt. Et alio in loco, *τὰ δ' ἅλλα αὐτῶν*, inquit, *τὰ περιετρημένα, πάσι εὐστρέφεται, ὡς ἰωνία, δὴ δὲς αὐτῶν, ἵψον, φλῶξ, ἡμεροκαλλίς. Ἐ γὰρ αὐτῶν, καὶ αἱ ῥίζαι ἐν αὐτῷ εἰσι*. Id est, Reliqui autem omnes supra dicti flores semine exeunt, ut Viola, Iouis flos, Iphyum, Philox, Hemerocalles. Nam & ipsa, & eorum radices lignosae sunt. Ex quibus intelligere licet, Hemerocalles Theophrasti radice lignosa, ab Hemerocallide Dioscoridis bulbosa dissidere. Athenæus ex Theophrasto Hemerocalles inter coronarios flores numerati scripsit. *τοῦ δ' ἡμεροκαλλίς ἀλαομένης αὐτοῦς ὁ πρὸς μὲν νύκτα μαρτυρεῖται, αὐτὴ δ' τῶν ἄλλων ἀνελκόντι θάλλει*. Id est, Hemerocallis florem nocte tabe-

Nomina

Lib. 4. c. 110.

Forma.

Lib. 4. c. 68.

Lib. 4. c. 10.

Lib. 4. c. 22.

Lib. 4. hist.

cap. 4.

Lib. 4. hist.

cap. 6.

Lib. 16.

Dipnos.

scere, oriente sole pullulare. Quod sic intelligendum, florem hunc noctu contrahi collabiq; in sese, diu verò sese explicare, ac veluti reuiuiscere: quod Solisequis

HEMEROCALLIS prior,

Matthioli.

HEMEROCALLIS altera,

Matthioli.



In c. 120.
lib. 3.

& Heliotropiis ceteris accidit. Matthiolus Hemerocallidem nusquam non in Italia prouenire tradit, circa messem in aruis inter segetes, in pratis, in montibus, & in vallibus, aureo colore micantem, Liliū siluestre vulgò dici: radice niri bulbosa, Lilio hortensū simili, sed alio colore: flores suo tempore dehiscences fulgentis auri modo rutilare, quem colorem perquam pallidum perperam appellat, nec eum intelligit Dioscorides, cum dicit *χρειαίονος ὡχρεῖον*, colorem valde ochreum, quem saturatè luteum à Dioscoride intelligi diximus. Hemerocallidis genus alterum idem Matthiolus facit, specie quidem superiori simile, sed radice ex multis & paruis coagmentata bulbis, floribus aliam diuisuram habentibus, vr eius pictura demonstrat. Priorem Hemerocallidem superiori capite diximus esse

De florib.
cap. 31.

Liliū purpureum maius Dodonæi, qui huic Hemerocallidem aliam substituit, Liliū videlicet non bulbosum. Cuius duo reperiuntur genera, florum colore discreta. Vni flos luteus: alteri in rubro dilutiori purpureus. In lutei genere flos vnus minor, alterius paulò maior est: vterque tamen purpureo minor, qui maximus est, & Lilio candido magnitudine ferè par. Sunt autem Lilio non bulboso folia oblonga & angusta, Porri aut Asphodeli foliis similia: caulis cubito altior, rotundus, læuis, absque foliis, superius in apophyses duas vel quatuor diuisus: in quorum singulis flores tres aut quatuor, Liliū forma & diuisura referentes, colore in vno quidem ochrea, id est, vr diximus, luteo, in alio rubro purpureo, cuius tamen medium floris luteum est. Post flores crassæ, triangulares gignuntur siliquæ, in quibus semen nigrum & splens, Pæoniæ feminæ simile, sed minus. Radices subsunt non bulbosæ, sed veluti Asphodeli lutei, multæ, oblongæ, cohærentes, & vni quidem, cui videlicet flores maiores & purpurei, crassiores nodosiorèsq; alteri verò minoris floris, tenuiores & longiores, è quarum annexis fibris quædam cras-

fiores

LILIVM Non bulbosum,
Hemerocallis Dodo.LILIVM Rubrum
non bulbosum.

flores serpunt, quibus non secus ac Asphodelus luteus in plures plātas facillē multiplicatur. Peregrinum Belgio istud Lilium est: floret ante Lilia candida. Lilium luteum nonnulli appellant, sed rectius Lilium non bulbosum dici Dodonæus putat: alij Liliaginem: plerique Liliastrum: Pena & Lobellius Lirisphodelum luteum Liliiflorum: veteres, inquit Dodonæus, Hemerocallida, quia caules non bulbosi Lilij in propagines seu ramulos distribuuntur, singulique flores tres aut quatuor promunt, & eos quidem ochrea colore in vno genere. Jam & porphyranthes Hemerocallis nominata reperitur: quæ appellatio purpurei floris non bulboso Lilio conuenit. Quæ omnia non bulbosum Lilium Hemerocallida legitimam esse perspicuè ostendunt. Quod verò tribuit Dioscorides Hemerocallidi radicem bulbosam, innuit istud, inquit, apud Dioscoridem Hemerocallidis descriptionem deprauatam: vel enim superuacuum scilicet, & veritati repugnātium adiectione ampliatam, vel duorum Liliorum descriptiones in vnam contractas. His rationibus Hemerocallidem suam asserere nititur Dodonæus. Herbarij tamen Matthioli Hemerocallidem magis amplectuntur. Lilio non bulboso est pectus similis planta hic appicta, Lilij rubri non bulbosi nomine meritò donanda: radicibus duntaxat differt, quas multum fibratas habet. His pulchrius Hemerocallides pictum damus. Semine ex Constantinopoli delato Lugduni in horto quodam Dalechampi industria creuit. rara hæc stirps, aspectu petelegans, Hemerocallides Constantinopolitanum phœniceum, vnico flore ab ipso appellata, è qua viua pictura hæc expressa est. Bulbum planè Lilij vel Hemerocallidis Matthioli pro radice habet, fibris plurimis capillata, ex qua erigitur caulis vnicus, cubitalis, teres, læuis, herbaceus, nodis & geniculis distinctus: è nodis singula folia, ex singulis geniculis modò bina, modò quaterna, rariùs terna prodeunt, caulem ambientia, Lilij foliis similia, sed minora & acuminatiora. In caulis summo vertice vnicus flos emicat, qui sex foliis constat, striatis, florum Lilij speciem referentibus, nisi minora essent, & colore phœniceo pulcherrimo: ex quorum medio sex apices sese exerunt phœnicei, staminibus pallidis

pallidis nixi, & media inter ipsos claua apicum staminibus concolor. Verum non tam venustus est flos tum specie, tum colore, quàm structura, & foliorum situ admirandus. Non enim quemadmodum floris Lilij iam hiantis folia solummodo terram versus inelinateda & repanda sunt, sed ita foras inflexa & intorta, vt ipsorum

HEMEROCALLES Con-
stantinopolitanum Phanicum
unico flore.

Lib. 4. c. 110

Vires.

Lib. 6. c. 21



caecumina omnia in idem quasi ectrum coëant in ipsius caulis vertice, vnde primum exiit, apicibus ex ipso floris umbilico foris pendulis, qui in Lilio & similibus recti stant. Hemerocallidis radix trita, auctore Dioscoride, trita pota, aut cum melle & lana in pello apposita, aqua educit & sanguinem: folia trita imposita mammarum ex partu & oculorum inflammationes mitigant. Radix & folia ambustis commodè imponuntur. Plinius, Hemerocallidis radix cum melle imposita ventri, aquam pellit, & sanguinem etiam inutilem: folia epiphors oculorum, mammarumque post partum illinuntur. Quæ eadem sunt cum iis quæ ex Dioscoride diximus, nisi quod radix ventri imponenda non est, vt Plinius dicit, sed ad vterum apponenda in lana cum melle, vt pessus fiat, vt Dioscorides ait, *συν μάλιν ἐν λινῷ ἀποστρίψας πρὸς τὴν ὑδραγωγὸν, καὶ ἀιμαγωγὸν*. Galenus Hemerocallidis radix, inquit, similis est Lilij radice & specie & viribus. Prodest non secus atque illa igni ambustis: nam & leuiter discuit, & non nihil repellit.

BVLBVS.

CAP. III.

Nomina

Genera.

Lib. 7. hist.

cap. 24.

BΟΛΒΟΣ Græcis, Bulbus Latinis, Arabibus *Basar*, *Alqir*. Bulbi esculenti, qui *βολβός ἐδάωμος*, & vomitorij, qui *βολβός ἐμελικός* dicitur, tantum meminit Dioscorides. Theophrastus plura genera posuit. τῶν βολβῶν, inquit, ὅτι πλεῖστα γίνεσθαι φανερόν. καὶ γὰρ τῶν μεγάλων, ὅτι χυλὸν τοῖς χυμῶσι διαφέρουσιν, καὶ τοῖς χυλοῖς ἀναχθὲν γὰρ οὕτω γλυκεῖς, ὥστε καὶ αἰκνὸς ἰσχυρὸς χυμὸς ἐν χερρόνισσι τῇ τὰ μέρει. Id est, Multa esse bulborum genera constat: differunt enim magnitudine, colore, figura, succo: nam quidam adeo sunt dulces, vt crudi comedantur, quemadmodum in Cherroneo Taurica. Et paulò inferius. πλεῖστα ἔχει βολβοῖσι, καὶ ἐλάττω (Gaza legit καὶ ἐν ἐλάττω) ταῦτα ἡγερέστερον τὸ δόνημα, & βολβῶν, καὶ ὁ πικρὸς, καὶ κίβη (Lege κίβη, quemadmodum apud eundem Theophrastum lib. 10. & apud Pollucem legimus) καὶ τρόποι τὰ τὰ σισυρήγγην. βολβοῖσι ὅ ταῦτα, ὅτι τῶν γὰρ τοῖς ῥίζαις, περὶ τοῖς χυμῶσι λευκὰ καὶ ἐλεπρόδω, ἴσθαι δὲ τὸ σισυρήγγην, τὸ τῶν ῥίζων ἀνέαντα τὸ ἔστω πρῶτον, ὃ καλεῖται χετιμῶνα (Emenda πρῶτον, καὶ χετιμῶνα) τὸ ὅτι τὸ ἐλεπρόδω ἀνέαντα. Id est, Plura autem sunt Bulbosæ, nec iis pauciora, veluti Viola alba, Bulbine, Opition (sic legit Gaza) Coix, & quodammodo Sisyrrinchium. Bulbosæ autem hæc sunt, quod radices habeant rotundas, colore candidas, & non squamosas. Quæ sic conuertit Plinius. Bulborum genera differunt colore, magnitudine, suauitate: quippe cum quidam crudi mandantur, vt in Cherroneo Taurica. Et paulò post. Genera Græci hæc fecere. Bulbinen, Setanion, Pitcon, Acroconon, Sisyrrinchium.

Cap. 16.

Lib. 10.

Lib. 19. c. 1.

Lib. 19. c. 1.

nuchium. In hoc mirum, imas eius radices crescere hyeme, verno autē cum apparuerit viola, minui & contrahi, tum deinde Bulbum pinguefcere. Ex quorum loco-
 rum cōparatione perspicuum est vtriufuis auctoris locos corruptos esse: nec enim
 Seranion Bulbum, nec acrocorion Theophrasti exemplaria habent. Idem Plinius
 Catonem Megaricos Bulbos celebrare ait. Deinde cum tantæ suauitatis esse in
 Cherroneſo Taurica natus dixisset, vt crudi mandantur, post hos, inquit, in Africa
 nati maximē laudantur, mox Apuli. Est & hic obseruandum, Bulbum esculentum
 & vomitorium propriē Bulbos appellari. Verū generaliter omnes olerum radi-
 ces, quæ similitudinem Bulbi habent, Bulbos dici. Sic Celsus. Ex oleribus valētiora
 Rapa, Napiq; & omnes Bulbi, in quibus Cepam quoq; & Allium numero. Quare
 Theophrastus loco citato non βαλάνος, sed βαλάνος appellat. Id verō magis mirum
 quod de lanigeris bulbis Theophrastus prodidit his verbis. μεγίστη δὲ καὶ ἰδιωτικὴ τῶν
 δασυφύων τῶν ἐν ἡμετέροις ἐστὶν γὰρ τῶν τοῦτο, φέρεται ἐν ἀρχαίοις καὶ ἐστὶν δὲ τὸ ἴδιον ἢ τὸ
 περιόντιον χυμώδες. ὥς τε ἀνα μέσον εἶναι τοῦτο ἰδιωτικὸν τοῦ ἴδιου, καὶ τὴν ἴξιν. ἰσχυρότατα δὲ ἐξ
 αὐτοῦ τὰ παλῖα (Athenæus & Pollux legunt παλῖα, Plinius interpretatur mapalia)
 καὶ ἄλλα ἡμετέριαι δὲ καὶ ἰδιωτικὴ τοῦτο, καὶ ἴσως περὶ ἐν ἰδιωτικῇ τεχνικῇ. Id est, Maxima au-
 tem & maximē propria differentia est lanigerorum. Est enim tale quoddam genus
 in litoribus nascens. Lanam sub primis tunicis habet, ita vt in medio sit eius quod
 edule est tum internum, tum externum. Texuntur ex ea & toga (Sic παλῖα vertit
 Gaza, Bayssius fascias pedum, seu fascias crurales) & alia vestimenta: est enim id la-
 nosum, non quemadmodum apud Indos capillaceum. Qua de re Plinius ita scribit.
 Theophrastus auctor est, esse Bulbi genus circa ripas amnium nascens, cuius inter
 summum corticem, eamque partem qua vescuntur, esse laneam naturam, ex qua
 mapalia vestisq; quedam conficiuntur. Sed neque regionem in qua id fiat, neque
 quicquam diligentius, præterquā Eriophoron id appellari in exemplaribus, quæ
 quidem inuenerim, tradit. Ex his colligas, multa quondam genera Bulborū fuisse
 omnibus nota, quod Dioscorides de esculento Bulbo dixit, cuius ob id descriptionem
 prætermisit, nobis verō ignota: quia, vt ait Pena, non secus arque Asphodeli,
 Bulbi plerique omnes edi mortualium luxu & mollitie desiere, præsertim Europæis
 regionibus, seu fuerint gustu minùs commendabiles aut viles quā Bulbacea
 multa, Porri, Cepæ, Allia, & similia: viscidi enim sunt omnes & mucosi, & pleri-
 que insulsi, & magis ad excipienda condimenta, vt Hyacinthi multi, & Galenicus
 Asphodelus, quā ad condiendum apti. Quare ex Dioscoride diuinare seu conie-
 ctari potius licet, quā asseuerare quid sit esculentus Bulbus: pro quo Ascaloniam
 cepam, de qua dicemus, Officinæ viurparunt, quòd viderem stimulare vulgò dica-
 tur, quod de Bulbis antiquitas prodidit, vt Martialis cecinit his versibus.

Cum sit anus coniux, &c. sine tibi mortua membræ,

Nul aliud, Bulbus quā satur esse poter.

Bulbi nusquam hodie in hortis coluntur: quare satius caremus. Siluestres multi-
 plices sunt: quidam edules, quanquam paucis, nempe Græcis & Apulis, eo satius
 deteriores quòd nullo cultu mansuescant. Gignuntur passim ac in segetibus, ra-
 dice bulbosa, cortice subrufo, (quamobrem quidam Pancratium esse putauerunt)
 altè defossa: foliis Porri, longis & laxis: caule tereti, nudo: flore per initia racemoso,
 paulatim sese dissepcente purpureo: semine paruo, nigro, in loculis triangularis, pri-
 mis Bulbi tunicis subamaris, vt In Bulbina, media cartilagine dulciore. Huius pi-
 curam pro Hyacintho primo Marthiolus, Fuchsius, & Tragus exhibuerunt: flo-
 ret Aprilis initio iam de floreſcente Bulbina. Horum flores rustici nostrates sero-
 rum manipulis, quos in foro vendunt, immiscet, ob purpurei floris venustatem.
 Allium est caninum Dodonæi, quem Bulbum esculentum & hortenſein vocat. Non est tamen

Lib. 19. c. 4.

Lib. 1. c. 11.

Lib. 1. h. 1. c. 13.

Lib. 19. c. 1.

Lib. 19. c. 1.

In Adverf.

Bulb. escu-
lentus mul-
torum.

Locus.

Forma.

In cap. 18.
lib. 4.

Cap. 11. h. 1.

Lib. 1. c. 13.

Lib. 1. h. 1. c. 13.

cap. 16. &c.
De florib.
cap. 12.

Allij

BVLBI esculenti genus maius,
Dodonæi, Hyacinthus, Matth.

Lib. 2. c. 79.

Lib. 2. c. 80.

Lib. 2. c. 81.



Allij species aliqua, inquit, sed Bulbi esculenti genus quoddam, veluti Bulbina, cui certè similimus est: Bulbo enim Bulbina rubet, & porri folia habet, Plinio auctore. Videtur autem hæc ex Africa Bulbus esse, quem Afrum cognominant: huius enim Dioscorides *πυρρὸν*, id est, rufum Bulbum esse ait. Huic adiunxit Bulbi esculenti genus minus illi simile foliis, floribus & radice, nisi minus esset. Tragus Hyacinthum exiguum vernum appellat, Germani *Hundsfenbel*, vel *Hundtsknoblauch*, hoc est, Cepam caninam, vel Allium caninum. Prius genus peritis Bulbus silvestris Plinij Pericarpus videtur esse, sicutus, quod fructus caulem cingat & ambiat: alterum genus Bulbina, herba, inquit Plinius, porraceis foliis, rubicundo Bulbo. Ex eodem Dodonæo Bulbū alium hic depinximus foliis Allij siue Porri, paucioribus, videlicet unico aut duobus duntaxat: caule rotundo, cauo, dodranaliumulis, sinuatim emicantibus floribus luteis, speciosis, sex foliolis ex calatho stellatim radiatis, capillo intus croceo, capitulo seu siliqua floribus delapsis triangulari, seminibus plenaradice

ce totunda seu Ceba siue Allium, citra odorem glutinosā. Multis Germaniæ locis crescit, sabulosis & umbrosis, atque circum conualles & riuulos, nonnunquam in sepibus. Per initia veris Aprili & Martio mensibus erumpit: ac statim deinde evanescit. Quomodo veteres nuncuparint, hæcenus incompertum esse ait. Sunt qui

BVLBI esculenti genus
minus, Dodonæi.

BVLBVS silvestris Fuch.
& Dodonæi.



Bulbinam

Bulbinam vocent, alij *βαλβιν* id est *balbin*, id est, Bulbum esculentum. Quorum sententia illi & petitis herbariis haud placet. Quare Bulbum siluestrem nominauit quemadmodum & Fuchsins, Germani *Feldszumbel*, id est, Cepam agrariam siluestrem. Ruellius Bulbum siluestrem prior nuncupauit, quem rura Galliea, quod radice & foliis Porrum imitetur, Porrium vocant.

Ca. 60. hist.

BVLBVS Vomitorius, Matthiola.



Li. cap. 11.

Li. cap. 66. Bulbus Vomitorius.

De florib. cap. 12.

De florib. cap. 12.

Bulbus æstiuus.

Locus.

Forma.

Tempus.

BVLBVS Aëstiuus Dalech. Tiphys Theophrasti.



thus floreat, hic verò Bulbus desinēte Iulio, Augusto toto & Septembri : quod duo

MMM

aut summum tria folia Hyacinthus edat, hic verò plura quàm octo, graciliora, angustiora, breviora: quòd Hyacinthi flos emergat post folia, huius verò flos cum caule ante folia exoriatur. His adde, Hyacinthum umbrosis siluis, humidis sepius, locisque aliis vdis gaudere, Bulbum hunc siccissimis, squalidissimis, apricis, ventoque expositis. Iam verò vnico tantùm caule

BVLBUS Eriophorus,
Dodonæi.



Lib. 7. hist.
c. 12.

Append.
lib. 9. arg.
cap. 31.

Append.
lib. 9. arg.
cap. 31.

BVLBUS Eriophorus,
Clusij.



Hyacinthus assurgit, hic verò duobus, tribus, quatuor. Postremò paucis diebus florem Hyacinthus retinet, hic mensem integrum, atque etiam diutius: qui flos in Hyacintho omnino pariparascit, in hoc Bulbo in purpura rubet. Sunt qui Bulbum hunc Theophrasti esse coniciant, quòd florem ante folia promat. Bulbos ~~icquod~~ diximus esse ex Theophrasto, qualem Belgij in horto Ioannis Brancionis vidisse refert Dodonæus. Bulbus erat qualis ceparum ex multis tunicis compactus, inter quos lenta quædam veluti lanugo reperitur. Iconem Parauio ad se à Cortuso missam fuisse ait, quam hic in nullo muratam, nec vlllo modo mutilatam expressimus. Sed hanc commentitiam esse veri & gemini Bulbi Eriophori pictura demonstrat, quam fidus & accuratus rei herbariæ scriptor Clusius expressit, qui eundem etiam Bulbum descripsit his ferè verbis. Habet folia multa oblonga, Hyacinthini, ferè similia, minùs carnosà & succulenta, duriora tamen, viridia, mucronata, sapore ingrato, quibus minutissimè etiam confectis, tenuia quædam fila instar tele araneorum diduci possunt. Ex horum medio caulis exit cubicalis aut amplior, rectus, Scillini caulis æmulus, lauis, nudus, virescens, superiore vero parte ad cæruleum colorem tendens: in summo veluti oblongam ac densam fert spicam, in denos vel plures versus distinctam, viridem primum, sed paulatim (dum sese explicat in flores cæruleum colorem contrahentem: constant flores senis foliis stellatim expansis, triangulo umbone in medio protuberante, Hyacinthi autumnalis floribus propemodum similes, in odori, colore cum suis pediculis cæruleo, & internis staminibus, quorù apices initio purpurei sunt, & vbi sese explicarunt, veluti pallefcunt quædam farina aspersi. Incipit florere ab imo, vt Scilla solet, & reliqui magna ex parte Bulbi, qui flores racemi aut spicæ in modum confertos habent. Semen se obseruasse Clusius ait, sed flores admodum caducos statim marcescere corpisse, & relictis in caule tantummodò pediculis decidisse. Radix crassa & bulbosa est, ex plurimis tunicis contexta, alba, tomentosa, & veluti araneum

nearum

*BVLBUS parvus
runcifolius, Pena.*



*BVLBUS Marinus
crinitus.*



nearum telis obfita, multos adnatos Bulbos habens, & cras-
sis oblongisque fibris nitens. *icnophor* nomen huic Bulbo
inditum ob tomenti copiam, quod lanæ modo in stamina
diduci potest. Hic non omittendus Bulbus parvus vnifolius
aut bifolius barrachoides Penæ, qui recto, gracili caule con-
stat, palmari vel sesquipalmari, vnicum folium aut summū
duo in medio quasi centro sustinente, multis & altis inci-
suris radiatim diuisum Aconiti modo, in cuius medio qua-
si umbilico flos vnicus, herbaceus pallensque, Aprili & Ma-
io cōspicitur, Ellebori prorsum, deinde semen siliquatum
etiam stellatum, & effigie Ellebori: radices Bulbus parvus,
quātus Fumariæ Plinij, admodum acris gustanti. Hunc col-
legisse se ait Pena in collibus Patavio- vicinis, in quibus vi-
pere capiuntur. His atroximus admirabiliorem Bulbum, nō

icnophor, sed *texedon*. De quo hæc legimus in

Nauigationibus Italico sermone cōscriptis, in-
ter quasdam insulas tantam stirpis eleganter ex-
pressæ copiam prouenire, vt naues hanc super-
gredi coactas quandoque remoretur. In fundo
maris crescit, quatuordecim vel quindecim bra-
chiorum longitudine, quatuor vel quinque al-
titudine extra aquam eminens, colore ceræ lu-
tescens, caule sitis crasso, ex quo per intervalla ex-
oriuntur Bulbi, ex fastigiis capillitium quoddam
emittentes. Radix est crassior, bulbosâ, quam plu-
rimis fibris capillata. Bulbus esculentus, vt do-
cet Dioscorides, stomacho & aluo utilis est, ru-
fus, & qui ex Lybia defertur. Amarum verò &
Scillæ similis stomacho utilior est, & concoctio
nem adiuuat. Omnes Bulbi acres sunt, & calfa-
ciunt, & venerè stimulant. Exasperant linguam
& consillas: multum nutriunt, carnes gignunt,
inflationes pariunt. Ad luxata, fracta, articulorū
dolores, & surculos extrahendos illi con-
ducunt. Gangrænis & podagris cum melle & per-
fese, hydropiconumq; tumoribus & canū mor-
sibus similiter cum melle & pipere trito im-
positi profunt. Sudores cohibent & stomachi dolores mitigant: fures & achoras

Bulbus Cu-
ritus mari-
nis.

Locus.

Forma.

Lib. c. 66.
Vires &
Temper.

cum nitro tosto exterunt: sugillata & varos per se, aut cum oui vitello purgant, &
lentigines cum melle aut aceto: fractis articulis vnguibusque ex polenta medetur.
Idem calidis cineribus torrefacti tollunt ficos, item cum cinere è magnarum capi-
tibus impositi. Cremari verò & cum alcyonio misti vitia cutis in facie, & cicatri-
ces nigras in sole illi emaculant: faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed
copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant. Plura de Bulbi vi-
ribus à Plinio prodita sunt his verbis. Bulbi ex aceto & sulphure vulneribus in fa-
cie medentur. Per se verò trieti neruorum contractioni, & ex vino portigini: cum
melle canum morsibus: Erasistrato placet cum pice. Sanguinem idem eos sistere
tradit illitos cum melle. Alij si è naribus fluat, coriandrū & farinā adiciunt. Theo-
dorus & lichenas ex aceto Bulbis curat, & erumpentia in capite cum vino austero
aut ouo. Et Bulbos epiphoris idem illinit, & sic lippitudini medetur. Aequè vitia

Lib. a. c. 91.

quæ sunt in facie, eorum rubentes maxime (id est, siluestres quibus cortex radice rubet) in Sole illiti, cum melle & nitro emendant: lentiginem cum vino, aut cucumi cocto (cum melle vel aceto Dioscorides.) Vulneribus quoque mirè profunt per se, aut (vt Damion) ex mulso, si quinto die soluantur. Isdem & auriculas fractas curat, & testium pituitas. In articulorum doloribus miscent farinam. In vino cocti illiti ventri duriciem præcordiorum emolliunt. Dysentericis in vino ex aqua cælesti temperato dantur. Ad conuulsa intus, cum Silphio pilulis fabæ magnitudine. Ad sudorem tussi illinuntur. Neruis vitiles, ideo & paralyticis dantur (contra Dioscorides monet à largiore eorum cibo abstinendum, *ἀπὸ τοῦ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ ὀφθαλμοῦ*.) Luxata in pedibus qui sunt rufi ex his, citissime sanant cum melle & sale. Venerem maxime Megarici stimulant. Siluestres interaneorum plagas & vitia cum Silphio pilulis deuotius sedant. Et satiuorum semen contra phalangia bibitur in vino. Ipsi ex aceto illinuntur contra serpentium ictus. Semen antiqui bibendum infantiennibus dabant. Flos Bulborū tritus crurum maculas varietatesque igne factas emendat. Dioscles oculos hebetari ab iis putat. Elixos asis minùs vitiles esse adicit, & difficile decoqui ex vi vniuscuiusque naturæ. Bulbine traditur vulneribus mirè vitilis, duntaxat recensibus. Galenus Bulbum edulem frigidiorē & crassiorē esse, lentumque succum procreare scribit: nam & coctū difficile est, & flatuosus, & venerem prouocat. Attamen illius ob amaritudinem simul & adstrictionem, abstergit simul & glutinat, atque etiam exsiccat. Bulbus vomitorius multò est calidioris temperaturæ. Veretrum, inquit Marcellus Empiricus, id est, Bulbus, quod est genus cepæ, in aceto decoquitur, idque acutum ore continetur, vt mobilitas dentium silatur.

Lib. 8. lib.

Cap. 12.

HYACINTHVS. CAP. IIII.

Nomina

Lib. 4. c. 8.

Lib. 6. hist.

cap. 7.

Genera.

Lib. 4. c. 9.

Forma.

Lib. 6. c. 104.

Lib. 2. hist.

cap. 4.

De florib.

cap. 11.

Lib. 10.

Lib. 1. plan.

cap. 104.

Lib. 10.



RACIS *ὑακίνθους*, Latinis Hyacinthus dicitur. Dioscorides vnicum Hyacinthum descripsit. Theophrastus Hyacinthum inter vernos flores recenset, eumque duplicem, tum satiuum, tum siluestrem. Recentiores Herbarij multò plures Hyacinthorū species obseruauerunt. Hyacinthus, vt descripsit Dioscorides, folia Bulbo similia habet: caulem dodrantalem, lauem, miuino digito tenuiorem, viridem, comam incumbentem incuruam, florum purpureoru plenam radicem etiam ipsam Bulbo similem. Quis sit iste Hyacinthus sciri perdifficile est. Ruellius frequentem in Gallia Hyacinthum esse ait, eumque florem à rusticis *Vacet* appellari in quo Romani vocabuli rudimenta quædam relucet, quasi Vaccinum & Vaccinium innuant, quo Vaccini nomine Hyacinthum à Romanis dici inter notha Dioscoridis legimus. Et Seruius, Vaccinium pro Hyacintho Maroni acceptum in carmine, affirmat. Dodonæus etiam Hyacinthum *Vacet* Gallici nomine descripsit, foliis oblongis, angustis, lauibis, & splendentibus, Porri, sed minoribus: caule glabro, terete, cuius coma florum pondete & mole, cum primum dehiscere incipiunt, grauata, deorsum incuruatur: floribus oblongis, rotundis, concavis, in latius se pandentibus, per oras reflexis, colore plurimum cæruleis, nonnunquam albicantibus, aut candidis siue niueis, aliquando purpureis: semine in siliquis triangularibus paruo, rotundo, nigro: radice torrida, bulbosa, candida, lento succo, vti & tota herba, plena. Cordus in Germania repenti scribit in apricis quibusdam tumulis. Dodonæus in Belgio etiam in aruis, & iuxta agrorum margines fruticibus aut arboribus confitos, & præcipue quidem prope Mechliniam urbem, ibique copiose nasci: florere Aprili & Maio mense. Hunc esse Dioscoridis Hyacinthum citra adiectionem autumat: item eum cuius meminit Columella, diuersitatem coloris quæ est in floribus vno vetriculo complexus,

Nec non vel nuceos, vel ceruleos Hyacinthos.

HYACINTHVS, Dodon.



Ipse Dodonæus Hyacinthum non scriptum vocat, ad differentiam alterius, nempe scripti, qui luctus notas inscriptas habet. Pena & Lobellius Anglicū & Belgicum quia nusquam maiori copia provenit, quàm in Anglia & Belgio. Matthiolus Hyacinthum pinxit, quem Bulbum esse diximus: item aliū, quem Orientalem vocat, eumq; duplicem, quòd ex Orientalibus regionibus ad Cortulū missus sit: alij Grecum nuncupant. Dodonæus priorem Orientalem & legitimum à Vacet Gallico, siue Jacynth Germanico non distinguit, nisi quòd hic minor ac magis serotinus est, ille maior ac præcocior. Et reueratū inter sese similes sunt duo isti Orientales Hyacinthi, tum ab Hyacintho non scripto Dodonæi non multū diuersi, teste etiam Pena, qui hos Parauij primū se vidisse ait: floribus tamen, foliis & bulbo distinguuntur. Hos Lobellius felicis & accuratius multo expressit. Prioris, qui Hyacinthus Orientalis Græcus ab eo dicitur, triplex differentia folio & flore: angustifolius, latifolius, & polyanthes alter seumior. Cū defloruerit duntaxat, maculis vipereis caulis variat. Præcox dilutior est flore: serotinus saturatiore, hilari, cæruleo, amæno. Hyacinthus Orientalis, maior polyanthes, quem mutilum & deprauatum Matthiolus pinxit, ut ait Lobellius, à medio cubitali caule ad summum vsque, in vnā partem vergente florum per amænorum, cæruleorum ordine decoratur, eximæ magnitudinis, ca-

In cap. 18. lib. 4.

De flo. c. 12.

HYACINTHVS Dioscoridi:

non scriptus, Dodonæo.



HYACINTHVS Orientalis

Græcus, Lobellij.



lathus, seu alabastris parvis similia: folia latiora: bulbis Narcissi par. Lobellus in Appendice Hyacinthum alium Orientalem, brumalem, album Louanio à Cornel. Gemma Medico ostendit cum hac fere descriptione. Rarum hoc atque exoticum videtur Hyacinthi genus: nam et si foliorum & florum forma cum pluri-

HYACINTHVS Orientalis
maior polyanthes,
Lobel.



HYACINTHVS brumalis,
Orientalis Gemmae.
L.



que aliis conueniat, id tamen sibi vendicat singulare, quod statim sub folijs hybernum tropicon terra erumpat, caulem quoque protrudens interdum per medias nives: florem quoque venustissimum edat circa principium Ianuarij, vel fine Decembris fere ad medium vsque mensis Martij: folia sunt, non vt ceteris laxa & mollia, sed succulenta, spissa, ac fere semper erecta vt in generibus Azzoi. Nerui in his nulli conspicui, sed striæ solummodo rectæ, ac veluti tenues fibræ. Durant autem virore constante vsque ad finem Iunij, ac multò diutius quàm in cæteris: flos leni caule, non nihil circa fastigia ad pediculos singulos excauata, propendet candidus, non nihil tamen sub initia, & circa supremas oras quiddam subæruleum leuiter præ se ferens, quo quidem euanescente sensim Februario mense totus fit lacteus, odore fragrantissimus, in ea specie deinceps mense plus integro perseverans. Radix bulbosa, intus candida, foris rufa, circa foliorum exortus maculas quasdam, quales in Serpentariæ maioris caule spectantur, effundit, interfusæ purpura nigro. Verùm id maxime sub Veris auspiciis, & cum terræ rursus mandata caulem emeritum gerit. Hæc Lobellus ex Gemma. Poëticum Hyacinthum, vt scribit Plinius, comitatur fabula duplex, luctum præferens eius quem Apollo dilexit, aut ex Aiacis cruore editi, na ducurrentibus venis, vt Græcarum literarum figura, A I, legatur incripta. Quam duplicem fabulam Ouidius in vnâ contraxit, & A I, literarum figuram, non Aiace, sed Apollinis luctum referte dicit. Versus eius hi sunt.

Err

HYACINTHVS Orientalis, I. Matth.



HYACINTHVS Orientalis, II. Matth.



Ecce cruor, qui fusus humi signauerat herbas,
Definit esse cruor, Tynoque niteuit oſtro
Flos ortu: formamq; capie quam Lilia ſi non
Purpureus color his, argenteus eſſet in illis.
Nō ſatis hoc Phæbo eſti, n̄ enim ſue anchor honoru.)
Ipſe ſuos gemtuſ ſolus inſcripſit, & At, di,
Flos habet inſcriptum ſuntetiſque litera ducta eſt.

Hic tamen etiam Apollo de altera fabula vaticinatur his verſibus.

Floſque nouus ſcripto gemitus imitabere noſtros.
Tempus & illud erat, quo ſe fortiffimus heros
Addit in hunc florem, ſoloque legitur eodem.

Huius Hyacinthi meminit etiā Theocritus:

Νῦν ὑακινθὲ ἀγλαὲ τῇ σα γράμματα, καὶ πάλιν αἶμα,
Ἀνὰ λαντὸν τοῖς ἀνδράσι.

Poëticum illū Hyacinthum Dodonæus neſcit minus eſſe cenſet, vt iam in nouimus, quod ex ſanguine Hyacinthi adoleſcentis ruber flos ortus ſit, eademque de cauſa à Poëtis Latinis ferrugineum cognominari, vt à Vergilio.

Et pinquens ſedam, & ferrugineus Hyacinthos,
Et a Columella.

Syrpiculum ferrugineus cumulare Hyacinthis.

Ferrugineum verò Hyacinthum dici, quod ad ſimilitudinē ferruginis rubeat. Eſt autē ferrugo, inquit, ferri corruptela, velut æris rubigo, quæ a colore ſubrubente rubigo appellatur: vnde & ferrugineus color, inſtar ferruginis rubens. Sunt qui velint ferrugineum Hyacinthum appellari, quaſi ſagubrem & funeſtum: aiunt enim ferrugineum fuſcum eſſe & ſubobſcurum colorem, Vergiliūq; cū ferrugineum uocinat Hyacinthum ad ſabulam eius alludere, quæ Hyacinthum ex ſanguine Hyacinthi adoleſcentis natum fingit ferrugineam etiam ab eo dici Charontis funeſtā & luſtuofam cymbam. Sed his cōtradiceſe videtur ipſe Vergilius ſcribens Hyacinthum ſuauiſſe, id eſt, non intenſe rubere his verſibus.

Et me Phœbus amat, Phæbo ſua ſemper apud me
Munera ſunt Læuri, & ſauæ rubens Hyacinthus.

In qua ſignificatione Quidium loco ſuperius adducto purpureum dixiſſe Dodonæus putat, quod purpureus omnis qui rubet color in floribus nominari conſueuerit. At Plinius purpureas violas, quas Vergilius nigtas vocat, ſola, Græco nomine à cæteris diſcerni, appellariq; ſa, & ab his lanchinam veſtem, & colorem purpureum qui in viola, lanchinum nuncupat his verbis. In quibus vnguento viciffè naturam gaudens luxuria, veſtibus quoque prouocauit eos flores, qui colore commendantur. Hos autē

Lib. 12. Metamor.

Idill. 19.

Lib. 1. huius cap. 19.
De florib. cap. 19.

Lib. 4. Georg.

Lib. 10.

Eclog. 3.

De florib. cap. 19.

Lib. 31. c. 6.

Idill. 12. 13.

maduerto tres esse principales: vnum in cocco, qui in rosis micat. Gratius nihil traditur aspectu, & in purpura Tyria, dibaphâq; ac Laconica. Aliū in Amethylo qui in viola: & ipse in purpureum, quēque Ianthinum appellauimus, &c. Hic violarum Martiarū color violaceus perspicue intelligitur, vbi rubor nullus. Quare non omnis purpureus in floribus color rubet, vt sentit Dodonæus. Quod autem Hyacinthinus color Ianthino vt voce, ita re similis sit, id est, violaceus, nō cruentus à cruore, ostri Tyrij color violaceus, siue Ianthinus apertè demonstrat, cui laus summa, inquit Plinius, color sanguinis cōcreti, nigricans aspectu. Idēq; suspectu resulgens. Eundem colorem violaceum ostentat purpura, cuius sanies, inquit Penna, ex violaceo rancillūm rubet. Vnde apud Vergiliū suaue rubens Hyacinthus dicitur. At Lilio purpureo non suauiter rubent flores, sed flammeo, siue luteo saturato rutilant, vt diximus. Porro ferrugine tinctum Ibera cū canit Poëta, innuit colorem, quem politæ casides igni calefactæ, aut candefactæ simulac frigescent,

Lib. 9. c. 38.
In Aduers.

HYACINTHVS Poë-
ticus, Penna & Lobellij.



violaceum rubidum, nitidum cōtrahunt, Galli vocant *Brunissure*. De quo etiam ferrugineas violas dixit Claudianus, neutiquam, vt putarunt, funestas aut lugubres intelligens: nam Virgilij versus contrarium indicat,

Pictus acu chlamydem, & ferrugine darus Ibera.

Quare alium à Lilio purpureo Hyacinthum poëticum proposuerunt Penna & Lobellius, qui magnam cum Lilio, Iride, & Gladiolo similitudinem habet. Flore etenim, semine, vniuerso caule & filiqua Iridem refert, bulbo, foliis porraceis, colore Ianthino Hyacinthum, foliorum similitudine Gladiolū, quem in Angliæ, Flandriæq; viretis passim videri ait. Hanc plantam Clusius à Lobellio ad se missam Iridis bulbosæ genus facit, cuius iconem à Lobellio expressam omisit: sed descripsit folio crassiore & veluti cepaceo, viridiorē, parte interiore canaliculato & candido, multisq; veluti bulbis argenteis resperso: caule crassiore & firmitiore, quem, vt in aliis Iridum bulbosæ ū generibus, amplectuntur folia quaterna, aut quina. Hic ex vaginulis binos flores exerit inuicem succedentes, quā in aliis Iridibus bulbosis maiores & latiores,

prorsus violaceo & elegantissimo colore, in odori tamen, quibus pro fimbria, lutea macula est, vt in reliquis succedunt binæ filiquæ magnæ, laxæ, in quibus semē reliquis maius, erui vulgaris magnitudine, pallidum, rotundum, rugosum, quod maturum, in filiquis, si quæuantur, sonum edit: radix est reliquis maior, & multis membranis tenacioribus nigricantibusque circūuestita, quæ nucleis etiam separatur, sed nō tam copiosis, atque in varia Iride & lutea, quæ singulis annis quinque aut sex huiusmodi nucleos deponunt. Floret quo reliquæ tempore. Verisimile est Hispanicis nauibus primū ex Hispania, aut Lusitania in Angliam delatam. Idem Lobellius Hyacinthum Poëticum luteum pictum dedit, à superiore nulla prorsus nota discrepantem, nisi floris colore, qui in hoc luteus est, in illo violaceus. Herbarij, vt diximus, multos alios Hyacinthos esse iudicant, spurios à Dodonæo vocatos: quorum primus folia habet angustā, quasi rotundā, bene virentia, per terrā magna parte strata: cauliculos inter ea rotundos, glabros, palmo longiores, in quorū summo

De florib.
cap. 54.

lumino flosculi parui, rotundi, caui, hiantes, colore caruleo, aliàs diluto, aliàs saturato: post quos siliquæ membranosæ, in quibus semen paruum, nigrum: radix subest bulbosa. Peregrinus Belgis hic Bulbus est, inquit Dodonæus, neque vsquam illic suas sponte nascitur: in hortis satis facillè comprehendit, & in plures bulbos citò multiplicatur. Folia ante Hyemem exeunt, cauliculi primo Vere, flores Martio. Hunc Hyacinthum Lobellius & Pena Hyacinthum comosum minorem vocat, ad verum Dioscoridis proxime accedentem, qui in toto Meridiano tractu multò frequentissimus est, Septentrionalibus, in hortis tantum. Vere ornata etiora, agrorumque margines herbidos, flosculis item venustis, & in comâ perspicuam per versus congestis, lagenulas numerosas & admodum exiles, confertas & parulas ostendantibus: vnde vulgus Prouincialium *Barrelets* vocat, quasi lagenulas. Cauliculus est sesquipalmi altis: foliis iunceis, tenerioribus, sparsis, striatis. Dodonæo Bulbi esculenti genus esse videtur, Hyacinthum siluestrem vocat Cordus, Tragus Hyacinthum exiguum, Herbarij Hyacinthum botryoideum. Hyacinthum etiam Fuchsius appellat, & alterâ

Cap. 23.

eius speciem facit, de qua mox: quem tamen Fuchsius foliis non ita iunceis, & serè rotundis, sed latiusculis & striatis depingit, & Hyacinthum caruleum maiorem nuncupauit. Alterum Neoteriicorum Hyacinthum superiori similem pro Marthioli Bulbo vomitorio præcedenti capite descripsimus, depinximusque. Tertius inter spurios Hyacinthos is est, quem Fuchsius, Matthiolus, Tragus primâ Hyacinthi speciem ponunt, quem Bulbum esculentum, siue Bulbum hortensem, & Allium caninum vulgò nominatū fuisse ex Dodonæo diximus. Sunt qui velint Scillæ, aut Pancratij speciem esse: quorum iudicium Dodonæus non probat, quòd Scillæ & Pancratij bulbi grandes sint, huius autem paruus, & si cum illis conferas exiguus. Pena & Lobellius hunc Hyacinthum spurium, siue recentiorum, tertium Dodonæi, vel Dioscoridis geminum esse arbitrantur, vel certè quàm maxime ad illum accedere. Etenim foliis est porraceis, Bulbi vomitorij latioribus, in terram reflexis: caule albicante, lzui, herbaceo, tenero, in quo à medio à summum vsque numerosi flosculi vtrinque congesti, oblongi, purpurei, ex paruulis petiolis, qui superne comosam umbellam, latiusculam, deorsum vergentem & incuruam efficiunt, purpuream violaceam, suau rubore permixto. Radix cepacea,

Ca. de Bulbo.

Lib. 4. hist. cap. 76.

HYACINTHVS comosus minor. Bulbus Plinij.



HYACINTHVS caruleus maior, Fuchsij.



DIPCAD Chalcedonicum,
Bulbus vomitorius, Matth.

DIPCAD candidus floribus,
Lobellij.



veluti pinnata capitula, in quibus semen continetur nigrum, rotundum, magnitudine orobi. Radix subest magna, albicans, multis tunicis ceparum ritu contexta, & frequētibus crassis fibris lignosis, viuacibus subtr̃s firmata. Huius notitiā Cortuso acceptam refert, qui in Belgiū misit Tibcadi nomine. Constantinopoli semper missa fuit Mulcari appellatione, ob insignē

HYACINTHVS Autumnalis, Dodon.



odoris suauitatem, quæ ad moschum accedere videtur, vel potius ad pastillorum fragrantiam, qui ex Beniuiuo & alijs odoratis fieri solent. Lobellius Dipcadi Chalcedonicū vocat, Matthiolus Bulbum vomitorium. Idem Lobellius alterum Dipcadi floribus candidis pictum dedit, cuius varietas gemina. Quæ niueo cādore, alicubi & purpura diluta conspiciuntur, folia supernè latiora ferunt. Floribus ex caruleo virentibus alioqui superioribus similis in hortis Belgicis visitur. Quartus ex spuris Hyacinthis est, Orientalis alter à Matth. nominatus: foliis oblongis & latis: caule longiusculo, ab imo ferè vsq; ad summum flosculis circūuestito: radice bulbosa, cuius imaginem solam Matthiolus expressit. Quintus Hyacinthus serotinus est, foliis angustis, paruis & minoribus quā primis cauliculis breuibus, tres aut quatuor digitos altis: flosculis in summo raris, ceruleis: staminibus in medio exiguis: semine in siliquis triangularibus exiguo: radice parua & bulbosa. Nascitur in Galliz quibusdam prouincijs, vt iuxta Parisiorum



florum Lutetiæ. Floret exitu Æstatis Augusto, aut Septembri. Autumnalem Hyacinthum ea de causâ & serotinum nominant. Tiphium Theophrasti à nobis cap. superiore descriptum videtur esse. Hunc eundem Hyacinthum minimum, sed pulchellum scribit Pena se primum omnium Autumnalis donatū nomine Antuerpiam è Veronenſi agro miſiſſe: plurimū poſtea etiam Lutetiæ Pariſiorū, & Narbonæ ad Aquas Marianas, & ad Cellam nouam Monſpelij à ſe viſum, glareosis, aſperis, Autumno incunſe, non Vere, vt ſuperiores: nō ſoſculos lagenis ſimiles edere, ſed radiatos, quinis, ſenis ve foliolis, cæruleis, Ornithogali minoribus. Cætera præſus eadem, ſed minora. Eius aliud genus Cluſius obſeruauit, altius, maiore bulbo, latioribus foliis & numeroſiore flore. Floret maturiùs aliquantò ſuperiore. Quare ad Tiphium Theophrasti, de quo in cap. de Bulbis diximus, propiùs videtur accedere. Eſt & Hyacinthus ſtellaris albicans, ſerotinus Lobellij, foliis exilioribus: flore aſpectu iucundo, albicante. Serius hic floret. Ex Biſcayæ montibus in Belgium delatus eſt. Item alius Hyacinthus ſtellaris, Lilifolius, floridus Muroni, à Lobello depictus: & Liliaceus Hyacinthus, ſiue ſtellaris Hyacinthus Liriophyllus, ex Biſcayæ montibus itidem aſportatus, rarus & perelegans, appoſitè Liliaceus dictus: radix enim eſt ſicuti Lilij bulbus, ſed minor & oblongior flaueſcens: folia Lilio candido

HYACINTHVS Stellaris albicans, Lobellij.



HYACINTHVS Stellaris alius Lilifolius.



ſimilima

HYACINTHVS Liliaceus, Lobelij.



simillima, sena, aut septena, inter quæ inediis exilit sine foliis spithameus caulis, in cuius summo flores Hyacinthi stellaris in cæruleo purpurei. Præter hos, & alios duos descripsit pro Hyacinthis Fuchsius. Vnum foliis ternis, alterum binis, latiusculis, Porri minoribus: floribus circa cauliculi summum sparsis, multum & radiantis stellæ ferè similitudine parentibus, colore in priore cæruleis, in altero candicantibus: quibus succedunt capitula rotunda, ochri magnitudine, in quibus semen milio simile: radice rotunda, bulbosâ. Priorem Hyacinthum cæruleum marem minorem Fuchsius appellat, alterum Hyacinthum albicantem, seu feminâ: plerique à floris effigie Hyacinthum stellatum. Pena & Lobellius Hyacinthum Germanicum Liliflorum stellarem. Dodonæus Satyrii genera esse aliquando existimauit: quam sententiam postea retractauit, quod Satyrio caulis sit cubitalis, folia Lilij, bulbus mali magnitudine, bulbo verò isti folia paruula, angusta, bulbus exiguus, cauliculus brevis. Reperitur vterque in plerisque Germaniæ locis, lato pingui, sed

Ca. 113 hist.

Lib. 1. hist. cap. 48. De florib. cap. 92.

inculto solo. Martio, quandoque etiam Februario flos exir. Alium Hyacinthum ex Dalechampio hic pinximus, latifolium cognominatum, qui in Monte Aureo Aruennæ sponte crescit: radice corticosâ, Lilio simili: foliis sex, aut octo, nigricantibus, crassis, latis, Lilij ferè: floribus purpureis elegantibus, particularim scilicet

HYACINTHVS Cæruleus mas minor, Fuchf.

HYACINTHVS Albicans, seu femina, Fuchf.



HYACINTHVS La-
tifolius, Dalechamp.

Li. 1. c. 1.
Vng.

Li. 11. c. 16.

Li. 2. simpl.



expandentibus: semine in capitulis rotundis, herbaceis. Dioscorides tradit Hyacinthi radicē pueris cum vino albo impositam impuberes seruare, vt creditur. Sistere autem aluum, & vrinam ducere potam. Opitulari demorsis à phalangio. At semen altringentius esse, & thieracis expetitum regium morbum expurgare cum vino potum. Quæ Plinius produxit his verbis. Hyacinthi radix est bulbacea, mangonicis venalitis pulchre notæ: quæ è vino dulci illita pubertatem coërcet, & non patitur erumpere. Torminibus & araneorum moribus resistit. Vrinam impellit. Contra serpentes & scorpiones, morbumque regium semen eius cum abrotono datur. Galenus, Hyacinthi radix bullosa est, inquit, ordinis primi in desiccando, secundi verò completi, aut tertij incipientis refectando. Itaque pueros diutissime seruare impuberes creditur illita. Fructus leuiter extergit & adstringit. Quamobrem & ipse regio morbo laborantibus exhibetur in vino, ordine quidem tertio desiccans, cæterum in medio consistens caliditatis ac frigiditatis.

NARCISSVS.

CAP. V.

Nomina

HYACINTHIS congener est *νάρκισσος* Græcis, Narcissus Latinis, Arabibus *Narcas*, seu *Nargies* dictus, Gallis *Narcisse*, & *Iannette*, Italis & Hispanis *Narcisso*, non à Narcisso adolescente, nimium superius amante, vt fabulantur Poëtæ, sed à vi stupefaciendi & sopiendi, quam Græci *νάρκωσις* appellant, & *νάρκη*, quod & Torpedini piscei nomen, quia eiusus stupidam tangentis manum efficiat: qualem vim inimicam nervis & caput grauantem Narcisso inesse testatur Plinius, item Plutarchus his verbis. Καὶ τὸν νάρκισσον ὕπνους ἀνίστασιν, καὶ ἀναιδούντι τὰ μέτρα, καὶ βαρύτερας ἐμπεσόντα νάρκαδός, εὖδὲ ἢ σοφιστὰς αἰσίοι ἀρχαῖοι μεγάλῃ θῆσιν περὶ αὐτοῦ, τυτὶσι τῶν χθονίων προσεγγίζουσι. Id est, Narcissum nominarunt, quia nervos hebetet, & torpida grauitates efficiat. Quare Sophocles ipsum velut magnorum Deorum subterraneorum coronamentum vocauit. Quod hi torpeant, vt pote mortui. Theophrastus & Dioscorides Narcissum eūδ *λίαν* appellari scripsere, Apuleius *άνδρον, βολβόν ἐμεικτόν, ἀλυσανόν*. *Άνδρον* quidem montanum, quod procul ab aquis proueniat: *βολβόν ἐμεικτόν* ab effectu, quod vomitum cieat. Est tamen alius Bulbus vomitorius propriè dictus, de quo diximus. *Αύσανις*, id est, à seipso genitus, vel per se nascens, quod sponte germinet. *Λίαν* etiam Liliū dicitur: & Iulius Pollux *λίαν* appellatione Homerum omne genus florū comprehendere auctor est. Narcissi genera duo potauit Dioscorides, vtramque flore albo, sed vnum intus troceum, alterum intus purpureum. Plinius de Narcisso cum Liliis tractat, & hunc ab illis ita distinguit. Sunt & purpurea Lilia, aliquando gemino caule, carnosiore tantum radice, maiorisque bulbi, sed vnus: Narcissum vocant. Huius alterum genus flore candido, calice purpureo. Differentia Liliis est & hæc, quod Narcissis folia in radice sunt, probatissimis in Lycis montibus. Tertio generi cætera eadem, calix herbaceus. Omnes serotini: post Arcturum enim florēt, ac per æquinoctium Autumni. Clariùs aliquando possēt de iisdem agere Narcissi

Lib. 11. c. 16.
Symp.

Li. 4. c. 11.

Genera.
Lib. 1. c. 1.

τὸτε τὰ φύλλα ἀνέλκῃ. Quæ sic conuertit Gaza. Mirum quod in Scilla Narcissifolij: euenit: cæterorum enim tam recens farorum, quàm regerminantium, suo tempore folium oritur, deinde caulis exit. In his verò caulis prius, & Narcissi quidem floris tantum caulis protinus exit: flos enim eius plurimum festinat, Scillæ autem caulis per se prius, tum flos ex eo emergens insidit, eadẽmque florum prouentus ternos ostendit: quorum primus tempus arandi primum significare videtur, secundus medium, tertius nouissimum: quot enim fuerint isti, totidẽ & arandi tempora ferme occurrunt. Sed cum ita senuerit, tunc foliorum exortus multis postea diebus incepat. Idem in Narcisso fieri solet, nisi quod nec aliam caulem præterquam floris proprium habet, vt diximus, neque fructum conspicuum parit, sed ipse flos vna cum caule definit, & cum reflorescit, legendum, cum exaruerit) tunc folia exeunt. In his quidem, inquit Dodonæus, Scillæ caulem florum ternos exortus ostendere Theophrastus scribit: Narcissum autem caulem non habere alterum iuxta eum qui floris est: her autem non potest, vt ex eodem caule ter floreat. Quare tres differentes bulbos esse consequitur, quibus temporibus floreant, vti Narcissum Mediopurpureum facere iam diximus. Hunc etiam ter florentem existimare possunt, qui vno eodemque loco reperiunt, & differentes bulbos esse non animaduertunt. Sed vbi cumque hoc Theophrasti loco *ναρκισσος* legitur, Plinius *κρόκος* leg. t. Notabilis & Scillæ Croci que natura, quod cum omnes herbæ folium primum emittant, mox in caulem rotundentur (alij protrudantur) in his caulis prior intelligitur (alij impellitur) quam folium. Et in Croco quidem flos impellitur caule: in Scilla verò caulis exit, deinde flos ex eo emergit. Eadẽmque ter floret, vt diximus, tria tempora satiorum (Theophrastus habet arationis) ostendens. Secundi verò & potissimum tertij Narcissi Ouidius meminit, vbi Narcissi formosi adolescentis mutationem in floribus sui nominis describit his versibus.

Liliaceæ.

NARCISSVS totus
albus, Dodonæus.



Nusquam corpus erat, crocum pro corpore florem
Inueniunt, folius medium cingentibus albis.

De tertio verò ea scripsisse Theophrastum putat quæ suprà citauimus, & diuerso ab eo cuius lib. 7. meminit. Hic enim folium ei tribuit *τῶν*, id est, angustum, quale vti que primus Narcissus habet: illic verò folium *ἀσφοδιῶδες*, *πλεονέκρον* *ἀλὶ πάλυ*, *ἔσθ' ἀπὲρ ὁ κρινώϊα*, id est, folium Asphodelo simile, multò latius Liliij modo: vt diuersis locis de diuersis Narcissis Theophrastum scripsisse perspicuum sit. Eodem verò Theophrasti loco paulò antè à nobis citato Dodonæus pro *μύλον τῷ χροῖ*, legendum censet *μύλον*, id est, luteus, vt non niger, sed luteus Narcissi flos intelligatur. At locum aliter emendandum, & de semine Narcissi, non de flore, hæc verba accipienda esse demonstrauimus. Præterea quartus quidem est Narcissus Dodonæo, antedictis forma similis, sed per totum florem & medio quoque candidus: quem etiam Clusius depinxit folijs oblongis, viridibus, ternis, aut quaternis, e quorum medio caulis satis latus, angulosus tamen & concauus exit, cui insident seni, septeni, interdum deni flores oblongi & omnino

Cap. 11.

4. Narcif.

Lil. 5. sup.
Hup. c. 1.

candidi, quotum videlicet calix, qui in alio luteus, etiam albus est & odoratus: dix superioribus similis. Sunt & Narcissi multiplicibus floribus, inquit Dodonæus, tum primi, tum alterius generis, foliis & bulbis aliis haud dissimiles. Ita varia semper natura, & ad stirpiū genera multiplicanda fecunda, tum ad ea permutanda prona, præfertim si cultus mangonio adiuuetur, vel in alium locum stupes transferantur: hæc enim ad stirpiū mutationes plurimū possunt. Idē Pena asserit cultum lenocinio Narcissum variatis foliis, floribus & bulbis posse admodum a pristina esse deservire, seseq; audire in mediū apud Venetos, quodam stirpium mangoni, 10 die. bulbi seminibus subfusa, vel insertis pullulationibus non & miras excitare figuras. Clusius Narcissum etiā flore multiplici depinxit, laniatū, & quodammodo catenatis foliis, multiplici flore: quia medius ille calix luteus tectiora ex candida folia sic interfecat & distinguit, ut calicis formam amplius non

NARCISVS flore
multiplex, Clusij.



NARCISVS Iuncifolius, Dodon.



servet, sed veluti apophysis quædā lutea ad singula folia adnata videantur. Odoratissimus est flos iste, & graevine quadā caput tentans. Dodonæus Narcissum annumerat plantā, quā Hispani, à similitudine quā folia cū iuncis habet, in quos vocat: unde Narcissum Iuncifoliū appellat. Folia huic oblonga, angusta, crassa, interim propemodū rotunda, admodū lævia & flexibilia, iunctis cū leniore, cō colore, & quodāmodo flexibilitate, nec nō rotunditate similia, inter quæ caulis medius exir, in cuius vertice flosculi tres, aut quatuor, vel plures, odorati. Narcissis forma similes, verū minores, & colore per totū florē lutei: radix bulbosa, candida, tenuis, nigra membrana integitur. Nascitur pleriq; Hispaniæ locis sua ponte. In Belgio Aprili mense florem promit. Hunc Bedonius vocat, id est, Bulbum vomitorium. Diosc. esse cōtendit Dodonæus, quod eius descriptio huic Narcisso similis est. Etenim folia ei sunt multo quàm alterius Bulbi Iuncifolij, id est, Bedoniorum, utpote iuncis propemodū lenioris, & perquam longa, longiorēque multo quàm esculenti Bulbi, & radix in tenui nigra membrana reconditur. Hanc plantam Narcissi Iuncifolij alterius & per alio nomine descriptū se videtur Clusius

De florib.
cap. 46.

L. J. stirp.
Halsp. 2.

Prior

Priorem verò luncifolium depinxit & descripsit aliquantulum diuersum. Huic, inquit, ovata aut ovato-lanceolata folia, oblonga, angusta, carnosa, & propemodum rotunda, & modiolis, laevore, colore, & flexu, illic quodammodo similia, nec per se in caulis, rotundus, caui, abiq. foliis, in cuius sum-

NARCISSVS luncifolius
prior, Ta.



NARCISSVS montanus luncifolius minimus, Lobell.



mo ex tenui quadam membrana flores quatuor, quinque aut sex prodeunt oblongi (germina interdum forma Narcissus similes, sed odoratiore), & ornato luteo, hoc est, clauso calice, quatuor ab internodiis eius foliis, quae tunc mucronata, nunc quodammodo circinata conspiciuntur. His succedunt triplex triangulares, sed obtusis angulis, semine nigro & anguloso pleni, ut in Narcissis, verum minore. Radix parva, bulbosa, candida, nutrimentis densis, montana in ista. Non sponte nascitur in pratis montana non procul Tolosa, & circa Guadalupam Clusius. Alterum es Dodonaeo proxime descripto, videretur inter Hispaniam & Gadest locis cum ipso flore te esse ante mense Ianuario: in Belgio quoque in Aprili utrunque flores, interdum etiam media hieme. Quare Lobellius Narcissum luncifolium Dodonaei, qui alter est & pulcherrimus Clusii Narcissum luncifolium luteum praevochum vocat. Narcissum luncifolium priorem Clusius appellat Narcissum luncifolium setoninum, paucioribus foliis & floribus duntaxat diuersum: tamen pictura plura in hoc quam in alio folia demonstrat. Addit Lobellius in Appendice Narcissum montanum luncifolium minimum. Palmari est longitudine, tenuibus foliolis, iuncis multo exilioribus, interdum erectis, interdum ad terram reflexis: inter quae cauliculus palmatis erumpit, in cuius summo ex tenui, instar ceterorum Narcissorum, consimili membrana flos singularis luteus vulgato Narcisso montano simili, & penè par, aspectu suavisimo & hilariore, cui siliqua Narcissi succedit Radicis bulbus quatuor nucis Ponticae nucleus. In figulinis servatur & colitur. Huic subdit idem Lobellius tres alios Narcissos. Primum Narcissum montanum luncifolium minimum alterum, flore luteo limbato: rugosis plicis, limbatisque floribus ex montibus Byssaicae, alioqui non differt à superiore. Alter est Narcissus montanus omnium minimus Hispanicus, flore Narcissi lutei, sed albo. Tertius est Narcissus luncifolius, flore circinatae rotunditatis roseo. His addunt Dodonaeus & Clusius Narcissum, quem Autumnalem minorem vocant. Planta est digitalis, inquit Clusius, vnicum

7 Narcissus



Narcissus montanus strobilatus esculentus.

Narcissus montanus unicus folius minimus alter, Lob.

Narcissus unicus folius flore rotundo roseo, Lob.



cauliculus gracilem & vacuum fetens, & in summo florem album Narcissus montanum, sex foliolis constantem, & in medio caliculus luteum: siliqua angulosa, men nigra, exiguum, angulosum continet: radix Narcissi unicus folii, minor tamen bulbosa, multis tunicis candidis, lentoque maturo coarctantibus costans, quam ambit membrana quadam nigra. Tota planta amara est. Narcissus plerumque ad Anam flumen in Turcia, floretque sine ullis foliis sub Octobris fine, & tunc Tonnanda dicitur. His addi potest, inquit Clusius, & is quem nonnulli Narcissum vocant, tamen si flore Narcisso dissimili: foliis quinque aut senis, oblongis, & pollicem latis, per virore ferè nigricantibus & splendentibus, humi sparsim inter quæ brevis exit pediculus potius quam caulis, florem suo cacumine fetens luteum, Colchici forma, sex foliis constantem (quorum tria maxima, alia tria interiora, quæ minora sunt, amplectuntur) ex membrana veluti vasculo prodeberantem, intra quem sex stamina cum suis apicibus & medio pistillo videre licet: radice cæssa, rotunda, intus candida, foris ut in reliquis Narcissis nigricante. Sub Augusti finem & Septembris germinare incipit, & plerumque floret. Gaudet montosis quibusdam Hispaniæ pratis. Vide quæ de eo scripsi nus capite De Saxifraga.

NARCISSVS *Autumnalis*
quorundam, ex Clusio.

Ibidem.
3. Narcissus.

3. Narcissus.

Narcissus autumnalis, tamen si flore Narcisso dissimili: foliis quinque aut senis, oblongis, & pollicem latis, per virore ferè nigricantibus & splendentibus, humi sparsim inter quæ brevis exit pediculus potius quam caulis, florem suo cacumine fetens luteum, Colchici forma, sex foliis constantem (quorum tria maxima, alia tria interiora, quæ minora sunt, amplectuntur) ex membrana veluti vasculo prodeberantem, intra quem sex stamina cum suis apicibus & medio pistillo videre licet: radice cæssa, rotunda, intus candida, foris ut in reliquis Narcissis nigricante. Sub Augusti finem & Septembris germinare incipit, & plerumque floret. Gaudet montosis quibusdam Hispaniæ pratis. Vide quæ de eo scripsi nus capite De Saxifraga. Appellant & Narcissum totum luteum, siue

Narcissum

NARCISSVS luteus
siluestris, Dodonai.



Narcissum montanum Theophrasti, siue Narcissum siluestre, siue Pseudonarcissum, qui Gallis Coquelourde dicitur, Hispanis Campanilla, Germanis Geelturnungs blumen, Belgis Oecl Tydelosen. Folia Porri aut Narcissi similia habet, sed breuiora ac minora: caules dodrantales, atque in singulis flores singulos Narcissi similes, sed medio eorum calice longiore, oblongioris calarhi similitudine, colore in totum luteo, absque odore: capitula rotunda, oblonga. Nemorosa Angliæ Belgique prae istis scant, auctore Pena, Februario mense & Martio. In regionibus Meridiei propioribus, vt Narbona, Vasconia, Hispania, non nisi editis montibus nascitur, & Maio solumq; floret, vt in Venganis, Mindenis, Pyrenæisq; iugis non procul Tholosa, inodorus, inefficacior, nec perinde narcisin ineluit. Codion Theophrasti nonnulli esse opinantur, pro quo inepte in vulgatis codicibus Codiaminon legitur, vt dudum annotauimus in libro de iis quæ

In Adverf.

flore placent: quidam Bulbum vomitorium. Narcissi siluestris lutei species est Narcissus multiplex, quem hic proponimus ex eodem Dodonæo, ab illo solo flore foemultiplicante discrepans: colore etenim totus luteus est: folia quoque ac bulbi inueniunt. Alius est Narcissus flore multiplici, quem ex Clusio paulò antè depinamus. Multos etiam Narcissos Matthiolus exhibet sine vllis descriptionibus, quos tamen excepto primo non Narcissos, sed omnino alterius generis flores esse iu-

NARCISSVS luteus multiplex,
Dodonai.



NARCISSVS Constantinopolis.
1. Matthioli.



dicat

De florib.
cap. 65.

dicat Dodonæus. Nam quos secundo, tertio, & octavo locis depinxit, Scillarum aut Bulborum litoralium species videntur, quales in Gallia Narbonensi plerisque locis, & alibi proveniunt. Quartus similis est illi Bulbo, quem Marcellus capite de Narcisso in commentariis describit his verbis. Nos in Apennini montibus his

NARCISSVS II.

Martholi.



NARCISSVS III.

Martholi.



NARCISSVS III. (con)

tinopolitanus, Marth.



NARCISSVS V.

Martholi.



nostris,



nostris frequentem vidimus, florem Augusto & Septembri mensibus florentem, figura Lili, dodrantali altitudine: foliis qualia in Narcisso describuntur: singulari caule, iisdemque aliis omnibus, excepto colore, qui nec candidus nec purpureus, ut Plinius docet, sit, sed inter candidum & luteum colorem, nullius aut exigui odoris.

NARCISVS VIII.
 Matthioli.



Vidimus & in mitioribus collibus enatum, sed non tam speciosum & magis albicantem: sed de quarto hoc Narcisso plura dicemus cap. De Ornithogalo. Quintum omnes Tulipam vocant, de qua aliquantò post dicemus. Sextus & septimus Leucoia sunt bulbosa, flores à Narcissis multum dissidentes, de quibus mox. Pena Narcissum tertium Matthioli, quem Constantinopolitanum appellat, nihil aliud esse censeat, quàm Pancratium maritimum, de quo suo loco agemus. Alium verò radice squamosa & nucleis stipata: floribus multiplicibus & foliosis secundo loco pictum, olitorum industria & mangonio, non natura, talem videri. Matthioli tamen non explicat ubi, quando, & quomodo nascatur, & an arte, an sponte, quemadmodum nec alterum veri Narcissi bulbo, sed florum foliis prolixioribus, angustioribus, porrectioribus staminibus. Narcissi radix siue estur, siue bibitur, vomitiones ciet, auctore Dioscoride, amibustis igni prodest cum melle trita. Dissectos nervos agglutinat imposita. Luxatis malleolis, diuturnisque articulorum doloribus trita cum melle

In Adoerf.

Vires &
 Temper.
 Lib. 4. cap. 11.

melle & imposita subuenit. Purgat & maculas in facie & vitilignes cum semine vrticæ & aceto. Cum eruo & melle vlcera sordes expurgat. Abscessus, qui ægre maturescunt, rupit. Educt aculeos infixos cum liliacea farina & melle imposita. De eiusdem vñ medico Plinius eadem ferè tradit. Vtriusque radix molli saporis est. Ambustus prodest cum exiguo melle. Sic & vulneribus & luxuris: panis verò cum melle & avenæ farina. Sic & infixa corpori extrahit. In polenta trinis oleoque contusis medetur, & lapide percussis. Purgat vulnera permixtus farina. Nigras vitilignes emaculat. Ex hoc flore fit Narcissinum oleum ad emolliendas durities, calfacienda quæ alserint: auribus vtilissimum, sed capitis dolores facit. Narcissi radix, vt scribit Galenus, vsque adeo exsiccandi facultate pollet, vt maxima vulnera glutinet, vel ad incisiones vsque, quæ circa tendones accedunt. Habet vero quoddam absterforium & attractorium. Hæc Galenus. Narcissi lutei siluestris radicem decoctum per alium lentos & pituitosos humores, nec non serosos expurgare recentiorum quorundam experimento exploratum est: & his prodesse qui crudorum humorum copia grauatur, semine anisi, & zinziberis pauxillo additis, vt minus noceat, minuique ventriculo molestum sit.

LEUCOIVM BVLBOSVM.

CAP. VI.

Lib. 6. hist.
cap. 7.



THEOPHRASTVS scribit, inter vernos flores τὸ μὲν πρῶτον ἐκφαίνεται τὸ λευκόν, ὅπως μὲν ὁ ἀπὸ μαλακώσεως, ἐν τῷ τοῦ χειμῶνος, ὅπως δὲ σκληροῦς, ὕψιστον. Id est, Leucoium inter vernos flores primum emicare, vbi cælum clementius fuerit, statim etiam hyeme. Vbi verò immixtus,

Lib. 7. hist.
cap. 14.

posita. Quod de eo Leucoio accipiendum esse docti censent, quod ipse postea de Bulbis disserens, bulbosis annumerat: quia id præ cæteris Leucois florere festinat. Quare Leucoium vnum non bulbosum Dioscoridis, de quo diximus, alterum bulbosum Leucoium Theophrasti statuere necesse est, à Leucoio Dioscoridis planè diuersum. Leucoium bulbosum Fuchsius, nomen Græcum exprimens, Violam al-

Nomina

NARCISSVS, Matthioli.

Genera.
De florib.
cap. 16.

Forma.

Locus.



bam vocat: nec abs re, inquit, flos enim huius herbarum colorem album, & violarum odorem refert: Germani weiß Hornungs blumen, Lugdunenses Campanes blanches. Dodonæus Leucoi bulbosi tria obseruauit genera. Vnum Triphyllum, alterum Hexaphyllum, tertium Polyanthemum cognominat. Primum Triphyllum, a tribus floris foliolis dictum, folia ex singulis bulbis bina promit, oblonga, angusta, in virore albicantia: foliis Pseudonarcissi lutei colore proxima: inter quæ medius exit cauliculus palmaris: in cuius summo flos è vaginula oblonga erumpit, à tenui pediculo deorsum dependens, foliolis tribus constans, maioribus candidis, intra quæ alia tria breuia ac minora, pallide virentia, & aliquantulum striata: in medio floris stamina cum apicibus luteis: radix bulbosa est, foris obscuri, & eius cuius Castanæ nucleus coloris, quæ faciliè in plures bulbos multiplicatur. Peregrinus Belgio flos, sed Italiæ & aliis regionibus familiaris. Exit præmaturè Februariomense reliquos omnes ferè antecedens. Matthioli

rhizolus sextum Narcissi genus facit. Lobellius & Pena Leuconarcissifolium minimum, palmari cauliculo: paucis foliis, quæ ternæ vel quaternæ habet: flore exiliore, qui vnicus illi est, herbaceus, lacteolus. Septentrionalibus etiam regionibus, vt Antuerpiæ, & in Nortmania frequens. Viderur Leucoium bulbosum Theophrasti:

VIOLA ALBA bulbosa,
Fuchsij.



cuius meminimus in libro de iis quæ flore placent. Secundo generi, Hexaphyllo non abs re dicto à sex floris foliolis, folia similiter sunt angusta, Porri & Pseudonarcissi similia, sed breuiora, viridiora, læuiora, & magis splendentia, versus terram aliquatenus reflexa: cauliculi tenues, palmares: flores in singulis singuli, rarissimè gemini, deorsum quoque penduli, colore candidi, ex sex foliolis aliquantulum striatis commissi, staminibus in medio cum luteolis apicibus: semen in rotundis capitis parum, rotundum, læue, & colore flauum: radix candida & bulbosa in plures bulbos faciliè propagatur. Plerisque Germaniæ superioris locis in vmbrosis & humidis siluis reperitur, apud Belgas hortorum areas exornant: fiores eodè quo superius tempore, aut non multò post. Marthiolus pro septimo Narcissi genere depinxit. Leuconarcissifolium paucioribus floribus à Lobellio & Pena nuncupatur, quos non dissimiles, sed singulos in singulis cauliculis minoribus habet, luteis capillamentis è medio erumpentibus, semine fusco. Tertium Leucoium bulbosum, Polyanthemum à florum vno ex cauliculo dependentium multitudine cognominatum, caule & foliis secundo simile est, maius tamè

Tempus.

Forma.

Locus.

Tempus.

Forma.

LEUCOIVM bulbosum minus
Autumnale, Dodon. & Clusij.



ac procerius: florem in singulis cauliculis non vnicum, sed quinque aut sex, & parriculatim quidem florentes profert, alterius floribus forma & magnitudine per omnia similes. Est in Belgio hortense tantum. Non primo Vere cū aliis duobus, sed multò post, Aprili videlicet in mense vna cum Narcisso floret. Lobellius & Pena Leuconarcissifolium pratense vocant. Hoc Narbone se multiflorum, inquit Pena, vt cæteris maius, ita multò pulchrioribus est floribus: sunt enim lacteo Ornithogali candore, sed Lilij parui effigie, in singulorū cauliū summo feni vel se peni ex nodo vno procumbentes: deinde semen rotundum, nigrum, Paxonis simile in membraneo folliculo: folia & radices sunt Narcissi Medio-lutei. Copiose floret in pratis vel decliuibus locis herbidis, & lacunosis scrobibus, non procul Mōspelio & Magaloua ad Lateranum castrum dirutum: semen fœnicicis maturat. Eadem planca quibusdam videtur esse Narcissus secundus Marthioli. Dodonæus alio in libro aliud Leucoium bulbosum minus pinxit, à reliquis distans, quod non Vere sed Aurumno floreat.

Locus.

Tempus.

Lib. purg.

Idcirco Leucorum bulbosum minus Autumnale vocat, quod sic descripsit Clusius.
lib. 1. flor. Cauliculo est palmum alto, gracili, vnum, interdum alterum & tertium ferens flo-
Tulipa, c. rem, candidum omnino seu lacteum, pendulum, sex foliolis constantem, & in cala-
 thi seu tintinabuli modum formatum, inodorum & ingrati saporis: flori insunt
 pallida stamina, eoque iam aperto primum prodeunt folia quatuor aut quinque,
 capillaria & viridia: radix bulbosa, satisque magna pro plantę proportionem, can-
 da, multisque tunicis glutinosis compacta & amara, quę candicante menti ana-
 tegitur. Ad Anam flumen nascitur: florer sub finem Octobris & Nouembri tem-
 pore. Nusquam alibi hanc plantam se vidisse Clusius ait, cui Leucorum Autumnalis no-
 men indidit, quod Autumnno duntaxat florētem inuenerit. De horum Leucorum
 viribus nihil neque a veteribus proditum est, neque a recentioribus observatum
 Fuchsius tamen ex foliis omnis ferē qualitatis experibus, radice autem dulci &
 glutinosa, digrentem leuiter, & cum hoc adstringentem facultatem, sicut & ali-
 quos Bulbos, habere colligit.

TULIPA. CAP. VII.

Nomina



TULIPUM peregrinum peregrino & Turcico vocabulo receperunt

Tulipam nominarunt: sic enim Dalmatę & Turcę vocant *pulm*
 seu amiculum capitis quod gestare solent, quod ei inuerti floris
 aperti similes sunt effigie. Est autem Tulipa ex bulbosorum nume-
 cuius varietate & quamplurimarum sunt species, & variates, magnitudine & florum
 colore dissidentes: de quibus accuratissime pertractauit Clusius. Is Tulipę duo ob-
 uauit genera, non quod forma à sese differant, sed quod alterius flores soleant
 præcoces, & alterius serotini. Hoc genus Turcę sua lingua *Canala lile* ap-
 pellat, illud *Cafe lile*, a locis vnde primum Constantinopolim fuerunt allata, nonnulli
 dicitur: *lale* enim illis florem significat. Vtrunque pedalem profert caulem, & cubi-
 talem aut ampliore, rotundum, virentem, & breui quadam incanaque
 gine aspersum, non cauum, sed firma medulla plenum: hunc plerunque ternis
 plectuntur folia, nonnunquam quaterna & quina, inferior lata & liliacea, longiora
 & crassiora, supra terram sese expandentia & conorquentia, superiora minus
 & angustiora, vel propendentia, vel sursum erecta, omnia colore ex caruleo
 re, aut arugineo, veluti farina asperso, & oris interdum adeò inflexis ut
 videantur, interdum minimè. Summo cauli insidet magnus flos sursum spectans,
 sex foliolis sepius constans, interdum septem aut octo, calathi aut cyathi modo
 se in fundo pandens, ex quo sēna, aut toridem, quot folia sunt, stamina eum
 modò lutea, modò pallida, modò nigricantia, pediculis etiam, quę stamina susti-
 nent, mirum in modum colorem variantibus. Dilapso flore succedit membra-
 neum triangulare caput, satis magnum, quandoque oblongius, quandoque breuius
 & ventre magis prominulo: quo in tres partes à summo dehiscente, conspicit-
 ur sex ordines seminis plani, cartilaginei, ferè liliacei, & circumatę propemodum
 runditatis, pallidi, fului, aut rubescentis. Radix bulbacea interdum breuior est
 terdum obliquis, crassa, inferiore sede nonnihil prominente, vbi fere in *foli*
 co, fibris aliquot rennibus donata, & foris nonnunquam fuluescente, sepius
 nante membrana obducta, quę interiore parte lanuginosa est quemadmodum in ca-
 stanearum cortex, quandoque tam denso tomento plena, ut mollissime recubet
 radix, quę solida est & firma, & veluti albumen oui coctum candida, gustantque
 dulcis, nec ingrata. Est autē in *Cafe lile*, id est, Tulipa præcoce tanta coloris varietas,
 quanta in nullo alio flore videri potest. Nam flos aut omnino luteus, aut ruber,
 aut albus, aut purpureus: interdum bini vel plures ex his in eodem flore permixti
 colores

Genera

Forma

*TULIPA maior,
Clusij.*



*TULIPA minor,
Dodonai.*



colores conspiciuntur. Simples illi colores etiam variantur sicutiores, aut diluiores, aut aspectu iucundi, aut inelegantes & obsoleti. Permixtorum & variorum adeo multiplex est differentia, ut eam describere perdifficile sit. In seroena Tulipa tam variam colorum differentiam se non obseruasse ait Clusius, sed luteas duntaxat & rubras. Tulipas varias quidam curiosè in hortis alunt ob excellentem florum venustatem, quarum nonnullas hic pictas datus Prima Tulipa maior nominatur, Matthiolo Narcissus quintus, Lobellio Lilionarcissus purpureus, cui ab eodem appictus est Lilionarcissus Chalcedonicus totus luteus, sanguineo puniceo par & similis, à Dodonæo maioris Tulipæ nomine donatus & expressus. Minores Tulipæ folijs sunt angustioribus, & serè Porraceis: cauliculis tenuioribus ac brevioribus: floribus minoribus, & minus in latitudine se pandentibus, bulbis minoribus. In Thracia & Cappadocia Tulipa provenit. Italix, Gallix, & Belgio peregrinus est flos: quare in hortis tantum colitur. Aprili mense floret in Belgio Lobellio Narbonensis Lilionarcissus luteus montanus. Pena Narcissosilium luteum vocat, quem erutum ex Dei Paradiso in iugis Cemenei Narbonensis, iam multi sunt anni, in Belgium deferendum curauit, amicis Antuerpianis communicandum, qui primi illic Tulipam nominarunt. Huic appingit Lobellius Bononiensem Lilionarcissum luteum, siue Tulipam, qui Narbonensis, folio, caule & flore proximus est, omnia tamen vegetiora & grandiora habet: quandoque flores in caule bipartito geminos, stellatos, & alicubi ternos, iucundo Leucoj lutei odore. Sequuntur dux alix pictæ à Lobellio. Prior Lilionarcissus luteus latifolius, obtusis phœniceis rubentibus oris dicitur, cuius flos sex folijs obtusis purpurei sanguinei Lilionarcissi constat. Radix item & caulis persimilis, in quo quatuor & nonnunquam plura folia, Liliaceis & Porraceis media. Interdum innatum bulbum in folio notauit Lobellius. Altera eximio est flore sese pendente, supremis foliorum oris & fundo ad basim luteis pallentibus, medium sanguineo fusco cingente: caliculi oris & media carina foris luteis: cætera omnia sanguineo fusco

exoleto similia, medio intus flamine nigro, flaminibus croceis obducto. Semina, ut reliquarum, compressa in oblongo, tripartito, membraneo, anguloso folliculo: quæ itidem sua colorum varias subeunt mutationes, & sæpe degenerant. Lilionarcissus luteis oris, flore patulo nominatur. His adnumeranda speciosissima flore planta, quæ

LILIONARCISSVS luteus Lilionarciſſum purpureum variegatū Lobellius appellat, alij Fritillariam, rectius Meleagridem dici poſſe Dodonæus arbitrat̃ur : Meleagridis enim auiſ plumas non coloris quidem ſpecie, ac varietate, ſitu, magnitudineq; macularum refert: eſt autem aui� hæc variis ſparſa plumis. Hæc planta à Narciſis differt, Tulipæ ſimilior, ſed minor. Floſ pulcherrimus deorſum vergens eſt: nis quoq; foliolis componitur, violaceo colore purpureſcens, quæ dilutè admodū purpureæ, ac quali albicantes, ordine coccinno digeſtæ, ac intermixtæ maculæ elegantiffima varietate commendant, & foris quidē. Interiore parte nigricantibus ſparſim diſpoſitis liguſis, circa bulbos maioribus ac frequentioribus exornantur. Stamina hinc quoq; ſex, & medius piſtillus, colore ſilutea. Caulis tenuis, circa quæ quina, oblonga, anguſta foliola, Croci, è vitore candicantia. Radex bulbosa, rotunda, & candida eſt. Semē albidum, cōpreſſum, ſiliquis Hemerocallidis minus. Tulipæ Bononiensis paribus clauditur. Nonnulla hæc planta accedere videtur ad figurā Colchicæ Orientalis Matthioli. Tulipæ genus quidam e



arbitrantur plātam, quam Ouloudiam Græcum vulgus appellat, & in hortis colitur. Bulbi aduecti ſunt nobis ex hortis Eremitarū & Monachorum qui mōtem Athi incolunt, ſolitudine & innocentia vitæ ſic venerabiles, vt ob eorum integritatem

TULIPA ſive Lilionarciſſus
luteus latifolius, Lobel.



MELEAGRIS ſua,
Dodonæus.



OVLVDIA seu
Tulipa lutea.

& pietatem mons is Sanctus ab omnibus vocetur. Radix illi bulbosa est, magnitudine Cepæ medioctis : caulis rotundus, cubitalis, crassitie minimi digiti : folia plerunque tria ; Lilio aut Ephemero Colchico similia, lata, venosa, è viridi nigricantia, non prorsus diducta, sed quasi in alucolum plicata, & imbricata, caulem ambientia : flos luteus, Lilio similis : vnde Tulipam luteam seu flauam cognominarunt, foliis foris striatis sex, ab angusto in latum sese pandentibus, effigie calathi, resupinis per ambitum labris, & in medio tot staminibus pallidis, quot floris folia sunt. Egregia sanè hæc est planta, & admiratione digna.

CROCUS CAP. VIII.



FINIS est Narcissus Crocus non modò figura & natalibus, sed etiam facultatibus peculiaribus, quæ utriusque epispastica, deinde quadatenus odoris sopotiferi insunt. κρόκος Græcis dicitur,

Nomina

sic & Latinis & Officinis Crocus, Arabibus Zahasaram & Zafaran, Italis Zaffarano, Germanis & Gallis Saffran. Crocus verò vocatus est à Croco iuvene, qui propter amorem Smilacis virginis in florem sui nominis mutatus est. Quod Ouidius testatur hoc versu,

Lib. 4. Metamor.

Et Crocon in paruos versus cum Smilace flores.

De quo fabuloso Croco aliter hæc scripsit Galenus. Adolescens Crocus cum Mercurio disco ludens, & incuriosius consistens, illapso in caput ipsius disco statim mortuus est : ex sanguine autem ipsius in terram delapso Crocus natus est. Sed & κρόκος solum, villumve & tomentum significat, cuiusmodi sunt Croci flaua flammæve stamina & villi, & flocci κροκόεις vocantur. Crocus est satius & silvestris. Crocus satius vbiq; notissimus est, non medicis solum Officinis, sed etiam culinis, ad obsonia grato colore tingenda, quanquam & sapore & odore illa commendat, & concoctionem iuuat. Folia fert oblonga, perquam angusta, graminea, per humum sparsa, densa, mollia : caules nudos, in quibus flores cærulei ex sex foliolis, in singulis filamenta terna quaternave, crassiusculo cacumine, colore flammeo nitentia, odore cum inaruerint intenso, & caput implente atque sopotifero, quæ cæteris partibus præferuntur, sedulorque colliguntur, & adseruantur, & Croci nomine vel sola veniunt. Radix subest bulbosa, carnosæ, copiosa, & viuax. De hoc Theophrastus hæc prodidit. ὁ δὲ κρόκος πωρόεις μὲν τῇ γούρῃ, καὶ ὡς περ καὶ τὰ ὅλα, πλεονέχων ὅτι καὶ ἡ γούρῃ τρυχόφυλλον ἔστι. ὁ βίωτης δὲ σφόδρα, καὶ ὁ βλάστης, ἢ περιωσθῆς, ὁ περὶ τοῖς λαμβάνει τὴν ὕδατος. πλεονέχων γὰρ αἰγεί, καὶ ἀλόγως ἡμῶν. ἐν τούτῳ δὲ καὶ ἡμῶν τοῖς φύλλοις καὶ αἰγὸς ὡς εἶ, διακρίνεται δὲ πρότεροι. ῥίζα δὲ πολλή, καὶ σαρκώδης, καὶ τοῖς ὅλοις ἰσχυρὴ. φυλάττει δὲ καὶ παρὰ τὸν χρόνον, καὶ γίνεται καλλίων κατὰ τὴν ῥίζαν. οἷον καὶ παρὰ τὰς ὁδούς, καὶ ἐν τοῖς κρηματοῖς καλλύσας. ἢ δὲ φύτεται ἀπὸ τῆς ῥίζης. Id est, Crocus natura herbaceus quemadmodum & alia, sed folio est angusto, & ferè in capillamenti modum extenuato. Valde serò floret, seròque germi-

Li. 9. med. local.

Genera.

Forma.

Lib. & c. 6. hist.

Crocus sine flore.

nat, vel p̄rpropere floret, vtro scilicet modo tempus acceperis: flore enim Vergiliarum occasu, & paucis diebus: statim enim cum solio florem pellit, imò & prius florem mittit quàm folium. Radix hinc multa, carnosa, & omnino viuax. Calcari gaudet, atque ita latioꝝ fit, radice deorsum versus atrata. Quare iuxta vias & fontes optimus. Scribitur radice. Quæ ferè exhibet Plinius

CROCVS sativus,
Martholi.

CROCVS non florens,
Martholi.



Lib. 16. c. 6. his verbis. Vñs Croci in coronis nusquam. Herba est folio angusto, peric
capillamenti modum. Floret Vergiliarum occasu paucis diebus, folioque flo
rem expellit. Viret bruna & colligitur. Siccatur umbra, melius etiam h
bo
na. Carnosa & illi radix, viuaciórque quàm ceteris. Gaudet calcari & attri

Locus. pereundóque melius prouenit. Ideo iuxta semitas & fontes latissimum. Cro
cus optimus erat Dioscoridi Coryceus, ex Coryco Ciliciæ monte. Secundum
locum dat Coryceo è tractu Lyciæ contemino. Terrium Lycio e monte Olympo. Quam Ruellij conuersionem non probat Marcellus Verg. hæc scribens. In
his verbis, *Ἰσχυρὸς δὲ ὁ ἐκ τῆς ἀπὸς Λυκίαν κυρσίαν, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ Λυκαονίου*,
articulus præpositus, & Corycij in genitiuo casu illic occurrentes, legitimam
sermonis seriem nūscunt. Ideoque nos secundæ bonitatis à Corycio ex Cilicia
esse dicimus eum, qui ex agro ad Lyciam, & Lyciæ Olympo monte afferatur.
Sic & conuertit Cornarius. Secundum locum obtinet qui extra Corycum ad
Lyciam nascitur, & qui in Lyciaco Olympo. Deinde qui ex Aegis Actolæ vr
be adfertur. At Cyrenæicus & Centuripinus omnium in Sicilia nascentium in
firmisimis est viribus. Similiter Phnius, Prima nobilitas Cilicio, inquit, & ibi in

Lib. 16. c. 6. Coryco monte: dein Lycio, monte Olympo: mox Centuripino Sicilia. Aliqui
Phlegrazo secundum locū dedere. Hodie verò non solum regiones ad Meridiem,
Africa, Cyrene, Sicilia, Gallia, sed etiam ad Septentrionem sitæ Anglia, & Hiber
nia laudatissimum ferunt, quo Belgium, Germania, aliq; vicini cibos condunt,

ac medicamentis nuscunt. Matthiolus Crocum ex Aquila Veltinorum vrbe
 primum sibi locum vendicare in Italia scribit, eo tamen prestantiorem esse qui ex
 Vienna Austriæ Metropoli defertur. Probat, inquit Dioscorides, recens, boni
 coloris, parum candidi gerens in circueu, oblongus, integer, non fractus, cui
 nihil deest, plenus, dum dilutus manus tingens, non cariem, aut situm redo-
 lens, odore iucundo & acuti. Qui talis non est, aut vetus est, aut humore perfusus.
 Crocus, auctore Theophrasto, tam montanus inodorus, quam satius Autumno
 florere incipit: statim enim primis imbribus floret. Quare flores ante folium edit
 continuo fere mensibus collectis folia exeunt, tota Hyeme virefcentia spre-
 tis alioribus. Deinde arefcent, ac Vere depereunt, nec Æstate apparent. Croci

in cap. 15.
lib. 1.
Elettio.
Lib. 6. hili.
cap. 7.
Tempus.

CROCVS siluestris I.
Dalechampi.



CROCVS siluestris II.
Dalechampi.



siluestris verus (alium enim Officinæ Crocum siluestem faciunt, nempe Ephe-
 merum Colchicum, ob floriseius cum satiuo Croco similitudinem) à satiuo cul-
 tura, & satiuo differt. Huius tria obseruauit genera Dalechampus. Primum
 minimum radice bulbosa, exigua, rotunda, multiplici cortice vestita, infernè
 Cepæ modo fibrata: cauliculo dodrantali, duobus latiusculis foliis obuoluto, vs-
 que ad floris exortum ferè ascendentibus, quatuor insuper, aut quinque so-
 liis ex lateribus vtrinque enatis, oblongis, angustis, linea cãdidaque media in-
 tersecat, diuisis: flore Croci hortensis, paruo, supernè purpureo, infernè fla-
 uescente, extantibus in medio staminibus croceis. Secundus priori in multis
 similis est, in quibuscumque diuersus: nempe quòd radice sit amphiore, ac den-
 sius fibrata: caule procioris, grandiore, crassiusculo: foliis paucioribus: flore
 maiore & larioe. Tertius radice est gemina, Gladioli modo, læuiore, integrio-
 re, minúsque lacero cortice obducta, parum fibrata: foliis quatuor, aut quin-
 que, longissimis, sed angustissimis, linea media candidissima distinctis: caule
 foliis vacuo, recto: flore media sui parte purpura nitente, suprâ & infrâ candi-
 do, interdum prorsus albo. Crocus siluestris in plerisque Galliæ locis, sed in
 Allobrogibus potissimum nascitur, præfertim primus & tertius in niuosis

Crocus sil-
uestris.

CROCVS silvestris III.*Daléchampi.*Li. a. stirp.
Huspa. c. 4.

montibus, terra nigra & pingui. Liguata nunc, & sub finem Maij florem & folia statim promunt. Hanc ob causam, opinor, Crocum Vernali Clusius appellavit, quod flore sit Croci, Veréque floreat: cuius genera duo constituit, Crocum Vernali minus, & Crocum Vernali maius. Croci Vernali minoris species tres. Primo angustifolio, seu minori bina aut terna sunt folia oblonga, crotocinis longè angustiora, gracilioraq; rotunda & capillaria ferè, viridiaq;. Inter ea cauliculus erumpit pollicari longitudine, angulosus, in quo flos vnicus Croci ferè, sed minor, senis foliis constans, ima parte foris flavescentibus, intus nonnihil candicantibus, reliqua caeruleis, siue violaceis, (inveniuntur & toti candidi) odoratis, quibus insunt aliquot parva stamina: succedit folliculus trigonus, in quo semen exiguum, fulvescens: radix exigua aeuellanz magnitudine, duro spadicòque cortice tecta, intus alba, firma, subadstringente gustu. Bini plerùque flores, interdù terni ex eodem cortice, qui totidem bulbos complectitur, prodeunt. Plurimus inuenitur

Gadibus, atque inter Afindum & Calpen, locis salebrosis & apticis. Alterum genus cum foliis, tum radice externo cortice huic omnino simile Clusius observavit in Beturiæ collibus Lusitaniz conterminis, flore paulò minore, & ex albo purascente, vixque è terra prominente, qui ex octo foliis compositus est, quatuor

CROCVS Vernalis minor I.

& III. Clusij.

*CROCVS Vernalis*

maior, Clusij.



exterioribus

exterioribus paulò maioribus: radix illi candida & gemina, vna alteri insidente: superior fitna, dulcis, edulis inferior flaccida. Tertium genus vberioribus & crassioribus est foliis, interdum rectis, cum reliquorum folia humi spargantur: hos superioribus multo minor, totusque cæruleus, tribus exterioribus foliis exceptis, quæ foris virefcente colore diluta sunt: radix superioribus similis, sed paulò maior, & semen crassiusculum. Hunc Crocum Gadibus duntaxat iuxta priorem Clusius inuenit. Florent omnes Ianuario & Febuario. Crocum Vernum nouus, inquit, foliis satiuum omnino refert, nisi breuiora essent: ante florem ea prodeunt, deinde subsequuntur bini, aut terni flores crocinis similes, sex foliis constantes, quorum exteriora terna, quæ pallidula sunt, tres purpureæ saturatiore, & quasi

CROCVS serotinus cum flore, Lobelij.



CROCVS montanus, Clusij.



nigricantes lineæ, ab infima basi ad extremum folium ductæ versicoloria efficiunt, intus verò tum hæc, tum tria interiora candicant, staminaq; in medio habent Croco montano similia: floribus succedunt siliquæ parvæ, oblongæ, angulosæ, subrufo, & rotundiusculo semine refertæ. His adiungit Lobellius duas alias Croci Verni species. Prior est Crocus Vernus serotinus*, flore ex purpureo rubente, violaceis lineis striatus. Alter est Crocus Vernus serotinus, cæruleis oris, sparsis in latera foliis. Præterea Clusius Crocum montanum Autumnalem depingit, qui flore est satiuus Croci, sed dilutiore, staminibus intus tribus croceis, inter quæ veluti penicillus luteus emicat: folia quaterna Crocinis similia, viridia, interiori parte veluti lineam quandam candicantem secundum longitudinem, exteriori verò duas huiusmodi lineas & quasi canaliculos habent: radix satiuus candida, plena, & veluti internodiis distincta, subdulcis primum, deinde ingrati saporis, integritur cortice quodam denso, & multis villis contexto. Nasctur in nonnullis Lusitanix rupibus, præsertim iuxta mare. Floret istic toto Nouembri. Siliquas Maio fert crassas, angulosas, semine plenas, quales Croci Verni est. Est & in Calcaris, vulgò de *L'esperon*, præcelso Gallia: Narbonensis monte, Crocus montanus albo flore. Theophrasto *κρόκος ὀφύδης* dicitur, Latinis Crocus montanus, Autumnalis, siluestris, Lusitanis *Pes de Borno*, id est, Pes asininus. Crocus satiuus, ut tradit Dioscorides, concoquit, emollit, leuiter adstringit, vrinam cit, & coloris bonitarem efficit. Arcet crapulam cum passo potus. Fluxiones oculorum cum muliebri lacte inunctus sistit: porionibus, quæ pro interaneis parantur, vtiliter miscetur: item iis quæ vuluæ sedique subiiciuntur & illinuntur. Venerem stimulat. Inflammationes erysipelatodes inunctus lenit. Aurium remediis vtilissimum est. Lethalem sanè dicit hunc, si trium

Lib. I. ca. 34.
Vires &
Temper.

si trium drachmarum pondere cum aqua bibatur. Radix eius cum passio pota vti-
 nam cit. Hæc & alia quedam de eodem prodidit Plinius. Discutit inflammatio-
 nes omnes quidem, sed oculorum maximè ex ovo illitum. Vulvarum quoque
 strangulatus, stomachi exulcerationes, pectoris & renum, iocinoris, pulmonum,
 vesicarumque, peculiariter in inflammationi earum vehementer vtile: iteni tussi &
 pleuritidis. Tollit & pruritus, vrinam ciet. Qui Crocum prius biberint, crapulam
 non sentiunt. Ebrietati eo resistunt. Coronæ quoque ex eo mulcent ebrietatem.
 Somnum facit. Caput leuiter mouet. Venerem stimulat. Flos eius igni sacro illi-
 nitur cum creta Cimolia. Ipsum plurimis medicaminibus miscetur. Crocus, in-
 quit Galenus, paulum quid adstringens habet, quod terreum frigidumque est: sed
 superat in eo calfaciens, & qualitas & facultas, vt tota eius essentia secundi sit or-
 dinis excalcifiantium, & primi exsiccantium. Quare còcoquendi vim quandam
 obtinet, adiuvante scilicet in hoc paucula illa adstrictione. Scribit Auicenna Cro-
 cum cephalalgiam excitare, & capiti nocere. Id quod non exguo, sed nimo vfu
 efficere potest. Vigiliis enim copiosus inducit, quæ modum excedentes capiei &
 sensibus obsunt. Moderatus autem Croci vsus cerebro prodest, sensus vegetiores
 reddit, somnum & torporem excutit, lætitiā gignit, corroborat cor. Thoracis
 crudos humores ad concoctionem perducit, pulmones aperit, & ab obstructione
 liberat: & ad hæc tam efficax est remedium, vt subinde phthysicis in summo vitæ
 discrimine, & propemodum animam agentibus, spiritum reducat, & vitam ad
 aliquot dies proroget: scrupuli dimidij, aut ad summum integri pondo, cum pas-
 so, aut vino dulci propinatus. Quo etiam modo grauissimas subito irruen-
 tes dyſpnœas citra febrem, statim & momento temporis tollere experimentum om-
 pertum est. Laudatur ad hepatis & fellis obstructiones, & ad regium morbum
 Croci stamina rrita carpis, aut sub mammis admota illitæ, vires suas cordi co-
 broq; illico transmittunt, quasiq; vertiginem tenebricosam inuehunt, aciem ocu-
 lorum præstringunt, aut hebetant. Scribit Serapio ex auctoritate Rhazis Crocu
 drachmarum duarum pondere partum accelerare, maximè inebriare si cum vino
 misceatur: tantam lætitiā parere, vt ex nimia lætitiā insaniam gignat. Quod ex-
 perimento confirmat Amatus Lusitanus. asserens se mercatorem vidisse, qui cum in
 ollam in qua carnes coquebantur, multum Croci inieciſſet, post earum esum tu-
 tam profusum risum prorupit, vt parum abfuerit quin risu nimo & cachinnis
 vita excesserit. His addenda Symeonis Sethi auctoritas. Crocus stomacho bonus
 est, inquit, ciborumq; concoctionē efficit. Obstructiones tollit. Pituitosa & lethar-
 gica vitia iuuat. Discutiendi quoq; vim obtinet, vlcetibus vtilis est, & ad spiritus
 difficultatem conducit. Si quis illo mediocriter vtatur, bonum colorem habebit:
 sin verò vltra modum, pallorem contrahet, & capitis dolorem, cibiq; inappeten-
 tiam faciet. Cum opio & lacte & rosaceo pedum doloribus impositus vbi dolent,
 summo pere prodest, superpositis Betæ foliis. Croco siluestri verno maiori, quem
 in Advers. ex Clusio descripsimus, foris duntaxat vtendum esse censet Pena. Illitus pubi vri-
 nas elicit ctebras atque crassas, tumores hydropicorum discutit, spicula euellit.

C E P A.

CAP. IX.

Nomina



P O' MNYON Græcis, Cepa & Cepe in neutro genere Latinis &
 Officinis, Arabibus *Bassil*, seu *Bassal*, Italis *Cipolla*, Germanis *Zumel*,
 Hispanis *Cepolla*, Gallis *Oignon*. *αψυλλον* autem Aristotele in Proble-
 matibus auctore dictum est *παρὰ τὸ κέρας μὲν τῶν τοιοῦτων*, quod ocu-
 lorum tunicam pupillamq; mordaci vapore lancinando, conuiuere contrahit;
 cogat lacrymas eliciendo: vnde Latinis Cepa lacrymosa. Cepa autem a capitis
 magnitudine. Quemadmodum Theophrasti & Dioscoridis æuo, ita etiam hodie

Genera.

Forma.

nostri hodie duo Ceparum genera norunt. Vnum quod feritur, alterum quod deponitur. Cepa capitata foliis constat ferè porraceis, intus concavis glabris: caule torundo, vacuo, nitente, per cuius fastigium flos in capite, siue caliculo villosa, candido, vel purpurascente: deinde semen copiosum, nigrum, Nigella: radix capitata, bulbosa, quibusdam maior, aliis minor, oblonga, orbiculata, & turbinata quibusdam, plurimis verò & communioribus Cepis à caulis ceruice sensim in compressam latiore, sed à lateribus reductam vtrinque circumferentiam bulbaceam abeuntibus, cuius vmboni fibrarum numerosa copia aptata subest, Ellebori alio modo: quod Cepis omnibus est commune, ex pluribus tunicis compacta est, & prætenuibus, sæpiissime rufis, interdù saturè rubetibus, nonnunquã candidis, raris viridibus vestitur membran. Hæc simplex, quæ non fruticas, neq. habet lobos adherentes, quam ob id Vnionem à veteribus rusticis vocatam testatur Columella: vnde Galli huius Cepar nomen vsurparunt, *Oignon* nominantes, quasi *Vnion*,

Liliaceo.

CEPA Sativa,
Marthioli.CEPA Scetilis, Matth. 11. C.
Cepula Columella.

Vnionem. Cepa scetilis, quæ tota in frondem luxuriat, sæpiusq. retondetur v. Porrum, γίνιον Græcis dicitur, Gallis *Ceboule*, quasi *Cepula*, aliis *Siboule*, nonnulli *Cumes* & *Cimons* vernaculo sermone proferunt. Sic à Theophrasto describitur. τὸ δὲ γίνιον κερκιδιον ἀκίφαλον ἢ, ὡς περ αἰχίνα μακρὸν ἔχει, ἐν τῷ βλαστῶσι ακρα, καὶ ἐκπύρεται πολλὰς ὥστε τὸ παράδειγμα. διὸ δὲ ἀπέρυσσιν αὐτὸ, καὶ ἐν φυτῶσι. Quæ sic P. inius interpretatus est. Gethyum penè sine capite est, ceruicis tantum longæ, & idè totum in fronde, sæpiusque refecatur vt Porrum. Idè & id ferunt, nō deponunt. Quæ sint Cepar χιτῶν id est, hisiles, in Hetruria vulgò *Cipolle* *malghe* nominatz, ex Theophrasto demonstrauimus, qui de Ascaloniis & hæc scribit. τῶν δὲ ἀσκαλωνίων ἰδία τις ἡ φύσις, μήνα γὰρ χιτῶν, ὡς περ αἰχίνα ἀπο τῷ μέγιστον, ἔτι δὲ ἐν αὐτῷ ἀναστῆναι ἀντιπιδίον διὸ καὶ ἐν τῇ φύσει ἀλλὰ ἀπέρυσσιν αὐτὸ, δὲ ἀπέρυσσιν ὅτι πρὸς τοῖς. Εἴθ' ἔτι βλαστῶσι, μεταρτυθῶσι, τελεθῆται δὲ τοῖς ἄλλοις ταχίως, ὡς ὅτι αὐτῶν ἄλλοι, καὶ πρὸς τοῖς ἰσχυροῖς, καὶ αὐτῶν δὲ χιτῶν ἰσχυρὰ ἐν τῇ γῇ στήναι. φυτῶν δὲ ἐν τῇ γῇ ἀπέρυσσιν, καὶ αὐτῶν ἀπέρυσσιν.

Lib. 7. hist.
cap. 4.

Lib. 9. c. 6.

Lib. 7. hist.
cap. 4.

χρὶς αὐτῶν

CEPA *fibula*,
*Matthioli.*CEPA *Afcalonia*,
Matthioli.

ἡ ἰσχυρὰ φύς ἡ δὲ ἴσχυρὰ καὶ ἡ ἀνὰ τὴν γῆν ἡ δὲ ἰσχυρὰ). Quæ sic Plinius expressit. Afcaloniarum Lib. 9. c. 6.
 propria natura. Etenim velut steriles sunt ab radice, & ob id semine feri illas, non
 deponi iussit Græci. Præterea serius circa Ver cum germinant transferri: ut
 crassescere, & tunc propere præeriti temporis pensitatione. Festinandum au-
 tem in his est, quoniam maruræ celeriter putrescunt. Si deponantur, & caulem
 emittunt & semen, ipsæq; evanescent. Has Afcalonias, siue Afcalonitides, siue Pa-
 lastinas Cepas esse putant docti, quas Galli vocant *Eschalotes* servatis præci voca-
 buli vestigiis, quæ quod ancipitis & dubiæ sunt naturæ inter Cepam Allum &
 Porrum, peculiarem quandam naturam, vel figuram eas habere tradit Theophras-
 tus. Sunt tamen Cepas similiore, sed multo minores, & erudæ in ientaculis lau-
 tiore frequentioreque habentur. Quapropter Franci *Appenz* appellant, quia *Pena* in
 edendi audacitatem excitant. Fortè etiam rectè Bulbum Seranium dixeris, quem *Adactyl.*
 Theophr. & Plinius Cepas genus quoddam esse testatur. Quæ Cepa Afcalonia ex
 Matthiolo hic expressa est, *Sclætoprasion* Dodonæi quibusdam videtur, de quo
 capite proximo dicemus. Omnium maximæ sunt Cepas, quæ Caieta Romam im-
 portantur, quæ etsi saturare rubescant, & crassioribus tunicis cōpactæ sint, leuius-
 cula tamen acrimonia prædita sunt, mansuq; tenerint: ob id in cibos præstan-
 tiores sunt cæteris. In Hetruria, inquit Matthiolus, minus asces, quæ magis rubet, *In cap. 44.*
 albz omnium acerrimæ, quamvis lauas candidis aciores esse Dioscorides scri-
 pserit. Suauitate & mole omnibus Italicis & Gallicis, inquit Pena, excellunt Afri-
 cæ, ac Hispanicæ, & Hispanicis maiores, ac speciosiores D. Akomari in Belgio si-
 unt, quibus prima commendatio, & magnitudo capitis extuberantis, compressæ
 vtrinque rotunditatis, Rapum non mediocriter quantis, squamosi curicula, exti-
 misque tunicis sanguineo saturo colore rubentibus, & nitentibus, Flandriæ, An-
 gliz, aliisq; Septentrionalibus expetitæ. Ad quas tamen gentes asportantur quo-
 annis Hispanicæ non minore copia, aut comendatione, quæ partim albz, par-
 p p p

Locus.

Tempus.

Lib. cxi.

Vires &

Temper.

Lib. x. c. 4.

Lib. vii. c. 1.

tim purpurascētes, gustūque aliquāto aciores sunt, pares teneritudine & mole, cibis & condimentis quā medicamentis apiores. Cæterarum ubiq; in Italia, Gallia, Germania, Anglia, Vasconia prouentus maximus hortorum cultoribus venit. Et ut quæque ad illarum bonitatem proximè accedit, ita optima habenda.

Terram amant pinguem vehementer subactam & irriguam. Florent Iulio potissimum mense, deinceps semen proferunt, quod non antè legendum quā cum nigrum colorem præ se fert, is enim color maturitatis est index. Omnibus eadem facultas incidendi, lacrymas ciendi, odor non insuauis, sed vapor & sapor intensior, aut mitior. Omnes mordicant, inquit Dioscorides, status gignunt, appetentiam inuitant, ætenuant, sitim excitant, fastidium pariunt, & expurgant. Alio viles sunt. Detrahis tunc eis in oleum coniectæ, ac pro glandibus subditæ, hæmorrhoidas reliquisque excretiones aperiunt. Succus cum melle illitus oculorum hebetudinibus, argemidis, tubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur, anginaq; laborantibus. Suppressos menses mouet. Caput purgat naribus infusus. Canis moribus cum sale, ruta, & melle illinitur. Cum aceto autem in sole inunctus, alphas sanatum pari spodio seabras lippitudines sedat. Varos cum melle reprimi. Contra calceamentorum attritus cum gallinaceo adipe utilis est. Alui fluoribus prædest. Aurium grauitati, ac sonitui confert. Ad purulentas aures, & elicio aquam in iis interceptam valet. Alopeciz earum succo vtiliter perfricantur: citius enim quā alcyonium pilos euocat. Largior Ceparum cibis capiti dolores ciet. Cocta vehementius urinam pellit. In morbis cocta etiam largius comesta lethargum efficit. Cum papis uvis & ficu illita, tubercula concoquit & rumpit.

Plinius de iis eadem & quedam alia prodidit. Cepæ olfactu ipso & delacrymatione caligini medetur, magis verò succi inunctione. Somnum etiam facere traduntur, & vlcera oris sanare commanducatæ cum pane. Et canis moribus vnde ex aceto illitæ, aut siccæ cum melle, aut vino, ita ut post diem tertium soluantur. Sic & tritæ sanant (lege ex veteri codice, Sic & attrita sanant.) Coctam in cinere & sulphoris multi imposuere cum farina hordeacea, & genitalium vlceribus. Sumus & cicatrices oculorum, & albugines, & argema inunxere: & serpentium morsus, & vlcera omnia cum melle item auricularum cum lacte mulierum: & in iisdem nitum & grauitatem emendantes cum adipe anserino, aut cum melle stant. Et cum aqua bibendum dedere repente obmutescētibz. In dolore quoque ad dentes colluendos instillauere, & plagis bestiarum omnium, priuatim scorpi. Alopecias fricauere & psoras tulsis Cepis. Coctas dysentericis vescendas dicitur, & contra lumborum dolores, purgamenta quoque earum cremata in cinere. Illinentes ex aceto serpentium moribus, ipsaq; multipedæ ex aceto. Reliqua in medicos mira diuersas. Proximi inutiles esse præcordiis & concoctioni, iustatio nemq; & sitim facere dixerunt. Asclepiadis schola ad colorem quoq; valdè profici hoc cibo: & si ieiuni quotidie edant, firmitatem valetudinis custodiri: stomacho viles esse spiritus agitatione ventrem mollire hæmorrhoidas pellere subditas pro balanis: succum cum succo fœniculi contra incipientes hydropes melle prolificere. Item contra anginas cum ruta & melle. Excitari eisdem lethargicos. Cepa, auctore Galeno, ex quarto est ordine excalfacientium. Essentia eius potius crassarum est partium: vnde etiam hæmorrhoidas aperit tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole alphas abstergetum alopeciis attrita pilos alcyonio citius restituit. Si succū eius exprimas, quod reliquum est admodum terreæ substantiæ est, eiusque calidæ: at succus aqueæ aëreæque caliditatis. Hic igitur iis qui suffusi sunt, aut aciem oculorum obtusam præ crassitie humorum habent, inunctus prædest. Ex huius temperatura tota Cepa flatuosa est manducata. Itaque quæ temperata sunt sicciorē, minùs flatuum generant. Cepa elixa, aut sub prunis tollita,

inquit

inquit Matthiolus, datur cum saccharo vtiliter anhelosis, asthmaticis & tussientibus, addito butyri momento. Excavatur ea parte quæ sunt radices, & præstanti repletur theriaca citrei mali succo subacta: deinde occluso foramine sub calidis cineribus coquitur, donec probè fuerit macerata: tunc premitur, & excipitur ctemor, iis perutilis qui pestilentia laborant, sed eos illicò sudare oportet. Item excavatur & eymini pulvere repletur, coquitur, & exprimitur eodem modo. Succus is vtiliter instillatur ad aurium surditatem. Crassior Cepæ squama sub feruenti cinere tolta antiquum capitis dolorem sedat, si frustulum eius calidum in dolentis lateris aurem intromittatur, supetasperfo rosaceo & laurino oleo, succidâque addita lana quæ totam operiat aurem. Cepæ succus cum acerrimo aceto mistus sanguinem è naribus manantem sistit iis immixtus.

PORRVM.

CAP. X.

NON solum hic Bulbus Cepis est affinis, sed etiam tunicarum in- Nominis
uolucris demptis, interius eius capitulum cor vocatum Cepam re-
fert: nec foliis, floribus, caule, & semine multum dissimilis, quem
Græci *ῥαπάνος* vocant, Latini Porrum, Arabes *Curat*, siue *Kurat*,
Itali *Porro*, Germani *Lauch*, Galli *Porreau*, Hispani *Puerro*. Præsum verò di-
ctum est à colore, quod sit *ῥαπάνος*, siue *ῥαπάνος*, id est, viride. Porrum au-
tem Latine quod porrò eat, & longè latè que grassetur auctore Ruellio. Pena Lib. I. cap. I.
in Aduers.
Genera.
a callosa Porri capitis simillima in ossibus fetrumminatis concretionem dictum
conicit. Olitorum industria Porrum in capitatum & sectiuum diuisit. Illud
ῥαπάνος Græci vocant, id est, capitatum, quod in caput accrescat, hoc secti-
uum, cui stondentem comam solo tenus amputant. Tale si facere velis: air Co- Lib. I. cap. I.
lumella, densius satum præceperunt priores relinqui, & ita cum increuerit se-

PORRVM sectiuum,
Fuchsy.



cari. Sed nos docuit vsus longè melius fieri,
si dissectas, & eodem more quo capitatum
modicis spatiis, id est, inter quaternos di-
gitos depangas, & cum conualuerit, de-
leces. In eo autem quod magni capitis effi-
cere voles seruandum sit, vt antequàm
translatum deponas, omnes radículas am-
putes, & fibrarum summas partes in-con-
deas. Tum testulæ vel conchæ quasi sedes in
singulis subiecte seminibus adobruuntur, vt
fiant capita latioris incrementi. Quod & Pli- Lib. I. cap. I.
nius tradidit. Seritur semine ab Aequinoctio
Autumni: si sectiuum facere libuit, densius.
In eadem area secatur, donec deficiat, sterco-
ra usque semper: nutritur in capita, antequàm
secetur. Cum increuit in aliam aream trans-
fertur, summis foliis leuiter recisis ante me-
dullam, & capitibus detractis tunicis extre-
mis. Antiqui silice, vel tegula subiecta ca-
pita dilatabant. Nunc leuiter sarculo conuel-
luntur radices, vt delunbæz alant, neque
distrahant. Porrum foliis est Allio simili-
bus, latioribus tamen ac longioribus, cari-
natis, & in acutum desinentibus. Cœuix illi



*Vires &
Temper.
Lil. ca. 147.*

longa bulbosâq; candicans, crassiori summitate, radiculis multis capillata, & numerosis tunicis contexta. Bimum in caulem profilit, Cephæ modo longum cauumq; floribus in cacumine in orbem conglomeratis semine nigro, cephæo non ablimili. Hortis omnibus frequentissimum, læto solo gaudet, odit rigorem. Maio & Junio mense floret, altero à lætu anno. Porrum capitatum inflatione parit, inquit Dioscorides, noxium succum creat, molesta insomnia parit. Vinnam ciet, alio a commodum, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pelit, vesicam exulceratam, renésque lædit. Cum pisana coctum esu quæ in thorace sunt educit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta in decessionibus ad preclusiones vulvæ & duricias vilis habetur. Vna & altera aqua coctum, aut aqua frigida maceratum, dulcescit, & multò minùs inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriam vim habet. Quare succus eius cum aceto, addito thure, aur manna, sanguinem, maxime è naribus profluente, sistit. Venerem stimulat. Contra thoracis vitia omnia pro delinctu efficax est, & ad tabem comestam. Purgat etiam arteriam. Sed si assidue estur, visus obscuritatem inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus contra bestiarum morsus auxilium est. Idem quoque illius prodest. Cum aceto, thure & lacte, aut rosaceo instillatus, aurium doloribus & sonitui confert. Varos tollunt folia cum rhoë obscuriorum illita: epinyctidi medentur. Crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent seminis draehmæ binæ cum æquali baccharum Myrti pondere potæ. Hæc de Porro capitato solum Dioscorides tradidit. Plinius ex variis auctoribus decerpta misceat, ac confarcinat. Porrum sectium, inquit, profluxu sanguinis sistit in naribus, contrito eo obturatis, vel gallæ mixto, aut menthæ. Item ex abortu profluxu, potio succo cum lacte mulierum. Tuli etiam veteri, ac pectoris & pulmonis vitiis medetur. Illis foliis sanantur & ambusta

Lil. ca. 147.

ambusta, & epinyctides: item alia vlcera cum melle trito. Vel bestiarum morsus ex aceto: item serpentium. Aurium verò vitiis cum felle caprino, vel pari mensura mulsi: stridores cum lacte mulieris: capitis dolores, si in nares fundatur, dormituri si in aurem duobus succi cochlearibus, vno mellis. Succus & ad serpentium scorpionumque ictus bibitur cum mero, & ad lumborum dolores cum vini hemina potus. Sanguinem verò excreantibus & phthificis, distillationibus longis, vel succus, vel ex ipso cibo prodest. Item morbo regio, vel hydropicis. Et ad renum dolores cum pisanæ succo acerabuli mensura. Idem modus cum melle vulvas purgat. Estur verò & contra fungorum venena: imponitur & vulneribus. Venerem stimulat, sitim sedat, ebrietates discutit. Sed oculorum aciem hebetare traditur: inflationem quoque facere, quæ tamen stomacho non noceat, ventremque molliat. Vocis splendorem affert. Capitato maior est ad eadem effectus. Sanguinem reiicientibus succus eius cum gallæ, aut churis farina, vel acacia datur. Hippocrates & sine alia mistura dari iubet: vuluæque contractas aperiri iubet: fecunditatem etiam foeminarum hoc cibo augeri. Contritum ex melle vlcera purgat. Tussim & destillationes thoracis, pulmonis, & arteriæ vitia sanat, datum in sorbitione pisanæ, vel crudum, præter capita, sine pane, ita vt alternis diebus sumantur, vel si purulenta excreantur. Sic & vocis, vel veneris, somnorum multum confert. (De voce nihil Dioscor. dixit, de somno autem, *ὑπνὸς ὁππότε* esse, id est, tumultuosum somnum parere.) Capita bis aqua mutata cocta aluum sistunt, & fluxiones veteres. (Dioscorides ait, Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & minus inflat.) Cortex tractus illitusque inhect canos. Hæc Plinius, qui paulò antè tradidit Neronem Lib. 19. c. 6. Porro sectiuo auctoritatem dedisse, vocis gratia, ex oleo statim mensum omnium diebus, nihilque aliud, ac ne pane quidem vescendo. Gravem enim vocem ex-
plicat Porrum, sua lentitia faucium asperitatem delinens. Certè & perdicæ

AMPELOPRASVM,
Matthioli.



vtuntur eo, si credimus Aristoteli, canoræ vocis gratia. Galenus de Porris, Alliis, & Lib. 19. c. 6. Cepis agens: Harum plantarum, inquit, radices vulgò frequentissimè esunt, caulem tamen rarò & folia, quæ & ipsa proportionè radicum acrem admodum habent facultatem. Corpus calefaciunt, & qui in ipso sunt, humores crassos tenuant, lentosque incidunt. Si cocta tantum bis terue fuerint, acrimoniam quidem deponunt, tenuant tamen adhuc, & alimentum corpori dant paucissimum, quod certè prius quàm elixa essent, omnino non dabant. Est aliud Porrum, nimirum silvestre, quod Græcis *ἀγρὸν πορρον* dicitur, id est, Vineale Porrum, Arabibus *Nahan*, Italis *Porro saluatico*, & *Porrandello*, Germanis *Vudlauch*, Gallis *Porreau de chien*. Ampeloprasum caule prostrato bicubitali: foliis porraceis, sed angustioribus: flore candido: radice bulbosa. Prouenit in vinetis, in agrorum marginibus, & in amœnis collum locis. Ex Matthiolo id pictum damus: à quo diuersum est quod Lobellius exhibuit, folio Alij

AMPELOPRASVM,

feu Porrum siluestre.

Lobellij.

Lin. C. 14.
Vitis C.
Temper.
L. 14. C. 14.

L. 1. Alio.



Schero-
prasm.
Dodon.
Forma.

Locu.

Cap. 143.

siluestris tenuifolij non dissimili, sed maiore & actiore, in caule bicubitali, radice bulbosa, non ex nucleis, sed singulari capite constan- te, Porri minore, duriore, actiore, nonnullis adnatis sepe propagante flore & nucleis semi- nis vice, triticeis granis paribus, in glome- atis capitulis non disparibus Allij siluestris te- nuifolij. Vineris, aruis, marginibus, lenticeis, & dumetis Galliar & Belgij gaudet. Stoma- cho magis quàm Porrum aduerlatum, vt o- dit Dioicorides, plus exalfacit, vinarum & menses vehementius ciet. Lius etus eorum serpentium morsus vtilis est De quo Plinius. Ampeloprasum in vineis nascitur folijs Porri, ructu grauis. Contra serpentium ictus efficax. Vrinam & menses cie- nes sanguinis per genitale inhibet por- rumpositumque. Datur & a partu mulierum, & contraccanis morsum. Galenus scribit Am- peloprasum tantum a Porris distidere, quam in omnibus alijs generibus agrestia or- m domesticis differunt. Quosdam autem in- rum annum sequentem, vt Cepas ac- dentes, ira & Ampeloprasum rep-

fieri que in cibo præstantiora, ac minùs habere vitiosi succi. Item Ampel- agreste esse Porrum: quare & actius eo, & siccius esse, sicut agrestia omnia re- hortensibus, ac proinde stomacho quàm illud nocentius. Sed & crassos & le- humores potentiùs incidere, valentiùsque infarcta organa obstructione li- Hac quoque ratione vrinam sæpe prouocasse, vbi a crassis & lentis humo- retinebantur. Adeò verò esse calidum, vr, illurum cataplasmatris modo, e- Porrum aliud paruum à Dodonæo ponitur. Germanis *Vinzeulauch*, *Bislook*, id est, Allium iuncum: vnde *ῥαϊνὸν παρὰ* Græcè nuncupauit. Cauli- graciles, teneros, cauos veluti iuncos paruos, in vnum acetuum coactos ro- rum vice profert, gustu ferè Porri. Inrer hos nonnunquam cauliculi ou- rotundi cum capitulis, vr in Cepa, sed multò minoribus, floribus pu- referti. Radices sunt Bulbi Cepis paruis similes, vel porracei, minores, gi, coherentes & implexi, fibris quamplurimis capillati. Prouenit vbi- hortis, adeoque Porrum refert, vr quibuscum non solùm veri Porri vic- pleat, sed opinionem faciat. Crudi folia acetariis gustum gratissimum. Hanc plantam Fuchsius Porrum sectiuum facit. Matthiolus pro Cepa Al- nia Theophrasti depinxit, vr diximus, Lobellio & alijs restibus. Pena nega- rum Ascalonitidem, seu Palestinam Cepam esse.

ALLIUM

ALLIVM sativum
silvestre, Matthioli.



Pena in
Aduerf.

Locus.

rum Allij vrsini speciem proximè referunt & redolent, radicis ceruice longiore, rimosa cute obsita. Allium hortense patim in hortis satum prouenit. Si sponte in aruis & cæpestribus, inuisum alicubi colonis, quia segeti innatum odorè & saporem ei cõmunicat, quo deinceps tum farina, tum panes im-

ALLIVM Vrsinum latifolium,
Fuschy & Dodon.



ALLIVM Vrsinum,
Matthioli.



Vrsinum

fibræ cirtorum modo crispatur, tædioli, vt Cepa, halitus, acris saporis: quo enim spicæ plures vna coierint, hoc acrius sentitur. Silvestre foliis constat paucis prælongis, teretibus, intus concavis, iuncea ipseiem representantibus: caule procero, læui, purpureos flores ostentante, cæcamine tum colore, tum forma conspicuo. Radix bulbus est pusillus, oblongus, non ex nucleis constans, sed vnico læuique capitulo, nonnullis interdum adnatis minoribus sese propagante. Est alterum hoc minus, ceterum foliis, caule, semine, radice superiori simile, in pratis siquætiùs proueniens. Allium vrsinum, odore minus quàm habitu Allium referens, folia profertæpius duo, grandia, feruè Lili conualidior, vicia, flaccida, læuia: caulem vnum aut alterum, tenellum, in quo flores multi, candidi, stellati. Bulbus aliquot nucleis paruis, oblongis, sparsis, candicans, odorem Allij tædiosum spua, gastantique saporem acrem non ingratum præbet. Ortu & habitu non ita huic distans Ophioscorodon verè dictum, a caule foliisque Serpëtarix modo maculosis, quæ tamen

ALLIVM anguimum,
Matthioli.



Vrūnum in editis montibus & vmbrosis, vel vdis pratensibus. Anguinum maculosum etiam in montibus, Hortense & siluestre æstate florent. Vrūnum Vere, Aprili & Maio mensibus. Vis Alta est acris ex Dioscoride, calcfacit, status excernit (Legendum enim non *εκερσιαιον*, *φυσσιν*, id est, vim excernendi, flatuosum, sicut in publicis codicibus habetur, sed *εκερσιαιον φυσσιν*) aluum turbat, itomachum exsiccat. Sitim efficit, status alterat aut concoquit (Ruellius interpretatus est, flatum permouet, cum Græcè legatur, *εμπνοησιωσις αλλαιουσιον*, id est, flatuum altetatricem, aut concoctricem vim habet.) Summam corporis cutem exulcerat. Esu latos ventris lumbricos expellit. Vrinæ ducit. Contra viperarum morsus & hæmorrhoidum prodest, ita vt non aliud magis (Græca habent, *εχιδνακτος τε, καὶ αμφοτέρωθεν ἀρριζέται*, &c. Sunt enim *αμφοτέρωθεν* q per vniuersum corpus sanguinem fundunt, ab Hæmorrhoi, siue Hæmorrhoidis serpentis morsu) si vinum iugiter sumatur, aut in eodem titum bibatur. Contra rabio-
forum morsus vtiliter illinitur. Contra aqua-

Tempus.
Lil. c. 146.
Vires &
Temper.

rum mutationes confert. Asperas arterias clarificat. Veterem tussim crudum & coctum esu lenit. Cum origani decocto potum pediculos & lendes enecat. Vstum & cum melle subactum illitumque hypopia & alopecias sanat. Exanthemata cum nardino vnguento, sale & oleo curat. Alphos, imperigines, lentigines, achoras, lepras, furfuresque eximit. Cum teda & thure decoctum, si in ore contineatur, dentium dolorem leuat. Contra muris aranei morsus cum ficulneis foliis & cumino illinitur. Comæ decoctum in infelsionibus menses & secundas trahit. Eiusdem galactia sufficit. factum ex eo & nigra oliua intritum, quod Græci *μυρτιδιον* vocant, vrinam cit, & aperiendi vim habet. Vtile etiam hydropicis. Hic Myrtoei vox aliquoties ab Hippocrate vsurpatur, vt in libro de visu, de medicamento quodam oculari scribens. *καὶ ὀλῆγον ἀναρριζέται, εὖς ἂν πύχον γίνωται ὡς μυρτιδιον*. Cuius vocis Galeus meminit in Glossis Hippocraticis, Dioscoridem citans. *μυρτιδιον τριβύλλου διοσκορίδης ἔχει φρεσι σκορδίον ἢ κρομόν*. Quæ de hoc Dioscoridis loco intelligi possunt. Eadem voce vsus est Theophrastus loco supra à nobis citato. Alij vites plaribus exponit Plinius his verbis. Allio magna vis, magnæ utilitates contra aquatum inutationes. Serpentes abigit, & scorpiones odore: atque, vt aliqui tradidere, & bestiarum omnium ictibus medetur potu, vel cibo, vel illitu: priuatim contra hæmorrhoidas prodest cum vino redditum vomitu. Ac ne contra araneorum murium venenatum morsum valere miremur, aconitum, quod alio nomine pardalianches vocatur, debeat: item hyoscyamum: canum morsus, in quæ vulnera cum melle imponitur. Ad serpentium quidem ictus potum cum reftibus suis Alij cum vestibus, id est, membranis corticibus) efficacissimè ex oleo illinitur: attritisque corporum partibus, vel si in vesicas intumuerint. Quin & suffitu eo secundas partus euocari existimauit Hippocrates: cinere eorum cum oleo capitis vlcera manantia sanitati restituens. Suspiriosis coctum, aliqui crudum id dedere. Diocles hydropicis cum centauro, aut in fico duplici ad euacuandam aluum: quod efficacius præstat viride cum coriandro in meto potum. Suspiriosis aliqui

Lib. 10. c. 6.

Libro de
morb. mul.
liber.

& tritum in lacte dederunt. Praxagoras & contra morbum regium vino miscuit & contra ileum in oleo & pulve, sic illinens strumis quoque. Antiqui & infan-
tibus dabant crudum. Diocles phreneticis elixum. Contra anginas tritum im-
poni, & gargarizare prodest. Dentium dolorem tribus capitibus in aceto tritis im-
minuit, vel si decocta aqua colluantur, addaturque ipsum in caua dentium. Auri-
bus etiam instillatur succus cum adipe anserino: phthiriales & prurigines po-
tum, tufum item cum aceto & nitro compefcit: destillationes cum lacte coctum,
vel tritum, permistumve caseo molli: quo genere & raucitatem extenuat: vel
phthysim in fabæ sorbitione. In totum autem coctum vtilius est crudo, elixumque
tosto: sic & voci confert. Tineas & reliqua animalia interaneorum pellit, in ace-
to thulso coctum. Tenefmo in pulve medetur. Temporum doloribus illitum eli-
xum, & pustulis coctum cum melle, deinde tritum. Tussi cum adipe vetusto deco-
ctum, vel cum lacte. Aut si sanguis etiam excreetur, vel porulenta, sub pruna coctum,
& cum mellis pari modo sumptum. Conuulsis, ruptis, cum sale & oleo. Nam cum
adipe tumores suspectos sanat. Extrahit fistulis vitia cum sulphure & resina, etiam
arundines cum pice. Lepras, lichenas, lentigines exulcerat, sanatque cum organo,
vel cinis eius ex oleo & garo illitus. Sic & sacros ignes. Sugillata ac liuenta ad
dolorem reducit, contusum ex melle. Credunt & comitalem morbum sanare, si
quis eo in cibo utatur ac potione. Quartanas quoque excutere potum caput vnum
cum Laferpitij obolo in vino austerio. Tussim & alio modo ac pectoris suppura-
tiones quantalibet sanat, fractæ incoctum fabæ, atque ita in cibo sumptum, do-
nec sanitatem restituat: facit & somnos, atque in totum rubicundiora corpora. Ve-
nerem quoque stimulat cum coriandro viridi tritum, potumque è mero. Vicia eius
sunt, quod oculos hebetat, inflationes facit, stomachum ledit copiosius sumptum,
sitim gignit. Cæterò contra pituitam, & gallinis & gallinaceis prodest mixtum
farre in cibo. Iumenta urinam reddere, atque non torqueri tradunt, si trito natura
tangatur. Hæc Plinius. Qui cum Allium cõtra hæmorrhoidas prodesse dicit, per
hæmorrhoidas non sedis affectionē intelligit, sed genus serpentis, cuius mas Hæ-
morrhus, femina Hæmorrhoidis vocatur auctore Aërio, ex cuius morfu sanguis
per totum corpus ferri contigit: vnde ei nomen positum. Galenus scribit Allium
calfacere & exsiccare quarto excessu. Agreste domestico valentius esse, cuius li-
qua agrestia. Alibi Allium mandi nō vt obsonium, sed vt salubre medicamentum
quod digerendi & obstructiones aperiendi facultatem habet. Quod si elixum pa-
rum fuerit, adeo vt acrimoniam deponat, vires quidem habere debiliores, succi
autem prauitatem non amplius retinere. Et alio in loco, Allium, inquit, ex eorum
ciborum est genere, qui & flatum discutiunt, & minimè sitim inferunt. Sunequi
parum id experti existimēt maiorem quàm Cepam sitim excitare, sed planè e o-
re: cum non modò maiorem quàm Cepa, sed nec omnino sitim faciat. Idem om-
nium planè eduliorum maxime flatum discutit. Itaque ipse certè agrestium the-
riacem id appello. Ex his perspicuum est Dioscoridem à Galeno scribentem vim
habere *διψυσ ποτιστικῆς*, id est, sitim efficientē, reprehēdi. Symeon Sethi tradit pro-
prietate quadam sitim à falso humore factam sedare, & non solum flatum discute-
re, sed horum generationem prohibere: colicos affectus à flatibus ortos, & diu-
turnos coxendicium, qui à pituita proueniunt, dolores iuuare. Porro & Allio hic
εξ οξυπόδιστος subdemus, Latinis Alliporrum, Gallis *Alliporreau*, quod non solum
effigiei, sed qualitatum Allij & Porri, vt Dioscorides ait, sit particeps. Magnæ edi-
ne Porrum æquat: folijs est Porraceis, quæ digitis trita Allium & Porrum respiciūt.
In multis Italiz locis sua sponte nasci Matthiolus affirmat, vnde translatum in
hortis & viridatiis virefcit. Aliud Scorodoprason pinxit Lobellius, folio Porri
latiore, caule quaternum & quinum cubitorum è bulbo crassiore, nucleis quinis
&

Lib. 19. c. 43.

Lib. 8. sim.

Lib. 1. Allium.

Lib. 11. Me-
tho.

Lib. 1. c. 47.

& finis ex squamatis cuticulis coacto, odoris ingrati, Allij, vegetioris. Item aliud, crassioribus & longioribus nucleis: bulbus eius stipatur membraneis inuolucris ex atro flauentibus: flos & folia Allij exiliora: odor & sapor Scorodoprasi. Magis spūare Allium ait Pena, sed propius exprimere Porrum, quod in cliuosis vineis,

SCORODOPRASVM,
Marthioli.

SCORODOPRASON alterum
duplex, Lobelij.



& nactus ericetis Ligurum, Niceæq; in Sabaudia sponte provenit. Quare falsum Marcellus Vergilius, qui, quod Plinius huius plantæ non meminerit, nec alij scriptores, monstrum aliquod Naturæ credit id fuisse, coactis humano opere coalescere simul non dissimilibus penitus oleribus duobus: qualia in re rustica aliquando excogitata in maiore ocio ab aliquibus fuere. Scorodoprasum, ut Lxxv. Dioscorides, promiscuas sibi vires ex Allio & Porro vendicauit, effectus Alij & Porri præbens, sed inefficacius. Coctū Porri modo dulcescit, & in olerum usum transit. Idem Galenus tradit, Scorodoprasum sicut gustu & odore mediam Alij & Porri qualitatē possidet, ita & viribus. Lib. 2. c. 147. Lib. 8. sim.

ORCHIS.

CAP. XII.



V M Bulbis, Hyacinthis, Cepaceis, atque aliis similibus Testiculos & Satyria recensere conuenit. In quibus qui ὄρχις, & κινδὸς ὄρχις Græcis, Latinis similiter Orchis & Cynosorchis dicitur, Officinis Testiculus canis, Arabibus Chafi al'kes, seu Chafi alchels, Italis Testicolo di cane, Germanus Knabenkraut, Hispanis Coyon de perro, Gallis Couillon de chien & du Satyrion, Officinarum nomē retinentes. Nam Officinæ Orchies Satyria nominant, & eorum bulbis legitimi Satyrij vice vtuntur. Præbuisse occasionem videtur Apuleius, qui nullam inter Satyria & Orchies differentiam facit, sed vtrumque Satyrium cum vtroque Orchis canis videlicet dicto, & Serapiade confundit. Græcis, inquit, dicitur Satyriū, aliis Cynosorchis, aliis Eutaticos, Panion, Serapion, aliis Orchis, Galli Vram, Itali Priapifcon, alijs Orminalem, alijs Testiculum leporinum nominant. Nomina

Orchis

Orchis dicta est herba, quòd radices sibi inuicem haud secus atque duo testiculi cohereant. Cynorchis verò quòd canum testiculis similem radicem habeat.

Genera. Orcheos duo esse genera dixerunt Dioscorides, Galenus, Plinius, Orchin siue Cynorchin, & Orchin Serapiada. Multò plures sunt recentioribus differentiæ, omnes à radicis effigie sic nominari. Fuchsius Orcheos duo genera facit, marem & feminam. Marem irem duorum generum, vnum latifolium, alterum angustifolium: feminam itidem duorum generum, vnam maiorem, alteram minorem. Matthiolus quinque Orcheos species depinxit, foliis & floribus differentes, quibus addidit Palmæ Christi species duas, de quib⁹ capite De Satyrio dicemus. Dodonæus Orcheis quatuor generibus distinxit. Primi generis, Orcheos videlicet, siue Cynorchis quinque species constituit, duas priores maris, tres reliquas feminæ nomine designans. Secundam Tragorchin, id est, Hirci testiculum. Tertiã speciem duplicem etiam, marem scilicet & feminam. Quartam quoque duplicem, hanc maiorem, illam minorem. Alio in libro Orcheis quinque generibus comprehendit. Primum Cynorchin vocat, cuius species quinque, secundum Testiculum morionis, tertium Tragorchin, quartum Orchin Serapiada, quintum Testiculum odoratum, siue Testiculum pumilum. Orchis siue Cynorchis, ut dicitur

In c. 124. &
125 lib. 3.
Lib. 2. hist.
cap. 46.

De flor.
cap. 62.

Lib. 3. c. 124.
Forma.

Lib. 27. c. 8.

De flor. c. 61

ORCHIS 1. species Dodo.
1. Matth.

Lib. 9. hist.
cap. 19.

1. Cynoso.

Lib. 2. hist.
cap. 46. &
De flor.
cap. 62.



Dod. lib.

quorum vnus plenior ac vegetior, alter rugosior. Secunda species foliis similiter lauib⁹, oblongis & latis est, sed quàm antecessoribus minoribus & angustioribus, quinque aut sex, nonnullis caulē amplectentibus. Tercia quadrantalibus, spica densa, bicut,

Orcheos delineationem Dodonæus primo, vel secundo, vel vtrique Cynorchis conuenire censet, & f. 1. legi apud Dioscoridem folia ἐλαφιστάλακον ὄρχιν, ὡς σκιδάριον μαλακίον, ut Scilla intelligatur Epimenidia, foliis minus asperis & angustioribus, quam in hîc Dioscoridis mollem appellat. Hanc lectionem confirmat Theophrasti auctoritate, qui de Orchis scribens ait, ὅτι ἐστὶν φύλλον σκιδάριον, id est, folium Scillæ habet. Quod de re paulò post dicturi sumus. At priorem in Dioscoride lectionem agnouit Plinius loco iam citato, Orchis Olex mollia folia assignans, & Theophrastus, vtriusque eodem Plinio colligere licet, non de Cynorchis, sed de Orchis Serapiade hic verba facere videtur. Cynorchis prima species, auctore Dodonæo, folia fert lata, pinguis, Lilijs foliis, propemodum similia: caulem pedalem ait altiore, angulosum, & in eo flores copiosos, spicatim digestos, colore rubentis dilux purpurei, cucullo aut galeæ patenti similes, ex quibus parte inferiore lacinosum quiddā, canis aut alterius animalis quadrupedis exuuium simile dependet, dilutè & ipsum purpurascens, punctulis magis purpureis respersum. Pro radicibus præter fibras supra adherentes gemini sunt bulbi veluti testiculi, forma aliquantum oblongi,

ORCHIS II. species Dod.
& Matthioli.



breui, in qua flores multi, colore ex cado put-
purascentes, multis purpureis punctis, & inte-
riore parte obscurioribus, copiosis, exiguis li-
neis ornati, forma galeam aut hiantem cucullu
referentes, dependente ex singulis veluti ani-
malculi quadrupedis, aut homunculi extensis
brachiis, & diuicatis cruribus absque capite
corpusculo: radices duae subsunt globosae, nu-
clei nucis myristicis magnitudine, adhaerentibus
ad annexu fibris aliquot crassis. Tertia Cynos-
orchis species folia edit angusta, striata, Planta-
ginis angustifoliae foliis quodammodo similia:
caulem dodrantalem: flores in breui densaque
spica copiosos, colore foris puniceo, & obscuro
rem purpuram referente, intus vero albicante,
eiusdem cum superioribus formae, sed tamē mi-
nores, dependente quoque ex ipsis rudi ac infor-
mi exiguo veluti quadrupedis animantis rudi-
mento. Radices subsunt aliorum Orcheon simi-
les. Exhibuit Matthiolus eam, quae hic expressa
est, Testiculi speciem tertiam sine vlla delinea-
tione. Illi & alius floribus per omnia similis, fo-
liis tamen latioribus, & secundum referentibus.

Dod. ibid.

Dod. ibid.

Dod. ibid.

Orcheus
genus. 4.
De flor.
cap. 61.

lam & quinta quaedam species reperitur, foliis vti secundus canis Testiculus: caule
pedale: spica longa: floribus colore herbaceo subuirentibus, ex quibus quod laci-
nae simile dependet, oblongum est, & quali quadrangulum. Haec sunt primi gene-
ris Cynosorchis species. Secundum Orcheus genus, Testiculus morionis à Do-

ORCHIS III.
Dodonaei.



TESTICULI III.
species, Matth.



QQQ

ORCHIS IIII. & V.

Dodonæi: I. Martii.

modo adnascuntur, non erectis, sed ipsi floris cucullo ita incumbens, ut facile obseruentur: gemini & huic testiculis similes globuli exeunt, & superius aliquot fibræ. Et vni quidem huius generis flores purpurei, violæ colore, in medio candidiores, punctis aliquot variegati, pluresque in densioribus

donxo dicitur, isque duplex, mas & femina. Mas folia sunt quinque aut sex, lata, læuia, Libi foliis similia quidem, sed minora, superius maculis aliquot subnigricantibus signata: quoru vnum atque etiam alterum caulem amplectitur, qui dodrantalis est: flores in spica purpurei, circa umbilicum albidiores, odorati & aspergi grati postterius corniculum habet propendens, simile fere corniculo Regii floris, anterieus vero cucullum auriculatū & cristatum motibus referunt. Nam cuculli quidem & patens huius modo flosculus hiat, & angusta folia quæ a lateribus surgunt, auriculas, quod verò e medio tollitur cristam refert. Radices gemini sunt globuli, nucleo nucis myristicæ similes, supra quos fibræ exeunt. In historia stirpium Orchis & cundum genus facit Dodonæus, Martii Testiculum quartum. Femina folia libetius lacerata, sed angustiora, & aliquantum venosa siue striata, Platanis angustifolia quodammodo similia: flores hiantes quoque & vni patentes cucullos, à tergo dependentes e longis corniculo, sed foliis, quæ crasse auriculati

*TESTICVLVS Merionis
mas, Dodonæi.*



*TESTICVLVS Merionis
femina, Dodonæi.*



caulisque quàm reliquorum longior. Alteri flores dilutè rubent, cauliculus breuior est, & folia aliquatenus minora. Tertij flores purpuram referunt exquisitè rubentem, & vermiculum colorem. densa huic breuisque spica: flores minores: folia nonnihil striata, pleraque erecta, & caulem circumamplectentia. Sunt verò & huius generis minores Testiculi, quibus cauliculus brevis est: folia paruula, quina aut sena, vno aut altero circum cauliculum erecto: flores in spira breui, tui, colore nunc in caruleo purpureo diluti, nunc candidi, quandoque rubentes, sed coloris obsoleti & odoris ingrati. Tertium Orchæus genus Tragorchis nominatur, id est, Hirci testiculus, ab alijs Testiculus leporistamè ab odore, quo hircu, cum in flore est, refert, Hirci testiculus potius appellandus: folia similiter laxa, lata, & longa

ORCHIS *Sauvages vel Scinophora Gemma: Testiculus Hircinus vulgaris.*



fert, Liliaceis proxima, maiora quàm aliorum Orchæon: caulem cubitalem, sæpe folijs nonnullis inferiùs implicitis: flores secundum caulem in longa veluti spira multos, fætidus & hircum olentes, quorum forma patenti quoque galeæ similis est, ex quibus tamen non exuuo simile quid, sed longa, aliquantulum retorta veluti laceretæ cum medio corpusculo cauda propendit, coloris eius cuius est caulis, purpureis aliquot punctulis circa annexum insignita: semen in valvulis oblongis & striatis gignitur perexiguum: testiculi subsunt grandes, fibræ aliquot suprà adhærent. Eius iconem infra posuimus. Quartum Orchæus genus Serapias ab antiquis cognominatur auctore Dioscoride, quoniam radix ad multa utilis sit. Sunt qui à Serapi Alexandrinorum Deo sic nominatum velint, inquit Fuchsius, propter lasciuia impudentem, quæ is Deus Canopi, vbi templum & cultu & religione excellens habebat, colebatur, vt videre est apud Serabonem. Paulo Triorchis dicitur non alia de causa, quàm quòd tribus testicularis radicibus in terra nititur, quas etiam Fuchsius vtrique Serapiadi appinxit. Plinius tamen &

Lib. 3. c. 115.
Cap. 210.
h. h.
L. h. Geo.
17.
Lib. 6. & 7.

Theophrastus non nisi geminos bulbos Serapiadi tribuerunt, neque plures duobus in his vel alijs testiculis se obseruasse Dodonæus affirmat. Huius Serapiadis duo genera depinxit Fuchsius, marem & fæminam. Dodonæus tria. Vnius flos papilionem, alterius fucum, tertij muscæam refert. Orchis Serapias, vt describit Dioscorides, folia Porro similia habet, oblonga, latiora & pingua, in alarum cauis inflexa: cauliculos dodrantes, subpurpureos flores: radix subest testiculis similis. De quo hæc scripsisse videtur Theophrastus. *καθ' ὅσον ἐπὶ τοῖς ὄρχεως καλόμενα διὰ τὸ γὰρ ὄναι, τὸ μὲν μέγα, τοῦ δὲ μικροῦ, τὸν μὲν μέγα ἐνεργέστερον αἰετὶ πρὸς τὰς ὀμφίλιας, ἐν γὰρ καὶ διδόμενον ἀγρὸς ὀρετρῆναι, τὸν δὲ ἐλάττω σήματι καλεῖσθαι. ἔχει δὲ τὸ μέν πολλόν σιλαφίδες, μετέτερον δὲ καὶ ἑλάττω. τὸν δὲ καλεῖται ὁμοῖον ἀπὸ τοῦ σιλαφίδος.* Quæ sic vertit Gaza. Sicut qui testiculus appellatur. Cùm enim gemini sint, alter magnus, alter autem paruus, magnum efficacem ad coitum, datum è lacte caprino tradunt, minorem verò obesse, ac inhibere. Habet folium Laferis, verum laxius atque minus: caulem simillimum spinæ, quam Pirum vocant. Sed hunc locum mendosum esse testatur Plinius, vt rectè Hermolaus annotauit. Non enim Silphij seu Laferis folium habet Serapias, vt Gaza conuertit, *σιλαφίδες* pro

De flor.
cap. 61.
Cap. 210.
Lib. 3. c. 115.
Lib. 9. h. h.
cap. 19.

In corall.
cap. 145.
h.

σκαλλῶδες legens. Etenim Silphio folium est Apij, nō scillaceum aut potraceum, vt Serapiadi. Deinde spinosus huic herbe caulis, & Apio, id est, Raphano similitudinis, inquit Hermolaus, nō, vt Theodorus, Piro similis. Plinius Theophrastus interpretantur est. Sed inter pauca mirabilis est Orchis herba siue Serapias, folia Porri caule palmeo: flore purpureo: gemina radice, testiculis simili, ita vt maior, siue, vt aliqui dicunt, durior ex aqua pota excitet libidinem, rarior siue mollior: huic caprino inhibeat. Quidam folio Scillæ esse dicunt, latiori ac minori: caule spinoso. Quare legendum, σκαλλῶδες, λεγόμενοι δὲ χειρὶ λατύνοντες, ὅτι χαλκοῖς ἀκροβατοῖς, ὁμοιωμένοι ἀπὸ τοῦ ποτρίου, id est, Piro. Testiculum Serapiada primum hic vocat describit Dodonæus: folia fert duo aut tria, læuia, latiuscula, at latij folijs multo mi-

De flor.
cap. 61.

ORCHIS Serapias primus,
Dodonæi.



TRIORCHIS Serapias
mar. Fuchij.



noræ caulem dodrantalem, aut altiore: flores in eo raros, candidos, papilionibus expansis aliis quodammodo similes, è foliolis scilicet tribus, vno superiore, & duobus lateralibus alas referentibus, & longiori, tenui velut papilionis corpore, cauda pendente, melleum & dulcem liquorem continente commissi: qui compositi aliquantulum pediculo cauli adherent. Globuli subsunt gemini, candidi & rotundi, & supra eorum atinexum fibræ aliquot pro radicibus. Secundum Serapiadis nomen quinis senisve constat foliis, venosis, aliquantulum lazis, Plantaginis angustioribus, quadantenus similibus, sed minoribus, quibusdam terram vestis testibus, aliis circum caulem, qui palmaris aut dodrantalis est: floribus in summo quinque aut sex, ex aliquot foliolis compositis, quorum inferius forma, & colore sublimi, fordidofucum proximè referre videtur: testiculi subsunt vt alius gemini. Reperiuntur huius species duæ: vnus flos foliola maiora, candidiora, & aliquantulum purpurascencia habet: alterius omnino minora & subuirentia. Huius caulis breuior, illius altior. Est Triorchis femina Fuchio. Tertius Orchis Serapias, vni est minoribus & paucioribus: cauleque breuiori ac tenuiori quàm secundus, cui aboqui satis similis est: flores huic tres aut quatuor, ex tribus exiguis superioribus & duobus

ORCHIS *Serapias secundus, Dodo.*
Marrh. Testiculus II.

TRIORCHIS *Serapias*
tertius, Dodonai.



TESTICVLVS odora-
tus, Dodonai.



liolis, & quarto inferiore oblongiore, colore in purpu-
ra tristi subnigro, nonnihil variegato, forma muscæ
cuiusdã corpori similes. Testiculi veluti geminæ par-
uæ pilulæ sunt. Secundum ex his Serapiada præsertim
maio rem Dodonæus cum Dioscoridis delineatione
conuenire ait: folium enim ei Marrubij folio longius
latiusque & laxæ est, quod reflectitur: caulis dodranta-
lis: florum superiora foliola dilutè in candore ruben-
tem purpuram referunt: testiculi exigui sunt. Vbi Do-
donæus *isoxora serapias*, id est, Marrubio, pro *serapio*, id
est, Porro legit, Pliniumq; qui folia Porri ei tribuit, in-
terpretibus omnibus errandi occasionem dedisse ait.
Quintũ Orchios genus Testiculus odoratus, siue pu-
milio nũcupatus, omnium foliis minimus est: etenim
ei foliola sunt omnino paruula, eaque venosa, & Plan-
tagini aliquatenus similia, sed minutis ac paruuliseius
foliis minora, virentia: caulis tenuis est, palmi altitudi-
ne, circa quem flosculi paruuli, candidi, suauiter odo-
rati, ordine digesti, ac spiræ modo caulem ambientes:
bulbi subsunt gemini, parui, oblongi. His addo Te-

Lib. de flo-
cap. 64

Genus
Orchios.
Dodon. de
flor. ca. 64.

sticulum vulpis vulgò vocatum, seu Testiculum sacerdotis, Germanis *Sternedelwurte*,
quem Fuchsius Satyrj trifolij nomine descripsit & depinxit. Tria duntaxat fere
semper folia profert Lilij albi foliis similia, minora tamen & rubicundiora, cau-
lem pedalem, in quo flores venusti, radicis caux floribus haud dissimiles, modò
nivei candoris, modò saturè purpurei: radices sunt veluti nuces dux exigux, vel
olux coherentes, foris rubescentes, intus candidæ, quarum vna plenior & maior,
altera minor, spongiosa, flaccida, sapore dulci & grato. Est alius Orchis, rotundus

Cap. 69.
huf.
Dodo. lib.
2. cap. 46.

TESTICVLVS Vulpis,
Dodonæi.

ORCHIS rotundus,
Dalechampij.



à Dalechampio cognominatus, radice gemina, testiculis simili, carnosâ, Læpe
fibrata: caule vnico, cubitali, rotundo: foliis ad summum tribus vel quatuor,
venosis, pallidis, atundinis instarè caulis amplexu sese explicantibus: flore pun
ceo in capitulis globosis, & aliquantulum com
pressis, non aliorum generum modo in capi
longo & spicato emicante, capituli vestitus
de industria affixo. Præterea obseruauit Dale
champius in editis montibus Orcheos
humile, rarum flore luteo, tribus aut quatuor
foliis constans, cætera vulgò cognitis simi
Prope oppidum Monspelio vicinum, Veger
nominatum, id genus nascitur. Orcheon gene
ra aliter distinxit Lobellius ex Cornelio Morio,
ma, & multò plura spectanda nobis proponit
vt tum huic, tum illi multarum id genus plan
tarum cognitionem acceptam referre debea
mus. Sunt omnes ordine, qui sequuntur, expre
sse. Cynosorchis Morio, Orchis mas à Fuchsio
folia Fuchsi, Satyrium Apulei, Otchi Delphi
nia palustris Corn. Gemma, Testiculus Mo
rionis mas Dodonæi. Cynosorchis maioris spe
cies secunda, Cynosorchis altera Dodonæi. Cyno
orchis Morio femina Dodonæi, Orchis Delphi
nia moriana Corn. Gemma. Testiculus lu
cinus Testiculus vulpinus primus, Orchis Serapi
pius primus Dodonæi. Testiculus vulpinus secu
dus, Orchis Serapius secundus Dodonæi. Hi Te
sticuli

CYNOSORCHIS maior Lob.

Serapius Dioscor.
Gemma.



fluctu superius descripti sunt, & depicti. Cynorchus Lobel maior. Serapias Diosc. VII.
Corn. Gemmæ, siue Basilica, Syderites vel Erythra, floris omnino purpurei,

SERAPIAS Diosc. 2. Gemma
Orchis Basilica altera, Cynof-
orchis altera in tur, Lob.

& aliarum omnium facile princeps. Cynofor-
chi. altera maior Lobelij, Serapias Diosc. VIII.
dis secunda. Corn. Gemmæ, siue Orchis Ba-
silica altera Syderites flore candidiore, thyr-
soq; magis compresso, & foliis latioribus usq;
ad verticem inflexis, circa caulem argenteis.
In Serapiadum genere principes, siue Pa-
licas appellauit Corn. Gēma, ob regali sceptri
diadematis ac trabæ similitudinem. Maior
tum prima, tum secunda foliis constans per-
fectè virentibus instar Poiri, oblongis, pin-
guibus, paulò latioribus, interdum leuiter in-
flexis: testiculi perfectè rotundi: cauliculus
dodrantalis, sæpe procerior: flos venustissi-
mus, valde purpureus, interdum leuiter sub-
purpurascens, dispositis fere in umbellæ dila-
tescentis speciem, nulla odoris gratia. Altera
flore minùs purpureo, magisque in aciem ex-
plicato. Floret vtraque a principio Iunij men-
sis, sæpe usque in medium Iulij, constante spe-
cie & venustate mirabili. Erumpunt folia cir-
ca solstitium Hyemale. Gaudet vmbrosis &
asperis, muscoso solo, & maxime graminetis.
Vulgaris Testiculus hircinus, seu Tragorchis, IX.



TRAGORCHIS minor, &
uerior, Gemma.

ORCHIS Melitias,
Gemma.



- X. & Lepotis testiculus nostrâs, quem iam descripsiâus, Orchis lautodes vel
 cophora, lacertatum æmulatione, Cornel. Gemmâ, siue Tragorchis altera. Tra-
 XI. gorchis minor & verior Corn. Gemmâ, siue Cor. osmities, siue Coriophora, flore
 XII. instar Cimiculi. Orchis Melittias, siue Apis cadauerulum exprimens, Orchis

ORCHIS Myodes I.
 Gemma.



ORCHIS Sphæcodes,
 Gemma.



ORCHIS Myodes
 altera, Gemma.



teumatica, vel Stratiotes maior, siue Militaris Cor. Gemmæ, quam meritiò Basili. xix. cam teſeian liceat appellare. Orchis Strateumatica minor Cor. Gemmæ. Or. xx. chis Barrachites, vel Barrachoides Gemmæ, Belgarum *Varkens*, id est, Ranula, a xxii. floris hura. Orchis Hermaphrodita ſecunda Cornel. Gemmæ, siue Orchis xxii.

ORCHIS Ornithophora folio
lani, Gemma.



ORCHIS Ornithophora folio
maculofis, Gemma.



ORCHIS Strateumatica maior,
Baſilica 3. Gemma.



ORCHIS Strateumatica
minor, Gemma.



psychoides

psychoides diphylla. Testiculus odoratus, à nobis suprà depictus & descriptus,
 XXIII. Orchis Spiralis Cornel. Gemmæ. Huic adiungitur Tetrorchis, vel Triorchis al-
 ba Spiralis, vel Autumnalis Cornel. Gemmæ. Alter Pumilio, inquit, flore candi-
 do odorato, rectè Spirale Satyrium vel Autumnale vocetur. Estq; ut plurimum

ORCHIS Batrachoides,
 Gemma.

ORCHIS Hermaphrodita Gemma-
 siue Orchis psychoides diphylla.



TETRORCHIS vel *Triorchis*
 alba, Gemma.



ORCHIS Frigida, alba,
 Gemma.



Triorchis

Triorchis, aut Tetrorchis, oblongis bulbis instar oliuæ compressæ, folia rhomboide, impenſe virentia, cum fulgore subatro. Flores in spiram apice dispositi forma diadematis, vt Testiculo odorato. Erumpunt folia mense Septembri, flore iam marcescente, ac perseverant vsque in Maium, inde vero per æstatē deliteſcunt:

TRIORCHIS lutea
Gemma, Lobell.



TRIORCHIS lutea, flore
luteo Gemma, Lobell.



erumpit autem cauliculus mense Augusto, florens vsque in Septembrem. Oculis fissa litoralis Gemmae, quæ gemma uetiora folia bifolia, Plantaginis latifoliae angustiora edr, & in dodranali cauliculo herbaceo, line luteo virentes Rosculos in horto D.Brancionis. Idem, aut illi congener est Triorchis lutea altera Corn.Gemmae, folio rotundiore & latiore quàm Triorchis alio viridior, trifolia & nonnihil hirsuta. Est etiam Triorchis lutea tertia, cuius effigies hic appositæ, sed obliquis radicis oliuaribus bulbis. Sequitur Ouchis minor Leodiensis Triorchis lutea, flore luteo, siue Basilica minor Corn.Gemmae Serapias & Triorchis quorundā. Terna folia angustiora, Quinqueneruæ Plantaginis amula edr, leuore & viriditate Auriculæ vrlinæ, vti superior flos item in cauliculo extra testiculi odorati parti. Radix ternis & quaternis pusillis, pendulis testiculis subest, quibus diuancatur & propagatur. Collibus agri Leodiensis gaudet. Dicitur hæc Basilica minor Gemmae, Pumilio, flore luteo nonnihil herbaceo instar regij diadematis, odore fragrantissimo, cui vis ad excitandam venerem præ cæteris admiranda:quare Hispani *Amor di donna* merito appellant: testes parui, rotundi, solidi, corrice rufo obducti. Folia emergunt prius Maio mense, vel circa finem Aprilis: floret mense Iulio vsque in Augustum: valde sese multiplicat sub terris. Gaudet montosis. Duæ, quæ sequuntur, a nobis descriptæ sunt & depictæ capite de Satyrio. Serapias mas læui folio, floribus dilutè purpureis, notulis conspersis, Satyrium Basilicum primum Dodonæi, Palma Christi Herbariorum, & Serapias fœmina pratensis, foliis notulis inspersis, Satyrium Basilicum alterum maius Dodonæi, & Palma Christi. Serapias candido flore montana maculatis foliis, Cynosorchis montana folio maculoso Corn.Gemmae in pratis niueo flore crebra visitur: cætera haud absimilia Satyrio Basilico altero Dodonæi. Serapias minor rubra nitente flore angustifolia, nullis inspersis punctulis. Serapias palustris latifolia, Cynosorchis palustris platyphylla, folio læui luteoque: flore albo, subpurpureascente Cornel. Gemmae

XXIII.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

SERAPIAS candido
flore, Lobell.

SERAPIAS minor rubra,
Gemma.



CYNOSORCHIS palustris
Platyphylla, Gemma.



SERAPIAS palustris altera
Leptophylla, Gemma.



- XXX Gemmæ. Præcocior est violacea Cynosorchis. Serapias palustris altera
 XXXI. phylla. Serapias palustris tertia Cynosorchis altera Corn. Gemmæ, serius flores.
 coma violacea, foliis interdum lævibus, interdum maculosis. Serapias montana
 XXXII. folio lævi, Cynosorchis montana folio lævi Corn. Gemmæ. Cynosorchis Dia-
 XXXIII. cornu

SERAPIAS palustris
III. Gemma.

SERAPIAS montana folio
leni, Gemma.



CYNOSORCHIS Dracon-
tias, Gemma.

CYNOSORCHIS
Conopsea.



contias foliis & floribus impensè rubris Corn. Gemmz. Floret circa finem Aprili-
lis, aut initia mensis Maij. Nascitur in humidis & vliginosis, præsertim vbi nigrior
terra est. Cynosorchis Macrocaulos, vel Conopsea, siue Galericulara Cornel. XXXIII.
Gemmz. Floret circa medium finemque mensis Maij, vsque ad mensis Iunij ferè

R R R

medium. Ad duorum cubitorum altitudinem sæpe pertingit. Flores illi purpurei admodum elegantes, & odorati vt in Serapiade Basilica prima, atque secunda, nisi quod color Conopseæ magis d. luteus, & hæc alterius velut formella propria videatur. Gaudet pratis, sed tamen non vique adeo humidis, vt priores: quin potius

XXXV.

SATYRIUM castratum, Gemma.

XXXVI.

Locus.

Vires &
Temper.
L. 1. c. 14.



CYNOSORCHIS leptophylla, Gemma.



medio quodam solo ac temperato. Satyri castratum, vel eunuchum, ex genere Cynosorchis Corn. Gemmæ. Cynosorchis palustris laxi folio & angusto omnium vilissima Corn. Gemmæ. Cynosorchis palustris altera lophodes vel nephelodes Corn. Gemmæ. Flus illi communis ferè cum ceteris maculosus. O ad huic communis appicta est deflorescentis Satyrii forma, vna cum corniulis, quibus semen atomum prorsus includitur. Hæstus Lobelius & Cornelius Gemma. Cynosorchis petrosus & arenosis locis prouenit. Quædam in palustribus, ac humectenibus, in pratis. Tragorchis in pingui & argilloso Testiculus vulpis & odoratus in editis & aridis locis maximè. Orchis rosea in uosis pratis altorum frigide rurique gaudet. Maio & Iunio mensibus oritur. Vnde dempto odorato, qui Augusto, aut Septembri mense flores promit. Cynosorchis raditur vt Bulbus cocta, inquit Dioscorides de ea, si maiorem edant viii, mares generis minorem femine, sceminas. Addunt etiam

CYNOSORCHIS palustris altera lophodes, Gemma.



Thes.

Theſſalia mulieres mollem cum caprino lacte bibendam dare, vt ad venerea exci-
 tent, aridam verò ad inhibenda, ac diſſipanda. Alterum etiam alterius potu reſol-
 ui. Eadem planè Plinius tradidit. Eduntur vt Bulbi cocti in vineis ſerè inuenti. Li. 37. ca. 8.
 Ex his radicibus ſi maiorẽ edant viti, mares generati dicunt, ſi minorẽ femi-
 nã, alterum ſexum. In Theſſalia molliorem in lacte caprino viti bibunt ad ſolu-
 landos coitus, duriorẽ verò ad inhibendos. Aduerſatur alter alteri. Serapiadis
 radix, auctore Dioſcoride, illita tumores diſcutiendi vim habet, arque vlcerã ex-
 purgat: herpetas cohibet: fiſtulas abolet: inflammationes illita mitigat. ſicca nimias
 compoſcit, vlcerãque putreſcentia & maligna oris ſanat. Cum vino pota aluum
 ſiſtit. Feruntur de hac etiam quæcumque de Cynoſorche dicta ſunt. Plinius quæ-
 dam horum duntaxat habet. Eius radices, inquit, ſanant oris vlcerã, thoracis pitui-
 ra: aluum ſiſtunt è vino potã. Cynoſorcheos radici bulbosã, ac geminã, inquit Li. 16. ca. 10.
 Galenus, viſi in eſt calida & humida, ac guſtantibus durieuſcula eſt. Cæterum ma-
 ior radix multã videtur habere excrementitiã humiditatem & ſtatuoſã. Li. 3. ſimpl.
 Quapropter epota venerem excitat. Altera minor contra, admodum elaborata
 eſt ad calidius & ſiccus vergens. Itaque hæc radix tantum abeſt, vt ad coitum ſti-
 mulat, vt etiam contrã planè inhibeat ac reprimat. Orchis Serapias ſicciorẽ
 faciliatẽ obtinet, quã vt primi ordinis haberi mereatur. Quociens nec proinde
 ad venerem accommodus eſt. Oedemata illitu diſcutit: ſordida vlcerã expurgat,
 herpetas ſanat. Siccatus multo amplius deſiccatur: nam & putreſcentia vlcerã ſanat
 contumaciaque: quippe cum & ſubadſtringens ſit, ac proinde etiam ventrem ex
 vino porus ſiſtit. Hodie Sepſiarij, inquit Dodonæus, Orcheon bulbos compo-
 ſitionibus ad excitandã venerem ſine diſcrimine admixcent. Præſtantioreſ ta-
 men ſunt Tragorcheos bulbi. Ambo autem aſſumendi non ſunt, ſed durior,
 ac ſuſcipientior ac ſiccior ac rugoſior reiiciendus. Eſt autem plenior non
 ſemper quã maior, ſed non rarò etiam minor, ſi videlicet bulbi colligantur priuſ-
 quam ſtirps deſloruerit, aut cum primũ in caulis erumpit. Neque enim ſucculen-
 tia abſolutã magnitudine ſuperat, priuſquã ſemen maturari experit. Nam
 cum alternis annis vnus bulbus intumeſcat, alter verò pereat, fieri non poteſt vt
 durior ac ſucco plenior ſemper maior ſit. Quando enim folia erumpunt, tunc
 demum, vel non multò antè plenior eſcere incipit, quo paulatim incrementũ
 ſumentẽ alter flacceſcit, rugãque contrahit, donec maturato ſemine vna cum fo-
 lis & cauliculis ſubinde totus ſubſidat, ac pereat, eo qui interea creuit vegeto, ac
 ſucci pleno.

SATYRIUM.

CAP. XIII.

IVSDEM Bulbaei generis cũ Teſticulari eſt *Græciſ* Græciſ dictum, Nomina
 Latinis Satyrium, Arabibus *Gaſi alchaleb*, *Chafi atraleb*, ſive *Tartarich*,
 Italis *Saturio* & *Satirione*, Gallis *Satyron*. Satyrio nomen fecerunt
 Satyri, qui primi ſilueſtres dij colludentes Nympheſ per ſiluas &
 antra, ad nimorem venerem herbam hanc inuenerunt. Dioſcorides Satyria duo
 ponit. Vnum Triphyllum, id eſt, trifolium, alterum Erythronium, ſive Erythraicũ,
 id eſt rubrum. Præter iſta recentior ætas Satyrium Baſilicum adinuenit, id eſt, Sa-
 tyrium Regium, quod & Palmam Chriſti nominauit, propter ſimilitudinem
 quandã, quã eius radix cum humana habet manu, Germani *Creutzblumen*,
 Galli *Satyron Royal*. Sed ne quis homonymia fallatur, lögè alia eſt ſtirps vehemen-
 ter purgans Palmæ Chriſti nomine donata. Satyrium Baſilicum duplex eſt. Vnum
 maius, alterum minus. Quoddam folio non maculato, aliud maculato. Satyrium
 trifolium delineat Dioſcorides his verbis: Folia ſert Rumici, aut Lilio ſimilia, mi-
 norã tamen, & rubentia: caulem nudum, longum, cubitalem: ſtorem Lilio ſimilem, Ibidem.
Forma.

album adicem Lilio similem, mali modo extuberantem, foris rufam, in quo
modo album, gustu dulce, & ori gratum. Satyrium Erythronium semine est
ni, maiore, duro, laui, splendente, quod fertur quemadmodum & Scincus veni
e & care cortice radice gracili, rufo, interiore parte alba, gustanti dulci, & ori non
ingrata. In apricis & montosis nascitur. Plinius de hisdem hæc prodidit. Contra
trierum vim habet Satyrium. Duo eius genera, vna longioribus foliis quæ Olea
caule quatuor digitorum: flore purpureo: radice gemina ad formam hominis te
stium, alternis annis intumescente, ac resistente. Altera Satyrium Orchii co
gnominatur, & Erythronium esse creditur. Distinguitur internodis & ramosiore frut
ice, radice fascinis virili. Nascitur fere iuxta mare. Vbi Cornarius legit ex vetere
dice, radice fascini, pro virili membro fascinum accipiens, in quo significatu vir
pauit Horatius hoc versu.

Ode 3.
Epos.

Minusue languet fascinum.

Hic Plinius Satyrium cum Orchii confudisse videtur, & ex Latini cuiusda
ris fenzela ista prodidisse subiungit enim. Græci Satyrium foliis Lili rubi
noribus, & tribus non amplius è terra extantibus tradunt: caule laui, cubiti
do, radice gemina, cuius inferior pars & maior mares gignat, superior ac m
feminas. Et aliud genus Satyrii (Erythraicum appellant) semine Vitæ m
lzur: dure radice cortice rubro intus album includi, sapore subaceto
tosius inueniri. Satyria Dioscoridis vera vix adhuc Herbariis bene
tamen ex Dalechampi conjectura potius quàm certa assueuerunt e
benus. Erythronium, siue Erythraicum montosis & apricis nascitur ad
sa, ima parte fibrata, oblonga, Porto non

SATYRIUM rubrum,

Dalechampi.



mili, foris subrufa, intus candida, nulla
re odoris iniucunda, veluti Orcheos, tenera,
stu principio dulci, qualis est Castaneæ, d
acri Cepæ Afcalonix modo, quam aum
ne perfecto in globosum caput colligit, m
gura, crescente verò caule nuda, ac la
gum produci, vt cauli quod fars fa
velut de suo suppeditet, nunc simplici, n
lut è duabus in vnum coeuntibus iuncta
nascuntibus aliis perpetuò, & cohærent
duabus, tribusue, ac interdum pluribus, quæ
hausta crassiore, ac maiore postea aug
caule, si ortum eius à radice consideres, p
ro, tereti, supernè rubenti: foliis Rumicis, a
lij, minoribus, binis, nonnunquam ternis
quando quinis, ad terram infractis, vix
sed maculis rubris conspersis, tam crebri
bere magis quàm virere videantur: flor
pureo, Lilio rubro, quod Martagon vocant
gura simili, priusquàm pandatur, oblongo, d
referatus est, sex foliis confluente, ad ra
candicantibus, reliqua sui parte ostro pur

racentibus, apicibus totidem quot sunt foliola, niueis, superne velut
conspicuis. Alterum, trifolium videlicet, inuentu rarius, priori omnino
le, nisi quod guttis & maculis lacteis folia variegantur, flos candicat. Vn
men oblongum siliquis includitur, nunc triangulis, nunc quibuslibet
sum. Inuenitur genus quoddam vnico, ac lato folio, sine flore, sine fructu. Ma

SATYRIVM trifolium, seu
album, Dalechampi.

SATYRIVM forte Pseu-
dohermodactylus, Matth.



Herbarij. Florent Aprili & Maio mensibus. Satyrorum historix id re-
quiritur, quod rotunda & globosa radice non sine, quale requirit Dios-
corides. At si Satyria non sunt, tamen ob insignem & venustam figuram descri-
benda fuerunt vulgato apud Herbarios seruato nomine, quoad verius sit inueni-
rum, aut e veterum libris eratum. Ad excitan-

SATYRIVM Erythro-
num, Matth. &c.

dam venerem magnam vim habere ostendit
humida & calida substantia cum acrisiorum
paululo iuncta. Pena eandem plantam Herba-
rius innotuisse scribit Satyrii Erythronij nomi-
ne, non multis ab hinc annis nulla desiderata
nota præterquam coloris, qui valde variat loci
varietate, vt in Scilla, Cepis, & aliis Bulbaceis
videre est. In Iura monte & collibus Taurinen-
sibus Pado sesquileucam distans provenire ait.
Est Lobellio Satyrium & Dens caninus Belga-
rum, Hermodactylus & Pseudohermodactylus
Italorum & Matthioli. Genuini vero Erythro-
nij radix ex Matthiolo hic depicta conspi-
citur à Cechino Martinello Pharmacopæo
præstantissimo & Herbario peritissimo mis-
sa. Ea est mali effigie, cortice tenui & rufo, can-
dida intus pulpa, sapore dulci, orique non in-
grato. Easdem radices Pena se Venetiis vidisse
ait in Alberti Martinelli Officina, quas hæc Sa-
tyrii Erythronij radices esse iudicabat. Ex sunt
subrotunda, magnæ, rugoso tuberosoq; corti-
ce, ex fusco rubello, effigiem & magnitudinem

In Advers.



Cyclamen vel perit. Anilobochia rotundæ prægrandis affecuta, carne intus al-
bida, edulis, dulci. Idem Marthiolus postrema Commentationum editione aliud
Satyrium penam pinxit, nulla adiecta descriptione. Satyrij trifolij radix, aucto-
re Dioscoride, bibitur in vino nigro austero ad opisthotonum. Ferunt etiam hanc
L. 6. c. 126. *Pures &* impetum ad venerem excitare. Erythronij radicem, si manu omnino teneatur,
Temper. venerem stimulare produnt, multo magis si bibatur in vino. Idem planè de Ery-
L. 126. c. 10. thronio Plinius tradit. Quibus addit arietibus quoque & hircis segnioribus
in potu dari. Et à Sarmatis, equis ob assiduum laborem pigrioribus in conum,
quod vitium procedamum vocant. Et Galenus Satyrium, aut Triphyllum, inquit,
humidum & calidum temperatura est. Quamobrem gustu quoque apparet
dulce. Attamen recrementitiam & flatuosum humiditatem possidet: quocirca ad
venerem concitat. Hæc vero & herba ipsius radix præstare potest. Porro, ut
dam aiunt, ex vino nigro austero potum sanat opisthotonum. Hæc de veterum

SATYRIUM primum,
Marthiol.



SATYRIUM Basilicum
maius, Dodon.



Dodonæi de Satyrii. Recentiorum Satyrium Basilicum maius, quod plerique maren ap-
flor. c. 62. pellant, folia habet oblonga, lata & lævia, Liliij foliis minora, nullis aut omnino
vix apparentibus in cæulis resperis: caules pedales, vel altiotes, non absque adnatis
foliis: flores in sommo spicatos, colore dilutè purpureos, exiguis punctis luteis
purpuree resperis: forma florum Testiculi morionis maris, nisi quod ipsis cæula
desit, sub quibus singula acuminata nascuntur foliola: radices sunt veluti gemine
palmæ, singula in quaternos digitos distributæ, quatum vna flaccidior & quali
fungosa, altera vegeta, ac solida, paucis ab annexu exeuntibus fibris. Alterum
maius genus, quod feminam vocant, priore tamen minus, folia eiusdem formæ
promittit, sed minora, & multis nigris maculis conspersa: flores Cucullo similes, ex-
statos & hiantes, uti Testiculi morionis maris, colore nunc candidos, alias in pur-
pura vel rubentes, vel dilutè ad cæruleum inclinantes, semper magis purpureo
ornatos, ac variegatos: radices alterius similes. Minus genus foliis est angustis, &
ut Marth

SERAPIAS *femina praeclara* *sive*
Palma Christi: Satyrium basilicum
alicerum, Dodon.



PALMA Christi minor, Matth.
Satyrium Basilicum minus,
Dodonaei.



vt Matthiolus ait, Croci, caule dodrantali, proce-
leu que, in cuius cacumine fls emicat purpu-
reus, Amarachi xmulus, qui tecens odore quam
suauissimu redditradicibus alioqui similibus,
sed quae magnitudine ipsis cedant. Nascuntur Sa-
tyria haec locis maxime humetibus, palustribus
in pratis & siluis. Florent Maio & Iunio. Huius
duo reperi genera in Ananiz vallamontibus
Matthiolus ait. Sunt qui velint Buzide siue Bu-
zidan Arabum esse. Sed scribit Auienna Buzei-
dem esse medicinam ligneam Indiam, in qua est
virtus similis virtuti Been. Et Sera, io, Buzei-
den, inquit, est species Satyrionis. Et Buziden
sunt radices duae, albae, similes Beh: n albo. Et
est medicina Indux, qua nos parum vtimur. Sa-
tyrij autem huiusce radices nihil minus quam
lignae sunt, nec ex India petuntur. Matthio-
lus Satyrium Basilicum siue Palmam hanc Christi,
Auiennae digitos citrinos esse vult, de quibus
haec scribit. Alahafra siue digiti citrini quid
est? Eius figura. It sic vola nianus comitaxra
ex citrinitate & albedine: & est duta, in qua est
patum dulcedinis: & ex ea est citrina cum pul-
uerulentia absque albedine. Et Rhalis digitos
hos croceos, vt exemplaria habent, appellat, &
esse gummi seu venam tinctorum ait. At Sary-
rij Basilici radices duae non sunt, neque cro-
ceae, neque ad tingendum viles. Quare id a ci-
gitis citrinis Auiennae & Rhalis perspicue dif-
ferre videtur. Satyrj Basilici radices Orcheon
radices sapore & gustu referunt: quare & facul-
tatibus similes existimantur. Nicolaus Nicolus
Florentinus capite de quartana curatione vim
habere ait & per superiorem & per inferiorem
ventrem purgandi, & aduersus quartanas febres
inueteratas, post purgationes radicis partem
pollicis longitudine, tusa cum vino ante ac-
cessionem vultu exhiberi, hocque temedio
ter sumpto Bilicium quendam post quadragin-
ta quatuor aut quadragintaquinque accessio-
nes, a febre quartana fuisse lib. ratum. Ma-
thiolus Fuchium reprehendit, quod Palmam Chri-
sti Satyrionum genitibus accensuerit, cum in
generibus Testiculorum canis porus numeran-
da fuerit. At Fuchium Dodonaeus & alii mu-
ti Herbarij secuti sunt, eam Satyrium Basilicum
nuncupantes, vt diximus. Triorchin Serapiada
Aeginetae esse Palmam Christi alii opinabatur

Loco.

Lib. 1. c. 98.

Cap. 1. c. 98.
simph.

Lib. 1. c. 107.

Lib. 1. c. 107.
1. n.

Vires &
Temper.

Pena, tum quia succulenta minus sicciorque est, & deterget intro foris que vlceri-
bus adnota, tum etiam quod melancholicis, quartanariis, epilepticis, neuroium

In Aduerf.

omnibus & putuosa saporra oppressis miram præstet opem, fluxum dysentericum sistat, quot qualicunque facultates Palmæ Christi recentiores vindicant, & magnandas sunt Ægyptiis venerandæ Serapiadis Dexaugusto cognomine: alio nihil attinebat à cæteris secreuisse, & Serapiadas nuncupasse. Rationibus hæc fauebat ex lectione coniectura: nam vbi *πλόχυστοι τῆς ρίζης*, id est, multi vsus radicem Dioscorides habet, legendum fortasse *πλόχυστοι* multitudinis radicem, & fortè vtrunque, id est, multifidam & multi vsus radicem innuebat. Inferius, vbi Dioscorides, *ρίζα δὲ ὕπερτι ὀρχιδίους ἀραιά*, id est, radix subest pusillius testiculis similis, legebat Pena multifida leuiore metarhesi multo quàm superiore capite, vbi pro oleo substituit Dodonæus Scillam teneram Pancratium vti dictum est a nobis.

COLCHICVM EPHEMERVM CAP. XIII.

- Lib. 4. cap. 79.** **Nomina.** **D**IOSCORIDES *καλχικὸν* à Græcis etiam *ἐφίμερον*, & *βανδύριον* auctor est. Latine Colchicum, Ephemerum & Bulbum agrestium, & angulorum Colchicum, à Colchide veneni ferace, in vltimo tractatu. Ephemerum quoniam sumptum vno die interheriat, *ἡμεροχθόνιον*. Mort aux chiens, Germanis *Testosen*, Italis *Zaffarano saluatico* Irenæ *ἰριόσπερον* seu *ἰριόσπινον*, id est, Ephemerum seu Irim siluestrem, quod lethale nuncupatum, quod breui vna & altera die florem amittat. Idem Galenus habet. Ephemerum, non illud lethale ac deleterium, sed alterum quod Irim agrestem cognominant. Et hos secutus Aegineta, Ephemerum, inquit de vltimo quod nonnulli Colchicum, quod in Colchide nascitur, vocant aut Bulbum siluestrem. Et alio in loco. Ephemerum, non deleterium, sed quod Irim agrestem dicitur. Et Aëtius. Qui Ephemerum, quod aliqui Colchicum, aut Bulbum siluestrem appellant, &c. Est igitur Ephemerum duplex, lethale quod Colchicum, & non lethale, quod Ephemerum non lethale nominatur. De Colchico priore locutus est Dioscorides, de altero proxime sequenti capite. Colchicum, vt ille dicitur, autumnii exitu florem edit subcandidum, crocino similem: post florem folia Bulbi similia, pinguiora tamen: caulem palmi altitudine, fructum ferentem rufum radicem quæ corticem habet in nigro rufescentem, quo nudata, candida, tenet in cic plena & dulcis inuenitur. Habet bulbus eius in medio rima, vnde flores erumpunt. Plurimum in Messenia & Colchis nascitur. Ephemerum non lethale excolitur folia Lilio simili habet, tenuiora ramentum: flores candidos amarosque, fructum mollem: radicem vnam digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. **Lib. 4. cap. 79.** **Cap. 80.** **Forma.** Nascitur in siluis & vmbrosis locis. Plinius, Ephemerum, inquit, folia habet Lili, sed minor: caulem parem, florem ceruleum, semen superuacuum: radicem digitali crassitudine, dentibus præcipuam concisam in aceto, decoctamque, vtipido colluantur. Et ipsa etiam radix mobiles sistit. Causis & exesibus imponitur. **Lib. 4. cap. 79.** Plinius. Colchicu Ephemerum aliud non est, Herbariorum iudicio, quam vltimum plebi præterit. Crocum & siluestre vbiq; vocatum, vti & in Croco siluestri diximus. Nam floret vt Crocus Autumno, flore perquam simili, concolore dilutius tamè ceruleo, staminibus pallidè luteis, iamdiu antea primo Vere orum & Aestate amittit folia, quæ porraceis laria, Pancratij sunt æqualia, vel Bulbi pinguiora, terna, aut quaterna, virentia, nitenia ab radice: caule sesquipalmaribus, semicircundat: radice altera parte compressa castaneæ figura, aut anacardiis, ris tunica rufescente ex fusco, ab ima latiorèq; basi ad apicem canaliculum in primis prima caulis germinario, intus tota alba, fungosa, mucida, virosa, gustu non ingrata. Est quibuldam Narcissus purpureus Plinij & Virgilij, apud Theophrastum

COLCHICVM Orientale,
Matthioli.

COLCHICVM alterum
Orientale, Matthioli.



florens Autumno, post Arcturi circa æquinoctium, perperam Moly Trifolium, cap. 6. quia eius flos minime lacteus. Est & Syriacum siue Alexandrinum Colchicum, cui bulbosa radix, vt describit Pena. Id non parum a nostrate differt, tamq[uam] in fide delineationem non minus bene referat: non enim ex radicis

COLCHICVM Anglicum,
Lobellj.



fulco, siue rima quæ est a latere, ea item enutrit, sed caulis erumpens mediũ findit balbiam, quæ siq[ue] geminum Colchici bulbu ab imo coagmentatum, caulẽmque vtrinque amplexatum ostendit, nigriõrque nostrate euadit intus prius simili, forisq[ue], alioqui è cepacea fungosaq[ue] concretione vti & totius figura. Illis adiungunt Lobellius & Pena aliud Herbarijs indictu, quod quia Anglia copiosissimum fundit, nec alibi faciliẽ reperias, Anglicum candido flore nuncupant. Perpulchra est planta, lacteis floribus Ornithogali vel Alphodeli, maioribus, Croci montani siluestris paribus: canem ornant scilicet palmarem radix & folia, alioqui pratensi vulgaris sunt, foris fusca, intus candida. Londini hortis merse radices Hiemem ferunt, Vere emergit, non secus atque in collibus & montosis prope Bristolium & in agro Somerseti. Clusius aliud Colchicum montanum exhibuit, quod terna quatuor nãve folia fundit, digitum longa, per terram strata, Hyacinthi non scripsi ferẽ annula, sed saturatius virentia & splendentia, gustuque acida, quæ vbi flaccescere incipiunt, colorem subrubrum

Lib. 1. p. 16.
Hisp. 16.

subtubum contrahunt. Flos sine foliis primum exilit, & sex oblongis purpureisq; foliis, & in medio staminibus totidem constare cum folia statim (contra quam in alio Colchico) subsequuntur & quodammodo protrudunt, totamque Hiemem perdurant in mensē usque Maium aut Iunium. Radix est bulbosa, vnica, non magna, multis subruis & nigricantibus tunicis obiecta, intus solida, candida, dulcisque cum quadā adstrictione, sede longiucula, quæ adnatis in lateribus propagatur. In collibus Salmantinis & vicinis lapidoso admodum solo prouenerat, ait Clusius, seque mense Maio collegisse plantam, cuius caulem dodrantalē, firmum, & in triangularem siliquam: semine ex rubro confescente, laui, exiguo, subrotundo, amari potius quam nam. Illic vulgò *Merenderas* vocant. Idem nos se obseruasse in pratis Salmantinis Colchicum nostrum vulgari simile, sed minus, atque in puritas nonnullas flore omnino lacteo: sed in genere folia antè primum Ver emergentia solere, quemadmodum nec in Anglia, hic ex Clusio pictum videtis.

COLCHICVM montanum
cum flore, Clusij.



Cap. 194.
simpl.

COLCHICVM montanum
minus, Clusij.



radix quouis anni tempore eruta, & quæ pharmacopœis pro *Hermodyctylis* habetur, etiamsi siccata, flaccida, vieta rugosa, & ingenti partim euanida, partim fungosa sit, quod acerrimè Matthiolus reprehendit, & erroris causam Serapioni adscribit, qui *Salmagen*, id est, *Hermodyctylum*, ut ipsemet interpretatur, iisdem planè verbis describit, quæ Dioscorides *Colchicum*. Quod autem & pernicioso errore has duas plantas committit, confirmat ex Paulo Aegio, qui lib. 7. de *Ephemeris* & *Hermodyctylis* seorsum tanquam diuersis tractauit, ac primum de *Hermodyctylo*. *Hermodyctyli* radix, inquit, & per se ipsius decoctum vim habet putgandi. Præsertim arthriticis, cum humores defluunt, exhibetur. Verùm stomacho valde aduersatur. Paulus post de *Ephemeris* ita scribit. *Ephemerum* non illud venenatum, sed quod *Iris siluestris* nominatur, mixta facultatis est, & repellentis, & discutiitis per halitum. Ex quibus perspicuum est *Hermodyctylum* ab *Ephemeris* longè diuersum esse, & hac in re Serapionem vehementer errasse, & Mauritanos omnes, ac eius sequaces medicos, qui *Colchicum Hermodyctyli* vice caupotius, & aliis medicamentis immiscent. Quare Matthiolus genuinum *Hermodyctylum* esse credit, quem ex planta expressit quam Augerius de Busbeke Constantinopoli alibi didicit: ubi etiam *Hermodyctylus* appellatur. & ad

HERMODACTYLVS

verus, Matthioli.PSEUDOHERMODACTYLVS, *Matth.*

dices digiti speciem referunt, adeo ut vnguium quoque figura conspicua sit. Folia fert prælonga binum dodrātum longitudine, & fortasse longiora, Porri aut Hastulæ regie similia: sed longè angustiora, brevioræque sunt quæ circa radicem diffunduntur. Radices habet quatuor ex vna eademq; basi emergentes, digitorum figura, colore ex pallido rufescente, albis in summitatibus vnguib; nullis circa sese fibris: nam quæ spectantur fibræ, circa radicem originem superiore parte capillaceæ sese fundunt. Caulis è medio profilit tenuis, herbacea tunicâ circumuolutus, in cuius summitate oblongum prominet capitulum (florem non vidit) piri figura, Colchici fere modo, minus tamen. Differt ab hac planta ea quàm quidam in Italia Herinoda solum esse arbitrantur, Matth. Pseudohermodactylum appellat. Sed Hermodactylum priorè, quæ verum putat, pleriq; respuunt, & Iridis generibus adscribunt, Iridè tuberosam appellantes, de qua capite de Iride locuti sumus. Præterea Colchici nostri radix medicamentis immixta, pernitiola non est. Neq; propterea dicendū, id, quod in Colchide plurimu nangebatur auctore Dioscoride, aliud à nostro esse: sed illic lethali interimēdi faciliare ceteris omnibus antecelluisse, tum q; succo illic esset magis concocto, tum quod à sō cælòque viui hanc nancisceretur. Sic fungi quibusdam locis eximiosi proueniunt, & nisi iisdem quibus Colchicum remediis vineantur, interimunt: alibi innoxij passim esitantur. Sic Texus Na boneu sis & Hispanica deleteria sola viriua, ut producit antiquitas: in Anglia & alibi minime malefica. Cicutæ & alius idè vsuenerit. Sed nostri Colchici radicem etiã pro Hermodactylis à quibusdam vsurpentur, sciendum tamen ab Officinarum Hermodactylis plurimum differre. Hi enim peregrini sunt, nō pernitioli, ut multis seculis plurimus vsus edocuit. Hos Hermodactylos Officinatum, Traliani & Pauli, esse Colchicum, seu Lphemetum non venenatum Dioscoridis Penna opinatur, & leuiore aliqua nota, non specie differre, vel si eadem non sint saltem admodum affinia esse. Idem censuit Lobellius, ex quo Colchicum Illyricum, siue Græcum nō venenatum Anguillatè, pictum exhibemus. Hermodactylos non venenatos Officinarum appellat. Se Venetiis habuisse ait muncere Alberti Boninelli Alepo Syrix euulsa à fratre Cequino Colchici Angulax plantas, prois palmitibus, sepiens, dens & duodenis folijs Colchici striatis, mucronatis, albis, in angustum sagittatis, imbricatis & lateratim stipatis, è quibus in pu-

fillo

COLCHICVM *Ilyricum* fuit
Græcum non venenatum,
Lobell.



Cap. 89. bi-
 flor.

EPHEMERVM non lethale,
Matthioli.



Lib. 1. c. 79.

Lib. 6. sim.

fillo pediculo flores exoriantur lutei, pallentes, terni, vel quaterni, Colchici parvi minores, flaminibus ite concoloribus. Siliqua non dissimila. Radix foris cepe cœcretionem, inius euanida & vita, quia in caulē, folia, flores, fructū & semen vis tota exhausta fuerat. Anguillaræ & Cequino assentiendū putat, quibus hanc plantā acceptam refert. Colchicis accenset Lobellius plātam quam capite de Narcissis ex Clusio descripsimus nomine Narcissi Autumnalis quorundā, Lobellij Colchicū luteum, fortasse Ephemerum non venenatum Dioscoridis cōgener, Narcissus Autumnalis Marcelli Vergilij Mutono, flore luteo pallente, cuius Narcissi meminimus eum de quarto Narcisso ageremus. Certē radice, caule, folio, flore, forma, tota deniq; planta propius ad Colchicu accedit. Matthiolus longē aliud Ephemerum nō lethale depinxit, q̃ in Ananiē sibus mōtibus tam in partibus quā in siluis copiosē nascitur, ab indigenis vulgō *Giglio marro*, hoc est, Liliū stultum nominatum: Ephemerū spurium Lobellius appellat. Folia habet Lysimachix Glasti aut Luteolæ media, in sesquicubitalibus cauliculis densis, que alis concavis: flosculos candicantes, vbi flos nigri, quinario foliorum numero: semen passillum in rotundis lini pericarpis oclusum. Radicem multū fibratam lſtidis. Hæc Lobellius. Fuchsius plantam, vulgō Liliū conualliu nuncupatā, Ephemerum non lethale esse contendit. Colchici radicem comestam scribit Dioscorides fungorum modo strangulando enecare. Remedio esse quæcūq; contra fungos opem ferens bubulum etiam lac potum, adeo vt quoties hoc adfuerit, nullum prætereā querendum præsidium sit. Ephemerum non lethale radicem dētiū doloribus remedio est, si decocto eius colluantur. Folia in vino decocta & illita, ædemata & tubercula, quæ nihil adhuc puris contraxerunt, discutunt. Vbi pro, *μικρὸν ὑγρὸν ἔχει*, legēdum putat Fuchsius, *μικρὸν τριώνυχον*, vt ex Galeno liquet si ceteri bête. Ephemerum nō lethale radicem habet adstringentem, & boni suauisque odoris. Ex quibus perspicuum est facultatis temperaturæque esse mitis, nempe repellentis, & habitu euaporantis. Testificatur opera quæ particulatim edit.

Siquidem non inefficiter radix eius in denu doloribus colluitur. Tum phymatum augmento & statui folia cōueniunt. Oportet autem ea in vino decocta prius quā pus moueas i. linere. Plinius de Colchico hæc solū tradit, priuatim lac bubulum iis qui Colchicum biberunt vile esse. Et Lib. 16. c. 12. folia Ephemerum tuberibus atque tumoribus illinuntur, quæ etiam dum discunt possunt.

possunt. Ferunt Turcas Colchici floribus vti cū inebriari volūt: eos enim vino macerant, quo epoto adeo stupidi redduntur, vt in ecclāsim abeant. Hermodactylus, auctore Meluē, calidus est & siccus ordinis secundi initio, cum humiditate tamen excrementitia, flatulenta, nauseabunda qua vetriculo nocet, præsertim quando in eum ex partibus aliis excrementa cōfluunt. Pituitam crassā maxime in Auris trahit: ob id podagrar, & alus arthritidis differentius confert, non sūperius modō, sed etiam cataplasmate ad motus, præsertim cum vitellis ouorum, & lactua hordei, vel mica panis. Impinguar, sperma auget, vlceribus confert, quia scilicet horum eorum, & carnem in his putrem confumit. Cuminum, Zingiber, Piper longum, Libysticū, Menthastrum, mastiche mixta, Hermodac. prohibent, ne suo humore excrementatio & flatulento lædat ventriculum, neve status crassos & nauseabundos in eo exciter, aut multa in ipso excrementa colligat. Si vero Hermodactylus cu pauco Zingibere, & succo Raphani, vel Scilla asata, aut Scilla succo & Zingibere, & pauca spica in trochiscos lingatur, purgat celeris & plenius per se enim tarde & imbecilliter vacuat.) Myrobalani quoque roborando stomachum Hermodactylus citō deturbant, & humorum in ventriculo affluxum prohibent. Datur ab aureo vno ad aureo duos. Ad annos tres seruatur.

SCILLA.

CAP. XV.



SEPACEO etiam generi tantopere similis est σκῆλλα: Græcis dicta, *Nomina* Latinis similiter Scilla, vt multi eam Cepam marinam vocent, & Varro Squillam, cuius exemplo omnibus Officinis sic nominatur, Arabibus *Haifel, Hausel, Afchū* seu *Alachul*, Italis *Silla*, Germanis *Meerzwibel*, Gallis *Sinpole, Oignon marin*, Hispanis *Cebolla Albatrana*. Quia autem inter hanc & marinum testaceum piscem, à tunicata squamarum cōpacta serie Squillam vocant, tanta similitudo intercessit, hæc putatur sic dicta, inquit Pena. *In Aduers.* Poëti etiam ἀπὸ τῆς σκῆλλης, id est, ab ariditate dicta esse, quod in subuletis maritimis Sole torridis oriatur, cuiusmodi sunt in Hispania, & prope arida Lusitania tesqua maritima. Plinius, Scillarum in medicina, inquit, alba est quæ masculus, femina nigra. Quæ candidissima fuerit, vtilissima erit. Et, Nobilissima est Scilla, quanquam medicamini nata, acetōque exacuendo. Nec vlli amplitudo maior, sicut nec vis alperior. Duo genera medica: masculus albis foliis, femina nigris. Et tertium genus est cibis gratum: Epimenidium vocatur, angustius folio, ac minus aspero. Quæ ex Theophrasto transtulit Plinius. *Lib. 10. c. 9. Genera. Lib. 19. c. 7.* ἰδιώδεις μὲν γὰρ οὐ μόνον βολβοί, καὶ ὡς καὶ τῶν τοῦτον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀσποδύλων βύζα, καὶ ἡ τῆς σκῆλλης, πλεονεξία, ἀλλὰ τῆς ἰπτανιδίου χαλμυρίνης, ἢ ἐπὶ τῆς χηρύσεως ἔχει τὴν προσφύρεϊαν, αὐτὴ δὲ σφισσοειδὲς ἴρα καὶ λεῖπρά τῶν λαγῶν ἔστι. Id est, Edules non solum Bulbi & his similia, sed etiam Alphodeli radix & Scilla, non omnis quidem, sed eius quæ Epimenidia vocatur, quæ ab vsu nomen accepit. Hæc angustiore est folio, laxioreq; quàm cæteræ. Scillæ differentias duas ex colore duntaxat inter Hispanicas tam multas animaduertit Pena: quarum extimæ tunica vni rubent, vt Cepis oblongis, alteri alben, magnitudine pares. Vtrauis maxima pomū Assyrium nō superat, Cæpæ modo multipliciter tunica, corticosaq;. Vniuersa folii carina vel dorsum palmum ferè lata, pedē alta, crassitudine minori quàm Aloës, crebro è bulbo pullulant squamarum cōpacta: caulis sesquicubitalis, gracilis, flores stellatos Ornithogali habet similes, sed minores, in ipicam postremò deiciens. Matthioli ait se cū olim credidisset Scillas, quibus in Italia tum medici tum seplasiarij vtuntur vulgō, veras esse Scillas, mutata tandem sententia eas pro legitimo Pancratio habere, Scillas ve tō geminas eas esse, quæ illis duplo maiores in Hispaniæ maritimis proveniunt, *Lib. 7. bull. cap. 11.*

Forma.

In cap. 11. lib. 1.

SCILLA, *Mathioli.*SCILLA *Hispanica sine flore, Clu.*

foliis Aloë æmulatibus, sed minus crassius, cum illa folia ferant nō Aloë, sed Lilio ptoxima, inter quæ non parua est differentia. At perperam, inquit Peua, pro Pancratio vulgarem Scillā, quæ vera est, accipit, quam non nisi vietam, aut adulescentem, cuiusmodi Veneris vaneunt, videat. Et foliorum gracilitas sanè nō aliam speciem constituit Scillæ, sed tantum contingit habitiora & maiora adulescere folia mutatione celi, soli, & cultu. Sic Cepis evenit angusto interiecto tractu, sic in foliis Aloës, & aliis malis observatur. His verò Bulbis flores, folia, omnia prorsus similia, aliquantò duntaxat graciliora, ut bulbaceis multis præpropere enatis, & aliò transplacatis evenit. In contiguatione suspensæ, dum fabulo merguntur aut servantur, languidiora pomunt folia, & succo seu pabulo cōsueti deliriantur, exilioraque sunt. Ratio par in Scillis pusillis, quas Pancratium Mathioli adstruit. Sed ex Clusio legitimam Scillā iconē lucē proponimus, qui eam & primū emergentem, & illam semineque onustam plerique Hispaniæ & Lusitanæ locis se etuille ait. Est verò Scilla, inquit, caulis plerunque cubitalis aut maior, erectus, nudus, absque foliis, floribus plurimis candidis & stellatis ornatus, Asphodeli minoribus, Ornithogalo maiori similibus, qui ab imo forere (vbi rectissimè scripsit Theophrastus) quæ admodum Asphodelus incipit. His succedunt siliques triangulares, & veluti compressæ, in quibus semen nigrum, planum & paleaceum, tandem emergunt quinque aut sex lata, nigra viridia admodum, densa, humi extensa, & quodammodo carinata Radix crassa, alba, multo citius runcata, lento quodā humore plena, multissimis et assisculis capillaris. Copiose nascitur supra Olysioponem, & plerisque aliis Lusitanæ

& Hispaniæ locis. Floret Augusto & Septembri, semen Octobri & Nouembri maturefcit. Folia maturo iam semine, & caule arido emergunt Nouembri & Decembri. De Scillæ viribus & præparatione satis prolixè Dioscorides. Vim aciem & fruentem habet. Assata vero multiplicis est usus. Pasta aut luto oblita in clibanis concisunt, aut carbonibus obruitur, donec circumlita pasta sufficiens tota fuerit. Quæ amota, si non mollescat, altera pasta aut luto circumlinitur, eademque quæ prius fuit. Nam quæ ita non assatur, noxia magis est, præsertim intertaneis data. Torretur item in olla indito operculo, & in clibanum coniecta. Sumitur ex ea abiectionis extimis partibus, quod maximè medium est, quod concisum effusa prore aqua coquitur, nouaque superinfusa vsquedum nec amaritudinem, neque acrimoniam habeat aqua. Siccatur autem in umbra dissecta, & lino traiecta, ita venetalleolæ inuicem se contingant. Sic utitur secta, ad oleum, vinum, acetumque scilicet cum vniuersis. Ad rimas verò pedum rudes Scillæ interanea pars in oleo seruatur.

*Libra. cap.
vi.
Vires &
Temper.*

SCILLA *Hispanica cum
flore, Clusij.*

aut cum resina liquefacta imponitur. Decocta in aceto demoris à vipera cataplasma est. Assi eiusdem pars vna, colti salis paribus octo subigitur, daturque ieiunis cochlearis vnus duorumve pondere ad emolliendam aluum. Additur potionibus & odoratis medicaminibus, & quibus vrinam ctere voluerimus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innarant cibi, & morbo regio, torminibus, in vetere tussi, asthmaticis, cruenta reicientibus (*ἀναπορεῖς*). Hic Dioscorides, & Medici alij *ἀναπορεῖς* appellant, qui sanguinem ex inferioribus partibus sursum educunt, & per os reiciunt.) Trium verò obolorum pondere in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coquitur eadem cum melle, sumiturq; in cibo ad eadem, maximè coctionem adiuuans. Strigmēticia per aluum ducit. Coctu & simili modo sumpta idem potest. Cauendus Scillæ vsus iis quibus interaneum aliquod exulceratum fuerit. Prodest verrucis & permionibus assam inungere. Semē eius tritum cum caricis, aut melle exceptum, si manditur, aluum emollit. Pro fotibus domus suspensa tota amu-

letum est. De iisdem Plinius confusè tractauit his verbis. Scillæ aridis tunicis direptis, quod reliquum è viuo est confectum suspenditur lino modicis interuallis. Postea arida frustra in cadum aceti quàm asperitimi pendencia immerguntur, ita ne vlla parte vas contingant. Hoc fit ante solstitium diebus 48. Gypso deinde oblitus cadus ponitur sub tegulis totius diei solem accipientibus. Post eum numerum dierum tollitur vas, Scilla eximitur, acetum transfunditur. Hoc clariorem oculorum aciem facit. Salutare est stomachi laterumque doloribus, parum sumptum binis diebus. Sed tanta vis est, vt auidius haustum, extinctæ animæ momento aliquo speciem præbeat. Prodest & gingiuis & dentibus, vel per se commanducata. Tineas & reliqua ventris animalia pellit ex aceto & melle sumpta. Lingux quoq; recens subiecta, præstat ne hydropici sitim sentiant. Coquitur plurimis modis: in olla quæ coniiciatur in clibanum aut furnum, vel adipe aut luto illita, aut frustatim in parinis Et cruda siccatur, deinde conciditur, coquiturque in aceto, tum serpentium iectibus imponitur. Tosta quoq; purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Vfus sic coctæ ad hydropicos. Ad vrinam ciendam tribus obois cum melle & aceto potæ. Item ad spleneticos & stomachicos, si non sentiant vlcus, quibus innatet cibus Ad tormina, regios morbos, tussim veterem cum suspirio. Discutit & foliis strumas quadrinis diebus soluta, surfures capitis, & vlcera manantia illita ex oleo cocta. Coquitur & in melle cibi gratia, maximè vti coctionem facias. Sic & interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo cocta, & mista resinæ. Semen eius lumborum dolori ex melle imponitur. Pythagoras Scillam in limine quoque ianux suspensam malorum medicamentorum introitum pelleretradir. Hæc Plinius. In quibus Marcellus Vergilius & Cornatius erroris eum in simulat, quod dixerit adipe aut luto illita, pro eo quod est apud Dioscoridem *ἐν πηλῷ ἢ ἐν ἄδιπνῳ* *ἐν πηλῷ ἢ ἐν ἄδιπνῳ*, id est, farina aqua subacta, quam pastam vocamus, aut luto oblinitur. *ἐν πηλῷ* enim & *ἐν ἄδιπνῳ* hic non adipem, nec multis aliis locis apud medicos significat, sed pastam aut fermentum. Dioscorides de Stibio, *ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ἄδιπνῳ*, id est, Lib. 6.

afficitur farina circumlitum. Vbi ramen etiam iniegit Plinius, qui sic vocat. Qu-
dam non fimo vtiuntur coquentes, sed adipe. Idem Dioscorides de Erisymo. ἰνδύ-
της ἰσχυρὸν καὶ ἀπὸ τοῦ ἐν σπλάγι περιελασθέντος. Hoc est, linteo illigatum, & fermento
oblito affatum. Et de fici veriusq; succo. καὶ μωροῦ θειαν ἀμειψιστὶ περιελασθέντος τὴν

ἐν κύλῳ ἐν σάκκῳ, id est, fermento vel pasta oblita circumfusa carne. Idem Paulus
ὡς ἐν φελλῷ ἐπὶ μύλων τὸν λάκκον. Hoc est, Oui in fermento afflati vitellum. Ac sicut
his in locis atque aliis ὅπως pro pasta aut fermento rectè intelligitur, ita multis aliis

Lib. v. hist. cap. xix. pro adipē vsurpatur. Porro quod ex Pythagora refert, idem prodidit Theophrastus, λέγειται γὰρ πρὸ τῶν θυρῶν τῆς Εἰσοδῆς φυλάττειν, ἀλλ' ἔστιν ἡ Εἰσοδὸς τῆς πίστεως δι' ἀλλήλους. Id est, Traditur & ante portas salutis remedio esse contra venēdic-

Lib. 8. 6m. rum noxam. Scilla, inquit Galenus, admodum incidentem facultatem habet, non tamen admodum calidam. Sed secundum hoc eam quispiam secundi ordinis censet exsiccantium. Præstat autem aut assam aut elixam sumere: sic enim vultur

Lib. 19. c. 6.
Labauc. 17.

dicibus mendose legitur τὴν ἀκρότην, pro τὴν ἀκρότην) vt ab ima caulis parte prima incipiat. Quare Augusti mensis principio Scillæ caulis assurgit, scotum eam ob caulam pictus, quod læpius est obleruatum, cubitalis aut etiam procerior, densissime floribus stipatus, qui primum diducuntur, ac interim dum aperti videntur, medij turgescunt, supremi gliscunt duntaxat, quæ ἀκρότη ἀκρότης est, primus ad ascescendum impetus. Exactis aliquot diebus flores qui primi reclusi fuerunt, diducuntur, medij sese prominent, supremi tantum intumescunt, quæ est secunda ἀκρότης. De extremo defluentibus medijs supremi sese explicant, quæ est tertia ἀκρότης. Hic borefrendi ter repetitus impetus, terrâ quoque ter subigi oportere denuntiat, præquam fruges lerantur. Flaccido verò & emortuo caule folia nascuntur circa laniarum medium vel finem, ob id bulbos cum folijs depictus sine caule, quæ postea Actiarum squaloribus exarescunt. Quod de Scilla illi prodidere, Vergilius et Arato idem de Lentisco literis mandant.

PANCRATIVM. CAP. XL

Nominat



RAECI *παγκράτιον*, sicut & Latini Paneracium, à vineendis & proli-
gandis morbis omnibus nominasse videtur. Scillæ species est, propte-

Lib. 2. cap.
163.

Forma.

reâ Scillâ nominant, vt ait Dioscorides, vt Plinius Scillam puf. lam.
Pancratii, vt describit Dioscorides, radix est Bulbo magno fimilis,
ore aut fubpurpureo, gultu amaro ac feruete. Folia habet Lilio fimilia.

447. cm.

sed longiora. Plinius. Pancratii aliqui Scillam pusillā appellare malunt, folis Lilij albi, longioribus crassioribusq; radice Bulbi magni, colore rufo. Dalechampius sic depingendū curauit, & descripsit his ferè verbis. Nascitur vbius in litore maris, radice Bulbi magni, cortice subrufo vestita, infernè capillata. Καπε modò folus αειθαλές, id est, Lilij albi, vr Plinius vertit, longioribus & crassioribus, quod idem addidit caule pedali & nonnunquam proceriore, anguloso, summo fastigio in quinque foliola candicantia virgata, acuminata sese explicante, è quorum medio anguloso

gulosâ, breviter adnatis compressæ cinguntur siliquæ pediculis subnixæ, ex quarum vertice flos albus emicat, oblongus, infernè arcuus, supernè latus, ambitu supremo in radios velut cuspidatim diuiso, pallidis apicibus multis, staminibusque intus extantibus, flore delapso semen in siliquis adulescit, & maturefcens radescit. Floret mense Iunio. Ex his perspicuum est, Pancratium Scillam non esse, sed speciem

Tempus.

PANCERATIUM, Dalech.

PANCERATIUM, Cusq.



flore postmodum ab ea distitem. Pancratium istud Monspelienſe Cusius Hemerocallidem Valentianam vocat, eoque nomine depinxit. Pancratium verò longè aliud, quale hic videtis expressum. Cum autem de Scilla dixisset, subiecit. Pancratium amplius maior est, extimæ runicæ rubent, foliaque ampliora & longiora. Nascitur copiose in mediterraneis Hispaniæ, estque præfens venenû. Genminat cum Scilla. Vires Scillæ & præparationem habet, vt tradit Dioscorides, ac eodem pondere in istis morbis exhibetur. Mitior autem huius vis est quàm Scillæ. Radicis succus cum erui farina in pastillos cõformatus cum hydromelite splenetici & hydropici vtiliter exhibetur. Horum quædam omisit Plinius, & alia addit his verbis. Aliam soluit succo cum farina erui sumpto: vlcera purgat. Hydropici spleneticiq; cum melle datur. Alij decoquunt eam donec aqua dulcis fiat, eaq; effusa radices terentes digerunt in pastillos Sole siccato: & postea vtuntur ad capitis vlcera & cætera quæ repurganda sunt. Item ad tussim, quâtum tribus digitis apprehenderint in vino dantes, & ad lateris dolores, aut peripneumonici ecligmate. Propter ischiada in vino bibendum, & propter tormina mensèsque ciendos. Radix Pancratij, inquit Galenus, Scillæ similem gustum refert ac vires. Quare ea quidam pro Scilla, si ea non adsit, vtuntur: efficit enim omnia in genere quidem similiter, sed longè imbecillius.

Vires & Temper.

Li. 27. ca. 2.

SISTRINCHION Dodonæi CAP. XVII.

THEOPHRASTVS cum Bulbis multis σισυγγίην ve' σισυγγίην nuntiat, & post eum Plinius. Ἰβλιν ἢ τῷ σισυγγίῳ, inquit, le, τὸ τῆς ριζῆς ἀνέκτα ἐστὶ τὸ πρῶτον, ὃ ἐκάλουν χετμῶνα (corrigere πρῶτον, ἢ χετμῶνα, vt legunt Plinius & Gaza.) τῷ δὲ ὕποστροφαινοῖς (addit Plinius ἴσιν) Lili 7 hult cap. 14.

- Lib. 12. c. 1. τοῦτο μὲν τὰ ἐν τῇ Ἰσπανίᾳ καὶ τῇ Ἰταλίᾳ καὶ τῇ Γαλλίᾳ. Quæ sic reddidit Plinius Sisy-
 rinchium. In hoc mirum imas ejus radices crescere Hieme, Verno autè cum appa-
 ruerit Viola, minui & contrahi, tum denique bulbum pinguescere. Sisyrinchium
 De florib. istud arbitratur esse Dodonæus plantam luc depictam, quam Hispani Nagobas
 cap. 8. quasi nucas siue paruas nucas vocant, Bulbi esculentæ genus, cui gemina est Sa-
 dix, & in Hispaniis passim editur: qualem radicem geminam & edulem Sisy-
 rinchio vereres illi assignarunt. Lobellius Hyacinthum poeticum Hispanicum geni-
 Formæ. no gladioli reticulato bulbo appellat. Huic folia sunt graminis, bina aut terna,
 Dod. ibid. oblonga, & angusta: caulis rotundus, dodrantalis, in quo flosculi tres aut quatuor,
 pulchri, cærulei, verum fugaces, & paucis admodum horis vigentes, abest autem

SISTRINCHIVM,

Dodonæi.



SISTRINCHIVM

minus, Clusii.



ptodeuntes, forma quodammodo florum Iridis, ex nouem videlicet folio-
 positi, quorum tria deorsum inflexa pro fimbria maculam habent pluri-
 luteam, alia tria sursum versus aliquantulum etiguntur, tria verò reliqua
 dentia iis quæ Iridis florum fimbriam contegunt, proportionem huic flos-
 cula & tenuiora sunt, sursumque arrecta medium floris tenent, summa ex
 que parte diuisa: capitula inde succedunt oblonga, in quibus semen rotundum
 paruum, uti Rapi: radix bulbosa, gemina, vno Bulbo alteri superposita, si-
 dioli, sapore dulcis & edulis, quæ inuolucro quodam integitur reticulato, quod
 quidem maioribus spissius est, minoribus minus crassum. Duo etenim huius
 nera esse videtur, magnitudine sola differentia. In Lusitania, & alibi apud His-
 panos nascitur. Clusius idem Sisyrinchium alterum genus depinxit, superiori simi-
 le, in omnibus autem minus, & foliis gracilioribus, floræque longè odorati-
 Hispanis Lario, nonnullis Macuas dicitur. Clusius etiam Sisyrinchium Theophrasti
 esse arbitrat. Inuenitur in Valentino regno, sed in Murciano frequen-
 tissimum.

Lib. 1. Hist.
 Hispan. c. 10.

ORNITH

QUOD *Ornithogalum* Græcis, Ornithogalum similiter Latinis dicitur, Plinio Ornithogale. A lacteo gallinarum candore Ornithogalum nomen accepisse videtur, inquit Ruellius, quod flores in lacteo colore taceant, nisi quis censat ab oui candidi figura, quare radix potest dici luma, nam auiculatum oua radix innuit, ites allusina. Ornithogalum, vel describit Dioscorides, cauleculum est tener, rarius, foliis abieatis, additis dactylis affurgens, superne tres quatuorve habet propagines renatas, in quibus flores foris herbacei, aperti verò lactei coloris, inter quos capitulum Cachrys modo infectum, quod vna cum pane coquitur velut Melanthium. Radix bulbosa, quæ & cruda & cocta editur. Idem delineavit Plinius his verbis. Ornithogale caule tenero, candido senapedali, radice bulbosa, molli, tribus aut quatuor agnatis. Coquitur in pulve Ruellius Ornithogalum esse ait, quod a Ruellio Sueshionum agro erigitur, rotunda radice, bulbaceam speciem præ se ferente, cuius medio cauliculus erigitur, cui quatuor adnatis appendicibus in eademque: foliis in capitulum erigitur, quod in eorumque foribus exiguus, foris herbaceus, intus lacteo colore candidus, qui simul coacti velut paniculae quædam compacti callo si quam in eodem erigitur in pilulam exuberant, nunciam proinde panis nunc repretentantem. Sueshionensis, et Charles vocat, pueris non innoxios, qui propter adstantes cum aratro terra profcinditur, aut in lactiores porcas sulcatur, eructos vomere colligunt, multo castaneis suauiores in cibis, quibus & crudis, & in cineribus incoctis tuta vescuntur, odore iueundissimo mirum in modum os commendante. Radix in orbem ferè collecta est, cortice pullo, candidissima intus carne pulpave perquam odorata. Vere vel Æstate cum fronde vident: Hyeme vel Autumnum cum exarantur agri radicitus euelluntur. Diu seruari possunt, & ubi nonne perunt inopia, pleribus rustici & famè & ieiunia castanearum more faciunt.

Nomen.

Lib. 15.

Lib. 15.

Forma.

Lib. 15.

ORNITHOGALVM

1. Matthioli.



Nec aliud humo genitum promptius in cibum cedit, cum frugum penuria gliscit. Mire suisbus expetitur, qui rostro serobiculos excauant, & horum capti dulcedine, gregatim ad hos eliciendos, radicitusque vellendos adcurrunt. Rura ex agris sponte natum grariorem cibum non norunt. Lautiores etiam mensas diuitum Ornithogalum non reformidat. At Dodonæo huiusmodi radix non Ornithogalum, sed Bolhocastani genus esse videtur. Radix enim est Bulbi forma, sapore castaneæ, quale Bolhocastanum esse nomen ipsum indicat. Ex Matthiolo duas Ornithogali plantas exhibemus, quod duo esse eius genera existimet. Quorum utrumque cum caule foliosum sit, differt ab eo quod Dodonæus depingit, quodque legitimum Dioscoridis Ornithogalum esse censet. Id etiam Bulbum leucanthemum appellat. Huic folia multa sunt & angusta, graminis minora: caulis inter hæc exit, dodrantalis minor, rotundus, glaber, absque foliis: flores in summo dispersi emicant sex aut septem, foris herbacei viridis, intus candidi, ex sex foliolis commissi, exiguus Liliis, præ-

Lib. 15. cap. 18.

In cap. 18. lib. 15.

ORNITHOGALVM

I I. Mattholi.

L. purgla.
Ap. c. 6.

fertim priusquam aperiantur similes, qui Sole quidem splendente parent, noctu vero, & cum aër nubilus etiam interdiu oclusi permanent: capitula succedunt triangularia, Caeuoyos femini similia, in quibus semen extinguitur: radix bulbosa, lento succo plena, sapore ut plurimum insipida & aquea, cum obscura tamen quadam acrimonia. Reperitur in agris frumentariis apud Brabantos locis compluribus. Maio mense flores edit. Dodonæus alio in loco Ornithogalum, quod Narbonense cognominat, haud parum differens à superioribus depinxit, foliis oblongis & tenuibus, & quam aliorum alacris, & caule tenello, cubitali, aut proceciore, nullo minus vestito, floribus vero è ornato quamplurimis, à medio fastigium petentibus, qui foliis herbaceis sunt, parentes vero interius lactis candoris visuntur, Phalangij flores referentes. Fiuētus triangularis est lobus, in quo fuit bulbos parvus & oblongus pro radice, & Narbonensi Gallia, ac iuxta Monsionem agris frumenti feracibus gignitur. Sicut Diofcoridis legitimum Ornithogalum est.

ment. At superiora pro legitimis Dodonæo magis placent. Ornithogalum Narbonenti simile, & magnitudine tantum distare videtur, quod à Myconio gignitur. Inter segetes oritur, inquit, cubitali altitudine, interdum maiori. Caulem

ORNITHOGALVM Dodon.

sive Bulbus Leucanthemus.



ORNITHOGALVM

Narbonense, Dodon.



bet lzuem

ORNITHOGALVM
magnum, Myconi.



bet læue, rotundum, folidum, Alphodeli instar, in quo flores intus candidi, ex sex foliis constantes, foris virides ex petiolo pendunt, prope cuius exortum foliolam è caule prodit, ipsam petiolum amplexens in florum medio stamina multa sunt veluti in Rosa. Radix crassa est, bulbosa, candida, solida, non squamata, dulcis, inferiore parte fibras in orbem emittens, eius extremum ambitum cingentes coronæ capitis monachorum instar. Cum huic idem sit sapor qui Ornithogalo vulgari, foliorum, florum forma eadem, Ornithogali speciem esse censet Myconus, etiam si solum sit in hoc duplo maius & latius. Quare Ornithogalum magnum appellauit. Raram plantam esse ait, seque his tantum reperisse, semel Toleti, iterum iuxta Barchinonem. Ornithogali speciem faciunt quidam, ut scribit Pena, quod Ornithogalum luteum vocant. Quamuis enim Ornithogalo nomen dedit florum lacteus cadot, cuiusmodi in gallinarum alis renidet aut ouis, non earum lacte, quo caret volucrum genus, tamè propter totius figuræ affinitatem nobis erit etiam vocandum Ornithogalum, quod flore luteo est elegantissimum, nec ita frequens Italiz, Narbonæ, calidioribusque visitur. In Aruernis & ad pomeria Lugduni pone & prope suburbium trans Lugdunum, vulgò *La Guilloiere*, in campis latis &

ORNITHOGALVM luteum Lobel.
sive Bulbus siluestris, Dodon.



NARCISSVS IIII.
Matthioli.



glareosis,

glareosis, etiamque in Borbonio agro, qua ducit regia via Lutetiam, plurimisque Belgij, Angliæ nemorosis Sommerfeti Ornithogalum luteum se collegisse ait. Tota planta minor multò, sed simillima candido Ornithogalo. Martio mensè floret. Bulbus vnicus plurimùm Scorodoprasi, oblongior, inodorus, pauciora, sed latiora quàm Ornithogali folia: flores prorsum Ornithogali, sparsi, & foris quidè herbidi vt Ornithogali, sed luteoli non candidi, intus verò eleganti luteo nitent. Est Bulbus siluestris Fuchsi & Tragi, Sisyinchium Cordi, Bulbus esculentus Lancunæ. Hic satis appositè collocabitur venusta planta inter Ornithogala & Lilionarcissos media: habet enim radicem Ornithogali, folia oblonga Narcissi, imum caulem glabrum, singularem, pedalem & cubitalem ambientia, in summo in alis diuisum, quibus Liliacei, lactei candoris calicis instar senis foliolis radiati flores, Tulipz minores, obtusi, è quorum fundo glomerulus pullus protuberat. Semen pericardio tereti Ornithogali clauditur, stamina luteola glomeratum fundum pullum ambientia. Plantæ odor suauis, aromaticus, Belgio hortensis vt rara, ita vñ incomperta. Narcissus est quartus Matthiolo, Lobelio Lilionarcissus polyanthes, recentioribus Liliū Alexandrinum, Italis *Hyacintho del pater nostro* propter glomerulos flores. Hæc Lobellius.

TRASI.

CAP. XIX.

Nomina **R**ASA est planta hæc, nec alibi scribunt Herbarij sponte oriri, quàm in amenissimo Veronensium agro, non procul ab vrbe, vbi etiam colitur pingui riguoq; aruo. Seritur & in Athesis fluminis sabulosis auctore Alexandro Benedicto. Huius radices Trasi illic vocantur, & Trasi Do'ce & Delzolini, Guilandinus & Dodonæus Dulcichinū vocant plantam ipsam, Pena esculētōs Cypetos, q; hæc planta prorsus sit è Cyperi genere seu radices, seu reliquam totam plantam spectes, eiusq; locos natales: nec differte videtur nisi radicem sapore qui gratus vescendo est, nec minùs velis. Sunt autem bulbosæ, vt describit Matthiolum, fabarum magnitudine, oblongæ, & cum siccat rugosæ. Planta ipsa folio est oblongo, arundinaceo, dorso eminente, triangulo, Cypetino simili. Caules edit cubitales, angulosos, in quorum cacumine folia exiliora stellarum modo radiata, inter quæ flores exeunt spicati, siue ubi hæc subulescentes. Radices habet numerosas, tenues, è quibus globuli dependent bulbosi, oblongi, fabarum magnitudine, colore subrubescēte, alba, dulciq; intus medulla, Castaneæ sapore. Autumno parui isti bulbi leguntur, Vere seruntur in plures multiplicandi. Sunt qui putant stirpem istam esse Theophrasti κύπερον ἰδιώμας, id est, Cyperum esculentum, cum cæterorum radices amaræ sint, & minimè edules: ὡς αἱ μὲνρίζαι γλυκύναι, τὰ δὲ ἐπὶ τῶν ὄχθραις, λίγω δὲ τῶν ἀγροτέρων, κυπεύρου, τὸ πλὴν, σελιν, ἱπποελίν, τὴν ἐν ταῖς λίμαις καὶ τὴν ἐν τοῖς πεδίοις τῶν τοῦ φρυγίων ἰδιώμας. Id est, quorum radices sunt dulces, quæ verò supra terrā, minimè, veluti Graminis, Cyperi, Apsij, Hippocistini, atque eorū quæ in paludibus & fluminis esculenta proueniunt. Quidam putant Trasos esse

Forma.

TRASI cum flore, Matth.



Arabum

Atabum medicor. in *Halazelm*, sed falso. Nam *Alzelum* ab Arabibus inter fructus, seu grana non inter radículas numeratur. Sic enim Serapio scribit, cap. 3. 7. simpl. *Halazelm*, id est Granum *alim*, est granum pingue, cicoris magnitudine, citrinum exterius, album interius, & habet bonum saporem, & defertur ex terris *Barbartz*. Idem confirmat *Auicenna*, cap. 3. 4. his verbis. Granum *Alzelum* est granum boni saporis, & oritur in partibus *Herzuz*. Ex quibus perspicuum est, granum istud à *Tasis* multum differre. Horum cremore, ut tradit *Matthiolus*, pectori & lumbis vitia expurgantur. Quo fit ut tussibus periculosissimis etunduntur eorum maceranturque carnium iure, deinde per linteolum exporantur, & cremor, quem citius veneris portiones miscent recentiorum nonnulli. *Lider* cremor per os ad vires ardores valde, & ad dynteritias: nam humorum acrimoniâ remouitur, præterea ex aqua potui, in qua eadem ferrum extinctum fuit. Veronenses pro bellariis vtiuntur. Sunt etiam radices, ut ex experientia & dulcedine coniecti potest, in moderate calacientium & humectantium genere, sed flatus quodam modo gignunt. Humentibus lico solo complures capitales radices edidisse scribit *Lobelius*. Vererem si mulare, abstergete moderate humectando, ideo expectoratione iuuare.

Vires &
Temper.

TUBERA ET FVNGI. CAP. XX.

TUBERVS aut Bullis, inquit *Galenus*, adnumeranda quæ Græcè *κνίβη* & οὖβη, Latine Tubera dicuntur, Arabice *Ramech*, *Alhamech*, *Tumer* & *Roma*. Italice *Tartessi*, Germanicè *Hirtzbrunst*, Hispanice *Tumas* de terra, Gallicè *Truffes*. Vocantur autem omnia ab inuolubus, & omnia à timore. Ac ne quis homonymia fallatur, sunt fructus arboris Tuberes noniati, & alii modo descripti, & *Cyclaminus* Tuber terræ appellatur. Tuber tradit *Dioscorides* radice esse rotundam, sine foliis, sine caule, subscissam. Effoditur Vere, & crebris succis, & cibi vsus venit. Eius luculentior est apud *Plinium* descriptio. Et quoniam à tuberculis rerum cæpinus, sequemur eorum ordinem, in quibus vel nati sunt, vel est aliquid nasci, aut viuere sine vlla radice. Tubera hæc vocantur,

Nomina

Lib. 12. 14.
Lib. 12. 10.

Forma.
Lib. 19. c. 11.
& 12.

TUBERA, *Matthioli*.



vndique terra circumdata, nullisque fibris nixa, aut saltem capillamentis, nec vique extuberante loco in quo gignuntur, aut timas agente: neque ipsa terra coherens. Corrice etiâ includuntur, ut planè nec terram esse possumus dicere, nec aliud quam terræ calum. Siccis hæc ferè & sabulosis locis frutectosisque nascuntur. Excedunt sæpe magnitudinem mali cotonei, etiam librali ponde e. Duo horum genera, arenosa dentibus inimica, & altera synœra. Distinguntur & colore, nigro rufoque, & intus candido, laudatissima Africæ. Crescunt, an ne vitium id terræ (neque enim aliud intelligi potest) ea protinus g. obetur magnitudine qua futurum est: & viuunt ne an non, haud facile arbitror intelligi posse. Putrescendi eni in ratio communis est iis cum ligno. *Lartio* *Licinio* *Prætorio* viro, iura reddenti in Hispania *Carthagine*, paucis his annis scimus accidisse mordenti Tuber, ut deprehensus intus denarius primos dentes inflecteret. Quo manifestum erit terræ naturam, in se globari: quod certum est ex

est ex iis quæ nascuntur, & feri non possunt. Et paulò post. De Tuberibus hæc traduntur peculiatiter, cum fuerint imbres autumnales, ac tonitrua crebra, tum nasci, & maxime è tonitribus: nec ultra annum durare: tenerrima autem verna esse. Quibusdam locis accepta riguis feruntur: sicuti Myrtenis negant nasci, nisi ex inundatione fluminum iniecto semine ab Tiaris. Est autem hic locus in quo plurima nascuntur. Afrix nobilissima, circa Lampacum & Alopeconnesum, Græcæ verò circa Elin. Hæc tenus Plinius. Duo in Romano agro genera haberi scribit Matthiolus. Vni candida, alteri pulla pulpa subest. Rimosus utriusque cortex, ac niger. Est & tertium genus in Ananienli & Tridentino tractu proueniens, colore


L. 1. Alam.

lubrifo, cæteris longe minùs, insipidum & gustu iniucundo. Tubera, auctore Galeno, nullam qualitatem insignem habent. Quare qui ipsis vtuntur, ad cõdimenta excipienda magis vtuntur, quemadmodum & aliis quæ vocant insipida, & innoxia, & ad gustum aquosa. Quibus omnibus est commune, vt alimentum quod ab ipsis in corpus distribuitur, nullam insignem habeat facultatem, sed subtile id quidem sit, crassitiè verò, quale ipsum est quod sumptum fuerit: crassius quidem quod ex Tuberibus est, humidius autem, ac tenuius, quod ex Cucurbita. atque in aliis proportionem. Sed de iis aliter scripsit Auicenna. Tube

L. 1. c. 698.

a rectra magis concreat substantia, aquea minùs: est & in iis aërea & subtilitas pauca, suntq; omnis sapientis expertia. Melancholicos & crassos gignunt humores magis quam quoduis aliud cibi genus. Quare frequenter deuorati apoplexiam & paralytim inuadunt. Præterea concoctu difficilia sunt, & ventriculum grauant. Tuberibus deteriores sunt Fungi, qui Græcis dicuntur *μύκωτες*, Arabibus *Hatar*, vel *Father*, Italis *Fungio*, Germanis *Pfifferlung*, & *Reysken*, Hispanis *Hongos*, *Cogomelos*, & *Cyltherquas*, Gallis *Champignons*, & *Potirons*. Horum differentiam duplicem statuit Dioscorides. Aut enim manduntur, inquit, aut pernicioles sunt. Multis de causis venenati gignuntur, vbi videlicet clauus ferreus in quo sit rubigo, aut pãni marcor adfuerit, aut si in serpentis cauernam, arborémve noxiam emergant. Cõtinent qui tales sunt ne quod strigimentum, concretamque pituitam, terræque eruti quàm celerit perirent. Qui verò esculenti sunt, suanem in iuribus gratiam ineunt, largientamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangulant, aut choleram morbum citant. Remedio est nitri (Oribasius habet olei) potus, aut lixiuium cum acida materia, aut feruesfactæ Satureiæ, aut Origani iusculum. Debellantur etiam gallicanifini potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed nec dissoluantur, cum magna ex parte integri cum recrementis alui deiciantur. Hæc Dioscorides. Matthiolus eorum qui sunt edules differẽtias multas reperiri scribit, præsertim in Hetrutia inter omnes Italix regiones Fungorum feracissima. Sunt enim, inquit, qui *Prignoli* vulgò dicuntur, singulis annis primis Aprilis imbribus erumpẽtes, nõ solùm odorem suauẽ spirantes, gustuque gratissimi, sed etiam protinus innoxij. Secundum locum tenent porcini, hoc est suilli vulgò nuncupari, qui prius elixi, deinde farina obliui, & in butyro, vel oleo frixi magnam cum palato ineunt gratiam. Sed in eo genere plures perniciosi quàm in aliis reperiuntur, qui faciliè dignoscuntur cum à terra & cortice purgantur, incidunturq; decoquenda. Nam dissectorum statim, vt Plinius ait, dilutus aduenit rubor, rancidus sibiinde aspectus, liuidus intus color, rimosa stria, pallidum per ambitum labrũ, postremo accedit nigredo, & ita protinus computrescunt. Rehtë etiam scripsit Auicenna eos nocentiores esse qui nigri sunt, vel virides, vel in rubro purpurascetes. Sed accidit plerumq; vt eos potissimùm Fungi perimant, aut in magnum discrimen adducant, qui super ferrea craticula, aut cineribus calentibus assati deuorant, quia non dissecti, noxij ab innoxij non faciliè secernuntur. Præterea nõ semper nocet Fungi, quia ex se lethiferi sunt, sed quod copiosius quam par sit ingerantur enim

F V N G I.



enim lentū admodū
carnosūq; lenticu-
ci arctiarum oscula
ita ostendit, ut con-
clutis in eis cariti-
bus suffocent. Quod
cum non in Hetruf-
cia, sed in Etruria
eduntur, si Alio
& pipere adiciant. Af-
feruntur Fungi mor-
tia, inquit Marti o-

lus, præsertim qui vulgō porcini vocantur: si enim innocentes adduntur, de-
ponuntur. Et licet in aliis aliis Fungorum vulgaria genera recitant, *Fraxinoli, Tu-
nini, Zoster, Oryzi, Carduoli, Ordinali, Parigiali, Vesciculi* de Lupo. Fungi etiam non
tota in hunc, sed nonnulli in arborum caudicibus nascuntur, quos omnes si per
petilo vasa purgetur, et thymus, modō non sint arbutes noxii, & e contrariis pro-
dunt, quibus nec ferrura, nec tabulae pannus, nec serpentis cadauri oblit. Ex
eo genere præter Agaricum, quosdam Laricibus innascitur, in Anan. & in mon-
tibus, et ginta libratum pondere, aureo colore, per ambitum insecto, in cibis gra-
tis imos sine ullo amaroze licet Agaricus, ex eadem arbore sit amarissimus. Sed
optime omnium Galenus dixit Fungum plantam esse admodum frigidam & hu-
midam: quamobrem ad deletetiam enecantemque facultatem accedere, ac sanē
immas esse quæ interficiant, potissimum qui ex natura mixtam habent qualita-
tem putredinosam. Et in lib. de Alim. Inter Fungos, inquit, Boletus si bellus in aqua
elaborant, prope accedunt ad cibos insipidos. Non tamen sic totis ipsis vulgō
vitiis, sed a parant variē & condiunt, ut alia omnia, quæ nulla insigni qualitate

FUNGVS spongiosus,
Dalechampi.



sunt prædita. Alimentum autem ex ipsis est
pituitosum & frigidum, prauisq; succis, si quis
ipsis largiatur, utatur. Omnium igitur Fungorum
ij minimum sunt noxii. Secundi autem post
hos sunt Amari. Reliquos vero tutius est ne
attingere quidem: multi enim ex ipsorum esu
interierunt. Noui quēdam, cui post Boletorum
non satis elixiorum (quæ innocentissimi esse pu-
tantur) usum largiorem, os ventriculi pressum,
& præcæuatum coarctatumq; fuit, difficilenque
habuit respirationem, & in animi deliquium
incidit, & doremq; frigidum sedauit, ac demū
senariis ex sumptis iis quæ humores crassos
incidunt, perit: cuius generis est oxymeli
ipsū per se, & cum hyssopo, & origano ipsi
mediocriter incoctis. Is enim cum hæc sumplit,
tum nieri spumam ipsis inspersam: post quæ
Fungos quos comederat vomit, quæ etiam quo-
dammodo in succum pituitosum frigidumq;
at modum, ac crassum erant mutati. Hic non
omittendus Fungus insignis, quem spongiosū
Dalechapius cognominauit. Nascitur in aspe-
ris & saxosis, sæpe ad Caltanorum radices, co-

Locus.

lore fuluo, corpore fpo gioso, figura in me am delineante, suauissimi gustus: quimobrem in delictu habetur variis modis pręparatus, vt hominum palatum variis condimentis oblectant. Galli vocant *Morilles*, inde fortasse, quod ad Mori fructus figurati nonnihil accedat.

ASPHODELV S.

CAP. XXI.

Zosteris



R A E I S ἀσφύδιλος, Latinus Asphodelus, & Hastula regia, quod dum floret prorsus sceptri regi effigiem referat. & Albucum, siue Albucus vocatur, Othecinis corrupta voce Asiodilus, Arabibus *Chrunce*, *Bhunn*, *Ornach*, *Abg*, seu *Axiras*, Italis *Asphodelo*, Germanis *Goldwurte*, Gallis *Asphodel*, & *Hache Royale*, Hispanis *Gamonos* & *Gamonites*. Florem ab *exon* appellati ait D o s m o d o s, P a n i u s caulem An hericum, radicem vero, id est, bulbos, Asphodelum Theophrastus etiam caulem ab *exon* vocat, Albucum vertit G a z a.

Libani

Aphod

capit

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1.

Plin. m. fecit. Dioscorides vnus Asphodeli meminit. Plinius Dionysium duo genera a ere tradit, marem & feminam. Recentiores tria obseruarunt. Asphodelum d scribit Dioscorides his verb s. Folia habet Porro maiori similia, caulem lauem in summo florem ferentem, Anthericum voc tum: radices oblongas, rotundas, glandibus similes, gustu acres. Hunc Dioscoridis Asphodelum alium vocant Hie barij quidam, alij marem, qui folia fert capitula, oblonga, angusta, Porri folijs similia, acuminata caulem rotundum, lauem, cubito longiorem, quem a medio larsum versus multi quinque foliolorum flores patentes exornant, colore candidi, aut ex rubro valde diluto modice purpuras entes, staminibus in medio, post quos capitula sequuntur obicularia, in quibus semen durum, triangulum, nigricantis obsoleto coloris: radices ab vno capite complures exeunt, oblongę, teretes, Pzonix minores concolores semine, acres, magnis glandibus quodammodo sim les, succose. Arida Narbonę litora huius Asphodeli teracissima sunt, nec minus montes a mari disiti, vbi bulbis il lus aduulrior. bustro stro effosis quantumuis

Locis.

HASTVLA Regia, siue
Asphodelus, Murth.



L. 1. 1. 1.

acribus suis lubenter vescuntur. Apud Germanos & Belgas non nisi latus prouenit. Floret Maio & Iunio mensibus, & particulatim quide ab imis incipiens. Plinius, Asphodelus, inquit, oblongum & angustum folium habet. Et max, Asphodeli mentione & Homerus fecit. Radix eius Napis modicis similis est: neq; alia numerosior, octoginta sunt acervatis siue bulbis. Theophrastus & fere Græci, princepsq; Pythagoras, caulem eius cubitalem, & sepe duum cubitorum, folijs Potri siluestris. Anthericum vocant: rad cem vero, id est, bulbos, Asphodelu. Nostri illud Albucum vocant, & Asphodelum Hastula regiam. Theophrastus hæc de Asphodelo ο μιν γὰρ ἀσφύδιλος μακρὸν, καὶ εὐκρίνον καὶ ὑπόγλυκ, καὶ χαλκὸν φέρων. Id est, Asphodelus longum, & angustum, & quadatenus viscidum folium habet. Et, μέγιστον ὁ πάλιν ἀσφύδιλος. ἢ γὰρ μέγιστος ἀθρόονος. Omnium maximu caulem Asphodelus habet: Anthericus enim maximus. Et μοχ, ἢ τὴν ἀπαύχαιρον ὁ ἀσφύδιλος, καὶ χαλκὸς αὐτῷ ἐκλάδεται, τῇ μὲν μερὶ τέρχμιος, τῇ δὲ χαλκὸς μὲν μέλας. γινε) θία ἐν τῷ σπογγύλῳ τῷ ὑπερστυ τῷ αἰθύν,

ἐκείνης, ἐκ τῶν αἰώνιων ἀλλ' οὐ τῶν θνήσκουσας τῆς τοιαύτης. τὰν ἀνθεσιν (non ἀνασθιν, ut habent publica exemplaria) παύεται ἡ γὰρ μίτος, ὡς παρ' ἡμῶν ἐπὶ τῇ σκιάλλει. ἀρχαίαι δὲ πρῶτος ἀπὸ τῆς ἐξέλιξης, ἐν δὲ τῇ ἀνθεσίνε συνίσταται σκιάλλει, ὥς ἐστι ἄλλα μεταβάλλει ζῶον ἐπὶ τῇ ἀνθεσίνε. Ἐπὶ οὗτος ὁ ἀνθεσίνος ἀναρτῶν, ἀνθεσίνος ἐκ τῶν αἰώνιων ἀλλ' οὐ τῶν θνήσκουσας τῆς τοιαύτης. τὰ λείψανον, ἀλλ' οὐ τῶν θνήσκουσας τῆς τοιαύτης. Id est, Multi feminis est Asphodelus, estq; semē eius lignosum, forma triangulum, figura nigrū.

ASPHODELVS minor,
Dodon. & Clusij.



ASPHODELVS bul-
bosus, Galeni.



Gignitur hoc in rotundo quodam quod flori subest, excidens æstate cum id dehiscit. Floret particulatim, ut & Scilla, incipiens ab imis. In Antherico nascitur vermis, qui in aliud animal volatile floridum transmutatur. Deinde cum Anthericus exaruerit, ipso eroso euolat. Videtur autem hoc peculiare habere præ cæteris laxi caule præditis, quod angustus cum sit, propages supernæ habet. Hæc Theophrastus. Dioscoridis Asphodelo satis similis est caule, foliis, floribus, planta appicta, sed radicibus differt, quæ non glandulosæ, sed crassæ, fibratæ, numerosq; ex vno capite nascuntur: folia Asphodeli minora & angustiora multo, brevioraq; & dilutiore colore: è quorum medio sex, aut plures ex eadem radice allurgunt caules cubi ales, ramosi, quos sine ordine nascētes exornant flores, superioribus similes, sed minores deinde triangulares siliquæ, primū virides, deinde albicantes, & in his semen rugosum, triquetrum, altero minus. Dodonæus & Clusius Asphodeli minoris nomine plantam hanc donarunt: nullumq; alium ferè Asphodelum ait Clusius toto Valētino regno nasci, & Gadibus, & plerisq; Granatensis regni locis inueniri etiā in lapidosa illa planitie supra Arelatem, secus vias. Huius meminimus in libro de iis quæ flore placēt, cum de Phalangio ageremus. Asphodelus femina Dodonæi, siue bulbosus, siue Hyacinthinus, folia habet porracea, sed tamen angustiora & tenuiora quàm primi Asphodeli: caulem rectum, rotundum, floribus similiter multis circūuestitum, rarioribus tamē, qui primi Asphodeli floribus, haud multum sunt ab similes, ex sex paruis acuminatis foliolis, & aliquot in medio staminibus compositi: capitula quoque triangularia, sed longiora, in quibus semen, radix subest bulbosa, magnitudine esculētī Bulbi, aut maior. Belgæ in hortis colunt. Floret eodem quo primus tempore, aut paulò tardius. Asphodelum esse caulis Antherico similis ostendit. Quare is erit Asphodelus, cuius meminit Galenus in libris de Alimen. facultat. bus,

Lib. 6. c. 80.
hist. 8. 10.
& de Bot. cap. 19.

de quo postea dicerur. Ab hac sententia non abhorrent Lobellius & Pena, qui Asphodelum fortè Galeni & Hyacinthinum appellant: quia ancipitis videtur figuræ & generis ex Asphodelo, cuius flores habet, & ex Hyacintho, propter similem radicem. Est & alius Asphodelus luteus, à florum colore luteo cognominatus, cui folia sunt oblonga, angusta, fluita, in virote quali cærulea, longiora & angustiora quàm primi: caulis rotundus, cubitalis: flores in eo à medio sursum versùs plurimi, alterius satis similes, sed colore lutei, staminibus in medio: capitula succedunt rotunda, in quibus semè: radices similiter còpures, sed singulæ oblongæ & tenues, multò quàm primi & tenuiores & longiores, colore luteolæ, supra quas fibræ quædam è lateribus exeunt, per quas in plures alias stirpi ipsa facillè multiplicatur. Hortis Belgij & Galliæ familiaris est. Floret similiter Maio aut Iunio mense. Est & Asphodelus luteus palustris, de quo in lib. de Palustribus. Addit Lobellius Liriasphodelū Liliiflorū, de quo egimus cap. de Hemerocallide. Præterea Liriasphodelū phæniceū, cui ex minato flauente flor: sicut lilia sunt Porri, Asphodeli albi vel Liriasphodeli vegetiora latioraq; supernè reflexa: caulis rotundus, durior, bituos ternosq; cubitos interdū superans, in cuius summo Liliacei itidem flores striati, Liliū puniceum minus æquant. Radix tuberosa teres, Asphodeli lutei minoris. Aspho-

Dodon de
Stirpib. c. 96.

ASPHODELVS luteus,
Dodonæi.



ASPHODELVS luteus
minor, Lobellij.



LIRIASPHODELVS
phæniceus, Lobellij.



deli ta

deli radix, vt Dioscoradit, calfaciendi vi prædita est. Urinâ & menses pota mouet. *Vires & Temper.* Lateris dolorib⁹, tubis, cõfusionsib⁹, ruptionibus drachmæ pōdere ex vino pota medetur, vomitiones adiuuat ludicri tali magnitudine in cibū accepta. A serpēte demorsus datur vtiliter triū drachmarū pondere. Illinire aut oportet morsus foliis radice & floribus cum vino: itē vlcera sordida & depaf. etiā: mammarum quoq; & testiu inflammationes, tubercula & futūculos, decocta in vini fæce radices ad recentes autē inflammationes cū polenta. Radicis succus adiecto vino vetere dulci, myrrha & croco simul decoctis, perquā vtile fit oculis medicamentū. Ad purulentas aures per se, & cū thure, melle, vino & myrrha tepesfactus prodest. In contrariam autē per se infusus dentiū dolorē mitigat. Cinis ē radice cremata illitus, alopecias capillis replet. Oleū in excauatis radicibus igni decoctū, illitū exulceratis perionibus, & ambustis igne cōducit. Dolori aurū instillatus auxiliatur. Candidā vitiligine linteo antea perfrictā in Sole, illita radix emendat. Semen & flores in vino poti, scilopen dræ & scorpionū venenis egregiē aduersantur. Aliū quoq; deiciūt. Galenus tradit Asphodeli radicē vtilē esse sicut Ari, Arisari (exēplaria falsō habent Asari) Dracōtij, nempe extergentis facultatis: vltæ autē cinerē calidiorem & exsiccantiorem, magis tenuium partium, & ad discutiendum potentiorē effici. Quare & alopecias sanat. Meminit Asphodeli etiam Hesiodus his versibus.

Νέπτιν ὡς ἔσσι πολλόν ἡμῶν παλῖος,

Οὐδ' ὅσον ἐν μάλ' ἔχτε, καὶ ἀσφodelος μετ' ὄψας,

Ignorant stulti quanto plus dimidium sit

Toto, quamque bonum magnum in Malua Asphodelo que.

Id est,

Li simpl.

Sed cū Asphodeli Dioscoridis radices aciores sint & ingratiore, quā v̄ præsertim hominibus nostris in cibū cedere possint, verisimile est Hesiodū Asphodelū aliquē aliū intellexisse, fortē Galeni, cuius vis etiā nō elixi ignauio multo, & feruor mitior. De quo sic scripsit. Radix Asphodeli & magnitudine & figura & amarote Scillæ radici quodāmodo similis est, si tamen vt Lupini paretur, maximam partem sui amaroris deponit, in eoque à Scilla discrepat. Nam Scillæ qualitas diffillunē exiit. Hesiodus certē Asphodelū laudat. Equidē noui quosdam rusticos qui grassante fame vix tandem cōpluribus elixationibus decoctionibusq; in aqua dulci esulentam ipsam red diderint. Porro hæc quoque radix, quemadmodū & Draconij, facultatem habet tenuandi & aperiendi. Proinde quoq; pro summo remedio ipsius asparagum ictero laborātibus exhibent. De eodem eduli Asphodelo hæc literis prodidit Theoph. πολλὰ δ' εἰς τροφὴν παρέχεται χρεῖσται, καὶ γὰρ ὁ ἀνθρώπος ἐδωκεναι τοῖς βέλους, καὶ τοῖς ἀνθρώποις φρυγέμενον. πάλιν δ' ἄλλοις ἢ μέγα κοπλήμας μετὰ σίκου, καὶ πλεῖστον ὄνουν ἔχει καὶ ὁσίοδον. Id est, interprete Theodoro, Asphodelus permulta ad cibum vtilia adfert: quippe Albucū tostum in cinere manditur, & semē torrefactum vsui est. Sed radix tula cum ficu in vsu maximē omnī venit, & vtilitatis plurimū auctore Hesiodo præbet. Hæc ex Theophr. Plinius exscripsit, Asphodelus māditur & semine tosto, & bulbo: sed hoc in cinere tosto, dein sale & oleo addito: præter eā cū ficis, præcipua voluptate, vt videtur Hesiodo. Traditur & ante portas villarū satum remedio esse contra veneficiorū noxiam. Quod postremū Theophr. & Diosc. non de Asphodelo, sed de Scilla literis mandarūt, vt diximus. Idem Plin. prolixius Asphodeli vires exponit, sed quæ partim mari, partim fœminæ debentur.

Li. 2. Alim.

Lib 7. hist. cap. 12.

Lib. 2. c. 17.

ΜΟΛΤ.

CAP. XXII.

Ts1 Homerus Moly illud primus celebrauit, quo contra Circes veneficia Vlysem Mercurius armavit, ita canens:

Ὡς αἶψα φρονέας πόρε φάρμακον ἀνέστιφόντης

Ex γαίης ἐρύξας, καὶ μοι φύσιν αὐτῷ ἔδωξεν.

Ρίζαν μὲν μίλῳ ἴσσε, γέλαδ' ἐν δὲ σκελὸς ἄσβε.

Odiss. 10.

TTT 3

Μῶλον δὲ μὴ καλέσει γῶσι.

Id est,

Sic satis diuulsam ē terra porrigit herbam

Mercurius, simul & naturam me docet huius.

Radix magna hinc, sed lactu flos concolor exit.

Moly vocant superi.

Et post Homerum Ouidius, dum canit:

Pascor hinc florem dederat Cyllenius album,

(Moly vocant superi) nigra radice retentum:

Lib. 14. Me-
tamor.

Nomen

tamen cū graues Græci & Latini rei herbariæ scriptores peculiaris herbariæ bulbosæ meminerint, quæ μῶλον Græcè dicatur, Latine etiam Moly, eique locos natales in quibus reperitur assignarint, de ea hic dicendū. Dictam autē volunt ἀπὸ τῆς αὐλῆς τὰς νόσους, id est, à mitigandis sedandisque morbis. Verum cū nomen istud non vni, sed pluribus postea accommodarint plantis, ut insigni quopiam odore, ita vi & figura

Lib. 2. 47.

Lib. 7. simpl.

non ita dissimili prædiris, ut Rutæ siluestri, auctoribus Diosc. & Galeno, tamen de Moly bulboso Diosc. hic agimus. Folia, inquit, graminei similia habet, latiora, humi spatia, flores Violæ albæ, lactei coloris, minores tamen, & cū Violæ purpureæ floribus comparandos: caulem album, quaternum cubitorum, in cuius summo inest quid

Lib. 3. ca. 4.

Allij speciei referēs. Radix est parua, bulbosa. De alio Plinius scripsit. Clarissima herbarum est, Homero teste, quam à Diis vocari putat Moly, & inuentionē eius Mercurio assignat, contraque summa veneficia demonstrat. Nasci eam hodie citra Pheneū, & in Cyllene Arcadiæ tradunt, specie illa Homerica, radice rotunda, nigraque magnitudine Cephæ, folio Scillæ: effodi autē difficulter. Græci auctores flores eius luteum pinxere, quum Homerus candidum scripserit. Inueni ē peritus herbarum Medicis, qui & in Italia nasci eam diceret: affertque & Campania vidi, aliquot diebus effossam inter difficultates saxæas, radicis triginta pedes longæ, ac ne sic quidē solidæ, sed abruptæ. Quæ magna ex parte ex Theophr. transcripsit, cuius verba hæc sunt.

Lib. 9. hist.
cap. 16.

Τὸ μῶλον πικρὸν παρὰ τοὺς ἑσπερίους (legendum ex Plinio παρὰ τοὺς ἑσπερίους) καὶ ἐν τῇ κυλλήνῃ. παρὰ δὲ τῆς ἑσπερίας καὶ ἡμῶν, ἐστὶν ὁμοίος τῇ σκίλλῃ (sic habent vulgata exēplaria: Gaza legit, καὶ ἐν τῇ κυλλήνῃ παρὰ τοὺς ἑσπερίους, καὶ ἡμῶν) τὴν μὲν ῥίζαν ἔχειν ὅμοιον τῇ σκίλλῃ, προσεμμενέας προειδὼν, τὸ δὲ φύλλον ἡμῶν σκίλλῃ. καὶ τὸ αὐτὸ πρὸς τὰ ἀλγεῖρα καὶ τὰς μαστίχας. ἡ μὲν οὖν ὁρμήσκειν γὰρ ἔχει χαλεπὸν, ὁμοίος τῇ σκίλλῃ. Id est, Gaza interprete, Moly apud Pheneū exit, atque apud Cyllenem esse (quemadmodum Homerus dixit) assermanter radice rotunda non dissimili Cephæ, folio Scillæ. Vsum eius contra veneficia summū, non tamē effodi difficulter, ut ait Homerus. Hæc Theophr. De Dioscoridis Moly primū dicemus. Id genuinū doctis Herbaris videtur esse, quod horti Patauii & Bononienses iamdiu, nunc etiā Belgæ colunt, cui bulbus exiguus, oblongus, ferrugine Porri, albicans, triticeis aut gramineis foliis: flos in cauliculis cubiti altis, lacteus, Ornithogali aut Allij vrsini æmulus: semen in siliqua. Istud Moly Dioscoridis faciūt.

M O L Y, Matth.

Forma.



Matth. Patauius misit a Cortuso pictum dedit. Idē prorsus esse opinor quod Clusius vidit Gadibus extra mœnia, Februarii initio florēs, & ita describit. Habet hæc planta bina aut terna folia graminea, exteriore parte aliquantulum lanuginosa, mollia, & ad terrā inflexa, inter quæ caulis exilit dodrantalis latus, rotundus, vacuus, in

cuius

MOLY folio Narcissi, Lobelij.



cuius cacumine ex membranula quadam emergunt multi flosculi exigui, candidi, sex foliolis constantes: radix bulbosa, alij aut auellanae magnitudine, nigricantibus membranis inuoluta, intus candida, succulenta, calidiuscula, & subingrato odore. Clusio plurimū ad Dioscoridis Moly accedere videtur, praesertim si pro *τροχίλον τερασπιν*, legatur *Λακκίδιον τερασπιν*, id est, quaternū digitorum. Illi assentiuntur Lobellius & Pena. Idem Lobellius perelegans aliud Moly serpentinum exhibuit. Dioscoridis Moly ortu persimile, folio ad terram item reflexo, odore & bulbo, sed flos candore rubens, cui subiacent bulbuli nitidi, Indici Moly ritu. Radix cepaeo quodam inuolucro obtegitur: caulis pedalis & sesquipedalis. Belgis hortense est. Addit aliud folio Narcissi, proceritate & caule non absimile, sed floribus caruleis, & foliis compressis Narcissi similibus, & ferè paribus, oblongis, & albis radicis bulbis portaceis simul implexis & cohaerentibus magno capitulorum stipatu, Alium odore praferentibus. Ab his differt Moly, quod ex Homero Theophrastus & Plin. descriperunt iis verbis quæ su-

prà memorauimus. Est enim horum Moly foliis Scillæ, tribus aut quatuor, longioribus: caule cubitali, crasso, concauo, rotundo, foliorum experte, multos flores candidos, stellatos in cacumine summo ferente, oblongis pediculis inhaerentes: semine in capitulis triagulis nigro, Ceparum ferè similis: radix crassa, alba, nigra membrana tecta. Iuxta caulem inter folia plerumq; exit alius cauliculus planus & folia-

MOLY serpentinum, Lob.



MOLY Liliflorum, Lob.



MOLY, Theophrasti & Plinij.*MOLY* *Indicum*, Dodonæi.

ceus seu vetius folium, quod in summo veluti Allij nucleum gerit, initio candicantem, deinde pallescentem, qui terra exceptus germinat, & plantam eiusdem profert. Moly Liliflorum vocat Lobellius. Alter in hortis, & Maio mense floret. Ita descripsit Clusius. In lib. Purgantium Dodonæus pinxit & descripsit. Præterea aliud Moly Indicum cognominatum, quod alij barbaro nomine *Caucasum*, quod ex India primum in Hispanias delatum est. Superiorem, inquit Clusius, cum

PSEUDOMOLY,

Dodonæi.



Lib. 4. c. 70.

Lib. Quæ
flore plac.

Ibidem.

foliis tum reliqua forma simile est, sed nunquam florens, & cui floris loco in extremo caule (qui pedalis est, & planus ferè, nec attolli sine adminiculis potest) conglomeratum caput est, multisque veluti Allij spicis mespili vulgaris magnitudine constans, primum viridibus, deinde flavescentibus aut pallescentibus, quæ etiam sine terra repositæ germinant: terræ autem commissæ in maiores bulbos adolescent, foliaque & caules proferunt: radix ut alterius cepacea, rotunda, alba, & tunicis amicta, quæ vetustate separatur, & in alios bulbos multiplicatur. Dodonæus in Historia stirp. Plinij Moly aliud, quod peritis aliis Herbatibus neq; Diosco. neq; Plinij Moly esse videtur, sed potius Phalangium, ut suo loco diximus. Idem Dodonæus Pseudomoly facit graminis genus quoddam in maritimis proveniens, valde tenerum, paruum, foliis pusillis, angustis, brevibus, magna ex parte super humum iacentibus: cauliculis teneriusculis, brevibus, gracilibus, in summo flores in muscariis candidos

Lib. 4. c. 47.

aut purpureos edentibus: radices teneræ sunt, & molles & longæ. Dioscorides tradit Moly radicem habere ad aperiendo, & maxime utilem, tritam cum irino vnguento, & in pectore adhibitam. Hoc Moly Dioscoridis à Galeno vocatur

dici

dici demonstrant ea quæ Galenus ei attribuit, citato etiam ipso Dioscoride. Sic enim Galenus. Myles radix paruo Bulbo similis est, facultatis constringendi siue Lib. 7. lib. contrahendi. Quare ipsam cum lolij farina admodum mederi vuluæ apertè scribit Dioscorides. At in nostris vulgatis Dioscoridis exemplaribus legimus, *μυζή* *ἰόνον* *μάρου*, non *μυζή* *ἀνώνυμου*. Cum vero scribatur Dioscorides, hanc radicem esse σφιδρα ἀγνήτην *περὶς* *ὑπὲρ* *ἡσυχίας* *ἀνισχυόμενης*, id est, summo opere prodesse, non ad aperiendos vteros, videlicet conclusos, vi perperam quis accipere possit, sed aduersus vteros apertos, vt videlicet constringantur atque concludantur, (est enim συνσπικτὸν *μυζή* *ἀνισχυόμενης*, vt Galenus clarè dixit,) sitq; loliacea farina ad id idonea, ordine tercio calefaciens ac siccans, ineptum verò vnguentum irinum molliens vteri conclusionibus, & hæmorrhoidibus aperiendis vtile, perspicuum est ex Galeno reponendum in Dioscoride, *μυζή* *ἀνώνυμου*, pro *μυζή* *ἰόνον* *μάρου*: ad stipulante etiam veteris codicis lectione, vt annotauit Andreas Lacuna.

A P I O S.

CAP. XXXIII.



R A R C I S ἀπίος & ἰχάς, & ῥάφανος ἀγρία, Latinis Apios similiter dicitur, Nomina & lîchas, & Raphanus siluestris, Cretensibus hodie Pyraria, Theodorus Caricam siue Pyrum vertit. Apion dixerunt Græci, quod radicis extremum in pyri figurâ rurbinetur. Eadem ratione lîchas, id est, Lib. 4. cap. 1. ficus, scilicet à radicis effigie, cuius hæc est ex Dioscoride delineatio. Forma Ramulos duos aut tres, iuncea, tenues, rubeniesque profert, qui supra terram parum se extollunt: folia Rutæ similia, longiora tamen & virentia, semen exiguum, radicem Asphodelo similem, & ad pyri figuram accedentē, rotundiorē tamen, & liquore plenam, intus candidam, foris nigro cortice contextam. Plinius iisdem penè Lib. 16. c. 8.

A P I O S, Matthioli.



verbis descripsit. Apios, lîchas, siue Raphanus agria iuncos duos siue tres spargit in terra rubentes, foliis Rutæ: radix Cephæ, sed amplior. Quare quidam Raphanum siluestrem vocant. Intus habet mammā candidam, extrā cortices nigros. Nascitur in moistis asperis, aliquando in herbidis. Effoditur Vere. Theophrastus δὲ λέγει ὅτι ἀπίος φύλλον μὲν ἔχει σπυρανώδες, βραχὺ, Lib. 9. hist. cap. 20. χαλκῶδες δὲ ἐπιγεγνῆς, τρεῖς δὲ τέτταρας, ῥιζὰς ὅδε ἀσφιδέου, πλὴν λευκώδην, φιλέει δὲ ὀρεῖνὰ χυμὸς καὶ καχλαωδὴν. τὸ δὲ λεῖται δὲ τῷ ὕδατι. Id est, Apios folium habet rutaceum, breue: caules per humum stratos tres aut quatuor: radicem veluti Asphodeli, verum squamofam. Locis gaudet montosis & lapidosis. Legitur Vere. Apios vera ex Creta aduecta ex Matthiolo hic depingitur, foliis exiguis, Rutæ vel Hyperico proximis, primo statim Vere ab radice exeuntibus, nigrioribus tamen, alba quadā linea in longitudinem procurrente: cauliculis iuncea, subrubentibus, lacteo succo madentibus: radice foris nigra, intus candida, pyri effigie: vnde & nomē. Cuius radicis mirabiles sunt vires. Nam eius superior pars Lib. 4. cap. 1.

sumpta, inquit Dioscorides, vomitione bilem pituitamque extrahit, inferior per aluum. Tota verò vtrinque purgationes mouet. Succus eius selsiquiboli pondere haustus, vtræque parte, hoc est supra & infra purgat. Cum verò liquorem colligere volueris, tundito radices, coniectaq; in craterem aqua plenum agitato, tum pen-
na collectum qui supernatabit liquorem siccato. De eiusdem radicis vſu hæc Plinius.

Lib. 6. 42.

L. 6. 9. biff.
cap. 10.

nus. Rad. x tusa in fictili mergitur, deiectione quod supernatat, reliquus succus purgat utraque parte, selquiobolo in aqua multa. Sic & hydropicis datur acerbuli mensura. Inspargitur & aridæ radice farina porionum: iunguntque superioriẽ partem eius vomitione biles extrahere, inferiorem per aluum. In quibus Plinius non nisi in sicci collectione à Dioscoride dissentit. Theophrastus quoque de eadem radice hæc tradit. τὸ αἶμα ὃ ἐκ τῆς ἀπὸ τῶν ἀνὰ τὰ μέρη χεῖρα καὶ τοῦ ποτῆρος ἀναστάντος, τὸ δὲ τῆς αὐτῆς ῥίζης τὰ ἀπὸ τοῦ αἵματος, τὰ δὲ τῶν χεῖρας καὶ τοῦ ποτῆρος ἀναστάντος, τὸ δὲ τῆς αὐτῆς ῥίζης τὰ ἀπὸ τοῦ αἵματος, τὰ δὲ τῶν χεῖρας καὶ τοῦ ποτῆρος ἀναστάντος. Id est, Non omnes eiusdem herbæ partes ad idem viles esse inanimè absurdum fuerit. Sed radice partem unam

A P I O S, Fuchsj.

Cap. 46. hii.
Lib. 4. c. 34.

per superiora, alteram per inferiora purgare admirabilis, ut Thapfiz & Ischados, quam Apion vocant, & Libanotidis. Ab hac legitima Apio & facie & viribus longissimè abest ea quam Fuchsius Apion fecit. Dodonæus χαυμοβάλανον vocat, id est, Glandem terrestrem, Germani Erdnuss, Erdfighen. Cauliculos tres quatuorve profert, seu turculos teneros, paulum a terra rubescentes, cum capreolis, quibus virinis sepibus, atque omnibus quæ nasci possunt se alligat: folia parua, angusta, flores venustos, rubore tinctos odore non ingrato: siliquæ exiguas semen exiguum cõcludentes. Radices longæ sunt, graciles, à quibus pendent bulbi parui napis exiguis similes, glandium ferè figura, foris nigricantes, intus albæ, gustu ferè castaneæ. Prouenit copiosa in Hollandia, in frumentis agris, hordeaceis porillimum, & in sepiis. Sunt docti qui Astragalum esse arbitrantur. Matthiolus Pseudoapion vocat. Caule est multiplici, inquit, cubitali, quandoque maiore, humi procumbente. Vicæ ferè modo foliis oblongis & subasperis: floribus puniceæ coloris, Pili

ænullis, odoratis, racematim coherentibus, quibus flaccesceribus siliquæ ovauntur, in quibus est semē. Radices habet Fici aur Pyri figura, ternas aut quaternas è tribus pendentes, nigra exteriore cute, alba interiore pulpa nulla purgatoria vi prædita. Floret iunio mense. Passim nascitur in Boëmia præsertim in vineis.

A R V M. CAP. XXIIII.

Nomina



P O N Græcis, Arum Latinis, Syris Lufha dicitur, Arabibus & Officinis Iarrus & Sara. Quidam, quod folium vestigij bubuli effigiem præbear, Pedem vituli appellant, Barbari Aron & Barham aron, Draconteam minorem & Serpentariam minorem, quod Dracunculum æmuletur sola magnitudine discrepans. Vulgus, quod pistillum promit exerti ferè generalis effigie, Sacerdotis penem nominat, Germani Pfaffen pen, Itali Ara & Gigaro, Galli Pied de Veau, & Pied de prestre Arum, ut describit Dioscorides, folia emittit Dracunculo similia, sed longiora, & minùs maculata: caulem dodrãtalem, purpascetem, pistilli figura, à quo Croci colore fructus exit. Radix illi candida, Dracunculo similis. Plinius Arum cum Dracunculo cõfundit de Bulbis agens. Est inter genera bulborum & quod in Aegypto Aron vocant, Scillæ proximum amplitudine

L. 1. c. 153.
Forma.

phlegmaticum Lapathi: caule recto, diuū cubitorum, baculi crassitudine radice
medicinis vixit, quæ edatur & cruda. Quibus setè verbis Dracontium descripsit
Quintus Arum in silvis, locis vrbrosis, humidis & frigidis nascitur. *Locus.*
officinis nō tam est, & quæ geminum. Etenim folia promè hederacea, cor-
dis hederacea, Dracontuli longiora, minime dissecta, paucioribus & albis resper-
sa maculis: caulem dodrantalem, album, in pur-
 pureum leuiter tendente, & cuius fastigio eru-
 pit inuolucrum, quod mucronata in turrim
 vaginula pistillum comploditur, & suo fouet si-
 nu. Verum vbi finctu pragnans satiscit in huius,
 solida pistilli facies dilutiore purpura rutilans
 emergit, & antractu penitus tandem patente,
 primum viridia, dein crocea spectantur semina,
 quæ in coronæ modò concinne cõtecta imam
 eius partem ambiunt. Radicem habet albam,
 bulbosam, oblongam, permultis stipatam fi-
 bris, Ellebori sere modo, gustu perquam acti.
 Matthiolus scripsit, in Bœrmiz montibus qui-
 busdam copiosum admodum cõuenire, sed Ita-
 lico longe minus, folisque tenuioribus, & mi-
 nori quoque radice. Quare hoc Arum minus
 vocat. Alteram Ari speciem ex Baldo monde à
 Francisco Calzolario ad Matthiolum missam
 hic etiam expressimus, cui folia sunt sagitta spe-
 ciem referentia, caulis valde perspicuus, ruben-
 tium baccarum botrum in cacumine habens
 confertum, & in acutum desinentem. Radici-
 bus nititur numerosis, tenuibus, circumquaque
 sese diffundentibus, è quibus bulbosi quidam
 globuli fabarum magnitudine dependent, alba
 intus pulpa, gustus acerrimi. Idem Matthiolus
 alio in loco aliud Arum, nimirum Aegyptium,
 depinxit, & cum opinor, secutus Dodonæus,
 Exit, inquit, & in Aegypto Arum, sed ab Euro-
 pæo diuersum, maius videlicet & latioribus fo-
 liis, quod plerique perperam Colocasiam ap-
 pellant. Quos secutus est Clusius, vt ostendi-
 mus in Agro cap. de faba Aegyptia. In eadem
 est sententia Anguillata. Matthioli & Dodonæi
 sententiam Myconus approbat, non solum eam
 ex simili plantæ illius cum Aro sapore confir-
 mans, sed multò certiore argumento, quod scilicet
 vaginam emittat Aro similè, petiolo crasso
 fultam, ex profundo & medio plantæ sinu or-
 tum ducente. Primum intra vaginam, deinde
 extrà flores visuntur, postea semen racematim
 coharens adnato illi longo ex vagina enato so-
 lia & radix eadem quæ Matthiolus icone repræ-
 sentauit, vt in hac nihil præterea spectare possis
 quàm vaginam, flores, & semè racemosum. Flo-
 rentem

ARVUM, Matthioli.



ARVUM aliud minus, Matthioli.



In ca. 162.
lib. 1.

In cap. 99.
lib. 1.

Lib. purg.
cap. 5.

Lib. 1. Hist.
Hisp. 19.

Lib. 1. c. 162.

AR¹ M¹ *Acryptum cum
flore, Myconi.*

Li. 1. 666.

Vires &
Temper.

Li. 2. 666.



rentem hanc plantam se vidisse ait Myconius
Barcinone in horto Petri Gualtheri & compari-
macopei Barcinonensis. Radix Arisarum
inquit Diofcorides, ut quæ nobis acris in sa-
lia sale coadunatur ad esum, & arida per se
cocta mûdum. Radix, semen, & folia eadem
cum Dracunculo vires habent. Radix priuatim
cû fimo bubulo illita podagriei prodit, Dra-
cunculi more reponitur. In totum ob mûdum
eius acrimoniam edendû est. Arum mûdum
dubis extulere Græci, ut fari in Plinius, *arum*
in cibis feminam præferentes, quoniam
durior esset, & in coquendo lenior. Per
vitia purgare, & aridum in porione mûdum
aut ecligmate urinam & menses eiere. Scilicet
oxymelite potum stomacho, interan-
exulceratis ex lacte ouillo bibendum ad
in cinere coctum ex oleo dâly. Alii eum
in lacte, ut decoctum obbere ut. Epiphora
xum impositum: itam sagittatum, tunc
oleo hæmorrhoidum vitio insidere, lac
ex melle illinentes. Laudant Cleopatra
pro antidoto contra venena: pleuritici
pneumonicis, quo tussientibus modo: semen interitum cum oleo aut rosaceo
fundens aurium dolori. Dieuches tussientibus aut suspensoriis, & orthopneis &
purulenta excreantibus farina permixtum in pane cocto dedit. Diodorus
licis è melle ecligmate, & pulmonis vitio: obitus etiam fractis imposit. *Arum*
omnium animalium extrahit naturæ circumlitum. Succus radicis cum melle
tuo, oculorum caligines, ac stomachi vitia discutit, tussim decocti vis cum
Vlcera omnium generum, siue phagedæna sint, siue carcinomata, siue serpen-
ue polypi in naribus, succus mirè sanat: folia ambustis profunt ex vino & o-
cta. Alium inaniant ex sale & aceto pota. Etiam luxatis cocta cum melle profunt.
item articulis podagrieis cum sale, recentia vel sicca. Hippocrates qualibet
collectiones cum sale imposit. Ad menses trahendos seminis vel radicis dra-
mæ duæ in vini cyathis duobus sufficiunt. Eadem potio, si a partu non pur-
& secundas trahit. Hippocrates & radicem ipsam apposuit. Dicitur & in pe-
tia salutarem esse in cibis. Ebrietatem discutit. Serpentes nidore cui a-
priuatim; aspidem fugat, ut inebriat, ita ut torpentes inueniantur. Perundos quo-
que Aro & lacteo oleo trahunt. Ideo & contra ictus dari potu in vino nigro po-
tant utile. In solis Arisarum optimè seruari traditur. De eodem hæc statuit Gale-
nus. Manditur Arisarum eodem modo quo Rapis. In quibusdam autem regionibus
acris quodammodo præuenit, ut prope ad Dracontij radicem accedat. *Arum*
dum ipsam coquis, priore aqua effusa, in aliam calidam conuenit conuenit.
Ad C. tenen panta hæc a nobis est diuersa. Nam in illis locis Arum mûdum
est medicamentosum & acre, ut Rapis etiam sit vitius. Perspicuum autem est, quod
talis in cibo quidem est præstantior. Si quis tamen humores crassos vel lentos in
thorace vel pulmonibus collectos tussi velit eicere, acrior ac medicamentosa
magis est præferenda. Non obscurum etiam est, quod succus qui ex ipsa in hep-
& totum corpus distribuitur, ex quo animalia aluntur, crassior quodammodo est,
quemadmodum de Rapis dictum est: potissimum quum radices ipsæ qualitate medi-
dicamen-

Li. 2. Alam.

dicamentosa fuerint expertes, cuiusmodi sunt, quæ Cyrene adferuntur. Quandoquidem apud nos in Asia Arum magna ex parte est acrius, facultatemque habet iam medicamentosam. Et alio in loco. Arum terrena essentia constat, sed calida. Quare extergendi vim habet, verum non valentem, sicut Dracontium. Est itaque in exsiccano & excalfaciendo primi ordinis. Radices eius maximè sunt vitales: siquidem comestæ crassitiem humorum mediocriter incidunt, adeò vt & excretionibus ex peccatore vitales sint. Vbi Galenus de Aro quod non vehementi acrimonia pollet, locutus est. Est enim haud dubiè quod in tertio ordine calidum & siccum est, ob multam qua præditum est acrimoniam.

ARISARVM.

CAP. XXV.



ΠΙΣΑΠΟΝ & *Arē* Græcè, Arisarum Latinis & Aris Plinio. Apud Hippocratem *Arē* non pro herba, sed pro instrumento chirurgico legitur. Galenus autem in Glossis Hippo. ait. *Αρις ὡς μόνον τὸ ὄργανον, ἀλλὰ καὶ βοτάνη τις ὅπως ὀνομάζεται.* Aris non solum instrumentum, sed herbam significat. Arisarum tradit Dioscorid. paruum esse herbulam, quæ radicem habet oleæ magnitudine, maioris quàm Arum acrimonix. Eius post Arum & Dracunculum meminit Plinius his verbis. Est & Aris quæ eadem in Aegypto nascitur, similis Aro, minor tantum, minoribusque foliis, & vtique radice, quæ tamen oliuæ grandis magnitudinem implet: alba geminum caulem, altera vnum tantum emittens. Hæc Plinius. Huius plantæ genera duo Herbarij ostendunt. Matthiolus prius, cui folia sunt Aro similia, à Luca Ghinose accepisse ait, alterum ab Anguillara, quod non approbat, neque verum putat. Toridem statuit Clusius, prius latifolium, alterum angustifolium. Latifolium Hederæ aut Smilacis fere folia habet tria aut quatuor, satis carnosâ, mollia, viridia, & acria, oblongo sulcata pediculo, qua illi adherent vtrinque pinnata, vti Ari folia, sed obtusioribus multo

Nomina
Lib. de Aro.

Lib. 1. c. 16.
Forma.

Li. 14. c. 16.

In cap. 16.
lib. 1.

ARISARVM prius,
Matthioli.

ARISARVM alterum,
Matthioli.



DRACONTIVM. CAP. XXVI.



RACIES *Δρακόντιον*, & *Δρακονίτις*, Dracunculus Latinis, *Serpentaria*, *Nomina*
& *Colubrina*, Arabibus *Luf*, *Alluf*, Italis *Dragontra*, Gallis *Serpentaire* &
Serpentine, Germanis *Schlangenkraut*. Nomen autem a figura sumptum:
caulis enim glaber purpureisque resperſus maculis, verſicolori facie

corpus angustum repræſentat æquali longitudine. Vertex quoque ſimul oris
hiatu linguam exerens cruentam, caput exprimit. In antiquiſſimis Græcis Dioſco-
ridis codicibus teſte Marcel. Vergilio duo de Dracunculo capita leguntur, vnum
de maiore, alterum de minore. At neque Galenus, neque poſt Galenum Paulus
Aegineta diligentiffimus in Græcis medicinarum auctor, & qui Dioſcoridis dicta
vbique bona fide retulit, Dracunculum priorem nouerunt, neque poſt Græcos
Latini ſcriptores, Apuleius, Serapio, & quod multi apud omnes momenti eſſe de-
bet, in vetuſtiſſimis Latinis codicibus, vnicum eſt duntaxat Dracunculi caput, al-
terius veſtigium nullum. Præterea de vtroque eadem ſere traduntur, ſed diuerſis
verbiſ, vt ex alio auctore id caput adſcriptum fuiſſe videatur. Quare viti docti
ſupplementum eſſe illud cenſuerunt, quod *Δρακονίτις μεγάλην* deſcribit: ideoque
ipſam hoc loco exemerunt, & inter notha retulerunt. Plinius tamen, qui Arum
cum Dracontio confundit, plura eius genera facit his verbis. *Quæ* & Aron ma-
gnæ cum Dracontio litis. Quidam enim eandem eſſe dixerunt, Glancias ſatu diſ-
creuit, Dracontium ſilueſtrem Arum pronuntiando. Aliqui radicem Arum ap-
pellauerunt, caulem verò Dracontium, in totum alium ſi modò hic eſt, qui apud
nos Dracunculus vocatur. Namque Aros radicem nigram, in latitudinem rotun-
dam habet, multoque maiorem, & qua manus impleatur: Dracunculus ſubru-
tilis, & draconis conuoluti modo, vnde ei nomen. *Quin* & ipſi Græci immen-
ſam poſuere differentiam, ſemen Dracunculi ſeruens mordaxque tradendo: tan-
tum p. taſſe ei virus, vt oſſectum gravidis abortum inferat. Idem paulò inferius.
Dracunculus, quem dixi, Hordeo matureſcente effoditur Luna creſcente. Omnino
habentem ſerpentes fugiunt. Ideò percufſis prodeſſe in potu aiunt maiorem, vt
& menſes, ſi ſeſtro non attingatur, ſiſtat. Succus eius & aurium dolori prodeſt. Id
autem, quod Græci Dracontium vocant, triplici effigie demonſtratum mihi eſt,
ſolus Betæ non ſine ihyſo, flore purpureo. Hoc eſt, ſimile Aro. Alij radice longa,
veluti ſignata, articuloſaque monſtrauere tribus omnino cauliculis, folia eius ex
aceto decoqui contra ſerpentium ictus iubentes. Terria demonſtratio fuit, folio
maiore quàm Cornus, radice arundinea, totidem, vt affirmant, geniculata nodis,
quot haberet annos, totidémque eſſe folia. Hi ea ex vino vel aqua contra ſerpentes
dabant. Theophraſtus quoque quoddam Ari genus Dracontium appellari ſcribit
his verbis: *ἡ δὲ τῆς Δρακονίτις (χαλῶσε γὰρ τὴν Δρακονίτιν, ὅτι οὐδὲ τὸν χαλῶν ἔχει τὸν ἀ-
ποκρίναν) ἀβρωῖος καὶ παριουανδρίας*. Eſt Dracontij radix (vocat enim quoddam Ari
genus Dracontium, quòd caulem habeat variegatum) ad eſum inepta & medica-
mentaria. De Dracunculo Dioſcoridis ab Aro diuerſo hic agimus, quem ſcribit
folia habere Hederæ ſimilia, magna, albis maculis notata, caulem rectum bicubi-
talem, varium, anguis ſpecie, purpureis notis aſperſum, baculi craſſitudine fructus
eſt in ſummo racemofus, colore primùm herbaceo, & cum maturuit croceo, gu-
ſtus mordax. Radix quidammodo rotunda eſt Bulbi ſpecie, Aro ſimilis, corticem
habēs tenuem. Naſcitur locis vmbroſis circa ſepes. Hic Dioſcoridis Dracunculus
doctis Herbariis, vt Fuchſio, Dodonæo, Penæ, *Serpentaria* eſt maior vulgo dicta,
ſoliſ hederaceis, maculas albas habentibus: caule recto, glabro, laxi, extima cu-
te ſerpentis exuvium maculis albis, fufcis, vipereis, pullis, puniceis, giluiſque, tranſ-
uerſis, obliquis & ſortuitis adeò exprimente, vt emiaſ repente intuenti horro-

Genera.

Li. 14. c. 16.

Lib. 7. hiſt.
cap. 20.

Lib. 1. c. 16.

Forma.

Locus.

Cap. 16. hi.

Lib. 1. c. 6.

Penæ 10

Adueſt.

DRACUNCVLVS *sive* *Serpentaria maior*, Dodon.*SERPENTARIA minor*, *Minor*.

pentariæ, e radice broſa, geniculata, latiùs ſerpente, & multis fibris humi depac-
nullo bulbo appenſo aut anneo, vrente guſtu & cruſta excitante. Iuxta *Plin.*
& labentes aquas frigidarum & alidarum regionum, vt in Belgio, Norðmannia,
Apulia, Hiſpania Granata ſponte emergit. Inde in hortos ſuos alij tranſlati.

rem incutiat, ſeſquicubitali, bicubitali, tri-
ius ſum ſi ex vapoſa emicat coſta, ſua ex-
num racemata, plane Ari, cui radix etiam in
ſimilis, rotunda, maior, ſeſque in lora pro-
gens. Qui hanc Draconium Dioſcoridi per-
negant, folia hederacea obſciunt, quod non
huiusmodi. At illi, inquit Pena, actius aguar,
nempe monent propter confectionem & ar-
dam ſimilitudinẽ folia Dracontij dici hunc
hederacea, cum potius folia Ari hederacea do-
buerint dici, quia huius poſtea conſtruntur
folijs Dracontij & radice. Vbi Dioſcorides
vniuerſum habitum plantæ reſpectu, huius
leuorem, viorem, & ſorem in idem per-
cui contulit, quia eſſent per quam afflicta
ta, vt vides in collatione radicum: vbi ſe-
numeri nulla expreſſione maioris aut minoris
Dracontij bis repetit collationem. Nec vni-
ſo tractu Græciæ ab in qua cum huius
dem Pena teſte, vlla alia viciſſim viſa Ser-
pentaria quam illa, quæ etiam non proci-
Monſpelij inter ſegetes, Gladioli & Hy-
thos læta exit, alibique in pinguibus ar-
diuerſa, niſi ætate, quando deciuſus ſemi-
& ſummitatibus effractis a præteruentibus
quenter repullulant nouellæ. Quæ porro
Pamio perſuadere, vt plures cõſtiterunt
Dracunculi, miſceretq; Ari, Ariſtæ
differentias, vt in Bechio, aliſq; locis ſita
git. Nec alterius plantæ videtur gemina
ſcriptio apud Dioſcoridem, ſed ab alio quod
paulum diuerſe, vt ſere fit, deſcripta. Tandem
Serpentarij Matthiolus Dracunculum mi-
nem facit, maiorem longè aliam, cuius radi-
Rapi ethigie, quam tamẽ non deſcribit, &
que ſe Tridenti ac Venetijs viduſe alio-
Vbi ſepius ſe fruſtra ſciſcitatum fuiſſe ait Pena:
negauerunt enim Patauini, Veneti, Veton
pharmacopœi, & doctiſſimi cõplures vſq;
ſibi viſam: negauerunt item Cortuſus &
guillara Penz anxie ſciſcitari. Adiecerunt Ho-
barij Dracunculum paluſtreni, quem Aruſti
luſtre vocat alij, Gallicè *Serpẽtaire d'eau*, vel *agua-
tignu*, q folia promit hederacea, maiora, ſuper-
nẽ acuta è caule rotundo, humili, vix palmar-
florem rubellum, odorum, non abſimilem Ser-
pentariæ, e radice broſa, geniculata, latiùs ſerpente, & multis fibris humi depac-
nullo bulbo appenſo aut anneo, vrente guſtu & cruſta excitante. Iuxta *Plin.*
& labentes aquas frigidarum & alidarum regionum, vt in Belgio, Norðmannia,
Apulia, Hiſpania Granata ſponte emergit. Inde in hortos ſuos alij tranſlati.

Serpenta

SERPENTARIA maior,
Mattholi.

DRACUNCVLVS palustris.



omnino acerum folia, ut pote similem facultatē habētia, vlcēribus, vulneribusq; re-
 cēdē mīlētis accōmoda sūt, & quanto minū fuerint sicca, tātō magis cōglutināt.
 Nō quā sicciōra sūt, viribus sūt acrioribus, quā ut vulneribus cōueniant. Cre-
 ditū quoq; est casēū humidū, si illis foris tectus reponatur, ob rēperaturq; illorū sic-
 citatē, à putredine cōseruari. Fructus valētior est nō foliis tantū, sed & radice. Itaq;
 & cācros & polypos eliquare creditus est. Suce^o quoq; eius vitia oculorū expurgat.

Serpent. nō succo, quā e Dracunculo, ex fū-
 ne exprellus & castoreo in aqua mīlētis, eius
 dolorem sedat. Lana exceptus & naribus indi-
 tus polypum conficit. Illius carcinomata co-
 pēscit. Triginta eius grana cum pōca pota abor-
 tum faciunt. Odore nō, postquam flores ab arcue-
 runt, recens conceptos fetus enecant. At
 radix calfaciendi vīnū habet: oris opīsticis, ru-
 pris, vūlis, tūssis catharro auxiliatur. Hūiores
 pētoris excreat: faciles reddit min cocta, tum
 allata, cū melle & per se ipsā in cibo accepta.
 Eadem arida trita cum nielle delingit. Vīna
 ciet, & venerē stimulat cum vīno pota. Vlcera
 maligna & phagedētica addita vīno alba,
 cum nielle trita repurgat, & ad cicatricem per-
 ducit. Collyria item ex ipsa hunt ad fistulas &
 fetus extrahendos. Eū, qui radice manus suas
 conficauerit, à viperis ferri negant. Expurgat
 vitilignes cum aceto illita. Folia trita lina-
 mento um vice recentibus vulneribus indun-
 tur. Eadem in vīno cocta & in posita ad pernio-
 nes faciunt. Et caseus foliis in oleo a putrefa-
 ctione tutus inanet. Hoc foliis Ari Plinius ad-
 fectū sit, ut supra diximus.) Succus autem radice
 ad nubeculas, albugines & caligines conuenit.
 Radix ad sanorum vīus oleris vice est, cruda co-
 ctave editur. Dracunculi radicem bis ter ve eli-
 xantes, quoad medicamentū omne deponat,
 nonnunquam exhibemus mandendam, inquit
 Galenus, quēadmodū Ari: quando hūiores
 crassi & lenti, qui in thorace ac pulmonibus cō-
 tinētur, vi maiore indigent. Et alio in loco, Dra-
 cōnum, ait, quiddam Aro persimile habet tum
 foliis, tum radice. Ceterū illo tum acris est,
 tum amarius: quare calfactorium magis, tenu-
 ioribus partibus. Habet etiam leuiculam quan-
 dam adstrictionem, quā quandoquidem cum
 prædictis duabus qualitatibus, acris scilicet &
 amara coniuncta est, medicamentum factū est,
 ut quā maximē efficac. Nam radix viscera om-
 nia expurgat, crassos potissimū & lentos suc-
 cos extenuans: optimūq; remedium est cōtuma-
 cium vlcērum. Expurgat extergetq; strenuē tum
 alia, quā extersionem desiderant, tum vitiliginē

L. A. Alm.

Lib. 6. f. 10.

Nomen



ΥΚΑΛΜΙΝΟΣ vel *ὑψιλον* Græcis, Cyclaminus, Rapum, & Tuber, Umbilicūque terræ Latinis, Cyclamen Officinis mutata voce, Panis porcinus & terræ, atque Archanita a nostræ ætatis Herbaris dicitur, Mauritanis *Buchormarien* *Buthermarien*, seu *Bochormarie*, Italis *Cyclamino*, & *Pani porcino*, Gallis *Pani de pourreau*, Germanis *Erdauert*, & *Schwembru*. Cyclaminum Græci ἀπο τοῦ κύβητος, id est, ab orbe dixerant, tum ob folij circinatum ambitum, tum ob umbilicatum radicis bulbum. Ichthyotheron autem, quod ea pisces necantur. Romani Rapum terræ, quoniam eius radix in terra velut Rapum extuberat: quia sine ratione Tuber terræ, quod in molem quandam intumescit, aut Umbilicū terræ, quoniam, ut umbilicus circinata figura emergit, sic & Cyclaminus sua terra conficitur, utam appellarunt. Panem porcinum haud dubie panem vocatum subulci, qui pecori suo radicem huius gratam pabulis cognouerunt. Alij quia radicem in orbem circumactam sæpius intueretur, quæ non in globum intumescens, sed veluti compressa sese in latitudinem explicaret, quæ forma in quodamiano vñ panes viluntur, Terræ panem nominauerunt. Cyclamini species duas ponit Dioscorides. Cyclaminus prior folia habet Hederae similia, purpurea, varia, supra infraque albicantibus maculis: caulem longitudine quatuor digitorum nudum, in quo flores Rosarum effigie, purpurei: radicem nigram, Rapo similem, & aliquantum latam. Nascitur in vmbrosis, maxime sub arboribus. Cyclaminus posterior, quam Cissanthemon, alij Cissophyllū vocant, folia habet Hederae, sed non caules crassos, geniculatos, qui vicinis arboribus capreolorum modo se obducunt: flores albos, odoratos. Fructus est velut vix acini, similis, Hederae mollis, gustu uiter aeris & viscosus. Radix inutilis est. Nascitur in locis asperis. Duas etiam species describit Plinius, Dioscoridem fere exprimens his verbis. Folia habet minus quam Hedera, nigrioraque & tenuior, sine angulis, in quibus albicant maculae: caule exiguo, inani: floribus purpureis: radice lata, ut Rapū videri possit: cortice nigro. Nascitur in vmbrosis: nostris Tuber terræ vocatur. Et paulo post de altera sic. Est & altera Cyclaminus cognomine Cissanthemos, geniculatis caulibus, superuacuis, a priore distincta, circa arbores se voluens: acinis Hederae, sed mollioribus: flore cædido, specioso: radice superuacua. Mihi & tertia Cyclaminos demonstrata est, cognomine Chamæcissos, vno omnino genere radice ramosa, qua pisces necantur. Hæc Plinius. Prior Cyclaminus nora est Officinis & Herbariis sine cōtrouersia: altera non item. Martialis duas Cyclamini primi generis species Messue auctore reperiri dixit, minorem & maiorem. Minorem se vidisse ait in agro solum Tridactyno in vallis Ananiz montibus, vbi copiose nascitur. Sed eam neque depinxit, neque descripsit: dixit tantum radice esse parua, nucis autolanæ cicerumque magnitudine. Cyclaminus secundam fateretur se non vidisse. Tragus in Hæuetia, non procul a Curia oppido, nec non prope Velcurium, in planitie inter quædam deſi-

Genera.

Forma.

Locus.

Lib. 4. c. 9.

CYCLAMINVS vulgaris,
Lobellij.

Ibidem.



Lib. 4. c. 71.

CYCLAMINVS

prior, Matthioli.



ac vliginosi locis in arbuta, planta quandam
 nuda scripsit ele. aut. nam, foliis rotundis,
 prioris. et similem Afaro, ita vt prius quidem
 intuitu Afarum esse crederet. Sed cum eam co-
 dilet, radicem deprehendit totam dan, rufam,
 magnitudine radices C. oci, goli. et tantum in
 amnam: flores odoratos, Breui. colore
 tricti, odore & forma Volam Martiam pur-
 purea ref. en. ne ille Germani. Valde re-
 loan notum. Quam cum Ilermoda. non esse
 aliquando falso credidisset, postea Cyclaminum
 exigax vera species non iudicauit, quia Cyclo-
 mino prius per omnia responderet, nisi quod
 non peninde acis est & se. Nascitur etiam
 in vmbrosis sp. Dodonaeus Cyclaminum alte-
 ram esse asseruit, quae hodie *Vitalba*, Galis.
Fione nuncupatur, Cordu. Dulcamaram, ali-
 quos autem nigros alij Perichlymenum dixerunt,
 quia aliam magis placent. Pen. in montibus Alpi-
 num. Paetis in salum prodegerunt, locis
 vdis, & laxis arboribus obuiam palam esse al-
 teram Cyclaminum scribit, quae non est folio
 circinato Alfarum vulgari Cyclamini, sed po-

Trogloba
cap. 14.Lib. 1. cap.
11. & 13.

tius tripartiti matrone distinctio, herbae Tripartitis, vel Tripartitis modo. Lande
 etiam Narbonae rigis montibus & hortis crederet. Eius radices quae vetustiores,
 magnitudine alterius sunt, quae nouella, adeo exiguae, vt auellane magnitudinem
 vix sapient. Adulterioribus caulis est exilis, tenuis, & in humum pronus,
 ex quo per longis pediculis folia surrecta fastigium vtiunt, vbi sunt flores purpu-
 reos, vulgares Cyclamini prorsus similes. Nonnumquam & luteos verno tempore
 eadem modum folijs exortis meminit se vidisse. Florent enim Vete & Amiano
 interdum odorati, alibi non. Lobellius Cyclamini alterius, plantae hederaceae foli-
 is in talibus collibus reperta, rei herbarie ludiosae iconem hanc & descriptionem
 exhibet. Hederaceae est Hederaceae folijs sinuatis, paribus, in mollibus, flexilibus, cubito
 prolixioribus cauliculis, floribus oblongis, galericularis, ex purpura pallentibus.
 Dodonaeus tradit praeter Cyclaminum alterum Dioscoridis, eius qui orbiculari est
 radice, nempe primi, à recentioribus aliquot obseruatas fuisse species, & folijs qui-
 dem differentes. Prima folijs virescentibus, angulosis ac Hederaceae similibus, in ambitu
 leuiter ferratis, superiore parte in virore nigricantibus, albicantibus tamen macu-
 lis variegatis, & vmbilico suemedio folijs subalbido, inferiore vero ac prona pur-
 purea, aliquando saturato colore, alijs dilutiore. Flosculi ex tenellis pendent pe-
 dunculis, deorsum nutantes, foliolis earum sursum reflexis, & purpureo Violae nigrae
 coloris non tamen intenso splendentes, odoris exigui. Succedunt capitula semina
 flosculi pediculis in spicas contortis. Radix Bulbi aut Rapi modo in orbem circūacta,
 & aliquantulum in latitudinem pressa, foris nigra, intus candida, rugas in are-
 fectis, et alia. Hanc speciem praeiit etiam Lobellius nomine Cyclamini f. lio
 Hederaceae. Alterius Cyclamini & lata quidem sunt folia, sed non angulosa, verum
 quasi rotunda, nullis superius aut omnino obscurissimis apparentibus maculis,
 saturo colore virentia, inferius vero è punicante purpura rubentia: flores prioris
 similes, at odoratiore: radix aliquanto minor. Tertia species folijs est similiter
 haud angulosis, sed ambitu eorum aliquantum crenato: maculata haec sunt, sed

L. de pur-
ga. cap. 17.

CYCLAMINVS altera
hederaceus foliis, Lobell.CYCLAMINVS altera
orbicularis, Dodon.

L. C. C. 11, 12.

Vires &
Temper.

umbilico nigriore. Flos intensiore colore purpurascit, odoris suauissimi ita
quam aliarum minor. Hæc ex Dodonæo. Vires Cyclamini non vulgates has
cet Dioscorides. Radix Cyclamini cum hydromelite pota pituitam aquam
per inferna trahim: mens pota & apposita cit. Tradunt si prægnans mulier
cem transgrediatur, abortum fieri. Partum appensâ accelerat. Bibitur & in
côtra lethalia, præsertim leporem marinum. Illita contra serpentium ictu
dico est. Immista vino ebrietatem facit. Regium morbum silit tribus die
pota cum passio, aut diluta mulsâ. Sed oportet eum qui bibit cubiculo calid
clinare multis vestibus contextum, quo sudet. Eiectus verò sudor fellis esse
inuenitur. Succus eius ad purgandum caput naribus instillatur. Ad denci
etiam excrementa in lana subicitur. Umbilico, imò ventri, & coxæ illitus suc
alum mollit, (pro καλίας μελάς, vetus codex habet καλίας τὰ πέρσι, id est, alu
tribat. Quæ lectio videtur alteri præferenda, quia purgationes, quas molitur Cy
claminus potus admotusque, sunt admodum violentæ & difficiles) verum ab
efficit. Suffusis & hebetibus oculis inunctus cum melle succus prodest: medi
mentis abortum facientibus admiscetur. Sedem procidentem cum aceto in
compescit. Exprimitur succus rufa radice, & ad mellis crassitudinem decoquitur.
Radix autem extergit, exanthemata reprimat, vulneribus per se ex aceto, aut mel
le medetur. Illita lienem minuit, vitia cutis in facie à Sole, & alopecias emendat.
Decocto eius luxata, podagra & capitis vlcuscula (καυδία, id est, maniana vlcera
pernionis)que vtiliter fouentur. Ipsaque in vetere oleo feruescens, ad cicatricem
perducit quæ oleo illo inuncta fuerint. Cauata radix oleo repletur, & cinen
uenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenicæ ceræ modico, vt strigimen
firmitudine cõtrahat vnguentum, cum primis vtile pernionibus. Radix Scillæ modo can
ciliâ reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos cõfectam.
In veteri codice pro καυδία, id est, contusam, legitur καυδία, id est, contusam.

Cyclaminus

Cyclaminus de contraria diachny nomine pinguis & siccifragilis dicitur
bony...
Eius & ad cathartica...
Cyclaminus radice...
Solut ex aqua pota...
Eius radix de...
Tribus drachm...
Sudoris cum...
Cyclaminus hanc...
Vicia...
Lidem & contra...
Cyclaminus radicibus...
Cyclaminus prioris viribus...
φάλαγγιν, χειρὸς ὀστέον τὴν γὰρ οὕτως καλεῖται
καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καθάρσεως ἐστὶν ἰσχυρὸν φάρμακόν τι
χρησιμώτατον ἐκ τῆς αἵτης ἀγλῆς διὰ τὴν ἐξ αὐτῆς ἀναστρέφουσαν πύλην
ἐστὶν οὖν φάλαγγις ἑτέρα σφίγι καὶ τῇ σφίγι παρόμοια τῆς τρυφῆς ἢ
τοῦ ὑδατος ἐστὶν Cyclamini radix a l inflammationum exhalationes valet & ad
& subdita, & ad vlcera ex melle. Succus autem ad purgandum caput cum
melle intus, & ad ebrietatem, si vino inspersum potui dederit C. interi & radix
ad partus ebrietatem appensa, & ad amaritiam. Cum autem effoderint, vrinitate
de cum vino subegerint, in pastillis fortiant sicuti facis vinū, qua maculae ablu-
guntur Cyclaminus vterque, auctore Mesue, est medicamentarius, calidus siccus...
ho tres gradus. Galenus gradus non sunt, sed abstergit, inquit, melidit, ora venarū
aperta, & salubrit, digerit, quod ex particularibus operibus eius perspicuum est. Nā
hic virescens ha moribundas teferat, violentēque ad fecessum prouocat in floccis
apertis. Sic etiam medicamentis phymata, strumas, aliaque durities digenti-
bis committitur, ac subtilis cum melle illius competit: adhuc per nases quoque
e purgat Adeo vehemens eius facultas est, vt abdomine illito ventrem si bdu-
cat, & trinit intericiat Nam & alioqui validum interimendo factui medicamen-
est in p. illo additus. Tota autem radix succo imbecillior est, quanquam & ipsa ve-
liciens sitnam & menses siue pota, siue apposita enocat, & aurigini prodest, non
modo ipsum viticus expurgans, sed etiam quae in toto corpore bilis fuerit, eam per
sudorem euicis. Prouide post potionem, sudoris adiuvanda prouocatio est Mo-
dus eius bibendi est diachmarum trium, siue cum melicerato, siue cum passo. Cu-
tis detergit cum in aliis, tum quòd alopecias, epheidas, omniaque exanthema-
ta curet, lienem quoque induratum iuuat emplastri modo illita tum rece-s, tum
enda. Sunt qui radicem siccam asthmaticis exhibeant. Porro altera Cyclaminus
radicem quidem superuacaneam habet, sed fructum admodum efficacem: nam
hic cum vino pluribus diebus potus lienes sanat, vrinam mouens, ac vētem sub-
ducens: locos quoque eiicit, & asthmaticis prodest. Qualitas eius gustanti acris est
& sublentia. Hæc Galenus. Cyclamini alterius vires, inquit Pena, communī pri-
orū, & vsus frequens Narbonen sibus ad Hispānicam lucem.

 $L_{\infty}(\mathbb{R})$

LEON

Nomina

Lij. ca. 49.

Forma

Locus.

Lij. ca. 49.

Vires

Temper.

Ibidem.

Lib. 7. sim.



pota auxiliatur demorsis a serpentibus, breui dolorem omnem sedans. *Autem* etiam infusus per clysterem in coxendicum affectione. Sic & Plinius. Radix ad-
satur omnium serpentium generibus ex vino pota: nec alia res celerius pro-
datur & ischiadicis. Leontopetali radice maximè vitumur, inquit Galen. *Quod*
facultatem, exliccandi, exaltandi in tertio ordine possidet.

COTYLEDON. CAP. XXIX.

UMBILICVS Veneris, Mart.

Nomen.

Lij. ca. 87.

Forma

Lib. 3. cap.

Vires.



GRÆCI *Λεοντοπιδάον* vocant, Latini
Leontopetalon, id est, Leoninum
folium. Caulem, vt delineabit Dios-
corides, emittit dodranalem, aut
etiam maiorem, plurimas alas habentē, in qua-
rum cacuminibus filiquæ sunt veluti in cacere,
& in his duo aut tria parua femina: flores para-
cei, Anemonæ similes: folia similia Brassicæ, si-
cilia foliorum Papaueris modo: radices nigæ,
Rapo similes, eminentias habētes veluti nodos
quosdam. Nascitur in aruis ac segetibus. Sic pla-
nè descripsit Plin. Leontopetalon alij Raphanon
vocant, folio Brassicæ, caule simplici, & al-
multæ, semē in cacumine in filiquis. *Cum* modo:
radix Rapo similis, gaudis, nigæ. Nascitur
in aruis. Hanc plantam, eiusque nigram, com-
rante mē, radicē Rapi instar vidisse. *Quod* Ma-
thioli non modo Venetiæ & Patavij in
busdam hortis, verum etiam in Hetruriz ar-
uis, aliisque Italiz locis, nascique frequentem
Apulia. Huius radix, inquit Dioscorides, in v-

ΚΟΤΥΛΗΔΩΝ Græcè, Latine
Cotyledon, Acetabulū, Vmbilicus
Veneris nominatur, Italicè *Ombelico*
di Venere, in Hetruria, quod est in
lia actuum operculis similia sint, *Copertum*
Hispanicè *Scudetes*, Gallicè *Escuelles*. Dicitur aut
Cotyledon à concauo folio acetabulū aut um-
bolicum imitato. Folium enim habet, inquit
Dioscorides, rotundum, acetabuli figura, in-
cudenter cauum: caulem in medio breuē, in quo
semen est radicem rotundam oliuæ modo. Sic
delineauit Plinius. Cotyledon paruula herba,
cauliculo tenero, pusillo, pingui folio & con-
cauo, vt coxendices. Nascitur in maritimis pe-
trofilijs, viridis, radice oliuæ modo rotunda.
Hæc Plinius. Vulgaris est notitiæ planta, a Ma-
thiolo rectè depicta. Radicis & foliorum succus
circumlitus aut infusus contexta genitalia nu-
dat, auctore Dioscoride. Inflammationibus, ery-
sipelatis, pernionibus, strumis, & stomacho
astuanti auxiliatur. Folia cum radice comesta
calculos

calculos atterunt, vrinas cient, hydriacis cum vino multo dantur. Herba vna ad amatoria. Plinius, Oculis medetur succo. Et, Calculos herba & radix Coryledonis sanar: itemque genitalium inflammationem omnem, pati pondere caulis & seminis, & myrrhæ. Coryledon condylomata & hæmorrhoidas mirè curat. Et perniunculos curat cum axungia. Galenus sic dehinc. Coryledon facultatis est mixtæ, nempe humidæ, subfrigidæ, & cuiusdam obscure adstringentis, & cum ea leuiter amaræ. Vnde refrigerat, repercurit, abstergit & disciuit. itaque phlegmonas erysipelarodeis, & erysipelata phlegmonode curat: & maxime stomachi ardore & stuantis admodum vtile est cataplasma. Putantur folia cum radice manducata calculos confringere, & vrinas mouere.

I R I S.

CAP. XXX.

I P I S Græcis, Iris Latinis appellatur. In quibusdam Theophrasti & Athænei codicibus *iris* legitur, ob id a Carya Consecratrix veritur. A cælestis arcus similitudine, quam flores eius repræsentant, nomen accepit Iris. Eadem de causa *iris*, *iride*, & *iridæ*, id est, sacra, cælestis, & admirabilis dicta est. Arabes *Asmeni um*, siue *Aurisa* vocant, *Irde*, *Giglio azzuro*, seu *Giglio celeste*, Germani *Blaugulgen*, *Blauerschnecke*, & *Flœuerriz*, Galli *Flambe*. Dioscorides Iridis vnius meminit, sed quæ tantum pro loci natalis varietate magis minusve commenderetur. Herbarij nostri aliam saturnam statuerunt, aliam siluestrem, easque multiplices. Iris, ita describere Dioscorides, folia Gladioli similia fert, maiora tamen, latiora & pinguiora: flores in caule æqualibus inuicem spatiis distantes, inflexos, varios: siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei, & carulei conspiciuntur. Vnde ob hanc varietatem arcui cælesti Iris cõparata est. Radices subsunt geniculatæ, solidæ, odoratæ. Quæ simul atque fuerint dissectæ siccantur in umbra, & filo tractatæ reconduntur. Melior est Illyrica & Macedonica, & inter has optima quæ densum & submutam habet radicem, ægle siaglem, subtiliorem, validiorem, gustu amariori. Græcè legimus *γλυστὴν ἀγλέμην*, id est, gustu feruentiori, qualis certe in Iride perspicitur, licet etiam amaret. Ruelius legit *αγλέμην* a odore syncero, & sinu non redolente, & quæ dum tunditur sternutationes mouet. Secundum locum tenet Africana, candida, gustu anara. In verustate teredine sentiunt, sed tunc odoratiore sunt. Plinius hæc de Iride prodidit. Sed Iris radice tantum commendatur, vnguentis & medicinis nascens. Laudatissima in Illyrico: & ibi quoque non in maritimis, sed in siluestribus Drilonis & Narone. Proxima in Macedonia. Longissima hæc, & candicans, & exilis. Tertium locum habet Africana, amplissima inter omnes, gustuque amarissima. Illyrica quoque duorum generum est, Raphaniris a similitudine quæ melior: rhizotomos subtrusa. Optima quæ sternutamenta tactu mouet (tractata pro tactu reponit Cornarius ex veteri codice, quia voce & postea viritur Plinius.) Caulem habet cubitalem, erectum. Floret diuersi coloris specie, sicut arcus cælestis, vnde & nomen. Non improbat & Pisidica. Natura est feruens, tractatæque pustulas ambusti modo facit. Teredines non sicca modò, verum & in terra celerrimè sentit. Galenus Irin Illyricam ceteris præstare testatur his verbis. Omnes Herbarij vnanimes scripserunt Irin in Illyrio natam optimam esse: Petroselinum verò quod in Macedonia provenit: bitumen è Iudæa adiectum: item & Opobalsamum. Idem & in reliquis fecerunt, quoniam dotes a regionibus acceptas, cum particularum de vnoquoque loquimur, non omittemus. Id quod ante Galenum Theophrastus prodiderat his verbis. *ἡ γὰρ τῆς Ἰρὶδος ἡ δὲ ἐν τῇ Ἰλλίῳ, αὐτὴ δὲ τῆς ἐν Ἰλλίῳ, ἢ ἐν τῇ πρὸς Ἰαλυσίαν χώρα, καὶ ἐν τῇ ἀνατολικῇ, καὶ ἐν τῇ μετὰ τὸν Ἰρὸν.* Id est, In Europa nihil præter Irin inueneris. Quæ optima apud Illyrios provenit, non locis tamen maritimis,

Nomina

Lib. I. cap. 2.

Genera.

Forma.

Lib. I. cap. 7.

Lib. I. Antid.

Lib. I. hist. cap. 7.

Li. 7. med. timis, sed mediterraneis, magisque ad Septentrionē sitis. Galenus in *Aclepiadeo*
 gener. quodam acopo Macedonicam habet, sicut etiā Carthaginensē in quadam The-
 riaca, lib. 2. de Antidotis recipit. Quanquam eam quæ ex Lybia magna sua ætate
 plurima adferebatur, tantū ab Illyrica distare ait, quantum mortuum corpus a
 viuo. Iris pāsīm in hortis colitur, foliis acutioribus, rigidioribus & latioribus quā
 Lib. 1. An-
 tidot.
 Locu.
 Acori aut Gladioli, vt scribit Pena. Flores cōstantenis potissimū foliolis, quorum
 tria deorsum repanda arcus modo curuantur, alia tria sursum, & contra se mutuō
 reflexa stamina aliquot cōdunt, quibus marcidis Æstate media ferē, siliqua Xyn-
 dis aut Acori palustris non dispar: angulosum item semē erui, sed minus se prodit,
 quod omisit Dioscorides. Radix est viuida plan-

IRIS domestica, Mart.



Ibidem.

ius bonitate tantū abesse Africanam, quantum animal vegerum à suo cadue-
 re Galenus dixit, vt suprà retulimus. Quare videtur Iris natalibus gaudere neque
 admodū feruidis, vt Africa, neque ita frigidis, vt Septentrionum, sed montosis
 temperatis & riguis, cuiusmodi ex Hispania hodie valde odoratam & laudatissi-
 mam ferunt. Sic ad Drilonis & Naronæ fluminum ripas, non in maritimis, Illy-

In Theria.

Ἰρις γ', ἢ ἔρπειος ἱερὸν, καὶ νάρωνος ὄχθῃ. Id est,

Irinq., quam Drilonis & Naronis ripæ aluit.

Vbi Scholiastes Illyricam Irin intelligit: Drilonem enim fluuiū esse Illyriorum &
 Narorum, qui Illyrios & Liburnos separat, vbi Cadmus & Harmonia habitauerunt
 in serpentes transmutati. Et Ptolemæus Drilonem & Naronem fluuios esse scribit
 in Dalmatia Illyrico vicina. Quare non genere aut specie differunt hæ Irides, sed
 multiplicem hanc sortiuntur varietatem non modō viribus, vt dictum est, sed
 etiam magnitudine, odore, & potissimū florum colore. Cuius multiplicis venu-
 sta mixtura, vt ait Pena, non modō in diuersis plantis, sed etiam in vnius duntaxat
 floribus spectanda est. Elegantæ enim hortensis amantes non modō purpuream
 (quæ vbiuis fermè Europæ ruri oritur, omniumque frequentissima visitur) sed
 etiam quasdam floribus candidis, Liliaceis alunt, non item luteam, vt Dodonæus
 putat

*Iris vulga-
 ris cædus
 floris.*

putat

putat, rarus vulgatem aureis floribus vltique in pratis Acorū, eſſe Iridem. Cuius radices, vt idem trochis, contopere adſtrungunt, & laniſis facilitatibus aduerſantur, vt reſeſe pſent. haſce vel duntaxat appenſis quemlibet ſanguinis fluxum ſiſtere. Hac autem florum purpureorum & alborum varietas fecit, vt Herbariorum vul-

Lib. 1. holi.
ca 31. & de
florib. cap.
40. & 41.

I R I S ſilueſtris, Matth.



I R I S ſilueſtris altera, Matth. ali.



gus olim inter Iris & Ireos diſcrimen fecerint, vt vulgatus ille vericulus indicat,

Iris purpureum ſorem gerit, Ireos album.

Quæ diſtinctio ineptior eſt, quæ vt reſutatione egreſſa. Iris ſilueſtris domi non eſt generum auctore Naud. Vna quæ plurimum ſaxoſis naſcitur locis, ſarivæ per omnia ſimilis, minoribus tamen foliis floribus, cauliſq; & radiibus graciliorib*. Altera totis Gladio, & prioribus radice tenni, lignoſa, geniculata, ſubruſa, inodora: caule breuiſſiore cæteris longe miſore, odore Armeniaci mali, qui conſtat folis novem, purpureis, quorum extrema ſuperiore rariuſque parte aureis pinguntur lineæ. ſilueſtris vtriuſque generis plurima, inquit, oritur in Goritienſi agro Saluatino monte, & lapidæ vallibus inter ſaxa, odore non ingrato. Pena duas etiam Irides, quas ſilueſtes vocant recentiores, agnoſcit, inodoras, minus obuias, multoque minus aromatica dote commendabiles. Vna hortenti ſemine eadem, inquit, niſi quia tota gracilior, quæ plurimum ſqualidis ſaxorum marginibus ſponte oritur, cultaque retinet ſpeciem, quæ diſtat à ſariva, etiã ſapore ingrato, odore nullo. In ſubalpinis Ligurum & Taurinenſium paſim occurrit. Altram non trivialis venularis ſe primū legiſſe ait in Nitiobrigum maritimis & ſabuletis herbidiſ, non procul ab oppido Frontignano ex aduerſo montis Cetij muſtam, nec vſpiam alibi in vniuerſa Gallia aut Italia ſacilem repertu, niſi maritimis: cuius radiceſ erutz effractæq; nullū vnquam ſe obſeruafſe Armeniaci mali odorem, qualem ei inefſe ſcribit Matthiolus. Radix, caulis, folium, ſiliqua, & ſemen Iridis, ſed minora, minūſque aromatica, ſaltem quibus locis natalibus illam obſeruauit, ſcilicet humidis & incultis. Flores tamen Iunio aptiūſ Xyridem colore & figura, foliolisq; minus repandis expriment. Sapor illi feruidus, amarus, tenuitas multa, quam etiam in medico vſu ſe cōpertam habuiſſe ſcripſit. Hiſ idem Pena aliam addit Iridem minimam & rariſſimam omnium, ſaxatilem, Narbonenſem etiam, quæ radiceſ plexu, ſubſtantia denſa, & colore Illyricæ abſimilis nō eſt: caule verò nullo, præſertim natalitiis: folio latuſculo, rigido, mucronato, palmum alto,

cuiusmodi Gladioli: flore, semine, siliqua Xyridis. Hæc statim atque è terra assurgit Chamæleontis albi modo pusilla humilisque permanet: ob id à nonnullis Chamæiris nuncupatur. Plurima oritur in agro Narbonensi, locis aridis & saxosis, secus specum illam sesquimiliari à Monspelio disitam, via qua Frontignagnū itur,

IRIS perpusilla & saxatilis.



CHAMÆIRIS seu alba perpusilla Iris latifolia, Lob.

Lib. purg.



Lib. purg.

in cuius cautibus & rupum commissuris frequens adolefcit prope Feculam. Chamæiris seu alba perpusilla Iris latifolia à Lobellio picta est, quæ ex Monspelienfi agro in Belgium & Angliam transmissa, frigido humidoque solo excepta, non secus ac innumera calidarum regionum peregrinæ stirpes, soli & calis tēperie mutata varias subit mutationes. Caulis illi dodrantalis, alicubi pedalis: flores candidi, aut latei, aut violacei. Alibi caule carentes, dilute rubentes, violacei, striati, & ex luteo pallentes observantur. Idem annotat, Clusium Irides Austriacas humiles, speciosis rubris floribus, & violaceis odoratis Vienna Belgium misisse, cum Chamæiride purpureo odorato flore. Alterum Iridis genus descripsit & depinxit Dodon. Chamæiridem vocavit Lobellius Iridē perpusillam, siluestrem, angustifoliā. Folia habet Gladiolo minora, angustiora, pinguiora: caulem palmi altitudine, foliis breviorē: è cuius summo flores singuli suis pediculis insidentes erumpunt odorati, ex caruleo violacei, aliquando ex purpureo violacei, ex novem foliolis constati: radix grævis, minimo digito duplo minor, obliqua, foris rufa, intus candida, acris, gustu Xyridis. In Belgio & Germania frequens, Maio mense floret, folia Hieme pereunt, Vere nova erumpunt. Dodonæus longè diversam Iridem depinxit, quam tunc Iridem vocat, cui folia fere Chamæiridis oblonga, angusta, tenuis cauliculus, flos in cacumine, minima Iridis, minor, angustiorumque foliorum, obscure virens, & quo aliis fimbria loco nigricans. Capitulum satis magnum semine perfecto dependet, in tres rimas latiscens. Semen rotundum Ochro minus, initio albicat. Non vnius formæ radix: ante florem duo vel tres veluti bulbi parvi coarctat: hoc enato in plures singuli extuberant propagines, quarum nonnulli digitum referunt: vnde illi Hermodactyli nomen plerique dedere, Iridis siluestris genus esse potest Dodonæi sententia, non Ephemeris. Sunt qui velint huc esse quem Matthiolus perperam pro vero depinxit Hermodactylo. Eius tamē pictura parum cum hac convenit. A quibusdam Lonchitis prior Dioscoridis cæsetur esse. Item aliam Dodonæus depinxit, quam bifloram appellat, Clusius

IRIS tuberosa,
Dodonæi.*IRIS biflora, Clusii, & Dod.*

Clusius Lusitanica Iris tuberosa, quæ etiam pinxit & descripsit. Huius, inquit, folia breviora sunt & angustiora vulgaribus, alioqui haud dissimiliter in summo caule, quæ pedalis est, flos è vaginulis purpurascentibus prominet, senis foliis intensius niter: villosa illa funibus, quæ in vulgari lutea, in hoc omnino candida est. Vnicum autem plerumque in singulis caulibus florem proferit, interdum sed raro alterum, rarissimè tertium, singulari quemque vaginula inclusum, iucundissimo odore, & Lilii cõallium æmulante. Istius florem se vidisse ait Clusius, qui quaterna haberet folia densum vergentia, totidem ligulas bitidas funtium & stamina contegentes, & quaterna etiam folia sursum reflexa, & inuicem amplectentia, vt interdum in floribus Natura ludere solet. Semen angulosum & rugosum in siliqua triangulari satis crassa sed raro perficit. Radix subest nodosa ac veluti geniculata, folida, pollicari crassitudine incurua, intus candida, ingrati saporis, & paulò post feruidissimi gustus, multis fibris summa terra hærens, & in multas propagines è lateribus nascentes distributa. Nasceitur passim in Lusitania supra Tagum, nunc pingui solo, nunc planè lapidoso. Bis floret, Vere cum aliis Iridis generibus, & Autumno: quam ob causam bifloram Clusius nuncupauit. Huic ferè similem esse ait eam, quam Alfonso Pancius medicus Ferrariensis Belgium misit, nomine Dalmaticæ minoris, nisi quod paulò angustiore folio videtur, flores purpure dilutioris, & terni, aut quaterni in singulis caulibus, oblongiori pediculo inherentes. Dalmatica maior, quam idem misit, vulgaris forma & magnitudine similis, inquit Clusius, sed est aspectu hilaris & peruenuit foliorum exortus lateratim tractus, vt describit Lobellius, & radiatim alas pauonis explicatas imitatur: floribus pluribus ex vno caule multis concavo alis, luculentæ magnitudinis, violaceis, nitentibus senis foliolis, alternatim etiam repandis. Vireta Belgica hanc in delitiis habent. His iungenda Iris flore caruleo obsoleto, cinereoque polyanthes à Lobellio depicta. Aliquot alias plantas in Hispania obseruauit Clusius, quæ cum flore sint Iridis aut Xyridis, ramen bulbaceas haber radices: quare eas Irides bulbosas nominauit. Prior sena sæpius habet folia longiuscula & latiuscula, inuicem alternatim amplectentia, mollia, in terram recurua, supernè ex vindi palen-

Lia. Simp.
Rip. can.

IRIS Damascena,
maior.

IRIS flore caruleo polyanthes,
Lobellij.



IRIS bulbosa latifolia
J. Clusij.



tia, infernè candicantia: è quorum medio flos exilit vnicus, odoratus, caruleus, interdum candidus, nouem foliis constans, Iridis seu potius Xyridis forma, quo marcescente vtrinque alij singuli succedunt. Caulem non habet, sed flos longo pediculo insidet vt in Croco: radice bulbosa, candida, auellanz modo dulcis, multiplex cortice nigricante inuoluta, cui (præsertim dum floret) aliquot, præter fibras, radiculae crassæ & oblongæ subnascuntur, vt in Hyacinthis interdum fieri solet. Inuenitur in Lusitania, Bæcæq; collibus non procul ab Arna flumine sitis, & copiosè circa Antequeram & Cordubam. Floret istic Ianuario & Februario. Lobellius Hyacinthum poetarum latifolium appellat. Alii sunt quinque aut sex folia tenuia, cubitali longitudine, interna parte canaliculata & candicantia, externa autem striata, &, viridis cum caruleo commixti coloris, caulem amplectentia, qui sesquicubitalis est, interdum maior raro breuior, nodosus, florem vnièu è vaginulis promens Iridis siluestris, aut Xyridi fere forma, cuius labra inferiora, & ad terram inflexa extrema parte lanuosa sunt & candicantia, quòque loco fimbria villosa esse solet, lutea macula insignita: folia alia his incumbentia subcarulei ex candido sunt coloris, extrema parte bifida & reflexa, ligulam vt Iridis generibus occultantia: quæ tria erecta sunt & oblonga, & dilatioris ex caruleo purpureæ. Totus flos iucundo

IRIS bulbosa angustifolia
flore vario, Clus. & Dodon.



aromate spirat odore præmanli ferè Coriãdri.
Post hæc sedit siliqua longa, gracilis, triangula,
superius angulatumq; semen continens. Ra-
dis bulbosa, candida, subdulci, spadiceis ali-
quot membranis inuoluta, quæ nucleis vti Al-
lium ferè separatæ, & seri potest. Lobellius
Hispanicum poetarum Hyacinthum vocauit.
Tertia iam dictæ per omnia similis ferè est,
breuiore tamen caule, gracilioribûsq; & ex
viridi pallescentibus folijs: flores bini contra-
ctiores latioresq; & lutei, inodori: siliqua cras-
sior & breuior: semen superiori simile: radix
iam dictæ similis, quæ nucleis etiam separatur.
Nasci ut pingui solo, & petrosis collibus ad Ta-
gum supra Olysiþonem. Floret quo superior
tempore Lobellius Hyacinthum poetarum lu-
teum nuncupat. Priorem Clusius appellat lati-
foliam, & a floris colore purpuream, siue æ-
ruleam, Hispani nunc *Lirio* simpliciter, nunc
Lirio Eþadanal, & *Lirios azules*, hoc est, Lirium
ensiforme, & Lirium æruleum. Alteram angu-
stulo hanc flore vario nuncupat, Hispani *Lirio*
Illyrico. Tertiam Iridem bulbosam flore luteo,

Hispani *Reylla buy* De harum Iridum viribus nihil adhuc compertum. His affine
est Litium maius Dodonæi, folijs Porro, aut Asphodelo similibus: caule cubitali:
flore Iridis, aut Sisyrinchij, colore aut toto luteo, aut æruleo purpureo, cum li-
neis luteis, quæ in inferioribus foliolis limbricæ loco sunt: radice oblonga, bulbosa,

LIRIVM maius, aut Lirium
verum, Dodonæi.

IRIS angustifolia flore
luteo, Clusij.



Cephele, & *Asper* videtur esse. Theophrastus quod Vere post Liliū exit, & *Thid* Lilio & Narcisso eū ē Herique Hispaniæ, Bætiæ, & Lusitanie locis sponte nascitur. His adde maiora duos Lobelij Irides. Prior admodū rara est, cui flores Chæris Iridis Montepeliæ, tribus foliis repandis, peregrina elegantia striatis, oblectat uti placeis. In Belgij hortis prouenit. Alterius florem vidit Bruxelæ delatum, etiam magnitudinis, maculis fortissimis transversis & obliquis, giluis, cinereis & panicantibus variatum: foliis tantū gladij rursū vndantibus. Cetera omnia Indi videntur, aut Dalvarum æ similia. Ceteri Irides calfaciendi extenuas, vim obtinent. Contra tamen efficaces, humoresque excreatu difficiles extenuant. Bætes ex hydromelite drachmarum septem pondere potæ purgant. Somnū conuulsas lacrymas cientes torminibus medentur. Cum aceto potæ venenatorum morbos, lienosis, conuulsis, refrigeratis, rigentibus, & quibus genitura effluit, autem.

*Vires &
Temper.
Diosc. l. 2.
cap. 16.*

IRIS lutea variata.



Lili. 64.

Mense cum vino potæ ducunt. Decoctum earum ad multiora tamen et vitæ, mollioribus aperientique locos. Ifi medicis infunditur. Stylus & linis carne impleant. Quinetiam plantæ modo cum melle appositæ fustus exulcerum. Serumas veterisque durities coctæ & melle emolliunt. Arida vlcera expleant, & cum melle purgant. Nudata ossa carne operiunt. Dolores capitis cum aceto & rosaceo vel herba nuntiat. Lentigines, vitia cutis in facie, & bubo albo, & duabus mellis partibus diluuntur. Pellis, mala matris, & acopis vel herba vniuersum magni vsus sunt. Infanti ligari salubre est, inquit Plinius, dentium præcipue & tussientibus, tinearumque videri borantibus instillari. Ceteri effectus eius multum a melle differunt. Vlcera purgat, caput præcipue, suppuraciones veteres: alia cum duabus drachmis cum melle. Tussis, tinearum inflationes potæ lienis ex aceto. Ossa tumentia & arua orū mortis ex potæ vana. Contra scorpiones duarum drachmarum potæ in pane, vel aqua sumitur. Contra canum

pus ex oleo imponitur: & contra perfrictiones. Sic & neruorū doloribus. Liliū & coxenditibus eū resina illinitur. Vis ei cōcalfactoria. Naribus subduta tumentamenta mouet, caputq; purgat. Dolori capitis eū coronæ malis aut liliū illinitur. Crampulas quoq; & orthopneas disciunt. Vomitiones ciet, duobus sumpta. Ossa fracta extrahit imposita eū melle. Ad paronychias farina eius viuitur: eū vino ad clauos vel verrucas, triiduoq; nō soluitur. Halitus oris comanducata abolet, alarumq; vitia. Succo durities omnes emollit. Somnū cōciliat, sed genituram consumit. Sedis rimæ & cōdylomata, omniaq; in corpore excrecentia. Iris, auctore Martharasa oris halitū cōmendat, dentium dolores mulcet, si radice decocta in colloquitur. Coquit, abstergit, digerit, resoluit, lenit, refert, expurgat & ducit. Vulnerariis in medicamentis admixta sarcotica est. Radicis succus bulbo, & aqua pellit, hæmorrhoidas forū elicit. Fit electarium ex succi radice drachmis tribus, galangæ, zedoariæ, singulorū drachmis duabus, cinnamomi, cardamomi, singulorū sesquidrachma, brasiæ marinæ semuncia, & melle quantæ sufficiat ad excipiendū, quo maxime iuuatur hydropici, & quotidie semuncia eium dō-

In caulis.

radicem. Radicum farina drachmarum quatuor pondere additis cinnamomi & anethi singulorum drachmis duabus, & croci scrupulo, tumores & dolores testiculorum mirifice tollit, si pauci coccinei frusto meraco albo perfuso hæc omnia in puluerem trita excipiantur, & calida apponantur. Hæc radices vesibus interpositæ, eas a tinearum erosionibus tuentur, & odoris fragrantia commendant. Radix trita, & ex aceto pota omnibus aduersatur venenis. Succu naribus infusus cetebrum à piruita expurgat: ventriculo tamen nocet: ideo non exhibendus nisi cum mulla & Indica Nardo. Potum radices decoctum obstructiones aperit, præsertim cum crassa materia impacta fuerit, ventris lineas pellit, urinas citat, renum calculos eiecit. Datus vtiliter potandum ictericis: sudores enim inouet, & auriginem exterit. Pulmones & thoracem expurgat, & iocinoris inflammationibus auxiliatur. Recentes radices saccharo conditæ aut melle, dantur vtiliter diuorandæ vnicui pondere calculo affectis, anhelosis, hydropicis ac repletis. Eadem in passo decoctæ ventulæq; addita hordeacea farina & illius particulas in vinum Illiricæ pulvis semidrachmæ pondere datur ex passo calido ad diuocum affectum. Oleum, quod ex foliis & radicibus sicco paratur, resiliunt, emollit, concoquit, frigidis doloribus mulcet, attenuat, & mirifice prodest iocinoris & lienis doloribus. Podagricos iuuat, lenitque articulorum duritiem, & exterarum corporis partium. Valet & ad frigidos vteri dolores, ad conuulsos, & aurium cruciatus. Vtus apud veteres radicum tantum, florum apud recentiores. Hæc ex Matthiolo.

ACORVM.

CAP. XXXI.

AKOPON Græcè, & *ακος* Plinio, Latine Acorum & Acorus. In *Nomina*
 Officinis nomen retinet, Arabice *Vage* seu *Vgi*. *Ἀγροδύμων* etiam Græci vocarunt Apuleio teste, id est, Veneream, & Piper apum, quod ea in alueariis suspensa nunquam diffingant apes. Dixerunt autem Græci, quia *ἡ τῆς κόρης*, id est, pupillis, siue aciei oculorum caliginosæ mederetur. *Pena in*
 Apum depinxit Dioscorides foliis Iridis, angustioribus tamen, radicibus non *Aduers.*
 angustius, implicatis, neque in rectum enatis, sed obliquis, & in superficie positis, quæ geniculis distinctæ sunt, subalbx, gustu acres, odore non ingratis. Præstat denique candidum, non cariosum, plenum & odoratum, cuiusmodi est in Colchide & Galatia. Acoros folia Iridis habet, inquit Plinius, angustiora tamè & longiora pediculo: radices nigras, minúsque venosâs, ceterò & has similes Iridis, gustu *Lib. ca.*
 acris, odore non ingratis, ruptu faciles. Optimæ Ponticæ, deinde Galaticæ, mox *Forma.*
 Lyciæ. Sed primæ in Colchide iuxta Phasin amnem, & vbiq; in aquosis. Recentioribus vires magis (alii, vires magis, legunt) quàm verustis. Creticæ candidiores Ponticis. In his Plinius cum Dioscoride prorsus conueniret, nisi radices nigras tribueret, & minús venosâs esse, ac ruptu faciles adderet, quanquam in vetustis quibusdam legitur ruptu, in aliis crutu. Legitimum istud Acorum scitè à Matthiolo expressum est, foliis Iridis, angustioribus longioribúsque, odoratis ac gustu feruidis: radicibus Iridis æmulis, frequentet geniculatis, firmis, subcandidis, *Lib. ca.*
 æmumeris ima parte adnatis fibris, odoratis, gustu acris ac subamaro, complicatis, non in rectum descendentibus, sed in obliquum actis, & summa tellure sese diffundentibus. Caule est læui, ex quo ramuli prodeunt, in quorum cacuminibus nucamenta quadam exoriuntur (ita affirmante Quacelbeno medicorum enim se nō vidisse ait Matthiolum) nucis Ponticæ iulis, aut longo Piperi similia. Talis est legitima Acori planta, quam Constantinopoli ad Matthiolum miserunt Avvrius de Bousbecke, Ferdinandus Cæsar ad Turcarum imperatorem orator, & Qua-

celbenus medicus, è Nicomedia, ex quodam vastæ magnitudinis lacu petita, vbi copiosum provenit Acorum. Est enim Nicomedia Bithyniæ ciuitas, Galatiæ & Colchis vicina, vbi optimum Acorum nasci tradit Dioscorides. Eandem Acori veri delineationem ex virëtis plantæ inspectione tradidit Lobellius scitè admodùm & accuratè, id nimirùm folia Xyridis habere, sed obliōgiora & angustiora, sesqui-

*ACORVM verum,
Machioli.*



*ACORVM cum flore, domini Robini,
regis Francorum Herbarij.*



cubito maiora, nitida, ex atro virentia, consimili radici eximia fragrantia prædita, quæ Iridis siluestris ritu Hieme marcescunt, & Vere pullulant: radices quales in Officinis prostant nomine Calamii aromatici, implicatas, nec in rectum, nec altum actas, sed cespite summo in obliquum, vt rectè dixit Dioscor. sparsas, subtus numerosa coma fibratas, albicantes foris, intus candidas, gustu acres & amaras, & gemulis distinctas, ex quibus vtrinque alternatim alarum ritu aptantur pullulationes. Neque caulem, neque florem edidisse ait. Idem de ea quam aluit prodidit Olaus: quinimò asserit relatu Augerij de Bousbecke, Cæsaris ad Turcarum Imperatorem oratoris, & Quacelbeni medici, nullum vbi nascitur sponte, neque florem neque semen proferre, sed duntaxat nucamenta quædam iulis nucis Ponticæ similia, è ramulis ex læui caule prodeuntribus pendentia. Nascitur autem ingenti quodam lacu ad radices montis præcelsi iuxta Prussiam Bithyniæ urbem. Hæc ideo inculcauimus, tum vt omnes apertissimè Acorum verum agnoscerent, tum vt intelligerēt id prorsus esse (vt petiti omnes huiusce tēporis Herbarij censuerunt) quod Officinæ saluò Calamum aromaticum vocant, non Galangam maiorem, vt quidam opinati sunt, multo minùs Acorum nostratæ palustræ, Gallis *Glaurul de marais* dictum, Germanis *Geelshuurtel* & *Drachenuurtz*, Belgis *Geelisch*: Officinæ olim Acorum perperà appellauere, & maiori errore radicibus eius pro genuino Acoro vsæ sunt: nam non forma modò, sed viribus potissimùm ab Acoro dissidet. Quare Pseudoacorum plerique nominarunt: Dodonæus Iridem luteam siluestrem, aut potius Pseudoiridem nuncupare maluit, vt pote Iridi quàm Acoro similiorem;

ACORVS *lucens falsus,*
Martholi.



PSEUDOACORVS
caeruleus, Tragi.



miiorē: cum contra Acoro aut Galangæ quàm
Indi propter radicis vim adstrictoriam similior
sit Quidam Butomum Theophrasti esse vo-
lunt, & vere quidem, vt opinor: quia Butomū
Theophrasto lib. 1. cap. 8. caulem lœuem & aqua
lē habet, vt & Cyperus: ea parte vero 17. libeius-
dem foliū habet Arundinis & Cyperi modo,
velut ex duobus constans angulosum, & media
parte velut carinatum: fructum, vt alij legunt,
magnum, vt alij, nigricantem, magnitudine Si-
dæ proximū. Quæ Acoro palustri conueniunt.
Dictum autem Butomū, quod à bubus libenter
edatur ac profundatur. Est igitur Pseudoacor-
us planta totius Indis, longioribus & angulio-
ribus, dorso aliquantulum vtriusque exante,
ensis figura: caulibus labris, rotundis, cauis,
nonnunquam bicubitalibus, in quorum cacu-
minibus flores multi exeunt, lutei, foliolis ter-
tis deorsum vergentibus, tertius alius multo mi-
noribus & surrectis. Siliquæ crassæ succedunt
triangulares, in quibus semina multa simul cō-
pressa, ordine sigella, plana, cartilaginea, lenti-
bus maiora: radices obliquæ, longæ, geniculatæ,
cirroscæ, in propagines diuise, palidè ruben-
tes, gustu adstringentes. Nasceitur in palustribus
locis, humidis & riguis tractibus, Italix, Germa-
niæ, Gallix, Belgioque familiaris. Floret Maio
& Iunio mensibus. Tragus Pseudoacoro Gla-
diolum quendam cæruleum minorem subiun-
git, quem potius Pseudoacorum cæruleum
vocare debuerat. In quibusdam humectis pra-
tis, inquit, & campis, qui Rheno, & prope
Vormatiam & Oppenheimium oppida ad-
iacent, plantæ genus hoc inuenit, cuius flores
aquei penè coloris, sed cum cæruleo mixti, ter-
tis singuli versus terram inflexis foliolis prædi-
ti. Cæterum quod ad reliqua attinet, folia, cau-
lem, radicem, ea ad Iridem proximè accedunt,
nisi quod tota sua substantia magis exigua, &
angustioribus foliis & acutioribus illa esse de-
prehenditur. Semen fert in oblongis & triangu-
laribus siliquis, non aliter ac Pseudoacorus. De
singulorum viribus nunc dicendum. Acori ra-
dix calfaciendi vim habet, auctore Dioscoride.
Decoctum eius potum vrinam cit. Prodest la-
teris, thoracis, & iecoris doloribus: torminibus,

Lib. 1. c. 10.

Lib. 1. c. 1.
Vires &
Temper.

raptis, conuulsis. Lienēs minuit. Vrinæ stillicidio & venenatorum moribus sub-
uenit. In fessu, quemadmodum Iris, ad muliebria utilis est. Succus radicis caligines
oculorum discutit. Antidosis radix vtiliter admiscetur. Vis ei ad calfaciendum ex-
tenuandumq; efficax, inquit Plinius, cōtra suffusiones & caligines oculorum suc-
co eiusdem

Lib. 1. c. 1.

co eiusdem potio, contrâque serpentes. Et variis in locis. Penitus in uicibus
antidotis miscetur. locinori medetur, thoraci quoque & præcordiis. Vrinam
eius decoctum, & omnia vesicæ viria sanat. Testium tumores radix decocta in
no, tritâque & illita mirè discutit. Duritias & collectiones omnes sanat, decocto
huius herbe fouentibus. Contusis & euersis pota duobus obolis in mulis cyathis

Lib. 6. l. 10.

Vires &
Temper.
Pseudo-
acori.

Galenus scripsit Acori radicem gustu esse acri & modice amaro, odoreque non
iniucundo. Quare facultatis calidæ esset, & consistentiæ tenuis. Hinc cōsentaneum
est ut urina moueat, & lienes induratos iuuet, tum corneæ membranæ crassi-
tiem detergeat simulque extenuet: sed ad hoc melior est succus ipsius. Omnia
veto siccificum esse clarum est. Et finè ordinis esse rerum in utroque, calcificando
scilicet & desiccando. Ab his Pseudoacori vires multum distant. Nescit enim
citra calcificationem: radix adstringendi facultate prædita. Quare de his, corneæ, cor-
trahit. Igitur urina non cit, nec menses prouocat, sed potius supprimit. Angu-
nem vnde cumq; manantem cohibet, ut rectè Pandeitarum auctor scripsit. eum,
qui sciam Acori radicem gestauerit, à nullo sanguinis profluuiio corripit. De re-
centioribus aliqui hanc Pseudoacori facultatem obseruauerunt, atque hinc adueni-
unt eius succum igne expressum menses nimium profluantes contrahere
posse. Dyfentericis utilis est.

GLADIOLVS.

CAP. XXXII.

Nomina

ἸΦΙΩΝ & φασγάνιον, & φαργανίον Græcis, Latinis Gladiolus, Ensis
Insculus, Romanis Segetalis, Arabibus *Kasfif*, Italicè *Gladiola*, flores Ma-
nacuræ, Germanicè *Schuerdel*, Gallicè *Glau* & *Glauet*. Xiphio, id est,
diolo seu Ensiculo nomen factum à folij figura, quæ ramis eadem propemodum
sit multis plantis, ut Iridi, Xyridi, Acoro, & bulbosis quibusdam, tamen hinc præ-
ceteris remanet, quia solum propius ensim mucronatum refert, striatūque

GLADIOLVS, March.

Forma.
Lib. 4. c. 10.



& neruis scabris rigidisque satis firmum. Quo-
in satis frequentissimè reperitur, Segetalis
xerunt. Gladiolus Iridi similis est, ut descriptum
Dioscorides, minor tamen & angustior, & gla-
dij modo mucronatus, nervosusque. Caulis
emittit cubitalem, in quo flores purpurei, or-
dine à sese distantes: semen rotundum: radices
duas, alteram alteri insidentem, velut paruos
bulbos, quarum inferior gracilis est, superna
crassior. Nascitur maximè in aruis. Plinius Lon-
chitidem à Xiphio discernens, cum illam in se-
rientibus nasci dixisset, de Xiphio subiungit.
E diuerso Xiphion & Phalganion in humidis,
cum primum exit, gladij præbet speciem, cau-
le duum cubitorum, radices ad nucas auellanz
figuram simbrizæ, quam effodi ante menses
oportet, siccariq; in umbra. In quibus a Dio-
scoride dissentit, qui nō in humidis, sed in aruis
nasci scripsit. Hic Gladiolus verus depictus
est in aruis & satis frequens, interdum & in
præis reperitur. Cui caulis singularis, inquit
Pena, rectus, rotundus, striatus, nitidus, e fœnis
quali

quasi sese exerens, & flores condiros deinceps habens per interualla, interdum ad vnam tantum caulis partem digestos, quemadmodum in Narbonensi, interdum binis ordinibus, ut inque vno, ut in Italico: flores rutilant hilari saruraque purpura, senis & septenis foliis conitantes, liliaceis similibus, vel Ornithogali, sed minus repandis aut diuulsis. Semen in folliculo rubrum eruat magnitudine. Gemini bulbi radices sunt, quorum habitior & corpulentior interdum superior inferiori incumbit, interdum inferior maior & languidior. Vere exacto iam effera multis pusillis bulbis propagatur Ornithogali modo: coma fibrosa subtus radicantur glutinosi bulbi, & villosa inuolucro teguntur fusco, sapore non ingrato, acri. Superior radices pars, auctore Dioscoride, cum vino & thure imposita, spicula & aculeos extrahendi vim habet. Cum farina liliacea & aqua mulla panos discutit: quare eiusmodi emplastris additur. Menses apposita trahit. Tradunt eandem superiorem radice cum vino poram veneri stimulare, inferiori vero steriles efficiere. Quin & superiorem radicem cum aqua bibendam commodè exhiberi pueris enterocoele laborantibus. Plinius eadem ferè tradit. Superior pars eius cum thure trita, æquo pondere admixto vino ossa fracta ex capite extrahit, aut si quid in corpore suppurat, vel si calcata sint ossa. Serpentis eadem contra venena efficaç. Et alio in loco. Xiphij quoque radix superior vrinam ciet infantibus. Enterocœlis datur ex aqua, & illinitur velicæ vitis. Et rursus. Appetentiam veneris facit radix ex Xiphio superior, data potu in vino. Xiphij radix, inquit Galenus, & maxime superior, attrahentem, digerentem, & desiccantem facultatem habet.

Lib. 3. c. 10.

Lib. 16. c. 10.

Lib. 16. c. 10.

Lib. 3. fin.

XYRIS. CAP. XXXIII.

ILANTA, quæ Græcis *Ἐυρίς* appellatur, & Theophrasto *ἰεὶς ἀγρία*, id est, Iris siluestris, Latinis quoque Xyris, Arabibus *Caforas*, Officinis & vulgo Spatula foetida, Germanis *Unandeleuskraut*, à cimicibus necandis, Gallis *Glaieul punice*. Prisci autem appositè *Ἐυρίδα* ob folij similitudinem, quasi rasorium cultrum aut nouaculam dixere. Est enim illi folium ancipiti nouaculæ similis, acutiore acie, & tenuiore rigidiorè, quàm Gladiolus aut Iris mucrone.

Nomina

Pena in Aduert.

XYRIS, Lobelij.



Spatula autem foetida, cum ob eandem folij figuram, (spata enim gladij significat) tum quòd grauem exhalet odorem vulgò punceputa est. Hanc his verbis delineauit Dioscorides. Xyris folia Iridi similia habet, sed latiora, & in summo acuta: è quorum medio caulis erumpit, satis crassus, in quo siliquæ sunt triangulares, & in ipsis flos purpureus, quod verò in medio est, puniceum est: semen in folliculis fabis simile, rotundum, rubrum, acre: radix est multis geniculis distincta, longa, rufa. Nascitur sponte in Galloprovincia teste Pena, & in Anglia quàm vberimè prope vda prata, & litoreos maris aggeres. Alibi in hortis colitur. Veterum Xyridem, vulgi Spatulam foetidam esse periti Herbarij credunt. Cùm enim obiciunt, Xyridis radicem longam esse, geniculatam, & rufam, quæ in Spatula multifida sit, gracilis,

Lib. 4. c. 12. Forma.

Pena in
Aducl.

cilis, fibrataque, præterea florum colorem, facile refelluntur, quod ratio magnitudo & color, ut pleraque alia, facile nonnihil non ita magna de causa mutatur. Etenim si Iridis radices & flores colore, magnitudine, densitate, bonitate & odore adeo variant, ut cum Florentina si nostram conseras, longè aliam colore & odore putes, quid ni possit tantilla mutatio Xyridi contingere? Illyrica Iridis radix est subruia, nostraris pulla & cinericia, Florentina candida eximia fragrantia, nostras verò ingrata ferè fetet. Adhuc cum *πλαντίνη* folia Dioleontides dixit, & acumine acutiora, innuit medium folij latius & ventricosius, summum verò multo angustiore mucrone, cuiusmodi prorsum sparulæ spòre nascens. Caulis etiam eius cubito maiores, plures, glabri, teretes, crassitie mediocri per media folia recti assurgunt, florésque in summo promunt Iridis siluestris, ternis foliis surrectis, nec inflexis, purpura saturatiore Violæ Martiæ, & in medio venis nonnullis luteis & phœniceis apparètibz, siliquis itè Iridis, triquetris, trinaq; carina dehiscètibz quādo maturuit semen, quod rubrum, nitidū, gemina secundū longitudinē serie conditur in siliquarū membranæ loculis ut in Pœonia, Orobi, ut quidā in Oribasiolide, aut Fabæ, nō vulgaris nostriaris, sed Dioscori multo minor, & nostrare rotundior fuisse probatur à doctis. Radix parua (facilis enim & frequensest in Dioscor. deprauatio vocis *μυρὰ* in *μυρὰ*) geniculata, fibris multis donata, & lili concolor, similis, aut fusca. Postremo ea & acrimonia prædita est radix, tametsi Cordi aut cimices oleat, ut multorum nostræ æris medicorum monumentis & experientius constet ea præstare quæ Dioscorides Xyridi reddidit. Quin Iridi non modò similis facit, ad & viribus anteit, tum ad vlcera, ossaque demum mada, tum intrò sumpto decocto aut siccis vehementius lotium ciet, & sudores mouet, sed pharyngem adurit ferè. Si multa decoctabatur, vomitum excitat, & tormina ventris, ut Iris facit. Hisce spatulam fœtidam esse Xyridi veterū astruit Pena. Cui has vires tribuit Dioscorides. Radix Xyridis ad capitis vulnera facit & fracturas. Educit aculeos & omne telum extrahit citra dolorem, admixta floris æris tertia parte, radices Centaurij quinq; & melle. Sanat tumores & inflammationes cum aceto imposita. Radix cum passo contusa bibitur ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, vrinx stillicidia, & alui profluuium. Semen ad ciendam vrinam efficacissimum est, trium obolorum pondere in vino posum. Idem & lienem liquat cum aceto potum. Xyris tenuium est radix, tum multo ampliùs fructus, qui & vrinam ciet, & lienes induratos sanare potest.

XYRIS, Mart.

Lib. 4. c. 22.
Vires &
Temper.

Lib. 3. sim.

POLYGONATVM. CAP. XXXIII.

POLYGONATON Græcis, Latinis Polygonatum vocatur, Officinis, *Nomina*
Herbariis, & vulgo Sigillum Salomonis, Italis *Frafinella* & *Ginocchio*,
Germanis *Uersquirtz*, hoc est, radix alba, Gallis *Signet de Salomon*. Poly-
gonatum autem à radice geniculorum frequentibus nodis ex intervalis tumēte
appellauerunt. Fuchsius, Dodonæus, aliique recentiores Herbarij duo Polygo-
nati genera dant. Vnum verum Dioscoridis, latioribus foliis, alterum multo an- *Genera.*
gustioribus. Polygonatum Dioscoridis frutex est cubito altior, folia habens Lau- *Forma.*
ro similia, latiora & læuiora, quæ gustanti simile quid malo cydonio aut punico
exhibent cum quadam adstrictione. Per singulos foliorum exhoris caudidos flo-
res promit numero maiore quàm folia, supputatione à radice facta. Radicem
habet candidam, mollem, longam, geniculis plenam, densam, graueolentem,
digitali crassitudine. Nasctur in montibus. Iam si singulas Sigilli Salomonis no-

POLYGONATVM maius,

Marthiali.

POLYGONATVM angustifolium, Fuchsj.



tas persequi libear, omnes, ne vna quidem reclamante, adesse comperies. Nam
in montibus gignitur, frutice cubito proceriore: foliis Lauri, lartioribus & læuio-
ribus, quæ gustata quendam mali cotonei aut punici saporem referunt cum
quadam adstrictione. Flores per singulas foliorum eruptiones exeunt candidi, qui
folia numero superant: etenim bini, terni, aut plures ab vnoquoque foliorum
sinu prodeunt. Radix illi candida, mollis, longa, crebris nodis articulara, den-
sa, graueolens, digiri crassitudine. Floribus excussis baccæ pisi ferè magnitudi-
ne dependent, primum virides, deinde nigricantes. Ab hoc Polygonatum siue
Sigillum Salomonis minus foliis discernitur: cui radix & caulis, plantæq; ha-
bitudo & natales sunt eadem, verùm folia angustiora multò, & ambitu stellato,
rubræ maioris vel asperulæ, quaterna aut quina: minores etiam flores inter folia

Pena in
Advers.

YYY

herbacei, paruaq; bacca pipetis minores. Multum hoc collibus Rauoli, & Taurino Pedemontium collibus siluosis vicinis, & arduis Vegani Narbonensis Belgici hortis charum & multū. Vbi maior etiam in pratis siluosis sponte luxuriat. Ruri etiam Gallie & Germanie prouenit crebrius. Huius radix, auctore Dioscoride, coriis, vulneribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas delet in facie. Scribit Liba. sim. Galenus Polygonatum mistam habere tum facultatem, tum qualitatem: habet enim adstrictionem pariter & acrimoniam quidpiam, nec non fastidiosam quandam amaritudinem & plicatu difficilem. Quocirca nec admodum est vsui, sed

FLOS Tyridis,
Dodonei.



tantum quod radicem eius quidam vulneribus illinunt. Sunt etiam qui riuos in facie illo detergent. Hæc Galenus. Hodie mulieres ex Polygonati radicibus aquam stillatitiam conficiunt, qua ad faciem detergendam protolendamque pro fuce vtuntur.

FLOS TYGRIDIS.
CAP. XXXV.

DODONÆVS & Lobellius rarissimum flos Tyridis vocatum pinxerunt, quem nunquam vidisse tarentur, sed illius iconem tantum affabre coloribus expressam à D. Ioanne de Brancione communicatam, virentibus, oblongis, angustis, & acuminatis foliis, e pullo radice bulbo: flore luteo, exiguis quamplurimis notulis puniceantibus fortuito variato, cuius medio suauiter rubens stilus exoritur. Omnibus rei Herbarie studiosis ipsa planta hactenus incognita. Eius bulbus edulis fertur.

COIX.

CAP. XXXVI.

Locus.

Forma.



LANTAM hic exhibemus à Mycono missam & descriptam his fere verbis. Passim in pratis prouenit, altitudine dodrantali: caule unico, rotundo, geniculato, qualis est Tritici calamus, in quo folia prorsus Gramini similia, in summitate veluti Auenæ paniculi habent. Pro radicibus bulbi duo subsunt, minor maiori insidet, vterque candidus, dulcis Graminis modo, vt inde Graminis speciem esse colligere possis. Si tamen planta est a veteribus descripta, eam potius esse suspicatur Myconus, quæ à Theophrasto καλή dicitur, alicubi καλή mendose pro καλή. Etenim Coicem inter καλὴν καυλὸν & γυμνοκάλον, id est, ea quæ folium habent atundicæum & angulosum recenser. Quibus mox subiungit, folia hæc quasi ex duobus constare, & medium veluti carinam habere, vnde & ceteris meatus medius amplius porrigatur. Quæ folij forma graminibus competit, etsi folia habeant atundicæis minora. Præterea idem Theophrastus Coicem bulbosam generibus

Lib. i. hist. cap. 16.


Lib. 7. hist. cap. 4.

COIX, *Mycon.*

generibus adscribit, qui sunt radice rotunda, non squamosa. Quod huic plantæ conuenit. At duplicem radicem Coici Theophrastus non tribuit, quæ reuera in hac planta duplex censeri non potest, ut ex pictura iudicare licet: superior enim non bulbus, sed vestigium tantum & veluti bulbi rudimentum. Vulgare herbæ nomen & vsum Myconus se ignorare scripsit, audiuisse tantum lepores hac magnopere delectari, nocturneque eius radices effodere. Quibusdam τὸ ξῆρις, id est, Gladioli species à nostrate diuersi, quem depinximus, videtur esse, aliis Sisyrinchium, in quo explicando Theophrastus genuinam radicem adnotasse videtur. Quanquam aliud Sisyrinchium ex Dodonæo iam ostendimus. Quid si Aegilopa Plinij quis esse dicat, quam inter bulborum genera numerat?

Lib. 7. hist. cap. 17.

Lib. 19. c. 1.



HISTORIAE

OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS

SEXTVS,

(633)

In quo describuntur & ad vinum depinguntur Planta Cathartica.

MERCVRIALIS.

CAP. I.



RAETER differentias plantarum, quæ à locis natalibus & earum partibus sumuntur, de quibus hætenus egimus, alias esse diximus, quæ ab earundem facultatibus & viribus petuntur, de quibus hic tractare instituimus. In his maximè admirabilis, & misens mortalibus, qui tor ægritudinibus quotidie consiliantur, vtilissima, quæ *ῥαψανδία*, id est, purgatoria nominatur, vnde plantæ *ῥαψανδία*, id est, vi purgandi præditæ. Quid enim admirabilius, quàm stirpis particula aliqua deuorata, vel decocto aut succo epoto, humorem quempiam aut plures ab aliis secerni, attrahi, & vomitu aut ventris deiectione purgari? Quid vtilius, quàm ægros horum sarcina oppressos, vel praua qualitate cruciatos, hac ope veluti Deorum manibus subleuari, atque morbo liberare?

Quamplurimas huiusmodi munifica Dei beneficentia hominibus largita est, quas omnes nec nouimus, nec omnes à veteribus aut recentioribus memoratas cognitasve hic persequimur. Sunt enim multæ iâ sparsim locis idoneis explicatæ, & à quibus disungi non poterant, vt Daphnoides, Rosa, Rosa Damascena, Senna, Castia, Tripolium, Hippophaës, Hippophaëstis, Apios, Bryonia, Cnicus, Narcissus, Brassica marina, Brassica siluestris, Lactuca siluestris, Gratiola, Rhamnus purgatorius, Sambucus, Iris, Thapsia, Polypodiū, atq; alia quædam. Alias hic explicabimus, easque manifestè catharticas, & satis notas, à Mercuriali etiam muliereculis cognita exordientes. *Ῥαψανδία* & *ῥαψανδία* Græcis, & *ῥαψανδία*, vel *ῥαψανδία*, id est, Mercurij herba dicitur, Latinis Mercurialis, quòd a Mercurio inuenta sit, Gallis

Nomina.

Genera.

Forma.

Lib. 4. c. 189.

Lib. 4. c. 189.

Mercuriale & *Vignoble*, Italis *Mercorella*, Germanis *Ringelkraut*. Eius genera duo tradidit Herbarij, marem & fœminam, quæ semine internoscuntur, & folijs in mari nigrioribus, in fœmina candidioribus. Mercurialis, vt tradit Dioscorides, folia Ocimo similia habet, Helinx cognata, sed minora, ramulos duplici geniculorum nodo cinctos, alarum caua multa, densa: fructum fœmina copiosum, racemosum mas è foliorum sinu dependenrem, paruum, rotundum, ceu binos testiculos vna coherentes: frutex est dodrantalis aut minor. Plinius de eadem re paulo aliter scripsit. Linozostis siue Parthenium Mercurij inuentum est, idè apud Græcos Hermupoean multi vocant eam, apud nos omnes Mercurialem. Duo eius genera, masculus & fœmina, quæ efficacior: caule cubitali, interdum ramo in cacumine: Ocimi angustioribus folijs, geniculis densis, alarum cauis multis, semine

mine in geniculis dependente, fœminæ copioſo, mari iuxta genicula ſtante, rario-
ri ac breui contortoꝛque, fœminæ ſoluto & candido. Folia maribus nigriora, fœmi-
næ candidiora: radix ſuperuacua, prætenuis. Nafcuntur in campeſtribus cultis.
Hæc Plinius. In vinetis noſtris maximè prouenit, interdum tam copioſa & efficax, *Locus.*

MERCVRIALIS mas,
Matthioli.



MERCVRIALIS fœmina,
Matthioli.



vt vina etiam ſuo ſapore inficiat, & bibentibus ingrata reddat. Auguſto menſe ſe- *Tempus.*
mine prægnans eſt. Vtraque Mercurialis Medicis, ſeplafariis omnibus, atque
etiam mulierculis notiffima eſt ſubnitroſo ſapore, & nonnihil viroſo ſucco, pur- *Vires.*
gâte, & medicato, ad multa perquàm vtili. Vtraq; enim, auctore Dioſcotide, aliu
mouet, olerum modo comeſta, cocta in aqua, & ea epota bilem & aquoſa ducit.
Creduntur præterea fœminæ folia trita & pota, poſt purgationem pudendis ap-
poſita, vt fœminæ concipiantur efficere: maſculæ verò ſimiliter adhibitis, mares
generari. Plinius de medico vtriuſque vſu paulò aliter quàm Dioſcorides tracta-
uit, eundemque fuſius ex Hippocrate declarauit, qui etiã hodie in libris illius ex- *Lib. 14. c. 4.*
tat, maximè eo qui de ſtetilibus inſcribitur, & in duobus de morbis muliebribus.
Verba Plinij hæc ſunt. Mirum eſt quod de vtroque genere eorum proditur, vt
mares gignantur, hunc facere, vt fœminæ, illam. Hoc contingere ſi à conceptu
ſuccus protinus bibatur in paſſo, edanturq; folia decocta ex oleo & ſale, vel cruda
ex aceto. Quidã decoquunt in nouo fiſtili cum Heliotropio, & duabus aut tribus
Alijſpicis, donec percoquatur. Decoctum dari iubent, & herbam ipſam in cibo
altera die purgationis muliebris per triduum: quarto die à balneo coire eas. Hip-
pocrates miris laudibus in mulierum vſu prædicauit has. At hunc modum medi-
corum nemo nouit. Ille eas vuluæ cum melle, vel roſaceo, vel urino admouit. Item
ad ciendos menſes, ad ſecundaſq;. Hoc idem præſtare potu foruq; dixit. Inſtillauit
auribus olidis ſuccum, inunxitq; cum vino vetere. Aluo folia impoſuit & epipho-
ris. Seranguriz, & veſicis decoctũ eius dedit cum myrrha, & thure. Aluo quidem
ſoluendæ, vel in febris, decoquitur quantum manus capiat, in duobus ſexariis aque
ad dimidias: bibitur ſale & melle admixto, nec non cum vngula ſuis, aut gallina-

ceo decocta. Salubrius purgationis causa putauere aliqui vtramque dandam per se, siue cum Malua decocta. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum laedunt. Mercuriali, inquit Galenus, vtuntur omnes, ad ventris purgationes duntaxat. Verum si quis eius periculum facere voluerit in cataplasmate, sanè admodum eam esse digerentis expectietur facultatis. Hæc Galenus. Eius hodie in enematis frequentissimus est vsus. Et multis in locis Pharmacopœi multum vtuntur melle quod Mercuriatum vocant. Succus expressi libris tribus incoquant mellis boni libram vnam cum semisse, vel libras duas, ad enemata, & muliebria encathismata. Matthiolus obseruatum fuisse scripsit, vertucas omnis generis vtriusque Mercurialis foliis tosti, vel earum succo. Item vtriusque semen cum Absinthio decoctum ictericos mirifice iuuare: malis quæ serpunt succum cum aceto mederi. Quæ ante Matthiolum literis mandauit Ruellius.

CYNOCRAMBE.

CAP. II.

Nomina

Forma.
Lib. 4. c. 184.

Locus.

Tempus.
Cap. 167.
Lib. 4. c. 191.

YNOKPAMBH, vel κυνία, vel Ανοξιστος ἀγρία ὄψων Græcis, Canina braslica, Cynia, & Mercurialis siluestris mas Latinis dicitur, Italis Mercorella bastarda, Gallis *Chou-de-chien*, & *Mercuriale sauvage*, Germanis *Vundkingelkraut*. Cynocrambe, vt tradit Dioscorides, cauliculum binum dodratum altitudine emittit, tenerum, subalbidum: folia Mercuriali aut Hederæ similia, certis interstitiis, subalbidum: semen foliis adhæret paruum, rotundum. In siluis copiose prouenit. Semen Aprilis in se profert, Maio maturescit. Herbam hic pictam Fuchsius & Dodonæus pro Cynocrambe proposuerunt quibus assentitur Pena. Quæ, inquit, in tota Europa secus umbrosas vias, & in siluis vtilique locis, præsertim Septentrionalibus & minus calidis copiosissima oritur, & vulgò siluestris Mercurialis vocatur, tantam cum mare habet similitudinē, foliis per interualla binis, in geniculis, & semine testiculis simili, gemino, in pediculis longis, caulibus quadratis, tenellis, vt quin vera sit Cynocrambe nulli sit dubium. Rectis hæc binis, ternis, & interdum quaternis non alatis cauliculis prouenit: folia subpallida sunt, quàm Mercuriali longiora: sapor, & odor oleraceus, & subuirosus: radix latior humiq; serpens, ipsa. Tota facies Mercurialem esse testatur. Vnus eius nullus, tametsi optimus futurus ad ferolos humores & melancholicos educendos. Cynocramben eandē Matthiolus pictam dedit, quæ

In cap. 164.
lib. 4.Lib. 4. c. 184.
Vires.

Lib. 4. c. 76.

notis omnibus Dioscoridis delineationi respondeat, præter semen, quod foliis non adhæret. Quam ob causam dubitaran hæc legitima sit Cynocrambe. Dioscoridis sanè oratio *προσαλεῖται τοῖς πεδύλοις καὶ πῶσι* scribit, *μακροί, καὶ στρογγύλοι*: quod verum est, si *καρπῶν* non solum geminos velut testiculos intelligamus, sed præterea subnentem eos pediculum. Scribit Dioscorides caulem & folia pota, & olerum modo in cibo sumpta aluum cieri: eius decocta bilem & aquas detrahere. Huius Cynocrambes neque Theophrastus, neque Galenus, neque Paulus, neque Aëtius meminere. Verum Galenus, Paulus, & alij, atque etiam Dioscorides alterius Cynocrambes mentionem fecere sub nomine Apocyni, a superiore multum diuersæ.

STAPHIS

ΤΑΦΙΣ ΑΓΡΙΑ & ἀγρὶς ἄγρια, Latinis Herba pedicularis, & pituitaria. Officinis & Italis Staphisagria, Arabibus *Alberai*, *Habebrai*, *Almuhazagi*, *Muhbezgi*, Gallis *Staphisagrie*, & *Herbe aux poudieux*, Germanis *Bismjnez*, Hispanis *Fabaras paparas*. A foliorū diuisura, qua Labruscam, siue Vitē siluestrem imitatur, nomen duxit Staphisagria, id est, Vitis siluestris: pedicularis autem, siue pituitaria, à viribus quas habet. Pediculos enim necat, & commanducata fetuore suo multam pituitam trahit. Folia habet Labruscæ, fistula, cauliculos rectos, molles, nigros: totum feret Glasti: semen in folliculis viridibus, velut cicer, triangulum, asperum, ex nigro subfuluescēs, intus album, gustu acre. Ita descripsit Dioscorides, & sic breuiter Plinius. Astaphis agria, siue Staphis, (Vuam Taminiam vocant falso: suū enim genus habet) cauliculis nigris, rectis, foliis Labruscæ, fere folliculos veriū quā acinos, virides, similes cicēri: in his nucleum triangulum. Maturescit cum vindemia, nigrescitq; cum Taminæ rubentes notimus acinos, sciamusq; illam in apricis nasci, hanc non nisi in opacis. Hæc Plinius. Hodie in hottis nostris ferit. In Istria, Dalmatia, Apulia, Calabria copiosissimè prouenit, auctore Matthiolo. Æstare floret. Monspensuli quidem vbis nascitur. Hæc est omnium tum Medicorum, tum Officinarum consensu Staphisagria, cuius hodie vsus est ad eadem, quæ à veteribus præfcripta sunt. Verumtamen Dioscorides ei flores Isatidis tribuit, qui sunt lutei pallidive, cum Staphisagriæ sint extrulei, venusti, & stellati, in quinque, aut sex foliola diuisi. Est autem Glasti color intelligendus, non qualis visitur in Glasti flore, sed qualis sit Glasti succo, nempe subcæruleus. Eius grana decem aut quindecim, inquit Dioscorides, si trita in aqua mullā dentur, crassa per vomitus purgant. Sed qui hauserūt ambulare debent. Prudentet tamen animaduertendum est, vt aqua mullā continuò potui detur, quoniam strangulationis periculum inferunt, & fauces vrunt. Trita herba, & ex oleo illita aduersus

Nomina

Forma.

Ls. 4. capi.
Lib. 3. ci.

Locus.

In cap. ipsi
lib. 4.

Tempus.

Vires.

Ls. 4. capi.

STAPHISAGRIA,

Matthioli.



motbum pedicularem, pturitus & scabueni valet. (Hæc in veteti codice sic leguntur, *τρυφεῖς καὶ ἰσχυροὶ, καὶ ἰσχυροὶ, καὶ ἰσχυροὶ, καὶ ἰσχυροὶ*, &c. Id est, Trita per se, vel cum sandaracha, posteaq; ex oleo illita, &c.) Cit plurimam pituitam commanducata: decocta in aceto dentium dolori, si ea colluantur, subuenit: rheumatismum gingiuarum sistit: vlcera oris, (aphthas vocant) cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur. De iisdem ita dissest Matthioli. Plinius. His nucleis ad purgationem vti non consuevit, propter ancipitem strangulationē, nec ad pituitam oris siccadam: fauces enim lædunt. Phthiriasi caput & reliquum corpus liberant triti, facilius admixta sandaracha: item pruritu & psoris. Ad dentium dolores decoquuntur in aceto: ad autē vitia, theumatismū cicatricum, vlcerū manantia. Flos tritus in vino contra serpentes bibitur: semen enim addidit, propter nimiam vim ardoris. Quidā eam pituitariam vocant, & plagis serpentium vtiq; illinunt. Hactenus Plinius. In quibus quod dixit theumatismos cicatricū, perspicuē

Lib. 3. ci.

lapis est, vel corrupta sunt Dioscoridis exemplaria: non enim ὄλας, id est, cicatrices, sed ὄλα ῥευματικὰ, id est, gingivarum rheumatismos, siue gingivas fluidas dicere oportet ex Dioscoride, itemque vlcera oris depascentia. Alstaphis agria, inquit Galenus, vehementer acrem facultatem obtinet, adeo vt ex capite purget, quod ἀποφλεγμωδίζει Græci dicunt, abstergatq; valenter. Itaque ad psoram accommodata est. Sed & vrendi vim habet.

RICINVS.

CAP. IIII.

Nomen



IKI vel ῥίον Græcis, Ricinus Latinis, Mauritanis Kerua, Officinis nonnullis Cataputia maior, quibusdā Pentadactylon, & Palma Christi, Mesæ granum Regium, Italis *Girasole*, Germanis *Underbaum*, vel *Creatzbaum*, Gallis *Paume de Christ*, Hispanis *Figuera de inferno* dicitur. Croton autem & Ricinus à similitudine animalis, quod semen eius refert.

Lich. ca. 34.

Lich. ca. 10.

Est enim Croton Latinis Ricinus, inquit Plinius, animal eiusdem turpitudinis, infixo semper sanguini capite viuens, atque ita intumescens, vnum animalium, cui cibi non sit exitus: dehiscitq; nimia satietate, alimento ipso moriens. Nūquam hoc in iumentis gignitur, in bubus frequens, in canibus aliquando, in quibus omnium ouibus & in capris hoc solum. Et alio in loco. Minus mirentur hoc, qui sciunt foedissimum animalium quantum magnificent ricinum: quoniam vni nullus sit exitus sanguinis, nec finis alia quam morte (mendose, legendum enim, nec finis alia quam morte) diutius in fame viuenti. Septenis ita diebus durasse tradunt, ac in satietate paucioribus dehiscere. Palmā Christi vulgus vocat à foliorū digitata effigie, quæ volam palmamque expansis digitis quadantenus æmulatur. Ricinus, vt describit Dioscorid. arbor est parua Ficus magnitudine, folio Platani, maiore, leuiore & nigrior: ramis caudicibusq; cauis arundinis modo: semine in vis asperis, quod cortice nudatum, ricino animali simile est. Plinius de oleo facinus loquens, Proximum sit, inquit, & Cici arbore in Ægypto copiosa: alij Crotonem, alij Sesamum siluestre appellant: ibiq; non pridem. Et in Hispania repente prouenit

Lich. ca. 34.

Forma.

Lib. 37. c. 7.

RICINVS, Matthioli.



Locus.

altitudine Oleæ: caule terulaceo: folio vniuersim: semine vuarum gracilium, pallidarumque. Nostri cum Ricinum vocant à similitudine feminis. Coquitur id in aqua, innatansque oleum tollitur. At in Ægypto, vbi abundat, sine igne & aqua sale aspersum eximitur, cibis fœdum, lucernis vile. Hæc omnia nostra Palmæ Christi ita quadrant, vt nihil magis. Est enim ei caulis crassus, rotundus, cauis, quinque aut sex cubitorum, geniculatus: folia ampla, alterno situ in pediculo ficulneo hærentia, septenis & nouenis, altioribus diuisuris Ficus, Platani, Castaneæ equinæ, Sraphisagræ, vel Ellebori nigri, subnigra aut subærulea, pinguis: flores in summitate racematim compacti, quorum infimi luteoli sunt, & sine fructu pereunt, summi rubri & siliquas proferunt triangulares, in quibus terna grana, cinerea, phasiolis minora, medullofa, ac multum olei, si premantur, reddentia. Non nisi in hortis situs prouenit. Carpinur Autumno dum semine abundat. Clusius suis Annotationibus in Historiam simplicium medicamentorum

dicamentorum ex Occidentali India Nicol. Monardus scribit se vidisse in Hispania circa Malacam & Calpen ad fletum Herculeum, aliisque mariumis Baricæ locis, Ricini plantas crassitudine hominis, altitudine trium, multis prægrandibus ramis brachiaras instar aliarum arborum, qui iam illic tertio aut quarto quoque anno amputari solent, adamusimèq; cōuenire Dioscoridis descriptioni illas plantas asserit. Refert etiam Bellonius, magnas in Creta Ricini arbores se vidisse. Theophrastus aliarum arborum folia sibi ipsis similia esse scribit, sed Populi, Hederæ, & eius, quæ Croton vocatur, dissimilia, & figura diuersa: noua enim rotunda sunt, vetustiora angulosa, quod & alio in loco repetit. ὅσα τῶν φύλλων μακροθυλακτοῦς καὶ ἰσχυροῦς καὶ ἰσχυρὰ καὶ τὰ τῶν κροτωνῶν ἔστιν ὡς αὐτῶν φύλλα τὴν ἀρχὴν, ὥς ἴσται ἀποτυπώται, καὶ ἄλλοι ἀναμειβόμενα. Id est, foliorum transformatio etiam aliorum communis est, nam Crotonis nonnulla initio cum proueniunt, rotunda sunt, deinde in angulos formantur, tanquam perfectè articulata. Quod & Plinius adnotauit. Maxima foliorum vnitas in suo cuiq; genere permanet, præterquam Populo, Hederæ, Crotoni, quam & Cici diximus vocari. Huic vires istas reddidit Dioscorides. Ex semine Ricini oleum nomine Cicinum vel Ricinum exprimitur, ad edendum minimè aptum, alioqui tamen lucernis & emplastris vtile. Grana triginta, putaminibus purgata, trita & pota, pituitam, bilem, aquasq; per aluum extrahunt, vomitionesq; mouent. Sed iniucunda admodum est & molesta purgatio: stomachum enim vehementer subuertit. Tusa & imposita varos & faciei maculas à sole contractas expurgant. Folia cum polenta trita oculorum tumores & inflammationes sedant, mammasq; turgentes cohibent. Per se aut cum aceto illita, erysipelata restinguunt. Plinius de eadem re hæc tradit. Oleum Cicinum bibitur ad purgationes vëtris cum pari calidæ mensuræ. Priuatim dicitur purgare præcordia. Prodest & articulorum morbis, duritiis omnibus, vuluis, auribus, ambustis: cum cinere vero muricem sedis inflammationibus, item psozæ. Colorem curis commendat, capillumq; fertili natura euocat. Semen ex quo fit, nulla animans attingit. Ellychnia ex vna fiunt claritatis præcipua: ex oleo lumen obscurum propter nimiam pinguitudinem. Folia igni sacro illinuntur ex aceto: per se autem recedunt a mammis, & epiphoris. Eadem decocta in vino inflammationibus cum polenta & croco: per se autem triduo imposita faciem purgant. De eiusdem purgarrice facultate manifestius hæc scripsit Mesues. Ricinus calidus succo ordine tertio, Hamech in principio tertii. Pituitam ac interdum bilem valenter purgat deiectione, & vomitu, materias quoque & aquam serosam à iuncturis attrahit. Dantur autem grana eius cocta & trita in iure galli antiqui: conferunt colico dolori, & iuncturarum, vt podagræ, ischiad: aut coquuntur in aqua casei, aut lac caprinum super ea mulgetur & colatur, & datur hydropicis vtiliter. Oleum autem Ricininum colico dolori à pituita & flatibus confert. Quoniam ventriculo nocet, corrigitur assatione, & si coquendo semen Anisi & Fœniculi addatur. Ricini fructus, inquit Galenus, quemadmodum expurgat, deterget ac digerit, sic quoque folium, sed vndeque debilius. Oleum quod ex semine conficitur, tum calidius est, tum tenuiorum partium quam oleum commune: quare potentius quoque digerit.

ELLEBORVS ALBVS.

CAP. V.



ἘΛΛΕΒΟΡΟΣ λεῖκος dicitur à Græcis, à Latinis Elleboreus albus, & Verarrum album, Arabibus Cherbachem, seu Charbch Abaid, Italibus Elleboro bianco, Germanis Weisniefz wurte, Hispanis Herba de Ballesta, Gallis Ellebore blanc & Vraire. Elleborem autem dictum volunt, quod ebum corporis eripiat, Veratrum quod mentem vertat. Album à radice vocarunt, quæ cum nigri radice comparata, candida est. Elleborei albi & nigri tantum

Li. 1. 1. 1. 1.
cap. 11.
Li. 1. 1. 1. 1.
cap. 16.

Li. 16. c. 11.

Li. 4. ca. 1. 1.
Vires.

Li. 33. ca. 4.

Li. 1. 1. 1. 1.
cap. 13.

Li. 7. simpl.

Nomina

Genera.

Elleboro subdire cum aceto, vnde etiones elidunt. De vtroque Elleboro simul Galenus & Plinius differunt, quæ proximo capite explicabuntur. Atum Mesues mortiferum esse prodidit, quod facile homines suffocare possit, ideoque prorsus tenendum. Matthiolus tamen scribit antiquos Medicos albi Veratri puluerem propinasse comitialibus, melancholicis, vertiginosis, infantibus, lymphaticis, convulsis, podagricis, hydropicis, elephantis, sed nunc eius usum exoleuisse, quod eius pulvis, non sine periculo dari possit, quamvis eius diluto multi absque incommodo vtantur. Id dilutum se melancholicis quibusdam exhibuisse testatur, nullo eorum incommodo. In lixiuio decocta eius radix pediculos & lendes necat. Decoquitur in lacte ad mûscas perimendas cum enim degustauerint, paulo post moriuntur. Mures quoque necat & gallinas. Paratur ex earundem radicum succo arte quadam præstanteum venenum, quo quibusdam in locis venatores sagittas inficiunt. Id, ut sæpe in brutis animantibus & pullis galinaceis se periculum fecisse Matthiolus affirmat, vbi sanguinem contigerit, facto sagitta ictu vulnere, paulo post vulneratum animal interit. Sed id per mirum, quod deuoratum id venenum, nisi magna quantitate, nihil ferè incommodi adfert, eoque ipso vesco venatores affirmat Hispani, cum purgationes moliri cupiunt. Quare nihil mirum, si ferinz carnes hoc veneni genere infectæ, nihil comedentibus obstant. Vnde vbi facto à iaculo vulnere sanguini se commiscuerit venenum, nulla alia antidoto seruari potest animal, quàm deuoratis malis cotoneis. Id quod à Celsæ heremado primum audisse ait. Hac de re Hispanus quidam venandi peritissimus, rogatus, ita scripsit, Celtiberos, seu Nauarros succum albi Veratri seruare in valis carnis, aut hincilibus fuso lythargyro subtilis, donec exactè fermentescat. Id cognosci hinc incuncto, & inserto acui, si rana transfixa moriatur: celerius enim interire animalia cetera cum sagittis eo succo illitis vulnerata fuerint: venatores stuparum eo succo tributarum puluillo ferrum sagittarum cum hastulæ parte quadam obuoluere, ne humore siccescente vis exhalet: integris viribus succum diu custodiri, si mala Cydonia, vbi reponitur, nulla fuerint, quia Cydoniorum odor vim eius obtundat: illam autem relictam mixtis vix bene maturæ acinis collisis, aut pipere trito & iniecto: quamvis feris perniciosum id venenum sit, occisurum tamen carnem esse tenetorem, ac suauiore, illam præsertim, quæ circa vulnus est. Lobellius scribit esse Ellebori albi differentiam ex vario flore, albo, subniridi, & ex albo rubente in horto Murtoni: quod postremum ante aliud germinat, foliis etiam maioribus, latioribus & longioribus. Ex horum medio caulis exit tricubitalis, aut amplior, in quo flores non albi, sed ex atro rubentes stellati, quibus succedit semen foliaceum alterius æmulatione: paucioribus fibris radix longior donata: cuius peculiari icone opus non est, cum sola sit in floribus differentia.

ELLEBORVS NIGER. CAP. VI.



ΕΛΕΒΟΡΟΣ μέλας, Μελα: πύδιον, ἐκ σφοι, πολύρριζον, & μελα: ὀφύζον
Græcè dicitur, Latine Elleborus niger, & Veratrum nigrum, quibus-
dam Luparia, Arabicè Cherbachem, seu Charbach Afrod, Italicè Elleboro-
nem, Gallicè Ellebore nou. Melampodium, auctore Dioscoride, quod
Melampus caprarum pastor Præti filius furoris correptas eo purgasse, ac sanasse
creditur. Recentiores Ellebori nigri species aliquot faciunt, vt ex sequentibus per-
spicuum fiet. Is, vt d'pinxit Dioscorides, folia habet viridia, Platani foliis similia,
sed minora, ad Spondylii folia accedentia, pleribus incisuris diffla, sed nigriora,
subaspera: caulem asperum: flores albos, purpureos, racematos cohærentes: semen
Cnici, (in Anticyra Sesamoides vocant,) quo deiectiones moliantur: radices
subtunc tenues, nigrae, veluti à quodam capitulo Cepæ simili prodeuntes, quarum
est usus.

Nomina

L. 4. c. 246.

Genera.
L. 6. c. 146.

Locus.

Eloc. 9.

Lib. 3. c. 6.

Lib. 3. hist.
cap. 10.

Cap. 10.

est vsus. Nascitur in asperis, editioribus, ac siccis locis. Optimum quod ex humil-
modi petitur terris, vt ex Anticyra. Nigrum ibi probatissimum gignitur. Eligi de-
bet corpulentum & plenum, in quo tennis sit medulla, acre gustu feruensque. Plinius de eodem hac tradit. Melampodis fama diuinationis artibus nota est. Ab hoc
appellatur vnum Ellebori genus Melampodium. Aliqui pastorem eodem nomi-
ne inuenisse tradunt, capras purgari pasto illo animaduertentem, datoq; lacte ea-
rum sanasse Prætidæ furentes. Genera prima duo sunt, candidum & nigrum. Hoc
radicibus tantum intelligi tradunt pleriq; Alij folia nigri Platani similia, sed mi-
nora, nigrioraq; & pluribus diuisuris scissâ. Vtrumq; caule palmi ferulaceo, bul-
borum tunicis cōuoluto: radice fimbriata Ceparum modo. Et aliquantò post. Ni-
grum alij Entomum vocant, (Dioscorides Ecistomum) alij Polyrrhizon. At verò,
vt Plinius in his cū Dioscoride de Elleboro utroq; consentire, ita Theophrastus
dissentire videtur. Scribit enim: ὁ δὲ ἐλαλίβορος, ὃς τε μέλας, καὶ λευκός, ὡς περ ἡ αἰώνια
φαινή. περὶ δὲ τῆς ὕψους διαφέρουσιν. οἱ μὲν γὰρ ὁμοίους εἶναι, πολλὰ τὴν χειρὶ μόνον δια-
φέρει. τὴν γὰρ ρίζαν τὸ μὲν λευκὴν, τὸ δὲ μέλας. οἱ δὲ τὴν μέλανος ὅσον ὅσον διαφέρει, τὸ
δὲ λευκὸν παρασώδεις, τὰς δὲ ρίζας ὁμοίας, πολλὰ τῶν χειρὶ μέλαν. οἱ δὲ ὁμοίως λευκὴν, τὰς δὲ
ρασι εἶναι τῇ μορφῇ καὶ αὐτὴν δὲ ἀνθερὰ ὡς, βραχὺν σφῆδρα φύλλον δὲ πάλιν τῷ χειρὶ, ὡς
τὸ τῷ νάρθηκος, μῆκος ἔχειν ὡς ὡς, ὅθεν δὲ οἱ τῆς ρίζας ἡρτημένοι τε καὶ ἐπὶ τὸν φύλλον, σ-
κλήρῳ δὲ ὡς μάλα, τὰς λεπτὰς καὶ χηρὰς. Id est, Elleborus niger & albus velut
homonymi esse videntur. De figura varia sentiunt. Alij enim similes esse aiunt,
sed colore tantum differre: huius enim radicem albam esse, alterius nigram. Alij
nigro folium Lauri, albo Porri tribuunt, radices autē similes dempto colore. Quia
similes putant, talem eorum figuram esse dicunt: caulem Antherico similem, sed
valde breuem: folium latè fissum, Ferulæ simile, bene longum, statim à radice pro-
dens, & humi sparsum: radices multas prætenues, atque viles. Et paulò supra as-
psit Elleborum κατὰ τὸν ἐχθρὸν σφῆδρα, id est, fructum ferre Selsam similem. Quæ
cum Dioscoridis descriptione haud conueniunt, qui nigro Elleboro Platani
folia & Spondylii, Theophrastus Lauri tribuit.

ELLEBORVM nigrum,
Marth. flore purpureo.



In cap. 146.

cap. 4.

Lib. 3. hist.

flore purp.

At si Theophrasti locus is diligentius expen-
datur, haud alium quàm Dioscorides Ellebori
delineasse videbitur. Cum enim nigri folium
ait esse διαφύδες, albi παρασώδεις, subaudiendum
τὴν χειρὶ, vt de colore intelligat. Quid enim
ineptius, quid tam graui auctore indignus, quàm
Elleboro vlli Porri folium assignare? Cum autē
vtrique Ferulæ folium tribuit, tam absurda
comparatio demonstrat locum hunc vitæ
esse, quia veterum nullus Verari folium Feru-
læ folio comparauit. Quare locus hic videtur
emendandus. καὶ αὐτὸν δὲ ἀνθερὰ ὡς, ὃ ὡς τὸ τῷ
καρπῳ, βραχὺν σφῆδρα, φύλλον δὲ πάλιν τῷ
χειρὶ, vt apud Dioscoridem legitur, παρασώδεις
μῆκος ἔχει, &c. Id est, caulem Asphodeli, aut Fe-
rulæ similem, sed valde breuem: folium inuolu-
tissum, &c. Quam lectionem Plinius confirmat
his verbis. Vtrumq; caule palmi ferulaceo, &c.
Ellebori nigri tria libi nota esse genera scribit
Marthiolus: primum, quod flores fert pu-
pureos: alterum, quod candidos: tertium, quod her-
baceos. Ei, cui flos est purpureus, numerosi sunt
folia

folia, robusta, saturatè virentia, septena simul ex apice canaliculatiq; pediculi prodeuntia, quorū sena, vtrinque videlicet terna in exortu coniuncta sunt: quod medium est, solū, & sine comite est. Caulē habet cubiro breuiorem, rotundū, glabrum, ac solidum: flores Rosarum effigiē, in purpura albicantes, e quorū medio inter alba quxdam capillamenta, octo exoriuntur liliq; parit, coniuncte, corniculorum figura, in quibus semen oblongū. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, longis, saturatè nigricantibus, tenui intus matrice, a bulboso capitulo, vnde caulis exit, prodeuntibus, amaro acriq; gustu, & qui faciliē stomachū moueat, odore insuauī, & ingraro, præsertim cum exenteratæ radices siccescunt. Ab hoc facie nihil distat Elleborus is, cui flores candidi, nili florum colore. Eandem plantā pro gemino Dioscoridis Elleboro agnoscunt Pena & Lobellius. Niger Elleborus, inquit ille, iam plurimus ex Pyrenæis & Alpinis in hortos translatus ineunte Hyeme, vel paulo post brumam flores profert, in candore roseos, interdū albos, nonnunquam purpureos, e pediculis statim a radice ortos, Cyclanini modo. Folia habet in singulis pediculis maiora, breuiora, rotundiora, & retusiora, sapernæ, quæ duntaxat paululum crenata sunt, ex atro viridia, totius crassa, aut rigida. Radix inexta, & intricata innumera fibrarum nigrarum stibole, eodē fermē superno complexu apertā, amara valde & ingraua. His reclinat nota vna a Dioscoride posita, nempe florum *το γυναικῶν βοτάνης*, id est, florum forma & statim coherens. I, autē in vero Elleboro sunt primū Rosarum compressum & nodum reclusum, deinde expansum effigie, quæ figura a racemosa multum abest. Quare non *βοτάνης* in Dioscoride periti quidam legendum censent, sed *βοτάνης*, facili lapsū in tanta nominum affinitate, id est, comæ, siue capilli in modum. Sunt enim *βοτάνης* siue *βοτάνης* cirri muliebres, capilli, cæcæ, & plexus muliebres, quæ scitè exprimūt in medio florum Ellebori velut Rosarum capillamenta, alba, deinde siliquæ octo parit coniunctæ. Præterea caulem *τραχύον*, id est, asperum, Elleboro nigro tribuit Dioscorides, qui in nostro glaber laxusq; est, non asper. At *τραχύον* etiam rigidum

Elleb. nig.
siue albo.

ELLEBORVS niger
III. Matthioli.



firmumq; exponi posse Pena putat. Tertius Elleborus, quem Matthioli faciminā, aut Pseudoelleborum appellandum censet, habet folia digitorum nouem instar ad pediculum vsq; dissecta, Aconiti cynoctoni ferè modo, sed longioribus diuisuris, nigricantia, vndequaq; serrata, & è longo planoq; pediculo, caua per medium excurrente linea ortum ducentia. Caulē edit vegetum, subasperum: flores cæteris similes, sed herbaceo colore subuitides, quinque, aut plures, emergentibus è medio corniculis acuminatis, & vtrinque compressis, in quibus semen. Radicibus cohaeret numerosis, tenuibus, palmā longitudine, ac etiam longioribus, colore nigricante, ac perinde vt in aliis è cepaceo capitulo enascentibus, odore similiter graui, & sapore amaro, acuto, ac nauisam inouente. Nascitur in montibus & conuallibus. Germinat omnia hæc Ellebori genera Ianuario, ac Februario mensibus, & sæpe germinādo nives perforant: florēt Martio. Dodonæus Ellebori nigri nomine tres plātas complexus, primū genuinum Dioscoridis Elleborū nigrū esse asserit, cui folia aspera,

Locus.
Tempus.

Elleb. nig.
Dodon.
Lib. 3. hist.
cap. 16.

nigricantia in quaternas, aut quinas crenas profundius fissa, Viris, aut, vt Dioscorides ait, Platanis foliis similia, sed minor: caules læues, è quorum verticibus flores acervatim exeunt in parvis umbellis, veluti in Scabiosa, dilute purpurei: deinde semen grano iritici haud absimile: quamplurimæ subsunt fibræ, tenues, longæ, nigrae, ab vno capitulo prodeuntes. Idem Dodonæus alio in libro eundem Elleborum nigrum verum Dioscoridis esse, non Theophrasti, pertinacius astruit, eiusque descriptionem ei ad amulum quadrare contendit, caulem asperum illi tribuens, quem illic læuem esse dixerat. Præter formam vires etiam cōuenire ait. Sed illi hominem torquet, quod scribat Dioscorides semen Ellebori nigri in Anticyra Sesamoides vocari, eiusque ad purgationes usum esse: ideo hanc lectionem vitariam esse opinatur. Nam si Sesamoides, inquit, a Sesami similitudine nomen habet, improprie Veratri nigri semen, non Sesami, sed Cnici æmulum, Sesamoides nuncupabitur. Ex his colligit aliunde hæc verba Dioscoridi accessisse, & fortasse ex Theophrasto translata: scilicet ita enim, *ἡ δὲ ἄλληλος ἐπιτεταται τὰς ῥίζας, ἢ τὴν καρπὸν ἔχει*, *ἡ δὲ ἄλληλος ἐστὶν ἀπὸ τοῦ φασί, τὴν καρπὸν ἔχει ἀπὸ τοῦ φασί, ὅτι δὲ σπέρματόν τ' ἐστὶν.* Id est, Elleborus ad eadem & radice & fructu utilis est: huiusmodi in Anticyra, vt aiunt, si ad eius purgant, quæ Sesamo similem fert. Et aliquando post, *ὡς δὲ ἀπὸ τοῦ τῶ σπέρματός ἐστιν*, *ἡ δὲ ἄλληλος ἐστὶν ἀπὸ τοῦ φασί, τὴν καρπὸν ἔχει ἀπὸ τοῦ φασί.* Id est, Anticyrenses Sesamoides Elleborum propinant, cuius fructus Sesamo similis est. Hæc verò non ab alio Dioscoridi adscripta, vt arbitrat Dodonæus, sed ab ipso met Dioscoride ex Theophrasto mutuo sumpta fuisse non dubito, cum scribit, *ἡ δὲ ἄλληλος ἐστὶν ἀπὸ τοῦ φασί, τὴν καρπὸν ἔχει ἀπὸ τοῦ φασί.* Quæ sic vult Ruellius. Semen Cnici, quod in Anticyra Sesamoides vocant, quo purgantur, moluntur. Hæc si rectè intelligantur, vera sunt, & legitimi Ellebori fructus uocem referunt. Nam fructum Sesamo similem, auctores illi non semen, sed aliquam integram intelligunt, in quibus inclusum semē est Cnico simile: quas similes si quis in his Elleboris cōtemplari potes quos depinxit Matthiæolus, nō in eo quæ Dodonæus legitimum Dioscoridis Elleborū nigrū statuit. Hæc nota, atque alix quædam in eo desiderētur, illegitimus Dioscor. Elleborus niger habendus est Santicula scemina Fuchsi. Astiantia nigra Gesnero. Alteram plantam veni Ellebori nigri viribus parū dissentientem posuit Dodonæus, quæ à Belgis *Heylichkesterwort*, id est, Herba Christi aut natalitia dicitur, quod pro me clemētiore ad Domini natalem diē floreat, quibusdam Planta Leonis. Huic folia sunt lata, spissa, in septenas, aut octonas partes diuisa, quarum singula oblonga, acuminata, quæ me vtrinque à medio sursum versus ferratos: caule ceteri flores in pediculis palmum altis è radicibus erumpunt, magni, primi nivesci & venusti, deinde purpurascētes, postremo virentes, cū videlicet è mediis staminibus luteis exoritur siquæ increuerint, quatuor aut quinque contunda, in quibus semen. Pro radicibus multæ sunt & fibræ, nigrae, in quibus medius tenuis nescio quid. Tertium genus Dodonæus Elleborum nigrum adulterinum cū Fuchsi nuncupat, à *Heilichkesterwort* appellatū, à Belgis *Heilichkesterwort*, quæ vox Herbam ignis significat, quod quadrupedum

ELLEBORVS niger,

I. Dodon.



Elleb. nig.
II. Dodon.

Elleb. nig.
III. Dodon.
Caus.

ELLEBORVS niger
III. Dodonaei.**ELLEBORVS niger**
adulterinus siluest. Fuchsi.

morbo, quē *gñē* *gñē* vocat, medeatur. Superiori quā *tātenus* similia sola habet, minora, in multa etiā alia nouena scilicet diuisa, angustiora, toto ambitu vnde quaque ferratū cauē pedalem, aut maiorē, cacumine in ramos diuiso, à quibus flosculi deorsum nutantes dependent, minores, coloris ex pallido herbaceo, & uor etiam, aut quinque siliquarum paruum succrescunt, sunt nigrae & rotundū contineat. Radices siliquarum tenuiores, & nutantes, inter se se impleant. Enneaphyllo Plinij esse quibulā de his placet. Enneaphyllo, inquit, longa folia nouena habet, caulicula naturae. Et Eleborus niger terris Matthioli, flore herbaceo. Fuchsius Eleborum nigrum genuinum Dioscoridis non desolant, sed adulterinum genera duo. Primum, Eleborum nigrum adulterinum hōtē, quod tenui esse Dodonaei modo diximus. Alterum, Eleborum nigrum adulterinum siluestre, quod Germani *Leuzkraut*, id est, pedicularē vocat, quod petroselinū interimat. Hunc Eleborum ter Aconita ecclet, & Lycodanum primum appellat in libro Eleborum nigrum modo facit, prout me descripto nō admodum dissimile. Caulē proceriorē habet & crassiorē: folia minora & angustiora, in sena, vel septena alia diuisa, ambitu vndiq; serrato: flores magnitudine superioris, pallidos: siliquas paruas, desimo similes, in quibus semē radicē lignosam, breuē, cū folis plurimis & subnigris. Nascitur in montibus asperis & petrosis, atque inter fēpes. Hyeme aut eius sine flet. Allobroges *Majore* vocat. Tragus Eleborum nigrum adulterinum eundē cū priore Fuchsi posuit, genuinum vero longē alium, tenerrimis videlicet foliis, Abrotoni exiguit, vt mox dicemus. Eleboro affines sunt Eleborastri & Consiliginēs, sic dictae à rusticis, quod in aruis inter Siliginē frequentissimē reperiatur, vel fortasse quod cierent alium. Matthiolus plantā hic appictā Consiliginē esse suspicatur, nō asserit: quoniam nullus tum veterū, tum recentiorum Consiliginis notae memoriæ prodiderit. Verū quia huiusce plantae radices per aurículas pecorum perforatas insertae, à pulmonaria, atque aliis morbis ea liberat, Elebori nigri modo, suspicio est Columellae & Plinij Consiliginem esse. De hac sic Columella. Praesens remediū cognouimus radicū, quā Lib. 6. cap. 5. pastores Consiliginē vocat. Ea in Maris motibus plurima nascitur, omnique pectori maxime est salutaris. Læua manu effoditur ante Solis ortū: sic enim lecta maiorē vim habere creditur. Vfus traditur talis. Aenea subula pars auriculæ latissima circūscribitur, ita vt manāte sanguine tanquā O litorū ductus appareat orbiculus.

Hic & intrinsecus, & ex superiore parte auriculæ con factum est, modica pars de
 seorsum cili eadem subula transfertur, & facio toramini præd cta iadicta infe
 ram, quam cum recens plaga comprehendit, ita continet vt elabi non possit. In
 eam d inde auriculam omnis vis morbi, pestilensque virus elicitur: deinde pars,

PSEUDOELLEBO-
rus, sive Confilago Matth.



ELLEBORASTER
*maximo flore & semine
 præmans.*



quæ subula circumscripta est, demouit exidit,
 & in minimæ partis iactura caput consecratur.
 Primus. Nostri ætatis meminit herbam in Mar
 sis repertam. Nasclitur & in Aequiculis circa vi
 cum Neruesiz, Confilago vocatur. Et radix her
 bæ Confilaginis, quam nuper inuestigamus, suu
 quidem & p. oro omnis remedii
 præfens est pulcherrima vis, vel tractata in
 in auricula. Bibi debet ex aqua, habetique me
 abidue sub lingua. Iusta itaque, eius ha
 goe præstata est, iue sit Confilago, siue Pseudo
 leboris, ad duorum palmorum altitudinem as
 surgit, auriculos proferat tenues ac molles, lu
 longiuscula, tenuia, quadatenus Abro: nullo
 res Buphtali lini paulo maiores, ex quibus
 tula prodeunt oblonga, non Ruborum
 radicibus nititur nigris, nigro Ellebori
 bus, tenui ribus, & aiquantibus
 bus. Plurima nascitur in Boemia prædictum
 agro Pragensi. Ex utuntur illic tum Moxi
 con pharacopæi omnes pro Elleboro
 posuerunt ad peccata morbos nigræ
 cellu. Tunc leguntur Elleborum
 perpetam esse valde, diximus, alij Elle
 setulaceum Theophrasti. Sed iam ostendimus
 Elleborum Theophrasti à Dioscoridis El
 ro diuersum non esse. Celsæro Setaroid
 nus est hæc planta, Dodonæo & A
 Buphtalmum. Elleborasterum, siue Confil
 nem genuinam tradunt Vna & Lolobus
 ximant, quæ in septem reperitur pascu
 Biturigas, & variis aruis Vulgari
 vocant) Gallie Aquitanie & Neob
 iuxta Ladum amnem Montipho vi
 piofo prouenit foliorum florumq.
 ducti sesquicubitalis geniculatos, squ
 ex viridi nigricante vel atra, in alas multas
 uis, quæ denta folia fulciunt, singule
 leuiter crenata, digitata, Lupini, Platani, vel Vi
 ticus diuisora & figura, sed longiora, crassa, n
 da, odore & sapore ferè Laureolæ. Porrig
 inde multiplices pediculi, qui in flores
 ceos, vel buxeos, pallentes, rugosos, riu
 plicantur. Deinde succrescunt cernicula
 ranosa, pallentia, quadatenus Aquileg
 mena teres, atrum, oblongum, grano Tr
 na

nus, recludentia Sole Arietem ingresso. Pereuntes bruma frigidissima etiā Sepren-
tionalibus perstat, florētque Chriti natalibus ferē. Altera Consiligo minor est Consiligo
Belgarum.
tota, paucioribusque caulibus, & foliis, sed maioribus & latioribus n. gisq; ferra-
tis. Hæc nihil aliud est quā Elleborus niger Matthioli flore herbaceo, Consiligo
Ruelli, Sesamoides Cordi, Elleboraster Belgarum Lobellio. Annotat Pena nostra
memoria pharmacopæos utraq; Consiligine vsos fuisse Ellebori nigri penuria
& ignoratione, nonnullos etiam quod verum Elleborum nigrum esse sibi per-
suasisse: quæ tamen si ad illum non parum accedunt, tamen ei neutiquam tutō in
vsu medico substitui possē. Superest vt Ellebori nigri vires explicemus. Purgat, in-
quit Dioscorides, (legendum τῆς γῆς καὶ τοῦ αἵματος ex Plinio, Purgat per inferna. Pituita
& bilem detrahit datus per se, aut cum scammonia, & tribus obolis, siue *Consiligo*
salis: decoquitur etiam cum lente & iusculis, quæ purgationis causā sumuntur
Prodest epilepticis, melancholicis, insipientibus, arthriticis & resolutis. Menses
inditus trahit, partus enecat, purgat fistulas impositus, & post tertium diem exem-
ptus. Item contra grauitatem auditus in aurem immittitur, ibique in alterum, aut
etiam tertium diem esse finitur. Scabiem sanat illitus cum thure, aut cera, & pice,
cedrinoq; oleo: vitiliginēs, impetiginēs, lepras ex aceto sanat: coctus cū aceto do-
lorem dentium collutione mitigat: erodentibus medicamentis commiscetur: ex
eo, farina hordeacea & vino vtile fit hydropicis cataplasma. Consitus prope vitū
radices, vinum purgatorium efficit. Ipso domos respargunt, expiandi vim habere
putantes: quare cum effodiunt, stantes Apollinem & Aesculapium precantur, vi-
taures aquilam, aduolare enim non sine periculo aiunt, quia mortem adfert auis,
si Ellebori effossionem conspexerit. Celerriter autem effodere oportet, quoniam
capitis grauitas ex odore oboritur: quapropter qui effodiunt, ad id arcendū Alliū
edunt, & vinum bibunt, ita nulli noxæ oportuni redduntur. Emedullatur Veratri
albi modo. De vtriusque Ellebori vsu multa præclare à Plinio literis madata sunt. Lib. 36. c. 1.
Nigrum, inquit, purgat per inferna. Candidum autem vomitione, causasq; mor-
borum extrahit, quondam terribile, postea tam promiscuum, vt plerique studiū
gratia ad peruidenda acius quæ commetabantur, sepius sumptiauerint. Carnea-
dem respersurum Zenonis libris, Drusum quoque apud nos Tribunorum popula-
rium clarissimum, cui ante omnes plebs stans plaussit, optimates verò bellū Mar-
ticum imputauere, constat hoc medicamento liberatum comitiali morbo in An-
ticya insula. Ibi enim tutissimè sumitur, quoniam sesamoides admiscet. Farina
eorum per se, & mista radícula qua lanas diximus lauare, sternutamentum facit,
amboq; somnum discutiunt. Nigrum medetur paralyticis, insipientibus, hydro-
picis, dum citra febrem, podagris veteribus, articulariis morbis. Trahit ex aluo bi-
lem pituitasq;. Ex aqua datur ad leuiter molliendam aluum, plurimum drachma,
modicè quatuor obolis. Miscuere aliqui & scammoniam, sed tutius scilem. In dul-
cibus datum copiosius periculum infert, oculorum caliginem foris discutit:
ob id quidam & inunxere trito. Strumas, suppurata, durities concoquit & purgat:
item fistulas terria die exemptum. Verrucas tollit cum squama aris, & sandara-
cha. Hydropicorum vètri imponitur cum farina hordeacea, & vino. Pecorum &
iumentorum pituitas sanat, surculo per aurem traiecto, & postero die eadem ho-
ra exempto. Scabiem quadrupedum cum thure, aut cera ac pice. Album optimū
quod celerrimè mouet sternutamenta, sed multò terribilius nigro, præcipuè si
quis apparatus porutorum apud antiquos legat, contra horrores, strangulatus, in-
tempestiuas somni vires, singultus infinitos aut sternutamenta, stomachi dissolu-
tiones, tardiores vomitus, aut longiores, exiguos, aut nimios. Quippe alia dari so-
lita, quæ concitarent vomitiones, ipsumq; Elleborum extraherent medicamentis,
aut clysteribus, sepe etiam sanguine venis emissio. Iam verò & cū prosperè cedit,

ex passo & in oxymelite: verū suauitatis gratia qua dā ex odoratis seminibus sunt inferenda. Si verō efficaciorē cupis purgationē, scammonij pauillū adducito. De vtriusq; etiā vīū distinctē admodū scripsit Mēsius his ferē verbis. Elleborus duplex albus & niger, idēq; albo salubrior: quā & albus lyapromata terra hila minatur: niger autē corpus incolume, & velut iuuenile tuetur. Calidus est & siccus ordine tertio, tenuat, terget, resoluit, carnē vlcēibus superexcrecentē exedit. Adde quod si ad arboris alicuius radices crescat, fructus ipsius purgatorios reddit. Albus calidus siccus in medio tertij, similiter terget, mordet: sed vomitu multo purgat, & lternutamenta valenter mouet. Vitandus autē hic est, quod strangulet. Niger autem omnium consensu sumendus, præsertim castigatus natura & arte: folijs robustis & animosis dandus, & Vere ipso. Datus autē quando & cui conuenit, temperamētum melius: ob id inores quoq; probatior reddit, & corpus incolume ac velut iuuenile efficit. Hæc enim propria ipsius sunt opera. Corpus enim totū excrementis corruptis expurgat, elementer ac sine molestia vacuat bilē vtramq; & pituitā: sanguinē proinde puriorē reddit, attrahēdo scilicet excrementa in venis mista, nō a folijs catuantur partiū, sed a toto corpore, & a remotis partibus, & cute ipsa. Ad cerebrū quoq; purgandū, & caput totū, & sensuū instrumēta, & neruos & viscera, & vesicā & vterū est efficacissimus: cerebri quoq; affectibus, vt cephalalgia, hemictanē, mania, melancholia, vertigini, epilepsia, paralyti, aqua vī in oculos defluxui apertē cōfert, iuncturarūq; quoq; morbis, vt nodis, & tumoribus cum hōis, lstrumis etiā. In summa est velut Theriaca, & per antonomasiam medicina caecæ, elephatiæ, herpetis, erysipelatis, exāthematis, phagedenarū. Puluis quoq; tenuissimus Ellebori nigri vī suū roborat. Acetū quoq; cum hoc decoctū, auri instillatū tinnitui cōfert, & auditū roborat. Idē acetū, si os colluatur, dentium dolori confert: præterea splenis affectibus, febribus diuturnis, quartanæ biliosæ, reliquis affectibus melancholicis sanatu contumacibus: urinā & menses mouet: corporis colorē & odorē bonum efficit, ac etiā oris. Cutis affectus, alphas vtroscq; quouis vīdī modo sanat: ex aceto affrictus curi, eius scedritatem & panos delet. Albus autē vomitu inmodico & violēto symptomata excitat horrēda: foris autē affrictus cutis vitia, scabiem, im petiginem, lentigines valenter auat. Vterq; autē fistulis & vlcēibus putridis ac malignis medetur. Albus autē quia huius tēpestatis corporibus est molestus, quin & velut venenum præsertim suffocans vitatur. Nigri autē virtus ad nostra vīq; tēpora est tolerabilis, licet etiā difficilis. Sanis etiā corporibus Elleborus est molestus, inquit Hippocrates. Arte autē & industria nostra castigatū quādo, & cui conuenit rectē propinamus, agitq; salubriter. Filius autē Zesar manna melli simili, tepida, quantitatē corticis radicularum Ellebori aptam horis octo macerat, colatū dat, in quo virtus est Ellebori. Idē fit in melle vī: passæ aut iure gallinarū vel carniū, aut oxymelite, aut vino dulci, aut condito, aut syrupo, aut sapa aliqua, superaddentes polentam vel orizam, aut pulcem, & sorbēdum ita datur. Sunt qui in radicem Raphani perforatam Ellebori fibras immittūt die vno, post die fibris ablatis dant Raphanum Ellebori vires habentem. Daucus item & piper longum, anisū, petroselinum, hyssopus, succus Calaminthæ, origanum, succus Cyrenæicus efficaciorē ipsam reddunt: & præter hæc Epithymum, Polypodium, sal Indus & similia: sese enim hæc confirmant. Ex hoc catapotia formauit Haly ad affectus melancholicos, elephantiæ, alphas nigros contumaces efficacissima, quæ recipiunt Hiræ picæ drach. duodecim, Ellebori nigri, Polypodij ana drach. quinque, Epithymi, Scæchadis ana drach. septem, agarici, lapidis Cyanei, salis Indi, Colocynthidis ana drach. tres. Dantur tutō a drach. vna ad aureos duos. Vtriusque autem Ellebori virtutem ex corpore deturbat mulsā, decoctum vuarum passerum, aut hordei, aut gallorum, aut gallinarum, cum oleo nucum, vel amygdalarum dulcium, vel simili:

puluerem verò Ellebori sumere tutum non est. Datur autem a siliquis sex ad tertiam drach.vnius, vel vsque ad drach.vnam.

TITHYMALI.

CAP. VII.

Nomina



ΤΙΘΥΜΑΛΟΣ & Τίθυμαλον Græcis, Latinis Lactaria herba, Lactuca marina, & Lactuca caprina, Mauritanis *Xanxer*, & *Ethulia*, Italis *Tithymalo*, Germanis *Urwolffz melch*, Gallis *Tithymal*, vel, *Herbe au lait* dicitur. A succo lacteo, quo turgent species omnes, nomen commune inditum Tithymalis, vel per diphthongum potius Tithoimalis, quòd mammam siue papillam vberis exitiosam siue virosam, non insecitè quis interpretetur. ^{males} enim mammam exitiosam significat. Similiter Lactarix ob commune omnibus lac vocitatz: atque ob eandem causam Lactuca, quòd ex hac herba haud secus atque ex Lactuca secta lac fluit: caprina, quòd capræ Tithymalis vescantur. Septem sunt Dioscoridi & aliis veteribus Tithymalorum genera. Sed plura hodie a recentioribus sunt obseruata. Primus Dioscoridis Tithymalus est mas, Characias, id est, vallis cognominatus, quòd vallis septisque muniendis idoneus est, à quibusdam Cometes, aut Amygdaloides, aut Cobius nominatus. Secundus ^{males} Myrtites, aut Myrsinites, id est, Myrtifolius, à Myrti foliorum figura, aut nucibus, quibus similem fert fructum, Caryites. Tertius Paralium, id est, ^{males} quòd in maritimis nascitur: quidam Tithymalida, & Mecona, id est, ^{males} quæ nuncupauerunt. Quartus Helioscopius, hoc est, Solem aspiciens, quia eius coma ad Solis cursum circumagitur. Quintus Cyparissias, a Cupressi foliorum similitudine. Sextus Dendroides, quòd ad arboris magnitudinem creuit. Septimus ^{males} typhyllos, id est, Latifolius à foliorum latitudine. Plinius eadem & totidem genera recenset: Theophrastus tria tantum, Paralium, Marem, & Myrtiten, ^{males} mus. Characiz caules, vt delineauit Dioscorides, cubitum excedunt, rubi &

Lib. 1. c. 8.

Lib. 9. hist.

cap. 12.

Forma.

Lib. 4. cap. 19.

CHARACIAS, Matth.
secundus, Dodonai.



TITHYMALVS Myrtites
seu fermina, Mart.



albo

TITHYMALVS helioscopius,
Martholi.

TITHYMALVS Cyparissius,
Martholi.



TITHYMALVS dendroides,
Martholi.



Tithymalis, folio rotundo, caule palmato ramis rubentibus, semine albo. Quatuordecim nomen *Helioscopium* appellant, totius Porphyran ramulis stantibus a radice quatuor aut quinque pedibus, semipedali altitudine luteis parvis. Hoc circa oppida nascitur semine albo. Cuiusmodi gratissimum, quod colligitur incipiente aestate. Nomen accepit quoniam capita eorum sicut solis umbra cum agat. Quintum *Cyparissium* vocant, propter foliorum similitudinem, caule gemmato triplici, nascentem in campestribus. Septimum *typhyllum* vocant, alij *Corymbiten*, alij *tygdaloidé* à similitudine, nec vilius latiuscula folia. Septimum *Dendroides* cognominant, alij *Cobion*, alij *Leptophyllum*, in peristernia copiosissimum ex omnibus maxime, quod in veteri codice legitur caulis rubentibus, & semine copiosissimum. Hactenus Plinius Dioseorides *Characiam Cobion* appellatam fuisse scripsit, quam appellatione Plinius *Dendroidi* attribuit, item ille *Characiam Aegypti* loidé vocari, Plinius *Platyphyllum*. Tempore istius de tribus generibus hæc litteræ mandant.

Lib. 9. hist. τὸν δὲ τῖθυμάλιν μὲν παλαιὸς χαλκίαιος κόνικος, φύλλον ἔχει πεντάφυλλον, ὅταν μεγάλος ὡς τὸς σπιθαμὰς, τὸν δὲ κάρπει λάλικον, ὁ δὲ κάρπει χαλκίαιος τὸ αὐτὸ φύλλον ἰλαρῶδες ἔχει, τὸ δὲ ὅταν μεγάλος ἔσται αὐτοῦ, ὁ δὲ μυστικὸς χαλκίαιος τὸ αὐτὸ φύλλον λάλικος, τὸ μὲν φύλλον ἔχει ἑξαπέτερον, μὲν πλὴν ἀντιφῶδες ἐπ' αὐτῷ, καὶ αὐτὸ

TITHYMALVS dendroides,
Dodon. ex Codice Casareo.

TITHYMALVS leptophyllus,
Matthioli.



ἀκραιὸν ἐκίγος, ὡς σπιθαμῶν. ταῦτα δὲ ἕκατα φέρεται καρπὸν, ἀλλὰ παρ' ἵτους, ὡς
μῦνον, ὡς ὁμοιωτά, περικτά ἀπο τῆς αὐτῆς ρίζης. φέρεται δὲ ὁρῶντα χειμ. ἢ ὁ χειρὸς
αὐτῶν γαλετταὶ καὶ οὐν. Id est, Ex Tithymalis est Paralium, granum vocatus, folio ro-
tundo, caule tota magnitudine paluum attingente, fructu candido. Qui mas
vocatur folio est Oleæ, magnitudine duos cubitos æquat. Myrtites, qui Tithy-
malus albus dicitur, foliū habet Myrti, nisi quod in cacumine spinosum est, sar-
menta parua per terram emittit, palui longitudine, quæ non simul, sed alternis
annis fructum ferunt, alia hoc anno, alia proximo, exorta tamen ab eadem radice:
fructus Nux vocatur. Matthiolus hæc Tithymalorum genera depinxit, Chara-
ciam, Myrsiniten, Paralium, Helioscopium, Cyparissiam, Dendroiden: Platyphyl-
lam vulgaris notitiæ prætermisit, & alium, cuius Dioscorides non meminit, Le-
ptophyllon addidit, quo Leptophylli nomine Plinius Dendroiden nuncupauit.
Pena affirmat Characiam Matthioli, Tithymalum Platyphyllum esse. Est enim
longioribus, latioribusque foliis quàm ceteri, ramis sesquicubitum & cubitos duos
altis, alioqui Dendroidi assimilatur. In Narbonæ, Gallicæ Prouinciæ, Lugdunen-
sis præfecturæ, & aliis plurimis Galliæ & Germaniæ siluosis, & fluentorum ripis,
nilū frequentius. Floret Maio & Iunio vnicaulis sæpius, eoq; Dendroidi affinis.
Characiam verò huic Platyphylo admodum similem, sed minorem caule & fo-
liis, ait Pena frequentiore etiam esse in Germania, & Aureliæ vicinis siluosis,
quàm calidiori solo, nullibi quàm in Angliā copiosiore: primo Vete florere,
caulesque complures à radice lignosa, fulca, rubentes mittere, in quibus folia mul-
tò minora, purpurascētia, amygdaliniis similia, quàm Paralij maiora: luteolos
flosculos, ex quibus deinde per Iunij menses oriuntur triangulares siliquæ, in qui-
bus terna grana, paulò superius quàm sint concava folia, quæ petrant seunt um-
bellarum ramuli. Dodonæus in Historia purgant. Characis species quinque con-
stituit. Primus caules profert cubitales, teretes & rubentes, folia tenuia, ob-
longa, angusta & longiora, maioraque quàm Oleæ, sed amygdaliniis angustio-
ra, com

Cap. 19.
lib. 4.

TITHYMALVS Characias
primus, Dodon.



TITHYMALVS Characias
quartus, Dodon.



ra, comam in cacumine largam, & lunci modo effusam, quæ concaua quædam sortum spectantia profert, vasculis siue acetabulis similia, ex quibus flosculi sublutei: deinde triquetra exeunt capitula, parua, in quibus semina: radix dura fibras multas habet. Mense hibernis Amygdaloides dicitur, in agro Maritimo ad crepidines Ledi annis eis potem Castri noui, item Lugduni ad Athenarum ex nobis in peninsula, Aureliæ, Bituricibus, & alibi in Gallia plurimus: folio Characis Anglici, sed longiore, molliore, & longe maiori, latiore magisque sparsa setura, peltata coma, adhibita. Est Clusio Characias legitimus Dodonæi, cui florum nigrum tribuit, non sulcateum aut paleosum. Est altera Characias species, huius supradicti similis, sed diuersioribus: caule quoque nonnisi in comâ minus habent: coma, & qui hanc fert caulis, foliis haudquaquam prius exiit: illius enim comam peltatis facientis folia tere semper desiliunt, vascula, flores, semina, & radices satis conueniunt. Hic est Characias Matthioli. Ad hoc genus pertinere videtur, non caulibus rubris, sed canis Tithymalus. Caules ei teretes sunt, rari, subito sæpe altiores, folia quoque oblonga, setosa, a' bida, tenuique lanugine pubescentia: umbella contractior: flosculi parui, lutei: semina trigemina in acetabulis, vt aliorum. Tithymalus Characias quartus Dodonæi admodum similiter longis, angustisque, paulo quam prius aut secundi minoribus, etiam albicanibus, sed minimum lanuginosis, umbella ex vltimis seta, quæ priusquam explicetur, oblonga, trifida, veluti amygdaliæ, rudimentum præter eiusdem tamen cum reliquis foliis coloris: vasculi & semina aliorum similia: radix æque mittitur. Est Myrsinites altera, & Turbida Alexandrinæ quorundam multo tamen cognatior Characis quam Myrsiniri putant Belgæ, inquit Lobellius, quamuis priusquam umbellas pandat, suprema folia proferat occulta, quæ veluti nucem amygdali adumbrare videntur, vt diximus: foliis enim est pallide viridibus, Characis æmulis, sed minoribus angustioribusque fructus & flores luteos herbarum ceterorum Tithymalorum ritu fert. E' Narbonensi agro & Gallica Provincia in horris Belgicis colitur. Quintus Dodonæi Characias, nobis est Tithymalus Myrsinites scitatus, de quo mox dicemus. Matthioli Myrsinites habet folia circa caulem totum crassa, acuta, Myrto similia. Ide Paraliu nasci ait in maritimis rariis, Senenitibus

TITHYMALVS paralius,
Dodonai & Pena.

Senensis, Argentario promontorio, & in toto illius regionis tractu, item in Aquileensi agro esse frequentissimum. Ar Pena Parali & Myrtanta effigies a Matthiolo proposui esse commentitias, neque ex plantis ipsius expressas ait, Paraliūque, nusquam, nisi sabuloso sterili- que litorum solo mediterranei, occidentis, & Germanici maris, copiose prouenire, defici- bi, virgis a radice rectis, rubellis, tactu gra- uolus foliis dense stipantibus, subnigris, basi la- tioribus: floribus ex herbaceo luteo, in longis pediculis circinata, foliola media et vlti- mus, sicq; umbellam efformantibus, & semina edentibus tricoccum, Chamælex aut Lachyri- dum non dissimile, minus & coarctius: intus esse tunc medullosa grana: radice simplicis, prolixa, lignosa. Eundem Paraliū descripfit & pinxit Dodonæus in Hist. hispan. Pena. Polcott. حود عوطا. Lili.

sci, mucronata, crebra stipant, vt Paraliū, pallidè virentia, & in summo magis sparsa, Sedi maioris aut Laureolæ ambitu, è quo trans folia concava & umbilicata sparguntur quaterni aut quini pediculi, qui Iunio & Iulio flores luteos herbaceos, pilulos, nudiculos ferunt, & semina triquetra Parali, Augusto matura, maiora, que

TITHYMALVS helioscopius,
Dodonæi.*TITHYMALVS paralius,*
Dodonæi Hist. purgant.

etiam tribus constans lateribus, & intrigonas valvulas dehiscunt, quæ singulæ singula grana, teresia, oblonga, fusca concludunt, medulla alba, acri, non ingrata. Hunc, inquit, Angliæ, Belgii, Franciæ horti sæpius alunt, nec alibi natam vidi. Eum certe multo melius pinxit Dodonæus, additis flore & capitulis assibrep-

TITHYMALVS Helioscopus,
Dodonæi.



TITHYMALVS Cyparissias,
Dodonæi.



pressis. Idem in Historia purgantium Patalium diuersum à Matthioli Paralio exhibuit, & ab eo, quem ex Historia stirpium monstrauimus. Illi cauliculi quini fenive assurgunt, cubiti, tenues, dilute rubentes, quos multa peristoma, angusta, oblonga vestiunt foliola, instar lanæ, candida densioraq; rotunda, sed non ita ample in cacuminibus umbellæ, in quibus & semina petinde ut aliorum. Tithymalus Helioscopus, inquit Matthiolus, vulgaris nomen est: nascitur enim palum prope vrbium & campidorum mœnia, in agris cultis & incultis, hinc & collibus. Dodonæus & Pena eundem Helioscopium depinxerunt, qui Germani *Sonchensende* uolunt, Belgis *Cromkens cruyt*, Galis *Reuulle marin* dicitur, omnibus familiaris & non folius Portulacæ, minus crassis, ambitu non uel crenato: caules paruos, pedales, teretes, in humum flexos, quaternos & quinos cingentibus: floribus ex luteo in palidum languentibus, in umbellam collectis: semine cæteris simili. Sed Narbonæ, ubi maturuerit, adeo spiritum vaporoso turgit, ut in solo relictum quatuor moueat, exiliat, mediūque crepet, potius grato sit spectaculo, quæadmodum & Tamaricis semen. Hæc Pena. Cyparissias, inquit Matthiolus, ea est planta, quam Esulam non perperam vocant Itali, cuius pro omni Tithymalo inualuit usus. Ab hoc multum differt Cyparissias Dodonæi in Historia purgant. & quem ipse in Historia stirpium depinxit. Huius enim foliola sunt oblonga quidem, sed petiolum angusta, & quam Esulæ minoris angustiora, ad Piceæ folia accedentia, molliora tamen tenuiora: cauliculus nonnihil rubet, densior altior, ramulos effundit complures, in quorum medio umbella cum acetabulis purpureis floribus: floribus seminibusque perpusillis: radice fibrata. Idem videtur esse, qui Leptophyllos Matthioli: cacuminibus tamen differunt. Huius species quædam minor repetitur, auctore enim Dodonæo, palmum duntaxat alta, tenuibus cauliculis, oblongis & angustissimis foliis, umbella exigua, flosculi luteolis, seminibus minutis. Matthiolus Dendroiden vidisse ait extra Terracinam, agri Neapolitani bœm, inter

ter laxa antiquissimi specus, plantæ arborescentis effigie, & in Tergestino litore, non procul à Timauro fonte in saxosis quibusdam rupibus arborescens, Anguillara in Thufcia, Liguria, & prope Massiliam. Bellonius refert in Creta ad duorum hominum altitudinem crescere, caudicem habere crassitudine corporis humani. *Platyphyllu*, id est, Latifolium genuinū se reperisse credit Clusius. Is pedali, interdum maiore altitudine aliquot à radice ramos emittit, nonnunquam simplici caule assurgit, circa quem ampla folia, mucrone rotundiore, ad latus novellæ foliorum formam accedentia, viridia, aliquantū um carnosā, & succo palescente ac riq̃ue turgentia: flos ex luteo purpurascens ramulis insidet, ac veluti acetabulis quibusdā continetur: radix crassa est & candida. In solo

TITHYMALVS *platyphyllus*,
Clusij & Dodon.



TITHYMALVS *ferratus*,
Dalechampij.



Valentino regno inter Biar & Huentimente via salebrofa inter medios frutices duntaxat se observasse ait, florentem mense Martio. Eundem pictum dedit Dodonæus in Historia purgant. Duos alios Tithymalos ex Dalechanpio hic exhibemus. Prior est Tithymalus ferratus, qui in agro Monspelienti vbiuis gignitur, radice multiplici, candida: caulibus multis, pede altioribus, rotundis: foliis ima parte longis & angustioribus, superiore latioribus, ferratis in ambitu, vnde cognomentum: flore subluteo, fructu anguloso. Tota planta lacteum succum fundit acrem & erodentem. Summa caulium parte, vt in Tithymalo Characia, folia duo iuncta quasi lacunatum alveolum efficiunt, è quo pediculi florem ac fructum sustinēt: exeunt. Alter est Tithymalus verrucosus, qui in aridis & sabulosis gignitur prope Lugdunū, ad Rhodani fluenta: radice brevis, sed surculosa: caulibus multis, cubitalibus: folio Myrti, inæqualibus spatiis disposito, candicante, minime per ambitum diviso: flore ex herbaceo subluteo: fructu rotundo, verrucarum tuberculis simili, qua de causa Verrucosum cognominarunt. Tota planta lacte manat, vt & cætera Tithymalorum genera. Nunc de eorum viribus dicēdum. Characiæ liquor lacteus, auctore Dioscoride, vim habet aluum per inferna purgandi: pituitam & bilem ducit, duorum obolorum pondere ex posca sumptus Cum melicrato autem potus vomitiones cit. Appetente vindemia lacteus hic liquor colligitur. Depilat is recens ex oleo in Sole inunctus, renascentesq; capillos flauos & exiles efficit, randēque omnes perimit. Cauernis dentium inditus leuat dolores, sed cera dentes oblinendi, ne effluēs fauces aut

Li. 4. c. 19.

TITHYMALVS *verrucosus*,
Dalechampij.



Lib. 16. c. 3.

linguam vitiet. Idem inunctus formicantes verrucas penfiles, thymos & imperigines tollit. Valet etiam aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas, gangrænas fistulasque. Semen & folia eadem quæ lacteus succus præstant, dimidio acetabulo pota. Radix drachmæ pondere cum hydromelite insparfa & pota, per inferna purgat. Decocta cum aceto colluto ore, dentium dolori auxiliatur. Huic consimilem facultatem habent Myrsinitæ succus, radix, semen, folia, ad ciendas tamè vomitiones imbecillior hic est. Paralij vsus supradictio similis est. Helioscopius vim eandem habet cum superioribus, sed non adeò validam. Cyparissix vis etiam eadem quæ præcedentibus. Dendroides quoque eiusdem effectus cuius superiores. Platyphyllos radix, succus, & folia, per inferna trahit aqua Pisces necat tufus, & aqua dilutus. Plinius eandem Tithymalorum vires partim ex Dioscoride, partim ex Theophrasto, partim ex alijs tradidit his verbis. Tradunt toties purgari hydro-picos fico sumpta, quot guttas lactis Characiz exceperit. Est & semen in vsu cum melle do-

ctum ad catapotia soluenda alui gratia. Semen & dentium cauis cera includitur. Colluuntur radices decocto è vino aut oleo. Illinunt & lichenas succo bibuli capri eum, vt purgent vomitione, & aluo soluta, aliàs stomacho inutilem. Trahit puerile adiecto in potu, bilem aphronitro. Si per aluum purgari libeat, in posca vomitione, in passo aut aqua mulsa. Media portio tribus obolis datur, hicos deo sumplisse melius est, fauces vrit leniter: est enim tam feruentis naturæ, vt perle extra corpori impositus, pustulas ignium modo faciat, & pro caustico in vitiis. Myrsinitæ fructus demetitur cum messium maturitate, lauatürque, deinde siccatur, & datur cum Papaueris nigri partibus duabus, ita vt sit totum acetabuli modus. Minus hic vomitionibus purgat quàm superior, cæteri item. Aliqui sic & folium eius dedere, nucem verò ipsam in mulso, aut passo, vel cum sesama. Trahit bilem & pituitam per aluum. Oris vlcera sanat. Ad nomas oris folium cum melle estur. Paralij semen colligitur incipiente vna, & siccatum teritur, sumiturque acetabuli mensura ad purgationes. Trahit bilem per inferna in oxymelite dimidio acetabulo: cæteri vsus qui Characiz. Cyparissix eadem vis quæ Helioscopio aut Characiz. Platyphyllos pisces necat, aluum soluit, radice, vel foliis, vel succo, in mulso, aut aqua mulsâ drachmis quatuor. Detrahit priuatim aquas. Dendroides est eiusdem effectus cuius Characias. Galenus dilucidius has vires exposuithis verbis. Tithymali omnes vincentem habent acrem calidamque facultatem inest verò & amaritas. Validissimus Tithymalorum liquor est. Secundum locum tenet semen, & folia. Sed & radix earundem facultatum particeps est, verum non ex æquo. Sanè ipsa cum aceto decocta dolores dentium sanat, maxime qui illis erosio pro- ueniunt. At liquores vt qui valentior vim habeant, in foramina quidem ipsa dentium induntur. Cæterum si aliam corporis partem contigerint, continuo adurunt, vlcérantque: quapropter foris illis cera circumuoluitur. Sic pilos quoque succus inunctus tollit. Porro quum vehementior sit, oleo miscetur: & si doli pe- fiat, tandem protus radices pilorum adustæ cortumpentur, corpusque depile red- dicitur.

Lib. 2. sim.

detur. Eadem facultate myrmecias, acrochordonas, pterygia, & thymos auferunt, detergentque lichenas & psoras, quia scilicet illis abstergendi facultas inest propter amaritudinem. Præterea vlcera phagedænica, anthracode, & gangrænode, quia valenter calfaciunt & absterguunt, si in tempore & moderatè quis vitatur, iuuare poterunt. Verumenimvero & fistularum callos eadem facultate adimunt. Porro hæc omnia genere quidem similiter, imbecillius tamen & folia & fructus præstare possunt. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnante capiendos vti assolent. Celerrimè namque ab illis in vertiginem acti, ac semimortui redditi ad aquæ superficiem feruntur. Cæterum cum septem sint eorum genera, valentissimus est, quem Characiam nominant, & Myrsinites, & qui in petris nascitur instar arboris: deinceps qui Verbasco similis est, & Cyparissias, post Paralys, de nique Helioscopius. Proportionem verò cõprehensæ eorum facultatis & cinis, & lixiuium erit.

TITHYMALVS TUBEROSVS

sive Apios. CAP. VIII.



TUBEROSVS Tithymalus exiguus promit cauliculos, aliquantulum rubentes, tenues ac teretes: circa quos exigua & parua foliola, forma quidè foliorum Hyperici aut huiuscemodi Rutæ sylvestris, at minora, Chamæsyces æmula. Umbellæ in fastigiis raræ, in quibus acetabula:

floruli pallentes lutei: semina asperiuscula triquetra, vti aliorum Tithymalorum, minora tamen: radix tuberosa pyri modo turbinatur, inferiore parte angustior, foris nigricans, interiùs candida. Manat ex hoc lacteus quoque succus, quacunque eius vulnerata aut læsa parte. In Apulia Italiæ prouincia gignitur, nec non in Græcia ac vicinis insulis, vt Creta, Lemno, aliisq; & quidem illic locis montosis. Exit vno loco longioribus cauliculis albis tene-rioribus breuioribusq; Huius quandoq; maior: illius verò subinde minor est radix. Memini siquidem me ab excellentissimo clarissimoq; viro Iacobo Antonio Cortuso, patritio Patruino, duas olim huius plantas accipere. Vnius radix maior crassiorq;: folia verò & ramuli minora: alterius verò radix minor, sed ramuli lōgiores, & folia paulò maiora. Hunc Tithymalum Græci ἀπῖος à figura & similitudine pyri nūcupant: dicitur quoq; & ἰχάρις & à Gaza Latine Carica, quod ἰχάρις, id est, Caricam siue ficum aridam radix referat: item & χαμαῖς δάκτυλος, siue terrestris glans, & à figura quoq;. Sunt tamen & alij χαμαῖς δάκτυλος Germaniæ familiares ac edules de quibus in historia frumentorum. Pempt. 4. scri-



psinus. Bellonius χαμαῖς δάκτυλος modo in Græcia Apion dici scribit. Facultate autem & temperamento Tithymalus iste, siue Apios, vehementer calidis ac siccis est, reliquis Tithymalis similis, ac perinde quoque humano corpori molestus ac noxius. Pars radices superior, Dioscorides ait, sumpta vomitione bilem pituitamque educit: quæ ad radicem inferior, per aluum. Tota vtrinque purgationes mouet. Succus sesquiboli pondere, vtraque etiam parte purgat. Hydropicis, inquit Plinius, datur acetabuli mensura.

News

ITTOYEA Gracis, Latinis Pityufa, Mauritanis *Alchem,* & sine articulo *Scobran* & *Scobran*, quod ex Serapione facile intelligi potest, qui nomine Scobran, id est, Esula, ut ipse interpretatur, totum Dioscoridis de capur transcripsit, Officinis Esula siue Ezula nominatur. Pityufa autem

Li-4 c. 160.

Pityusa capur transcriptis, Officinis Efula siue Ezula nominatur. Pityusa autem à dictione *vitrus*, quæ Piceam significat, quòd Piceæ folia referat. Hanc Dioscorides Tithymalorum generibus assignavit: attamen cum Cyparisiæ Tithymalo nomine, viribus, natalibus foliis præferat, sit adeò affinis, ne quæ in falleret hæc simili-

Forma.

tudo, Dioscorides specie à *Cyparissia* differre monuit, scriptisq; caulem habere cubito altiore, multis geniculis cinctum, foliis acutis, tenuibus, Picæ similibus circundatum: flores paruos, veluti purpureos: semen latum instar lenticulæ radicem albam, crassam, succo plenam. Inuenitur quibusdam in locis magnus hic fru-

Lib. 14.5.6

tex. Plinius de herbis propter cognationem nominis cum Pino & Picea agens, brevis descripsit. Cum honore & Pityusa, inquit, simili de causa dicitur, quia quidam in Tithymali genere numerant. Frutex est similis Piceæ, flore parvo, purpureo. In quibus hæc duæ voces, cum honore, quæ in vulgatis codicibus leguntur redundant, & penitus ineptæ sunt. Quare legendum ex veteri codice, Ex Pityula.

In cap. 250
lib. 4.

mili de causa dicetur, &c. M

PITYVSA March 5me

E. fulva major.

ri σφολρα τριφυλθ, id est, valde magnum, quæ est Esula maior, vnicæ uotæ p-
gnante: scribit enim Dioscorides Pityula fructum esse *ελατω ις φαειν*, id est,
larum Lenticulæ instæ, quum Esula flores & fructû habeat non Lentis, sed Tili-
mali, id est, triquetra capitula, in quibus semen. Sed mendosum hunc locum
esse credunt docti viri, rei ipsius cognitione, & virium experientia suffragante.
Vtriusque Esulæ iconem ex Dodonzo in historia purgant. hic proponimus, quæ
& à Marthioli pictura hic etiam posita, & ab Esula in Histo. Stirpium picta differ-
re videtur, vbi Esulam maiore pinxit, quem Fuchsius Tichy malum plaryphyllum

TCOM.

*ESULA maior, Dodonæi
Hist. purgant.*



Esula paritur, Rosculis rubris, & semine Pepli, peltata foliola transmittentibus, Tithymalorum ritu. Esula maior Dodonæi ex Hist. purgant. videtur esse Esula maior Germanica, à Pena depicta, cuius apud Germanos & Belgas pharmacopœos

fecit, minorem, quem ille Tithymalum Cypariissiam. Esula maior, ut describit Dodonæus, fruticosa stirps est: caules eius complures, teretes, supra culatam altitudinem assurgentes, foliis vestiuntur obo longis, angustis, quam Tithymali Characiæ minoribus umbellæ angustioribus. Hæc flores seminaque Tithymali: radix ampla, ramosa, crasso cortice obducta, succo lacteo plena, ut tota stirps. Reperitur in collibus quibusdam Germaniæ, circa Scaphusiam & Basileam. Minor priori similis est: caules tamen eius breviores, & nerioresque: folia etiam oblonga, angusta, acuminata, minorum: flosculi fructusque respondent: radix tenetior, lignosior, tenuliori cortice vestita. Tota similiter lacteo succo prægnans est. Hæc Turpetum nigrum est Actuarii, quamvis dixerit Dioscorides, Pityusæ radicem candidam esse: nam interiorem pulpam intelligit, non exteriorem corticem, qui viridis rufescit, siccatus nigricat. His subiungit Lobellius Pityusam, siue Elulam minorem alteram, floribus rubris, quam Pityusæ speciem alunt Belgæ, inquit, stirpium peritiores, spithamam & pedem altam, foliolis

*ESULA minor, Dodonæi
Hist. purgant.*



*PITYUSA siue Esula minor, Dod.
Hist. stirp. Tithym. platyphyllos, Fuch.*



PITYVSA sine *Efula* minor,
Dodon. Hystor. stirp. Tithym.
Cyparissias, Fuchf.



frequens est vſus, prægrandis *Pityuſa* *Dioſcoridis*, quam ille luculentiùs deſcripſit his ſerè verbis. Ex ampla multiſque adnatis implexa radice, craſſo, denſo, pulloque cortice amicta, innumera eriguntur virgult., minimũ digi- rum craſſa, & binos cubitos alta, virentia, quæ folia habet crebra, *Lathyridis*, aut arbo reſcētis *Tithymali*: nec ſemen diſſimile, ſed partim ſe- cundũ cauſis & foliorum interualla, partim in vmbella, ſed minùs lata, & minùs in orbem collecta. Cætera non diſſident à reliquis *Ti- thymaliſ*. Verũ rarior hæc in Italia & Gallia, frequens in Germania ſuperiori & inferiori ad Rhenum. Alia *Efulæ* genera obſeruauit Herbarij. *Pena* & *Lobellius* *Efulam* raram ex *Lio* Venetorum inſula monſtrarunt, quæ ſeſ- quicubitum, & cubiros duos longos caules emittit, fungoſos, rugoſos, fuſcos, minimum di- gitum craſſos, in ramulos multos pedales di- uiſos, in quibus bina folia per interualla, maio- ra quàm *Alypi*, lenta, pingua, *Thymelex*: flo- res penduli, purpureſcentes: radix foris pulla, ſeſquicubitum longa, digitorum minimum craſ- ſa, ſueco plena. Tota planta lacteſcit. Non ali-

bi quàm in litotibus, quæ admodũ *Tithymalus* *Paralius*, & inſulis maris *Adna- tici* facilè reperitur, & *Lio*, inſula parua. Eſt hæc Venetis Medicis & pharmaco-

PITYVSA ſine *Efula* minor altera
floribus rubris, Lobell.



ESVLA maior Germania,
Pena.



ESVLA rara, *Pena*
& *Lobell.*

ESVLA rara tho *Venietorum*
Insula Penalia.



ESVLA siluestris, *Tragi.*



minu-issimis folijs, Thymo similibus, vestitus: semen in tripartitis loculamentis continetur. Pityusæ radix, vt auctor est Dioscorides, purgar per inferna duarum drachmarum pondere, data cum aqua mulsâ. Seminis autem drachma vna datur: succi vero cochlearis vnus mensura. Excipitur hic farina, & in catapotia formatur. At foliorum drachmæ tres dantur. Plura tradit Plinius. Bilem, inquit, &

pæcis Pityusæ species, & hac Efulæ vulgaris vice vtuntur in confectione Benedictæ, & catapotius catharticus: purgat enim non segniùs, quàm Efula communis. Quibusdam creditur Alypum Dioscoridis, alijs, sed perperam, negrû Turbich, quod Actuarius Pityusam esse acriatur, vt diximus. At Pityusæ quidem ea non est, sed persimilis, ideo rara Efula nominata. Tragus tres alias exhibuit. Siluestrem, quæ in fabulosis siluis prouenit, caule procero, cubiti altitudinem ferè attingente, elegantioribus, ac magis rubris umbellis: alteram dulcem, quæ in umbrosis ac vliginosis montibus & vallibus alpium Helueticarum nascitur, caule, flore, folijs, radice & lacteo succo Tithymalis & Lathyridi adeò propinqua, vt ab illis vix discerni possit. At gustus ipsius lactei succi & radiceis dulcis est: semen rotundum, luteum, ad milium accedens, è vasculis suis cum maturuerit exilire solitum. Est Trago alia Efulæ exigua species, quæ in agris quibusdam a melle autûnali tempore reperitur, frutex dodrantalis, surculosus,

Li. I. ca. 300.

L. 8. simpl.

L. 8. purg.
cap. 34.

ruitam per aluum detrahit radix, decocti hemina, aut feminis ligula in balneo. Folia in aceto decocta furfures cutis emendant: mammas quoque milto Rutæ decocto, & tormina, & serpentium ictus, & in totum collectiones incipientes. Pityrusam, inquit Galeus, quidam speciem esse putant Tithymali, quod succum illi similem habeat, quodq; similiter purget, & in cæteris omnibus sit illi viribus affimilis. Multa de hac planta tradit Mesues diligenter notanda. Esula, inquit, herbarum lactiarum species, rusticorum est purgatorium. Vna est magna, altera parua. Magna vlcera viscera, ob id perniciofa. Parua est præstantior, præsertim cortice radice tenui, leui, fragili, subrubro Calsiæ modo, ante sex menses collecto:

ESULA dulcis, Tragi.



ESULA minima, Tragi.



nam recens quo mense collecta mala est, & orta loco aliquo prope thermas. Colligenda est Veris initio. Lac, quod calidius, tum acius, ac valentius sit, sine Venus. Calida sicca principio tertij gradus. Substantia constat tenui, ignea, acti, incidente, tenuante, fundente, siccante, aperiente, & terrea styptica etiam, siccante maris altius immerfas. Purgat valenter pituitam, aquas, atram bilem etiam, a mæchris: ob id harum doloribus confert, & hydropi insigniter, sed nocet cordi, stomacho, hepati, viscera excoiat, venarum ora disrumpit, corpus immodicè siccatur, semen absumit, febres inflammando excitat, lacte suo maximè. Ob id miscenda ei sunt cardiaca, stomachica, hepatica. Ad hæc glutinosa, cogentia & astringentia: glutinantia, vt gummi, tragacanthum, bdellium, mucago Pflyli, succus Portulacæ: postremò refrigerantia. Infundantur ergo in acetum, præsertim quo Cydonia sint macerata, & in succu Intybi, vel Sonchi, vel Portulacæ, vel Solani: additis etiam myrobalanis, ablinthio, aloë præstantior euadit. Radicè Esulæ maiors, inquit Lobellius, aceto & lacte præparatam, in puluerem redactam à granis duodecim ad grana sexdecim enemate infundere solemus, & in medicamèto cholagogò grana sex vel octo sine molestia: pituitosis verò ad tempus tantillum idest submolestum, quia ægrius pituita expellitur.

LATHY



AΘΥΡΤΣ Græcis, Latinis etiam Lathyris, quibusdam Tithymalus, *Nemosa* & inter Tithymalos numeratus teste Dioscoride, Officinis Catapucia minor, quod in pilolis quibusdam, seu potius catapotus semen ferat, vel potius quia dixit Dioscorides, *ἡ ἁπλοῦς καὶ ἀσπύριον*, id est, in catapotus in npra grana purgare, Arabibus *Mensana*, seu *Mahendana*, *ἡ ἁπλοῦς Catapucia minor*, Insulribus *Catapucia*, Gallis *Esperge*, Germanis *Spink* aut. Cauli *Forma* profert cubitalem, vacuū, vt describit Dioscorides, digiti crassitudine, in cuius *Li. 4. c. 16.* cumine sunt alæ folia in caule oblonga amygdalini similia, latiora tamen & latiora. Quæ in summis sunt ramulis, minora, Aristolochia, aut Hederæ oblonga figura. Fructum fert in summis ramis, tribus loculamentis distinctum, rotundum ceu capparim, in quo terna sunt semina, mēbris discretis, rotunda, maiora eruis, quæ cum corricibus exuuntur, candida sunt & dulcia: radix illi tenuis, & inurilis. Totus frutex lacteo succo Tithymali modo turget. Plinius *passim* a Dioscoride *Lib. 17. c. 11.* diffidet, hæc scribens. Lathyris folia habet multa, Lactuca siuoriora, tenuiora, germina multa, in quibus semen tuniculis continetur, vt Capparis, quæ cum inaruerit, eximūtur grana piperis magnitudine, candida, dulcia, lactea purgata. Hæc postrema omnium Tithymalorum Lathyræ, notissima est omnibus & vfitatissima, Catapucia nostra minor, cui omnia aptissime quadrat. Nascentur in hortis, & in agro- *Locus.* rum marginibus occurrit. Carpitur Autumnino, dum fructu prægnans est, semenq;

LATHYRIS, Matthioli.

LATHYRIS minor, Dalech.



eximitur dū tuniculæ quibus includitur inaruerit. Lathyridis grana sex aut septē, *Vires* & vt tradit Dioscorides, purgant aluum in catapotio, aut cum caricis, aut palmulis *Temper.* denotata, sed aqua frigida postea sorbenda. Trahunt autem pituitam, & bilem, & *Li. 4. c. 16.* aquas. Succus Tithymali modo exceptus eundem effectum præstat. Folia cum gallinaceo, aut oleribus decoquuntur ad eisdem effectus. Plinius verò eius grana *Lib. 17. c. 11.* vicena in aqua pura, aut multa pota, hydropicos sanare tradit. Trahunt & bilem, inquit.

inquit. Qui vehementius purgari volunt, cum folliculis ipsis sumunt eam, non stomachum laedunt. Itaque inuentum est, ut cum pisce, aut iure gallinacei succo purgetur. Sunt qui dicant, inquit Galenus, Lathyrum etiam Tithymali esse speciem, quod similem illis succum habeat, tum quod eodem modo purget, totaque illius cultura similis sit, nisi quod semen gustantibus videatur dulce. Quod sane maxime purgatoriam vim habet. De eadem Actuarius hæc scripsit. Lathyrus hemetiūs pituitā purgandantur eius grana maiora quindecim, & minora viginti. Atque iis, qui vberius purgari capiunt, mandari iis vero, qui multa euacuatione operari non habent, integra deuorari iubentur, præsertim si eius qui sumit stomachus vitiatum fuerit. Lathyrus minor in pinguibus nascitur, radicibus multis, crassiusculis, tenuissimis fibris huc illuc vagantibus: ramulis ad radicem complusculis, humi sparsis, in quibus folia sunt Polygono similia, paruula. Caulis dodrantalis, aut paulo altior: foliis inæquali situ vtrinque prodeuntibus, oblongis, Hyssopi vel modo. Floribus in eius summo vertice conglomeratis, planta tota lacte succum fundit.

PEPLVS, PEPLIS.

CAP. XI.

Nomina

QUAE CIS *πέπλος, πούλι, & μέλον ἀγρίος* dicitur, Latinis Peplus, Olanis Esula rotunda, Gallis *Renelle marin des vignes*, Germanis *Traufmölch*. Peplus autem nominatur, auctore Pena, quod ramulorum ambitu, & quasi rotundo amictu velum efformet: est enim *πέπλος* velum & stagulum. Vel potius ob purpuream foliorum superficiem, sanè xeranthemum, quæ Peplo in vinetis, & Peplidi in maritimis nascenti sæpius inest. Peplus enim fuisse purpurei, vel phœnicei coloris multæ historiæ declarant. *πέπλος, ἀδράχην ἀγρίαν*, id est, Portulaca siluestris. Hippocrati *πέπλιον*, Latine etiam Peplus & Peplum, ut nomine, sic effigie Peplum referens, & propius adhuc etymum Pepli exprimens, idcirco *πέπλος ἀγρίος* à Dioscoride dicitur, id est, largius &

PEPLVS, Maritima.

Li. 4. c. 66.
Forma.

Locus.
Li. 17. c. 11.



rius fruticans vndequeque. Peplus, ut dicitur Dioscorides, exiguus frutex est, albo laticore, plenius, foliis paruis, ut Ruta, latioribus. Tota eius coma dodrantalis, rotunda, humilis, fascimine sub foliis paruo & rotundo, minus quam candidi Papaueris. Radix vna, ex qua totus frutex provenit. Nascitur in hortis & vineis. Colligitur mæsisibus, siccaturque in umbra, & continuè vertitur. Plinius, Peplo, inquit, quod in Sycem, alij Meconium aphrodes vocant, Meconium, alij Mecona aphrodes vocant, vetus codex habet ex vna radice renui fruticat, ut Ruta, paulo latioribus: femine sub foliis rotunda, minore quam candidi Papaueris: huc leuissimum Dioscorides assentitur: repugnat quædam exemplaria, quæ habent, minus candido, quod vultis, ut hic color, illic magnitudo indicetur. Vites ferè colligitur mæsisibus, sic atque fructu suo, subiectis aquis in quas excidat. Quod postremum perspicue falsum est. Quod enim siccari opus erat, si in subiectas aquas excidere debeat? Quare ex vetri codice legendum, sub-

sectis.

PEPLIS, *Marthioli.*

iectis in quæ excidat, vt intelligamus vasa, aut substrata lintea Peplis autem, Dioscoride auctore, frutex est vndeque amplius, candido succo plenus: foliis Portulacæ hirsutius, rotundis, & infernè rubrum quid habentibus: semine sub foliis rotundo, velut in Peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua, tenui. Vtraque hic depicta est. Quibus Dalechamp Peplion, & Peplin minorem adiecimus. Illud in litorum arenis gignitur, radice vnica, tenui, sex digitos longa, nonnihil capillata, superne rubente, inferne candida: caulibus multis, humi sparsis, & circûquaque terram operientibus, rubris, lacte manantibus: semine rotundo, gemino fere, foliis annexo, vt in Chamae-cyce, & Peplo, feruidi gustus. Peplis minor in vineis gignitur, radice crassiuscula, tortuosa, paucis fibris capillata: caulibus multis, palmum altis, furculosis: foliis ima caulium parte lino similibus: quæ verò caules in furculos diuiduntur, amplioribus, proximè cauleni latoribus, in acutum desinentibus: flore subluteo, minuto:

Peplin
Dalech.Peplis mi-
nor, Dalech.

fructu gemino testiculorum modo, in alueolis lacunatis reposito. Lacteo succo tota planta turgere, & corpus vehementer purgat. De Pepli viribus hæc scripsit Dioscorides: Herba ipsa multos habet vsus, radix verò inutilis. Semen eius tulum, ferusdâq; aqua madefactum reconditur. Picuitam & bilem acetabuli pondere cum hydromelitis cyatho potum ducit. Obsoniis mixta herba aluum conturbat.

11. p. 162.

1. ves. 17.

Temper.

PEPLION, *Dalechampj.*PEPLIS minor, *Dalech.*

Li. 17. c. 12.

Cōdi ut in muria. Eadē Plinius tradit. Pepli semine potō aluus soluitur, bilis ac putrida detrahatur. Media portio est acerabuli mensura, in aquæ mulæ heminis tribus. Et cibus inspergitur, obsoniūq; ad molliendā aluū. Peplis, vī Dioscorides tradit, colligitur, ac reponitur, & datur quemadmodū Peplos, muria item conditur: vires denique easdem quas Peplos habet. Portulacæ, etiam Peplion, ob similitudinem foliorum vocari præfatus Plinius. Portulacæ vires prolixè memorat, à Peplij facultate diuersas. Galeno Peplos frutex succum habet similem Tithymalis, cum in aliis, tum quia purgat, ceu illi. Peplion quoque frutex paruus succum habet sicuti Tithymali. Nascitur plerumq; ad mare: radicem habet superuacua, vī & Peplis: succum vero validum, non ramen admodū vtilem: sed semen vtile est, & flatuosum, similiter ac semen Pepli purgans. Eo in loco in Græcis codicibus falso *φουδισ* legitur, & ab interpretibus flatuosum conuertitur, quod Dioscorides & Paulus *στυπιδιστος* γένος esse dicunt, id est, feruentis gustus: quare & hic apud Galenū pro *φουδισ* legendum *στυπιδισ*. Præterea Aëtius ex Hippocrate ait Peplion esse *φουδισ* καὶ ἀρρηκτικόν, id est, flatu disrumpere, ac discutere, quare flatuosum dici minimè potest.

CHAMÆSYCE.

CAP. XII.

Nomina
Li. 4. c. 104.
Forma.



RACIS *χαμαίφυκος*, & *συν* nominatur, Latinis similiter Chamæsyce. Ramos profert, inquit Dioscorides, quaternū digitorū, per tetram stratos, rotundos, succo plenos: folia Lentis specie, Peplo similia, parua, tenuia, humi strata: semen est sub foliis, rotundum, velut Pepli semen. Sed neque florem, neque caulem habet: radicem tenuem, & inutilem. Nascitur petrosis & squallidis locis. Ex his intelligere licet Chamæsyce Peplo valde affinem, aut eius speciem aliquam esse. Chamæsyce Dalechampi hic appinximus.

Locus.

CHAMÆSYCE, Dalechampi.



Chamæsyce
Pena.

quæ in agro Monspelienſi gignitur, exili radice, longiuſcula, candida, dura, ſimplici & ſingulari: ramulis multis, quatuor digitorum longitudine, humi in orbem ſtratis, lacteo ſucco in ananibus: folio Lentis ordine per ramulos diſpoſito, in adacta planta ſerè rubefcente, acris & feruidi guſtus: ſemine rotundo, exiguo, ſub ſolis abdito. Chamæſyce alia Pena depinxit, quæ Peplo, ac Peplio rarior eſt: modo, nec vſquam in Germania, aut Italia, ſed duntaxat in Narbonenſis Gallie occis vinerit; reperitur, vbi plurima, præſertim in aridis & ſabuloſis, non procul a Monſpelio ad patibulum via, & tractibus maritimis. Palchella rota, & repens, ramulis & foliis numerosis, humi reptantibus, ex pallido virentibus, Heſperis diſtinguitur.

non dissimilibus, sed lactescens, vti duæ superiores: simile quoque semen, folliculum, & flores habet, sed cuncta minora. Chamæsyces ramuli in vino triti, vt tradit Dioscorides, vteri dolores sedant, in pecto appositi. Tumores, verrucas pensiles, & fornicantes tollunt impositi. Decocti & in cibo sumpti aluū solvunt. Ipsorum succus idem præstat, & illitus aduersus scorpiionum ictus auxiliatur. Valet & ad hebetes oculos, caligines, incipientes suffusiones, cicatrices, & nubeculas cum melle illitus. Plinius nõ eadem prorsus tradit. Chamæsyce Lentis folia habet, nihil se attollentia, in aridis petiolisq; nascens. Claritati oculorum, & contra suffusiones vtilissima, & cicatrices, caligines, nubeculas in vino cocta, & inuncta. Vuluæ dolores sedat apposita in linteolo. Tollit & verrucas omnium generum illita. Prodest & orthopnoicis. Linreolum pro pecto posuit, & de orthopnoicis addidit, quod Dioscorides non habet. Chamæsyce, inquit Galenus, abstergentem simul & acrem vim habet. Itaque acrochordonas, & myrmecias, caules eius teneriores in modum cataplasmaris ad mori, quæ ex eis profluit liquor, auferunt. Cum melle verò crassas oculorum cicatrices detergunr. Sed & hebetudinem visus a crassitie natam adiuvant, sicut sanè & suffusionum principia.

Vires & Temper.

Lib. 4. cap.

Lib. 8. simpl.

SCAMMONIA. CAP. XIII.

SCAMMONIA planta Græcis dicitur, Latinis similiter Scammonia, *Nomina* Arabibus Scammonia, & Sachmuntia, Italis Scammonea, Gallis Scammonie. Radicis liquor Scammonium, Græcis etiam σκαμμωνιον, quod recentiores Græci δακρυδιον, id est, lacrymam, Officinæ corrupta voce Diagridium vocant. Scammoniam tradit Dioscorides ramos muleos ab vna radice producere (Orbasius addit, τρεῖς ἢ τεσσάρων, id est, tres aut quatuor) tricubitales (Orbasius, ἢ τετραπύχης, vel quatuor cubitorum) pingues, ὑμπαριονίας τι ἐξὶ δακτύλιος, ac nonnihil huiusmodi (Ruellius legit, πᾶσι δακτύλιος, vertitq; & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant. Sed prior lectio ramulis Scammonia maximè accommodatur, quam etiam confirmat Serapio, qui ex Dioscoride transcripsit. Scammonea est planta habens ramulos egredientes ab vna radice, quorum longitudo est trium, aut quatuor brachiorum, super quos est viscositas adhærens manui, & parum horæ, & habet folia pilosa.) Sed & folia hirsuta sunt, similia Helxinæ, aut Hederæ, molliora tamè, & triangular: flores albi, rotundi, caui instar calathi, graueolentes: radix admodum longa, crassitudine cubitali. (In vulgatis codicibus legi: ut, πᾶσι δακτύλιος ὅσον ὀφθαλμοῦ, ac in veteri πᾶσι δακτύλιος ὅσον βραχίου, & ita legunt Orbasius & Hecmolaus, id est, crassitudine brachij. Quæ lectio melior est, cum nunquam, nisi improprie, dicatur aliquid esse crassitudine, sed longitudine cubitali, præcipuè apud hunc auctorem. Serapio ineptè vertit, habet radicem grossam sicut pollex alba graueolens, succo plena. Plinius paucis huius delineationem perstrinxit. Scammonium est succus herbæ, à radice ramosæ, pinguibus foliis, triagulis, albis, radice crassa, madida, nauseosa. Nascitur pingui & albo solo. Dioscoridi pingues sunt ramuli, Plinio folia. Illi flores & radix candicant, huic folia. Quod Dioscorides

Forma.

Lib. 4. cap.

Cap. 10. simpl.

Lib. 16. c. 17

SCAMMONIA, Math.



In cap. 104.
lib. 4.

dyrit radicem esse ὀπὺ μαστῖν, καὶ βαρύτεραν, id est, succo plenam & grauculentem. Plinius vertit madidam, ac nauseosam. Matthiolus Scammoniam plantam, cuius effigiem hic proponimus, Constantinopoli ad se Viennam missam fuisse ait ab Augerio de Busbecke, ad Turcarū Imperatorem legaro, quam curauit illic transplantandam à Bono Baldino Myropola, eamq; soli humore restitutam, paulò post viticulas, folia & flores emisisse. Sed eam non oratione, verùm penicillo tantum depictam ostendit. Pena anno sexagesimo primo, aut secundo supra sesquimillesimum, Sequinum Martinellum pharmacopœum Venetum ex Syriaco Alepo misisse ait plusquam centum libras glebæ Scammonij Anrhiocheni succi cōcreti, cui exprimendo interfuerat: conchas etiam non paucas, lacryma plenas, seu Diacrydio antiquorum, cum seminibus angulosis, volubilis. Hæc semina tum Patum, tum Venetiis primo Vere terræ mandata in luculentam volubilem, seu voluulum abiisse, adeò sinuosis smilaceis foliis triquetris, vel potius Cissampeli foliis, floribus, facie similis, vt planè cum nostra Cissampelo eadem videatur. Verùm radice insigni fuit, & mole grandem Bryoniz radicem æquanre, atque teneritudine æmulante, foris pulla, aut cineritia, intrus albida carne: cuius hiliæ cor medium exemptum, planè idem est, aut simile radice communis & probarioris Turbith Officinatum. Verum hæc faciliùs aliquatò frangitur, ramenti perinde gummosa succo lacteo turgat, atque Turbith. Communis etiam Herbariorum confensus

Scammonium maxime nō Mospeleus.

SCAMMONIA maritima *Monspeliensis.*



& rota ora Monspeliensi cum Scilla, Peplo, & Panceratio provenit: quoniam Scammonia tota imitatur, eius modò lacteum succum fundit, Catharticam vim Scammonia, Tithymalo, aliisq; id genus nō multò inuolidiorem obtinet. Radice est candida pollicis crassitudine, succosa, in arenam altius defossa: caulibus multis, bipedalibus, furculosis, rectis: foliis Hederæ, læuibus, mollibus, pallidis: flore quoque albo. Succo lacteo tota planta manat. Quomodo Scammoniz succus, cuius vsus est, sit colligendus, & syncerus ab adulterato secernendus docet Dioscorides. Colligitur succus capite radice ablato, & ipsa in forniciis formam excutata confluit enim in ipsam succus, qui conchas demum excipitur. Alij effosa ad restudinis formam terra, & substratis nucis folis succum excipiunt, & siccatum extrahunt. Quod ab Orbasio sic declaratur. Alij scrobes in terra martarij instar effodiunt: (ῥοφιδῶς legit, non, ῥοφιδῶς, id est, instar forniciis) in quos substratis nucum foliis radices abradentes, liquorem effundunt, atque ita siccatum extrahunt. Probatum

qui pellucidus est (Plin. 104, 105, Ruellius ex Plinio, nitidum vetit) leuis, taurini glutini colore, foramina tenuia habens, spongiosus. Talis est qui ex Mysia Asia adfertur. Nec verò solo attendere oportet, si ad tactum linguæ albescat: hoc enim evenit etiam admixto ipsi Tithymali succo, sed magis consideranda sunt prædictæ notæ: etsi non vehementer linguam exurit, id quod etiam Tithymalo admixto solet contringere. At Syriacus & Iudæicus pessimi sunt, græues, densi, Tithymalo & eni farina adulterati. Scammonij historiam paulò aliter tractauit Plinius. Radix eua

Lib. 14, 28.

Canis

Canis ortum excavatur, vbi in ipsam confluat succus, qui sole siccatus digeritur in pastillos. Siccatur & ipsa, vel cortex. Laudatur natione Colophonium, Mysium, Prienenſe ſpecie autem nitidum, & quàm ſimillimum taurino glutini, fungoſum tenuiſſimis fiſtulis, citò liqueſcens, virus redolens, gummoſum, linguæ tactu lacteſcens, quàm leuiſſimū, cū diluitur a'beſcens. Hoc euenit & adulterino, quod fit erui farina, & Tithymali marini ſucco, in Iudæa ferè, quod etiam ſtrangulat ſumptum. Deprehenditur guſtu, Tithymalus enim linguam excaſfacit. Quod Scammonium Dioſcorides ſpōgioſum, Plinius fungoſum dixit. Præterea citò liqueſcens, virus redolens, gummoſum, linguæ tactu lacteſcens, cū diluitur albefeſcens, Dioſcorides inter bonitatis notas nō recenſet. Hic adulterari erui farina, & ſine diſcrimine Tithymali cuiuſvis ſucco, ille Tithymali marini tantū ſucco reſultat, atque quod adulteratum ſit, ſumptum ſtrangulare, quod Dioſcorides non habet. Scammonij facultates nunc ſunt explicandæ primū ex Dioſcoride. Succus drachmæ vnius, aut obolorum quatuor pondere hauſtus ex aqua, aut aqua mulſa, purgat per interna pituitam ac bilem. Verū ad aluum ſoluendam oboli duo cum ſelamo, aut alio ſemine ſumpti ſufficiunt. Dantur etiam ad efficaciorem purgationē ſucci tres oboli, Ellebori nigri oboli duo, & aloës drachma vna. Fiunt etiam ſales purgatorii drachmis viginti ſucci Scammonia: ad ſex ſalis cyathos adiectis. Horū modus eſt proportionē virium, integer cochlearia tria, medius duo, minimus vnum. Purgat & radicis drachma vna, aut dua, cum iis quæ dicta ſunt. Quidam decoctū ipſius bibunt. Cocta cum aceto, & trita cum farina hordeacea iſi hiadicis fit cataplaſma. Succus necat partus in lana vtero appoſitus. Tubercula diſcutit cum melle aut oleo illitus. Coctus autem in aceto, & illitus, lepras exterit. In diuturno capitis dolore cum aceto & roſaceo caput ex eo irrigatur. Qua de re ita Plinius ſcripſit. Scammonium quoque ſtomachi diſſolutionem facit, bilem detrahit, aluum ſoluit, præterquā ſi adiciantur aloës drachmæ duæ obolis eius duobus. Et mox, Bulbi more, nec antè, nec poſt vtile (vetus quidā codex habet, vſus bimo, nec antè, nec poſtea vtile. Alius verò: Bimatu, nec antè, nec poſt vtile: quæ neque ad Bulbum reſertit poſſunt, neque Bulbus ad Tithymalum, de quo modo dixit linguam excaſfacere.) Dedere & per ſe ex aqua mulſa, & ſale, quaternis obolis. Sed vtiliſſimè cum aloë, ita vt incipiente purgatione mulſum bibatur. Fit & decoctum radicis in aceto ad craſſitudinem mellis, quo lepræ illinuntur, & caput vngitur in dolore, cum oleo. Dandi Scammonij, ac ſumendi modus longè apertiùs à Dioſcoride quàm à Plinio hic traditus eſt. Deinde, Scammonio roſaceo & aceto diluto, in vetuſto capitis dolore Plinio caput vngitur, Dioſcoridi irrigatur, ac perfunditur, qui nec tradidit vſum bimo eſſe, nec antè, nec poſt vtile. Certè Meſues viginti annis ſeruari ait. Galenus Scammonia in ſimplicium catalogo nō meminit. Paulus verò Scammoniam ſcribit caſſacere, diſcutere, & bilioſa extergere, magiſq; eius liquorem, qui iam & phymata diſſipat, ſectus appoſitus corrumpit, lepras exterit, diuturno capitis dolori cum oxyrrhodino ſuperfunditur. Radix tum ipſa, tum decoctū eius potum purgati: cum aceto autem & farina hordeacea decocta, coxendicum doloribus applicatur. Et alio in loco. Scammonia perinde ac Veratrum purgat, magis ſtutam bilem. Cæterum inter omnia quæ purgationes moluntur, aduerſiſſima ſtomacho eſt. Datur igitur iis qui febre carent, & ſtomacho ſunt meliori, ad pondus quatuor obolorum cum ſale, aut pipere, aut zinzibere, aut quodam ſtomacho vtili, quod protinus corpus permeat, aut etiam cum melleitem cum gummi quoq; ſunt catapotia. Theophrastus, τὸν δὲ σκαμμόνιον, inquit, ὁ πρὸς μόνον χρόνον, ὡς δὲ ὕδωρ. Id eſt, Scammonia ſuccus tantū vtilis eſt, & nihil aliud. In his quæ à veteribus de Scammonio produntur, duo ſunt expendenda: eius delectus, & in purgationibus doſis. Laudant enim illi leue, pellucidum, colore quàm ſimillimum

Lib. 4. cap. 165. Vm.

Lib. 16. c. 3.

Lib. 7. cap. 1.

Lib. 7. cap. 4.

Lib. 5. h. d. cap. 11.

maximo glutini. At vulgare nostrum squalidum est, & cineritio colore, & aspectu tristiore: quia non succus, aut liquor manant, aut lacryma Scammoniz ad nos adfertur, sed succus vi expressus. Scammoniz lacrymam, quam Venetis apud Albertum Martinellum vidit Pena in Syriacis conchis allatam, Colophoniz eoncolorem, concretionem simili, ex fusco cæruleam fuisse ait, cuius coloris non est Scammonium nostrum. Sic differt Meconium ab Opio, quod est manans liquor, seu lacryma Papaveris, flava & limpidior. Verum cum pura ac meta lacryma Scammoniz tam frequenter vsui non sufficeret, succum multum vi expressum ad nos asportari oportuit: cuius maximè delectus habendus, quia nullus nisi variè adulteratus ad nos adfertur. Nam aliquando ex eodem corpore, eadem morbi causa, & eodem planè modo affecto, grana aliquot sumpta facile, & sine vilo cruciatu, bilem pituitamque expurgabunt, ex eadem prorsus gleba frusto paruo effracto multo plura grana sumpta minùs euacuabunt, nec sine molestia, & cruciatu. In causa est dissimilis molis concretio, quæ hic plus, illic minus, aut lactis Tichymali, aut Lathyridis, aut alterius stirpis valentioris succi accepit: vnde dissimiles purgationes consequuntur. Cum autem veteres, aut drachmam, aut quaternos obolos, aut maiorem aliquam dosim præstebunt, purum & merum succum impetant.

CHAMELÆA.

CAP. XI III.

Nomina



CHAMELÆA Græcis & χαμαῖος ἄνθος, Latinis etiam Chamelæa, & Oleago, Oleastellus, Mauritanis *Mezereum*, & *Almazerion*, Prouincialibus *Giaroupe*. Chamelæa autem, id est, humilis Olea, vel Oleago, vel Oliuella dicta est, ob eam quam cum Olea foecita est similitudinem. Chamelæa, vt tradit Dioscorides, frutex est sarculosus, tamis dodrantalibus, folijs Oleæ, sed tenuioribus, dēsis, amaris, quæ gustum mordent, & atteriam deradant.

L. 4. c. 166.

Forma.

Lib. 31, c. 27.

Plinius ex Chamelæa oleum sacitium parari dicit, ipsamq; descripsit his verbis. Simillimum huic est ex Chamelæa frutice saxoso, non altiore palmo, folijs Oleæ baccisq;.

CHAMELÆA, *Marth.*

Lib. 24, c. 19.

Lib. 3. hist.
cap. 37.

Quo in loco pro saxoso, fortasse legendum sarculoso, vel sarmentoso: est etiam Dioscoridi frutex *εργασίδης*, nam reliqua, vt Dioscorides, etiam Plinius habet: & præterea baccas & oleum. Eadem repetit Plinius alio in loco. Chamelæa similitudinem foliorum Oleæ habet. Sunt autem amata, odorata in petrosis, palinum altitudine non excedente. Marthiolum Chamelæam & Thymelæam copiose in vallis Ananiz montibus, & Tridentino agro provenire scribit, & utramque fructum ferre Myrti baccis similem, qui tamen Chamelææ longior sit quadantenus, & oliuæ formam referat. Vtrique initio vitefcit, mox per maturitatem tubescit, denique exsiccatus niger conspicitur. Dodonæus, Chamelæa, inquit, in Italia & Gallia Narbonensibus incolis, asperis & desertis repetitur, humilis & fruticosa stirps, pedalis, aut altioris magnitudinis, multis tenuibus virgulis ramosa, folijs oblongis, Oleæ similibus, sed minoribus & nigrioribus: flores ex alijs foliorum exigui, sublucci: fructus inde

CHAMELÆA,

Dodonæi.

CHAMELÆA Alpina

incana, Pena.



tricocci, vt in Tithymalo, & Lathyri, primum virides, deinde rubentes cum maturuerunt, qui decerpti nigrescunt, oleosamq; pinguitudinem contrahunt oleorum instar, sapore acres & mordaces, faucibus exurentes, veluti folia & cortex, obiculis duris lignosis, piperi similibus: radix lignosa. Huic Chamelææ aliam addit Pena, quam Chamelæam Alpinam incanam vocat, superiori valde similem gustu, facie, viribus: foliis & virgultis ligneis, gracilibus, concoloribus, rugoso cortice amictis, quæ tamen ab illa facile discerni possit, fructu nimirum Mezerei Gerinanci, Oleastri, aut Philyreæ, non tricocco, & foliis summis non ex atro virentibus, sed tenui, molliq; & incana lanugine obductis, quemadmodum & flores pallentes è lagenulis argenteis, Stramonix similibus, sed minoribus cõspiciuntur. Commanducata, non secus ac Mezerei Germanici, grana fauces exurunt: ideoque etiam plebs rusticum piper vocat. Manducata folia lentorem remittunt, vti Sardanellæ, Thymelææ, & Chamelææ Narbonensis. E' Lemani & Allobrogum vicinis Alpibus solum habuisse ait. Chamelææ folia pituitam & bilem purgant per inferna, auctore Dioscoride, præsertim in catapotia deuorata: ita vt duplum absinthij cum vna Chamelææ parte misceatur, & hæc aqua aut melle excepta in catapotia formentur. Non liquefcunt ea in ventre, sed quotquot accepta fuerint, per aluum egeruntur. Iisdem foliis tritis & melle exceptis sordida & crustosa vlcera repurgantur. Plinius, Chamelæa, inquit, aluum purgat: detrahit pituitam bilēque, foliis in duabus absinthij partibus decoctis, succoq; eo cum melle potio. Foliis impositis & vlcera purgantur. De eadem breuiter hæc Galenus. Chamelæa vincentem habet qualitatem amaram. Quamobrem admodum sordida vlcera, & maximè quæ crustas habent, commodè purgare potest.

Vires &
Temper.
L. 4. c. 166.

L. 14. cap.

Nomen



RÆCIS θυμέλαια, sic & Latinis Thymelæa nominatur. Quæ appellatione effigiem naturamq; plantæ quadante nus adumbrat. Videtur enim Thymelæa quasi Tithymelæa dicta, ex Tithymali & Oleæ mixta facie. Arabes etiam *Megerson* vocant, eam cum Chamelæa confundentes.

THYMELÆA, Math.

Forma.
L. 4. c. 167.

Locus.

Libyæ, cas.

THYMELÆA, Dodon.



Eius semen *κνίδιος κνίδιος*, id est, granū Cnidium dicitur, Eubœenses Apollinum vocant, alij Linum, quòd sativo Lino frutex hic similis sit. Faluntur qui Granum Cnidium Chamelææ fructum esse putant, foliorum similitudine decepti. Virgas producit longas, ut describit Dioscorides, multas, bicubitales: folia Chamelææ similia, sed angustiora & pinguiora, viscosa & glutinosa dum māducātur: flores albos, & inter ipsos fructum Myrti baccæ modo paruum, rotundum, initio viridem, tandem rubentem, cuius fructus inuolucrum durum est & nigrum, intus album. Nascitur in asperis & montosis locis. Plinius breuiter hæc complexus est. Etenim quo nascitur Granum Cnidium, quod aliqui Linum vocant, fruticem verò Thymelæam, alij Chamelæam, alij Pyros achenen, alij Cnidium. Est similis Oleastro, foliis angustioribus, gummosis si mordeātur, Myrti magnitudine, semine, colore, & specie farris, ad medicinæ tantum usum. Quæ mendosa sunt, & ex Dioscoride si corrigēda, Myrti magnitudine, semine, colore & specie foris. Thymelæam cum Chamelæa Ananix montibus & Tridentino agro copiose nasci scripsit Matthioli, uti supra diximus. Eius Thymelæam hic appinximus. *Mexico* quidem ille Germanicum potius, cuiusque semen, piper rusticum seu montanum appellatum, quam Thymelæam veram cuiusque Granū Cnidium nobis proposuit. Genuinam Thymelæam descripsit Dodonæus in Hist. Stirp. cuius iconem hic posuimus. Felicius pictam dedit in Hist. purgantium: item Clusius, qui eam accuratissime delineauit his fere verbis. Thymelæa frutex est pollicari interdum crassitudine, cubitalis, aut amplior, qui in multas virgas diuiditur cubitales, pulchras, tenues, rectas, quas vestiunt perpetuò virentia folia, Lini, maiora & latiora, mucronata, non cuspidata, ut in Chamelæa, neque ita fragilia, sed lentiora, & gummosum quid præbentia, si dentibus atterantur. Flores fert in extremis virgis, candidos, Oleæ fere similes, quatuor foliolis constantes, copiosos, racemarum fere propendentes deinde fructum

THYMAELÆA vera Clus.
Dodon. Histo. purgans.



fructum baccarum Myrti interdū magnitudi-
ne, oblongiorē paulò, per initia virentem, cū
maturuit rubrū corallij modo, carne succi ple-
na & aquosa vt in Cerasijs, sub qua later vnicū
semen, nigra fragilique pellicula, allam & ferui-
do gustu medullam continens. Radix ignota
& dura, in teneris plāti Raphani modo effor-
mata, & crasso cortice tecta, lentoque & admo-
dū tenaci, quemadmodū & tota planta. Flo-
ret Iulio, & toto lere Autumno, deinde sem-
per profert. Nascitur locis asperis per totam lere
Hispaniam, & plerique Gallie Narbonensis.
Quod Pericarpium dixit Dioscorides, non to-
tius baccæ rubentis inuolucrum intelligit, sed
inuolucrum seminis in baccâ conclusū, cuius
seminis medulla alba est, & in ea semor ille que-
situs in grano Cnidio. Quæ, sicut in Dioscoride
auctore, per inferna bilem, pituitam, & aquas
purgat, si viginti granorum interna pars biba-
tur. Verum fauces vr̃it. Quare cum farina aut
polenta dari debet, aut in vix acino, aut melle
cocto obduco deuoranda. Eadem trita cum ni-
tro & aceto illinitur is qui ægte desudant. Fo-

Lib. 6. Hist.
Vires.

lia, quæ peculiariter Cneoron vocatur, circa messem colligi debent, & in vmbra
siccata reponi. Qui dare volunt tundere debent, & neruos emere. Purgat ex ipsis
acetabuli mensura vino diluto inspersa (legendum enim *πικρασμῶν*, non *πικ-
ρασμῶν*, vt habent exemplaria multa, quæ secutus Ruellius vertit, illitum). Sed
moderatiùs purgat mixta cum lente cocta, & tritis oleribus. Eadem folia trita cum
vux acerbæ succo in pastillos redacta reponuntur. Herba stomacho infesta est,
partus appositâ necat. Cocco Cnidio, inquit Plinius, color corni, magnitudo gra-
no piperis maior, vis ardens. Itaque in pane deuoratur, ne adurat, cū gulam tran-
sit. Huic vis præsentanea contra cicuram. Sinit aluum. Quæ ex Theophrasto sum-
pta sunt. *Δι' κνιδίους κόκκους στρογγύλους, ἐνυβρόν τε χυμῶν, ἐκίχον ἡ δὲ τῆς πεπρωσ, ἐχρηστέον
ἐν πολῷ τῷ θερμώτατι. Διὰ καὶ οὕτως διδύσκει ἡ ποτὶ (διὰ τὴν γὰρ πρὸς κοιλίας λύσιν) ἐν
καὶ τῇ σαρτὶ καὶ ἐκλαττωσιν. καὶ οὕτω γὰρ ἄλλος τὸν πεπρωσ. Id est, Grauum Cnidium ro-
tundum est, colore rubrum, maiusq; pipere, sed multò validiore caliditate. Quare
in potu dantes (exhibent verò ad aluum solucndū) pane aut farina subacta obdu-
ctum id præbent: alioqui enim id fauces adurit. Quod hic exhiberi ad aluum sol-
uendam vertimus, Plinius sinitre aluum non rectè videtur dixisse, cū granum id
catharticum sit, vel Galeno teste, qui scribit Granum Cnidium purgare, sed acris
esse & adurentis facultatis. Artentiores in eo loco Plinij legunt: Ciet aluum. My-
conus herbariz rei studiosissimus fruticem & eius iconem ex Hispania misit, quæ
Thymelææ speciem esse suspicatur. Frutex hic passim in locis siccis & siluis nasci-
tur, inquit, maxime in quercetis, altitudine cubitali, ramulosus, & circumquaque ra-
mulos diffundens. Folia eius minima sunt, Myrto similia, sed minora: flos luteus
minimus, ab ea solij parte, qua caulem attingit, nascens, vt in Chamæpity: radices
lignosæ, præsertim superiore parte, cortice nigro rufescente, crassitudine polli-
cati, non altius in terram demissæ, sed per summum rufescentem diffusæ, flexiles, gu-
stu valde ingraro, cum acrimonia amaro, & fauces abradente quemadmodū
Thymelæa Dioscoridis. Totius fruticis odor grauis est, & sapor insuauis. Totus*

Lib. 37. c. 9.

Lib. 9. Hist.
cap. 22.

Lib. 7. sim.

etiam

THYMELÆÆ species,
Myconi.



si mordeantur, & gustu amaro, deinde admodum acri & adurente: flos in olea Oleæ similis, oblongi, in quatuor foliola per extremum diuisi, colore luteo. Flos Thymelææ ferè, sed nigricante: radix crassa, lignosa. Frequens est in rebus lentino & Granatensi. Martio & Aprili floret. Illic ab Herbariis Sanamundæ dicitur, à rusticis *Mierda-cruz*, propter purgandi facultatem, cuius causa tustia regionis apprimè in vsu est. Hæc Clusius.

SESAMOIDES. CAP. XVI.

Nomina

ΣΕΣΑΜΟΕΙΔΕΣ, *ἑσάμοειδες*, & *σῆσαμοις* Græcis, Sesamoides gnum, & Sesamoides paruum Latinis, à seminis similitudine dictum.

Li. 4. c. 147.

Forma

Sesamoides magnū, quod in Anticyra Elleborum, vel, ut ait Theophrastus, Elleborinen vocant auctore Dioscoride, quia in purgationibus Elleborum miscetur, herba est similis Senecioni aut Rutæ: foliis longis: flore albo: radice cili, inefficaci: semine sesamo simili, gustu amaro. Sesamoidi paruo, quod album vocat Galenus, cauliculi sunt palmi altitudine, folia habentes Coronopo similia, sursum tamen & minora. In summo cauliculorum capitula sunt flosculorum superpurpureorum, medio eorum albo, in quibus semen sesamo simile, amarū, fuluum, radix tenuis est. Nascur in asperis locis. De quo hæc Plinius. Sesamoides à similitudine nomen accepit, grano amaro, folio minore. Nascur in glareosis. Deinde de altero. Est etiamnum aliud Sesamoides Anticyræ nascens, quod ideo aliqui Anticyricon vocant: cætera simile Erigeron herbæ. Sesamoidis magni semen, ut docet Dioscorides, purgat pituitam & bilem per superna, quantum tribus digitis capi potest tritum, & sumptum cum Ellebori albi sesquiobolo in aqua mulsâ. Parui item semen purgat bilem & pituitam per inferna acetabuli mensura potum cum aqua mulsâ. Idem impositum cum aqua tubercula & tumores discutit. Eadem ferè Plinius habet. Granum Sesamoidis datur in vino dulci ad detractiones.

Locus.

Li. 24. c. 24.

Ibidem.

Li. 4. c. 147.

Li. 24. c. 24.

tribus digitis capitur, miscéntque Ellebori albi vnum & dimidium obolum, purgationem eam adhibentes maxime infanz, melancholiz, comitialibus, podagris. Et per se drachmæ pondere exinanit. Et Sesamoides paruum de robor bilem in aqua potum. Semen illinitur igni factio discutit panos. Galenus, Sesamoides magnum, inquit, quod & Anticyricus Elleborus appellatur, quia semen eius vt Elleborus purgat, hoc & reliqua facultate Elleboro similis est. Nam & in abstergendo, exsiccando, desiccandoque similem illi vim obtinet. Sesamoidis albi semen vehementer amaram qualitatem continet, non solum mediocrem. Calfacit itaque, rumpit & extergit. Herbas istas catharticas Herbarij sibi ignotas esse fatentur. Pena tamen suspicatur Hormalam Syriacam in odoratis depictam ex Lobellio Sesamoides maius esse. Matthioli vero Sesamoides minus ostendit, quod Cortuso acceptum refert. Penultiopinantur Sesamoides maius esse eam

Lib. 3. sim.

In cap. 47.
lib. 4.

SESAMOIDES *minus*
multorum, Dalech.



herbam, quæ in tota ora Massiliæ & Liguriæ, Corsica ac Sardinia vigentur, illicque vernacula lingua *Tartourave* appellatur. Fruticosus est, pedes non altior, radiculis substant, gracilibus, tenuibus, si totam plantam spectes, superuacuis ramis multis, rotundis, densa lanugine villosis, furculosis foliis Rutæ simillimis, numerosis, hirsutis, candidis: flore in summis ramis copioso, exiguo, candido, densius congesto, intra lanuginem delitescente: semine paruo, nigro, gustu tam feruido, vt si quis herbam mandat, diutius ardere fauces videantur, tam pertinaci vredine, vt nulla oris collutione deleri possit. Minor sanè est in Chamelæa, Thymelæa, Laureolæq; generibus acrimonia, ac vrendi vis, quàm in hac planta. Hodie impostores, ac quidam ignari quàm inalefica sit huius plantæ vis, & corporibus nostris noxia, ex vino albo, vel cicetû decocto, vel elixæ carnis iusculo bibendâ propinant drachmam vnam vel alteram, in validisimis naturis, tanta purgandi potestate, vt sepe ob hypercatharsim sanguis erumpat. Educt autem sic sumpta biliota, pituitosa, aquosa,

id quod & Dioscorides testatur: vt inirum non sit, in Anticyra dictum olim fuisse Elleborum, admisceriq; solitum potionibus ex Veratro albo paratis, vt facilius & citius Veratrum, quod vomitiones magis ciet quàm deiectiones, aluum commodius detraheret. Hoc fortasse Elleborum est, quod fructum Sesamo similem edere Theophrastus scripsit, quo in Anticyra purgationes fiebant. Quanquam non solum fructu, sed etiam radice vile esse scribit: quod negat Dioscorides, qui radicem *ἀντικυρίαν*, id est, imbecilem, siue ignauam esse dicit, seminiq; purgandi vim tribuit, quam etiam foliis & ramulis inesse experientia docuit. Planta hæc Clusio est Sanamundæ tertium genus, Cortuso Erica Alexandrina, Alfonso Pautio Cneorum. Thymelææ congenerem esse, & iisdem facultatibus pollere putat Clusius. Plantam alteram hic etiam appictam Sesamoides minus quidam nominant, non ad Dioscoridis quidem historiam referentes, sed ad eam quam cum superiore cognationem habet originis, saporis, facultatis cathartice. Quidam Phacoides vocant esse Oribasij, ob foliorum cum Lente similitudinem. In maritimis, vt & alterum provenit, sed Corsicæ magis quàm Galliz, Liguriæve: caule pedali, in ramul

los pluri

los plurimos & graciles diuiso, lanugine molli vestitos superioris modo: folijs numerosissimis, minimis, lætiùs virentibus, Lenticulæ similibus, cū ca ramos densissimè coaceruatis, vt ramorum conspectum adimant, Aizoi acris specie: flore copioso, tenui, candido, per totos ramos folijs intersparso, suauissimi odoris, nec moscho dissimilis, & quasuis acres plantas superantis. Purgat, & eundem humores educit quos Sesamoides maius, sed laboriosius, præsentiorèque

*SESAMOIDES minus,**Dalechampy.**SESAMOIDES minus,**Matthioli.*

nimix vacuationis discrimine. Eius ruscæ ac cribratæ drachmam pitiana mixtam forbendam dedit Dalechampus cuidam neruorum distentione laboranti Lugduni in publico valetudinario, cui non segnîus alius decessit, est, quàm si colocinthidem sumpsisset, restitutâque sanitas. Sesamoides minus à Matthiolo positum Pena approbat, scribitque optimè Cyanis comparari. Folia enim prorsus sunt Cyani parui, incisura & ortu Coronopi, hirsutiora, maiora (fortè *μακρότερα* pro *μικρότερα* in Dioscoride legendum, qui error in eo saepe frequens est): flores radiati, prorsus Cichorij concolores & similes superne, subtus capitula ex squamulis compacta Cyami aut laceæ modo habentes: femine tus Selami: radice Tragopogoni, exiliore. In Narbonensi agri squalidis colibus, etiam herbis ad Ladum copiosè prouenit hæc planta, atque etiam in Lombardia. Huic Matthiokus non rectè Phalaridis flores & capitula affinxit. Hæc ex Pena. Quidam Catanancen priorem esse putant.

EMPETRVM Græcis, & *φασεῖδης* dicitur, Latinis Empetrum & Phacoides, & Calcifragum Plinio. Id non descripsit Dioscorides, sed dixit tantum in maritimo & montolis nasci, gustu salso, quod verò propius terreno prouenit, amarius esse. Purgat pituitam & bilem, & aquas, si in iure aliquo, aut aqua nulla exhibeatur. Eadem prorsus Plinius tradidit. Empetron, quam nostri Calcifragum vocant, nascitur in montibus maritimis, ferè in saxo: quo propius mari fuerit, minus salsa est (Deprauata hæc in vulgaris codicibus lectio, sic corrigenda, quæ propius mari fuerit, salsa est) potaque bilem trahit ac pituitas: quo longius magisque terrena, amarior sentitur. Trahit aquam. Sumitur autem in iure aliquo, aut in hydromelite. Galenus scribit Empetrum ad solas purgationes esse vtile, bilem ac pituitam educens, gustu salsum esse, quare ad alia quoque vti licere, ad quæ pollet substantia salsa: item nominari Prasoides. Idem planè Aëtius & Paulus ex Galeno exscripserunt, vt vox phacoides vel in Dioscoride, vel prasoides in aliis merito suspensa sit. Addit Paulus, quia salsum est, extergendi vi præditum esse. Cum verò Dioscorides, Galenus, atque alij Græci medici ipsos sequentes scribant Empetrum ad purgationes tantum vtile esse, Plinius contrà his quæ modò citauimus subiiciat, vetulitate vires perdere, recens vrinas eiere decoctum in aqua vel tritum, calculosque frangere, & qui fidem promisso huic quæruunt, affirmare lapillos, qui subferuebant vna, rumpi: perspicuum est eum, alterum Empetrum Saxifragum dictum cum maritimo Empetro

EMPETRVM phacoides, Herba terribilis Narbonensium.



confudisse. De quo Saxifrago, siue Empetro altero, caput extat in multis excusis exemplaribus Dioscoridis, cui calculos vesicæ frangendi, & vrinas eiedi vis tribuitur: quamquæ caput hoc inter Dioscoridis notha & adscripticia a peritis herbariis referatur. Præterea ex iisdem Græcis authoribus colligere licet sœniculum marinum, siue Herbam Sancti Petri, Empetrum non esse, hoc loco descriptum, quod quidam crediderunt: quia ei nulla bilem purgandi, pituitamque facultas insit. Quare diuinare potius, quam certò statuere licet, quæ planta legitimum veterum Empetrum asseri possit. Si tamen cõiecturæ locus sit, Dalechampius Empetrum esse opinatur plantam, quæ à vulgo Narbonensiû Herba terribilis vocatur, cuius capite de Alypo mentionem faciemus, ob violentiam in corpore purgando facultatē. Ea nunc in ipso maris litore prouenit salsum humorē bibente eius radice, ac tum salso gustu est, vt cæteræ plantæ, quarum radix marinam aquam fugit: nunc in montibus mari vicinis, vt in monte Cestio, vulgò *Cap de Ceste* prope Agatham, nullo maris succo imbuta, sed tantum obie

cta eius afflatui, ac tum saluginis expers, gustati perquam amara sentitur. Cubiti est magnitudine, & eo maior, cortice purpureo, ramosa, folio Læti, sed Læti modo per æquales versus non disposito, per ramos & furculos nullo ordine prodeunte, superne viridi, inferne candicante, capitulis in ramiarum vertice purpureis & rotundis, Aphyllanthi non dissimilibus. Purgandi vim habet Scamioide utroque non inbecilliorē. Purgat autē bilem, pituitam & aquas non aliter, quam Tichymalus.

Nomen



ΚΥΣ ἄγρος, Cucumis silvestris Latinis dictus est, & Cucumis crassus, & anguinus, Officinis Cucumis asininus, Arabibus *Cheta alimar*, *Katallener*, seu *Cheta alhamar*, Italis *Cocomero saluatico*, Germanis *P'wilder cucumer*, & *Ejsele cucumer*, Hispanis *Cogombrillos amaragos*, Gallis *Coucombre sauvage*, Cucumini

L. 4. c. 49.

Forma.

silvestrem tradit Dioscorides solo fructu distare à sativo Cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia atque samenta sativi refert: radice candida, magna.

CUCUMER agrestis,
Matthiola.



His notis Cucumerem nostrum silvestrem designari nemo est qui non aperte videat. Is flagella per terram spargit, bicubitalia, minima digiti crassitudine, rotunda, breuibz aculeis aspera, solida, & anguium modo inflexa. Folia edit ex longis, crassis, & aculeatis pediculis pendencia, in obtusum mucronem desinentia, perpetuè viridia, infernè pallidiora, & creberrimè reticulatisque venis, rugosa, utrinque aspera. Flos tota æstate ex foliorum alis, quinis, lais, terminatis, & flauis foliolis constantes, quosdam steriles, quosdam fecundos. Steriles ternarius trifida veluti complicata, & per antheram crocea, nec hirsuta stamina habent, in anteriore parte capitulum, futuri fructus rudimentum. Fecundi in medio ternas hirsutas flauas furculas staminum vice continentes. Retro hirsutum & oblongum extuberat tuberculum, quod flaccescēte flore paulatim cum pediculo accrescit, donec maximè glandis crassitudinem superauerit, quod undique aculeis armatur, & in maturitate cōspicue glaucet, & candicare, vel pallefcere cœperit, sponte sua, aut leuitet tactum ex pediculo

exiit, & cum impetu oblonga, foris nigra, intus candida semina cum aqueo humore ei acclat. Radice nititur crassa, rotunda, carnosa, rapo oblongo haud abominabili radiculis multis huc & illuc dispersis. Tota planta vehementer amara est, præsertim fructus amarissimus, sola seminis medulla dulcedinem habet, quæ etiam inures alieat, inquit Cordus. Quare miratur Galenum huic semini amarum non potuisse tribuere quod fortasse tantum corticem seminis degustauerit, qui amarus est, non ipsa in nucleum, qui propriè seminis appellatione venit. At falso Galenum a Cordo reprehendi Matthiolus arripitur, quod nusquam scripserit Galenus Cucumeris silvestris semina amara esse, sed Cucumerum semina quædam amara esse, quemadmodum & amygdale: nec diserte dixisse Galenum aut satiuum aut silvestris Cucumeris semina quandoque amaram reperiri, coniecere tamen ex contextu facili esse de satiuo semine intelligere, & lectores admonere voluisse huiusmodi seminum nucleos, qui natura dulces sunt, aliquando soli in quo nascuntur vino amatos effici. Nascitur Cucumis silvestris in sabuletis, ac rudieribus: eliq̃ in Gallia Narbonensi & Hetruria frequens. Frigidioribus locis feritur in hortis ab Herbariis. Augusto mensis floret. Autumno fructum producit. Instillatus liorum succis aurium dolori conuenit, inquit Dioscorides. Illita ex poleonis radix veterem omnem tumorem discutit. Imposita cum resina terebinthina tubercula

Locus.

Tempus.

L. 4. c. 49.

Vires

Temper.

cula rumpit. Ichtiadicis infunditur : podagras discutiit decocta ex aceto & illita. Eius decocto dentes in dolore colluuntur. Arida farina impetiginem, lepras & vitilignes absterget nigris cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus felquioboli pondere, item cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitam quæ deiciunt, præsertim in hydropicis : deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. Radicis febriæ in vini, præsertim Lybicæ, hemina conteritur, danturque ex eo terni cyathi tri duo, dum tumor abundè deprimi cernatur. Quæ postrema sententia sic legitur in vetere codice. Δεῖ δὲ τῆς ῥίζης λαβόντα ἡμίλβαν μζ' αἰσιν ἐξερῶν οἴνω, μέλινα ἀγυπτίους γλυκύαις, λειψέτω, καὶ διαδοῦναι ἐκ τούτου κομίσθων. γ. γ. ὅς ἐστι ἡμέρας τρεῖς, εἰς αἷμα δύγκατος ἐκ αὐτοῦ συσταλῇ. Id est, cum febrilem eius acceperis, oportet eam laeuigare cum binis sextariis vini dulcis, præsertim Aegyptij, propinare quæ ex ipso tres cyathos ieiuno trium dierum spatio, donec abundè tumor ipsè subsidat. De foliorum & radicis vsu medicorū, idem quod Dioscorides Plinius apertè tradidit. Radix ex aceto cocta podagræ illinitur, succoquæ dentium dolori medetur. Arida cum resina impetiginem & scabiem, quæ pforam & lichenas vocant, parotidas & panos sanat, & cicatricibus colorem reddit. Foliorum succus auribus turdidis cum aceto instillatur. Sed in his quæ de Elaterio scripsit, à Dioscoride dissentit. Cucumer siluestrem esse diximus, inquit, multò infra magnitudinem satui. Ex eo fit medicamentum, quod vocatur Elaterium, succo expresso ex semine. Quæ in re Plinius Theophrastum sæculis æstimeribz enim καὶ τῆ σκεύη τῆ ἀγρίας τινος μέρη ῥίζαν ἀλάφης καὶ ψάρας βοσκόμεσαι (legendum, ἀλάφης καὶ ψάρας βουήται, το ζωοποιον, &c. Est enim id, quod Dioscorides ante dixit. Ξυμα δὲ λεῖτα ῥίζα ἀλάφης, λίπραν καὶ λετχάνους σημάχει, nulla facta pecudum mentione) το δὲ σπέρμα χλωρόν ἐν ποσσὶ τοῦ λαθέμενον. τὰλλα τε αὖ δὲ τὰ θρωσκομένη, τότε γάρ βέλιον. Id est, Cucumeris siluestris radix vitiliginem & scabiem sanat. Ex semine verò succo expresso fit Elaterium. Legitur Autumno : tunc enim melius. Dioscorides verò ex fructu Cucumeris elaterium fieri docet, vt simul etiam quod in ipso carnosum exprimat. Deinde quod scripsit Dioscorides. Sunt qui ad hauriendam procinus succi abundantiam cribratos cineres humi inspergant, & medium cauantes replicatum linteam obfundunt, per quod Elaterium cum sua humiditate diffundatur, siccatumque in pila conterunt, Plinius non satis expressit. Semen quoque, inquit, cinere conspersigitur, ad coercendam succi abundantiam, qui expressus suscipitur aqua celesti, & subsidit, deinde sole cogitur in pastillos ad magnos mortalium vlus. Paulo post de Elaterio, Nec vllum, inquit, ex medicamentis longiore auo durat. Incipit a trimatu. Si quis recensiere vii velit, pastillos in nouo fictili igne lento in aceto domet. Melius quo vetustius : finitque iam ducentis annis seruatum, vt auctor est Theophrastus, & vsque ad quinquagesimum lucernarum lumina extinguithoc enim veri experimentum est, si adnotum, priusquam extinguat, scintillare sursum ac deorsum cogat. Locus Theophrasti, quæ Plinius citat, vs est πείσαν δὲ αἵματος φαρμάκων ἀλλελεον διανεμίσει χρυσόν τριλίτριον, καὶ το παλαιότατον ἀρσενον, μετὸς δὲ οὗν τῆς ὑδατος οὐκ ἀπολείπει, ὥδε ψάλατος ὡς ἐστὶν πάρος ἀλλήδιδινακασίων ἐτών, θαλάσσης δὲ τῆ κρήνης, εἰδυμένων δὲ ταῖς αἰσιν δύναντο. αἷμα δὲ τῶς προσιόντος ὁ ἕρποντες, διὰ γὰρ ταύτην καὶ ὅταν κόψωσι, τιγείσας ἢς τί φραγ ἔρπον, καὶ ὥδε ὅτως ξηρὸν γίνεται, ἀλλ' ἄχρηστον ἵκαντα ἐπὶ οὐθένισσι παρατρέφονται τοῖς λύχνους (non αὐχυνες, vt in vulgatis exemplaribus legimus) παρὶ δὲ μέντοι μέλινα ὑπερέχον αὐνο ποσὶ τῶν φαρμάκων (non ὑπερέχον, vt habent vulgati codices) αἷλη μὲν οὖν ἐκδοτός τῶς δινηάμεως. Id est, Omnium quidem in vniversum medicamentorum maximè diuturnum est Elaterium, & quod vetustissimū optimum. Itaq; medicus quidam, vir haud gloriosus neq; mendax, sibi esse Elaterium ducentium annorum dicebat, virtute mirabili, donatum à quodam. Diuturnæ confer-

uationis est humoris copia: eam enim ob causam etiam cum triuerint, in cinere humidum reponunt, ac ne sic quidem siccarut, sed vsque ad quinquagesimum annum lucernis admotum eas exinguit. Ainnat autem solum hoc ex omnibus medicamentis maximè purgationem immodicam per superiora efficere. Hæc igitur eius medicamenti propria vis. In his Theophrasti vetbis Gaza hæc prætermittit, *πασι τοῖς μὲν καὶ λυχνῶν, καὶ πρὸς τοὺς ἀνὰ πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις*. Est autem *ἐπιεικὲς, ὃ ἵκτεται ἀπὸ τοῦ μὲν ἀνθρώπου*, vt Galeus in Glossis Hippocraticis exponit. Dioscorides Elaterium scribit à bimatu ad decennium deiectionibus vtile esse. Theophrastus id mirabili virtute ducentis annis seruatum esse. Scribit idem Theophrastus *οὐδὲν ἐπιεικὲς μὲν τοῖς λυχνῶν*, quæ Plinius cōuertit, lucernarum lumina exinguit. Contra Dioscorides ait, *παρὰ τοῖς λυχνῶν*, id est, quòd lucernarum luminibus obiectum facillè flagret, vel ad lucernā admotum facillè ardeat. Sed potior videtur esse Theophrasti sententia, vt videlicet Elaterium propter humoris copiā lucernarum lumina exinguat, & vt Plinius ait, scintillare sursum ac deorsum cogat. Nam omne humidum, quod pingue non sit, ignis flammam protinus exinguit. Quare Elaterium, in quo humiditas aquea multum exuperat, lucernæ flammam exinguet potius, quàm ardebit admotum, excitatio videlicet in humido à calore statū, id quod experientia confirmari potest. Itaque cum Dioscoridis locum mendo non esse suspicantur viri docti, & pro *ιουγὲς* legendum esse putat Cornarius à *εὐγὲς*, non ardet. Elaterium bilem ac pituitam vitæ parte extrahit, inquit Dioscorid. Optima suspensio est purgatio. Quod si in animo est deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudine, cacta dato, postea cyathus vnus aquæ tepidæ sorbeat. Ad citandas tamen vomitiones aqua diluens Elaterium subiectas linguæ partes penitissimè penna obliuit. Quod si quisquam difficilius euomat, oleo aut vnguento irino resolutio, somnum inhiibeto. Porro his, qui eximie vacuantur, continue vinum & oleum dare connitentem vomendo restituantur. Quod si vomitiones non finiantur, aqua, & da, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet Elaterium menses parius necat in pello subditum: morbo regio medetur cum lacte naribus infusum, à diurnis capitis doloribus libet. Efficacissime anginis illinitur cum vetere oleo, melle, aut felle taurino. Hæc & alia quædam Plinius habet. Obscuritates, inquit, & vitia oculorum sanat, genarumque vlcera. Tradunt hoc succo tactis radicibus vitium, non atungi vvas ab ausibus. Contra phthirā bibitur, & hydropifēs. Illitum anginas & achoras cum melle & oleo sanat. Et paulo post. Podagris & articulorum morbis decoctum in aceto illinunt, præsentem remedium: lumborum vero dolori semine solo siccato, dein trito, triginta denariorum pondere, in hemina dato aquæ. Sanat & tumores subitos illitum cum lacte mulierum. Purgat eas Elaterium: sed grauidis abortum facit. Suspiriosis prodest, morbo verò regio in nares coniectum. Lentigines ac maculas è facie tollit in Sole illitum. Adiecit & eius modum ex Dioscoridis sententia. Modus proportionem vitium à dimidio obolo ad solidū. Copiosius necat. Integer modus, inquit Dioscorides, obolus est, minimus semibolus, pueris chalci duo, si quidem copiosius periculum adfert. Galeno Cucumeris agrestis tum fructus, tum fructuum succus, quem vocant Elaterium, tum non minime radices, & foliorum, ad medicationes perutilis est. Elaterium itaque menses ciet, & foetum interimit appositum, ceu alia omnia amara, & subtilium partium, maximè si quam habeant caliditatem, velut Elaterium: nam suum me amarus est, leuiter calidum, vt ex secundo sit ordine ex calfacientum. Porro tale protinus digerendi quoque vim habet. Sic igitur eo angina laborantes iungunt quidā cum melle, & oleo vetere. Bonum item est morbo regio affecti,

Ibidem.
Vires &
Temper.

Lib. 10. ca.

Lib. 3. sim.

fufum

fusum cum lacte in nares, dolores capitis sanat etiam hoc vsu. Atq; Elateriũ quĩdem eiusmodi est. At radice succus, vt & foliorum Elaterio similem vim habeat, imbecilliozem tamen. Sed & ipsa radix similem facultatem habet abstergit enim, digerit, emollit. Potrò correx potentiũs ea desiccet. Mesues de huius Cucumeris facultate, viribus, noxa, & eius correctione fusius disserit his serè verbis. Succus ex Cucumeris siluestris fructu laus est præcipua, secunda radice. Is fructus iam absolutus si maturitate pallescat, viridisque esse desierit, & amaritudine sit eximia, succumque remittat album & subpinguem, est calidior. Imperfectus autem tam est noxius, vt sanguinem educat. Succus quidem ex eunte Æstate excipitur: radix sine Veris colligitur. Eadem in medicamenta multum efficacia & celebria recipitur. Succus calidus est & siccus ordine tertio: substantia ignea & terrena constat. Purgat potenter pituitam vomitu, & deiectione, & interdum bilem, si vacuari parata est: serofum quoque excrementum etiam euulsu contumax, atque ideo à iuncturis mirificè trahit, præsertim succo & radice. Ob id earum dolorem sanat: ischiadem etiam iuuat apertè cataplasmate impositus, vel clystere iniectus. Radices eius cum absinthio in aqua & oleo peicoctæ hemieraniam molestam, & curatu difficilem sanant, si ipso decocto tempora fricentur, & si ægris radices eadem cum herba trita cataplasmate applicentur. Succus quoque ipsius cum pauco lacte naribus iniectus idem efficit: excrementa enim cerebri euacuat, & nasi fetorem ab horum putredine ortum persanat: cephalalgiam quoque veterem, & epilepsiam. Idem cataplasma, præsertim si sterces caprinum addatur, tumores magnos & duos, & strumas resoluit. Succus quoque & decoctum tum fructus, tum radice hydropem iuuat potu (valenter enim aquas serofas euacuat) & icterum, & obstructions lienis, & hepatis. Pulvis radice cum melle cicatricem scdam tenuat, ecchymomata contusionibus succedentia dissipat. Succus radice cum farina fabarum, sordem faciei, & sorditatem cutis illius terget. Radix ex aceto forri alphis affricta, eos delet & lentigines. Resoluit enim, tenuat, terget, siccet. Soluit molestè & tardè: aperit, obstructa, & ora venarum. Quæ ne aperiat & vlceret hic succus, ac cum torminibus, & anxia molestia vacuet, datur cum Bdellio, vel Tragachantho, vel lacte dulci, recenter mullso, aut mullso & sale: promptiùs autem purgat cum pauco sale gemmæ & aromatibus. Succus ex fructibus per maturitatem pallentibus clementer sine compressione multa extractus, siccatur vt Scammonium aut aloë. Nonnulli inter siccandam ei immergunt aromata nodulo ligata, quem extrahunt dum siccando cogi incipit. Alij alia immittunt pro variis scopis. Triennio seruatur, post sex menses vtendus. Noxam autem ab eo corpori impressam delent aqua hordei, mullsa, vinum, oleum. Datur succus à granis decem ad drachmæ vnius partem tertiam. Pulvis radice à granis quindecim ad drachmæ semisseim. Decoctum ab vncis duabus ad vncias quatuor.

Lis med.
purg. 49

COLOCYNTHIS.

CAP. XIX.

CΟΛΟΚΥΝΘΙΣ, θήλος, quasi Cucurbitula, diminuto à καλόκυθα Nomine nomine, nam fructus eius cum Cucurbita fatiur fructu collatus, longè minor est, Latinis similiter Colocynthis, & Cucurbita siluestris appellatur, Arabibus *Chandel*, *Handel*, siue *Handal*, Officinis, Hispanis & Italis *Coloquintida*, Germanis *Coloquint*, & *Urtidekurbse*, Gallis *Coloquinte*, & *Courge saumage*. Quibusdam Fel terræ dicitur, Arabibus Plantarum mors, quod herbas

alias sibi vicinas veneni modo interficiat, vt vicina illi terra adusta videatur.

Hippocrate, Colocynthem sive συκωνιον vocat, & σικυν, & συκωνιον σπινθιν, κολακων γινδις τ' ἔστιν, Colocynthis spongiam, eius interiorem partem, & σε π' ἄγριασιν, κολακων γινδις ἀδ' ἑκαμφορίαν, in sectilem Colocynthida, ut Galenus in Glossis.

Forma. ponit. Colocynthis aspera viticulos foliaque per terram strata ^{ponit}, Cucu-
meri, que n hodie Citrulum vocant Oſcinz, ſimilia, in macronem deſinentia.

COLOCYNTHIS,

Marbroli.




Li. 4. c. 171.

Li. 2, c. 190.
Lib. 2, c. 4.
General.

atque vtrinque ex obliquo & profundius in
ternas plerumque partes secta, quæ partes
quoque habent incisuras: flores iuxta folia
lidos siue flauos: fructum rotundum, pile-
ma in orbem coactum, primum viridem, &
inde flauum, cortice nequ' spithæ, n' que duro
contactum, qui cum exaruit, um' & durus est,
fungosa candidâque in ea pulpa, in qua
nula seminibus pyro similibus plene duri-
tate candidum nucleum claudentibus. Ra-
nuitur oblonga, fibrata, candida. Fructus
re est amarissimo, qui licatur, & ad vltim-
diem assernatur. Hæc est Dioscoridi
cynthis: sic enim describit. Colocynthis
menta foliaq; firmi Cucumeris eam, po-
ram repentina, diuisa: fructum in speciem
dioctis pile conglomeratum, vehemen-
tissimum, quem legere oportet cum ceperit in
lidum colorem permutari. Aucennas
fles duplicem faciunt Colocynthisdem,
& feminam. Mas est foris liginosus,
cans, subasper, grauis, durus: femi-
lantior, præsertim si est magna, perse-
rura, alba, lenis, rara, leuis: viri eius in

medulla albisfima, rara, lens & levis: quòque leuior, eo maior: sitq; ex
laxo, arenoso, libero, Autumno lecta, cum languescente viore cæpe
lorem luteum mutari. Inmutata & his notis destituta, mala: status rorim
& molestissimos excitat, immodicè purgat, vt etiam sanguinem educat, &
mortem adferat. Pegima est etiam ac venenosa, quam producit vnicam
vna planta. Quæ planta si loco illo est vnica, multò perniciosior
parit, præsertim si locus ille est viginosus, vel puluerulentus, vel
propinquus, vel serpentinus abundet. Dodonæus alterum Colocyn-
nus reperiri tradit supra à nobis descriptæ haud multum simile, quod vine
longis, asperis alra scandit, & Cucurbitæ satius modo iis omnibus, quæ
sunt, capreolis sui se innoluit. Folia fert Cucumeri siluestri similia:
Cucurbitæ profer similem, sed multò minorem, pyri solim magnitudin
effigie: cortice duro tegitur, viridi, lignoso: intus succo plenus est amar
gustus. Hanc Lobellius pingendam curauit. Cordus sex Colocynthidu
cies recenset, Colocynthidem grandem, oblongam, quæ viticulis mult
terram spargitur, ex intervallo geniculis præcinctis, iuxta quæ capreolis em
tit, & singula erigit fœia longitudine & latitudine pedali, in tres par
modo lecta, tactu aspera, & breuioribus aculeis horrida, pedilibus aut cubitalib
teretibus, asperis, concauisque pediculis insidentia. Ab isdem geniculis tad

Lib. de
plant.
cap. 98.
L.

COLOCYNTHIS Pyri-
formis, Lobel.

in terram demittit tenues, quibus nutriendo
suctus succurrit. Flores secus stoliorum exortu
profert, quibus decid. antibus grandis, & humi
procumbens excrevit fructus, longitudine ple-
rumq; dodrantali, ea crassitudine, quam vtrq;
manu circum amplecti vix possis. Is primum
viridis est, postea candicantibus maculis con-
spergitur, postremo maturus totus luteo pallet,
& circa pediculū eminentibus angulis distin-
guitur. Dissectus corticem primo ostendit du-
tum lignosumq; mox flauam cartilaginosaq;
carnem, & in medio sex ordines seminum can-
didorum, oblongorum, acuminatorum, laterū
& planorum, in quibus candidus inest nucleus.
Radice nititur brevis, a qua multæ alæ candidæ
in diuersas partes exeunt, cubitales, & tenues.
Hæc planta ad cameras perticis extructas ad-
mota capreolis eas apprehendit, & attegias
icenasq; facit. Sapore fructus est amarissimus, &
grauis odore: seminis nucleus dulcis est. Seritur
spectaculi gratia in latis hortorum arcis. Altera
Cordi Colocynthis grandis, & rotunda, supra-
dictæ viticulis, capreolis, floribus, foliorū ma-
gnitudine, asperitate, radicibus, deniq; aliis omnibus similis, & æqualis, demptis
duntaxat duobus, quod scilicet folia in quinas partes dissecta habet, & fructus mi-
nores, lobis nullis rotundos, aut modicè planos, colore primum viridi, in maturi-
tate pallido, pulpa, seminum ordine & figura superiori similes. Tertia Colocyn-
this coronata, viticulis, capreolis, folia & flores primæ similes profert, & simili-
ter per terram repit, sed omnes partes tenuiores habet: fructum pyri modo turbi-
natum, quo maiorem in maturitate flauū, & candicantibus lineis per longitudi-
nem distinctam, foris durum, & lignosum, intus fungosā carne plenum, in qua
quatuor oblongorum, paruorum, pleniorum, ac candidorum seminum ordines
continentur. Radicibus nititur supradictis similibus, sed minoribus: sapore est
amaro, vt cæteræ, sim. lireiq; colitur. Quarta Colocynthis oblonga, glabra, viticulis,
capreolis, si in flore & radicibus primæ similis, & æqualis est. Folia amen
quoq; vicius dodrantem vix excedunt, & non longè à mucrone duabus incisuris,
sed non profundis, in tres partes diuiduntur. Fructum habet oblongum, primæ
similem, glabrum, minorem, colore primum viridi, in maturitate obscure luteo,
ac in pallorem saturatum degenerante, seminum ordine, quantitate, atque pulpæ
substantia, colore, ac sapore præcedentes Colocynthidas æmularur, similiter etiā
in hortis colitur. Quinta Colocynthis oblonga, candida, grandis, viticulis, foliis,
capreolis, floribus, fructus quantitate, semine, radicibus, asperitate, atque amaro
sapore primæ simi. est. Solo ferè colore huius fructus ab illius fructu differt:
etenim principio viret, mox albicantibus, & inæqualibus maculis, seu nubeculis
aspergitur, postremo in maturitate totus albeat. Colitur in hortis supradictarum
modo. Sextam Colocynthidem ponit, fungosam illam, & lauem, vulgaremq;
quam descripsimus. Hæc colitur à quibsdam Herbariis in hortis, sed rarissimè
provenit. In Italia & Hispania, & trans maria in calidioribus locis sponte in as-
pectu gignitur. Eius flores in æstate, seu fine æstatis apparent: fructus Autumno, siue
etiam tunc maturescunt, & durant integris natura & viribus ad quinque annos.

II.

III.

IIII.

V.

VI.

VII.

Li. 7. simpl. Colocynthis, inquit Galenus, gustu amara est, sed quæ amaritudinis illi, dum
Vires & poratur, ad sunt opera, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem
Temper, quam validam in se continet: nimirum cum iis, quæ expuigarant, & ipsa per al-
uum excerni præuertens. Viridis ipsius succus intritus ischiadibus prodest.

Li. 4. ca. 171. Dioscorides vero enucleatus eius effectus declarat. Medulla fructus purgatoriam
vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsâ, melle cocto, myrrha & nitro exci-
pianur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pilæ teruntur, & infusæ clysteri-
bus profunt netuorum resolutioni, coxendicû doloribus, & coli vitiiis, ut quæ-
lem, pituitam, & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant. Fæcus admotus
enecant. Dolorem dentium tollit, si vnâ repurgetur, & in ea luto obliata aceto &
nitrum inferuescant, eo decocto decocti dentes colluantur. Si aqua mulsâ,
aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo refrigerat, potu crassum humorem
& strigmenta alui detrahet. Stomacho supra modum aduersatur. Subdita ex ea
balano alui excrementa reiciuntur. Virenti succo vtilissimè ischiadici pe-

Lib. 20. c. 3. cantur. Plinius perspicuè etiam eius vires exponit. Colocynthis vocatur alia cu-
curbita subaud. ipsa plena, sed minor quâ fariua. (Sic fortasse rectius legas. Vires
pallida ad medicinam quàm herbacea, medulla fructus per se inanit alui. Arefac-
ta infusâ; clysteribus, &c.) Vtilior pallida, quâdo eius sunt medicinz. Herbacea
arefacta per se inanit aluum. Infusa quoque clysteribus, intestinorum omni mor-
bis medetur, & renum, & lumborum, & paralyti. Eiecto semine aqua nitro
decoquitur ad dimidias, sic tussienti bibitur obolis quatuor. Prodest & si-
farinæ aridæ pilulis cum decocto melle sumptis. In morbo regio vultus
eius sumuntur, & protinus aqua mulsâ. Carnes eius cum absinthio & bile
dolorem tollunt. Succus verò cum aceto calefactus mobiles dentes
Item spinæ & lumborum, ac coxêdicum dolores cum oleo, si inficitur. Præter
mirum dictu, semina eius si fuerint pari numero adalligata febribus, sanare de-
tur quas Græci periodicas vocant. Hæc Plinius. Ex quibus Cornarius locos
quor declarari scribit, hæc tamen à nullis interpretibus, ut ille arbitratur, re-
tellectos. Primum duos modos sumendi medullam Colocynthisidis in
coaluisse, paucis particulis omisis, ut pro *διώχων δι' ἑχλὴν ἢ μὴν δι' ἑλερόν τε*
καὶ χαθαρικὴν, τερμαβόλῃς παλῶθος μὲν ὑδρομελῆτος λαμβανόμενῃ συνήντροι, καὶ συν-
μίλῃ ἰσθμῷ ἑτεῖ χαθαρικόν, sicuti habent publica exemplaria, quæ interpretes
ti sunt, legunt, *διώχων δι' ἑχλὴν ἢ μὴν ἰσθμῷ τε καὶ χαθαρικὴν, τερμαβόλῃς πα-*
μῇ ὑδρομελῆτος λαμβανόμενῃ, καὶ συνήντροι δι' ἑτεῖ συνήντροι, καὶ μίλῃ ἰσθμῷ ἑτεῖ χαθαρ-
Id est, Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua
sa sumantur. Sed & si cum nitro, & myrrha, & melle cocto cogantur in catapotio.

Lib. 21. c. 15. Priorem modum aperte tradit Aëtius. Dantur ex medulla eius scrupuli duo
aquæ mulsæ cyathis duobus. Posteriores docet Plinius, cum ait, Prodest & sto-
macho, farinæ aridæ pilulis cum decocto melle sumptis Alij tamen legete ma-
lunt ex Dioscor. de, Obest stomacho. Farinæ aridæ pilulæ cum decocto melle lu-
muntur. Deinde rectè dixit Plinius, Eiecto semine aqua mulsâ in ea decoquitur
ad dimidias. Quod in Dioscoride nonnulli longè aliter intellexerunt, ipsam scilicet
cet medullam in aqua mulsâ coqui debere. Hoc falsum esse Aëtius perspicuè
ostendit. Quod si minùs purgare volueris, inquit, sumito Colocynthidem nullæ
magnitudinis, eamque aperito supernè, & semen totum eximito. Deinde quic-
quid tormenti speciem præ se fert in ipsâ, rursus citra semen in ipsam indito, & im-
pletam ipsam sapâ, aut vino dulci veteri, diem ac noctem macerari finito. Deinde
excolatam per pannum vinum calefactum bibendum dato. Hoc tamen interit, quod
Dioscorides aquam mulsâ, aut passum in ipsâ prius coquendum, deinde
sub diu exponendum præcipit. Aëtius sapam aut vinum dulce vetus diem solum,

ac noctem

ac noctem macerari sinit. Sic etiam Paulus habet. Colocynthidem semine reiecit, sed quæ medullam referuet, passio implebis, sineq; totam noctem commadefort, manè passum auferetur, poruiq; dabitur. Qui sanè vsus hodie quoque Medicis repensissimus est, Colocynthidem, aut alia pharmaca in liquore aliquo macerandi. Infusionem vulgò vocant. Sed præcipuè Medicis scitu necessaria sunt, quæ cum Mauritani ceteri, tum Mesues de Colocynthidis temperatura, viribus, & rebus, quæ ex ea aduersus varios morbos, de eius vi malefica, de correctione, præparanda, & sumendi modo tradidit in libro secundo de purgantibus medicamentis. Colocynthis, inquit, calida est, & sicca, ordine tertio, ignea substantia & terrea per visionem tenuata, eximiè amara constat. Pituam & alios humores crassos & glutinosos magis ex profundis partibus & distantibus, vt cerebro, nervis, musculis, iuncturis, pulmone, thorace, quàm ex venis attractos, vt censet Dioscorides, purgat, non ita Dioscorides censet, sed pituitam, bilem & strigmenta purgare. Paulus Colocynthidis medullam scribit bilem potissimùm vacuare, & mucosa, non à sanguine tantum, quemadmodùm Veratrum, & Scammonium, sed & à neruis, & nervosis partibus) ac etiam bilem flauam, vt voluit Humain. Quapropter harum partium morbis mirè subuenit, cephalgia antiquæ, dolori cranij, totius hemieticæ contumaci, epilepsia, apoplexia, vertigini, aquosæ fluxioni in oculum, podagra frigida, ischiadi maximè ac reliquis nervorum iuncturarumq; affectibus: althmati itè ac tussi antiquæ, dyspnœæ ex thoracis repleti angustia. Ac præterea summè omnium prodest colico dolori tam à pituita, quàm à flatibus, & hydropi. Omnia autem hæc siue sumpta, siue clystere, aut balano intestinis inmissa præstat. Vtero autem imposita factum necat. Eadem cum aceto forti affricta alphas, lepram, psoram, elephantiam sanat. Oleum denique super calidos cineres incoctum cortici eius inanito, capillos illitu nigrat, eosque ne cadant firmat, canitiem tardat. Idem auri instillatum eius dolorem, ac tinnitum sanat. Eodem oleo & felle bubulo interaneorum vermes necantur, si simul misceantur, & calida ventriculo illinantur. Acetum similiter incoctum collutione dentium dolorem sedat: incidit enim, tenuat, terget, digerit. Ne autem cordi, ventriculo, hepati, & cæteris visceribus noceat turbando, subuertendo, violenter trahendo, miscenda sunt quæ has partes roborant, vt mastiche, gallia: misceantur & glutinosa, lubricando citiùs deturbantia, acrimoniam mordacem obtundentia, vt gummi, Tragacatha, Bdellium, & similia, ne ampliùs vias vlceret per quas fetor, & ora venarum adeò vehementer aperiat, vnde sanguis manet. Serapio Colocynthidem mulsâ, cui incocta fuerit Ruta, macerabat, siccabat, leuissimè terebat, & mulsâ prædictâ dabat. Græcus quidam Colocynthidem oleo rosato fricabat, & cum æquali portione Ladani in catapotia formabat, vitia prædictis affectibus Mesues eam minurissimè forficibus incidit, mucagine Traganthi, aut Bdelli perlinuit, siccât, tenuissimè terit: cum Ladano vel mulsâ, vel mastiche oleo rosato dissoluta in pastillos cogit, citra molestiam purgantes. Quod si noxam corpori impresserit, mulsâ, vel vuarum passarum decoctum cum oleo amygdalino, vel oleo nucum eam abolet. Longam decoctionem sustinet, estque pulueranda renuissimè, vt eiu facultas malefica permista illi exquisitè alia, plenius obtundatur, vtq; viscera celerrimè permeet, neque in ipsis ob partium minùs tritarum crassitiem cesset: qua fortasse sit, vt in visceribus pigra retineatur, eaque vlceret, præsertim cum sensu percipi possint eius particula. Datur à siliquis sex ad decem.

Nomina

Forma

Li. 4. ca. 179.

Li. 4. meth.

Li. 37. ca. 4.

Li. 9. meth.

Li. 7. ca. 4.

Li. 3. purg.

cap. 2.

Cap. 30.

Simpl.

In cap. 179.

lib. 4.

AΛΠΙΟΝ Græcis, Latinis Alypum & Alypia dicitur, id est, indolens, siue expers doloris remediū, *αλγῆ ἀσκήσαν*, nisi quis maritimum quasi *ἀλγικόν*, id est, salsum vel maritimum, quod secus mare, ut Dioscorides ait, oriatur. Herba est succulosa, inquit ille, subrubra, graminibus ramulis tenuibus foliis: flore molli, leui, copioso: radix velut Betæ est, tenuis (Oribasius nec Betæ similem, nec tenuem radicem esse ait): semen velut Epithymi (thymi habet Actuarius.) Nasçitur in locis maritimis, maximè Libyæ, plurimè & aliis locis vberissima. Plinius, Alypum, inquit, cauliculus est molli capite, non dissimilis Betæ, acce gustatu, ac lentum, mordensq; vehementer & accendens. Turpetum Alypum est Officinarum Turpetum, *Turbith* Arabibus dictum, quod Turpetum vocant. Nam in minoris Tryphetæ compositione scribit: Si hoc medicamentum pituitæ deiectionem moliri instituas, Alypum, id est, album Turpetum addas. In alio in loco, Turpetum, quod radix est Piryusæ, & album Alypia, glutinosum de trahit pituitam. At cū idem Actuarius iisdem ferè verbis quibus Dioscorides, Alypum descripsit, subiunxeritq; huius semen atræ bilem per inferna ducere, addere quidam Alypum ab Alypia differre, quæ non atram bilem, sed pituitam excuet. Verùm is aliam radicibus, quas Turpeti nomine donauit, aliam semine Alypi, siue Alypiæ vim inesse intellexit, neque ramen hanc ab illo differre: quod confirmat Paulus his verbis. Alypi semen infernè atram purgare bilem, pari Euphorbiæ mensura, cum sile, & aceto dictum est: in testina verò, si fidè Dioscoridi damus, leuiter exulcerat. Est autem meo iudicio quæ nunc Alypias vocatur. Mesueson Turbith radicem esse herbæ lactariæ, foliis Ferulæ. Serapio Tripolium Dioscoridi Turbith appellat. Quare difficile est quæ nam sit hodie planta, quæ verum Dioscoridis Alypum dici queat, discernere. Matthiolus plantam hic pictam alio Ghino Pisit ad se missam pro Alypo fuisse scribit, sed pingendo deprauata.

ALYPVM,
Matthioli.ALYPVM, Pennæ, Herba
terribilis Narbonensis.

ait Pennæ

ait Pena. Qui nullam habuit quæ æquæ bene, imò vltimo modo (præter Ferulas) Aly-
po congruat, siue lineamētis, siue efficaciam purgandi, quam frutex maritimus hic
depictus. Herbam terribilem vulgus Narbonensium appellat, de qua capite de
Empetro diximus. Hanc Hippoglossi Valentini nomine depinxit Clusius, qui
florentem vidit mense Febuario & Martio in Baticæ solitudinibus, & in regno
Murciano, totiusque Valentino. Batici *Coronilla de froyles, & Siempre en xuxa*, quod
semper arida & exsucca videatur, appellant. Murciani vero & Valentini *Segullada*,
nonnulli Valentini profectores Hippoglossum, quamvis nihil cum Hippoglossis
Dioscoridis commune habeat, nisi quis forte ob foliorum eū Rusci foliis abun-
dantiam sic dictum putet. Quæ tamen in hoc frutice circa pediculum sunt oblon-
giora & angustiora: præterea facultates sunt etiam dissimiles. Eidem Clusio Aly-
pum esse non placet, cum planè arida sit & exsucca planta. Cæterum circūstans
neos Baticæ Medicos scribit eius decoctum propinare iis qui scabie Hispanica
laborant, non sine foelici, ut aiunt, successu. Est & hæc planta Parmica, & Coniza
tercia quibusdam. Semen Alypi, Dioscoride auctore, purgat atram bilem, si men-
tura Epithymo pari cum sale & aceto sumatur. Intestina tamen leuiter exulcerat.
Plinio verò aluum soluit in aqua mulsa, addito sale modico. Minima portio drach-
marum duarum, media quatuor, maxima sex. Ea purgatio datur e gallinaceo iure.

Lib. 4. c. 177
Vires.
Lib. 37. c. 4.

PYNOCOMVM.

CAP. XXI.

PYNOCOMON Græci, Latini quoque Pynocomum vocant. Folia
haber, ut scribit Dioscorides, Cruæ similia, sed aspera, crassa, & aciora,
caulem quadrangulum, florem Ocyimi, seme Marthubij, *απαρις* habent
vulgata exemplaria, alia *απαρις*, id est, Porri, sicuti & Orbasius legit. Radicem ni-
gram, rotundam, pallidam, exigui mali figura, terram olentem. Nascitur in locis
saxosis. Eadem breuiter Plinius tradit. Aluum soluit & Pynocomum, Eruæ foliis
crassioribus & rarioribus, Hæc vox, rarioribus, Pynocomi nomenclaturæ repu-
gnat, sic enim a densa coma dictum videtur. Quare pro rarioribus repone acriori-
bus, veteri etiam codice, atque Dioscoride lectionem hanc confirmantibus) radi-
ce rotunda, lutei coloris, terram olente: caule quadrangulo, modico, tenui: flore
Ocyimi. Inuenitur in saxosis locis. Ex rei herbariæ scriptoribus nullum aut audiui,
aut legi, qui Pynocomum verum se nosse asseueret. Quod si quis diligens & in-
dustrius aliquando repererit, sciat ex Dioscoride & Plinio non contemnendas
esse eius vires. Semen drachmæ pondere potum, inquit Dioscorides, vim habet
grauia & tumultuosa infomina facienda. Cum polenta impositum tumores discuti-
maculeos & spicula infixæ extrahit. Sed & folia imposita tubercula & furunculos
discutiunt. Radix aluum soluit, & bilem vacuat. Darur drachmarum duarum pon-
dere in aqua mulsa. Ex Dioscoride Plinius hæc videtur exscripsisse. Radix eius in
aqua mulsa denariorum duum pondere, & aluum, & bilem, & pituitam exinanit.
Semen somnia tumultuosa facit, vna drachma in vino potum. Rursus, Passim & in
quacunque parte, ac maximo incommodo nascuntur, qui furunculi vocantur,
mortiferum aliquando malum confectis corporibus. Remedio sunt Pynocomi
folia trita cum polenta, si nondum caput fecerint. Et alio in loco, Spicula sagitta-
rum extrahit Pynocomi semen.

Nomina
Lib. 4. c. 169.
Forma.

Locus.
Lib. 6. c. 8.

Vires.

Lib. 26. c. 8.

Lib. 6. c. 8.

EPITHYMVM.

CAP. XXII.

EPOD Græcis *ἐπιθυμῶν*, Latinis quoque Epithymum dicitur, Arabibus
Eputmo, Gallis *Taigne de Thym*. Epidiymum scribit Dioscorides florem
esse Thymi durioris, & Thymbæ similis. Habet capitula tenuia, le-
uia, & in eis caudiculas veluti capillamenta. Plinius magna ex parte
Dioscoridi

Nomina
Lib. 4. c. 47.
Forma.
Lib. 26. c. 8.

Dioscoridi assentitur. Aluum, inquit, purgat Epithymum, qui est flos & Thymo Satureiæ simili. Differentia, quod hic herbaceus est, alterius Thymi albus. Quidam Hippopheon vocant: stomacho inutilis, vomitiones mouet, sed tormina & inflammationes discutit. Sumitur & eclignate ad pectoris vitia cum melle, & aliquando Indu-

*EPITHYMVM,
Matthiola.*

Lib. med.
purg. c. 16.



EPITHYMVM Græcorum & Arabum, Lobelij.



Vires.
Diosc. l. 4.
cap. 172.

Aluum soluit à quatuor drachmis ad sex, cum mellis exiguo, salisq. & aceti. Mox alia de Epithymo subiungit opinionem. Quidam alii Epithymum tradunt sine radice nasci, tenus similitudine pili, rubens: siccare in vmbra, ubi ex aqua acetabuli parte dimidia, d. v. habet puitam, bilēque. Mesues scribit Epithymum Thymo, Thymbræ, & euidam specie. Quod supercrecere Cassuthæ modo. Duj lei id Creticum, idemq. præstantius, præcipue capitulis florulentis, subrusum, ac re etiam, odorata absolutum, graue. Alterum Syriacum nigrum, rufum, ignobilius, vt etiam pallidum, & tenuius. Hæc Mesues. Epithymum Arabum siue id quo hodie vrimur, nihil aliud est, quam capillaceum quiddam inter sese implectens, sine radice Thymo innascens, & sese circumuehens. Quare dubitare pleriq. Græcorum an Arabum, siue nostrum idem sit, quod vocat Dio-
scorides florem esse Thymi duri. At certè nostrum, siue Arabum Epithymum idem planè est cum Dioscoridis Epithymum. Sed scire oportet, vt perspicue docet Plinius Thymum duplex esse. Vnum maius, Thymbræ, aut Hyslopi, cuius furculi capitis spicatis Stæchadis ritu aperti, floribus ex pallido purpurascens, atque numerosa florum coma implicantur, cuius vires præstantiores. Hoc ex Syria Venetias asportatur. Aliud vulgare nigrum Plinij, Serpyllum zygis Dioscoridis, in Narbonæ maritimis colibus pullum nascens: folio & flore Serpylli, rigidior, passim etiam Epithymi cincinnis & capitamentis, delicatissimis obuolutum. Dioscorides prioris tantum, ex quo prodit hæc sectura meminit. Hoc nihil aliud est, quam capitula florculi, geminatiue, quibus apiantur caudiculi capillamenti instar, coloris fulci, vel rubellitantis. Florculi interdum candidi, nonnumquam herbacei, Thymo vero vtrique purpurascunt. A' tero Epithymo vulgari Thymo innascente vrimur: Syriacum enim rarius. Potum cum melle purgat per inferna pituita & bilem atram. Priuatim prædest. melancholicis & inflatis acetabuli mensura ad 10. drachmarum quatuor pondus cu melle, Creticum modico.

Scribit

Scripti Galenus Epithymum Thyini facultatem habere, ad omnia efficacius ex-
 siccare & exalfacere in tertio gradu. Paulus, Epithymum laudatissimum esse re-
 medium scribit inter ea, quæ aeræ bili vacuandæ sunt: dari ipsius drachmas quinque,
 læuigaras ex lactis hemina.

Lib. 6. (imp.)
 Lib. 7. ca. 4.

CASSYTHA.

CAP. XXIII.

RECENTIORIBVS Græcis κασσίθα dicitur, Latinis Cassytha, vel y, in
 y, transeunte Cassurha, Herbariis & Officinis hinc deslexa quadam
 pristini nominis vmbra Cuscutha, *Cassutha*, vel *Cuscutha*, Arabibus.
 Quidam, quod Lino maximè sese obuoluat, Podagram Lini vocât, &
 Anginam Lini, quòd quasi cõpedibus id cui infederit illiget, nec vinctum eo fa-
 cilè possit extricari. Galli *Goutte*, vel *Agourre de lin* vocant, Germani *Fitzkraut*,
 vel *Flachszedem*. De hac veteres Græci nihil, quod sciam, memoriæ prodiderunt.
 Plinius tamen de iis loquens, quæ in alia stirpe viuunt, sicut visum, Est, inquit, &
 in Syria herba, quæ vocatur Cassytha, nõ rantrũ arboribus, sed ipsis etiam spinis cir-
 cumuoluens sese. In cuius vulgaris codicibus Cassytha sine spiritu legitur, libra-
 riorum fortasse vitio Cassytha pro Cassythas scribentium. In quibusdam Cadytha
 habetur, non Cassytha. Quæ vox Cadytha etiam in Theophrasto reperitur, ex qui-
 bus illa mutuatus est Plinius. scribit enim, ἡ τι θι δὲ συνειμακὶν βολάνται, ὃ καλῶμεθα κα-
 δύθας, καὶ δὲ δὲ πρὸς καὶ ἀγροῦ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖσι. Id est, & Syriaca illa herbula, quæ
 Cadytha vocatur, arboribus & spinis, atque aliis quibusdam innascitur. Cassutha,
 vt depingit Ruellius, herbolis fruticibus adnascitur, eorum adminiculo fulta, ra-
 dice nulla, sed velut ab alarum sinu prodeuntes cirro capillamentove mira longi-
 tudinis, statim ab ortu ramulis sese circumuoluentibus: iam velut elauiculis nixa,
 sensim proserpens herbarum fastigia scandit, & crebris voluminibus opere co-
 piario per vertices rotata, comas herbarum complectitur, tam volubilis illi natu-
 ra est. Foliis vidua cernitur: florem fundit album: semine quoque scater renuicisci
 dilutioris rutilant purpura, nõnunquam ex rubro rufescunt, fidibus lyra: um cras-


Nomina

Lib. 6. ca. 4.

Lib. 3. ca. 1.
 cap. 14.

Lib. 2. ca. 11.
 Form. 1.

CASSYTHA, Matthioli.



sitie pares. Non in terra, sed in herbis passim
 nascitur Cassytha, quas ramis spissò sepius irre-
 tit contextu, vt tectorij modo herbosum cespiti-
 rem à sole vindicat. Nonnunquam cacumini-
 bus impendens stirpes huini derubar, pro-
 priamque parentem suis laqueis strangular, aur
 continuo marerni alimenti suctu perducit ad
 tabem. Hæc Ruellius. Sed vt de Epithymo &
 Epithymbra, ita & de Cassutha à multis meri-
 to ambigitur, inquit Pena, suapte adolescat
 radice, æque inde surrecta finitimis plâis sese
 implicet, vnde alimentum vberius nacta, radi-
 culæ illæ exarescât. Qua de reira decernit ille.
 Epithymo, Epithymbræ, atq; Cassuthæ nascēdi
 & repēdi conditio par. Cassutha enim orta
 primùm & amplexata Vites Narbonenses, tam
 multis osculis per quandam quasi synastomo-
 sin earum succum populatur, & genium de-
 fraudat, vt radices sui muneris minùs iam ne-
 cessarij oblitæ, feruore arefcant & abrumpan-
 tur (non secùs ac Vrachii exarescunt sceta exclu-
 so, & mutato alimenti ductu) pendulis illis

Locus.

similis. Materies valida, & cum ad alia, tum ad nauigia utilis. His verbis Theophrastus declarat vnguentarios suis compositionibus addere solitos Balani corticem tustum, pro styminato, siue spissamento, conferuandi odoris gratia, quem ad vsum nucleus est inutilis. Plinius de eadem hæc tradit. Myrobalanus Troglodytis & Thebaidi, quæ ludæam ab Ægypto determinat, communis est, nascens vnguento, vt ipso nomine apparet. Quo item indicatur & glandem esse arboris, Heliotropio, quâ dicemus inter herbas, simili folio. Fructus magnitudine Auellanae nucis. Ex his in Arabia nascens Syriaca appellatur, & est candida. Contra in Thebaide, nigra. Præfertur illa bonitate olei quod exprimitur, sed copia Thebaica. Inter hæc Troglodytica vilissima est. Sunt qui Æthiopiam iis præferant, Glandem nigram, ac pinguem, nucleoq; gracili, sed liquore qui exprimitur odoribus aptiori, nascentem in campestribus: Ægyptiam pinguiorem esse, & crassiori cortice, rubentre: & quamuis in paludibus nascatur, breuiorem sicciorēq;. E diuerso Arabicam viridem ac tenuiorem: & quoniam sit mōtosa, spēs iorem. Longè autem optimam Petræam ex quo diximus oppido, nigro cortice, nucleo candido. Vnguentarij autem tantum cortices premunt, Medici nucleos, iundentes, affusis paulatim calida aqua. Vides in eiusdem arboris & fructus delineatione auctorum veterum discordiam. Dioscorides eam *myxus*, Theophrastus *purpureus*, Plinius Heliotropij folio esse ait. Cū autem harum folia multum a sese distent, vt in horum aliquo mendum sit necesse est. Fructum Dioscorides nuei Ponticæ assimilât, Plinius magnitudine nucis Auellanae esse ait, Theophrastus fructui Capparis & magnitudine & specie similem. Dioscorides scribit interio rem fructus partem tundi, & velut amaras amygdalas humorem reddere, cui assentitur Galenus, scribens carnis eius succo vnguentarios vti. Theophrastus fructus corticibus contulis eisdem vti, fructum esse inutilem: Plinius vnguentarios cortices rariū premere, sed addidit medicos nucleos tundere. Mefues Ba'ani Myreplicæ fructum alium magnum, alium paruū facit. Magnus, inquit, nucis Auellanae est magnitudine, triangulus. Paruus verò eiceri similis, malus: vterq; ramen medulla leni & vinctuosa. Magnus est præstantior, præsertim Syriacus. Cortice est albo, leui, tenui, medulla intus alba, leni, pingui. Paruus, si ex nigro albescit, & medulla est alba, leni, pingui, & recens, est innocentior. Nullus verò fructum hunc magis

Li. 6. simpl.

Li. med.
pur. 5. c. 1.

GLANDIS vnguentariae siliqua cum fructu, Pena.



ad viuum expressit, atque Pena, quem & descripsit his ferè verbis. Siliqua est admodum elegans, palmium longa, ex carinula bifori compacta, teres, rotunda, gracilis, binisq; loculis ventricosa, nempe ima supremaque sui parte qua protuberat, glandem vnā vtroque loculo claudens: summa vtro acuro stilo, rostri instar, mucronem protendit, intus subrufo colore, foris pullo cinereoue, & secundum longitudinem striis rugisq; exarata, coriacea tora, flexilis & corticosa, insipida, subadstringens & sicca. Hæc Pena Glans vnguentaria, auctore Dioscoride, trita, & drachmæ pondere cum pulce sumpta, splenem liquar. Imponitur etiā ipsi cum Lolij farina & aqua multa. Podagricis itidem. Cum aceto cocta dererit scabiem, lepram: cum nitro viriliginis, & cicarices nigras. Arum vrina rollit lentiginis, varos, maculas a sole contractas, faciei exanthemata. Vomitus mouet: aluum cum aqua multa soluit. Stomacho multum aduersatur. Oleum quod ex ipsa exprimitur, aluum soluit. Cortex eius magis adstringit. τὸ δὲ σκινανθίου καὶ καθυδαθίου αἰσιν

Li. 4. c. 14.
Vires.

ἐκ πίστεως, id est, interprete Cornario, Quod vcrò ex ipsâ cōtusa & exptella superest
 rectimentum miscetur smegmatis aduersus scabritias, & pruriginis idoneis. Alij
 ἐκ πίστεως succum venterunt, verùm rursus, inquit, & exptellæ. Superiorem con-
 uersionem approbat Galenus, qui cū de carnis succo dixisset, subiunxit, ἐκ πίστεως
 μακροχρόνιον, id est, reliquum quod ab expressione restat, idem quod Dioscoridis
 ἐκ πίστεως. Illius de hac tora re verba sunt. Balanus Myreplica defertur ex Barbaria
 regione. Vtuntur vnguentarij carnis eius succo, qui facultate calidus est. Reli-
 quix autem, vnde expressus est succus, terrestres, scilicet & duræ, vincentem ha-
 bent qualitatem amaram. Sed & admista quædam est adstrictio. Quare extergen-
 tem simul & incidentem, contrahentemque & stipantem effectum habent. Itaq;
 ad ionthos, lentes, ephelin, & pruritum, deinde & ad psoram & lepram conue-
 niunt. Verùm & lienes liquant, iecurque indurefcens. Quod si quis carnem eius
 drachmæ pondere cum melicrato bibat, medicamentum experietur vomito-
 rium. Sæpe etiam per inferiora aluum largiùs subducit. Itaque cū hoc medica-
 mento vtimur ad viscerum expurgationem, & maximè iecoris, lienisque, ex ois
 crato ipsum exhibemus. Gaudet verò maximè aceto ad actiones externas. Aceto
 enim efficacior est, vt & psoras & lepras detergeat, & multò etiam magis quæ
 sunt minora, lentes, vitiliginem, ionthos, ephelin, exanthemata, achoras, cerosa,
 & quæ crassi sunt succi omnia. Porro cū illinenda est lieni, præstat ad-
 mistam esse farinarum quampiam exsiccantem, cuiusmodi est erui & lolyda
 na. Hæc Galenus. Meluz Glans Myreplica maior calcificat initio ordinis ter-
 cat secundo. Humiditatem habet excrementosam & acrem, qua ventriculū
 subuertit, nauseam excitat, viscera conturbat. Pituitam crassam & lentam vomitū
 & deiectione purgat: quare confert colico affectui pituitoso, & flatulenti
 ptus, balano, clystere iniectus, cataplasmate ex ipsius medulla, hordei farina &
 melle appositus, & calore suo neruorum frigidis affectibus, spasmo tetano, con-
 tractioni. Tumores quoque dueros, strumas, nodos resoluit cum melle. Hepati
 tem aut lieni obstructo, vel durato cum farina lupinorum, & spica confectū im-
 posita. Ad hæc autem Glans minor, & eius oleum efficacius admoventur. Idem
 etiam auribus infusum tinnitui, sibili, surditati auxiliatur cicatrices fœdas, len-
 gines, alphas, & cætera cutis vitia emendat. Incidit enim, tenuat, terget, expurgat,
 aperit obstructa. Parua Glans ad omnia est efficacior, molestè purgat, vires de-
 cit, sudorēque frigidum mouet. Ob id non vtenda etiam oleo, nisi emplastro,
 vnctione, cataplasmate. Glans ne ventriculo noceat, facit assatio. Ea enim humi-
 ditatem excrementosam & acrem horum symptomatum causam coquit, & re-
 soluit: tūcque solum deiectione purgat. Adicitur præterea ipsi, præsertim co-
 quendo, semen anisi & fœniculi. Hodie Officinis & Myropoliis, tum ad valere-
 dinem, tum ad voluptatem ex Glande vnguentaria oleum exprimitur, vt nullo
 odore iucundum, ita nullo rancore, aut foetore vnquam veterascens. Quare ad
 quamlibet odoris suauitatem ac vim, vt moschi, zibetti, ambari integram, ac ve-
 getam ruendam, omnium oleorum id vnum aptissimum est, nullamque habet
 aut sordem chirothecis, ac vestibus illinit.

Temper.
Vires.

RECTUS cathartici, de quibus huc agimus, veteribus Græcis Latinisque fuisse incogniti, præterquam ex recentioribus Græcis Achæario, ab Arabibus inuenti, & ad leuiotes purgationes frequenter vsurpari, qui omnes generis nomine Auicennæ Dilegi, siue Delegi dicuntur, & Serapioni Hatilig. Tamen si librariorum vitio Hatilig pro Delegi corruptè legi putat Garcias Hist. Aromat. Ind. auctor, quod omnes Medici Arabes illi affirmarint Myrobalanos omnes Delegi nuncupari. Hascum viderent inierpretis quodammodo ad glandis formam accedere, improprie Myrobalanos venterunt, cum pruna, quibus similia sint, melius vertissent. Ad hæc cum Myrobalani vox Balanum myreplicam significet, id est, glandem vniuentariam, perperam illis fructibus nomen id indatum, quod vnguentis apti non sint. Sunt in vniuersum quinque earum genera: flauæ seu luteæ, seu citrinæ, *Asfar* Arabibus dictæ. Indicæ siue nigre, *Asuar*. Quebulæ, *Quebulgi*: Bellericæ, *Bellerigi*: & Emblicæ, *Embelgi*. Emblicæ Senitica sunt Auicennæ, minuta, & leuiore. Quod docet Serapio his verbis. Myrobalani de Seni sunt ex speciebus Myrobalanorum: habent corticem subtilem, quæ nota Emblicis conuenit. Menses Myrobalanos citreos, nigros, cepulas eiusdem arboris fructus esse quibusdam videri ait, ut immaturi sint citreæ, maturi nigre. Cumque arbor his auctoribus sit bifera, primi partus sunt citreæ & nigre, secundi verò cepulæ: alii diuersarum arborum fructus videri, idque credi, quod eorum facultates & opera variant. Id confirmat Garcias auctor Hist. Aromat. Indic. Falluntur, inquit, tam ij qui omnia Myrobalanorum genera in eadem arbore nasci putant, quam qui flaua & cepula tantum Nam quinque sunt diuersa arborum genera, & quod magis mireris, in regionibus sexaginta, aut centum leucis a sese distantibus nascuntur. Nonnulla in Goa & Batecala, alia in Malanor & Dabul. In toto regno Cambayæ quatuor earum genera inueniuntur. Kebula verò in Binager, Decam, Gazarate, & Bengala. Ceterum, quæ in Lusitaniam deportatur, magna ex parte collectæ sunt in regione, quæ est inter Dabul & Cambaya. Nam experientia compositum habemus, eos fructus, quos regio Septentrioni vicinior producit, minus putredini obnoxios esse. Inuenio autem, inquit Garcias, apud eos hæc Myrobalanorum genera, quorum vsus est in purgationibus leuibus, & sine molestia. Primum, quod rotundum est, & bilem purgat, indigenæ Arare vocant, Medici, Aritiqui: nobis sunt flauæ. Alterum genus, incolis Rezenuale: nostræ sunt Indicæ, siue nigre. Tertium genus, Gorim incolis nuncupatum, rotundum: nobis Bellericæ. Chepulæ verò nostræ, quæ pituitam purgant, illis Aretæ appellantur. Hæc sunt quatuor Myrobalanorum genera, quæ illis sunt in vsu medico. Nam quinto genere Anuale iis nuncupato, nobis Emblico dicto (tamen si apud eos reperitur) non vtuntur nisi in densandis coriis rhois coriariorū vice, & atramento conficiendo. Sunt tamen etiam nonnulli, qui iis viridibus vescuntur excitandæ appetentiæ causâ. Porro Flauæ teretes sunt: arbor Sorbi folia profert. Emblicæ arbor foliis est minutim incisis, Palmæ magnitudine. Inda Myrobalanus octogona est. Arbori folia Salicis similia. Bellericæ arbor foliis est Lauri, sed pallidioribus, & subcinericis. Chebulæ magnæ sunt, & rotundæ, oblongiores tamen, cum ad perfectam maturitatem peruenerunt, & angulosæ. Arboris folia Persicæ similia. Sunt autem singulæ arbores Pruni magnitudine, omnisque siluestres, & sponte nascentes, non domesticæ. Cum autem gustu sint adstringente & acido, sorborum immaturorum modo, ex frigidorum & exsiccantium classe esse dixerim. Præparationis modus apud Indos non inualuit, utpote qui iis non vtantur purgationis, sed adstrictionis tantum gratia. Nam si purgari velint, eorū decocto vtuntur, Vires.

Lib. I. c. 67.
Nomina
Lib. I. c. 7.

Genera.

Cap. 207.
simpl.

Lib. I. c. 17.

Forma.

Temper.

Vfus &
Vires.

MYROBALANI.



L. f. m. d. b.

MYROBALANI EMBLICÆ.



& maiori dose quam nos in Europa. Autem iis saccharo conditis ut, magis sibi su. Chebulatorum autem maior est generis et diuntur in Bisnager, Bengala, & Cambaja: Indica in Batecala, & Bengala. Ex his iuberet soleo, immaturis subtilius liquore ganis elicitur, quem post sumptam aliqua co- seruam adstringentem propino, & syrupo ad- misceo si quando opus est. Flauas & Bellericas præscribere soleo initio mensis, ut qui aut pro- fluuio, aut stomachi relaxatione laborantibus enim cõuenit huiusmodi cicutæ præparata adstrictionem cum pauca aciditate coniungat. Præterea immaturorum succum in alui fluuiis admodum efficacem esse expertus est. Hactenus Garcias in Aromat. Indicarum H. storia. Actuarius de iis ita scripsit. Inter ea, quæ perquam modicè purgant, fructus quoniam noti & lignosi censentur, qui è Syria & Æ- pro ad nos deferuntur: quorum alij Limoni Chepulz, alij Migri nominantur, omni com- muni nomine Myrobalana nuncupati. Duo

aut tres eorum drachmæ læuigatæ purgandi vim obtinent, & priuatim superu- cuum capitis humorem exhauriunt. At Lutei bilem flauam euacuant, pituita Cepulz, atram bilem Nigræ. Cæterum ventriculum, ac intestina sua adstric- confirmant, roborantq. Torrefactæ Myrobalani ablutæq. plurimum vis po- toris exuunt, sed tenuiorum partium euadunt, exsiccantq. magis. Quæ quæ defluxio ad inferiora procumbens molesta est, & intestina vlcerat, hæc mu- mus, quæ modicè humorem defluentem subducunt, & notatu dignum roboris testinis conciliant. Eandem & consimilem facultatē obtinet, quod Empetrum, & quod Emplitzi barbara voce appellatur. Hæc Actuarius. Duo potissimum My- balanorum genera condita ad nos deferuntur. Primum, Kebula siue Chepulz, plu- ris sit, omnium maxima, oblōga, pusilli Limonij, aut Persici effigie, compo- callosa nigraq. carne, sapore iuglandis conditæ. Alterum Bellerica m. nor, ro- dior, tenerior edendo. Bellerico citrina similia facie, cute, nucleo oblon- pulpa, sed sulca, vnde nomen. Indica nigra est, notissima de colore, nuclei expe- callo penè lapideo Hanc concolorem melancholicum humorem aptius ed- putant. Post emò Emblica, potius fragmenta, quam integra pruna, quadam- triangula, Bellericis minora. Myrobalani, inquit Mesues, medicamenta sunt be- nigra. Tantū enim abest ut purgando vires deiciant, ut etiā cor, vētriculum, he- par, corpusq. reliquū cōfirment, cogēdoq. in vnum roborē: quare vnica histia commodant, qui sunt obstructionibus obnoxij, has enim excitāt. Præterea medi- camentis acerbis, & purgādo exolūtibus, ut Scammonio, perfectè corrigēdis re- ctè miscētur: sed huic præsertim citrinæ sunt miscēdæ. Id enim cōtraria tum- stituta, tum qualitate frangit, & purgationem iuuat. Hæc & multo plura le- apud Mesuem de Myrobalanis. Omnium effigies hac pictura expressit Lobellus, de Emblicis & Bellericis hæc literis mādauit. Emblicæ paruā refrigerat, siccior- dine primo, pituita etiā putri vētriculum purgāt, eumq. & cerebrū, necnon, cor, hepar, & partes laxas cōstringendo roborāt: ob id tremori cordis & febri ap- tentiam inuicat, vomitum sistunt, furorem & latratus bilis cohibent, vnde animæ

rationali

rationale augent, calorem viscerum maligniorem, & inde vitam suam extinguunt. Præstantiores sunt magnæ, carnis multæ, densæ, & in pariorum. Largius purgant, & rugis ventriculi minus incommodant, si aqua in sole macerentur, donec humectata tumescant: postea expressæ multa biduo macerantur, igni lento coquantur: ubi coctæ refixerint, mellis albißimi parte quarta exceptæ reconduntur. Aromaticis, Cinnamomo, Xyloloe, Cardamomo, Croco, Gilla, & similibus nonnulli condunt. Bellericæ etiam sunt benignæ, & roborant. si præ primo gradu, sicæ secundo, cætera Emblicis viribus proximæ. Optimæ sunt magnæ, multa & densa carne, græues. Hæc Lobellius.

TAMARINDI.

CAP. XXVI.



EQVI ac Myrobalani vetetibus Græcis incogniti fuere Tamarindi ab Arabi⁹ nominati, id est, Daçtyli Indi, siue Palmæ Indicæ Tamar

Nominat

enim illis daçtylum significat. Sed ut Myrobalanos, ita Tamarindos

minus apte illi vocarunt: quoniam eorum arbor Palmæ similis non

est, nec ex Palmarum generibus, ut dicitur, nisi ad effigiem fructu respexerint,

Lib. 12.

quæ daçtylum siue digyrum inflexum refert. Garcias in Aromat. Indicorum Hi-

storia tradit in Malauar *Puli*, in Guzarate *Ambili* nuncupari, eoque nomine reli-

Forma.

quis Indiæ provinciis notos esse. Arbor est, inquit, Fraxini, aut Iuglâdis, aut Casta-

næ amplitudine, materie firma, non fungosâ ramis foliis multis ornuis, & minu-

rim incis. palmi magnitudine: fructu in arcus aut digiti incurui figuram effor-

mato. Huius immaturi cortex virescit, siccatus verò cinereus est, & faciliè auellitur:

nucleos intus continet latiorum lupinorum magnitudine, quodammodo rotun-

dos, sed planos, colore fufcos, læues, quibus abiectis pulpæ vsus est, quæ lenta est,

& viscida. Illud vero mirum & obseruatione dignum tradit, quòd hic fructus in

arbore adhuc pendens, noctu foliis sese innoluat vitandi frigoris causa, inter-

du vero sese expedit, & e medio foliotum emergat. Acidus est dum virescit, ea ta-

men aciditas suauitate non caret. Nascuntur Tamarindi multis Indiæ locis, in-

Locu.

quit idem Garcias. Sed qui locis montosis, & ad Septentrionem versis proue-

niant, præferuntur, & diutius incoerupti manent: quæ sunt quos Cambaïete

& Guzarate gignit. Idem Mesuen reprehendit quod Tamarindos fecerit Palmæ

siluestris Indiæ fructum, cum rota India Palmas non reperias, sed eò deferuntur

Palmæ fructus ex Arabia magna quantitate, edunturque sicæ, atque etiam in

massam compressæ, abiectis ossibus. Garcias vidisse se ait in Cambaya & Guzarate

siluestre quoddam Palmæ genus, sed sterile, & longè diuersum a Tamarindifera

arbore. Idem Serapionem etiam redarguit, quòd scripserit ex auctoritate Abo-

Cap. 14. lib. 1.

hanisæ Tamarindos in Cæsarea Aman prouenire: nullos enim in Cæsarea Aman,

quæ est Syria, prouenire certū esse ait Garcias, cum à negotiatoribus ex India de-

ferantur. Nonnulli, inquit ille, Tamarindos à saporis aciditate Oxyphœnicem

vocant, quorum sententiam nec probō, nec improbo. Sed quod Lacuna Com-

mentariis in Dioscoridem lib. 4. cap. 126. à Thebaicis palmulis non differre scribit,

minimè probō, quemadmodum nec quod eius arborem Palmæ siluestris genus

facit, foliis oblongis, & per extremum acutis. Tamarindotum iconem hic positam

Lobellio debemus. Quare quæ de iis etiam prodidit subiungenda. Tamarindo-

rum semina recentia, inquit, Cassiæ quadantenus similia, sed maiora & angulosâ

quadrati pisi ritu, compressiora tamen è siliquis carnosis, & multis fibrarum cir-

ris implexis quàm Phaseli nostratis maioribus, quales in instructissimis Officinis

Antuerpiæ prostant (minimè è palmulis, aut eius generis fructibus, ut multi cre-

didere qui non videtunt) in horto sata G. Driefsch, nobis perelegantes arbusculas

TAMARINDI folia, fructus, semina, *Oxyphoenix* perperam creditum, Lobellij.

Lib. purg.
cap. 7.
Vires &
Temper.



successu, quàm si syrupo acetoso vteretur: & gros eorum infusione putgate, & Tamarindorū vnciz quatuor aqua frigida, aut stillatitia intybi macerentur in thesauris, facta expressione eximantur, & modico saccharo inspergantur. Eius biliosum humore pituitam incidunt, & attenuant. Indos sine molliat purgare cum oleo nucis Indicæ sumptis: medicos verò folia rrita partibus pelatæ affectis imponere.

EVPHORBIVM, ANTEVPHORBIUM. CAP. XXVI.

Nomina

Lib. 6, c. 10.
Forma.

Lib. 6, c. 10.



ΥΦΟΡΒΙΟΝ Græcis, Latinis etiam Euphorbium nominant, Arabibus *Euforbium* & *Forbium*, Italis *Euforbio*, Hispanis *Alfornon*, Gallicis *Euforbe*. Plinius herbam Euphorbiam nominavit, eius usum Euphorbium. Euphorbium, auctore Dioscoride, arbor est Libyæ, Ferulæ speciei, quæ in monte Atlante iuxta Mauritaniam nascitur, succo repleta acerrimo, quem timentes incolæ ob eximium eius feruorem, ventres ouillos cinctos arbori circumligant, & eminus caulem contris incidunt, statinique velat ex ea se quodam multus succus in ventriculos effunditur, sed ex vulnere etiam humi spargitur. Sunt autem duo succi genera, vnum pellucidum velut sarcocolla, magnitudine erui: alterum in ventriculis vitreum, & compactum. Eligendum est translucens, & acre. Adulteratur sarcocolla & glutine admixtis. Sed non facile experimentum gustu sumptum, quia vellicata semel lingua feruor diutius permanet, ut quicquid offeratur Euphorbium esse putetur. Eius inuentio tribuitur regi Libyæ cognita fuit. Eius rei locis aliquor meminit Plinius. Iuba Prolemæi pater, qui primus utrique Mauritaniæ imperauit, studiorum claritate memorabilior etiam quàm regno, similia prodidit de Atlante: præterque genti ibi herbam Euphorbiam nomine, ab inuentore medico suo appellatam. Cuius

dicum

Æcum succum miris laudibus celebrat in claritate visus, contrâque serpentes & venena omnia priuatim dicato volumine. Et Euphorbiam e monte Atlante, vltraque Herculis columnas, in ipso rerum naturæ defectu. Et rursus, Inuenit & patrum nostrorum ætate Rex Iuba quam appellauit Euphorbiam, medici sui nomine & fratris Musæ, a quo D. Augustum conseruatum indicauimus. Sed Iubæ volumen quoque extat de ea herba, & clarum præconium. Inuenit eam in monte Atlante: spectatur foliis achantinis (Lege ex veteri codice & Dioscoride, specie Ferulæ, foliis, &c.) Vis tanta est, vt e longinquo succus excipiat: incisæ conto subditur excipulum ventriculo hordino. Humor lactis videtur effluere, siccatus cum coit thuris effigiem habet. Qui colligunt clariùs vident. Contra serpentes medetur, quacunque parte percussâ, vertice inciso, & medicamento addito. Hæc Plinius. Ex quibus perspicuum est deprauatè in Dioscoride legi, *ἢ τῶν τριῶν* Mauritaniæ, cum Tmolus mons sit Lydiæ in Asia minori, restetque Ruellium Atlantem legisse ex Plinio. Euphorbium plantam qui representarit, nullus adhuc extitit, quod sciam, præter Dodonæum, ex quo hanc expressimus. Natum fuisse scribit anno 1570. Bruxellæ in horto Io. Boissot viri generosissimi & doctissimi, à quo vnum terræ commissum folium in plura multiplicatum est, & radicem demisit in obliquos ramulos diuaticatam. Ioannes Leo in Africa historia, ex vno solo, vt ipse nominat, fructu, vigintiquinque, aut triginta quandoq; provenire scribit, è quibus maturis & vulneratis succus effluit lacti similis, qui lentorem contrahens concresecit, & colligitur. Euphorbium istud, vt describit Dodonæus, folia habet oblonga, crassâ, virentia, in rotunda ac terete figura angulosa. Cucumerem satium referrent, si non anguli eminentiores, & albicantibus spinis plurimis duplici ferè ordine obsiderentur. Effluit ex his vulneratis liquor vehementer acris, & mordax, faciliè concresecens. Succus illitus, auctore Dioscoride, vim habet suffusiones discutiendi: potus rota die exurit: quare melli collyriisque pro acrimoniæ ratione admiscetur. Coxendicum doloribus prodest in odorifera potione haustus. Squamas ossium eadem die eximit: verùm eo vtentes oportet linamentis aut ceratis communire carnem ossibus circumlitam. Narrant quidam percussos à serpentibus nihil mali passuros, si incisâ osse tenus capitis cute, intrinseus succus infundatur, & postea vulnus consuatur. Euphorbium, inquit Galenus, causticæ sue vrentis & tenuium partium facultatis est, perinde ac alij multi succi. In his neque alibi, quod legerim, Dioscorides, neque Galenus purgatricis facultatis Euphorbij meminere, quam Plinius non omisit. Veronica soluit aluum, &c. Item Euphorbium, vel Agaricum drachmis duabus cum sale modico potum ex aqua, aut in mulso obolis tribus. Fusiùs eam explicarunt Aërius & Aëtarius. Euphorbium, inquam, pituitam, sed potius aquas subducit: est autem acutissimum, & maxima ignea vi præditum. Quapropter colicis, & quibus venter frigidior est, exhibetur: eos vehementer conurbat, sitimque maximè mouet. Quidpiam ex odoratis seminibus ei permiscetur, & erium obolorum pondere ex aqua mullâ præbetur

Lib. 27.
proem.
Lib. 14. c. 7.

In purgati.
Hist.

Lib. 9.

Viti.
Lib. 3. c. 30.

Lib. 8. sim.

Lib. 16. c. 11.

sed

EUPHORBIVM,

Dodonæus.



Lib. purg.
cap. 10.

sed præstat vt cum melle cocto in cataporia formetur. Mefues hanc & alias eius faculcates recenſet his ferè verbis. Euphorbium igneum eſt, calidum ſiccum ordine quarto, omnium lacrymarum calidiſimum, tenuiſimum. Vir, ruborem excitat, vlcera, penetrat, terget. Tam valenter agit, vt præ anguſtia & labore ſyncope & ſudorem frigidum accerſat. Purgat autem præter cætera pituitam craſſam & lentam, quantumvis impactam, etiam à nervis & iuncturis remotis, & profundis, ſumprum, ſed correctum. Idem ex oleo Leucoij lutei ſolutum affectibus nervorum frigidis, paralyſi, ſtupori, tremori, ſpaſmo, ſpaſmo cynico, nodis, illiſque mirè conducit. Hepatis quoque & lienis tumoribus, & dolori ab intemperie frigida, & flatu, & ei, qui per iuncturas & partes alias turget, occurrit. Pulvis eius ex acetophosphos valenter affricus delet: idem ſternutamentum valentiſſime citet. Cum oleo deſpica illitum occipiti, lethargicæ obliuioni prodeſt, aquas quoque vacuat. Ventriculo & hepati nocet ſua actionis vehementia: ob id minùs tenuis eſt tendendum, & miſcendum acrimoniam obtundentibus, calore ſtammorum extinguentibus, lubricantibus, & horum omnium tanta copia, vt ſuperficies eius vndique obtegatur. Hæc Mefues. Sed difficile eſt Euphorbium, inquit Dodonæus, aliis ita vel iungere, vel permiſcere, vt non vrendi videretur. Nam & plurimo contemperatum oleum inunctum veſicas excitat, præſertim in corporibus mollioribus: quare tutius eſt inter ſimplicia non admittere. Tunditur etiam non ſine moleſtia, niſi naribus diligenter obturata munitis. Si quando enim acrimonia ad nos peruenerit, mox pruriginem, ſternutamentumque excitat, deinde ardore ſummo copioſam pituitam ac muccum, tandem verò & ſanguinem elicit non ſine perpetuis lacrymis. Addeſt hanc Euphorbij acrimoniam indigenis tando fertur eſſe herba, quæ ab effectu, & conuenientiis Euphorbio faculcatibus Antephorbij nomen accepit. Hæc cauliculos emittit multos, rufundos, virentes, atque circa eos folia qualia Portulacæ. Radix multas habet propaggines. Succo quoque prægnans eſt, ſed nequaquam acris, verum lento & refrigerante, ardorem & acrimoniam Euphorbij retundente. Creuiſſe ait Dodonæus etiam in horto Boiſſon, eodẽ quo Euphorbium anno, atque vna cum eodem periſſe. An veteres de ea herba literis aliquid mandarint, nondum compertum. Videtur tamen Dodonæo ad Telephij ſpecies referri poſſe.

ANTEUPHORBIVM,

Dodonæi.



Forma.

Vires.

niam Euphorbij retundente. Creuiſſe ait Dodonæus etiam in horto Boiſſon, eodẽ quo Euphorbium anno, atque vna cum eodem periſſe. An veteres de ea herba literis aliquid mandarint, nondum compertum. Videtur tamen Dodonæo ad Telephij ſpecies referri poſſe.

ALOE. CAP. XXVIII.

Nomina

MEDICAMENTORVM omnium vulgariſſimum & præſtantiſſimum eſt, quod αλόη, tam herba quàm ſuccus eius Græcis dicitur, Latine Aloë, Officinis Aloës, Gallis Aloe & l'herbe du Perroquet, à ſolummodo virore. Quia verò Aloë in maritimis naſci prodirat, non abs re quis ſuſpicietur, inquit Pena, nomen illi factum à ſile, vel ſalo ſive mari, cuius afflatus in primis gaudet, fortè itidem & nonnihil ſalſedinis foris continet, vt exiit marini.

ritima. Sunt etiam qui à crassis foliis, & similitudine, quã cum Semperuiuo habet, Semperuium marinum nominant: Dodonæus Semperuium amarum Columellæ. Græcorum quoque vulgus Aizoon hodie vocat, quia semper viret: Arabes, Persæ, Turci, teste Garcia In Aromat. Indicotum Historia, Cebat. Nam quòd *Laber* à Serapione vocatur (codex meus habet, *Saber*) interpretis errore, aut libratorum negligentia factum fuisse existimat.

ALOE, Matthioli.

ALOE cum floribus,
Matth.

Siquidem Arabicum exemplar *Cebat* habet, inquit: Gazarate verò & Decan incolæ *Artaa*, *Canarini*, qui maritimum hunc tractum habitant, *Catecomer*, Hispani *Aobar*, Lusitani *Azure* appellant. Scillz foliū habet Aloë, vt describit Dioscorides, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, repandumq; $\pi\alpha\rho\ \epsilon\chi\sigma\tau\epsilon\rho\ \delta\iota\ \tau\alpha\ \mu\epsilon\sigma\sigma\epsilon\ \epsilon\chi\epsilon\iota\ \epsilon\kappa\ \pi\omega\lambda\gamma\acute{\iota}\nu\ \acute{\alpha}\nu\omega\theta\iota\alpha\ \acute{\alpha}\rho\alpha\upsilon\varsigma\ \epsilon\zeta\ \chi\omega\tau\tau\alpha\ \kappa\alpha\lambda\omega\varsigma$: id est, ab vtraque parte habet ex obliquo spinulas rariùs eminentes, mutilas. Alij legunt, $\pi\alpha\rho\ \epsilon\chi\sigma\tau\epsilon\rho\ \delta\iota\ \tau\alpha\ \mu\epsilon\sigma\sigma\epsilon\ \epsilon\chi\epsilon\iota\ \tau\alpha\ \pi\omega\lambda\gamma\acute{\iota}\nu\ \acute{\alpha}\nu\omega\theta\iota\alpha\ \acute{\alpha}\rho\alpha\upsilon\varsigma\ \epsilon\zeta\ \chi\omega\tau\tau\alpha\ \kappa\alpha\lambda\omega\varsigma$: id est, interprete Lacuna, folia ex obliquo vtrinque in spinas quasdã retulas longioribusq; interuallis dispositas desinunt. Vel, vt vertit Fuchsius, folia vtrinq; gerunt ex obliquis aculeos raros & breues. Quæ Ruellius obscuriùs & ex Plinij potiùs quàm ex Dioscoridis sensu conuertit, folia vtrinque ex obliquo longioribus interuallis striantur, & in spinulas desinunt retulas truncatq;ue. Quomodo autem Aloës folia striata dici possint, mox dicemus. Caulem proferit Antherico similem, florem album, semen Asphodelo simile. Grani est tota herba odore, & gustu amarissima, radice vna pali in terrã adacti specie. Nasctur copiosissima in India, præpinguis, vnde succus quoque defer tur. Prouenit etiam in Arabia, Asiãq;ue, & in maritimis aliquot locis, ac insulis, velut in Andro, succo extrahendo non valde idonea, sed ad glutinanda vulnera utilis, si trita illis imponatur.

Lib. 3. c. 22.
Forma.

Locu.

Lib. 2. c. 1.

Hæc ex Dioscoride. Hodie plerisque Europæ locis in hortis pensilibus feliciter, non secus ac suis natalibus in sabuleto depacta adolescit florètque. Scribit Garcias in Aromat. Indicotum Historia, Aloën plurimam nasci in Cambaya, Bengala, aliisque multis locis. Caterum laudatissimam esse in Socotora, quæ inde ad Arabes Persas, Turcos, deniq; per vniuersam Europam defertur, eamque ob causam Aloën Socotorinam appellari. Distare autem Socotoram insulam à treto maris Erythræi. 118. leucis: quare non minùs Arabicam quàm Aethiopicam dici posse, quòd altera parte freti Arabia terminetur, altera Aethiopia. Nec verò succum ex Aloë extrahi

1. cap. 34.
lib. 4. Diosc.

Lib. 17. c. 4.

Lib. 1. c. 2.

trahi in quadam duntaxat Socotoræ vrbe, vt scribit Andr. Lacuna, sed per totam insulam, quæ nullis vrbibus exculta est, verum pagos duntaxat habet, quos gregibus neque laterculis ad excipiendum succum subterni paucissimi videntur auctor est. Esse autem Socotorinam laudatissimam, non solum vulgus, sed etiam à celebribus viris se accepisse asserit. Quin compertum se habere, quod quidem plerisque aliis Indiæ locis nasci, quæ cum Socotorina deferatur Adem, & Gida, inde terrestri itinere Cairum, postea Alexandriam: vel Ormis, deinde Basora, postea Cairum & Alexandriam: facile tamen dignosci Socotorinam ab ea, quæ in Cambaya, Bengala, aliisque locis aduehitur, Socotorinæque quadruplo maius esse quàm eius quæ aliunde adfertur pretium. Inter reliquas autem notas Socotorinam commendari, quòd solida sit, & bene compacta: aliterius vero parum non posse perfectè eoire, quòd succus ex diuersis plâris collectus sit. Quod vero Dioscorides & Plinius scribunt laudatissimam ex India deferri, alij ex Alexandria, Arabia, non simpliciter id intelligendum est, sed de ea quæ ex Socotora primum in Indiam delata est. Alexandrinam autem quidam præferunt, quod superius annis pleraque aromata Ormis deferretur, deinde Basora, Adem, Gida, & Naxos melis Suez, quæ in extremo maris Erythræi sita est, & Alexandriam ad Neapolim vnde Veneti petentes ea reliquæ Europæ communicabant: non autem Alexandria fiat Aloë. Nascitur verò nò modò in maritimis, sed etiam desertis Indiæ locis: eam enim se vbique vidisse ducentarum leucarum itinere terre eas solitudines cõfesto. Hæc tradidit Garcias. Ex quibus intelligere licet quæ sit hodie Aloë Sucotrina, & vnde dicta, cui primum locum statuit Mesura, & secundum Hepaticæ seu Persicæ, tertium Armeniæ, quartum Arabiæ, & apud Plinium Aloës descriptio, sed breuior, præter hanc alia quadam habet, apud Dioscoridē nò leguntur. Aloë Scillæ similitudinē habet, maior, & pinguioribus folijs, ex obliquo striata. Caulis eius tener, rubens, medius, non discolor, therico: radice vna, seu palo in terram demissa, graui odore, gustu amara. Latissima ex India affertur, sed nascitur & in Asia: non tamen ea vtuntur, nisi a recentibus folijs: mirrice enim conglutinat, vel succo. Ob id in turcicis cadornm eam ferunt, vt Aizoon maius. Quidam & caulem ante maturum minimis incidunt succi gratia, aliqui & folia. Inuenitur & per se lacryma adulterata. Ergo pauimentandum vbi sita sit censent vt lacryma non absorbeat. Falsè tradiderunt in Iudæa supra Hierosolymam metallicam eius naturam: sed noli iudicis improba est, aut humidior. Erit ergo optima, pinguis ac nitida, rufi coloris, & bilis, ac iocinoris modo eoacta, facile liquefciens. Improbanda nigra & dura, resissa quoque, quæ & gustu intelligitur. Gummi adulteratur & acacia. Quod Dioscorides dixit Aloën folio esse Scillæ simili, crasso, pingui, modicè lato, rotundo, & sus pando, ex vtraque parte, non anteriore aut posteriore, sed à lateribus folij habere rarius extantes, & mutilas. Plinius obscurius dicit Aloën Scillæ simile, nem habere maiorem, & pinguioribus folijs, ex obliquo striatam, id est, lacrymam ex obliquo laciniatis, & veluti striatis cum spinularum eminentiis: alioqui Aloë folia neque parte aduersa, neque auersa sunt striata, neque in canaliculos excavata, vt autoplia ipsa demonstrat. In Aloë inueniri lacrymam per se adhaerentem Plinius ait, Garcias in Aromat. Indieorum historia scripsit nullum eius inueniri gummi certum esse, sed interdum aquam quandam viscidam è folijs stillare, at negligenter & nullius vsus. Idem miratur Plinium tradidisse Aloën metallicam supra Hierosolymam inueniri, qui non solum Medicos Iudæos, verum etiã pharmacopœas supra Hierosolymorum incolas se esse asseriebant, diligenter interrogari de hoc loco. Sed illi constanter negabant vnquam fuisse repertam huiusmodi Aloë in tota Palæstina. At Plinius id non affirmat, verum fuisse inquit, qui tradiderunt.

Sed

Sed & Dioscorides in præfatione totius operis falsum esse asserit quòd Niger dixerit Aloën fossilem metallicam Plinius dixit) in Iudæa nasci. Probat Dioscorides Aloën *ἡπαρὶζαύριον*, id est, hepatis speciem præferentē. Plinius iocinoris modo coactam dixit. Deinde adulterari gummi & acacia, quod & Dioscorides ait. Adulterant ipsam gummi, quod deprehenditur gustu, & amaritudine, & odore valido, & quod non dissolvitur ad minimum vsque frustum, dum digitis friatur. Quidam etiam acaciam admiscēt. Hac in re iis auctoribus fidem adhibendam non esse censet Garcias, quòd exigua sit iis in regionibus gummi & acaciæ copia, imo nulla, quemadmodum à viris fide dignis accepit. Præterea cum nimia sit illic Aloës quantitas, non adulteratur, sed quia negligentiores sunt incolæ in tollendis sordibus, quas hic succus secum trahit, aliàs alia purior, aliàs impurior videtur. Illud vero non negat, quin in alias regiones translata, illic adulteri possit. Dioscorides herbam Aloën gustanti amatissimam esse scripsit, Plinius gustu amatam. Anton. Musa negat amatam esse, Pena nostræ insignem amarorem non inesse ait, ne quidem recenti ex Hispaniis in Flandriam Angliamque delata, ubi tamen Aloë factitari dicitur. Quinetiam succum nondum solibus percoctum, ut brumæ tempore, minimum amarum esse, idque cæteris multo aequo siccato permixtis enenire, ut ignavius multo per initia lapiant, deinde maturitatem ad præparatam, perfectioris saporis formam acquirant. Sic lactuca menstrua dulcis est, trimestris cum florem & semen profert amara. Portulaca fatua initio, adulta acida. At Garcias Aloën herbam non amatam gustu deprehendi miratur: nam sæpe degustatam admodum amatam se gustasse asserit: quòque vicinior pars erat radici, eo amatiorem illi visam fuisse, extrema autem folia amarore carere visâ. Huius diversitatis causa est calum solùmque: iis enim feruidioribus herba eiusque succus perfectius excoquuntur, & saporem suum, id est, amarorem contrahunt, quod nõ nisi tempore evenit eidem herbæ succoque in aliis regionibus minus calidis promuentibus. Aloës herbæ succi duo genera tradit Dioscorides. Vnum arenosum, quod purissimæ saxe esse videtur. Alterum quod iocinoris speciem præferet. Nec sunt audiendi, inquit Garcias, qui succum ex superiori parte plantæ profluentem eo, qui media aut infima parte profluat, præstantiorem putant: nam omnis succus bonus est, & arena caret, si adhibita diligentia extrahatur. Hodie Sucotrinam Officinæ vocant, cui prima laus. Eius singulas libras ducato emunt Venetis, si limpidâ & lucida sit, ex rubro flavescent. Quæ verò Officinis hepatica dicitur, ubiuis infimi pretij est, arenosâ vero & purioris saxe, iisdem Caballina vocatur. Nunc de Aloës facultatibus tum ex veteribus, tum ex recentioribus dicendum. Aloë, id est, herbæ succus, vim habet adstringentem, auctore Dioscoride, somniferam (*ὑπνῶδης*). In quidam codices Græci non habent: siccantem, densantem corpora, aluum soluentem. Stomachum expurgat duorum cochleariorum mensura pota in aqua frigida, aut tepida. Sanguinis reiectiones cohibet, & morbum regium purgat trium obolorum aut drachmæ vnius pondere pota cum aqua. Deuorata cum resina, aut cum aqua, aut melle decocto excepta, aluum soluit. At trium drachmarum pondere sumpta, perfectè purgat. Mixta aliis purgatoriis medicamentis, stomacho minus noxia ea reddit. Siccata & inspersa vulnera glurinat, & vlcera ad cicatricem perducit, compescitq;. Priuatim verò exulceratis genitalibus medetur, & rupta infantium præputia agglutinat (*ἡπαρὶζαύριον* præputia vocat, eo quòd glandi inducantur.) Condylomata rimasque sedis cum passio sanat (Alij codices habent *συν γλαυκῆ δὲ*, id est, cum dulci vino.) Sanguinis eruptiones ex hæmorrhoidibus factas sistit: & digitorum reduvias ad cicatricem perducit. Liuores & sigillata cum melle delet. Lippitudines scabras, & angulorum in oculis prutiginis lenit. Dolorem capitis sedat, temporibus & fronti ex aceto cum rosaceo inuncta. Capillos

fluentes cum vino compescit. Tonsillis, gingiuus, & omnibus in ore affectionibus ex vino & melle prodest. Ad ocularia medicamenta torretur in testa pura ac candente ligu' aque subinde versatur, donec æqualiter torreatur. Lauatur, vt quod est arenosissimum subsidat velut inutile, & leue ac pinguisimum assumatur. Plinius eadem ferè tradit. Natura eius spissare, densare, & leuiter calefacere. Vfus in multis, sed principalis aluum soluere, cum penè sola medicamentorum quæ id præstent confirmet etiam stomachum, adeò non infestet vlla vi contraria. Bibitur drachma ad stomachi verò dissolutionem, in duobus cyathis aquæ tepidæ, vel frigidæ, cochlearis mensura, bis terte in die ex interuallis, vt res exigit. Purgatus etiam causa plurimum tribus drachmis. Efficacior, si pota ea sumatur cibis. Capillum fluentem continet cum vino aultero, capite in Sole contra capillum peruncto. Dolorem capitis sedat temporibus & fronti imposita ex aceto & rosace, dilutiorque infusa. Oculorum vitia omnia sanari ea conuenit, priuatim pruriginis & scabiei genarum: item insignita ac luida, illita cum melle maxime. Tonicum. Tonsillas, gingiuas, & omnia oris vlcera. Sanguinis excreationes, si modice sint, drachma pondere ex aqua: si minus, ex aceto pota. Vulnenum quoque fluxum, & vndeunque fluentem sistit per se, vel ex aceto. Alias etiam est vulnenum vtilissima, ad cicatricem perducens. Eadem inspargitur exulceratis genitalibus virorum, condylomatis rimisque sedis alias ex vino, aliàs ex passo, aliàs sicca per se, vt exigit curatio, mitiganda ac coercenda. Hæmorrhoidum quoque abundantiam leniter sistit: dysenterix infunditur. Et si difficilius conquoquantur cibi, bibena modico interuallo. In regio morbo tribus obolis ex aqua. Deuorantur & pilulæ cum mellis decocto, aut resina terebinthina ad purganda interiora. Diurnum pterygga tollit. Oculorum medicamentis lauatur, vt quod sit arenosissimum subsidat. Aut torretur in testa pennæque subinde versatur, vt possit æqualiter toreri. Quod Dioscorides dixit, Aloë duorum cochleariorum mensura potam stomachum purgare *μὲν ὁ Dioscorides φησὶν, ὅτι γαλακτῶδες*, Plinius ait bibi ad dissolutionem stomachi in duobus cyathis aquæ tepidæ, vel frigidæ, &c. vt aquam tepidam verterit το γαλακτῶδες ὀπίσσω, id est, aquam lactei teporis. Galenus de eadem uerit. Aloë herba non admodum apud nos prouenit. Quæ in magna aseria, lignosior est, & facultatis imbecillioris: attamen usque adeò desiccate potest, vt vulnera conglutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Cælofryia & Arabia, multò est melior. Optima verò Indica, cuius liquor est id quod ad nos importatur medicamentum cognominatum Aloë, ad plurimas res propter siccitatem morfus expertem utile. Est autem non simplicis naturæ, sed, vt indicio est gustus, astringit simul, & amara est. Astringit quidem mediocriter, sed vehementer astringit. Subducit & ventrem, vt puta ex eorum medicamentorum numero, quæ Greci ab excernendo stercore *ἰκκαροποιον* vocant. Itaque tertij est ordinis exlascitium, calfacientium autem aut primi intensi, aut secundi remissi. Verum & ipsius facultatis misturam attestantur particularia ipsius opera. Nam & gratum stomacho est medicamen, vt si quid aliud, & sinus glutinat. Sanat & vlcera, quæ ægre ad cicatricem duci possunt, & maxime quæ in ano sunt & pudendo. Iuuat etiam eorum inflammationes aqua liquata, & vulnera ad eundem modum glutinat. Congruit similiter videnti ad inflammationes in ore, natibus, oculis. In summa repellere & discutere simul potest, cum hoc vt parum extergeat, quantum videlicet steribus parvis non sit molestum. Hæc Galenus. Hodie Aloës usum esse non modo apud Arabes Turcasque medicos, sed etiam apud Indos in purgantibus medicamentis & collyriis testatur Garcias in Aromat. Indic. Historia, tum etiã vulneribus carne explendis: in quem usum plerumque in suis Officinis medicamentum habent, cui nomen Mocebar, ex Aloë & Myrrha paratum: quo etiam plurimum

vruntur in equis curandis, & vulnerum lumbricis enecandis. Medicum se vidisse air magni Sultrani Badur regis Cambaia, ipsa herba Aloë vrētem pro medicamento familiari, in hunc modum. Folia Aloë concisa cum sale coquebat, eius decocti vncias octo propinabat, quæ aluum sine molestia & nocumento subducebāt quater aut quinquies. In vrbe Goa Aloë probè tusam, & cum lacte mixtam propinantiis qui vlcere renum aut vesicæ laborant, vel qui purulentas excernunt vrinæ, non sine magno suecessu, & ægrorum commodo: nam illico curantur. Eius vsus etiam aucupibus notus est, qui contracta auium crura ea conglutinant. Similiter in India maturandis phlegmonis idonea. Recentiores, & docti quidem viri, Arabes medicos insectati sunt, quod affirmauerint Aloë venarum oscula adeo referare, vt inde sanguis fluat, eamque ob causam hæmorrhoidibus non conuenire. Sed iis dudum responsum fuit, longa experientia compertum esse Aloë foris admotam ora venarum claudere, & sanguinem sistere, intro verò sumptam, illis præsertim qui hæmorrhoidibus vexantur, sanguinem attenuare, calfacere, deducere ad ora venarum, ipsæque adeo vasorum extrema referare, quod & alij succi multi faciunt, vt Porri, Vrticæ, Myrrhæ, quæuis calidi & sicci. Siluius scribit Aloë calore & crassa substantia venas tum hepatis, tum hæmorrhoidas aperire: anastomatica enim esse maximè quidem calida, crassa, acris & mordacia, non minimum tamen calida, & crassa, qualis est Aloë: foris verò admotam vasis sanguine fluentibus, ipsum sistere facultate sua adstrictoria, & valde sarcorica. Clusius Aloë à

In Mela-
cap. 1.
lib. purg.

*ALOE Americana,
Clusij.*



vulgari planè diuersam primus, quod sciam, ostendit. Eam & plures alias illi acceptas referre debemus. Multa illi sunt folia, inquit, hominis longitudine, saruratiùs virentia, læuia, inferiore parte trium aut quatuor digitorum transversorum crassitudine, & valde lata mutuo sese amplectentia, vt in vulgari Aloë & Asphodelis, sensim verò in mucronem desinentia, qui nihil aliud est quàm spina nigricans, crassa, & duos digitos transversos interdum longa, & adeo firma, vt Americi pro subula vranur, cuspidisque vice suis telis adaptent. Foliorum latera quæ renuiora sunt, spinis eiusdem coloris horrent, sed breuioribus, basi latiore, & deorsum recuruis vt in Rhamno tertio, interiore patte fibrosa. Sunt hæc folia succi plena amari, & acris. Ex eorum medio caule in enasci intellexit Clusius (neque enim vidit) brachiali crassitudine, & breuioris lanceæ altitudine: radix est crassa, oblonga, incurua, & veluti internodiis distincta, è cuius geniculis ad latera adnascuntur aliæ plantæ. Primum hanc plantam sibi demonstratam fuisse ait Clusius à D. Ioanne Placa Medico & profes-

Aloë Ame-
ricana.
Forma.

fore Valentino, primo ab vrbe Valentia lapide in Monasterio D. Virgini facto, cui cognomen de Iesus. Postea aliis etiam locis obseruauit. Erutam autem vidit omnium maxima radice in suburbanis Petri Alemanni, duorum ferè cubitorum longitudine, ad cuius latera triginta ferè pumilæ plantæ enatæ erant,

exquisitis, etiam in diis in Belgium delat. Eorum una à *Paulo Galieno* plantæ scopæo facta Aloë producta, ex qua novam deinde molam coarctant, quæ patet vulgari Aloë esse. Viuax est, multoque arborosæ ar, radices multipliciter sese propagans, cuius rei gratia, & propter spinarum rigiditatem Indi seu Americi circa agros ferunt, ad eos communiendos, & fures arcendos. Valentini filij *Aguilla* vocabant, id est, filum & acum, quod foliorum extremae spinæ, acus, & fibræ interiores illi vicem præstent, Indi *Magny*, & *Medi*, nonnulli Hispani *Cardon*, ob aculeos. Magno in vfu est apud Indos, vt refert Gomara ad finem historię Mexicanæ, cuius verba, quod integram huius plantæ historiam contincant, adscribere hic libuit ex Clusio. *Medi* nonnulli *Magny*, alius *Cardon*, arbor est d'iplo h'non as l'itara, aut alius crescens, crassitudine coxæ hominis, parte inferiore crassior & densior, deinde sursum in pyramidem desinens vti Cupressus. Quadragena illi folia, regularum prope modum amplitudine, & eodem modo canaliculata, sede inferiore crassa, & in mucronem desinentia, lateribus tenuiora, & crassa spina mucronem occupante. Tantra circa Mexico copia nascitur, quanta apud nos vitis. Producit nam, florem, & semen. Ex ea ignem struunt, cuius cineres panis, & ligni idonei: truncus loco ligni est: folia regularum aut imbricam. Eam cibus lent antequam nimium adolescat: tum enim radix crassior fit, quæ excavata quidam colligitur, qui Serapij modo illic densatur: is aliquantulum coctus fit, depuratus siccharum, dilutus acetur, & addito Opatij radix est, quam præstantiam, Vini medicinam nominant vinum, illis quidem in vfu, & vni salubre: erenim caput ferit & inebriat: nullum autem cadaver, nulla pura sentina adeo foetet, atque eorum anhelitus, qui eo vino inebriati sunt. Ex huius germinibus & renellis folijs fit conferua. Foliorum proprius succus recentibus vulneribus aut vlceribus instillatus, breui ea curat. Genuum & radicem succus, cum Absynthij illius regionis succo mixtus, vix moribus vtiliter instillatur. Illius folijs paratur charta in vsum sacris & pictorum, & ex iis linæ aut cannabis modo paratis fiunt Al pergates (calceus Hispanis admodum familiare, ex funiculis contextum.) flores, chlamides, ciugula, funes: denique illis sunt cannabinum filum. Horum foliorum cuspidés seu spinæ adeo firmæ sunt & acutæ, vt illis acis aut subulæ vice fiat, cum fibris extrahendo. Illis spinis sacerdotes illius regionis in sacrificijs se gere solent: erenim cuspis non frangitur, & saris altè penetrat, exiguo foramine. Hactenus Gomara. Addunt quidam, Americanos Venereæ hac planta curare solitos hoc modo. Eius fragmentum in minutas partes actum, ollæ canthari aquæ capaci impositum, trium horarum spatio decoquebant, olla prius luto obturata: eam deinde apud ægrum positam percrebant magna fumi copia inde exhalans multum sudorem excitabat. Aut solum huius plantæ prunis impositum assabant, cuius fumum æger excipiebat: sed ad vehementes sudores inde excitabantur, adeoque vires collabebantur, vt vix ferre posset, tamen si triduo duntaxat vteretur. Ex eorumdem foliorum seticula contextuntur, & indusia conficiuntur. Hæc Clusius.

RHABBARVM. CAP. XXIX.



PVD Arabes & recentiores duæ radices peregrinæ Rha nomine de
 signantur. Quæ res atque vtriusque stirpis ignoratio fecit, vt pleri-
 que, num eiusdem plantæ radices essent, ambigerent. Verùm rerum
 inspectio atque accurata collatio totam litem diremit, docuitq; Rha-
 ponticum à Rhabbaro plurimùm discrepare. Primùm Rhabbari præcis in-
 cogniti historiam perscribemus. Nascitur id in montibus Singui ciuitati Indiæ Locu.
 propinquis, quæ à frequentissima & ditissima ciuitate omnium, quarum erat me-
 moria, Quinsai quatuor dierum itinere distat. Veraque verò regioni amplissime,
 & in multa regna diuisa, quam Mangi vocant, ditionis est. Singui terræ ciuitatem
 indigenarum lingua significat, Quinsai verò cæli. Quod illinc Rhabbarum ad-
 fertur, Indicum nuncupant. Id autem perpauca est, tum quia ipsæmet gentes
 id consumunt, tum quia pauci mercatores, cum quibus sunt commercia, eò vique
 penetrant, tum quia minore sumptu & periculo ex Armeniæ ciuitate, quam Tau-
 ris nominant, (Terua ptolemæi quidam esse arbitrantur, alij Arsamoten Plinij)
 aduehitur. Gignitur & in Prouincia Scythiæ orientalis Tartarorum Imperatori
 subdita, quam Tanguth vocant, in montibus oppidis Campion & Succuir vicinis
 (Succuir Saranganæ a Plinio dici quidam suspicantur.) A Tauris, quæ Armeniæ ma-
 ioris caput est, ad eas vrbes iter patet centum & octoginta dierum, his stationi-
 bus. A Tauris ad Sultaniam ex ruinis Tigranocerta ædificata sex diebus perueni-
 tur. A Sultania ad Calibin (Colixos esse aiunt) quatuor. A Calibi ad Veremi, sex. A
 Veremi ad Eri Atianorū caput, vt quidā volunt, quindecim. Ab Eri ad Bachora
 (in Chorasmiis siue Choraxiis oppidum id est, Chorasam prouinciā vocant. Sunt
 qui Berdrigeos Plinij esse credunt, alij Bacrianos) viginti. A Bachora ad Sarma-
 cand (Margianæ caput nonnulli esse autumant, alij Sogdianorum) quinque. A
 Sarmacand ad Cascar. Communos Plinij quidam esse volunt, alij Aracofios) vi-
 gineique. A Cascar ad Acsu (Arafini sunt Plinij quorundam iudicio) per de-
 fertas ac vastas solitudines, viginti. Ab Acsu ad Cuchia, viginti. A Cuchia ad Cia-
 lis oppidum, decem. A Cialis ad Turfon (fortasse Tagas esse Plinij non malè
 quidam opinati sunt) decem. A Turfon ad Camul, quod iam prouincia Tanguth
 continetur, tredecim. Hucusque Machometum colunt, idè Musulmani dicti. A
 Camul ad Succuir quindecim. A Succuir ad Ganta, Gandaros Plinio nonnullorū
 opinione dictos, quinque. A Ganta ad Campion, sex. Itineris spatia viato-
 res & mercatores parasangis metiuntur, quas adhuc farsing vocant veteri no-
 mine, sed corrupto. Via facilis, nec montibus impedita, nec solitudinibus homi-
 nes iumenta que siti ac fame necantibus intercepta, octo parasangas, id est, 24. ini-
 liaria Italica conficiunt singulis diebus. Nam parasanga tribus miliaribus Italicis
 proportionē respondet. Campionenses ac Succuirini Rhabbarum sua lingua Nomina
Rauend Cini vocant, quod non rectè quidam nunc *Raued Sem*, nunc *Raued Semi*
 appellant. Cuius nominis proprietas controuersiam dirimit inter medicos no-
 stri seculi agitatam, cur ita vocetur, contendentibus aliis Sinicum nominatum
 esse à Sinis extremæ Indiæ populis, aliis Scenicum, vel Scenticum a Scenitis Ara-
 biæ gentie, aliis à Scenitis Parthorum natione, qui Ariæ & Margianæ montes ha-
 bitant: quæ postrema sententia plus habuit ponderis quàm reliquæ duæ, cum
 Arij, Margiani, Aracofij, & alij populi prouinciæ Tanguth Campionensibusque
 finitimi communi vocabulo Cini & Maucini etiam hodie nomenclentur. An verò
 à Troglodytis Æthiopix, quos *Ἰνδοί* Barbaros nuncupasse videtur antiqui-
 tas Rhabbarum sit appellatum, facile diiudicari potest. Nam Æthiopiam & eius
 Troglodytas Lusitanorū nauigatio nobis pæfecit, quibus in locis nec Rhab-

barum prouenire, nec inde ad nos mitri cōpertum est. Quod verò in Ægyptum per sinum Arabicum camelis deportant, ex Armuzo, nunc Ormus, & Teredone, nunc Balzera, ad Euphratis ostia sis, & aliis ciuitatibus Caramaniz maritime mercatores aduehunt, in ea loca secundo Enphrate, id Barbarum potius nominatum crediderim, ab earum gentium immani feritate, quæ in montibus suis collectum ad nos transmittunt. Quondam enim totus is tractus desertorum vastitate, & tam longo itineris à nobis intervallo dissitus, vix solis nominibus cognitus fuit. M. Paulus Venerus viam, quæ è Carmania ad Tanguth ducit Combinam, Timochaim veterum Arbelitin, in qua Darium Alexander vicit, Sapurgan, Balæ, Thaican, Scassem, Balaxiam, Bafcia, Cheshnur, Comaros Plinij, Voeham, Oceanos Plinij, Caschar distinctè tradidit. At verò Chagi Memet è regione Chilam ortus prope mare Caspium ex oppido Tabas, mercator summæ fidei, acutissimique ingenij apud Suecathinos & Campionenses emendi Rhabarbari causâ aliquandiu commoratus, alteram viam suprâ descriptam, quæ è Tana Armeniæ eo proficiscuntur, rectam & compediōsam docuit: ex cuius narratione magnam horum partem nos sumpsisse ingenue fateamur. Rha Turcicum Mellez idem esse cum Rhapontico Græcorum nemini dubium esse debet. Ad ripas fluminis Rha, nunc Volga, Edel, Elarach, (tor enim nominibus appellant,) Bonis, nunc Neper, Tanais, nunc Tana, vel Don, id erexit, vt & Acorus. Turcæ olim vltra Tanaim sedes habuere prope Sarmatas Zygos, nunc Circassios, in partibus illis campis, in quibus nunc Tartari Harmarotrophi, siue Hamaxobii Hordas, id est, turmas vagantur palantes & errabundi, Rhaponticum ad eas nationes mittebant: vnde Turcicum cognominatum. Scribit Pena multis ab

Rha Tur-
acum si-
ue Ponu-
cum
Locis.

RHA CAPITATVM,

Helenæ folio.

Forma.



hinc annis Rha ex semine Turcieo notum os habuisse in hortis Galliz & Flandriz, quod magno studio cultum ibi viguit, foliis Pioniz, sed non perinde latis, longioribus, Helioz, vel Verbasci, in ambitu serratis & fimbriatis, aduersa parte virentibus, auersa lanuginosis, caulem rectum sesquipedalem & cubitalem amplexis, capite fastigiatum, foris squamulis longicatis, ac per maturitatem staminibus purpureis pleno, vt in Cynara, & Cardui purpureis, seminum circa Iunium & Iulium maturuit, Centaurij maioris, vel Carrami, longior: radix furcior, maior, & Rhabarbaro similior quàm Centaurio. Id pinxerunt Dodonæus & Lobellius. Huc capitato Rheo valde affine est, inquit Lobellius, quod ex Italico semine alunt horti quidam Belgici: sed folia angustiora multo, acuto Lapathoparia, auersa parte incana: caulis rectus, capite fastigiatum, squamulis loriceato, ac staminibus purpureis Cynaræ aut Cardui cōcoloribus pleno: semen Cnici siluestris, cōpressum, ægri matureseit in Belgio: radix Centaurij maioris, fungosior. Hoc ex Lobellio pictum damus. Sed

ad Rhabarbari historiam reuertatur oratio. Succur ampla & frequens est ciuitas, ædificiis ornata sumptuosius & magnificè, è latere constructis, angustis, imisque superba delubris, ex saxo & marmore compositis. In planitie iacet, innumeris fluuij canalibus rigua. Quare omnibus rebus hominum vitæ necessariis abundat.

ferico

ferico præfertim, quod illic plurimum Mori nigrae foliis pasti bombyces nent. Vites quidem locus is, nempe frigidior, dedignatur. Vini loco potum zytho similem adiecto melle incolæ parant. Cætera, illorum ager Malorum, Pyrorum, Armeniorum, Persicorum, Melonum, Cucumerum fertilissimus est. Rhabarbarum vbiuis in ea provincia gignitur, sed præstantissimum in quibusdam montibus Succuir propinquis, editis, saxosis, siluis diuersissimarum arborum, opacis, fontes plurimos effundentibus, terra rubra, crebris pluuiis fontiumq; scaturiginibus riguisq; semper lutosa. Caulem ab radice profert viridem, palmi altitudine, quem

Rhabar-
barum.

RHAPONTICVM alterum
angustiore folio, Lobell.

RHABARBARVM,
Martholi.



circundant folia multa, palmos duos longa, tamen pro ætate plantæ longiora, aut breviora, ima parte angusta, in summa latiora, rotundata, in terram inclinata, toto ambitu lanuginosa, cum adoleſcunt viridia, cum senescunt flauescencia, & humi procubentia. Ex medio foliorum stipatu cauliculus, siue surculus prodit, flores sustinens, hic illic nullo ordine emergentes, ex candido purpurascetes, Violarum nigrae, siue Martis similes, maiores, odoris validi, grauis & iniucundi. Radix ad duos vel triue palmos, tetram subit, cortice fusco obduta, crassitudine dispari: sunt enim radices quædam tenuiores, quædam crassiores, sed nonnunquam tanta crassitudine, vt suræ & coxæ hominis non cedant. Ex his fibræ multæ radiculae ve enascuntur, circumquaque per terram se spargentes. Planta è terra effusa, (quod Hyeme fit, nimirum ante Maii finem, cum illis gentibus Ver incipit, quia tum priusquam exoriantur folia, succo introrsum reuocato plenior & habitior, ideoq; facultate præstantior radix turgescit) radiculae primum reſecantur & reiciuntur, deinde radicis, velut truncus in frustra conciditur, qualia videmus in Sepalsis. Est autem intus lutea, venis distincta, colore rubro pulchre nitentibus, succo luteo rubroq; madida, quo manus inficit, sic lento & glutinoso, vt contactu faciliè digitis inhaereſcat, saporis tam amari, vt gustari nequeat. Fruſta protinus radice dissecta non appenduntur, vt sicceſcant: sic enim luteus succus totus efflueret, crassaq; euania,

& exhausta radix, fieret facultate imbecillior, & bonitate inferior, sed super
 & tabulis disposita, quotidie ter, aut quater inuertuntur, vt quod superne est
 ne collocetur: hæc enim ratione succus non adimitur, sed in radice veluti coactus
 & concretus manet, radice nisi confestim ea diligentia adhibearur, effruescente
 ac inarescente. Post quartum demum, aut sextum diem pertusa frusta
 adactis ligata suspenduntur loco perflato, ætemq; liberè admitrente, sic tamen vt
 solis radius non feriantur. Hoc pacto exactis mensibus duobus siccaturum Rha-
 barum egregium reconditur. Ex septem plaustris recentis, cum siccaturum est, vix
 restat quod equum oneret. Effossa per æstatem radix foliis iam enatis, & adultis
 velut immatura, nec succo luteo madet, vt quæ per Hyemem effoditur, & inpro-
 fiata, leuis, arida est, bonitateq; ab altera multum superatur. Qui
 pergunt, vt Rhabarbarum emant, quale effossum est, siue cū foliis, siue
 liis plaustris imponunt, ac velles singulas in plana deductas sexdecim S
 genteis vendunt. Cusæ autem monetæ nullus apud illos vsus: argentum &
 in virgas oblongas malleis ducunt, eas deinde in particulas ponderis vni-
 gy diuidunt, qui valer argenteos solidos Venetos circiter viginti, a
 nummum aureum eum dimidio. Id pro moneta est. Emprum in ea
 dictum est, præparant. Id ineolæ, quod admiratione dignum est, nullo
 habent, ne effossuri quidem, nisi ab externis mercatoribus eo
 deposcenribus, pretio sollicitarentur. Indi & Chineses mercatores man-
 partem collecti, & præparati auferunt. Catani ad purganda corpora, & a
 dieinæ remedia, id non vsurpant more nostro, sed coctis, & eum aut con-
 nibus perquam odoratis mixto, Deorum quos adorant simulaera & ima-
 sunt. Multis in locis tanta est huius radice copia, vt pro ligno siccaram
 Quidam tam paruifaciunt, vt equis languentibus, & agris assidue con-
 obiciant. Longè pluri æstimatur Catani radice Mambro Cini voc
 Rhabarbaro nascens, ad varias ægritudines laudatissima, ob idque no-
 sed ad oculorum morbos præcipuè. Nam ea in core trita ex rosacea, &
 lorum dolor euelligio sedatur. Ad nos eam non conuehant, propter
 nomine celebris, cætera ignota est. Apud Catanos in prouincia Chi
 quoque nascitur Chiai Catani nominata, vniuersis eius regionis populis com-
 datissima. Foliorum & aridotum & virentium decocti cyathus vnus vel
 birur quam calidissime bibi potest, aduersus febres, dolores capitis, lateri-
 lorumq; remedio inter alia efficacissimo, & ad alios plerosq; morbos.
 quoque ventriculi concoctionem decoctum id sic iuuat, vt eius grauior
 dum cibum contractæ faciliè medeatur, & felicior, ac celerior
 nem præstat. Ob has nimirum dores Catainorum quisque hanc siccum
 aliquo peregrinaturus gestat, vt subitis eorum morborum causis occurrat. Tam
 ob id est huius plantæ dignitas, ac æstimatio, vt Rhabarbaro pl
 sola vicia gens illa lubentissime permutet, atque adeo iactet Persis, ac Franch
 ea planta innotescat, mercatores Rhabarbarum amplius non postulaturos. A
 nas non absque periculo in montes Rhabarbari teraces conscendere narra-
 gendi graua, nisi eius prouinciæ iumentis vehantur. Illic enim venenatam q
 dam herbam nasci, qua gustata vetetinis vngulæ decidunt: equos verò e
 montium pascuis assuetos exitiosam hanc plantam noscere, nec attingen
 nos verò capere & appetere magno suo malo. Rhabarbarum calidum est
 in ordine sicudo potius quam primo, auctore Mesue Substa
 vna aqua, reitrea adstringente, in corporis molè coëcta, pro
 igæa, a qua rarum efficitur, superficialia, quæ sunt interream
 Vires. do amarum efficit, ac purgatoriam, & obstructa liberantem. C

Mibroni
Cini ra-
dix.

Chiai Ca-
tai herba.

Temper.
Lib. qu g
cap.

excellens medicamentum, multas dotes medicamento purganti inaximè expetitas complexum. Huic substantiæ macerando separantur, vt calida & purgatrix in humore tranſiit, terea vè adstringens remaneat. Bilem pituitamque illa vacuat, præcipue in vniculo & hepate, & inde sanguinem pulgat, obſtructiones liberat, & affectus inde natos, icterum, hydropem, splenis tumorem, febres putridas etiam diuturnas, dolorem hypochondriorum punctorium. Hæc niſuper hæmorrhagiam pulmonum, vel aliarum partium ſiſtit, ex caſu quoque aurictu conuulſa, rupta, ſiacta, interna & externa ſanat, ſi eius drachma vna cum mumia granis duobus, & Rubiæ tinctorũ grano vno & dimidio ex vino auſtero bibatur. Mumia & Rubiæ non ita valentium medicamentorum inenſura hic eſt parior, vt mendii ſuſpicio ſit, inquit Siluius, præſertim cum Auicenna Rubiæ drachmā vnam Rhabbarbaro addat. Oleum quoque eius contuſis & confractis nauſealis vtiliter illiniunt ſingultũ & dyſenteriam ſanant, præcipue aſſum, & cum ſucco Plantaginis e vino auſtero potum. Innoxium eſt Rhabbarbarum: omni tempore tuto datur: omni eſt ætati ſalubre, atque adeo pueris, & prægnantibus. Efficacius autem agit ſumptum ex ſero lactis, præſertim caprini, aqua quoq; Inrybi, aut Apij, vel Plātaginis cocta & colata maceratum, idq; omnino cum Spica nardi, actionem eius iuuante imprimis, expreſſumq;. Quod ſi ad liberandas obſtructiones propinandum eſt, vini albi puri & odori modicum macerando admiſceatur, expreſſumq; eius tunc ſumatur, & cum deterſione ac purgatione opus eſt. Quod ſi poſt purgationem viſcera adſtringendo roborari volumus, puluis eius triti datur, ſi adſtrictio magis expetitur, aſſum datur, ſi maxima, uſtum.

AGARICVS.

CAP. XXX.

ΑΓΑΡΙΚΟΣ vel *ἀγάρικος* Græcis dicitur, qui Agaricus Latinis & *Nomina*
 Agaricum, Mauritanis *Garchum*, ſiue *Garcium*, Hiſpanis & Italis *Agarico*, Germanis *Dannenschuam*, quali fungus Pinorum, aut porius *Forma*
 Aluerum & Laricum, Gallis *Agaric*. Agaricum gentile nomen ſibi
 addiuit, ab Agaria Sarmatiæ regione, in qua naſcitur, teſte Dioſcoride, vel ab
 Agaro, quem & urbem, & amnem in Sarmatia vocari tradit Ptolemæus. Appia-
 nus Alexandrinus Agaros Scythicam gentem contra ſerpentium morſus adhiberi
 ſolitam reſert: propter quod Mithridates eos apud ſe habuerit. Agaricum ſcribit
 Dioſcorides radicem dici Silphio ſimilem, non ita denſa ſuperficie ſicuti Sil-
 phium, nam tota rara eſt. Duo eius genera Vnum mas, alterum ſæmina, quæ etiam *Genera*
 præfertur, rectos venarum diſcurſus intus habens. Mas rotundus eſt, & vndique
 eadem ſubſtantia compactus, *ἡγάρικος ὁμαλὸς οὐκ ὀψίς*, cuius videtur ſenſus eſſe ac-
 commodatior iudicio And. Lacunæ, atque vniformis vndique. Nam cum dixiſſet
 Dioſcorides, Agarico ſæminæ ineſſe quoddam venarum diſcurſus rectos, aſſignat
 poſteà diſſerentiam in maſculo, dicens ipſum eſſe rotundum, & per omnes par-
 tes ſui ſimilem, vniformem, atque eiufdem ſubſtantiæ & naturæ: id quod inter alia
ἡγάρικος ſignificare ſolet. Huic interpretationi adſtipulatur Serapio, qui ſic verit.
 Sed eſt tota eius ſubſtantia continua. Guſtus vtrique ſimilis, inirio dulcis, mox
 cum ſaliua madet (*ἔστιν ἰσχυρὰ δὲ ὀρεῖα*). Naſcitur in Agaria Sarmatiæ regione. Qui-
 dam plantæ radicem eſſe aiunt. Alij in truncis arborum ex putredine, velut fun-
 gos, naſci tradunt. Prouenit etiam in Galatia Afrix, & Cilicia, in Cedris, ſed fri-
 abile & infirmum. Galliarum glandiferæ arbores Agaricum ferunt, inquit Pli-
 nius. Eſt autem fungus candidus odoratus, antidotis ethicax, in ſummis abo-
 ribus naſcens, nocte relucens. Signum hoc eius, quo in tenebris decerpitur.
 Et alio in loco, Agaricum vt fungus naſcitur in arboribus, circa Boſphoron, *Lib. 1. c. 9.*
 colore

AGARICVS, *Math.*

*Li. purgan.
cap. 5.*

ricus. Hodie cum seplais omnibus notissimus sit Agaricus, & quoties o
 vsu tritus, tamen Dioscoridi vix notum fuisse perspicuum est, ut qui
 eum dici Silphio similem scribat, deinde hæsitans subiungat, aliis radicem et
 plantæ, aliis fungum arborum truncis innascentem quadam putredine. Agari
 igitur fungum esse certum est, qui præter arbores glandiferas nascitur, præci
 in Larice, in qua præstantissimum in Ananienibus montibus se collegisse at
 Matthiolus. Vim habet calfaciendi & adstringendi, auctore Dioscoride, et
 Temper. cem ad tormina, & ad cruditates, ruptaque, & casus. Duorum obolorum ponde
 Lib. 4. ca. re datur non febricitantibus ex vino mulso, febricitantibus ex aqua mulsa. Du
 hepaticis, asthmaticis, in morbo regio, dysentericis, nephriticis, in vitæ difficul
 tate, in vteri strangulatu, & in vitæ colore, drachmæ pondere. Tabidis autem
 cum passo, splenicis cum aceto mulso, stomachicis ita ut est manditur ac deuora
 tur sine vlla humoris sorbitione, similiter acidum ructantibus. Sistit sanguinis re
 iectiones trium obolorum pondere cum aqua sumptum. Facit ad coxendicum &
 articulorum dolores & comitalem morbum, si pari pondere cum aceto mulso
 sumatur. Ducit & menses foeminis vteri inflatione vexatis vtiliter æquale pondus
 datur. Rigorem soluit ante febrium accessiones datum. Alium putgat drachmæ
 vnius, aut duarum pondere potum cum aqua mulsa. Est lethaliū medicamen
 torum antidotum, si cum diluta vini potione drachmæ vnius pondere sumatur.
 Serpentum plagis ac moribus trium obolorum pondere cum vino potum auxi
 liatur. In summa, internis omnibus viciis conuenit pro viribus & ætate datum,
 Lib. 4. simpl. aliis cum vino, aliis cum aqua, aliis cum aceto mulso, aliis cum aqua mulsa. Galenus
 eius naturam sic declarat. Primum gustui dulcem esse, sed paulò post amarum
 apparere, & acrimonie quandam speciem temporis spatio inducere, leuiculusq;
 adstrictionis, & consistentia esse lara. Quare compositum esse ex substantia aërea,
 & terrea, à caliditate extenuata, præterea minimum habere essentia aqueæ. Hac
 ratione & digerendi vim habere, & crassitudinem incidendi, tum infarctus visc
 tum expurgandi. Ob id regio morbo laborantes sanare, eos utique qui sic ab in
 farctu

factu iecoris laborant. Iuuat & comitiali morbo obnoxios eadem facilitate. Tum rigores per circuitum recurrentes, ex crasis aut viscolis humoribus natos sanat. Iuuat & demorosos à bestiiis frigore lædentibus, aut compunctos, tum foris in affecta parte impositum, tum intus in corpus sumptum pondere drachmæ vnius cum vino diluto. Est & purgatorium. Hæc Galenus. Hodie Agarico siue simplici, siue in trochiscos coacto in purganda pituita vtimur. Nam, auctore Mesuæ, pituitam crassam, lentam, putrem, & bilem flauam & atram vacuat, à cerebro, neruis, musculis, sensuum instrumentis, spina dorsi, thorace, pulmone, ventriculo, hepate, liene, renibus, vtero, iuncturis. Ob id medicamentum familiæ à Democrito dictum est, quòd ad omnes partium internarum affectiones conferat: viscera reddit imbecilla: ob id tergentibus miscetur, ne in ea virtus eius altius penetret.

Li. purgati-
cap. 3

HIPOPHAES.

CAP. XXXI.



ENIT & iis quæ lacteum succum fundunt Hippophaës annumerandum. Frutex (inquit Dioscorides) est *φρυγανέυς*, siue surculaceus, vnde quæque densus & amplius: folia ei oblonga veluti Oleæ, angustiora tamen & teneriora inter quæ spinæ siccæ & candicantes emicant, articulatae, interstitio quodam distantes: flores Hederæ corymbos referunt, racemarin coherant, sed tamē minores mollisque, & ex albedo partim rubentes: radix crassa & mollis, succi plena, gustu amata, ex qua veluti ex Thapsia succus colligitur. Anguillara radicem refert palmum esse longam vel maiorem, & ex

HIPOPHAES, Dodon.
ex Cod. Casareo.



hac fracta aut vulnerata succum manare tenuem, lacti concolorem, gustu amarissimum, odore grauem. In maritimis, ac sabulosis, vt Dioscorides scribit, nascitur. Anguillara arenosis & maritimis locis in Peloponneso à se reptum refert. *Ἰπποφάει* Græcis, Latinis quoque Hippophaës dicitur: à Plinio lib. 22. cap. 12. (nisi corrupta vox) Hippophyes. Hippophyes, ait, in sabulosis maricimisq; nascitur, spinis albis: Hederæ modo racemosa est, candida & ex parte rubentibus acinis: radix succo mader, qui aut per se conditur, aut pistillis farinæ. Extant verò & inter nothas appellationes quædam huius nomina: vt, Hippophanes, Hippion, Echinion, Pelecinon, & Lappago, quæ tamen Aparinæ conuenit: nostra ætate ab indigenis Peloponnesi *εργασία γαβασον*, id est, Spina purgatoria vocatur. Ab Hippophaë differt Hippophæstum, quod tamen & Hippophaës aliqui (Dioscoride teste) appellant: à Plinio Hippope (nisi & hic vitium) dicitur. Spinæ fuloniz genus est, absque cauliculo, flore, aut fructu inanibus tantum capitulis, foliis paruis

spinosis, radícula molli & crassa, ex qua cum foliis & capitulis succus exprimitur. E Narbonensi Gallia, inquit Ruellius, Hippophæstum vidimus spinosis capitulis, sine flore, sine cauliculo, minutis inter aculeos foliis candicantibus. Debent (Plinio auctore) Hippophaës & Hippophæstum accommodata esse equorum naturæ, neque ex alia causâ nomen accepisse: quippe quædam animalium remediis nascuntur

nascuntur. Est verò Hippophaëis, præsertim verò radix ipsius ac succus, calidæ
sicæq; facultatis, & simul valenter purgantis. Succus syncerus radicis huius pi-
tuitam, bilem, & aquosos humores detrahit oboli pondere: cum farina verò sub-
actus quatuor obolorum. Saluberrimè autem cum aqua mulsa exhibetur.

In comitiali morbo, ut Plinius ait, utilisissimus. Frutex verò ipse sicca-

tus tunditur, tritusque cum aqua mulsa exhibetur. Extrahitur

quoq; succus è radice, foliis & capitulo Hippophæsti, qui

& ex aqua mulsa pituitam & aquam detrahit, &

præcipuè comitialibus morbis, neruo-

rum vitiis, & Orthopnææ,

ut Dioscorides tradit,

conuenit.

* * *

HISTOR



HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS-

SEPTIMVS.

(623)

In quo describuntur & ad vinum depinguntur Planta Venenata.

PAPAVER.

CAP. I.



ATHARTICA, & quantitate & qualitate malefica, graues corpori noxas inuehunt, non solum quæ deleteria, vt Thymelea, Lathyris, Euphorbiū, sed etiam quæ benigna vocitantur, nisi necessariæ conditiones obseruentur. Quare illis venenata ordine subiungenda, quæ principes corporis nostri partes, & virtutes ipsum gubernantes ita opprimunt, atque vincunt, vt necessariò mors consequatur. Vt igitur de Catharticiis plantis libro superiore, ita hoc de Venenatis agemus, quas sceleratis, & qui ad hominum perniciem

his abuti voluerint, igno rante præstiterit: probis autem, & iis qui ad hominum salutem naturæ rerum arcana scrutantur, cognitu hæ sunt necessariæ, tum vt doceant homines, ne ab iis imprudentes fallantur, aut si quando per imprudentiam harū quampiam sumpsierint, tunc quoque innoxie fiant, atque irritæ, tum vt iis succurrant, qui iam noxam sentiunt. His adde, quòd morbis quibusdam venena sunt salubria, malefica tamen vi eorum modis omnibus, vel saltem quibus nobis licet, fracta. Venenatas autem non omnes, quæ cognitæ sunt, hic persequimur. Quasdam enim, vt Taxum, Nerium, Cicutam, Coriandrum, similitudine ducti in alias classes digestimus: sed plerasque, & eas notiores, quale est Papauer, Græcis *μῆκον*, Arabibus *Thaxthax*, & *Chasca*, Gallis *Pauot*, Italis *Papauero*, Germanis *Maysomen*, Hispanis *Dormidera*. Officinæ Papaueris nomen retinuerunt: *μῆκον* quidem à *μῆ* καὶ *κον* est, id est, à non operando dicitur, quia vineti papauereo sapore sensus stupefacti, membra nihil queunt agere, vel *παρὰ τὸ μέγιστον*, à proceritate, siue longitudine. Multa sunt Dioscoridi Papaueris genera. Vnum est Papauer Rhœas, Erraticum nuncupatum, de quo in Agro diximus. Alterum satium, *μῆκον ἥμιστον*, cuius vnum genus est horrense, *μῆκον κατὰ τὴν ὁλοκίτην*, semine albo: alterum siluestre, semine nigro: tertium magis siluestre, Arabibus *Sed*. Horrense vocat Dioscorides quòd in hortis frequentissimè seratur, cætera duo siluestria, non quæ non serantur. (Nam non solum in hortis seruntur, sed etiam in campestribus, segetum & leguminum modo) sed quòd asperiora sint tum caulibus, tum capitibus, tum foliis, nec tam domestica, quam horrensia. Præterea est *μῆκον κορυμβοειδές*, id est, Papauer cornutum, siue cornicularum, Arabibus *Almacharam*, & *μῆκον ἀπρόδον*, id est, Papauer spumeum.

Nomina

Genera.

FFF

zitate libenter. Papauer satium album caulem proferre rectum, leuitem, vnicum, sed alis diuisum, ternum & quaternum cubitorum, quem folia ambiunt longa, lata, candida, Scariolæ hortensis, aut Hyoscyami nigri modo lactea, lata, tenera,

Forma

PAPAVER satium rubrum fimbriatum Dalech.




succum lacteum emittentia, qui effusus vna, aut altera die post flauescit: flores in summo caule vel candidos, vel leuiter purpureos, latius bus quaternis sepius foliis deinde rotundum, magnum & oblongum caput, in quo semen albu. Huius speciei quædam feruntur in hortis flor. speciosiore, oris cristatis & fimbriatis, capitulis etiam quæ operculo inest corolla, radiois multis, acutioribus, & dentatis, renato ambitu. Cætera superiori prorsus simili. Papauer fimbriatum, & cristatum albu, & nigrum Lobellius appellat. In calidatun & frigida regionum hortis satum maximum. Papaueris prouetus, præsertim in agris maritimis, aut statim maritimo obnoxio, quibus impendio delectatur. Est ille duplò maior, niueo candore nitens, & tantò pulchrior flos, quem horti Belgij in deliciis habent ad coronamenta: non sanè alius generis à fimbriato albo, aut nigro satius, nisi florum incisura & lacinis profundis, sætutà per elegantem sortitur, quæ multo ipsa seorsim maiores & confertiores, Rosarum dehiscendum æmula graia, visum oblectantes, ipsis Maluæ hortensis pares floribus cernuntur. Color renidet albus, aut coccineus sanguineus, aut niueo cādore & rubore confusus: interdum ora cristata ex albo purpurascunt. Seminibus me donauit maximæ & optimæ spei non minùs peritus quàm nobilis Carolus de Croy princeps de Chimay, studiosissimus, & summus stirpium admirator. Papauer satium nigrum, caule & foliis albo proximum, flores promit venustos, rubros, vel colore sanguineo saturato Præoniæ, capita rotunda in quibus semen nigrum concluditur, vnde nigrum cognominatur. Satiuū istud etiam horticultant, capitibus superiori satiuo albo tam similibus, vt non nisi è semine nigricante diffractis illis agnoscant phar macopœi ipsi qui seuerint. Eius pictura ex Dodonæi Historia stirpium hic exhibetur. Officinis Papauer nigrum magnum dicitur, indocilis Papauer rubrum à florum colore, à Lobellio Papauer spontaneum siluestre, & hortense, semine interdum albo, interdum nigro. Hic etiam appinximus Papauer nigrum satiuum, flore Maluæ hortensis, aut Præoniæ Penæ, & Lobellii, cuius seminis tutior est vñs in syrupo de Papauere, quàm Papaueris nigri spontanei,

Lib. 2. Bot.

In Apped.

PAPAVER fimbriatum, & cristatum, album, & nigrum Lobell.



PAPAVER silvestre,
sive nigrum, Dodonæi.



In Hilbor.
purgant.

de quo mox. Quæadmodum autem albi sativi,
ita huius nigri sativi differens quædam species
est, quæ florum folia multū fimbriata, & rubro
colore nitentia gerit: item capitulorum corol-
las cristatas, alioqui nec colore, nec magnitudi-
ne distat. Præterea inter superius album, inquit
Pena, & rubrum indoctis nominatum etiam
quoddam est Officinis notum, quod nulla se
discrepat, nisi parvis foraminibus patulis in lu-
perna capitis parte, vnde elabatur seminis. Papa-
uer patulū vocant Pena & Lobellius. Dodonæo
Papaver sativum tertium est, caule, foliis, corol-
lis & capitulo minus. Flos ex caruleo, ac pur-
pureo obsoleto, ac dilutū quendam intertem
refert: capitulum quoque rotundum, basi per
maturato semine foraminibus aliquot, quæ
te operculum ipsi insidet, in circuli huiusmodi
defluenti semini viam præbens: quod alioquin
bus non contingit, quorum ita clausi per
calices, ut nullum inde semen elabi possit. Ita
Dodonæus. Papaver spontaneum hinc est, &
silvestre, Pena, & Lobellij, in horis præparatum
foliis minoribus, floribus dilutū rubro colore.

soleto aspectu: capitulis triplo minoribus, numerosis: semine interdum nigro, interdum albo, quandoque hiantibus osculis, quandoque oclusis & coherens
semen, quod parum gratum & probatum habetur, præsertim nigrum. Quod
virosius reiiciendum, & sativi nigri primi semine vtendum. Ex Papavere alio

PAPAVER nigrum sativum flore
Malva hortensis, aut Pæonia, Pen. & Lob.



PAPAVER spontaneum silvestre
& hortense, Pen. & Lobell.



nigro

nigro vitroque lacryma, seu liquor gummosus, tum sponte, tum ex vulnere manat quem Græci *καὶ ἰσχὺν ὄντων*, & *ὄντων* vocarunt. Eius colligendi ratio hæc a Dioscoride traditur. Cum ros in eo exaruerit, cultello stellam circūscribere oportet, ita ut ad interna usque non perforet; lateribus capitis in directum summo cutē incidere, exeuntem lacrynam digito in concham deradere, & non multo post redire: inuenitur enim concreta, & sequenti die sicca. Oportet autem ipsam in mortario terere, & in pastillos coactam reponere. Præterea ex capitibus vna cum toliis tuis, & prælo expressis succū colligunt, quo in mortario trito pastillos effungunt. Meconium id appellatur, opio imbecillius. Quæ sic declarat Plinius. E nigro Papauere opos gignitur scapo inciso (Sic habent vulgata exemplaria, tamen capite inciso legendum videtur, ut caput incidi debeat, non scapus: sequitur enim, nec in alio genere ipsum inciditur caput, & sic habet Dioscorides) ut Diagoras suadet, cum turgescit: ut lollas, cum deflorescit, hora diei sereni, hoc est cum flos in eo exaruerit. Incidi iubent sub capite, aut calice. Nec in alio genere ipsum inciditur caput. Succus, & hic, & herba cuiuscunque, lana excipitur, aut si exiguus est vngue pollicis, ut lactucis, (Hermolaus legit, aut lactucis, legendū tamē videtur ex Dioscoro aut conchis: succū enim *Εἰς μίαν* & dera sum excipere iubet) & postero die quod magis inaruit. Papaueris verò largior, densatur, & in pastillos tritus in umbra siccat, non vi soporifera modò, verum, si copiosior hauriatur, etiā mortifera per somnum: Opion vocant. His Meconij parandi modum alium subiicit. Cum capita ipsa & folia decoquuntur, succus is Meconium vocatur, multò Opio ignauior. Nunc Papauerum vires explicanda. Papaueribus satuiis communis refrigerandi vis est, ut tradit Dioscorides. Quare folia & capita in aqua decocta fortis somnum accerfunt. Bibitur & decoctum contra vigilias. Capita trita & cum polenta cataplasmatix mixta, erysipelatis & inflammationibus profunt. Oportet autem viridia ipsa tundere, & in pastillos cōformare, siccatōs, reponere, ac vi. Capita per se etiam addimidias in aqua decocta, dein iterum cū melle dum humor densetur, crasse scātq; decocta, eclegma medicamentum efficiunt, dolorē mitigans in tuis, & fluxionibus arteriæ, & cœliacis affectionibus. Efficacius hoc medicamentū redditur adiecto Hypocistidis succo, & acacia. Papaueris nigri semen tritū cum vino bibitur cōtra fluxiones alui, & feminarū profluvia. In petuigiliis fronti ac temporibus cum aqua illinitur. Opium magis refrigerat, spissat, siccatq; & mediocri quantitate sumptum dolorem leuat, somnū conciliat, concoquit. Tuis atq; cœliacis affectibus auxiliatur. Maiori copia haustū nocet, lethargicos efficiens, & interimit. Ad dolores capitis cū rosaceo perfusum facit. Aurium doloribus cum amygdalino, myrrha & croco instillatur. In oculorum inflammationibus cū osto ouo luteo & croco. Erysipelatis & vulneribus cum aceto: podagricis cū lacte mulieris & croco, fedi pro balano subditū somnū allicit. Erasistratus auctor est Diagoram vsum eius improbare in aurium dolore, & oculorum lippitudine, eo quòd vsum hebetet, & soporem gignat. Andraxas verò ait, si non adulteraretur, excarcari eos qui ipso illinerentur. Mnesidemus vsum duntaxat eius olfactū probauit, qui ad somnum conciliandum conueniat. Quæ falsā esse experientia deprehēdit, quū ipsi effectus viriū huiusce medicamenti fidē faciant. Hæc paulò aliter Plinius refert. Diagoras & Erasistratus in totum damnauere, ut mortiferum, infundi ventantes: præterea, quoniam visui noceret. Addidit Andraxas non protinus excarcari eo, quoniam adulteraretur Alexandriæ. Sed postea vsum eius non improbat, est medicamentum nobili quod Diacodion vocant. Deinde vsum medicum Plinius præscribit his verbis. Satui albi calix ipse teritur, & è vino bibitur somni causa. Semen elephanti medetur. Et mox. Semine quoq; eius trito in pastillos, è lacte vrutur ad somnū: itē ad capitis dolores cū rosaceo. Cū hoc & aurium dolori instillatur.

Podagris illinitur cū lacte mulierū. Sic & foliis ipsis vtuntur. Item ad sacros ignes, & vū nera ex aceto. Ego tamen damnauerim collyriis addi, multoq; magis vocāt lexi pyretas, quosq; pepticas & cœliacas. Nigrum tamē cœliacis in vino datur. Satiuum omnino magis rotundat capita. At siluestri longum ac pusillū, & ad omnes effectus valentius. Decoquitur & bibitur contra vigilias, eademq; aqua fouēt ora. Galenus, satui Papaueris semen, inquit, mediocriter somnū cōciliat, visu candidum. Proinde panni ipsū inspergunt, tum melle maceratū edunt. Papauer nigrū medicamentosum est, admodum refrigerans. Aliud nigrū omnium est medicamentum, tum semine, tum caliculis, tum foliis, tum succo. Validè enim refrigerat, ad stuporem vitæ & mortē perducens: est enim ex quarto & vltimo refrigerantiū ordine. *Méxus atp' tis, v. l. p.*

PAPAVER cornutum,
Mathioli.

L. p. simpl.



L. q. ca. fl.

PAPAVERIS corniculati
species, Dodonæi.

In Hist. purgat.



Papauer nigrū medicamentosum est, admodum refrigerans. Aliud nigrū omnium est medicamentum, tum semine, tum caliculis, tum foliis, tum succo. Validè enim refrigerat, ad stuporem vitæ & mortē perducens: est enim ex quarto & vltimo refrigerantiū ordine. *Méxus atp' tis, v. l. p.* Papauer corniculatū, ab Orbasio & Aëthialiū, ab aliis Papauer siluestre, aut maritimum, pellatum, ex Dioscoridis descriptione folia habet alba, hirsuta, Verbasco similia, in floribus serrata siluestris Papaueris modo: caules breviores, florem pallidū: fructum longū, cornu modico flexum, & nigræci fructū similem, vnde etiam accepit: semen paruum, nigrum, Papauer medicem per summa terræ, crassam, nigram & scitur in maritimis & asperis. Id in maritimis Senensibus Crassetano & Orbetellano agris circa Herculis portum in Argentario promontorio, itē Adriatici maris litore non longā a nauo fonte, & Tergesto, saxoso litoris copiosissimum prouenire scribit Mathioli. atq; etiam in hortis & viciariis feri. Idem Clusius & Dodonæus corniculatū Papauer agnoscunt, quod maius est, inquit Dodonæus. Rarior quā Papauera candidis & ambitu intracorniculatis laciniolis foliis satis refert, non tamen laetior, sed nonnihil lanuginosior, instar fere foliorum Verbasci: caules infirmiores breviores, & multas alas diuiduntur: flores ochrei coloris, luteo pallent, quos excipit nō capitulū, sed tenue oblongū, incuruumq; corniculū, siue siliqua, in qua semen nigricans: radix subest lōga, crassior. Præter istud vulgare corniculatū Papauer, duo alia obseruata sunt à Clusio & Dodonæo genera. Prius folio est Eruce modo laciniato & alacris, incisio, vulgari minore & tenuiore, neque candidante, sed hirsuto: caules interdū vulgari non minores, teneriores tamē, & graciliores, procumbentes: flores etiā minores interdū intensiore colore rubent, interdū languidiore (præsertim in eo genere quod per omnia tenerius est &

PAPAVER corniculatum
alterum, Clusij.PAPAVER corniculatum
violaceum, Dodon.

est & minus) nōnunquam etiam pallido sunt colore, mediis foliis ad phœniceum
vergentibus: cornicula praelonga, quibus veluti opercula quædam insident latius-
cula, in iis semen nigrum Papauere maius, radix oblonga, candicans. Nasctur in
agro Salmannicēsi iuxta vias & agrorum margines. Floret Iunio, semen Iulio pro-
fert. In Belgio sarum nō nisi Augusto & Seprembri floret, interdum etiam serius.
Minime autem croceo succo turgēt, vt quidam putauere. Illud quod florem habet
pallidum & phœniceum in Viennensi agro sponte nascitur inter Auenas, præfer-
tim quæ secus vias sitæ sunt. Alteri folia sunt multò maiora & teneriora, eaque
minutim admodum dissecta, neq; candicantia, sed viridia: cauliculi renelli & sub-
hirsuti: flos superiori non minor, carulei ex purpureo coloris sarurari, & nigræ
Violæ æmuli, fugax admodum, & qui leuissima aura excutitur: huic succedunt cor-
nicula digiti duntaxat longitudine, plærumq; etiam breuiore, exilia, duziuscula, ri-
gidiúsque hirsuta, in quibus continetur semen exile admodum, colore ex caruleo
nigricante: radix tenuis est & inutilis. Inuenitur in multis Hispaniæ locis, sed non
nisi inter segetes, & Maio mensē floret, in Belgio multò serius, & in torum multò
minus ac tenerius. Hæc Clusius, qui istud postremum Papauer se collegisse ait in
agro Narbonensi inter Auenas prope Larera oppidum, secus flumē Ledum, à Ca-
stellanis vocari *Rosetta*, à nonnullis *Amapolas moradas*, id est, Papauer flore violaceo,
à succi mororum colore. Perperam, inquit Lobellius, corniculata Anemone ma-
ior à Pena dicitur, cuius flos minus bene expressus in Aduersariis. Corniculati Pa-
paueris radix, vt tradit Dioscorides, in aqua decocta ad dimidias, & pota, vim ha-
bet coxendicium & hepatis affectus sanandi: prodest iis qui crassa quædam aut ara-
neosa cum lotio reddunt. Seme acetabuli mensura cum aqua multa potum aluum
leniter purgat. Flores & folia cum oleo imposita crustas emarginant: pecoribus
illita argemia & nubecula repurgant. Postremus est *papauer àppasiles*, Papaner spu-
meum, aliis Heracleum, vt iam diximus, non perinde vt cætera notum. Caule est
dodrantal, vt describit Diosco. foliis admodum paruis, herbæ Lanariæ similibus,

Vires &
Temper.

Papauer
ipsum com.
Lib. 4. c. 65.
Forma.

Vires.

Lib. 7. sim.

fructu circa ipsa albo, sed & tota herba alba est, & spumosa, radice alba, per suam
 terræ hærente. Huius fructus colligitur ætate cum plenè maturuit, & siccatu de-
 cidit. Purgat per vomitus, si acetabuli mensura cum aqua mulsâ bibatur: quæ pur-
 gatio priuatim comitialibus prodest. Eadem sic breuiter tradit Galenus. Papauer
 cornutum vim habet incidendi & abstergerendi. Itaque radix herbæ in aqua deco-
 cta ad dimidias hepaticos affectus adiuuat. Porro folia & flores sordida admo-
 dum & contumacia vlcera iuuant, sed ea reicere oportet vereribus iam repug-
 natis. Nam tam validè abstergunr, vt puras carnes colliquant. Hoc virium robore
 non sordem duntaxat, sed & crustam vlceribus detrahit. Papauer Heracleum se-
 non habet pituitam expurgans. Opio aut meconio largius epoto consequitur ve-
 rernus cum perfictione & pruritu vehementi: itaque sæpe inualecente veneno,
 tanta ei accipit prurigo, vt hominem excitet. Corpus id medicamentum oleo. Re-
 medio sunt post citatam oleo vomitionem acres clysteres, acerrimumque melle-
 cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido. Merum cum absinthio aut ciu-
 mo copiosum, aut calidum per se acetum. Alia plura remedia tradunt Dioscorides
 & Auicenna. Corniculatum Papauer cibo & potu eadem inferre consuevit q-
 opium, nec aliis expugnatur remediis.

ANEMONE.

CAP. II.

*Hæc duas Anemones figuras, quas Pena diligentia nos debemus, propter floris similitudi-
 nem, qualu ferè in Papauere spectatur, Papaueru generibus adscribimus, quoniam
 suus locus esset inter Anemonas alibi descriptas & particulatim explicatas.*



OTISSIMAE verò apud Narbonenses duæ primo intuitu Pa-
 Rheadis florem ostentant, in cultis præsertim, quarum maior
 habet etiam Coriandri diuisura, sed Papaueris Rheadis mod-
 fura, in caule pedali & sesquipedali: flores vero ex rubro in pur-

ANEMONE maior

Pena corniculata.



ANEMONE minor,

Pena.



reum

reum violaceum deficiunt, quos perquam tenellos Papaueris Rhœadis ritu vel lenissimus auræ appulsus celeriter aufert, remanente rereti hirsuto longiore corniculo, cornuti Papaueris non dissimili, sed minore & graciliore: quasi natura alludere voluisset isto descripto ad Papaueris cornuti siliquas, & altero ad Argemonæ glomerata capirula, in acutum fastigiata, non operculo inunita, ut Papauera omnia sunt. Minor autem delicatior caule non dissimili, minoriore folio & diuisura quàm Coriandri, valde quàm hirsutis & satis rigidis, hirsuta capirula, flore eleganti relinquente multò minora quadantenus similia Rhœadis Papaueris: semine nigro Hyoscyami: radice pusilla, superiori haud dispari, quibus si tuberculum adesset nullæ notæ deessent: ac si non sint Anemones, sanè vix sint vllæ propiores aut illis, aut Argemonæ, aut non hæ putandæ sint, vel suspicandum capite de Anemone duo genera descripsisse Dioscoridem. Quorum vnum iadice sit tuberosa, alterum no dissimili Rhœadis quod videntur inuenire verba in isto, deinde confirmare, vbi discrimen ponit Papaueris, Argemonæ & Anemones, huius tuberculi nulla interim facta mentione, cum tamen maximè oportuit: quare fortè idem illi cōtingit, quod Drabæ radici, quæ alicubi tuberosa, alibi plana & æqualis visitur. Idcirco à Monspeliaceis Medicis veræ putantur, frequentisque inibi oriuntur in vinetis ac veruactis, præsertim iuxta prædium Præceptoris & harum seduli vestigatoris D. Asfarj, qui cum aliis multis opinabatur illam Germanicam & recentiorē Anemonem, stellaris luteis Ranunculi floribus & semine, radice multis bulbulis ruberosis Bulbocastani donatâ, speciē esse bulbosum Batrachij: nā tametsi eiusdem flores interdū albidis aut purpureis sint, tamen nihil semē habet tota quod quadantenus præferat Papauer Rhœas: sunt enim folia Geracij columbini aut Ranunculi, cuius vrentem faculratem itidem habet: quapropter illic nos referendum duxissemus, nisi à Galeno memorata Anemone luteo flore nos suspensos sententiæ de hac planta magis quàm certos retinuisset.

An Gal.
Anemone
lutea ubi
narrat viret
eodem ut
Germani-
ca.

HYPECOM.

CAP. III.



VOB Græci *ὑπεκοῦν* & *ὑπέρκοον*, Latini quoque Hypecoum dicunt. Nasçitur, inquit Dioscorides, in segetibus & aruis. Foliū habet Rutæ simile, ramos paruos. Vim habet respondentem Papaueris succo. Plinius eadem planè tradit. Hypecoum in segetibus nascitur, foliis Rutæ. Natura eius eadem quæ Papaueris succo. Galenus Hypecoum vim habere refrigerandi scribit, & ex tertio esse refrigerantium ordine, ut parum absit a Papauere. Herba hæc paucis aut nullis herbariis nota est. Eam tamen quæ hic picta est pro genuino Hypecoo Matthio⁹ proposuit. In aruis prouenit, foliis Rutæ paulò maioribus, caulibus exiguis, mollibus, hirsutis, in quibus sunt flores, in luteum pallescentes, etsi prope calicem purpurei spectentur, in quorum medio flocculus erumpit, colore aurum æmulans, visu iucundus. Floribus succedunt capitula renui inuolucro contexta, in quibus semen concluditur nigrum, asperum, Pseudomelan-
thio

thio proximum. At folia Rutæ huic esse dicto *falsum* esse demonstrat. Præterea viribus opij prædium non esse gustus docet: nam gustanti potus insipidum quiddam & ignavum linguæ relinquit, ab opij amarore horrido prorsus alienum. Qui explorarint gustu, humidum tantum & calidum secundo ordine facili dicent. Hæc fortasse altera est Argemone Tragi. Est Alcea peregrina Penz & Lobelij, descripta in Horto cap. de Alcea.

HYOSCYAMVS.

CAP. IIII.

Nomina

GRÆCIS *ἡνιοκόμος*, Latinis Hyoscyamus, Apollinaris, Arabibus, *ἡνιοκόμος*, quo teste, Altorcum, siue Altercangenum dicitur, Arabibus *Mei Bengi*, O ficinis corrupta voce *Iusquiamus*, Gallis *Iusquiamus* & *Hambani*, Germanis *Bilsam* & *ant*, & simpliciter *Bifen*, Italis *Iusquiamo*, & *Ispanis* *Leuismo*. Hyoscyamum autem, id est, fabam porcinam Græci videntur appellasse, quod Auliano auctore pasta huius herbæ conuellantur siue aprie, senti inorte periculo, nisi copiosa aqua statim se foris & inus proluant: tades aquas, non ut proluant se tantum, verumetiam ut caneros venienter nacli protinus sanitati restituantur. Apollinarem vero Latini ab Apolline cinz inuentore dixerunt, vel quia opplet cerebrum viroso ac fetido hab que metens percellit, quasi Apollinis æstro: Altercum autem ab altercando bonio teste, quia cum verborum altercatione rixaque se torquent Hyoscyamentati. Tres Hyoscyami differentias assignat Dioscorides. Vna flores lenti purpureos, folia Smilaci similia, semen nigrum, cytinos duos ac spinosos. Altera flores luteos, folia & siliquas simpliciores, vulgari codices habent *απλῆς*, & *Οριβαλίας* *απλῆς*, id est, teneriores, siveu sublauium velut Irio. Tertia cinz, tenera, lanuginosa, flores albos & semen album pignat. Nascitur in maribus & rudibus. Plinius quatuor recenset genera, cum secundum & quartum vnum & idē sit. Herculi eam quoq; adscribunt, quæ Apollinaris, apud Arabas Altercum

Lib. 4. c. 64.
Genera.

Lib. 4. c. 64.

HYOSCYAMVS, Martii.

Lib. 4. c. 64.

Forma.



sive Alterchigenum, apud Græcos vero Hyoscyamus appellatur. Plura eius genera. Vnum nigro semine, floribus pene purpureis, sive sum. Talis nascitur in Galaria. Vulgus a cãdidius est & fruticosius, altius Papauer. Tertij semen Icionis semini simile: & omnia niam gignunt, capicisq; vertigines. Quartus genus mole, lanuginosum, pinguius cãdidi seminis, in maritimis nascens. Hyoscyamus, ut describit Dioscorides, frutex est, emittens crassos, folia lata, oblonga, nigra, hirsuta: per caulem deinceps floris prodeunt veluti mali Punici cytini, clypeolis semine, ut Papaueris plenis. Quod floribus tribuitur, id seminis conceptaculo tribuendū videtur: hoc enim scutulis contegitur, & semine intus continet, non autem flores. Serapion de fructibus scribens, quod hoc de floribus, his verbis. Et super ramos eius lateribus est fructus similis balaustræ in figura sortitus super ramos ipsos æquedistantes per ordinem, super quem fructum est operculum simile

simile scuto, & ipse fructus est per ordinem, plenus semine simili semini Papaue-
ris. Niger familiarissimus calidis & frigidis regionibus, vbiuis in Europa gigni-
tur secus vias, locis sabulosis & incultis. Folia proferit ampla, longa, lata, cinerea,
mollia & flaccida, lanuginosa, laciniata & marginibus altius incisâ, crassa, succu-

HYOSCYAMVS albus,
Mattholi.



HYOSCYAMVS niger,
Matth. Luteus, Dodon.



lentæ: caules crassos, cubitales & bicubitales, ra-
mosos, quos flores continua serie digesti ve-
stiunt, patentibus calathis similes, colore per
margines subluteo, discurrentibus vna purpu-
rascentibus aliquot venis, in medio verò ex ob-
scuriore purpura nigricâtes, quibus calices suc-
cedunt rotundi, oblongi, crassi, ventricosi, su-
perius operculati, & aculeati, in quibus semina
haud ita magna, colore pullo: radix crassa, pro-
lixa albicat, erutu facilis, & ad anodyna mul-
tùm utilis, inius scetens & obnoxia putredini,
quàm reliqua planta, quæ grauis odoris est, ca-
put grauens & somnolentiam inducens. Hunc
Dodonæi, Penæ, Lobellij Hyoscyamû nigrû ex
Matthio. pictû damus, qui Hyoscyamum sim-
pliciter vocat. Candidus rarior est: quare in
hortis Gallix & Belgij feritur & colitur. Is ta-
men in maritimis ruderibus asperis provenit
Narbonensis Gallix, præsertim vbi Rhodanus
in mare influit. Eadem propemodùm facie est
& magnitudine qua niger: sed eius folia latio-
ra sunt, rotundiora, molliora, hirsutiora, non-
nihil quoque circumtosa ac sinuata, quamuis
minus: cauliculi breviores: flores per caulicu-
los & in summitate candidi, iniores, radices
laues: calyces non spinosi: semen candidius.
Hunc etiam scitè pictum dedit Matthiolus. Is
nouam quandam plantâ inter Hyoscyami ge-
nera à quibusdam numerari scribit, quæ caules
edit sesquicubitales, rotundos, tenui obductos
lanugine, ramosos: folia ampla, pingua, tenui
pilo reſerta, mollia, Solani somniferi speciem
quandam referentia, odore graui: flores luteos
Hyoscyami æmulos, è quibus capitula subro-
tunda oriuntur, qui quandam Hyoscyami spe-
ciem præferunt: nam & similibus ferè scutu-
lis concluduntur, coronato vndique orificio,
& semine intus subflauo. Radice nititur alba,
spithamæ longitudine, & digiti crassitudine,
numerosis fibris. Hyoscyamum nigrum vocat,
Dodonæus luteum, cuius caulis simplicior, in-
quit, folia indiuisa, minora, lata tamen & oblon-
ga, Solani lethalis, maiora, candidiora, ac mol-
liora: flores in cauliculorum fastigijs inconti-
ti luteo pallentes colore, aliquantè minores
quàm nigri, vascula ferè similia, sed minora, te-
neriora,

HYOSCYAMVS III.

Matthioli.

Hist. pae-
gant.HYOSCYAMVS Peregrinus,
Dalechampi.Li. 4. c. 64.
Vires &
Temper.

neriora, & spinis carentia, semen pollidum
flauum, vt Itronis pusillum. Dubium
mum Pena & Lobellius appellant. Quam
plantam istam minime ad Hyoscyami
referendam esse cenfeo, cum vtriusque
tates ex diametro pugnent: huius enim
est acce, folia acria admodum, & in
rem ori diu inurentia, qui non nisi
pore extingui possit, id quod caliditatem
ignem testatur. Ad Nicotianam progre
dit, de qua in Peregrinis. Quare p
Dodonæo Hyoscyamum Peruvia
lati puto, nec eius generibus recte
quod in eius foliis insignis acrimonia
hendatur, qua digerunt, resoluunt,
experientia compertum mihi est. Ea
lidæ naturæ, non stupefacientis acrimonia
sunt opera, qualis est Hyoscyami. Pl
aliam hic depictam Herbarij quidam a
scyami, alij ad Solani species referunt. H
ra est, & foliorum & fructus figura
vmbrosis & densis Apennini silua
foliis oblongis, per ambitum sinuosi
ternis ferè simul ex interualis per cau
deuntibus, teretem, digiti crassitudi
cubitalem: fructu in caulium vertice
exiguo malo simili, pruni magnitudi
belcente, semine pleno. Vires & eius
huc incogni præteritosimæ ac ele
picturæ genere (illuminatione vocatur
res nostri (in vetusti codicis manuscrip
branis, quæ multarum stupium ita p
imagines ostendunt, hæc herba proponit
diùs expressa nomine tituloq; Apollina
describit ita dictam notat ab Apolloni
sopho, qui eam Platoni monstrat, eam
cis vocari Strygnion Malchion (Strychnon Ma
nicon) & Dorigion (Doricnion.) Hyoscyamus
semine nigro, & is qui semine est subflauo, an
ctore Dioscoride, insaniam inducunt, caput sa
pore percillant, & noxi sunt. Albus ad me
cum vsus vtilior: si verò desit, vtendum
flauo. Niger pessimus improbandus. Exprimi
tur succus ex tenero semine (addit vetus codex
τὸ λευκόν, id est, albi Hyoscyami solus, cau
búsque, in quem vsus tunduntur omnia, ex

pressusque in sole siccat. Vfus eius ad annum vsque: facile enim putrescit. Ex
primitur priuatim etiam succus ex arido semine calida aqua perfuso, tuso & ex
presso. Est verò succus hic antedicto præstantior, & magis dolores finit. Hæc
autem virens contusa, & trimestris tritici farinæ mixta in pastillos conformatur,
& per os

& reconditur. (In antiquo legitur, ἡ δὲ χλωρὰ καὶ πικρὰ καὶ μετὰ σπασμὸν ἀδύρω, ἡ πικρὰν. Id est, Herba viridis tufa, & iuxta farinæ Sefamī aut Rutæ.) Prior succi expressio, & quod à secco semine exprimitur, collyriis dolorem lenientibus commodè miscetur, & contra acres calidæque fluxiones, dolores aurium & vulvæ vitia: cum farina autem & polenta, contra oculorum, pedum, aliaque inflammationes. Semen eadem potest. Facit ad tussim, destillationem, oculorum fluxionem, vehementes dolores, muliebria profluvia, aliâque sanguinis eruptiones, oboli pondere cum Papaveris semine & aqua mulsâ potum. Confert podagris, testibus inflatis, mannisque à partu turgentibus, si tritum cum vino illinatur. Miscetur vtiliter & aliis cataplasmatibus dolorem leuantibus. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus per se, & cum polenta mixta vtiliter illinuntur. Recentia ad mitigandos omnes dolores illinuntur. Tria aut quatuor cum vino pota, hepáticas febres sanant. Decocta olerum modo, & heminæ mensura comesta, mediocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si in colo vlcus habenti quis per clysterem infundat. Radice in aceto decocta dentes in dolore colluuntur. Plinius eadē Lib. 35. c. 4. sere tradit. Hoc (quartum genus) recepere medici: item rui seminis. Nonnunquam ante candidum rufescit, si non ematurus, improbatūque. Et alioqui nullum, nisi cum inaruit, legitur. Natura vini (mendose, legendum enim, Natura veneni, ut sequentia declarant) ideoque mētem caputque infestans. Vfus seminis & per se, & succo expresso. Exprimitur separatim, & cū caulibus sō iisq; vtiūtur & radice, temeraria in totum (ut arbitror) medicina. Quippe etiam foliis constat mentem corrumpi, si plura quā quatuor bibantur. Etiam antiqui in vino febrem depelli arbitrabantur. Et oleum fit ex semine, ut diximus, quod ipsum auribus infusum tentat mentem. Et alius in locis. Hyoscyamus contra canum morsus valet, & in vulnera cum melle imponitur. Contusum cum foliis ex vino datur peculiariter contra aspidas. Eius succus sanguinem excreantibus medetur. Nidor quoque accensi tussientibus. Breuius sic Galenus. Hyoscyamus, cui semen Lib. 1. sim. arum est, insaniam ac saporem adifert: is cui semen mediocriter flavum est, propinquam ei facultatem habet. Verū virique fugiendi sunt, ut inutiles ac deleteri. Cæterum cuius semen ac flos candidus est, ad sanationes maximè idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium. Hyoscyami eponi noxæ auxiliatur aqua mulsâ copiose data auctore Dioscoride, lacque, præsertim asininum: si Lib. 6. c. 11. deficiat, caprillū, vel bubulum, vel aridarum ficuum decoctum. Faciunt etiam ad id nuclei pinei: item Vrticæ semen, Intubus erraticus, sinapi, nasturtiū, cæpa, allium, & hæc singula cum vino sumuntur. Postea sinendi quiescere, quemadmodum qui vinum biberunt ut excoquant.

SOLANVM.

CAP. V.

DE Solanis, quæ in hortis vel circa hortos crescunt, in Horto tractauimus, nunc de veenatis. Primum de somnifico siue soporifero, quod etiam Halicacabum nonnulli appellant, inquit Dioscorides. Fruticat id ramis inulhis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum Coroneæ mali similiū pleniflore grandi, rubro: fructu ac folliculis crocato: radice magna, subrubro cortice vestita. Nascitur in saxis non procul a mari. Has omnes notas in plantam hic pictam competere Matthioli putat, ideoque legitimum esse le Solanum somnificum Dioscoridis asserere non dubitat. Numerosis enim ramis fruticat, inquit, densis, surculosis, fractu contumacibus, foliis multis, subpinguibus, Coroneæ mali haud absimilibus, floribus subrubentibus, caules per interualla verticilli modo amplectentibus: fructu crocato, Ggg

Nomina

Lib. 4. c. 61.

Forma.

baciz figura in folliculis hirsutis concluso. Radix subest longa, vegetaque, brachia
li quandoque crassitudine, cortice subrubente circumvestita. Nascitur in mari-
mo tractu, locis plerumque saxosis. Hanc plantam etiam Clusius nomine Solani
somniaferi descripsit, Lobellius eodem nomine pinxit. Aliam tamen Solani som-

SOLANVM Somnificum,
Matthioli.



SOLANVM Somnificum
alterum, Matthioli.



L. b. p. hist.
pap. 11.

nifici speciem Matthioli proposuit, hic quoque expressam. foliis an-
gustis, venosis, in terram inclinatis, caule anguloso, floribus tintinnabuli simi-
bus purpurascentibus, in ambitu denticulatis, & è longo prodeuntibus petalo, ex
bus baccae prodeunt nigrae, aut ex nigro purpurascentes, vinosae, minuto tem-
peratae, quemadmodum & reliquorum Solanorum acini. Haec viridi quodam
lice ad medium usque ferè conteguntur, cuius ambitus coronae figuram re-
solvit. Radicem habet grandem, strumolam, teneram, albicantem. Maio mensi
Junio fructum fert. Nascitur in agro Goritienfi Saluatino monte inter laxa. Theo-
phrastus in descriptione Solani somnifici nonnihil à Dioscoride dilidet,
scribit. ὁ μὲν ὑπὸ τοῖς στυγχοῖς ἐρωθρα. ἔχει τὴν ῥίζαν ὡς περ αἰμα, ἔσθραται, καὶ
καὶ, καὶ ἔσθραται ἐρυθρότεροι κόκκοι. φύλλον δὲ τριγυμάλῳ ὅμοιον, ἢ μάλιστα τῷ γλαυκῷ,
ἀλλο διαστῶ, καὶ περὶ τὴν μέγαν. Legendum, καὶ σπιγῶσι μέγαν. Sic Gaza legit, vt
ἀνθρακίται, quae legitur in vulgaribus codicibus post ἔσθραται, irreptitia sit & de-
lenda, vel superioribus addenda hoc modo, τὴν ῥίζαν ἀνθρακίται, vel ἔσθραται, &
atque ita conuertit. Vesicariae genus somnificum radice rubra sanguinis modo
sed cādidam siccescit, fructu rubriore quàm coccus folio Tithymalo simili
malo dulci, sed pi'oso. Verum pro κόκκω, etiam κρόκω legi posset, & pro γλαυκῷ
γλαυκῷ μέγαν καὶ λευκῷ. Scribit enim Dioscorides huius Solani ἔσθραται ἐν κόκκῳ
καὶ σπῆλαι, id est, fructum esse in siliquis crocatum, & φύλλον μίσητον μέγαν καὶ λευκῷ
est, folia malo Cotoneae similia. Quare Theophrastus locus fortasse hoc modo
uertendus foret. Solanum somniferum radicem habet rubram cum effoditur
guinis modo, cum inarescit, cādidam: fructum magis rubrum, croci instar, vel
briori

briorē croco : solum Tithymalo simile aut malo Cononæ, sed densum, & palini magnitudine. Quæ postrema Gaza omittit. Plantam, quam Herbariorum vulgus Solatrum maius nominat, Officinæ Solatrum mortale, quidam Solanum lethale, Galli *Solane mortel*, Germani *Dolkraut* & *Senkraut*, Veneti vulgo *Herba Belladonna*, Fuchsius & nonnulli cum secus Solanum somnificum Dioscoridis esse putant. Qua de re hæc est Fuchsij sententia. Eam quidem plantam Solanum esse somni-

Cap. 104.
Hilior.

SOLANVM Somnificum, Fuchsy.



cum, quibuldam non sine magno errore Solanum esse credentibus hortense quod lushus plurimum confert, & eas a lethalibus morbis conseruat ac tuetur. De quo non laborandum, sed quid in homine possit considerandum, cum constet pleraque animantibus cæteris esse cibum, quæ homini venenum sunt. Experientia vero compertum fuisse ait geminos pueros statim ex esu acinorū huius Solani mortuos esse. Quod siquē facere potest somniferum esse, præsertim cum tota ferē descriptio illi conueniat, hoc dempto, quod semen non habet in siliquis croceum. Hortensis autem Solani notæ multæ illi non conueniunt: neque enim exilis est frutex, sed propemodum arborescens, neq; florem candidum habet, sed spadicem: fructu verò & floribus ad Solani furiosi historia accedere videtur, vt suspicio sit horum duorum generum historias esse confusas. Quam quidem auget Theophrastus, qui in eorundem descriptione non nihil à Dioscoride variat. Quicquid sit, certum est Solani esse speciem, quod forma foliorum satis docet, atque huius vehementem refri-

gerandi vim, maxime si paulò copiosius sumatur, inesse, vt hoc nomine pro Solano somnifero eius vsus medicus nullo periculo esse queat. Quod si tamen hæc nonnullis haud lausfecerint, inquit Fuchsius, certè necesse est Mandragoræ speciem fateantur esse tertiam, quam pingit Theophrastus. Hæc ferē Fuchsius, à quo dissentit Matthiolus, nec hanc plantam Solanum somnificum Dioscoridis esse putat, quia fructum non fert in folliculis crocatum, quamuis eius bæccæ largius sumptæ interimant, & viribus usdem quibus Solanum somniferum polleant, facie tamen maxime à sese distant. Eadem prætereà vlla Mandragoræ specie cōprehendi posse negat, vt capite de Mandragora fusiùs ostendimus. Quare eam Solani quintam speciem esse antiquis incognitam putat Matthiolus. Eandem Dodonæus nec Solanum manicum, nec Solanum somniferum Dioscoridis, nec Mandragoram morion eiusdem esse arbitrat, sed potiùs Mandragoram Theophrasti. Genserus Solani genus siluaticum, Germanis *Schaffbeere*, & *Dolwurtz* dictum, Italici *Belladonna*, sponte in Germania, circa siluas, alibiq; locis incultis abundare scitib; bæccas aut potiùs poma cerasorum instar coloris cæruleo nigricantis ferens, radiceq; crassâ esse, viuaci proculdubio in hortis futura. Sed ne pueri fructus sua specie inuitantes deuorent vitæ periculo, vt in alijs Solanis, ita in hoc præcipuè cauendum. Quidā, inquit, mortale cognominant. Aliqui Morion esse suspiciantur, vel potiùs Mandragoram Theophrasti. Ab hoc siluatico Solano non aliud esse opinatur Solanum somniferum. Tandem hoc adjicit, sūm hoc Solanum legitimi quidem, sicut & Mandragoræ, omnibus suis partibus succedaneum esse posse. Cordus Solanum somni-

Lib. 3. hist.
cap. 90.

ferum hodie ignotari scribit. Id tamen certum esse plātā, quam ipse Amarodulcem, Germani *selenger uheber* appellant, huic valde cognatam esse: foliis enim, florum forma, fructu & viribus quas in seipso expertum esse ait) Solanum ferre. De hac egimus in lib. de iis quæ in vicina scandunt. Sed ad Solanum somniferū Fuch-

Forma
Hederæ Bel-
lendonæ de-
clat.

Forma So-
lani mani-
feri Diosco-
lib. 4. cap. 9.

Locu.

Lib. 9. hist.
cap. 16.

Lib. 4. c. 63.
Vires Soda-
somniaferi.

Lib. 8. Gen.

uis provenit, foliis hortensi Solano maioribus, caudice bicubitali tricubitalique, interdum maiore, subrutilo colore, numerosis ramis, alis multis concavis, in quibus flores oriuntur, longi, Luræ digitalis floribus proximi, ex lōgo pediculo penduli, Campanulæ instar cōcani, colore ex pallido purpurascēte, capillaceis intus staminibus. His flaccescentibus baccæ suboriuntur, singulæ ex suis pediculis pendentes, insecto brevique, caliculo comprehensæ. Maturescētes nigricant, acini vix magnitudine, pellucida exterius cute, vinoso succo refertæ, & numeroso munitæ que semine. Radicem fundit longam, crassam, albicantem, succi plenam. Solanum manicum, siue furiosum, solum habet Eruce simile, maius aliquot, satis ad Acnethi folium accedens: caules a radice proceros emittit decem aut duodecim, vix longitudine adolecentes, caput in cacumine oliuæ figura, sed vt Plantam pelu hirsutius, verum minus latius: flore nigrum. Postquam eo exiit, racemus ex rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus Hederæ corym, vt vix mollibus. Radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. Gignitur in montibus vêtō persiliat & platanetis. Id Solanū se non vidisse fateatur Martholus & ceteris Herbariis fortasse ignotum est. De hoc sic Theophrastus. *Ὁ δὲ μα-
νιχὸς ἔχει τὴν ρίζαν καὶ μορφὴν ὡς τῆς ἐρύχου, καὶ καλὴν. Id est, Solanum mani-
ferum radicem habet candidam, cubitalem, cauam. Et paulo post. ἔχει τὸ πρὸς τὸν φάλλον
ὡς τὸ ἐρύχου, καλὴν ὡς τὴν ἑρπύλλαν ὡς πρὸς τὴν ἐρύχου, κεφαλὴν δὲ ὡς πρὸς τὴν γοφὴν, μείζων δὲ τῇ
παχυτέρῃ, ὡς τὸν δὲ πλατύνει καὶ πρὸς τὴν. Id est, folium habet Eruce simile, sed maius, cau-
lem quatuor fere cubitos longum, caput Gethyi, maius tamen atq; crassius si-
cut autem est Plantam fructui. Quæ si quis cum Dioscoride conferat, ferè eandē
huius Solani historiam compertiet, nisi quod Dioscorides habet, τὴν κεφαλὴν ὡς τὴν
μύρτιν ὡς πρὸς τὴν ἐρύχου, διαστῆναι δὲ ὡς τὴν πλατύνει σφαίραν, μείζονα δὲ καὶ πλατυτέραν. Id est, caput
in cacumine Oliuæ figura, sed vt Platanī pilulæ hirsutius, verum maius latius. Ex
quibus intelligere licet in Theophrasto pro παχυτέρῃ legēdum esse διαστῆναι,
cut & Gaza legit, qui pilosius interpretatus est, vel πλατυτέραν, id est, Ianus. Solan-
manicū copiose in Ægypto nasci tradit Cordus, vnde ad nos adferuntur eius
cūctus, quos pharmacopolæ *Cuculos de Leuante*, Galli *Coques de Leuant*, id est, Solan-
Orientalē vocant. Nam Cuculus, inquit, idem est quod Cucubalus, id est, Solan-
Leuante verò Itali Orientem appellant. Antequam ad nos perferantur hi Cuculi
omnino exsiccantur nuclei interiores, & succosa caro quæ corticem ambit. Pices
quani primū eos deglutierint, vertigine corripiuntur, & supini aquis inuati,
ita vt faciliè manibus apprehendi possint. Aliis Cucuti siue Coccati Orientis
cum Solani huius historia conuenire non videntur. De horum Solanorum facul-
tanbus nunc dicamus, primū ex Dioscoride. Solani somniferi radicis cortex in
vino drachmæ pondere potus somnificam vim habet, opio mihiorem. Semen ve-
hementer vrinam ciet. Corymbi duodecim hydropicis dantur. Si quid nume-
ra adiciunt, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua multa copiosa potu da-
ta. Succus (vel, vt alij legunt, φλας, id est, cortex) pastillis inseritur, & medicamentis
quæ doloris leuamētum præbent: decoctum in vino, si in ore contineatur, dentium
doloribus auxiliatur. Radicis succus cum melle illitus, oculorum hebetudines tol-
lit. Eadē tradit Galenus. Solani somnifici cortex radicis, si cū vino bibatur drach-
mæ pōdere, somnū accersit, sed & ad cetera quoq; Papaueris succo persimilis est,
nisi quod eousq; imbecillior est, vt ipse sit tertij ordinis refrigerantiū, cū hic in
quarto*

quarto sit constitutus. Huius semen vrinam ciendi vim habet, verum si plus duodecim baccis hauseris, dementiam adferet. Plinius valentiorum refrigerandi vim huic tribuit, cum ait. Quin & alterum genus, quod Halicacabum vocat (Legendum ex Dioscoride, Quin alterum genus, quod & Halicacabum vocat) soporiterum est, atque etiam opio velocius ad mortem. Dioscorides dixit soporiferam vim habere opio mitiorem. Laudatum verò à Diocle & Euenore, à Timarchide etià carmine, mira obliuione innocentia (Lege, mira obliuionis innocentia, nempe quam adfert citra perniciem) quippe præsentaneum remedium ad dentium mobiles firmandos (Dioscorides dixit tantum ad dentium dolores valere) si colluantur. Halicacabo vni exceptionem addidere, ne diutius id fieret, delirationem enim gigni eo. Nec demonstranda remedia, quorum medicina maioris mali periculum adferat. Et paulò post. Halicacabi radicem bibunt qui sunt vaticinandi callentes, quia furere ad confirmandas superstitiones aspici se volunt. Remedio est, id enim liben-
 cius retulerim, aqua copiosa mulsâ, ca'ida potui data. De Manici radice id non tradit Dioscorides, ut dicitur. Theophrastus etiam scribit corticem radicis huius Solani tusam & in vino maceratam, atque potam somnum inducere. Solani somnifici Fuchsi, quam quintam Solani speciem esse Matthiolus arbitratur, baccæ deuoratae homines in veterum inducunt, & in furorem agunt. Aiunt Empirici quidam aquam è tota planta destillatam, duorum aut summum trium cochleariorum mensura haustam, internas viscerum inflammationes extinguere, nullo corporis incommodo: sed à largiore potu abstinendum. Ad erysipelata & alios calidos affectus confert. Contusa folia oculorum palpebrarumque phlegmonas leniunt. Sic-
 cæ radicis miram vim prædicat Matthiolus. Eius enim drachma crassiusculè trita, si in vino horis septem maceretur, & percolatum id vinum ieiunus quis hauserit, à cibo prorsus abstinebit, nec vllum vnquam carpere poterit, quoad acetum potauerit: hoc enim vnicum esse mali remedium. Solani furiosi radix, ut scribit Dioscorides, drachmæ vnus pondere pota ex viuo, facit species vanas, imaginationesque non iniucundas obuersari. Sed duplicatus hic modus ad tres vsque dies mentis alienatione adfert, quadruplicatus interimit. Remedio est aqua mulsâ copiosius pota, & vomitione reiecta. De eodem Galenus, Solanum furiosum, inquit, ad medicationes quæ intrò in corpus adhibentur inutile est. Nam si quatuor eius drachmæ sumptæ sint, mortem adferent, si pauciores insaniam. Vna certe innoxie sumitur: cæterum nec ipsa vile quid obtinet. Verum si foris emplastri modo corpori illinatur, vlcera maligna & depascentia curat. Sed ad talia radicis cortex optimus est, desiccans secundo ordine iam completo, & tertio incipiente, refrigerans verò secundo incipiente. Plinius hæc de eodem prodidit. Tertio folia sunt Ocimi (ὀκίμιν Dioscorides, id est, eruca, ut iam annotauimus) minime diligenter demonstranda, remedia non venena trahanti: quippe insaniam facit paruo quoque succo (Dioscorides tradit id radice fieri) Quamquam & Græci auctores in iocum ventere: drachmæ enim pondete lulum pudoris gigni dixerunt, species vanas, imaginésque conspicuas obuersari demonstrantes: duplicatum hunc modum insaniam facere. Quicquid verò adiciatur pondeti, repræsentari mortem. Hoc est venenum, quod innocentissimi auctores simpliciter Dorycnium appellauere, ab eo quòd cuspides in præliis tingerentur illo, passim nascente. Qui parcius spectauerant, Manicū cognominauere. Qui nequiter occultabant. Erythron aut Neurida, ut nonnulli Perisson, ne cauendi quidem causa curiosius dicendum. Sed Plinii locum sicut in vulgatis exemplaribus legitur, emendabit & Dioscoridem illustrabit Theophrastus, ex quo vterque quæ de Solano dixit, mutuatus est. Ὁ δὲ μα-
 νακιστὸς φρύχων, inquit, οἱ μὲν θύρον καὶ ἀλυσσὴν αὐλῶν, αἱ δὲ περὶ τὸν (Dioscorides habet θύρον & πύρριν) λαλῶσιν δὲ ἔχουσιν τὴν ρίζαν καὶ μακρὰν ὡς πύχυν, καὶ κοιλὴν. Λιθόσται δὲ αὐτῆς, ἵαν

Lib. II. c. 4.

Vires Solani manici. Lib. II. c. 69.

Lib. II. c. 69.

giditas valde efficax. Quam obrè modicū quidē soporem conciliat, largiū verò
 sumprū interimit. Herbarij diuersas plantas Doryeniū esse diuinarunt, à quibus
 multū abest hic depictū, quod Mōspelienses docti Herbarij pro Doryenio habēt.
 Gignitur hic frutex in asperis, saxosis, & editis locis non procul a mari, caulibus
 multis ex vna radice crassa, lignosa, multifida prodeuntibus, cubitalibus, nonnun-
 quam alnionibus, flexilibus & lentis Sparti modofoliis paruis, oblongis, angustis,
 quaternis simul, per interualla caules & ramos circūdanibus Erythrodani modo,
 aut Aparines flore in sinu caulū vertice instar vnbellæ ferè circinato, e pallido
 subnigricante, denso, admodū paruo. Nondū explorata est huius fruticis facultas, vt
 somnifera sit nec ne diiudicari possit. Gustu insipido est, vt etiā auctor est Pena, &
 refrigerātis no humectātis facultatis. Idē cū superiore esse puto Doryeniū Hispani-
 cū Clusij, cui ferè similē planta in regno Valérino, & quibusdā Batiçæ locis na-
 sci tradit, cubitalibus & viminis modo obsequiosis virgis, superiore gracilioribus:
 foliis breuioribus & latioribus, breui pediculo ternis, aut quinis simul iunctis, &
 ramulos amplectentibus, gustu salso, & nō nihil acrimoniæ habēte: oblōgi ramu-
 sculi ternos, quaternos, aut quinos flores sustinent, medica maiores, colore viridi:
 alioqui tota planta candida est omnino & incana, magis etiā quā superior.

MANDRAGORAS. CAP. VII.

MΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ Græcis & Κίρκας, Pythagoræ ἀνδροεικής, qui-
 busdam ἀνδράς, Latinis etiā Mandragoras, & canina, aut terrestris
 Malus dicitur, Arabibus *labrosc*, *Tibrohae*, Officinis & Italis *Man-
 dragora*, Hispanis *Mandracola*, Gallis *Mandragore*. Circa à Circe
 nomen inuenit, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Antropo-
 morphos à forma humana, quoniam omnes ferè radices Mandragoræ à medio
 ad imum bifurcæ sunt, vt cruribus hominū similes videantur. Quare si quo tem-
 pore fructum ferunt effodiuntur, hominis cui brachia desunt ethiæ quadate
 nūst representant. Duo Mandragoræ genera, auctore Dioscoride. Mandragoras
 nias & candida, & Mandragoras femina, siue niger, tridacias appellatus. His re-
 ctum addit Mandragoram nomine Morion. Mandragoras mas siue albus folia à
 radicis capite profert magna luglandi, aut latifolia: Lactucæ æqualia, oblongiora
 tamen, mollia, læuia vt Beræ, in viridi candicantia, & circa radicis caput per terrā
 sparsa, secus quæ breues exeunt pediculi, in quibus flores pallidi & foliacei, latius-
 culo calici insidentes. His singula succedunt poma, rotunda, paruis limonibus
 æqualia, colore ad dilutum aqua crocum inclinantia, carne succosa, quæ cōtinen-
 tur pallida aut cæcia femina, pyri seminibus æqualia, non tamen acuminata, sed
 modice plana, & ab vna parte renum instar sima. Radix subest perennis, grandis,
 longa, crassitudine manum implere, in partes duas sepius distracta, foris pallida,
 aut in candido subfusca, intus candida, carnosā, succosā, & crasso cortice vestita.
 Odorem tota herba grauem spirat, præsertim poma, quibus succus est aliquantū-
 lum gustu vinosus, subamarus, tam odore, quā sapore caput grauās. Radix ama-
 rescit, simulq; subdulcis est. Mandragoras niger, seu femina folia habet maris
 instar per terram sparsa, minora tamen & angustiora, tenuifolia Lactucæ similia,
 sed his quoue minora, mollia, odore graui, ac in viridi colore nigricantia, secus
 quæ pediculi, flores & poma sunt albo Mandragoræ succosā carne seminibusque
 similia, colore verò paulò pallidior, duplò minora, forbis, aut paruis mespilis no-
 stratibus æqualia. Radicem habet perennem, priori substantia & figura similem,
 sed minorem, in duas aut tres inter sese implicatas partes diuisam, foris nigrican-
 tem, intus candidam, quæ sapore prioris radici respondet. Hæc proculdubio sunt
 Mandragoræ genera, à Dioscoride expressa his verbis. Mandragoras niger, quæ

Nomina

Manhi. in
 l. 4. Diosc.
 cap. 71.

l. 4. cap. 71.
 Genera.

Forma.

Lib. 4. c. 71.



fœmina existimatur, angustioribus est foliis, ac minoribus quàm Lactuæ, visis ac graveolentibus, per terram dispersis, atque inter ipsa mala forbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus hæret bene magnitudinis, ternisve inter se conuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis: caulem non fert. Alter candidus, qui mas dicitur. Huius folia magna, alba, lata, lævia ut Betæ: ma'la quàm alterius duplò maiora, colore in crocum inclinante, iucunde cum gravitate quadam olentia, quorum pomorum cibo aliquantùm ophiones soporantur. Radix alterius similis maior & candidior, orbara & hæc caule. Huius consentanea fung magna ex parte quæ Plinius tradidit. Mandragoram, inquit, alij Circeium vocant. Duo eius genera: candidus qui & mas, niger quæ fœmina existimatur, angustioribus foliis quam Lactuæ, hirsutis & caulibus, (legendum, hirsutis, æqualibus, non, & caulibus: utrique enim Mandragoræ caules desunt. Præterea hirsuta folia malè dixit, quasi Dioscorida legisset: neutrius enim folia hirsuta sunt, ut ex Dioscoride liquet) radicibus binis, ternisve rufulis, intus albis, carnosis, tenerisque, penè cubitalibus. Ferunt mala Auellanarum nucum magnitudine, & iis semen ceu pyrorum. Album hoc alij Arsen, alij Morion, alij Hypophlomon vocant. Huius folia albà quàm alterius latiora, ut Lapathi sariuz. Quæ Mandragoræ nigri poma Dioscorides *ῥοις ἰμπερῖ*, id est, forbis similia facit, Orbasius enim *ῥοις* & achradibus comparat: quorum prius ad magnitudinem & formam, posterius ad figuram tantùm referendum videtur. Marcel. Vergil. *ῥοις ἰμπερῖ* legit, id est, ouorum vitellis, ut ipse interpretatur, similia. Sed & *ῥοις* malè legit, & hæc vox, oua, non ouorum vitellos significat. Præterea omnes probati codices & Orbasius *ῥοις* habent. Serapio Mespilum interpretatus est, quod vitiũ non Serapioni, sed ipsius interpreti adscribendum. Plinius hæc mala nucum Auellanarum magnitudine esse scribit. Idem Mandragoræ fœminæ caules tribuit, cum vtrumq; Dioscorides *ῥοις ἰμπερῖ* esse dicat. Quare Cornarius in Plinio hirsutis, excaulibus legendum esse crederet, nisi rursus sequeretur, Succus fit & ex malis, & è caule, &c. ut Plinius caulem ipsi omnino attribuat. Nam quæ de Mandragora tradidit, partim ex Dioscoride,

Embl. 64.
lib. 4. Diosc.

ride, partim ex Theophrasto transcripsit, qui etiam in Mandragora caulem agnoscit. τὸν δὲ ἄλλον, inquit, τὰ μὲν ὁμοίωταί τῷ τῶν καυλῶν ἐχέει, καὶ ἀπὸ τοῦ μανδραγοῦρας, καὶ τὸ καύειν. Id est, Reliquorum autem quædam similitudinem huic (Ferulæ) caulem habent, veluti Mandragoras, & Cicuta. At Theophrasti Mandragoras à Dioscoridis Mandragora plurimum distat. Quod cum Plinius non animaduertisset, ex utroque transcribens, utriusque Mandragoram confudit. Maximam autem utriusque Mandragoræ differentiam hæc perspicue demonstrant. Dioscorides Mandragoræ nigri fructus forbi magnitudine, & pallidos esse dixit: albi verò fructus siue mala duplò maiora, & colore in crocum inclinante depinxit, ac utruque sine caule. Theophrastus apertè Mandragoram caulem habere scripsit, ut ostendimus, ἰδιόθεν τοι χαρπὸν τὴν μανδραγοῦραν, τὴν μέλαινα τε & ῥαυδὴν, ἢ ὀνόμαζ' εἶναι τῷ χυμῷ. Id est, peculiarem autem eis fructum esse, quod niger & Acino vix similis, & vinoso sit succo. Quæ non satis rectè sic conuertisse videtur Gaza. Fructus Mandragoræ peculiaris, quod niger racematus, vinosusq; suo sapore sentiat: ῥαυδὴς enim non racematus neque racemosum significat. Nam ῥαυδὴ, ῥαυδὴς, ut alibi declarauimus, vix acinum propriè designat, id est, vix fructum, qui ex succo, carne, vinaceis, & ambiente cute constat, non totam uiam, siue racemum, vnde ῥαυδὴς vix acino similem Græci intelligunt. Ruellius hunc fructum effigie esse oui, non, ut Theodorus vertit, racemi, apud Theophrastum legendum esse censet, magno errore: integer enim est hic Theophrasti locus. Quare nemo miretur, aut alterutrū auctorem insimulet, quod tam contraria de Mandragora scripserint. Quisnam autem sit Theophrasti Mandragoras ab Herbariis ambigitur. Cordus tertiam Mandragoræ speciem, quæ priuatim Morion dicitur, Theophrasti Mandragoram esse censet. Grandem, inquit, radicem habet, caulem procerum: folia Solani & Mandragoræ nigri foliorum mediam habent figuram. Flores profert nigros, & post hos nigros fructus grandi vix acino æquales, qui vinosum succum emittunt. Vidisse ait hanc plantam in Hesiæ umbrosis & antiquis siluis iuxta speluncas natâ, Hesiæ *Dolkraunt* dictam, quo nomine Græcorum Morion interpretantur, aliis etiam *Schaffbeer*, quoniam fructus eius soporem faciunt. Hanc plantam Solanum siluaticum Gesnerus appellat, Itali *Bella donna*. Quidam, inquit, Solanum mortiferum, aliqui Morion esse suspicantur, vel potiùs Mandragoram Theophrasti, ut in superioribus fusiùs diximus. Fuchsius Solanum mortiferum esse arbitrat, vel certè tertiam Mandragoræ speciem quam pingit Theophrastus. At Solanū somniferum non esse ex Matthiolo iam ostendimus: nec Mandragoram Morion rectè dici posse (omnia enim quæ de Mandragora suo Theophrastus tradidit, ad tertium genus Mandragoræ Fuchsius refert) idem probat, quod Mandragoras Morion folia ferat, ut scribit Dioscorides, Mandragoræ mari similia, dodrantalia, humi iacentia circa radicis summum. Quibus verbis demonstrat plantam hanc, ut & cetera Mandragoræ genera, caule carere. Quæ in eam, quæ *Bella donna* nominatur, minimè conuenient: cum folia emittat hortensi Solano maiora, palmum non excedentia, minimè candicantia, nec humi strata, sed ex caulibus exeuntia, in quibus adnata plurimæ, bicubitata, ligni modo dura. Quare planta hæc Mandragoras Morion esse nequit. Dodonæus eam Theophrasti Mandragoram esse censet, ut diximus, sed à Mandragora Morio Dioscoridis distinxit, quam Dioscorides non vidit, ut ex verbis illius colligi potest. Alium, inquit, tradunt esse Mandragoram, nomine Morion, in opacis iuxta specus enatum, foliis albi Mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus, quæ mollis est & candida, paulò maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Mandragoras provenit in siluis, & obscuris locis. Utrumque genus frequè nascitur in multis Italiæ locis, præsertim in Apulia, Gargano môte. In hortis maximè colitur ab Herbariis. Augusto

Lib. 6. hist. cap. 4.

Lib. 6. hist. cap. 2.

Ca. de Sol. lan.

Lib. 4. c. 12.

In lib. 4. Diosc. c. 76.

In herbar. Germ.

Ca. de Sol. lan. Cap. 164. Lib. 4. hist. cap. 2. Ca. de Sol. lan.

In lib. 4. Diosc. c. 69. Lib. 4. c. 71.

Locos.

Li. 7. simpl. mense poma perficit. Mandragoras auctore Galeno vincentem habet qualitates
Vires & refrigerantem, adeo vt tertij sit ordinis refrigerantium. Verū tamen non nihil
Temper. caloris inest, & in pomis humiditatis. Quare soporem & conciliandi vim habet.
 Radicis cortex cum sit valentissimus, non tantum refrigerat, sed & desiccatur, reli-
 quum quod intus est imbecillum est. Omnes eius partes ad magnos in medicina
Lib. 4. c. 72. vsus adhibet Dioscorides. Succus fit e cortice recentis radicis tulio, & ptele subie-
 cto, qui insolaris vbi concreuerit, fictili reconditur. Malis quoque succus depromi-
 tur, sed aliquantò ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex ad vsu
 suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defecatum ius seruant.
 cyathoq; vno vtuntur in peruigiliis, & doloribus, & ante sectiones, vltioneq;
 sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso porus. *ο δὲ πικρὸς πρὸς τὴν μελιχροίαν*
 Id est, lacryma, siue liquor cum melierato potus, ipso sponte defluit, succus χυλόμε-
 tundendo exprimitur) vt Verarrum per vomitiones bile atram, pituitamq; eieci-
 hit: verum potu largiore vita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ o-
 culos finiunt, pelvis quoque emollientibus admiscetur: semiobolus poteste in-
 ter se menses, & partus expellit: subditus sedi pro balano somnificus est. Radix
 emollit, quod senis horis cum eo decoctum sit, & ad accipiendam, quæ effusa
 opaueris formam, ipsum facile præstat. Folia recentia conuenienter oculorum
 inflammationibus, & collectionibus quas vlcerata citant, cum polenta illita
 durities omnes, suppuraciones, strumas, & tubercula discutit: stigmata sua
 ceratione delent, si quinis senisve diebus sensim perfricentur. Folia seruata
 muriis eosdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium
 ex melle, aut oleo medetur: strumas atque tubercula cum aqua discipat: arthritidis
 cruciatum cum polenta sedat. Fit citra coctionem vinum e cortice radicis, ad
 modum. Ternæ minæ in vini dulcis metretam coniiciuntur. Dantur ex eo
 cyathi iis qui secari, aut vri debent: siquidem nullo tunc afficiuntur dolore,
 veterno quodam pressi torpefunt (*δὲ δὲ καὶ ἀπὸ πικρῆς*, quod alto somno opor-
 mantur.) Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item ex
 iis succus: nimio ramen odore percussi obmurefcunt. Semen malorum p-
 vuluas purgat, appositumq; cum sulphure ignem non experto, rubra semen
 profluvia sistit. Scarificata, punctisq; mulsarum aperta radice erumpens lacry-
 ma cauo vase recipitur. Liqumetum autem succo lacteo præstantius est. Sed
 vbiq; vt experientia docet, radices lacteum succum delacrymant. Vt tertius
 Mandragora: speciem non nouisse videtur Dioscorides, ita nec eius vires cer-
 radere. Aiunt, inquit, eam in pane, ossa, obsoniõve, drachmæ pondere deuorata
 vsum rationis inrecipere: obdormiscit enim homo, eo ferè quo comeditur ha-
 tu, sensus impos, ternis quaternisve ex quo data est horis. Hoc medici vtuntur,
 sciendi vrendiq; necessitas adest. Anridorum esse aiunt radicem cum Solano
Cap. 29. manico potâ. Plinius à Dioscoride & Theophrasto sua muruarius, vt diximus, non
 omnino tamen eadem tradidit. Succus fit, inquit, & è malis, & ex caule, deciso ca-
 cumine, & radice punctis a petra, aur decoctæ: vtilis hæc velur succus (sic emendat
 Cornarius ex vetere codice vulgata exemplaria, quæ habent, vtilis hæc vel succu-
 lo.) Concisâ quoque in orbiculos seruat in vino. Succus non vbiq; inuenitur,
 sed vbi porelt, circa videmias quaritur. Odor grauis eius, sed radicis & mali gra-
 uior. Ex albo mala matura in vmbra siccantur. Succus ex iis sole densatur: item ra-
 dicis ruscæ, vel in vino nigro ad tertias decoctæ. Folia seruantur in muria efficacius,
 aliàs recentium succus pestis est: sic quoque noxiæ vires. Grauedinem adferunt
 etiam olfactu. Quicquam mala in aliquibus malis mandantur, nimio tamen odo-
 re obmurefcunt ignari. Poru quidem largiore etiam moriuntur. Vis somnifica
 pro viribus bibentium. Media potio cyathi vnus. Bibitur & contra serpentes, &

ante sectiones vitione, que ne sentiantur. Ob hæc satis est aliquibus somnū odore quæsisse. Bibunt & pro illeboro duobus obolis in musto. Theophrastus Mandragoræ folia vlceribus cum farina vitia esse scribit, radicem rasam, & ex aceto subactam ad eiy si pelata, ad podagricos dolores, ad somnum, & ad amores: dant autem in vino & aceto. Secant orbiculos velut ex Raphano, quos siso transmissos, in musto si spendunt super fumum. Quæ fortasse Plinius exprimere voluit com dixit. Concisa quoque in orbiculos seruatur in vino. Quæ tamen alio in loco dilucidius expressit. Sed is in publicis exemplaribus valde corruptus est. Igni sacro medetur Arizom, folia trita Cicuta, Mādragoræ radix. Siccatur in aere vt Cucumis, &c. Quæ ex vetere codice sic restituit Cornarius. Igni sacro medetur Arizom, folia trita Cicuta, Mandragoræ radix. Secatur hæc in asses vt Cucumis, primumq; super multum suspenditur, mox in fumo. Dein tunditur in vino & aceto. Agyrtæ & impostores illi circūfodinei, qui radices fictitias humana effigie pro Mandragoræ radicibus imperitæ plebi ostentant, ex Pythagoræ Amphiposiorpho, quo nomine Mandragoram appellauit, vt diximus, occasione sumptisse videntur. Cui Columellæ testimonium accessit, qui vulgi quoque superstitione motus cecinit.

Quamuis semibomani vrsans gramine feta

Mandragora pariat flores, nux flammæque Cicutam.

Illi in Bryonia, Al hæc, Arūdinis, aliarūq; plantarū radicibus adhuc recentibus humanā vtriusq; sexus effigiem sculpsit, insertis in ea loca, in quibus pilos exoriri voluit natura Hordei & Milij granis. Deinde eas facta serobe tenui sabulo obruunt, vt grana illa radicularum emittant, quod euenit viginti summum dierū spatio. Tum erunt, & radicularum ex granis natas acutissimo cultello cōcidunt, itaq; aptat, vt capilli, barbæ, & ceterarū corporis partū pilos referant. Has sub crucibus & totis ex vrina supplicij affectorū enatas persuadēt, mōstrososq; eorū vsus pollicentur. Nec nisi magno vitæ periculo effodi posse nugatur, eane qui effodiar radicibus adalligato, & auribus pice obturatis, ne radices clamorē exaudiant effodiētes: qua audita illis pereundū sit. Cuius imposturæ, ac mēdacij origo ex veterū superstitione fluxisse viderur. Theophrastus enim de effodiēdo Mādragora hæc scripsit. Circūscribunt & Mandragorā gladio ter, serantq; ad occasum spectātes. Iuleni & aliū saltantem tripudio circūagi, multaq; de venenis vsu & re dicere. Quæ Plinius trāstulit his verbis. Cauēt effossum contrariū ventū, & tribus circulis autē gladio circūscribunt: postea fodiūt ad occasum spectātes. Matthioli hanc tabulam, quæ ignaris Mādragoræ radices effodere volētibus rārope minatur, ex Flautosepho natā putat, qui etsi de alio radicis genere scripsit, ea tamen facili ab impostoribus ad Mādragoræ radices, detorqueri potuerūt. Hæc sunt illius verba. Vallis, qua ciuitas parte Septentrionali cingitur, quidā lacus Baaras appellatur, vbi radix eodem nomine gignitur, quæ flammæ quidē asimilis est colore, circa vespertam verò veluti iubar fulgurās. Accedētibus, eamq; euellere cupiētibus facilis non est, sed tam diu refugit, nec prius manet, quā si quis vrinā muliebrē, vel menstrū sanguinē super eam fuderit. Quinetiā tunc si quis eam tetigerit, mors certa est, nisi fortē illā ipsam radicē ferat de manu pendente. Capitur alio quoque modo sine periculo. Totam eam circūfodiunt, ita vt minimū ex radice terra sit conditū, deinde ab ea religant cinem, illoq; sequi eum à quo religatus est cupiente, radix quidē facili euellitur, canis vero conditū non moritur, tanquam eius vice à quo tollenda erat, traditus: nullus enim postea accipientibus metus est. Tantis autem periculis propter vnā vim capi eam opera pretium est. Nam quæ vocantur dæmonia pelimorum hominum spiritus, vtus immeris, eosque necat, quibus subuenit non fuerit, hæc etiam si tantum adinoueatur agrotantibus, abigit. Hæc Iosephus. Sed literatū hominem nullum esse existimo, qui his imposturis & nugis fidem adhibeat.

MALA

DIFFERUNT non parum à Malis insanis, quæ nostræ ætas Æthiopica cognominat: horum stirps caule assurgit subinde cubicali, in duas treve alas diuiso: foliis latis, ex albido virentibus, angulosis, duriusculis, quibus à media costa, siue nervo spinulæ quædam breues excunt. Hæculi secundum cauliculos albicant, senum foliolorum, staminibus mentis

MALA Æthiopica, Dod.



Æthiopica boni succi, & alimenti non multum corpori adferunt.

APOCYNVM.

CAP. IX.

Nomina

L. 4. ca. 76.

Forma.

Vires.

L. 4. simpl.

L. 14. c. 11.

APOCYNON Græcis & κυνδορον, & κυνοράμνον, Latinis Apocynum, Cynomoron, & Brasica canina dicitur. Apocynum quidem & Cynomoron, quod est canes interficiat, quasi canicida. Cuius hæc est apud Dioscoridem descriptio. Frutex est longas habens virgas, tenuis, vitulinum modo, graueolentes, ægre fragiles: folia Hederæ similia, sed moliora, in summo acutiora, grauius olentia, subuiscida, succo luteo plena: fructus vix liquas fabarum, folliculi specie, in quo semina lanugine obuoluta sunt, dura, per nigra. Huius folia cum adipe in panes coacta, & in cibos data, canes, lupos, & pantheras interimunt: protinus enim coxendices ipsorum resoluunt. Graueolitur, τούτους ταύλλα συντάλλει ἀποποιεῖν, quod sic Cornarius vertit. Haec tamen cum farina subacta in panes coacta, &c. Legendum sanè, συντάλλει. Est enim & farina aqua subacta, & ut pinsatur, prius quam fermentescens acetat, vulgo pasta, quod sensus requirit. Galenus, Apocynum aut Cynocrambè, inquit, vocant quidam Cynomoron, quod canes celerrimè interimat, sicut Lycostomus lupos. Est autem hominibus venenum, herba multum grauius olens, proinde omnino calida est non instrenuè, non tamen proportionè desiccata. Itaque admodum digerentis est facultatis. De quo aliter scripsit Plinius. Sic & pleuriticis, & omnes lateris dolores Apocyni semen ex aqua (sub. lino) fritum est loco Hederæ,

Hedera, molliore tamen, & minus logi. v. iculi. seentia acuto, diuiso, laeuigino-
so, graui odore. Canes, & omnes quadrupedes necat in cibo datum. At cum Dios-
corides nullum Apocyni vsum humano corpori conuodum praeferbat, & Ga-
lenus venenum hominibus esse dicat, & solum foris impositu discutiendi vim ha-
bere, merito suspectum est Apocyni semen pleuritici ex aqua propinati. Quare
verba haec, Sic & pleuriticis & omnes lateris dolores ex aqua, ad praecedita refe-
renda videntur, vt sequatur, Apocynum Outex est, &c. Scribit Matthiolus ^{in lib. 4}
duas a Luca Ghino ad se missa fuisse, quae siliquas duas dono acceperat. Syria de- ^{cap. 4.}
latas, quarum vni inscriptum erat, Periploca repens, alteri Periploca non repens,

APOCYNVM, Mattholi.

APOCYNVM repens, Matth.



quod ita in Syria has plantas nominant. Praeterea has siliquas Rhododēdri siliquis
admodum similes fuisse, nisi quod repens Periplocae siliqua ea erat longitudine,
qua & Rhododēdri, gracilior tamen, alterius breuior. E longiori facta plantā pro-
uenisse non modo humi repenti, sed & arbores proceras scandentem, ē breuior-
i vero aliam, quae notis omnibus Apocynum refert: vtramque succo turgere, re-
pentem albo, non repentem suberoco. Est & alia in siliquis differentia: cum enim
hae in vtraque Rhododendri similes sint, in nō repenti tamē simplices, acutiores,
rectae ex vno pediculo proueniūt, in repenti verō binae, & in origine cōiunctae, &
in sese iuicē inflexae, nec adeo vt illae in acutū desinentes. Non negat Pena Apo-
cyni descriptioni apprimē quadrare plantas duas non min⁹ raras quam elegantes,
quas Patruij & in publico Pisano virotopridem vidit. Earū vtriq. nomē Periplo-
ca erat. Altera nō repens flexilibus erat lursculis, vimincis, gracilibus, laevis, pe-
diculos vtrinque habētibus longiusculos, & exiles, in quibus folia hederae, mol-
liora, viridia, laeua, mucronata, & quam Vincetoxici rotundiora, nonnihil in summo
acuminata: flores tenues, candidi, muscosi, Valerianae instar aut Drabae, inter folia
eoriuntur, succedentibus Augusto mēse siliquis corniculatis, mucronatis, rectis,
in Asclepiade maioribus, claudentibus semen nigris, depressum, papposa
lanugine obductum. Succus flauescit, ingratus, & vti tota planta virosus. Hae si

deuoratis necem infert, inquit, Apocynum esse & huius fore ab idem Vincetoxicum facile probabile est. Certum tamen exploratumque fuit esse ad eas venena a cane deuoratis antiocharmacum fuisse, quemadmodum Thoræ Anthora, & Pardalianches habet in Paridis. Altera Periploca repens prolixioribus & leuionibus vitiis furculis serpit, variisq; flexibus arripit & amplectitur obuios. Tota hęc Periclymeni modo: sunt vrring, ex aduerso bina, Periclymeni potius quam Hederæ æmula, sed apice quemadmodum Vincetoxicū donata: sibi quę solentore connectione mutuis erāt coniunctæ quasi rostris, vna & floris basi, seu calathio, vna repandæ, summis & in his infertæ mucronibus, Rhododendri quadamtenus modum. Easdem Periplocas descripsit & depinxit Dodonæus, & ad Dn. Coridis Apocyni referendas esse censuit, præsertim priorem. Easdem Lobelius etiam pietas dedit, & priorem cognatæ figuræ esse & naturæ cum Scammonio Monspelienfi consensu, succo, vitiolis & longior radice reperiatur. Sed ab hac sanè diuersum est Scammonium Monspeliense.

ACONITVM.

CAP. X.

Nomina
Luc. 1. 2. 3.



ACONITON Græcis, Aconitum Latine. Nascitur, inquit, in nudis cauitibus, quas aconas nominant. Et ideo Aconitum dicitur, nullo iuxta ne puluere quidem nutriente. Hanc Aconitis nomen nominis attulere. Alij quoniam vis eadem in morte est, coitibus a diti aciem deterendam, statimq; adinota velocitas sentitur. Fama narrat, ut si declarat Ouidius in Metamorphosi) e spumis Cerberi canis, hinc ab interis Hercule, extitisse, ideoque apud Heracleam Ponticam, vbi monstratur in apud inferos aditus, gigni. Idem Ouidius a cauitibus nomen indicat his versibus:

*Quæ, quia non moritur dura, vincta cote,
Agrestes Aconita vocant.*

Lib. 7.

Ibidem.

Lib. 6. cap.

Lib. 4. cap. 72.

& 76.

Genera.

Theophrastus ab Aconis, vbi plurimum nascitur, nomenclaturam dixit. Aconitum vicus est Perandynorum, qui ad Heracleam Ponti est. Raritas huius aliter ait, Porus Aconitæ, veneno Aconito ditus. Apud vero, inquit Plinius, ferebatur clatura interpretatio, si eam ab herbæ succo vel radice, quibus equali consuetudine a venatoribus afflicta & subacta celerius subit, & permissa aliter, et ceteris cauitibus, aut a pago cognomine deducast, amens poliret. Et aconitum dicitur quemadmodum τὸ γένος ἀπὸ τοῦ τῶν δεινῶν, nō a taxo. Sic enim in Cypripedia Neoplatonis γὰρ τὸ δεινόν, ὡς καὶ τὸ δεινόν ἀπὸ τοῦ τῶν δεινῶν, ὡς καὶ τὸ δεινόν ἀπὸ τοῦ τῶν δεινῶν. Neque enim aconitum, sed hominē collumare per uitrebamus vobis. Dioscorides dicit perit Aconitum in genere. A Vnum, quod Pardalianches vocat, alij Camaron, alij Thelyphonum, alij Myocodon, alij Theriophonum siue Theriophorum. Altera Aconitum I Vnum, quod & Cynoconum, cuius tria facit genera. Vnum quo vtiuntur venatores, duo, quæ in vsum suū vertere Medici, ex quibus tertium vnticum nominatur. tamen dissimulandum nō est, verba hæc, Vnum quo vtiuntur venatores, & ceteris gatis codicibus Græcis exarata nō esse, sed statim huius Aconiti nominibus natalē & descriptionē subiūgi, sine vlla generū distinctione: quæ nec in Oribasio reperias, & Marcellus vsupia respuit. Illud quia enecar pitheras, Pardalianches quia feram sexa animalia tactis genitalibus, Thelyphonum, quia feras Theriophonum nominatur. Camaron vero a radice Camaro marino sicuti et auctor Myocodon, quia procul & è longinquo nūres necat. Hæc Lycodon Cynoconum, quia plurimum lupos canesq; interit at. Plinius de vno & priore Aconito Dioscorides scripsit, alterum prorsus omisit. Theophrastus de Thelyphonum sine Aconiti mentione tradidit ea, quæ ad prius genus Aconiti Dioscorides per-

Luc. 1. 2. 3.

neq.

nent, quæ etiam Plinius transcripsit, & de Aconito velut ab illo diuerso scorpionum.

Certe Aconitū multarū scripturā vnū fuit nomē, quas inter multas lethales cōper-
tum esset celeritimā & certissimā mortē adferre : de quibus quia Theophrastus &
Dioscorides succinctē nimis, atque minus apertē scripsere, (flores enim & alia in
delineationibus prætermiserūt) tactū est, vt alij atq; alij Aconita alia arg; alia sta-
tuerint. Aconitū Pardaliachēs tradit Dioscorides folia habere tria, aut quatuor,
Cyclamino vel Cucumeri similia (συνίσις simpliciter habēt exēplaria, Oribasius si-
ueſtri Cucumeri) minora tamē, & subsæpera, caulē dodrantalē, radicem scorpionis
caudā similē, alabastrī modo nitentē. Hic neq; florum, neque fructus vlla mentio.
Ferunt Aconitū huius radicē scorpionis admotā eū resoluentē, & ediuerso aduorto
Elleboro excitari. Ocularibus medicamentis dolorem tollētibus miscetur. Enecat
pardos, lues, lupos, & feras omnes carnibus impositu & obiectum. Quibus simila
tere de Thelyphono Theophrastus prodidit. τὸ δὲ γὰρ λέγουσιν οἱ περὶ σκορπίου καλεῖται
ἀπὸ τοῦ ὅτι ῥιζὴν αὐτοῦ εἰς τὴν σκορπίου ἐπιφύεται (Gaza ἀποθνήσκον legiti ἀπαλειψέτω
τὴν σκορπίον, ἵνα διὰ τῆς ἰαλλήσεως λάβῃ τὴν γρακάνην) (Gaza ἀποθνήσκον φασιν, ἀπὸ λυγροῦ ὅτι
ῥιζὴν αὐτοῦ εἰς τὴν σκορπίου ἐπιφύεται, πάλαι δὲ τὴν σκορπίου, ἵνα διὰ τῆς αἰδοῦς τελέῃ τὴν ῥιζὴν τὴν φύλιν,
αὐθιμαρον, χηρὸν σκεπτικόν ὅτι οὗτος σκορπίος ἀληθινὸν ἀποθνήσκον, ἡ χηρὸν δὲ τὸ μὲν φύλλον αὐτοῦ κτελε-
μαρον, τὸν δὲ ριζὴν, ὡς περὶ τοῦ χηρὸν, σκορπίου, φησὶ) διὰ ὡς περὶ ἀργυρίου, ἔχει δὲ αὐτὸν χηρὸν φιλῶν ὅτι χρυσὸν
σκεπτικόν. Id est, Gaza ininterprete, Thelyphonū, quod ali Scorpionē appellant, quia
radicē scorpionis similem habet, admortum scorpione occidere tradit, & cum te-
nuiscere possit si Elleboro candido linatur. Enecat idem & boues, & oues, & iu-
menta, & in summa omnes quadrupes eadem die, si genitalibus folium vel radi-
cula imponatur. Proficat potū cōtra scorpionū icūs. Foliū habet Cyclamini, ra-
dicem, vt dictum est, similē scorpionī. Nascitur graminis modo, & geniculis con-
stata loca amat vmbrosa. Quæ sic Plinius exscripsit. Thelyphonum herba ab alijs
scorpion vocatur propter similitudinē radicis, cuius tactū moriūtūr scorpiones.
Itaque cōtra eorum icūs bibitur. Scorpionem mortuum si quis candido Ellebo-
ro linat, tenuiscere aiunt. Thelyphonū omnē quadrupedem necat, imposita ve-
rēdis radice, folio quidē intra eundē diē, quod est simile Cyclamino. Ipsa geni-
culata nascitur in opacis. Quāuis hæc aperte eadē sint cum iis quæ de Aconito par-
daliachē Dioscorides prodidit, tamē eadem alio in loco de Aconito repetit Pli-
nius, alijs tamen quibudam additis. Constat omnium venenorū ocyssimū esse
Aconitū, & tactis quoque genitalibus feminini sexus animalium, eodem die in-
ferre mortem. Hoc quoque tamē in visus humanæ salutis vertere, scorpionū icūs
aduersari experiendo datum in vino calido. Ea est natura, vt hominē occidat,
nisi inuenierit quod in homine perimat. Cum eo solo colluctatur, velut pari intus
veneno. Sola hæc pugna est cū venenū in visciferis reperit: mirumq; exitialia
per se ambo cum sint, duo venena in hominē cōmoriuntur, vt homo superſit. Et
mox, Torpescunt scorpiones Aconiti tactū, stupentq; pallentes, & vinci se confi-
tentur. Auxiliatur eis Elleborum album, tactū resoluente ceditq; Aconitū duobus
malis, suo & omnium. Quod duobus malis dicit Aconitū cedere, suo & omnīū, in-
tellectu est difficile. Hunc locū veluti mendo inquinatum coniectura sic emēdat
Cornarius. Ceditq; Aconitum duobus malis, suo dominio. Quam lectiōnē mini-
mē probō. Quidam pro malis legunt, modis, & sic interpretantur, Aconitū cede-
re, id est, innoxium fieri, ac nihil lædere, duobus modis: suo, nimirum proprio, ac
peculiari, si reperiatur venenum in corpore: & omnium, sub, venenorum, quorū vis
frangitur idoneis & convenientibus alexipharmacis. Pergit Plinius, Tangunt car-
nes Aconito, necantq; gustatu earū pantheras, nisi hoc fieret, repleturas illos sitis.
Ob id quidam Pardaliachēs appellauer. Et rursus, Maiores oculorum quoq; me-
dicamentis Aconitum misceri saluberrimē promulgauere, aperta professione,

Li 4. ca. 71
Form 4.

Lab. 5. hist.
cap. 29.

Lap. 410.

Lib. 17, c. 1.
& 4.

malum quidē nullum esse sine aliquo bono. Fas ergo nobis erit, quāvis illud diximus
venena monstrare qualē sit Aconitū, vel deprehendendi gratia. Folia habet Cyclo-
mini, aut Cucumeris, nō plura quatuor, ab radice leuiter hirsuta. Radicem modi-
cam Cammaro similem marino. Quare quidam Cammaro appellauere, alij Thyr-
phonum ex qua diximus causā Radix incuruatur paulū scorpionū modo, quae
& Scorpium aliqui appellauere. Nec defuere qui Myoostonum appellare mallerent,
quoniā procul & ē longinquo odore mures necat. Hæc Plinius de Aconito primo
Dioscoridis. Theophrastus scripsit, ut diximus, hæc de Aconito a Thyrpho-
nau diuerso scripsit. Τὸ δὲ ἀκόνιτον γινώσκουσιν πασι καὶ ἐν κρήνῃ, ἔστι ζακινθίων· παλαιῶν
ἀρετῶν ἐν ἡρακλῆϊ τῷ ἐν τῷ ὄρει. ἔχει δὲ φύλλον μὲν κρυμμένον, ῥιζὴν δὲ ὁμοίαν τῇ ζακιν-
θίου καὶ χυμὸν αὐτοῦ τῆς ζακινθίου τῆς καὶ πρὸς τοῖς ὄρεσι. τὸ δὲ φύλλον, καὶ τὸν χυμὸν
ῥιζὴν πασι ποιεῖν. αὐτοῦ γὰρ ὁ χυμὸς ἔχει ἰσχυρὰς, βραχὺς δὲ ἡ ὥρα, καὶ νύκτι
περισσὴν ἄλλως ποιεῖται τῷ αὐτοῦ τοῦ ἰσχυροῦ καὶ σαχυρῆς. φύλλον δὲ παλαιῶν, καὶ τὸ
ταῦτα ἀρετῶν, ἔστι δὲ τῷ αὐτοῦ ἰσχυρὸν καὶ ἔστι καὶ τοῦ αὐτοῦ τῷ αὐτοῦ ποιεῖν. ἔστι
δὲ καὶ αὐτοῦ τῷ αὐτοῦ τῷ αὐτοῦ τῷ αὐτοῦ τῷ αὐτοῦ τῷ αὐτοῦ τῷ αὐτοῦ τῷ αὐτοῦ τῷ αὐτοῦ τῷ αὐτοῦ
τροπῶν τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ
συνέπειν δὲ καὶ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ
μελικρατῶν συντελεῖται. καὶ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ
καὶ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ
μυῖα, καὶ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ
ἀλλὰ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ
καὶ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ
καὶ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ τῶν αὐτοῦ
Id est, Aconitum nascitur, ut ait
Creta & Zayntho plurimum & optimū in Heraclea Ponti. Folia habet
simile, radice nigra & colore simile nuci. Sic vertit Gaza, legit enim ἔστι
in vulgari codice bus claratū est. Dioscorides παλαιῶν καλεῖται, id est, curu-
larum comparat, Plinius Cammaro marino, vnde Cammaro appellatū dixit
mortiferā. Illi mellē, solum autē & fructum nihil nocere aiunt. Fructus est humi-
lus non humilis materix. Brevis est herba, & nihil superuacui habens, sed fructu-
mentosum: semen autē nō spiceum. Nascitur ubiq, & non in Aconis solum, vnde
nomen accepit. Est autē vicus is Perandynotum. Gaudet locis petrosis. Neq, per
neque vllum aliud animal ipso pascitur. Componi id quodāmodo narrat ad alia
efficiendum, nec id cuiusvis est. Quare medicos cōponendi ignaros propter
ciente vti, & ad alia quædam: si bibatur, nullum sui sensum inducere, neq, in
neque in aqua nullā. Componi verō ut certo tempore interimat, veluti duobus
aut tribus, aut sex mensibus, item anno, aliquos etiam duobus annis. Perit enim
illos de vita decedere quibus longo tempore corpus cōtabescit, facillime qui vni-
tim. Nullum autē huius antidotum esse ex aliqua alia planta audiuimus, sed
sumpsissent remedia quædam excogitata fuisse: nam incolæ seruasse quosdā
& vino, & quibusdā aliis huiusmodi, sed & hos itaq, atque etiam operos. Hæc
Theophrastus. Quia de Plinij, priorēve Dioscoridis Aconito intelligi nō possunt,
neque de posteriore, hoc vno dempto, quodd vterq, radices τῶν καλεῖται comparauit
in Theophrasto pro καλεῖται rectē καλεῖται legatur. Sic enim Dioscorides alterum Aco-
nitum describit. Aconitum alterum, quod alij Cynoostonum, alij Lycoostonu ap-
pellant, nascitur plurimum in Italia, montibus Iustinis, præstatius superiore. Folia
habet Platani, magis tamen incisa, longiora & nigriora: caulem veluti Filix, cum
altitudine, aut maiore, pediculum glabrum: semē in siliquis aliquatenus longioribus
dices cirris marinarū squillarū similes, nigras, quibus ad luporū venationes viuunt:
nam infertæ carnis crudis, & a lupis deuorant, eos enecant. Hæc solum in
quibusdā Dioscoridis codicibus repertas, in aliis tria notant Aconiti Lycoostonu
genera, ut iam monuimus, quorum tertium dūtaxat describitur, nimirum Ponticu.

Lib. 9. hist.
cap. 16.Lib. 4. c. 7.
Forma.

Quare merito docti viri in hoc capite quædam de his suspicatur, quibus Dioscorides & Aconitorum duorum historia, & quomodo tum venatores, tum Medici uterentur, declararet, quemadmodum in medico nihil horum prætermissit. Nunc Aconita varia ex peritis in herbis professamus. Ac primū fuerit Matthioli Aconitum Pardalanches. Planta est, inquit, in nudis & arduis montibus succulentis, vmbrosis tantum locis, foliis Cucumeri proximis, ad summam quatuor, usque subhirsutis. Caulem edit palmarem, subhirsutum,

ACONITVM Pardalanches, Matthioli.



quemadmodum & foliorum petiolos. florē non vidit, verum Doronici æmulum esse suspicatur. Radicem edit alabastrum modo splendens, dum recens est, digiti crassitudine, ex lata origine acutum desinens, in cuneam angulicula, & tota facie scorpionis caudam egulante. n. Hæc vidisse se legisseque affirmat tantum in Aconitis montibus Tridentini agri, locis ferè inaccessis & præruptis. Rarum quidem illam esse, & ab aliis fortasse haud videri, quam ab his quibus videndū copiam fecit quos multos veritatis locupletissimos testes profert. His tamen fidem adhibere nolunt periti herbarii, nec vlla aut Matthioli asseueratione aut testis monis persuaderi possunt, ut plantam hanc in rerum

TORÆ Valdensium, Aconitum l. Diosc. Gesnero.



natura existere credant: quin potius fictam ac cōmentitiam picturam esse existimant. In primis Gesnerus, cuius hæc sunt verba in libro de Lunarij. Matthioli pro Aconito primo delineata imago, planè fictitia mihi videtur: siue ipse ad Dioscoridis descriptum neminem confinxerit, siue ab alio deceptus acceperit. Quanquam enim ipse hoc Aconitum primum sæpe in Tridentinis montibus se legisse scribat, non tamen fidem apud nos meretur radicis quam proponit formam nimis facine artificiosam, nimiumque σκορπιος abscque vllis fibris. Idem Gesnerus Toram venenatam (aliqui Lunariā vocant, fortè quod folium ei rotundum & orbiculare sit instar Lunæ plenæ) Aconitum primū Dioscoridis esse asserit, quod foliatria edit ab vna radice, quorū duo extrema minora sunt, & absque cauliculo, medium maius est. Ea rotunda sunt, planè circinata, ea ferè magnitudine, ut diameter duos pollices æquet, in circuitu serrata, solida, albicantria. A medijs principio cauliculus enascitur, simul & paruum aliud folium mucronatum inde profertur. Radicula circiter decem, ceu Napi quidā exigui ab vno omnes radietis capite oriuntur. Eandē plantam ab Anguillara Patavini horti præfecto verū Aconitum Pardalanches iudicari scribit: reperiri in mōte Baldo inter Pataviū & Veronam: oriri etiam apud Valdenses in Alpibus Vnderflumen, & Engroia. In eadē sententia Gesnerus perseverat in Hortis Germaniæ. Aconitum primū, siue Pardalanches voco, inquit, nō quod Fuchsius pinxit, neque Doronicū, ut quidam, neque depictū à Matthiolo herbā, de qua dubitamus etiam, nū in rerum natura extet, & si extet, an rectè ab eo pingatur, nullis penitus in radice fibris quod ego in nullam plantā cadere dico. Sed ego Aconitum primū, Toram

dictam à Valdensibus, vt semper, & quidem primis existimauit, ita magis æm
in ea sententia cõhæmor. Sci o, inquit, & alia quidda herbas diuocatis in leu Thora
nomine vocari, vt in Italia al cubi N. pelli. Ego de Thora, siue Toxico Valden
loquor. Nasci ut sp̃te in mōtib* quibulda Sal. audie & Valefię nostrę, rarissim
recētes sunt, omniū cādidissimis, leorponu specie, præsertim caudæ, in quib
manifesta. Foliū aliis plātis singulare est, alius bina, terna, quaterna, aut etiam
ab vna radice. De eius veneno hæc ex epistola ad se missa describit. Venenu le
thale ex ea cõcitur, quo si gladius, aut spiculū, aut sagitta infecta fuerit, & ho
vulnerauerit mirabile dictu, nisi pars læsa subito abicisa fuerit, vt non queat ven
malignitas in reliquū corpus serpere, totū sanguine ita corruptū atq; cōuulsa
statim occidit, nec vllō remedio aut medicamine, quod ferat, vñ ac talia reme
ri possit. Itaq; necesse est eū qui percussus fuerit misere perire. Si vero dñd
sagitta huiusmodi veneno intacta, verbi gratia vsus aut fera alia, per alio fue
rit, bino aut trino sattu facto mortis cadit, cuius carnes si edātur, nihil
mini Quo darū intelligi, ad venenū soli sang̃ini inimicu esse. Nam & Toxi
neno illi sanguis ita inimicus est, vt si in ollā in qua seruatur venenū sang̃u
derit, venenū suū vim amittat, nec ampliū nocere possit. Idē ex alio
refert, herbæ huius radicē seruari aliquādiu in loco humido, postea cōuulsa
coruulsa fuisse, sūo eo qui expressus fuerit septas tingi. Vñ si quis per
quit Gesneus, acum eo succo inficiant, quā rana purgat, quæ si istius succo
præstanti venenū indicant. Peritus mihi quidam Herbarius noster
in arduo mōte effossam illā herbā statim comes suos oliscit, & deinde venen
ninarū, vixque frictionibus & vino faucibus intusculato fuisse reuocatu. Deinde
idē aliquādo sibi obseruatu, sanguinē e vulnere fluente admota illa herba
radice priuū substitisse, deinde versus plaga recurrisse. Hanc Marlinus
aconitū Pardalūches vocat inmerito, eū pamosa faculata quodū Aconitū
Toxicū superet. Sūt qui ad Cyclamini genera referāt. Quidā Limeu Plor
spicātur. Limeū, inquit, herba appellatur à Gallis, quæ sagittas in venen
medicamēto, quod Ceruariū vocāt. Pena cõmentitū etiā Martioli Pardalū
esse arbitratu Thora verò So'danellis, Gramini Parnasio hederaceo
& Cyclamino accēset, de qua sentē admodū dileruit, & dilucidio. quā
expressit his ferē verbis. Thora Valdensiū herbula est, inquit, quæ palam
diuq; Alpiū incolæ venatores vsi sunt, vt etia multi alij ad feras capiedas,
solo succo expresso & spiculis illito certā citamq; perniciē parāt. Quia naque
rit telum aut vulnus fecerit, sub. rrepētē virus, quo illico ora vulneris
sione anteuertāt) corrūpūtur, putrescuntve: vnde Thora nūcupata, manifest
cæ vocis vestigio, Thora ex q̃ dñpā deducta, quæ est corruptio, venenu, aut
Omniū enim, vt a totū Aconitorū, atque etiā Ellebori quibus sagittæ infici
vires qui lōga experientia cognouerūt, si cū istius vitibus cõparentur, mult
efficaces & incertas existimāt. Huius Vere ineūte succus premitur, atque vel
aut porius vngulis & cornibus bouillis recõditus emitur, mittiturq; ven
poria finirima, vbi ad vsus annuos venationū sibi cõparāt ferarū insidiatore
Delphimates, Aliobroges, & Prouinciales *Bessiers* & *Loubatiers* vocant. In mon
Geneuē cõterminis nascitur, sesqui palmū vix superāte caule, glabro, & iun
ius e medio & summo sape vnū, raro bina, rarissimē toto caule terna aut q
folia, ambitu circinato, & tantillū cristato, superficiei glabra, & rigidū
futa, laure & colore virēre, nonihil ad Cyclaminū accedens: flores lumb
li, Tormentillæ veradiculæ sat multæ, quæ toruli oblongi, vñ quo ex
acutis, supnē autē quasi nodulū collectis, Asphodeli si nōdū dñpā
tem amplexa, quasi caneti forcipulæ. Hæc de Thora Pena p̃ dñpā
Aconito Pardalūche plantam depinxit, quam Herbariorum vñ dñpā

Eib. de Lu
nazis.

14. 17. ca. 11.

Ca. 3. h. 11.

Sam & Vulpinam, alij Herbam Paridis vocant, Germani *Uunßbeere* & *Dolauert*, Sed Aconitorum delineationes hanc eorum speciem non esse arguunt. Præterea deleteriam vim huic inesse plerique negant. Certe antidotis aduersus lethalia pharmaca paratis aduersetur. Dodonæus in Historia stirpium cum Aconitum Pardalianches aliud nactus non fuisset, eius picturam ex Matthiolo mutatis exhibuit, quam haud veram sed nec tiam iustisq; videri diximus, quibus in fine eiusdem Historie assentitur, arque Doronicum Romanum Officinarium, Aconitum Pardalianches antiquorum esse asserit. Et in Historia purgantium Aconitum Pardalianches describit, quod Pena & Lobellius & Herbarij plurimi Doronicum appellant, cuius etiam radiculas passim pro Doronico medicamentorum compositionibus admiscem. Has testatur Lobellius sepius a Ioanne de Vræde Rhizotomo sine noxa vlla impune deuoratas, quamuis canibus perniciosè prodantur. Folia exiunt subrotunda, latis, & luteo vitentibus, mollibus, tenui lanugine pubescentibus, Hederæ cuiusdã, ac vnius Cyclotini foliorum quidem forma, sed amplioribus, ad Cucumeris folia magis accedentibus, minoribus tamen, & mollioribus: caulis dodrante altior, & ipse lanugine haud carens, striatus, & quasi multiangulus, alioqui torûdus, qui in pauculos diuisus ramulos, ipsis fastigiis flores promit, Chrysanthemi æmulos, medio videlicet disco, & orbiculato ambitu luteos, qui in tenues & candi-

Lib. 3. 677.

DORONICVM Rom. Aconitum
Pardalianches antiquorum, Dodon.



ACONITVM Pardalianches
minus, Matthioli.



ACONITVM Pardalianches,
Plinij.



dos pappos resoluuntur. His subsunt exigua nigricantiaque semina, cum de his magna, candida dum recentes sunt, geniculis velut articulata non decidunt, sed graminis modo per obliquum serpunt, & subinde exuberantes a pedibus germina proterudunt, ita sese multiplicante stirpe demissis etiam ab ipsius radicis

ACONITVM *Pardalianches*
Theophrasti, ex Matthiolo.



LIMEVM *Pardalianchis* genus
uno tantum folio, Dalech.



partibus aliquot deorsum concoloribus fibris. Referunt radicula exanimata scorpionem, nam anterior & rubetior cauliculis pro corpore, posterioribus pedibus, posterioribus tam exprimere videtur caudam. Theophrasti Thelyphoni, quod idem esse cum Aconitum Dioscoridis putamus, radicem corporis efficit, scribit, Dioscoridis, & scorpionem. Sed foras, inquit Dodonaeus, hoc addidit, ut cum Theophrasti Thelyphoni scorpionem. Hanc plantam appello Monardella Pardalianches minus, quod Liliaceae familiae est. Aia vero huius Aconiti species est Dodonaeus, antedicta paulo maior, virens, procerior, cuius radix longior mappitur, & adnatis vrinis, canarum pro corpore scorpionem refert. Hanc pro Aconitum Pardalianche Plinij Macdonium dixit, cuius dicitur, quod Theophrasti Thelyphoni & Monardella Pardalianches facit. Hoc radicem non solum quae scorpionem integrum refert, sed folia Cyclamini, radices fibras graminis modo, & similiter scorpionem, & alios rursus scorpiones exprimentibus postea & folia & germina est. Angles & flores nihil ferè a superius dictis differunt, sunt enim aurei oes Chrysanthemum modo. Hanc triplicem proximè explicatam Aconiti Pardalianchis differentiam Pena, & plurimi Herbarij pro triplici Doronitidis agnoscunt, de qua fufius tradidit libro de plantis quae in asperis nascuntur. Hoc folium hoc venenatum, Plinij Cyclaminum quidam tertium esse voluit, radice proterutiosa. Gignitur in niuosis montibus. Aliter prope oppidulum quod Muram videntur, & in luxu cacumine, vel sub ipsa nive, ut nix liquata est sese attollens, & flores non se Maio, vel Iunii principio radice in aequales diuisa, Rapunculis simile, quod Plinij ramosum dixit, fibrata, gustus valde cum terra primum exit, vni folio, crasso, pallide virescente, vni, lateribus Cyclamini simili, paulo rotundiores, nui, dodonaei flore Violae, huius, & alterum subnascitur, non

LIMEVM alterum
duplex folio.

sed longum & angulosum. Tam venenata plan-
ta est, vt cum reces erutam & Ierhaleni adhuc
odoiem spirantem Herbarius quidam mihi
comes curiosius & sepius olfecisset, velut
exanimatus corruerit, vnde & ab eo pulces in-
terfici posse, animo concepio vt arbitror. Alpi-
nas gentes vallis Putz Sagittarum fertur, huius
plantæ succo ungere copertum est ad leuissimam
venatione, inuitabili letho percutibus, quas
sic vulnerauerint, vt vel gutta sanguinis e pla-
gua fluat. Acicula huius succo tincto columbam
leuiter punctum nos paulo post morti vidimus,
cum tam exitiose facultatis periculum facere-
mus. Linguam Plin. ap. lib. 7. quo Sagittas in
venatu Galli tingunt, & ideo venenum cerua-
rium vocant, quidam esse arbitrantur. Hactenus
de Aconito Pardalanche. Nam Lycopodium
seu Cynoctonum ostendendum, alterum
Aconiti summum genus, cuius differentias plu-
res, quam recensuerit Dioscorides, hodie norunt
Herbarij: tametsi ambiguae mediæ ve naturæ
inter Ranuculos, Elleboros & Napellos quædam
earum esse videantur, vt rectè scripsit Pena. Ho-

num Aconitorum quædam luteum florem, alia caeruleum, aut purpurascens pro-
ferunt. Matthioli aliquot Aconiti Lycopodii species proposuit sine vllis descri-
ptionibus, quod appictæ imagines eas ad viuum representent. De floribus tantum
dicit, eos in quarto & nono aureos esse, in reliquis purpureos. Dodonæus in Hi-

ACONITVM Lycopodium II.
Matthioli.ACONITVM Lycopodium III.
Matthioli.

storia

ACONITVM IIII. *Lyc-*
etum, Matthioli.ACONITVM V.
Matthioli.

Historia stirpium Elleborum adulterinū nigrum siluestrem Fuchsy pro L. no primo posuit. In Historia purgant. aliud Lycoetionum maius luteum. folia sunt ampla, vt ipse descripsit, in complures partes confecta, Platanī foliorum similitudine, sed profundioribus diuisuris, haud *maxillata* (vt perperam Dioscorid.)

ACONITVM VI. *Matth.*ACONITVM VII. *Matth.*



ACONITVM Lycoclonum
luteum maius, Dodonaei.



ACONITVM Lycoclonum
Dodonaei ex Cod. Caesario.



his exemplaria legunt (sed non 7^{ma}), id est, minora, resplendentia, ac non raro nigriora, superiore vultu scilicet parti anteriore magis albicare: caulis bipedalis & quandoque altior, rotundus, laevis, ad latus nonnihil inclinans, & nequaquam in totum recte assurgens, in ramos diffusus: flores ordine supra inuicem digeruntur, colore pallentes

pallentes subluteo ! semen in corniculis nigricat : radices sæpius nigre, præterea
 ris crassis & flexuosis implicaræ. In montosis & opacis saltibus, antiquis mona-
 ribus viret. In hortis Galliæ & Belgij colitur. Trium illorum, quorum quædam
 Dioscoridis exemplaria meminerunt, postremum esse censet Dodonæus, Pon-
 cum dictum. Est Marthiolo Aconitum Lycopodium primum. Arabes Stragulatorem ad h,
 id est, lupi appellant, Officinæ quædam Napellum luteum, nonnulli Lupariâ, Germani Vals-
 uurtz, Hispani Yerua matta lomo, Latini Tac lup.

ACONITVM Lycopodium
luteum minus, Dodon.



ACONITVM aliud,
Dalechampij.



Pro deteriore cæteris veneno haberi a venenosis, qui eo lupos interficiunt, non quod illi
 nō faciant alia Aconita, sed quia hæc & cer-
 tius. Quin nonnulli in locis, inquit Pena,
 adulti flores vel folia inaperta fauces tumore
 co excitato adurunt, & verruginem ciunt. A-
 nitum Lycopodium aliud depinxit Dodonæus
 paruum siue minus cognominatu, dicitur
 his ferè verbis. Humilis est herba, ut quæ
 ter foliorum pediculos cauliculos nudi
 bens : sunt autem hi breues, vix palmari
 renues, folium vero in singulis vniuersum
 cum descriptione quidem rotundum, sed non
 Napelli multilidum, & profundis in lobis
 diatim dissectum, quibus medius infidet
 lus luteus, forma Ranūculi, quem tamē
 pirulum, sed siliquæ ponē sequitur, parum
 aut quatuor, sursum arrectæ, veluti Lycopodium

LYCOCTONVM caruleum
flore Delphinij, Dodon.



Radicula subest crassa, tuberosa, primæ Anemones æmula, quasi geniculis aliquot articulata, gustus admodum acris, ex qua foliorum pediculi exeunt. In Belgij hortis floret, inquit, nō rarò ipso Ianuario, cūm clementior Hyems fuerit: vnde Aconitum hyemale siue hybernum illuc dici cœpit. Aconiri autem speciem esse &

LYCOCTONVM *caruleum*
parium, Dodon.



In his pot
gant.

forma foliorum siliquarūque, & pernitiōsa herbæ facultas ostendunt. Matthioli etiam Aconitum Lycoctonum secundum fecit. Vt Lycoctoni lutei, ita carulei aut purpurascētis aliquot sunt species. Prima Dodonæo est quæ proceris caulibus assurgit, instar Napelli: folia habet variè similiter & creberrimis incisuris diuisa: flores secundum caules superius veluti in longam spicam compositos, & puniceo ac obscuriore colore purpuream æmulantes, forma ferè Floris regij (quem Delphiniū multi esse arbitrantur) in posterius videlicet corniculum desinentes: siliquas & semen vt in maiori Lycoctono luteo: radices oblongas, crassas tres aut quatuor, paucis adhærentibus fibris. Altera tota externa facie Napellum refert, caulibus videlicet dissectis, fissis & nigricantibus foliis, flore caruleo, hiante, ex totidem partibus eodem ordine composito, siliquis etiam ac semine omnino similibus: sed radix est diuersa, conis scilicet effigie, bulbosa, ex cuius media basi cirri multi & fibræ tortiles exoriuntur.

Tertium genus cauliculos profert tenuiores, breuiorē, dodrante altiores: folia diuisura Ranunculi aut Lycoctoni lutei, minora tamen: flosculi caruleo nitent colore, paulò minores quàm Napelli: siliquæ & semina eadē quæ aliis: radix fibrosa, nigricans, adnatis exiguis veluti bulbulis faciliè propagatur. Hæc in montibus reperiuntur, vnde in Belgij hortos sunt trās-lata. Primum ac tertium vna cum Napello sæpenumerò aut non multò post, sed secundum multo seriùs floret. Lycoctona est ex ipsa facie perspicuum est, ac nocendi non minoribus facultatibus prædita. Aliud Aconitum ex Dalecham pio hic depictum est, quod candidum & ἀγυλον cognominari potest. In opacis excelsorum montium iugis provenit, tenuibus & perquam multis radicis fibris, nigricantibus: foliis multis, Geranio aut Aconito luteo similibus, longo pediculo & villoso subnixis: nullo caule, vnde ἀγυλον dictum: floribus principio rubore aspersis, sed cum senescunt albicantibus, duobus aut tribus ex summis foliis prodeuntibus, sex foliolis constantibus, singulis suo pediculo singillarim insidentibus. Semen

ACONITVM *candidum,*
ἀγυλον, Dalech.



ACONITI *Lycoctoni* genus
aliud, *Dalechampi*.



Lib. 6. c. 7.
Aconit. no
12.

videre non licuit. Id cum *Dalechampia* Ge-
nium album esse suspicaretur, Hierbary quibus
naturæ & facultatis huius plantæ indagandæ ne-
gotium cõmiserat, venenatam esse, & ex Aconi-
torû genere asseruerunt. Dodon. in *Histo. purg.*
Ranunculum albo flore vocat. Nema aliud ex co-
dẽ Aconiti *Lycoctoni* genus exhibemus, quod
in montosis ac gelidis siluis nascitur, *Lupido* ap-
pellius sæpius ad Orientem versis, ad te per te-
ram serpente, candida, carnosa, æta, e ebri-
colorum nodis scabra: caule sesquipedali, ter-
laceo, foliis. Ebuli, valde serratis, amplioribus, v-
vno pediculo ferè septenis, flore Violæ, e pun-
ceo candicante, semine paruo, in siliquis lani-
sculis. Cum Aconita omnia lethalia sint, quæ na-
la inuehant, & quæ sit omnium communis re-
dendi ratio ex *Dioscoride* & aliis venenosis
ponamus. Aconitum statim atque bibe-
guam edulcat cum quadam adole-
edulcatione vertigines, potissimum emen-
gere conantur, inducit, & oculos in-
tes, pectorisque & hypochondriorum

tem, simulque multi status redduntur. In his, vomitionibus venenum ed-
oportet, & clystere alui purgare. Vtemur in potu Origano, aut Ruta, aut Mar-
bio, aut Absinthii decocto cum vino absinthire, vel Eruca *rebus*, ita
Paulus & Aëtius legunt, quam ætius, id est, *Sempe-
tuum*, vt vulgaria herba est
plaria) aut Abrotani, aut Chamelææ aut *Chamæpityos*. Prodest etiam
opobalsami drachma vna cum melle, aut caltorij & pipæris & ræ-
cum vino. Et coagulum hædi, aut leporis, aut hinnuli cum aceto. Ferit quo-
recrementum, aut ipsum ferrum, aut aurum, aut argentum igne candens to-
restinctum, vt vinam hoc bibatur. Lixiuum item cum vino & gallina
aut cornuum bubulorum iura cum vino sumpta. Dicitur autem *Chamæpityos*
uatim ipsis conuenire. His addit Aëtius, eos qui hausere, post dulcedinem & ad-
strictionem, amari tudinẽ percipere, constrictionem maxillarum comitari, & os
stomachi morsus, caligare oculos, & subrubentes videri, perseveranteque mal-
tremorem concussum tumoresque rotius corporis sequi. Sed eandem meden-
rationem Aëtius & Auicenna præscribunt. Petrus Aponensis libro de venenis,
iis qui Aconitum biberunt sphragidem Lemniam commendauit drachma
duatum pondere ex calida potam, deinde vomitum excitari iubet, a vomitu
riacam eodem pondere exhiberi, ex vino, in quo incocta fuetit Gentiana, præ-
que Aconiti præcipuum esse antidotum Aristolochiam longam. Galenus
Aconitum *Pardalianches* septiciæ & deleteriæ facultatis esse: quare in cibo potu
fugiendum, tamen ad putrefaciendum quædam extra os & sedem aptum
Herbæ autem radix ad hæc utilis est. Aconitum *Lycoctonum* esse sim-
lis facultas, sed peculiariter lupos interficere, sicut illud pardos.

Lib. 34. 49.

Cap. 13.

Lib. 6. sim.



ST & Aconiti Lycoctoni species, qui à Barbaris & recētoribus Napellus a figura Napi in radice apparentis vocatur, a Germanis *Blauveluurtz*, & *Rappenblumen*, id est, flos rapaceus, à Belgis *Blauwvortele*, à nonnullis *Munchi cappen*, id est, monachi cucullus siue cap-pa monachi, à Gallis *Chapperon siue Coqueluchon de moine*. Dicitur & Thora. *Cassia* Nomina
initrit bicubitalem atque etiam tricubitalem, petiolosque graciles folia ferentes Ranunculi maiora, è virore nigriora, supina parte nōnihil albicantia, numerosioribus alrioribusque incisuris diuisa. Flores à medio caule ad summum vsque ordine prodeunt, colore caruleo venusto, cuculli hiantis, aut galeæ parentis speciem omnibus suis partibus referentes: quinque enim constant paticulis, quarum maior & superior cucullo, aut cassidi, capiris cauo operimento similis, duæ mediores latera contegunt, reliquæ inferiores minores sunt, & angustæ, nonnullis ex igitis staminibus medius, villosis, quibus extremis puncta lurida viridiæ insunt: ex medio etiam duo paulum inflexi exoriuntur styli, non prius quàm eleuetur cucullus se exerentes, quos sequuntur siliquæ, in quibus semen nigrum, angulosum ac minutum, vt luteo Lycoctono: radix crassa, oblonga, Napi figura, foris nigricans, intus candidior. In Alpibus Ananiz & Rheriz, rum a ibi in montibus sponte provenit. Apud Belgas quandoque in hortis reperitur. Maio aut Iunio interdum etiam serius aliois locis floret, semen Augusto dat. Auicenna de Strâgularore adib, & Strâgularoie leopardi, rum de Napello seorsum tractauit. De Napello verò hæc. Napellus venenum perniciosum, est in summo calidarius & ticitatis. Delet albas linitum, & confectio eius dicta Alherzachali in potu sumpta delet albas, & similiter confert lepræ. Est venenum destruens bibentem sc, maior verò portio medietas drachmæ vnus, & secundum me, minus hoc internerit. Theriaca verò eius est mus Napelli, & ipse quidē est mus qui eo nutritur. Semina vero (id est, coturnices) ex eo cibantur, & non moriuntur, & ex omnibus confectio-nibus Diamoschum niagis ei resistit. Et alio in loco. Napellus est de deterrioribus. Et accidit potanti ipsum, vt a postementur labia & lingua, & egrediantur oculi eius, & frequens fit super ipsum verrigo, & syncope: & non excercere, seu non mouere potest crura, & est oppidō malum. Er qui euadunt ex eo rarō euadunt quin cadant in hecticam, aut phthisim, & quandoque facit epilepsiam odor eius. Er eius succo imbibuntur sagittæ, & interficiunt quem vulnerant statim. Cura. Oportet vt festinetur ad faciendum vomere bibentem ipsum cum decoctione seminis Napi & Rapæ, & detur in potu vinum, & butyrum coctum vaccinum, dando potum supra porum, & similiter decoctio corticum glandium cum vino. Deinde cura eius principalis est Bezahar, & medicamē de musco, & Algeduar (id est, Zedoaria) & Duha seu bis mus buha, (id est, herba nascens cum Napello, & Napellus Moyfi, animal quod moratur in radice Napelli sicut mus, veluti ipsemet interpretatur) & theriaca magna quandoque Forma.

Lors.
Temper.

Li. a. fen. & tract. 10. 1.
Li. a. fen. & tract. 10. 1.
Pures & Temper.

NAPELLVS, Dodon.



Li. a. fen. & tract. 10. 1.

in loco. Napellus est de deterrioribus. Et accidit potanti ipsum, vt a postementur labia & lingua, & egrediantur oculi eius, & frequens fit super ipsum verrigo, & syncope: & non excercere, seu non mouere potest crura, & est oppidō malum. Er qui euadunt ex eo rarō euadunt quin cadant in hecticam, aut phthisim, & quandoque facit epilepsiam odor eius. Er eius succo imbibuntur sagittæ, & interficiunt quem vulnerant statim. Cura. Oportet vt festinetur ad faciendum vomere bibentem ipsum cum decoctione seminis Napi & Rapæ, & detur in potu vinum, & butyrum coctum vaccinum, dando potum supra porum, & similiter decoctio corticum glandium cum vino. Deinde cura eius principalis est Bezahar, & medicamē de musco, & Algeduar (id est, Zedoaria) & Duha seu bis mus buha, (id est, herba nascens cum Napello, & Napellus Moyfi, animal quod moratur in radice Napelli sicut mus, veluti ipsemet interpretatur) & theriaca magna quandoque Lib. a. fen. & tract. 10. 1.

conferat in eo vique ad terminum. Et de melloribus (scilicet est ut in peris) muschi in fricatione a bezahard, aut quantitas drachmar unus de muschi muschi cum si qua vna muschi. Et existimant quidam quod radices sunt Bezahar Napelli. Et omnia albezahard sunt bona ei, & propterea quod simulata aluminis & habet fila sicut fila lithargyrii. Et animal nominatum mus Napelli, est contrarium Napello, & destruitur eius operatio cum comeditur ex ipso. Hæc Auicenna. Cuius Napellum esse plantam eam quam descripsimus Herbariis persuaserunt seu & atrocia illa symptomata, in quæ inciderunt qui sumpserunt. Tota quidem perniciosus est admodum, sed radix perniciosior, adeo ut manu aliquando interita, inquit Matthiolus, quousque concalescat, neminem perimat. Quoties pastor necatos asserit, qui assendis auiculis Napelli caule pro veru cum se videlicet. Inanis illius in necandis hominibus faolus exempla aliquot idem refert. Eandem evidenti sed perquam miserabili exemplo Antierpt olim compertam fuisse Dodonæus auctor est. Cum enim imperitis huius inter acetaria illarum essent radices, quicumque eas ederunt, seu sumis concepti symptomatis breui interiere. Inter remedia & antia, quibus cum lethalis veneno statim succutendum, Auicennamurem Napelli nutritum refert, qui naturæ huius maleficæ tota substantia aduersetur, & eam ab omni liberet periculo. Matthiolus murem Napelli radicibus videtur se læpius numentum asserit, qui Napellus Mnyfi dicitur ab Auicenna. Paponen etiam Napelli bezahar esse scribit murem nascētem in radice, qui exsiccandus est, & dandus in potu drachmarum duarum pondere. Sed tonius Guarnierus Papiensis, sua ætate celebris Medicus, in tractatu de venis hunc non murem esse sed muscas existimat. Refert etiam quendam philosophum ac veritate studiosum sollicitè admodum & diligenter murem huiusmodi quæ sunt, ne præ vi quam vel mure, vel arrosim etiam Napelli radicem ab eo, tam, sed muscas abunde multas folia depalcentes inuentas, quæ philosophi muris loco accipiens antidotum ex eis confecit, quam & aduersus alia, sed et Napelli venena utilissimam ac efficacissimam comperit. Accipit hæc tentia, baccharum lauri, antidoti Mithridatis singulorum uncias duas, muscas Napelli viginti quatuor, mellis & olei quantum satis est. In eadem planè sententia Pena & Lobellius, scribentes accliuës montium saltus Rheticarum Alpium Napello abundare. Iunio & Iulio mensibus, cui omni illic arroso gramine præpecus olone, nec ab villo animali attingitur præterquam à muscis quæ graminis aduolant, & illi invident, & floribus forte nascuntur: sunt enim ferè coneres, maiores quàm communes, & caputibusque ex lurido viridique velcærente quasi cantharides, vel cincedule. Hæcæ autem se attentius obseruassidem continenter flores rostellis delibantes, cæterum murem Napelli frustra & multis auxillis plantis quæsuissæ, & an vidissent opitiones percunctatos, vique sibi visum negasse. Quare tum suspicatos Arabas ex *μυγ μύ* lexisse, id est, ex musca murem: *μυγ* enim musca est, *μύ* mus: nullum enim antidotum ex mure parant, ex muscis verò præstantissimum aduersus funestum Tatantæ morbum, & epidemicos morbos. Cuiusmodi hoc. Accipe muscas quæ passum acceperunt Napello viginti, Aristolochiæ, Boli Armeni ana drachmam vnam. Nec si vlla planta huic congenere musca hæc carulex insident aut viciant. Quæ est coniectura istum Napellum esse Arabum, & vnum esse ex Dioscoridis Aconitis. Et verisimile est non murem esse qui Napello viciat, sed muscas quæ huius eius viuunt: nam Aconitum, cuius Napellus est species, mures interinunt, & inde *μυγ μύ* & *μυγ μύ*, id est, muricida dicitur. Plantam aliam hæc depicci et Napellum vocant Herbarij ob venenatam facultatem, & Napellum leuca themum seu

In cap. 79
lib. 4.

In Hist.
purgam.

Luc. 10. 10.
Lib. de v.
neum.

mum seu

NAPELLVS *racemosus,*
Dodonæi.



mum seu racemosum cognominant. Nascitur in saxosis, gelidis, & niuosis montibus cum Aconitis inter lapides & fixa: radice longa, laia, innumeris fibris nigris capillata, quæ in plerisque id genus plantis sic complicatur, ut retia temere congesta quis iudicet. Sub his fibris veluti sub fornice inter lapides, ex quibus radix prosilit, cameratum spatium est, in quo mures occultati sæpius deprehenduntur. Caules multos erigunt, sesquipedales, glabros, Filicis modo, nodosos, prope radicem nudos: folia Angelicæ similia, gustus amarissimæ & abominandi, odoris tetræ: floræ in caulium vertice albæ: fructum Hederæ corymbis similem, qui nouem aut decem acinis constat mollibus, nigris. Narrat monium, in quibus hæc planities frequens est, incolæ, ea sumpta lupos & homines necari præsentium exitio. Quidam venenatam esse negant, & Actææ Plinij esse voluit. Actæa, inquit, graui foliorum odore, caulibus asperis, geniculatis, semine nigro ut Hederæ, bacis mollibus, nascitur in opacis & asperis, aquisque. Datur acerbulo pleno interioribus faminarum morbis. Sed

caules asperos Actææ tribuit Plinius, quos in hac nostra læues esse diximus. Quidam Plinij codices habent caulibus Anisi, falso. Cornarius legit caulibus angulosis, & Actæam Ebulum appellatam à Plinio videri ait, & apud Paulum Æginetiam *Lib. 17. c. 7.* radicem Sambuci radicem interpretatur. Dodonæus Christophorianæ nomine describit, & Aconitis adnumerat, propter periculosam & Aconitum similem quam habere creditur facultatem: fertur enim exitialis ac non minus noxia quam Aconitum. *Lib. 1. c. 4. In H. inc. pagant.*

ANTHORA.

CAP. XII.



QUONIAM pessimè consultum humano generi foret, si de venenis ageretur sine remediorum declaratione, huic de venenatis plantis libro postremam addemus plantam, quæ cum aduersus venena omnia, tum maximè aduersus Napellum plurimum valet. Ea est Anthora *Nomina* ra vulgò dicta, quasi Anithora, seu potius Antiphthora, quod Thoræ aduersetur, & eius sit alexipharmacum. Ea, ut ferunt Herbarij, cum Napello vel prope Napellum crescit in Rhetia & Sabaudia alpibus, atque etiam alibi. Taurini Ligures atque Lemani lacus incolæ aduersus exitiale Thoræ venenum diuinitus comparatam esse putant, qui radicem huius copiam Venetias deferendam curant. Caulem proferit sesqui palmarem, interdum cubitalem, rotundum, firmum, in quo tenuia ac multitudine profundisque incisuris hisa disparibus interuallis oriuntur folia, in latus sese diffundentia: flores Napelli æmulos, sed luteos pallentes & minores: siliquas & semen similia. Radices subsunt geminae, solidæ, oblongæ, olivæ pares, sæpe maiores, cortice subnigricante, carne intus alba, cum siccate fuerint fractæ contumaces, friabiles tamen. Scribit Auicenna Napellum Moyse buha herbam esse nascentem cum Napello, eique propinquam ita ipsum debilitare, ut non crescat, neque fructificet, nullum esse hac melius Napelli alexipharmacum, ad omnia

Forma.

Lib. 1. c. 100.

NAPELLVS prior,
Matthioli.

ANTHORA, *sive Anthura*,
Matth. Napellus Moysi.



L. 4. 674.

prodesse ad quæ Napellus, ad albaras & ad lepram, & theriacam esse vipers & venenatorum animalium. Alio in loco tradit Zedoariam illam meliorem esse quæ cum Napello crescit, atque eius vicinia illius vires terundi. Ex quibus colligitur Anthoram esse Napellum Moyfi Auicennæ, & eiusdem Zedoaria. Dicitur tamen Zedoariam habent Officinæ, de qua dicemus in Peregrinis. Amarissima est Anthoræ radix, & non solum Napello & cæteris omnibus venenis aduersatur, sed etiam ad purgationes utilis est: serosos enim & mucosos humores per inferiorem ventrem educit, lumbricos & ventris tineas pellit. Pena & Lobellus æthiopicis. Hugo Solerius scribit hanc radicem ad fabæ magnitudinem in iusculo aut vino derafam propinari ad largas durorum corporum per superna & inferna purgationes. Antonius Guainerius in tractatu de peste refert Anthoram magnæ esse aduersus pestem efficacitæ. Et quod ad experientiam, inquit, vidi consuetudinem Diſtamno virtutis Anthoræ radicem esse. Et est herba quæ iuxta Thoram illam scilicet herbam nascitur, ex qua venenum conficitur, cum quo in Alpes Salutianorum & Pinarolij capras siluestres venantur. Et hæc radix Anthoræ assimilatur nucleis oliuarum, & est bezoar illius Thoræ, quæ est adeo venenosa, ut omnia animalia sua interficiat venenositate. Hæc ille. In collibus prope Diam

Allobrogum ea frequentissima nascitur. Indigenæ vocant *L'herbe du mado*, id est, herbam colicis doloribus utilem. Radicum geminarum altera quotannis, ut in Cynosorchi, flaccescit altera fit vegetior. Credit in eo tractu Herbariorum vulgus, marcescentem radicem coli cruciatus excitare, grandiolem & augeſcentem sanare.



HISTORIAE

OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS-

OCTAVVS,

(1749)

In quo describuntur & ad vinum depinguntur Planta Peregrina.

GUAYACVM. CAP. I.



VLTAE sunt stirpes quæ in remotissimis terrarum oris exoriantur, tam excellentibus dotibus præditæ, ut iis in tanta nostrarum copia carere nec possumus, nec velimus. Raritas pretium & admiratione auxit, & discendi cupidos veteres Græcos, Latinos, Arabas ad earum notitiam comparandam ita stimulauit, ut maria transire, in barbaras regiones proficisci, edita cõscendere, per saltus & auiâ vagari, omnia denique perlostrare, nulliq; labori parcere voluerint. Quare multi quidem multa & præclara de iis literis consi-

gnarunt, sed non omnes omnia quæ viderint, sed auditione dumtaxat acceperint, ob id incerta quadam nonnulla fabulosa tradiderunt. Nunc verò cum regiones multæ illis prorsus ignotæ, & velut alter orbis detectus sit, iisdem discendi stimulis concitati seduli & indultivi viri, multò plura quàm veteres obseruarunt, multòque veriora & certiora de aliis quæ ab illis tradita fuerant, literarum monumentis mādauerunt. Ex quibus ea promptissimè quæ studioso lectori satisfacere possunt. Sed multas peregrinas plantas, quæ ex iis manant, aliis libris exposuimus, ut in Silva Siliquam catharticam, Ficum Nigritarum, Populum Peruanam, Ahouai, Hairi, & plures alias in Cathartici Aloë, Rhabarbarum, ordine & quadam cum aliis similitudine id postulante. Nunc de peregrinis arboribus, fructibus, herbis agemus, quarum fructus, cortices, ligna, radices, semina, succi, resinæ, gummi magno ac quondiano nobis vtili sunt. Exordiemur autem à Guayaco omnibus notissimo. Indi *Guayacan* vocant, nos Guayacum, siue Gaicum, alij Lignum Indicum. Hoc alij Ebenum esse dicunt, aut Buxi speciem, alij aliis nominibus appellat. Sed nouum est arboris genus nec in his regionibus aut viliis aliis toto orbe veteribus cognito visum, sed in eo solo ubi nuper inuentus est, quæ sic descripsit Nicolaus Monard. Magna est arbor, llicis magnitudine, ramosa, matrice magna, nigricante, materie quàm Ebenus durior, cortice crasso, gummoso siue pingui, & cum siccu est lignum facit decidens foliis exiguis & duris: flore luteo, cui succedit fructus rotundus, solidus, quo semina continentur veluti in mespilo. Frequens nascitur in insula S. Dominici. Aliud eius genus in insula D. Ioannis de portu diuite postea

Nomina

Forma

Loco

reperitum est, superiori ferè simile, sed minus omnino, & ferè sine matrice, odora-
tius & amarius superiore, quo uti desiere ut istud vsurparent, ob admirabiles vir-
tutes Lignum sanctum appellatum: experientia enim docuit altero præstantius
esse. Quanquam vtriusque facultates in curanda lue venerea maximè sint effica-
ces: quare ad eam curandam siue coniunctim, siue separatim vtriusque propinatur
decoctum. Secundum istud genus videtur esse, quod Pena Palmam aut Palum san-
ctum Indix occiduz vocat, quam speciem à Guayaco diuersam facit, etsi similis
esse dicatur, nempe non vasta ut Fraxinus, sed minor, & concolore cortice: foliis
Plantaginis, sed crassioribus, minoribus, pinguioribus, breuioribus: fructu iuglan-
dis magnitudine, aluo subducendæ idoneo. Idem Pena Palmæ sanctæ fructus ar-

*PALMÆ sanctæ simi-
lis arbor.*



boris à naucleris Angliæ, qui ex India redierant, furculos se habuisse scripsit, quos depulit & descripsit his ferè verbis. Rami sunt grandis arboris, recti, cortice arboris ludæ, folio Cor-
carnoso, nudo, quam Lauri latiore, breuiore, nervoso, in quorum summitate hærent foliola pallidi, coriacei, circinatæ rotundati, almu-
dum compressi, auteo nummo Gallici ferè resin quorum medio insunt semina leu-
gie & colore, compressiora, gustu amariora. Hæc ex Pena. Quomodo autem & quomodo
Guayaci vsus primùm innotuerit, ita narrat Hispanus quidam magnis doloribus Hy-
ci morbi, quem ab Indā muliere contraxerat, torquebatur, cuius seruus in ea provincia me-
dicinam faciens decoctum Guayaci protinuit, quo non solum à magnis doloribus liber-
auit, sed etiam pristinæ sanitati restituit, cuius exemplo multi alij Hispani eodem morbo infecti curati sunt. Eius morbi curatio His-
pali statim euulgata fuit ab iis qui ex ea redierant: hinc per totam Hispaniam, inde per
vniuersum orbem, quem hæc lues paulatim oc-

cupauit. Atque hoc sanè medicamento nullum aliud aduersus eum morbum præ-
stantius, sic volente Deo, ut vnde manarat morbus, inde remediū peteretur. Nam
primùm ex India occidentali hoc malum duxit originem, præcipuè verò ex insu-
la D. Dominici, quæ prima fuit noui orbis ab Hispanis occupata, vbi morbus
tam familiaris est, quam nobis papulæ, neque eius contagium magnopere
quam reformidat. Hoc autem modo propagatus fuit. Anno à Christo nato 1493
eo bello, quod Neapoli gestum est à Carolo Gallorum rege, Christophorus Co-
lumbus ex prima illa profectioe, quam noui orbis conquirendi causa suscepit,
cùm rediisset, & inuentis S. Dominici aliisque insulis inde Neapolim (ibi tum Rex
Catholicus erat, pacemque cum Gallorum rege fecerat) viros ac mulieres secum du-
xisset, commeantibus vltro citroque excercitibus, Hispani primùm cùm Indis mu-
lieribus hac scabie correptis, & Indi cum Hispanis consuetudinem habuerunt
deinde ad Italos & Germanos, postremò etiam ad Gallos serpsit hoc malum, ac
inde per vniuersum orbem. Ad huius perfectam curationem nullum aliud præ-
stantius remedium, quam Guayaci decoctum pro morbi magnitudine, ægri vni-
bus, & totius corporis temperatura à medico præscriptum: est enim eius modica
antidocum, neque eum curat manifestis suis quali-
atibus. Nam gustus ex Galien
doctus

*Vires &
Temper.*

doctrina in lib. de Simpl. medicament. facultatibus tradita, sic ex admodum & calidæ substantiæ esse demonstrat, quod amarum sit eius decoctum & acce, ut calidum ad tertium vsque gradum esse censetur, & habere partes *triplices*, nempe subtiles, in quibus acrimonia, & terrestres adulas in quibus amaritudo consistit quare tantam sustinet decoctione, adeo ut si decies decoxeris, paulo minus amarum, acce & spissum fuerit hoc decoctum quam primum, vixque virtus extrahi possit. Cum igitur is qualitatibus prædictum sit, non solum is non curaret hunc negotium, qui ex calida & sicca oritur hepatis intemperie, imò potius exacerbarer. Ex quibus liquet occulta qualitate, & forma specifica, ut aiunt, id agere, quod semadmodum & multa alia medicamenta. Conuenit etiam huius ligni decoctum incipiti hydropi, asthmaticis, epilepticis, morbis velicæ & renum, articulorum doloribus, omnibus morbis qui ab humoribus frigidis & flatibus proueniunt, & diuturnis, quibus nihil profuerint cætera medicamenta quæ in vsu sunt quotidiano, præsertim si morbi illi suum veneram subsequantur. Dentes etiam confirmat & dealbat, si sæpius eius decocto colluantur. Qua verò ratione præparandum sit ligni huius præstantissimi decoctum, quis eius vsus, quæ eo ventibus victus ratio seruanda, non est quod hic explicemus, cum hæc omnia lippis & tonsoribus iam sint notissima.

EBENVS.

CAP. II.



EBENVS, Græcis, Ebenus Latinis, Arabibus *Abanus*, & *Abenus*, Italis *Ebeno*, Gallis *Ebene*. Ebenus opuma, inquit Dioscorides, habetur Æthiopica & nigra, nullos habens venarum discursus, factio cornu laeuore similis, cum frangitur densa, mordens gustu & subadit ingens. Saturatur iucundo odore super carbones sine fumo. Recens igitur admodum ob pinguedinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est Indica lineas albas habens & fuluas, item frequentes maculas: cæterum prior bonitate antecellit. Theophrastus in India tantum prouenire Ebenū scribit his verbis. Ebenus quoque Indicæ peculiaris est, cuius duo sunt genera, vnum laudatum in materie pulchrumque, alterum ignobile. Quod præstantius, rarum, alterum copiosum. Coloris graniam non recondita acquirit, sed statim sua natura habet: fructuosa est arbor Cytisi modo. Idem cecinit Maro.

Nomina

LIB. XVIII.

Forma.

Lib. 4. hist. cap. 4.

Lib. 1. Geor.

-sola In lib. nigrum

Fert Ebenum, solis est thurea, virga Sabæ.

Hos secutus Plinius, Vnam inquit, è peculiaribus Indicæ Virgilius celebrauit Ebenum, nusquam alibi nasci professus. Herodorus eam Æthiopix intelligi maluit, in tributi vicem Regibus Persidis è materie eius centenas phalangas tertio quoque anno pensitas Æthiopus cum auro & ebore, prodendo. Et mox, Æthiopix forma nuper allata Neroni principi, rarain arborem Ebenum Meroën vsque à Syene sine impetu per nongenta xvi. m. passuum, nullamque aliam nisi palmarum generibus esse docuit. Accendit eam Fabianus negat: virtutem autem odore iucundo. Duo genera eius, rarum id quod melius, arboreum, trunco enodi, materie nigri splendoris, ac vel sine arte protinus iucundi: alterum fruticosum Cytisi modo, & tota India dispersum. Theuetus scribit Indiam ferre & alere tantopere laudatam Ebenum, sed præcipuè in insula quam Palmobotte vocant præstantissimam & nigrâ colligi. Cæterum an Ebenus quæ ad nos adfertur legitima sit, meritò dubitari potest, quod iussu nullum iucundum odorem emittat. At hic tempore & longo permatia utinete euanescere & perire potest. Eum Officinæ pro Xyloaloe habent. Nec obstat, inquit Pena, quin Officinarum Ebenus species sit Guayaci. Nam prædura assule, quæ in Officinis videntur, & aquis meris sedunt, tum pinguedo

Lib. 1. cap. 14.

Toz. lib. 4. cap. 11.

guedo, quæ exudat igni perinde atque à Guayaco, tum aspectus ipse, tum vires & sapor id testari videntur. Præterea odor ei inest Guayaci, & vires ad eadem quæ Guayacum commendantur. Quod si quis obiiciat solam Indiam nigram ferri Ebenum ex Poëta, respondet Ebeno idem euenire posse quod Guayaco, quod nō modo in Taprobanæ finitimis ad Orientem & Austrum, sed etiam in India occidua longissimè disita siluestris proveniat. Ebeni facultates has esse scribit Dioscorides. Caliginem oculorum deterget ad veteres destillationes pustulæq; mirum in modum pollet. Si quispiam facta ex eo corticula collyriis vtatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentave in vino Chio die noctuq; macerata in collyria digerantur. Nonnulli pertrita ipsa excoquant. Alij pro vino aqua vtuntur. Vt itur in hētili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plūbi vsti modo, & ita siccis scabritq; lippitudinibus cōducit. Plinius aliter de eadem re disserit. Non omittetur Ebenus propter miraculum. Scobem eius oculis vnicè mederi dicunt: lignoque ad cotem trito cum passo caliginem dissipant. (Dioscorides dixit lignum vice cotis ad terenda collyria paratum valius esse.) Et aqua verò radice, albugines oculorum item tulsim pari modo. Dracūcia ad hoc adiecto cum melle. Ebum Medici & inter erodentia assument. Quæ postea, Ex aqua vero, &c, Dioscorides non habet, Galenus etiam prætermisit. Ebum requirit, ex iis lignis est quæ trita cum aqua in succum soluntur, vt lapidum nonnulli. Vis ei inest calfaciendi, extergendi, & tenuium partium. Quapropter pupillas offuscant extergere creditur. Miscetur alijs remedijs ocularibus, quæ ad vlcera vetera, fluxiones, & pustulas accommodata sunt.

T H V S.

CAP. III.

Nomina

L. 1. 2. 2. 3. 4.

Lib. 1. 1. 1. 1.

c. 1. 1. 1. 1.

Lib. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.

L. 1. 1. 1. 1.



RALCIS *Albicus* & *Albicus*, Latinis Thus, Auicennæ Conder. S. pioni Rondet corruptè, Italis *Incenso*, Germanis *Purrauch*, Hispanis *Emenso*, Gallicis *Encens*. Thus, vt refert Dioscorides, in ea Arabia vtitur quæ Thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere quod, ut ait, ulum Stagonias appellatum, natura rotundum, cum frangitur in quatuor, in fustitu statim ardens. Indicum verò suffuluum est, & colore liuidum, rotundum industria facit, nam in quadrangulares formas dissectum huiusmodi versant, donec rotunditatem contrahat. Verum huiusmodi Thus temporè uescit, quod Atomum, aut Syagrum appellant. Secundum locum habet Arabum & in Sinio nascens, quod aliqui Copileum vocant, minus multo & fuluus. Eius genus cui Amonitæ cognomen est, alioqui candidum, quod dum molitur, mulchiches more digitis cedit. Adulteratur in itinere Pini resina & gummis quod facile deprehendi potest, quod fustitum gummi flammam non eiaculaur, & resina fumum euanescit. Thus verò statim ardetidem maleficium odor prodit. Huius Thure Dioscorides, cuius historiam fusiùs ex Theophrasto & Plin o descriptum non inhiucundum fuerit. Gignitur Thus, præter Arabiam nullis, ac ne Arabiæ quidem vniuersa, sed priuatim in medio ferè regionis, circa Aramitas pagum Sabæorum. Spectat is locus Orientem æstiuum vndique rupibus inuius, & à desertis aridis scopulis inaccessus. Siluarum Thus proferentium longitudo est centum milia passuum. latitudo dimidium eius: quas & Minxi attingunt pagum alium incolentes, per quos Thus euehitur vno tramite angusto, à quibus etiam Thus Minxi dictum est: etenim hi primi commercium Thuris fecere, maximèque id exercent. Cæteris Arabibus videre Thuris arbores interdictum est: huius exceptus, ac ne Minxi quidem omnes has arbores videre possunt: us enim in Thus & legendi potestas trecentum tantum famulatum esse dicunt, quæ id sibi per successionem vendicant, quæq; ob id sacra vocantur, quia cum incidunt has arbores, aut nec

fæcunda sunt,

fœminatam, nec funerum congressu polliuntur, atque intra religioſam circumſpectantur. Quidam promiſcuum ius iis populi eſſe tradunt in Arabiis, ubi per vices annorum diuidi. Cæterum quæquam priſci Romani in Arabia ſolent præſentare, tamen arboris Thuits facies a nullo quod ſciam, inquit Plinius, Læſiſſimo tamen eſt. Græci quoque variant. Alij enim, vt ſcribit Theophræſtus, ſolæ Myræ introſuntaxat, & heibidi coloris prodidere. Alij Lætiſco ſimilem, ſicut in ſolis arboribus tradidit contorti eſſe caudicem, ramiſ Aceris maxime Poſuici, ſicut in ſolis arboribus modo emittere, talique in Carmania apparere, & in Aegypto ſitæ in diſſidis arborum regnantium. Cortice eſſe Lauri conſtat quidam & ſolum ſimilem. Talis certe fuit arbor Sardibus, nam & Aſia Reges ſerendi cauſa habuere. Quam ætate Legati, inquit Plinius, ex Arabia venire, omnia in Carmania fecerunt, quod iure miſemur, vti gis etiam Theophræſtus ad nos comineantibus: quous credi poteſt matrem quoque & eteſa enodiſſima, e trunco Mei ſemelano ſolent matrem occiſione vendendi. Deinde quæſtos alteram vindemiam auſit. Prior atq; naturalis vindemia, circa canis ortum flagrantillimo æſtu, incidemibus qua maxime videbatur eſſe prægnans, tenoſiſimulque tendi cortice. Lætiſſima hic plaga, no adimitur. Inde proſilit ſpuma pinguis. Hæc concreta denſatur vbi loci natura poſcit tegete palma excipiente, alibi terra circumpauit. Purius illo inodo, ſed hoc ponderoſius. Quod in arbore hæſit, ferro deſecitur, abſque corticoſum. Autumno legiſſur ex æſtuo partu. Hoc puriſſimum, candidum. Secunda vindemia eſt Vere, ad eam Hyeme corticibus inciſis. Ruſum hoc exit, nec comparandū priori. Creditur & nouellæ arboris candidius, ſed veteris odoratus. Quod ſi in ſolis melioris gigni putant. Iuba in inſulis negat naſci. Hæc de Thuiſe veteris literis mandatur, quæ omnia recentioribus non probantur. Primum Garcias per vniuerſam Indiam Thuſ minime prouenire certifiſſimum eſſe ait, & quicquid Thuris hic colligitur, & hinc in Luſitaniam deſertur, ex Arabia aduehi aſſerinat. Quare miratur Dioſcoride & cum ſecutum Auicennam ſcripſiſſe Thuſ in India naſci. De Arabibus tamen minus mirum, qui nigricantem colorem Thuris Indici ex Dioſcoride, Indu in ea ratione vocare poſſunt, qua Myrobalanum nigrum, Indum. Cæterum Thuſ Arabibus dici Louan, idem Garcias auctor eſt, nomine ex Græco deducto, eoque ſolo nomine ab omnibus vocari, à pauciſſimis Conder. Arborem etiam quæ Thuſ producit Louan ab iſdem appellari, cuiusque duo eſſe genera. Vnā montanam, alteram in planis naſcentem. Montana montibus confragoſis prouenit, optimūque & laudatiſſimum Thuſ proſert. In planis naſcens Thuſ proſert nigrum & improbum, quo cum aliis reſinis petmixto naues picant, vti nos pice. Ex arbores ſunt Regis, nec cinquam Thuſ colligere licet niſi Regis permiſſu. Conſuunt eo negociatores ex Aden, Xael, & aliis Arabiæ locis, & cum Rege de Thuris quantitate quam auerturi ſunt, & de pretio conueniunt, modò laudatum ſit ac legitimum, quod nos maſculum appellamus, ipſi Meluo. Arbor Thuris humilis eſt, & folia habet Lentifco ſimilia, peculiarisque eſt Arabiæ. Aiunt tamen Hiſpani in nouo orbe etiam Thuſ inueniri. Sed fides penes eos eſto. Cum autem optimi Thuris ſatis vile ſit pretium, improbi verò, quod interdum cum optimo miſcetur, & cui nonnunquam corticum fragmenta inhzrent, multò vilius, id minime adulteratum ad nos deſecti putat Garcias. Quis enim, inquit, adulterare vellet, quod tam vili eſt? Theophræſtus à Garcia diſſideſcribit enim arborem Thuriſeram Pinus reſiſiferas referre, & ſuccum fundere, qui tempore dureſcit, & Thuſ vocatur, cum quo granula reperiuntur arenæ aut ſibulo ſimilia, quæ Mannam Thuris vocant. Multas inſulas & regiones huius eſſe ſeraces, non ſolam Arabiam, & quibusdam etiam locis tam vulgarem eſſe, quàm Aurant am malum in Galliæ Proſpericia. Thuſ tamen quod in Arabia creſcit, & à Pecher & Fartach regni Aden oppidis

Lib. Aren.
Ind. cap. 6.

Nomina

Genera.

Forma.

Tot. Col.
mog. lib. 4.

ARBOR *Thursifera*,
Theueti.

men nihil ille, sed sibi relatum à nauis utrumque trunci Pino simi is sobole. At folium quia rarissimum, neque à quopiam vnquam expressum, pictum magis sciscitaturus sit ne plantæ resinifera, quam asserturus. Est enim quod aliis contigit, ab imo pediculo ad summum vsque cuculli verticem de-

THURIS *lympidis*
folium, Pena.

Lib. 1. c. 90.
Vpes.

oppidis defertur, vt olim, ita etiam hodie præstantissimū haberi, quod à prisks magna cum superstitione colligebatur. Id duplex esse. Vnu quod æstate, & quandiu Sol sub cane est, colligitur, candicans, parum, nitidum, pellucidum: alterum quod Vere rubescens, pondere, pretio, bonitate & viribus superiore multo infestius, quia illud maturius, & à Sole sub coriace suæ arboris magis excoctum esse videtur. Arabes cultris arbores vulnerant, vt copiosior liquor effluat, que n *Albouor* vocant. Ex his arboribus quædam sexaginta Thuris libras, & copius emittunt. Arboris ic nem ex Theuero expressimus, & eliciendi Thuris rationem. Thuris lymphidum & pellucidum, nitoremque accuratam succini assecutum se vidisse & habet scribit Pena, quod Dioscoridis notis quædam: nam dum adolebat suauissimum spargebat odorem, & vulneribus tumore discutiendi vi relicta aliqua adstrictione habebat partis suam erat auxilio: se Rursum docto Medico Launano gummi istius arboris fructu & folio donatum. Asserte-

quasi ex geminis tenuibus conflatum, & gina sesquipalmum longa instar in indistinctis histronis speciem præ se ferentis, superleata, quod de floribus Napelli & de Londæ non de foliis vllis memorant auctores. Numplificandæ Thuris vires, & magnæ ac certissimæ uersus varios morbos, tum internos, tum externi utilitatis. Calefaciendi & adstringendi vi auctore Dioscoride, oculorum caliginem ducæ caua vlcera replet, & ad cicatricem perducit: cruenta vulnera glutinat, infrenatque cunctas sanguinis eruptiones, etiã msi cerebri membram effluat: vlcera quæ cacoëthe vocantur, & sedis & reliquarum partium permulcet tritum cum eo & lacte linimentum: formicantes verrucas inter initia, impetiginisque ex aceto & pice illitum tollit: ambusta igni pernionesque cum suillo adipe, aut anserino, & vlcera in capite manantia cum nitro si infricetur sanat: paronychis cum melle, autibus fractis cum pice medetur: ad reliquos autium dolores cum vino utuntur: inflammata à partu mammarum cum cimolia & rosaceo magna utilitate perunguntur: addit ad arteriarum viscerumque medicamenta prodest sanguinis excretioni: potum: sed in secunda valetudine haustum insaniam mouet, & largius cum vino potum interficit. Cortici Thuris eadem vis quæ Thui, sed validior, adistinctiorque. Quare potu cruentis excretionibus & vuluis fluxione laborantibus

tibus in pello confert, ad cicatrices oculorum, & caua fordeſque efficax eſt, toſtus ſcabris lippitudinibus auxiliatur. Manna Thuri: (Sic micas Thuris concuſſu eltiſ vocamus, inquit Plinius) vim habet eandem quam & Thus, ſed inualidiuſculam. Fuligo Thuris oculorum inflammationes mitigat, fluxiones ſuſpendit, vlcera purgat, caua replet, carcinomata ſiſtit. Galenus diſtinctius eadem declarat. Thus excaſcit ordine ſecundo, deſiccatur primo, habet quoque adſtriſionem puſillam. Sed minimum manifeſta adſtriſio eſt candido. Cortex eius euidenter adſtriſit: quare ſtrenue quoque deſiccatur, adeo vt ex ſecundo ſi ordine completo deſiccantium. Eſt autem craſſiorum partium quam ipſum Thus, & minimum habet acrimoniæ. Ob has ergo tum facultates, tum qualitates, multus eſt eius uſus apud Medicos in hæmoptacis, ſtomachicis, cœliacis ac dyſentericis, non tantum iis quæ extrinſecus applicantur ipſum admiſcentes, ſed & iis quæ intro in corpus ſumuntur. Fuligo eius tum ſiccioris, tum calidioris eſt facultatis quam ipſum Thus, adeo vt ad tertium uſque exceſſum perueniat. Habet verò etiam abſterſorium quiddam. Itaque eo nomine & repurgare, & implete quæ in oculis conſiſtunt vlcera videtur, veluti & myrrhæ & ſtyracis. Hæc Galenus. Quod verò Dioſcorides dixit Thus in ſecunda valetudine hauſtum inſaniam mouere, nullus alius Græcorum ſcriptorum, quod ſciam, prodidit. Contrà Auicenna tradidit Thus conferre rationi, ipſamq; corroborare, & eſſe quosdam quibus præcipitur, vt eius inſuſum bibere aſueſcant ieiuni, ſed eius uſum plurimum dolorem capitis excitare. Id tamen quod ille dixit Thus largius cum vino potum interficere, Auicenna etiam uſum eius plurimum cum vino interficere, ſimiliter cum aceto. Serapio locum Dioſcoridis ſic conuertit. Et quando bibunt de eo ſani, parum meliorat eos, ſed ſi nimis cum vino biberint, inducit maniam, & amplius cum vino occidit.

Li. 7. ſim.

Li. 12. 13.

Lib. 6. mpl.
cap. 17.

MYRRHA.

CAP. IIII.



MYPPNA Græcis, Latinis Myrrha, Arabibus *Ler Mur*, ſeu *Mor* appellatur, *Myrrha* Italis, *Mirren* Germanis, *Myrrhe* Gallis. Myrrhâ ſc. hic Dioſcorides lacrymam eſſe arboris quæ in Arabia gignitur Ægyptiæ ſpinæ non diſſimilis, è cuius vulnere deſluit lacryma in ſubiectas tegetes, alia circum caudicem concreſcit. Deinde genera eius recenſet. Dicitur aliqua pediaſimos, præpinguis, quæ expreſſa ſtaçtè emittitur. Alia gabireæ pinguiſſima, læto & pingui ſolo naſcens, ea copioſam ſudat ſtaçten. Omnium prima eſt quæ Troglodytica appellatur, accepto cognomine à loco in quo prouenit, ſplendens, ſubuiridis ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quædam, quæ à Troglodytica ſecunda eſt, Bdellij modo mollis, verum odore grauiuſcula, apriſci naſcens. Alia caucaſis cognominatur, præter modum exoleta, nigra & retorrida. Omnium deterrima quæ Ergaſima dicitur, pingui carens, cano ſitu obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & viribus eius proxima. Improbatur Aminææ cognomine. Eligenda eſt recens, ſqualore obſita, leuis, vndique concolor, quæ contraçta venas vnguium modo candidas & læues oſtendit, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens: ſuperuacua & inutilis eſt ponderoſa, coloris picei. Plinius cum de Thure ſcripſiſſet, hæc de Myrrha literis mandauit. Myrrham in iſdem ſiluis permixta arbore naſci tradidit aliqui, plures ſeparatim. Quippe multis in locis Arabiæ gignitur. Conuehitur & ex inſulis laudata, petuntque eam etiam ad Troglodytas Sabæi tranſitu maris. Satiua quoque prouenit, multum ſilueſtri prælata. Gaudet raſtris æque ablaqueationibus, melior radice reſrigerata. Arbori alitudo ad quinque cubita, nec ſine ſpina, caudice duro & intorto, craſſiore quam Thuris, & ab radice

Nomina
11. 12. 13.
Forma.

Genera.

Electio.

Lib. 12. 13.

etiam, quàm reliqua sui parte. Corticem læuem similèmq; vnedoni: scabrum alij spinosumq; dixere. Foliū Oliuæ, verùm crispum & aculeatum. Liba Oluferi. Aliqui similem Iunipero scabriorem tantum, spinisq; horridam, folio rotundiore, sed sapore Iuniperi. Nec non suere qui è Thuris arbore vtrumque nasci mentirentur. Inciduntur his & ipsæ, iisdemque temporibus, sed à radice vsque ad ramos qui valent. Sudant autem sponte priùs quàm incidantur, Stactem dictam, cui nulla præfertur. Ab hac siliua, & in siuestri quoque melior æstiuu. Geneta complura. Troglodytica siuestrium prima. Sequens Minæ, in qua & Atramitica est, & Aufariis Gebanitarum regno. Tertia Dauitis, Quarta collaritia, Quinta Sembrocena, à ciuitate regni Sabzorū mari proxima. Sexta, quam Dalatin vocant. Est & candida non tantum loco, quæ in Messalum oppidum confertur. Probatur Troglodytica à pinguitudine, & quod aspectu aridior est, sordidæque ac barbara, sed acrior cæteris. Sembrocena prædictis caret vititiis, ante alias hilaris, sed viribus tenuis. In plenum autem probatio est minutis glebis, nec rotundis, in concreto albicantis succi & tabescentis: atque fracta candidos vngues habens, gustu leuiter amara. Secunda bonitas intus variaz. Pessima intus nigra peioris, in fortis. Hæc Plinius, qui magnam partem ex Theophrasto mutuatus est. Gygæni, inquit, Thus & Myrrha in regione Arabum media, circa Saba & Arramua & Citibæna, & Mamah. Nascuntur autem Thuris & Myrrhæ arbores aliæ in monte, aliæ in pede montis culturis propriis. Quamobrem aliæ coluntur, alie nemè. Montem istum aiunt esse excelsum, & ningi solitum, amnèsque ex eo in aqua fluere. Myrrhæ arborem minorem esse Thuris arbore, fruticosiorèmq; durò & contorto iuxta terram, crassiorèque sura hominis, cortice læui, & Andrachne. Alij qui se vidisse affirmant de magnitudine ferè non conueniunt, neutram earum arborum magnam esse aiunt, sed minorem Myrrhæ herbamque eius folium esse aculeatum, non læue, Vlna simile (*ωροσηρ*) habent vulgata exemplaria, Plinius legit *ιδαια*, id est, Oliuæ crispum tamen in extremo aculeatum Illicis modo. Alij Myrrhæ arborem Terebinthi similem tradidere, sed scabriorem spinosiorèmq; folium paulò rotundius, quod proximum Terebintho. Quidam, sed falsò, Thus & Myrrham ex eadem arbore scisci putauerunt. Hæc de Myrrha veteres prodidere. Ex recentioribus Garcipis plurimam etiam adferri ex Arabia ad nos Myrrham, quæ Indis Boladum etiam ex regione Abexini quæ Æthiopiz est. Qualis verò sit arbor, quæ profert, aut qua ratione eliciatur, nunquam se scire potuisse air. Illud addit, quod quodam mercatore qui in Melinde & Mosambique negociabatur, tum a quodam sacifico Æthiopiz, & episcopo Armeniz intellexit, genus esse quoddam hominum montanum & siuestre (*Bodans* vocant, linguæque pura Arabi non nihil Chaldaicam, aut Syriacam antiquam accedit, vti ferunt) quod Myrrham in Bratta & Magadaxo terrestri itinere adfert, & è Chaldaea regione vocata se deferre asserit. Theuetus falsum esse air quod Plinius Sabæos petere Myrrham scribit à Troglodytis transitu maris: quia tum veterum, tum recentiorum auctoritate regio hæc eo loco sita est, qui mille, aut mille & ducentis leucis à Arabum regione distet, qui omnium eorum, qui per hæc loca peregrinati sunt, testimonio nunquam tam longas peregrinationes aggrediuntur. Præterea non stat nullum esse in Arabia tam diuitem, qui nauim adornate & instruere possit omnibus ad nauigationem necessariis, quæ ad Troglodytas vsque pene non potest situm esse creditur inter regnum Celala, & desertum Paucal, ad altitudinem præmontorij Bonæ spei, regionis frigidæ & ferè inaccessæ ob indigenarum barbariam. Ad hæc eos erroris insinuat, qui putant Myrrham locis frigidis & humis perfectionem suam adipisci, & arbores Thuris Myrrhæque feras nusquam excoli.

Lib. 9. hist.
cap. 9.

Lib. 1. Aro-
mat. Ind.
cap. 3.

eodem in loco provenire, niuésque iis in locis in quibus nascuntur frequentes esse: nam se vidisse asserit duo penè millia huiusmodi arborum in eadem silva permixtarum. Perinde falsum esse ait Myrrham quam Arabes per mare rubrum in Alexandriam Ægypti camelis important, Indicam esse, cum ipsimet Indi & Insulares Asiatici eam ex felici Arabia petant. Cùm verò Myrrha Dioscoride auctore quadantenus viridis sit, pellucida, gustu acri cum amarore, negat plerique Myrrham genuinam ad nos deferri, cum ne in Alexandria quidem vix reperitur quæ non adulterata sit, qui enim eam vendunt, multis modis corrumpunt ac vitiant, Christianos irridentes qui tam curiosè emunt. Quamobrem quæ publicè venit, tantùm abest, ut virescat, pinguis & gummosa sit, ut potius arida sit, exusta, nigra vel pallida, & faciliè in puluerem dissiliat. & gustu vix amara cum acrimonia sentiat. At si talis sit Myrrha quæ passim in Officinis habetur, tamen nos vera non carere cetum est: aduehitur enim quandoque quæ legitima, ac probatissima sit, sed ea rara admodùm. Pena quod Bdellium putatur certò se scire ait, & à

*MYRRHA aut Bdellium
suo furculo spinoso ha-
rens, Pena.*



Rondeletio experimèntis persuasum fuisse optimè viribus Myrrhæ respondere: idèò Myrrhæ speciem esse credit, nec vulgare rationis momentum addit, Londinum allatas fuisse multas peregrinas merces, inter quas plurimos huiusce ligni furculos perquisiuit, solida substantia, cortice duro, nigricante, spinis multis rigidis & crassiusculis horrentes, in quibus multa copia Bdellij congesta, intus forisq; valde amari: cætera Dioscoridis descriptioni admodùm similia. Ad id quod de colore obiciunt respondet se vidisse in Officina Gulielmi Driesch pharmacopœi Antuerpiensis fuluam, albescentem, viridem etiam Myrrham. Has eius vires Dioscorides recenset. Calfacit, soporem gignit, glutinat, siccatur, adstringit, vuluam emollit, & præclusam aperit: menses & partus celeriter extrahit cum Absinthio, lupinorum cremore, vel succo Rutæ admota: magnitudine sabæ deuoratur in vetere tussi, orthopnœa, in laterum pectorisq; doloribus, in alui profluuiis & dysenteria: horrores discutit duabus horis ante febrim accessiones, sabæ magnitudine pota cum pipere & aqua: subdita linguæ liquataque scabritiem arteriæ expolit, obtusam vocem ex-

*L.L. ca. 67.
Vires.*

pedi: ventris tinea enecat, contrà grauem oris halitum manditur, & aduersus alarum tædia cum liquido alumine illinitur: gingiua & dentes stabilis, colluto cum vino & oleo ore: vulnera capitis illita glutinat: medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis peruncta cum cochleæ carnibus: item purulentis auribus inflammatisq; cum meconio, castorio & glaucio. Ad varos cum calsia & melle illinitur: imperigines ex aceto purgat: defluentes capillos cum ladano & vino myrteo illita firmat, oculorum vlcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiam læuigat. Scribit Galenus Myrrham secundo esse ordine tum exalfacientium, tum desiccantium. Quare capitum vulneribus illitum glutinare ea posse. Inest & amaritudo non pauca, per quam foetum & lumbricos tum enecat, tum eicit. Inest ei & abstergendi facultas. Sic igitur ocularibus miscetur

L.L. simpl.

medicamentis, quæ ad vlcera & crassas cicatrices præparantur. Eadem de causa additur & medicamentis quæ ad tussim veterem & asthma exhibentur: non tam arteriam exasperat, sicut abstergentium nonnulla. Verùm adeo moderatè obtrinet absterisionem, ut nonnulli eam arteriacis admisceant, tanquam sufficienter exsiccans & desiccans medicamen, scilicet absterisionem prohibentem ab amaritudine nihil verentes.

CARYOPHYLLVM.

CAP. V

Nomina



ET ERBVS Græcis ignotus fuit fructus, qui *καρυόφυλλον* seu *καρυόφυλλον* dic tur, Latine etiam Caryophyllum & Caryophyllus, quod, si verbum verbo reddas, Nucifolium dixeris, quo nomine longe alia res designatur, nimirum fructus aut fructus rudimentum, quæ cum Nucis nihil prorsus simile habet. Nostri, quod dicitur moderatè piperis sit, Clauis dicitur, *Clou de Gyrofle* & *Gyrofle*. *Mauis* & *Tahne* & *Charumfel*, *Asiaticus* Caryophyllus, Italis *Cirofiano*, Germanis *Nargel*, *Indicum* *Tahne*.

Libus.

no de *cyrofel*. Iam meminit Plinius his verbis. Est etiam num in India piperis gratia simile, quod vocatur Caryophyllum, grandius flagellusque. Tabernaemontanus Indico loco id gigni. Adueritur odoris gratia. Serapio de Caryophyllis bene Galenum falso citat, cum ex Paulo, vel Galeno recentiore aliquoties re illa mutuatus sit. De iis sic Paulus. Caryophyllum non eam habet virtutem, quæ nomine prætenditur, sed ex India veluti flores cuiusdam arboris festuacati, & nigrescentes, longitudine fere digitali, odorati, acuti, calidi & siccissimi in tertio propemodum ordine. Est multiplex, sive opsonia, tam ad alia multa medicamenta. Recentiores de iisdem videntur certiora tradiderunt. Caryophyllum, inquit Garcias, Arabibus, Persis, & omnibus fere Indis *Calafur* vocatur, in Maluccis vero *Chanque*. Nomen item quæ sunt in Pandectario, *Arumfel* & *Charumfel*, corrupta esse putat. Nunc Caryophyllum in Maluccis tantum insulis, quæ sunt quinque, nec cul nimirum à mari, nec etiam locis nimis mari vicinis. Nascentur etiam Zeilan, non nullisq; aliis locis, sed nullibi fructifera est arbor quam à Maluccis.

Libus.

L. Arom.

Ind. casu.

Locus.

Forma.

Ea est Lauri forma & magnitudine, foliis etiam Laurinis, sed a corymbis, Salicis aut mali Perficæ simillimis auctore Clusio, ramis multis, proso flore, primam candido, deinde virescente, postremum rufescente, induratus est Caryophyllum ipsum, clauum vocant, quod capitatum sit in eam clauum, exiens quatuor denticulis sese stellatim decussantibus. Prouenit ex extremis ramulis Myrti modo. Est autem flos is viridis adeo odoratus, ut flores omnes odori suauiate superet. Clusius Caryophyllum non flores induratum, sed potius fructus rudimentum esse censet, quemadmodum in piperis, pyris, puniceis, arque aliis videre est. Nam flos ipse qui quarernis foliis constat, huic fructus rudimento insidet, multis fibris plenus, veluti flos Myrti ferè. Pediculi oblongi, ex quibus dependent flores, vulgo *Fusti* vocantur. Folia non tam odorata sunt quam Caryophyllum ipsum, sed neque tamen ipsi nisi aliquantum siccati. Colliguntur Caryophylla à decemquingentesimo Septembris vsque in Ianuariu & Februarium, non manu, ut quidam voluerunt, sed violenta flagellatione: cum flores enim flagellant altiores ramos, postea prius circa arborem solo, nullum enim genus graminis sub hac arbor nascitur, omnem succum siue humorem ea attrahente. Decussa Caryophylla biduum aut triduum siccantur, deinde asseruantur, & in Malacca, Siam, prouincias mittuntur. Quæ in arbore hærent & remanent, crassiora sunt, & ab aliis

CARYOPHYLLI

aromatici, Matthioli.

ab aliis nisi vetustate differunt. Quare non rectè Auicenna hos fructus mares facit. Nascentur ipsa arbor sponte ex decidentibus Caryophyllis. Cum enim huic nunquam desit pluvia quæ fructui alimentum præbeat qui in terram decidit, enascuntur arbusculæ, quæ intra octennium quidem adolescunt, in centesimum verò annum perdurant, quemadmodum ipsi incolæ testantur. Errant, inquit Garcias, qui Caryophylli & Nucis moschatæ arborem eandem esse putant. Nam Nux rotunda ferè folia habet, Pini foliis similia: Caryophyllum folio est Lauri, angustiore. Præterea Caryophyllum deferretur in Bandam insulam procul inde disitam, quæ Nucem profert. Scribit Auicenna Caryophylli arboris gummi facultate simile esse glutini Alborin, id est, terebinthinæ resinæ: quod se vidisse Garcias negarunt qui Caryophylla ex Maluccis deferunt. Clusius tamen inter Caryophylla, quæ Anruerpiam aduehuntur, ait inueniri interdum gummi ex arbo rufescens, odorum sanè, & quod prunis iniectum Caryophyllorum odorem refert. Id fortasse gummi fuerit Auicennæ, quod tamen affirmare non audeo. In Iava insula crassiora illa & annotina Caryophylla magis expetuntur, à nobis verò tenuiora, quæ adhuc viridia aceto & sale apud Maluccanos condiuntur, sed ex his teneriora saccharo asseruantur, quæ mirum in modum palato grata sunt. Lusitanicæ mulieres quæ istuc habitant, ex Caryophyllis viridibus aquam stillatitiam eliciunt, mira odoris suavitate fragrantem, & cordis affectibus vtilem. Nonnulli sudorem mouent iis qui lue venerea vexantur, Caryophyllis, Nuce moschata, Pipere longo & nigro. Alij Caryophyllorum puluerem capiti admovent aduersus capitis dolores à frigida causa provenientes. Mulieres Indicæ atque etiam Lusitanicæ ea mandunt commendandi halitus gratia. Ea, auctore Serapione, iocinori, stomacho, cordi auxiliantur & ipsa roborant. Concoctionem adiuuant, & ventrem constingunt. Eorum puluis drachmarum quatuor pondere sumptus cum lacte venereum concitat. Præterea Caryophylla, ut tradit Auicenna, visus aciem acuunt, nubeculas & argema exterunt.

Lib. cap. 30.

Lib. cap. 30.

Vires.

Li. 1. simpl. cap. 309.

Nomina

L. l. ca. 199
L. l. Arom.
Ind. ca. 20.

Vx, quæ Græcis recentioribus *μαχαρίδιον* & *μαχαρίδιον*, & *μαχαρίδιον* *μαχαρίδιον*, vel *μαχαρίδιον* *μαχαρίδιον* dicitur, Latinis etiam Nux moschata, & Nux myristica, Arabibus *leuzbane*, *subagaa*, seu *Giangban*, Gallis *Noix muscade*, Italis *Nocemoscada*, Germanis *Moschat musk*, Hispanis *Nuez de isperie*. Ab incolis eius regionis in qua provenit Palla, Macis verò Bupallia, in Decan Nux ipsa Iapatri, Macis verò Iaisol, ab Auicenna Iaisiband, id est, Nux Bandensis, Macis verò Bessaf. Vtraque describitur à Garcia & aliis hoc ferè modo. Arbor, quæ Nucem myristicam & Macim fert, Persicæ malo similis est, breuioribus tamen foliis & angustioribus. Fructum adhuc immaturum Macis

NUX myristica, Martb.



Locus.

Causa.

Electio.

Temper.

Vires.

est, quemadmodum nec ea quæ in Zeilam provenit. Fuit hæc Nux cum suo Maci veteribus Græcis incognita, quamvis Serapio in Macis historia Græcos auctores citet. Septembri mense Nuces certatim legunt incolæ barbari, & quantam quisque potest copiam congerit, illic enim omnia sunt communia. Eligendæ sunt recentes, minimè cariosæ, graves, farctæ, pingues, ita ut adacta acu confestim exeat liquor. Invenitur quandoque oblongum quoddam genus, mas vulgò appellatum, & à mulieribus alia Nuce longè vtilius existimatum. Nuces myristicæ, ut Mauritanii scribunt, siccant & exsiccant ordine secundo completo, adstringunt, oris suavitatem commendant, & fetorem anhelitus communis abolent, lenigines in facie emendant, visum acuunt, ventriculum & iecur roborant, lienem absumunt, urinam cient, fluentem aluum sistunt, flatum discutiant, & frigidis vteri affectibus mirè profunt. Ex recentibus contusis & in cacabo calfactis, prælo exprimitur liquor, qui refrigeratus ceræ novæ instar concrevit, fragrantissimum spirans odorem, nervorum & articulorum doloribus diuturnis à frigida causa excitatis vtilissimus, qui & venerem stimulat. Mulcet mirificè Nux myristica ventriculi dolores, si trita decoquatur ex rhodomeo, s. vnciis sex, & duabus aquæ vitæ, quousque

quousque aqua euanescat. Nam si huiusce colati liquoris cochlearia tria quoti-
die dantur ieiunis, & dolor à frigidis oriatur excrementis, aut à flatu, procu-
ludibio iuuabuntur ægri. Maximè commendatur eadem ad vteri cruciatus à flatu ge-
nitos, hoc modo. Coquitur crassiusculè tufa cum Marricariz radicibus ex sex vn-
cijs vini albi generosi ad tertias. Percolatur decoctum, & additis Sacchari dua-
bus drachmis propinatur.

NVX INDICA. CAP. VII.



OM solùm inter Palmas, sed etiam inter arbores omnes Palma illa,
quæ nucem Indicam fert, palmam obtinet eadè multa vitæ humanæ
necessaria suppeditat, nec est pro dignitate celebrata ne ab ipsis qui-
dem Arabibus: priscis enim Græcis an cognita fuerit, pletique dubi-
tant, in quibus est Garcias, tametsi Strabo eius meminisse videatur. Eius historiam
ex eodem Garcia & aliis hîc conteximus. Arborè scribit ille à Serapione & Rhase

NVX INDICA,
Martholi.

laralname, id est, arborem nuciferam dici, Nu-
cem verò Indicam ab Auicenna lausia lindi,
quæ nomina in codicibus nostris vulgaris non
reperiuntur, sed Neregit tantum, quam Nu-
cem Indicam interpretantur. Vulgo vocatur
arbor Maro, & fructus Narel, quod nomen Na-
rel commune est Persis & Arabibus: in Mala-
uar arbor ipsa Tengamaran, fructus verò maru-
rus Tenga, sed vitidis adhuc & immaturus Ele-
ri, & Goz Lanharin Malaio arbor Triccan, ipsa
nux Nihor, cui Lusitani nomen Coccho indi-
derunt, ob tria illa fotaminum vestigia, quibus
cercopitheci aut similis alterius animalis caput
repræsentat. Arbor est vastæ magnitudinis, foliis
Palme aut Arundinis, aliquantò latioribus,
flore Castaneæ, materie fungosa & ferulacea.
Fructum parit capitis humani inagnitudine,
vel maiorem, vel magnis melonibus parem.
Eius prius siue extimus cortex primum viri-
dis est, deinde ex atro rufescens, subdurus, cras-
sus, villosa materie compactus. Subest aliis præ-
durus cornu instar, ferè triangularis, qui nucleū
siue medullam continet albicantem, crassam,

crassitudine digitali, sapore dulei, concuam, quæ in cauitate suauem, dulcem &
limpidam concludit aquam. Quantò autem tenetior nux, tantò suauior est is li-
quor & copiosior. Maturior verò facta eundem liquorem quidem continet, sed
minùs suauem, quique interdum acefcet, in inueterascente concrefcit. Gaudet are-
noso solo & mari vicino, vt in mediterraneis haud facillè sit reperire. Seruntur
ipse nuces ex quibus enatæ plantæ transplantantur, quæ paucis annis adolefcunt
& fructiferæ sunt, præsertim si diligenter colantur. Nam Hyeme cinere aut ster-
cote conspergi volunt, Æstate aqua rigari, latiores tamen euadunt, si secus adifi-
cia pangantur, quia videntur luto & sordibus gaudere. Has in duo genera distin-
gunt, vt tradit Garcias. Alterum enim fructus ferendi causa seruant. Alterum Su-
ræ cogendæ gratia, quæ est vinum mustum: decocta autem ab incolis Ottaqua vo-
catur. Sura verò hoc modo colligitur. Præcisus ramis vascula alligantur ad liquo-

Lise. Geo-
graph.Lib. Ara-
Indicæ.

Nomina

L. 2. c. 498.

Forma.

Locu.

rem, quem Suram vocant, excipiendum. Eum vt ex altioribus ramis colligant, arborem conscendunt apianis ad pedes compedibus & laqueis, aut foramina quædam in corpore faciunt, vt facilius conscendant. Hęc Sura distillatur aquæ ardentis modo, vinumque extrahitur aquæ ardenti per omnia simile, vt etiam pannum lineus eo madefactus non secus ardeat, quàm si aquæ ardenti intinctus foret. Vocatur autem stillatitius hic liquor Fula, id est, flos, quod reliquum est Otræ quæ appellatur, admisto stillatitij liquoris momento. Ex Sura antequàm distilletur infusa fit acetum satis interdum acre. Sublato priore vasculo, si vulnus in arbore laesum coit. Id lagra vocant. Optima censetur quæ in Naledina insula nascitur: non enim nigricat, veluti quæ in alijs regionibus prouenit. Mareties ligni cum sit prociua, ad plurima perquam utilis est, ita vt interdum in Naledina insula naues ex hac arbore fabricentur, atque clauis, molis, velis & rudentibus armentur. Ex tam quæ in Malauar Olla auctore Garcia nuncupantur, fiunt ædium testæ, & nauium tabulæ & opercula. Hoc tamen nomine non huius arboris ramo, sed ipsius arboris designari scripsit Ferdinandus Lope, in Historia Indica, quibus inscribere filios indicæ memorabiles & acta publica. Refert etiam simili olla seu folio Arabum characteribus inscriptam fuisse epistolam, quam Rex Calecut ad Emanuelem Portugaliarum Regem dedit, cum eò primum appulerunt Lusitani. Indi istarum Plantarum germinibus vescuntur, nam gratiora sunt palato, quàm aut calidiora modum, aut humiles Palmæ, quas vulgo *Palmitar*, Itali *Cesagiani* vocant. Quæ autem nobilior est Palma, eo tenerius & odoratius germen producit. Quædam sunt perinde quæ: quare qui huiusmodi germen edit, non immerito Palmarum edem, dicitur. Sed de arbore, nunc de fructu dicamus. Ex eius extremo cortice villi sunt, qui compacto fiunt rudentes & fines nauibus necessarij, qui in ortu præparantur in marina. Ex eodem super loco naues obturantur & stipantur, ipsi, superius stat, quod putredini minis sit obnoxius, & aqua marina imbutus non fiet. Idemque. Idem affirmat Clusius, qui omnes rudentes & fines abimicantur. Vlysiipone ex villis Coccorum siue nucum confectos esse scribit perinde verò earum quæ in Indiam nauigant. Sed etiam ex iisdem villis sunt nodi, qui in testa, magno in vsu omnibus tenitoris fortunæ mulieribus Vlysiipone. Nulla ex hac villosa materie fieri aulæ testis est Garcia, id quod tamen persuadere videtur natus est Lacuna. Ex secundo cortice duro vasæ in tenuiorum vsu tornantur cuiusmodi Vlysiipone & alijs locis se vidisse ait Clusius ex Cocco de Malabar confecta, oblongiora plerumque, quàm quæ ex vulgari Cocco parantur, & nitidioraque. Sed ea paralyticos, si inde bibant, minimè nuant, vt vulgo Lusitanorum creditum est: nihil enim in hoc fructu est quod nervis conferat præ oleum, de quo mox dicemus, nec ipsi Indi huiusmodi facultates his vasculis tribuunt, nec quisquam alius probatus auctor. Medulla sine nucleo recenti cum carne & piscibus vescuntur, non aliter quam nos pane, nec amygdali dulci saponi cedit. Ex eadem trita lac exprimunt, cum quo coquitur oriza, non minus suavis quàm si cum lacte caprino decoqueretur, aut ex ea & auium quadrupedum vectatibus edulia parantur, Caril illis nuncupata. Ex eadem exsiccata panem faciunt. Noces illæ recentes siccatæ, atque supremo cortice delibratæ & confectæ ab indigenis Copra vocantur, deferunturque in Ormuz, Balagnare, & in alijs regionibus, in quibus minor est earum copia quàm vt exsiccati possint, & in alijs provinciis quæ his omnino carent. Suaues sunt, isque vritur ea quæ in Indis sicca, multo que sunt gratiores palato, quàm quæ integræ in Lusitaniam deferuntur. Ex his duobus olei genera exprimuntur. Vnum ex recentibus confutis calida aqua, quibus expressis oleum aquæ supernatat. Hoc vritur

Vfus.

Laba.

Caril.

Copro.

Olea.

Vires.

inquit Garcias, ad purgandum excrementis ventriculum & intestina: purgat enim leniter & sine noxa. Multi Tamarindorum expressionem addunt quod vtile esse medicamentum sepius se expertum fuisse ait. Si id oleum Auicenna & Serapio intelligunt, cum melioris succi esse dicunt quam butyrum, recte quidem non sentit Garcias arbitrarum, in eo vero falli, quod ventrem nimis mollementer purgat butyrum. Alterum eius genus est, quod ex induratis tibus trocato, doctis & confectis. Copra vocari diuinus lipidissimum magna copia ex oleis extrahitur. Id non solum neruis vtile, sed etiam oris coquelix aprum est. Neuis autem admodum conferre, & neruorum contractionibus & articularum doloribus antiquis, se expertum fuisse testatur Garcias, ægum eo inunctum in cupa grandi imponendo, ibique quiescere sinendo concalescendum. An vero lumbricos enecet, vt Auicenna & Serapio tradunt, nondum se expertum fuisse ait. Quod vero ipsum nucem eadem esse facultate præditam sentiant, non modo rationi consentaneum non esse, sed quotidiana experientia manifestissimum esse, eius esu lumbricos præterea. Id verum quod tradit Serapio ex auctoritate Mesangie, Cocci estis filii alium. Nam alterum a ratione non est, nec enim, quæ et naturam est purum, ventrem contrahere, oleum, quod tenuiorum est partium & acriter, ipsum lenire. Ex ipsa autem natura, hore nullum oleum elicitur, sed ex Coccho tantum: quamuis Lacuna scribat quosdam in ea opinione esse, vt credant dulce id oleum quod ex hac Palma stillat, Dioscoridis esse Elæomeli. Cocchu, quæ de Maldina appellant, nigro est cortice & nitidior quam vulgaris, cui figura magna ex parte nec ita rotunda vt vulgari. Medulla interior, quæ siccata dura est admodum & canosa, non nihil tamen ad palliorem inclinans, in superficie rimosa est, & valde porosa, & lo sapore æstans. Laudatur hic Cocchus, vt auctor est Garcias, sed præsertim eius medulla ad ierfus venena ab ipsis harum insularum incolis. Et à viris fide dignis se accepisse ait, ad coli dolores, paralytici, epileptici, aliosque neruorum affectus prodesse. A coli quidem doloribus, quod vomitum excitaret, ab alijs vero ætudinibus liberari ægros, si aliquam in nucibus aliquandiu conseruati ediderint, adiecto medullæ momento. Quibus fidem ille non adhibet, vt pote quæ experientis minimè sint confirmata, usque vtatur medicamentis quorum facultates iamdiu perspectæ sunt, & in hincis experimentis comprobata. Auicenna scribit nucem Indicam calidam esse in principio secundi gradus, siccam in primo: inesse tamen in ea humiditatem excrementiciam: quate recentem humidam esse primo ordine, graueni quidem stomacho esse, sed non mali nutrimenti: oleum è veteri nuce conferre doloribus dorsi & genuum.

NUX VOMICA ET METHEL. CAP. VIII.



NUX quæ Arabibus *Leuz alkei* seu *alke* dicitur, Officinis ac Barbaris Nucis Vomica: quæ verò *Leuz atrachaba*, Nucis Methel seu Nucis Methella. Nucem Vomica Serapio Abraam citans breuiter sic delineat. Est nux colore inter glaucum & album, Auellana paulò maior, nodosa. Nucem verò Methel hoc modo. Est fructus similis Nucis Vomica, cuius semine Citri semini simile est. Et ex Hacse. Nucis Methel similis est Nucis Vomica, semine Mādragoræ semini æmulo, cortice aspero, gustu suauis. Et Auicenna. Nucis Methel inquit, est similis nucis, cortice aculeis etasis & breuib. recto. Nucis Vomica similis est eius semine Citri semini simile est. Lonicerus arbitrarum Nucis Vomica desertiptione Nucis Methelle Officinarum conuenire, & contra: vt Nucem Vomica Officinarum pro vera Methella, & earumdem Nucem Methella pro legitima Vomica Serapionis & Arabum acceptamus. Amarus Lusitanus in eadem est opinione, quod Nucis Methella Officinarum colore sit glauco in album vergente, & ab utroque latere attollatur tuberculis quibusdam circularibus, oculos imitantibus, tum quod quæ Methellæ assignantur notæ, omnes Vomica Officinarum conueniant,

Lib. c. 498. c. 18. simpl.

Lib. c. 498. c. 18. simpl.

Cap. 18. simpl.

In cap. lib. 1. Diosc.

Lib. c. 498.

Nomina

Cap. 16. simpl. Formæ.

Cap. 16. simpl.

T. 1. cap. 10. In cap. 10. lib. 1. Diosc.

quæ plana est utroque latere, cortice aspero, veluti piloso, sapore vinctuoso & pingui, canes interficiens. Quod verò eius semen semini Mandragoræ simile dicitur, id intelligit Amatus de virtute & effectu, non de figura, cum hæc etiam nux quarto gradu frigida sit. Id quod ante Amatum Lonicerus annotat. At si Vomica vulgaris vera esset Methella, necesse foret, ut scribit Anguillara, hanc iussisse semen Cirri simile, ut scribit Auicenna, ut Serapio, Mandragoræ, quibus tamen simile nihil in ea reperitur. Quare Methellam vulgarem, veram esse Methellam verisimilius fuerit, quam Vomicam. Ex cuius Methellæ descriptione ab Anguillara tradita, sunt qui coniciant, nec id temere, esse Crateus Hippomanes cuius meminir Theophrasti scholiastes, ἡ πικρὴ καὶ ὡς τοὺς φῶς ἐχέει καρπὸς οὗτος (ὁ μὲν δὲ τοὺς φῶς ὡς πικρὸς μύκωνος) ἀντιγράφει, sic enim legendum censet Anguillara. Crateus Hippomanes plantam esse dicit, quæ fructum habet Cucumeris silvestris modò (folia non nigriora veluti Papaveris) spinosum. Vomicam autem vulgarem nec veram Vomicam esse, nec Methellam putat Anguillara, nam eius historix a Serapione ex Abraam expositæ refragatur color, aliquidque aut lana similitudo, nodi in ea nulli. Præterea a viro fide digno, & rei herbariarum peritissimo se accepisse ait vulgarem Vomicam radicem esse non nucem, ob idque dis, per humum repentiibus. Matthiolus credidit aliquando quas Vomicas sic vocant, genuinas esse Methellas, quam sententiam tandem retractam iis assentiri ait qui Nucem Methellam Strammonij fructum esse credunt. Præterquam quod Nucis imaginem refert, etiam aculeis crassæ & brevibus semen Mandragoræ simile habet, nec dubitat quin fructus ipse, ac tota ita saporiferæ sit facultatis: quæ de re in Horto diximus. Vomicam vero Non Officinarum non esse genuinam: quia (si Auicenna & Serapioni credimus) Vomica Nux Methellæ similis esse debet, sed aculeorum vice nodos habere. Vomica vulgaris caret: quinetiam nullam Nucis speciem refert. Scribit Anguillara Nucem Methel venenatam esse, stupefaciendi vim habere, somnum dum inducere, cerebro & cordi noxiam esse, semiserupuli pondere sumptum ebriare, drachmæ verò vnius pondere deleteria facultate vna die interimit. drachmæ vnius pondere inebriare aiunt, duarum drachmarum pondere ne Auctore Rhase obstupefaciendi vim habet, dolores leniendi sedandique, doque interi nere, meatus satiare, vomitus excitare. Eos qui maiore quantitate drachmæ pondere sumperunt, interficit. Succurritur iis si butyrum calfactum continuo assument, & extremas corporis partes in aquæ calidæ solium iniiciant. Præterea ad vomitum se pessime cogendi sunt. Denique iis omnia auxiliantur quæ aduersus Mandragoræ venenum valent. Nux Vomica per se, ut scribit Serapio, aut cum sale, aut aliis medicamentis trita drachmæ pondere, vomitum cito præstat cum semine Anethi aut Fœniculi, & melle mixta, & cum aqua calida pota humores phlegmaticos biliososque expellit, & alium mediocriter subducit. Vomica nostra vulgaris præsertim canes citò interimit.

In cap. 146.
lib. 2.

Lib. 2. cap. 101.

Vires &
Temper.

Cap. 163.
simpl.

ANACARDIVM.

CAP. IX.

Nomina



ETERIBVS Græcis incognitus fuit hic fructus, quæ recentiores Græci Ανακάρδιον, Latini similiter Anacardium à cordis tum similitudine tum colore vocauerunt, Arabum vestigia secuti, quibus Balador dicitur, Indis Bybo, Lusitanis Fava de Malaqua, quòd viridis & in arbore pendens iunilis sit nostrati maiori fabæ, maior tamen. Auicenna de eo sic scribit. Anacardium est fructus similis ossi Taniatindorum. Et nucleus eius est similis nucleo amygdalæ dulcis, qui innoxius est. Et cortex ipsius est durus, habens

Forma.

for. 1013.

ANACARDIVM.



foramina, in cuius raritate est mel viscosum habens odorem Et sunt qui ipsum masticant, & non nocet eis, & propriè cum nuce. Serapio sic etiam describit. Balador, id est, Anacardus, est fructus arboris, similis cordi auri, cuius color est rufescens, parum ad ruborem declinans, sicuti est color cordis. Intus est res simili sanguini, & id quod administratur ex eo, & deservitur ex Sini. Nascentur ex montibus Siciliæ ignitis. Hunc fructum ex Cli-

Cap. 446.
impl.

Locu.

sio hic pictum damus. Magna est eius in Cananor copia, auctore Garcia, tum in Calecut, & reliquis Indiæ prouinciis, velut in Cambaya & Decan. Calidum sic cumque esse quarto excessu tradit Auicenna, vlcerare, adurere sanguinem, & humores, delet radicitus verrucas, virilignes albas & lepram, sanare alopeciam, commouere calida apostemata partium interiorum, aduersus nervorum affectus à frigida causa ortos & paralytim valere, memoriæ iacturam refarcire, maximè sumpta confectione anacardina, mentem tamen de statu deicere & furorem excutere, eius suffitu hamorrhoides exsiccari. Sed deletoria facultate non carere, humores adurere & inersficere. Eius antidotum esse lac vaccinum potum, & oleum ex nucibus expreßum. Eadem Serapio tradit, citatque Galenum, qui huius fructus meminere, cui tamen planè ignotus fuit, atque noxium esse præsertim biliosis & iuuenibus. Quod illi Anacardium calidum & siccum statuunt quarto ordine, alij tertio, Garcias non probat: in virente enim perspicuum est hunc calidum & siccitatis gradum deesse, neque rationi consentaneum videri, eò caliditatis & siccitatis excessu constituere quod pipet. Nisi forte, inquit, quod in Sicilia nascitur iis sit facultatibus præditum. Præterea deleteria esse facultate negat, quod expectantia repugnet. Nam his in regionibus, inquit, è lactis sero maceratum asthmaticis datur, & aduersus lumbricos. Adhæc iis viridibus & sale conditis vitur in cibariis, oliuarum conditarum modo. Fructu verò siccato caustici vice vtuntur in stumis, totaque India huius cum calce mixti vsus est ad pannos obsignandos. Anacardij historiæ à Garcia descripæ Clusius Scholia stes adiecit descriptionem & picturam fructus cuiusdam, siue nucis, quam aliquando Vlyssipponè adferri ait è Brasilianorū regione: *Caious* vocant. Arbor est magna, foliis Pyri (in recens nata Lauri potius) fructu oui anserini, forma & magnitudine, qui succo plenus est, veluti id Citriorū genus,

Lib. 1. Aro-
mar. Ind.
cap. 30.
Lib. 1. c. 40.
Temper.
& Vires.

Cap. 446.
impl.

Lib. 1. c. 30.
Arom. Ind.

CAIOUS, Clusij.

MEDIVS.

INTEGR.



quod Limā vocant, quo quidē vtuntur Brasiliani (licet Theuetus contrā asserat) vt ab iisdem se intellexisse ait Clusius. In extremo fructu prominet nux quedā, renis leporini figura, colore cinereo, interdum ex cinereo rubescente. Duplici hæc nux coniecta est cortice, inter quos spongiosa quedam est materia, olei asperimi & calidissimi plena, intus verò nucleum continens, edulem, & Pistaciis gustus suauitati non cedentem, pellicula cineticia obductum, quem eximere oportet. Eo leuiter tosto vescuntur incolæ: sic enim gravior est, & venerem stimulare fertur. Acri illo nihil præstantius esse serunt ad lichenas & impetigines tollendas. Incolæ certè aduersus scabiem vtuntur. Sed illud mirum, primum fructū nulla semina continere, & extrema illa nuce earum arborum genus conseruari debere. Nonnulli Anacardiorum genus esse arbitrantur, ob similitudinem acris illius humoris, quem cotticibus inclusum habent.

Cap. 61. de
serip. Arom.
ti.

FAVEL

Nomen
Lib. I. cap.
Acom. Ind.
cap. 3.



FAUFEL Arabibus dicitur, id est Auellana Indica, inquit Serapio, Auicennæ Fîfel & Fufel, sed deprauatè auctore Garcia, in Malabar Pac a vulgo, à nobilioribus Areca, quo nomine vtuntur Lusitani qui

Forma.

in Indiis habitant: in Gazarate & Decan Çupari, in Zeilan Pozz, in Malacca Pinan, in Couchin Chacani. Arbor quæ fructum hunc parit, recta est, fungosa matetie, folijs Palmae, fructu Nuclei moscharæ, minore tamè, aut iuglandibus exiguis similis, intus dura, & candidis rubentibusque venis respersa, non planè rotunda, sed altera parte sessile: quæ ramen notæ non omnibus Arecæ generibus conueniunt. Integitur inuolucro admodum lanuginoso, & foris fusco, hauc,

ARECA sine Fausel, Clusij.



Locus.

Cap. 35.
simpl.

Cap. 35.
simpl.

Temper.

Ô Virt.

Lib. I. cap.

perquam simili Dactylis cum maturum & siccatum fuerit. Hanc nucem probebat ouit Matthæus Siluaticus: sic enim scribit. Fausel id est, Auellana Indica, est similitima Nucis moscharæ, nisi quod pars vna est plana, altera eminentior, ita vt possit stare erecta, sicut calebulus in ludo dicitur Pedes. In cæteris intus & extra Nuci muscatæ similis est, sine odore, & inapore. Nascitur inclusi in quadam lanugine in folliculo serici. Multoties fertur inter alias species à Calecut. Et ego vidi ipsum in suo solo. Hæc ille. Nascitur Fausel plurimum in Malabar, in Guzarate & Decan pauca quædam idq; duntaxat in maritimis, sed laudatur, fertur in Chaul, quod defertur Ormuz. Maximum vero prouenit in Mombam insula. Nascitur etiam quod in regione Bacain proueniatque id defertur in Decan cum eo quod in Couchin nascitur nigrum & pusillum, durum admodum, postquam siccatum fuerit. Præcipue nit etiam in Malacca, sed tam parua quantitas vt vix incolis sufficiat: item in Zeilan in

copia, sed candidum, quod in eam partem regionis Decan defertur, quæ Calecuti loco caret, tum etiã in Bishaga. Defertur etiam ex Zeilan in Ormuz, Cambray & insulas Maldinas. Scribit Serapio ex Haboanifa auctore istam in Arabia non prouenire, quod de mediterraneis locis & magna ex parte intelligendum esse cernit Garcia: nascitur enim laudata sed exigua in Dofar & Xael portibus Arabie. Amat enim hæc arbor loca maritima, mediterranea respuit, alioqui magna contingia sereretur, quoniam singulis diebus eam edunt cum Mauriani, tum Moabæi (genus hominum id est, qui Ali generum Mahometi sectantur) etiam in ieiuniis suis cum à Betre abstinent: mandunt enim Arecam cum Cardamomo purgati ventriculi & cerebri gratia. Scribit Serapio ex auctoritate Isaac Fausel parum calfacere, & paucæ amaritudinis particeps esse. Sed se degustasse Garcia assensum nullumq; in eo calorem deprehendisse, verum cum insipiditate adstringentium facultatem. Cui consentiunt quæ subiungit Serapio ex aliorum auctoritate, præcipue id esse ac siccum, atque adstringens: ob id aduersus calidos morbos valere, doloribus dentium auxiliari, gingiuas & commotos dentes stabilire. Quibus accedit Auicennæ auctoritas, scribentis Fufel refrigerare atque adstringere. Immatuum Fausel stupefacit & uebriat, vt refert Garcia: idèò sic editur à nonnullis, vt ve-

luci ebrij dolotum cruciatus non sentiant. Admifcentur Fauſel ſive Areca eadē quæ Betre admifceri dicemus, tamen ſi Betre calidum ſit, Areca verò frigida & ſicca. Sed & admifcetur Lyrium, quoniam vtrumque gingiuas coſtituar, & dentes ſtabilit, ſtomachum roborat, & vtile eſt aduerſus ſanguinis reiectiones, vomitus

*AVELLANA Indica,
Maſculola.*



*AVELLANARVM
Indicarum, Cluſij.*



& alui profluvia. Sic autem parant. Contuſam Nucē Fauſel in tenuiſſimas pattes cum Lycio & folio Betre, cui ſit exemptus netuus, mandunt, ſicuti in Betre dicitur, & priorem ſatiā quæ ctuenta eſt expaunt, eāque ratione cerebrum & ventriculū expurgant, gingiuas ſtabiliunt. Potētiores ex Fauſel, Lycio, Caphura, Ligno Aloës & Ambari momento paſſillos componunt, quos mandunt. Garcias ex Fauſel viridi aquam ſtillatitiam vitreis organis eliciebat, qua maximo cum ſucceſſu in biliſis alui profluviis vtebatur. Nucem Fauſel cum ſuo operimento ex Cluſio hic depinximus, qui & aliam vidit nucem oblongā, quæ Fauſel cum ſuo involucto magnitudine æquat, ptx dura & foris nigricans, quæq; per medium ſecta Nucem myſticā proximè æmulatur. Fortē Fauſel genus erit, aut aliquid ſimile. Eius quoque iconem hic ex eodem expreſſimus. Alias Auellanas Indicas a Cortuſo dono datas depinxit Matthioli, & deſcripſit his ſerē verbis. Prior tum facie, tum magnitudine diſſet à Fauſel. Conſtituitur putamini ex tūmo Cardamomi maioris putamini ſimili, ſed duriore, compaſtiore, & colore magis obſcuro, magnitudine iuglandis vitidi adhuc putamine tecta. Eo Auellana concluditur oblonga, vtraque parte acuminata, dorſo arcuato, inferiote parte lata ac leſili, oſſe cō tecta duro, læui, caſtaneorum colore, in quo nucleuſ concluditur ſoliduſ, eiufdem ſetē figuræ, tenui albāque membrana obductuſ, dulci intuſ medulla, albicante. Altera eſt ſuperiore longē minor, quæ è ſuo involucto exempta, quod læue molleque eſt, colore ſubpallido, nec folio Palmæ craſſiuſ, glandis acuminatæ aut myrobalani ſanę ſetē figura eſt, duro putamine concluſa, quod colore vulgariſ auellanae oblongum intuſ nucleum pumilam amygdalam referentem continet. Cluſiuſ in Scholiis in Garcie Aromaticorū Indicarum hitoriam aliquot Auellanatum Indicarum icones cum ſuis deſcriptionibus exhibuit. Prior exigua eſt tribuſ lateribuſ elatioribuſ, atque itidem tribuſ foraminuſ veſtigiiſ, vti Coccus conſpicua villoſo quodam involucto velut Fauſel ſerē tecta. Altera pollicati eſt longitudine, duotum verò

digitorum crassitudine, inferiore parte sessilis, rugosâ scabritie & cinerea, superna autem & eminentiore parte laevis, subulsiq; coloris, ita vt animalculum duro cortotectum videatur. Prægnans est, & aliam continet. Huc ferè simile genus inuenitur minus, nigricâs, quod à Matthiolo priori generi Auellanaarum Indicarum adscribitur. Tertia Mehenbethene nouine à Cortuso missa. Pollicem transversum longa est, forma triangulari, duro & ligneo putamine, fracta tres cellulas ostendens, in quibus nucleus oblongus, albus dulcisque inuenitur. Quomodo autem Mehenbethene nomen illi tribui possit non video, cum Auicenna de Mehenbethene tractans, nihil aliud quàm Græcorû Lathyrum describat.

SANTALVM.

CAP. XI.

Nomen



ETERIBVS Græcis ignotû fuit quod Santalum dicitur, Auicenna Serapioni, atq; Mauritanis omnibus corrupto nomine *Sâdal*, in Timor insula, omnibûsque Malacæ vicinis prouinciis *Chandama*, in Canara, Decan. & Guzarate, *Sercanda*, auctore Garcia. Santali tria sunt genera, rubrum, album, pallidum, quod Officinæ Citriuinum appellant. Idem Garcia Santalum scribit in Nucis iuglandis magnitudinē assurgere, foliis admodum virentibus, Lætisci æmulis, flos ex caruleo nigricat, fructus est Cerasi magnitudine, primum viridis, deinde niger, in sipidus & faciliè decidens. In odorem feruntur arborei, nisi cum detracto iam cortice exsiccata fuerit. Tria huius genera vno loco non proueniunt, sed in regionibus multum à sese distantibus. In Timor insula vndique portubus abundante plurimum album & pallidum reperitur, & in India ultra Sangem fluiuium, quæ Indi Hanga vocant, item in Verballi portu laevis, vehementer quidem odoratum, sed quod breui senescat, debeatq; post annum multo ligno adempto odor eius euocari, qui in medio est. Præfertur id quod minimum ligni, plurimum cordis habet: rubrum in India intra Gâgem, videlicet Tanasariu, & maritimis quibusdam Charamandel. Hoc a Brasilioliquo (quod vtrunque sit in odorem) differt, inquit Garcia, quod Santalum rubrum nequid est, neq; inficit, quæ notæ in Brasilio perspicue apparent. At rubrû Santalum gare Officinarum sæpe inficere comperias. Eius ea in regione, in aqua proutur, rarus est vsus, quod Indi aduersus febres duntaxat eo vtantur. Reliquum in Lusitaniam & Occidentales regiones deferitur. Ex eo interdû idola sua eorumq; deorum fabricantur: quæ de causâ crassiora ligna magis expetuntur, maioriq; pretio venduntur. Primum locum tenet pallidum, secundum album, tanta tamen inter vtrumque arbores est similitudo, vt hæc ab illa discerni nō possit, nisi ab incolis, qui eas casas mercatoribus vendunt. Vtiusq; magna copia per vniuersam Indiam absumitur: quoniam omnes ferè eius regionis incolæ, siue Mauritani, siue Gentiles eorum mortariis lapideis confuso, & aqua macerato, vniuersum corpus inungunt, deinde sicari sinunt, ad æstus corporis tollendos, vel ad odorem conciliandum. Est in regio calida admodum, & incolæ plurimum odoribus delectantur. Garcia legitimum Santalum citrinum vix in Lusitaniam deferri putat, cum multò plus apud Indos, quàm in Lusitaniam delatum vendi possit. Ex quibus non sine ratione dubitandum genuinumne Santalum citrinû habeamus, an potius aliquod aliud lignum odoratum eius loco ad nos deferatur. In citrini tamen penuria, albi & rubri partes æquales præscribendas esse non putat Garcia, sed potius, solum candidû, multò magis enim cum citrino affine est album quàm rubrum. Auicenna de Santalo scribens, Galenum, cui id incognitum fuit, falsò citat, statuitq; frigidum esse in fine secundi ordinis ad tertiu vsq; siccum in secundo. Serapio similiter ex maleorum Arabum auctoritate frigidû in tertio gradu, siccum in secundo: rubrû tantum frigidus esse albo & citrino. Præsertim rubrum humorum fluxum inhibere, erysipelas, in illam

Lib. 4. Aromat. Ind. cap. 17.

Genera.

Forma.

Locu.

Electo.

Lib. 4. cap. 49.

Vires &

Temper.

Cap. 106.

Simpl.

is, inflammationibus, podagra: à bile orta: ex succo Solani, aut Sedi, aut Portulacæ, vtiliter illini. Candidum ac pallidum ex aqua rosarū fronti imposita capitis dolores à bile & caliditate mulcere. Omnia calidis febribus aduersari: epora æstuū vetriculo auxiliari. Fiunt ex his & aqua rosarum epirhemata, quæ vetriculo admota, eius feruorem in ardentissimis febribus extinguunt. Præterea Santalū, auctore Auicenna libro de viribus cordis, cordi amicum est, latiriam enim adfert, & robur ei addit. Quare is miscetur medicamentis quæ cordi & eius palpitationi succurrūt. Sed cum Santalū album & pallidum odorata sint, Mauritanorum sententia improbanda, qui Santalum tertio ordine refrigerare prodiderunt.

AGALLOCHVM. CAP. XII.

PRISCIS Græcis ἀγάλλοχον, recetioribus etiam ἀγάλλοχον & ξυλάλοχον, **Nomina**
 Latinis Agallochum & Lignum Aloës, Arabibus *Hand*, *Agalugin*, seu *Agalugin*, a Guzarare & Decan incolis, auctore Garcia, *Vd*, quod ex **Lib. 1.**
 Arabibus sumptum videtur in Malaca *Gambo*, selectissimum autem **Acom. Ind.**
Calambac. De eo sic Dioscorides. Agallochum lignum est, quod ex India, & Ara- **Lib. 1. c. 21.**
 bia deportatur, Thura ligno simile, maculatū, odoratum, gustu adstringens, cum **Forma.**
 quadam amaritudine, cute veriū quam cortice vestitur, aliquantum versicolore. **Lib. 1. c. 4.**
 Anicēna duobus diuersis capitibus de Agallocho tractat. De priore, nomine Aga- **L. 1. c. 799.**
 lugin siue Agalugin, de altero nomine Xyloaloës. Priore quidē ait Agalugin li-
 gnum esse Indicum, aut Arabicum odoratū, cute aspera, diuersis & lineis colora-
 ta. Huic adstringēdi vis inest cum pauca amaritudine. Quæ omnia ex Dioscoride
 descripta sunt, in quo legit *ἰσχυρὸν, εὐωδὸν*, quemadmodum & vulgaria exēplaria
 habent, id est, punctis maculatum, odoratum, pro quo Orbasius legit, *ἰσχυρὸν*
εὐωδὸν, id est, Est igitur odoratum Deinde easdem, quas Dioscorides subiungit vi-
 res. Serapio Dioscoridis verba transcribens nec maculatum nec punctotum memi-
 nit, nec Paulus. Posteriore loco Auicenna nomina & regiones enumerat, a quibus
 Xyloaloë deportatur. Sed in omnibus vetū & legitimū nō nascitur. Nam quod
 in promōtorio Comorin, veteribus Cori dicto, & Zeilan inuenitur, lignum odo-
 ratum est, quod lignum Aloës siluestre vocatur, cum tamen non sit. Legitimum
 in Malaca & Sumatra nascitur, vnde à Chinenſibus ferebatur. Serapio ex Dioſco-
 ride & Galeno omnia transcripsit, item multa eius genera, & plurima alia ex Ara-
 bibus. Garcias legitimum Lignū Aloës nō nisi in India nasci putat. Ex Arabia qui-
 dem adferri potuisse, prius tamen ex India eò deportatum, vt pleraſque alias mer-
 ces. Nam in Arabia prouenire non arbitratur: nec cute vestiri, sed cortice, vt & alia
 ligna: neq; verisimile esse pro Thure adfufimēta substitui, sed potius contrā, pro
 Agallacho Thus substitui debuisse, vt pote cuius maior copia fuit: non solemus
 enim rariora & inuentu difficiliora vulgaribus substituere, sed contrā. Est autem
 Agallochum eodem auctore arbor Oleæ instar, interdū minor. Nec florem nec
 fructum vidit, ob periculosa huius arboris diurnam obseruationem, frequen-
 ter istis grassantibus tigribus. Ramos autem ex Malaca delatos vidit. Ferunt Aga-
 lochum recens dissectum nulla odoris fragrantia gratum esse, nec nisi siccatum
 odoratum, nec eum odore per vniuersam ligni materiam diffundi, sed in ipsa ma-
 trice consistere. Crassius enim est cortex, & ligni materies odoris experta. Non ne-
 gat tamen Garcias, quin putrescente cortice & ligno, oleosus ille & pinguis hu-
 mor matrici sese insinuet, illamq; odoratiore reddat. Sed vt odor Agallocho con-
 cilietur minimè putredine opus est: nam tēpore aliud magis, aliud minùs odora-
 tum sit, quod multi experientia edocti probè norunt, vt etiam de recens dissecto
 statim iudicare possint, siue odoratū futurum, annon. Nam in omni lignorum
 genere aliud alio præstātius est. Solent autē Malacæ incolæ Agallochum repur-

Electio. gare ante, quàm mercatoribus vendant. Præfertur multum nigricans, cinereis diffuſis currentibus venis, pòderoſum, plurimo pingui humore prægnans. Probatio erit, ſi igni accenſum multum humorem exidet, ſi in aquam iniectum nõ ſudat: nam ſolidiſſimũ quodq; innatat. Guzarate & Decã incolæ præter ſupradictas notas, ut magna ſint fragmẽta requirunt, quemadmodũ maiores gemmas & margaritas cæteris præferunt: ſibi enim perſuaſerunt quo maiora ſunt fragmẽta, eo maiore facultate prædita eſſe. Fabulam narrant qui Agallochi arborem à nemine viſam referunt, quòd in terreſtri tantum paradifo proveniat, illuſq; lignum ferri fluminibus quæ ex eo manant. Hoc verò multò abſurdius quod Pandeſtarius ſcribit Agallochum Chamelæ adulterari, cum tota ea regione Chamelæ nõ naſcatur auctore Garcia. Illud quidẽ Serapio tradit ex quorundam auctoritate ramos Agallochi à gi, & in flumina decidere, cum uſ vehi in eas regiones quas alluunt: præterea lignum Aloës ex arbore ſua exciſum anni ſpatio ſepeliri, ibiq; corrodi, ita ut remaneat lignum Aloës purum, nihilq; è ligno illo erodatur. Cui Symeõ Sethi ſubſcripſit, nõ alias futurum odoratiuſ ſcribẽs, niſi priuſ marcorem aliquem & terebinthem ſenſerit. Quod ait Garcias Auicennam hallucinari cum ſcribit Agallochum ab incolis elixari, ut omnem odoris vim eliciant, id in noſtris exemplaribus nõ reperitur. Verum Agallochum Officinis omnibus diu ignotum fuit, atq; etiam hodie non ignoratur aliud atq; aliud lignum ei ſubſtituẽtib; quãquam verum à Luſitania India Vlyſſiponem & Hiſpaniam delatum ſit, ſed magno æſtimatum: hunc autem ex eo ſphærolæ precatoriæ, odoris iucunditate, & pretij magnitudine commendabiles. Frequentiores tamen ſunt ex quæ ex Xyloaloe ſylveſtri, cuius exſecia meminimus, hunc, tum ex alio ligni genere quod Agallochum proximè emulatur: inodorum tamẽ eſt. Venetiis etiam bent inſtitores, inquit Pena, cariffimum uſu probatiſſimum, guſtu aſtringenti, pſicco, non multum amaro: ſuffitu ſua uſu reddit odorem, & ſuccum aut liquorem pinguem, odorẽ qualem in Ebena vel Guyaco percipias, cui concolor & fortè congenit. Manditur Agallochũ, inquit Dioſcoridus decocto os colluitur, commẽdandũ tuſus gratia. Sudores arcet toti corpori inſuſum. Pro thure ad ſuffimenta ſubſtituitur: dix epota drachmæ vnius pondere humiſtomiachi vitia, & imbecillitatẽ ſeuoremq; mulcet. Si lateris iocinoriſq; dolor exaceruat,

*AGALLOCHVM ſive
Xylonloe.*



*Lib. 1. c. 11.
Vires &
Temper.*

Lib. 1. c. 79. ſi dyſenteria aut tormina infeſtant, ex aqua bibere prodeſt. Agallochum auctore Auicenna caſſacit atque exſiccac ordine ſecundo. Facit ad cordis affectuſ: obſter ea medicamenta quæ cordi præſidio ſunt ab eodem recenſetur.

BALSAMVM. CAP. XIII.

*Nomen
Lib. 1. c. 1.
Forma.*

Locus.

Tempus.

Opobalsamum.



BALE & *BALQUM*, Latine etiam Balsamum dicitur, Arabibus *Balsam* *Talema*, *Belsan*, Italis *Balsamo*, Gallis *Baume*. Dioſcorides Balsamum eſſe tradit Leucoij, & ut in vulgatis exemplaribus haberetur, Pyracanthæ magnitudine, folio Rutæ proximo, longè cãdidiore, ſemper exurte. In Iudææ ſolum quadam valle, & Aegypto naſci, diſſerẽs ſcabritia, proceritate, gracilitate quòd igitur tenui & capillacea coma ſit, Theriſton vocari, quali demelſide, fortaliſ quòd ob gracilitatem facile demetur. Aethiſis ſub ortu canis ardoribus arborem vnguib; ferreis incidi, manareq; è plaga ſuccum ſive liquore, quem

quæ in Opobalsamum vocant, sed tam exiguo succo, ut annis singulis, non plures quam semel septemve congij cogantur, inibiq; pondus duplo rependitur argenteo. Theophrastus paulo aliter delineauit his fere verbis. Balsamum in valle Syriæ nascitur, in hortis duraxat duobus, ut aiunt, alterum viginti esse iugerum, alterum multo minorem. Arbor magnitudine est Mali Punicæ magnæ, ramis valde multis, folio Rutæ simili, sed subeandidiore, perpetuo virente. Fructus similis est Terebintho, magnitudine, figura & colore, valde odoratus, & lacryma ipsa odoratior. Hac ex plaga colligi tradunt, inciso vnguibus ferreis caudice circa superna, sub sydere cum maxime æstus feruet. Colligi verò æstate tota, sed multum non esse quod fluit, vnam enim die concham duraxat plenam colligi: odorem eius eximium esse & copiosum, adeo ut ex eius tantulo odor longum spatium periret. Verum sincerum nullum ad nos aduehi, sed cum collectum est atq; permixtum: multatim enim tetum permixtione vitiani, & quod in Græcia venditur, sæpe adulteratum esse. Quin & valde odoratas esse huius arboris virgas: & eas quidem amputari quotannis, partim, ut reliqua valentiora feruentur, partim ut emolumentum plus comparatur: videri enim eas magno pretio posse. ex qua Gazæ cōuersione sic legēda Græca in vulgatis codicibus deprauata. *Ἀλέδρα γὰρ καὶ χαίρις καὶ ἰκαστοὺς ἰνὸν μὲν, ἔτι δὲ ἄλλων νεκρῶν, ὡς ἐξ ὑπὸ τέρα σὺν ἔστιν, καὶ πάλαιον κέρδος εἰσφέρει, πωλεῖται γὰρ ταύτης.* atq; huius arborum cultus causam ad imbrem referunt, (Lege, καὶ τῆς ἱρρασίας περὶ τῆς Ἀλέδρας γένεσιν τῶν ἄλλων εἶναι &c. Continuo enim eum decidere: atq; etiam virgarum amputationem causam quandam esse aiunt, cur arbores magnæ non fiunt. Etenim quia frequenter tenduntur vitgas tantum producant, nec in vno caudicem vitæ inuenduntur. Nullum vspiam siluestre Balsamum esse audiuius: ex maiori horto vasa duodecim impleri, quæ dimidiū congij capiunt. Ex altero verò duo duraxat. Sincerum vendi duplo ad argentum pretio, adulteratum proportionem mixtionis. Et Balsamum quidem odoris gratia videtur excellere. Plinius quædam alia scribit, alia ex vitro; mutatus videtur. Sed omnibus odoribus præfertur Balsamum, vni terrarum Iudeæ concessum, quondam in duobus tantum hortis, vitroq; Regio, alterum iugerum viginti, non amplius, altero pauciorum. Ostendete arbutusculam hanc vbi Imperatores Vespasiani. Clarumq; dictum à Pōpeio Magno in triumpho arbores quoq; ductas. Seruit nunc hæc, & tributa pendit cum sua gente, in totum alia natura quam nostri externiq; prodiderunt. Quippe Viti similior est quam Myrto. Malleolis feri creditur, nupet vinceta ut Vitis: & implet colles vinearum modo, quæ sine adminiculis se ipsæ sustinent. Tondetur similiter fruticans, ac rastris mitescit, properatq; nasci, intra tertium annum fructifera. Folium proximum Rutæ, perpetua coma. Scruere in eandem Iudæi, sicut in vitam quoq; suam. Contrā defendere Romani, & dimicant pro frutice est. Seritq; nunc eam fiscus: nec vnquam fuit numerosior aut procerior. Proceritas intra bina cubita subsistit. Arbori tria genera. Tenui & capillacea coma, quod vocant Eutheriston. Alterum scabro aspectu, incuruum, fruticosum, odoratius. Hoc Trachy appellat. Tertiū Eumeces, quia est reliquis procerius, læui cortice. Huic secunda bonitas, nouissima Eutheristo. Semen eius vino proximū gustu, colore rufum, nec sine pingui: peius in grano quod læuius atque viridius. Ramus crassior quam Myrto. Inciditur vitro, lapide, ossibusq; cultellis. Ferro ladi vitæ alia odit. (Theophrastus & Diosco. ferreis vnguibus scalpi dixere) Emoritur protinus, eadem amputati superuacua patiens. Incidentis manus libratur artifices tēperamēto, ne quid ultra corticē violet. Succus è plaga manat, quē Cipobalsamū vocant, suauitatis eximie, sed tenui gutta: ploratus lanis parua colligitur in cornua. Ex his nouo fictili cōditur crassiori similis oleo, & in musto cādida. Rubescit deinde, simulq; durefcit è translucido. (Legendum, & translucet) Alexandro magno res ibi gerente, toto die æstiuo vnā conchā impleri iustum erat. Anni verò fecunditate è maiore horto con-

Lib. 3. hist. cap. 6.

L. 11. cap.

Lib. 16.
Geogr.

Ibidem.

Lib. 1. c. 86.
To. 1. lib. 7.
cap. 3.

Succi E-
lecti.
Lib. 1. c. 86.

gios senos, minore singulos, cum duplo repēdebat argēto. Nunc etiā singulorum arborum largior vena, ter omnibus percutitur æstibus, postea depuratur. Ex præmentis quoq; in merce sunt. Denarius trecētis amputatio ipsa furculuq; vñt. intra quintū demum annum Xyloballamum vocatur, & coquitur in vnguētis. Pro succo ipsum substituere Officinæ. Corticis etiā ad medicamentā pretium est. Præcipua autē gratia lacrymæ, secūda semini, tertia cortici, minima ligno. Strabo etiā Balsami historiā sic descripsit. Hierichus est capus à montana quadā regione circūdatus, q̄ in theatri speciem ipsū declinat. Hoc in loco est Palmetū Palmis abundis spatio stadiorū centū, & totū irriguum, & habitationibus plenū, vbi & regia est, & Balsami viridariū. Arbor odorata est & fruticosa, Cytiso & Cerebintho p̄similis. Eius corticē vulneratēs, succū in vasis suscipiunt tenaci lacti p̄similē. Alii etiam nasci Balsamū testatur, cum scribit. Et apud Sabæos Thus & Myrrha, & Cinnamonum nascitur: in ora etiā Balsamū, & quædam alia planta odorata. Avicēna Balsamum in Ægypto nasci scripsit, eandemq; ferē omnia quæ Dioscori de eo tradidit. Ait Theuetus se vidisse hortum non procul à Cairo Ægypti liquore illo raro & pretioso ex Balsamo arbore profluente celeberrimum, quam Prouincia præfectus adhibitis custodibus diligentissimē cōseruat, vt eius liquore colligat, quē quorundam ad Turcarū Imperatorem mittat. Itē à Græcorum Patriarcha & vrbis senatibus audiuisse eum qui hodie colligitur, neq; tam oleosum, neq; vulneribus vltibusq; curādis tam vtilem, quā qui postremi Regis Ægyptij tempore colligebatur. Plures quidem clam Opobalsamū vendere, sed adulteratū. Narrasse Arabes ex historiis Cleopattam Ægypti Reginam ex Iudæa Balsamum primam in Ægyptum trāstulisse. Sed huic historiæ vix assentitur Theuetus, quod in alia vulgari Græca lingua cōscripta in Palestina legerit, Traians tēpore Balsami feracia fuisse montem Engadi, & quædā alia Asiæ minoris loca: quāquam re vera cum hæc nulla reperire potuerit Balsami stirpem. Præterea Basiliani montis Libani ex historiis suis referebāt, in quadam mōtis parte quē Solis ortū spectabat, Arabi Græcis imperare, tantum Balsami colligi solitum, quantū in Ægypto. Sed regione à Turcarū tyrannide oppressā, & exactis inde Christianis, eius liquoris memoriā vñ cum planta ipsā exoleuisse. Ægypti Reges nihil pretiosius habebant, quod Regibus & Imperatoribus Persidis, Catæ, Æthiopie, Græciæ, ceterisq; donarēt, siue ad ineundā siue ad confirmandā cum eis amicitiam. Auctor descripsit Africæ, in octaua eius parte tradit extra urbē Ægypti Misruhetich præcipuū Ægypto à Mahumetanis cōditam ad Nilum, excellētes esse & magnificas sepulchras Regum Ægypti, qui eorum lingua Soldani dicūtur. Ab his sepulchris mille & quingētis passibus stare dignos dictos Almathria, in quibus est hortus vnicū alens arbore, quæ Balsamum producit, nec in toto orbe vlla alia est quā hæc sola. Plantula est in medio fontis instar puri. Nā est procera arbor. Folia eius similia sunt foliis vitis, & parua. Audiuisse se refert qui dicerent, si aqua fontis diminuat, plantam ipsam siccatā iri. Hortus cinctus est validissimis muris, in quem ingredi nemo potest, nisi maximo fauore aut dono custodiētibus dato. Multa quidē hæc illi de Balsamo. Nullus tamen notis omnibus delineauit eius imaginē, vt verisimile sit eam præsertim veteribus illis incognitam fuisse. Hanc ex amici cuiusdam oratione sic refert Pena: Humilis est frutex, aspectu deformis, cineracei coloris, flore pusillo lalmini lutei simili, minore, perpetuis virgis. Folia horna exiit mense Decembris, quibus non nisi mense Maio noua substituuntur. In Cairo atque Babylone facta vget. Decembris mense ramuli præscindūtur, quibus cera oblitæ appenduntur amphotæ, excipiēdo aureo liquori, qui moschum sapit. Nunc de tribus plantæ partibus dicamus, vt veras ab adulteratis discernamus, & earum vires perspectas habeamus. Succus probatur, auctore Dioscoride, recens, odoris validi, sincerus, non

ad acorem vergens, dilui facilis, lævis, adstringēs, ac modicē mordēs linguam. Sed vatiē vitiatu nisto ab aliquibus Terebinthi, Cypri, Lentisci, Balani vngueto, item Sulino, Meropio, Melle, aut cerato Myrteo, aut Cyprino liquido, læui. Sed dolus facile deprehenditur. Nam putus in lancam vestem instillatus, si eluatur, neque maculam, neque notam relinquit: vitiatu autem inhaeret, & lac instillatus coagulat, quod adulteratus nō efficit: Præterea sincerus in aqua, au lacte celeriter liquatur & lactescit, adulteratus olei modo innatat se cōuoluens, & in stellæ modū diffundens, Sincerus tempore crassescit, deteriorq; redditur. Xylobalsamum probatur recēs, tenuibus ramulis, fuluum, odoratum, quadatenus Opobalsamum spirās. Semen eligitur flauum, plenū, grande, ponderosum, mordēs gustu, feruens, modicē Opobalsamū olens. Adulteratur semine Hyperico simili, quod ē Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, virium ignauia, sapore piperis. Efficacissima vis inest succo, & maximē calfaciens, abstergit quæ tenebras oculis offundunt, medetur perforationibus vuluæ cum cerato rosaceo appositus: mēles quoque secundas & partus extrahit, horrores illitu discutit, sordida vlcera expurgat, & cruda cōcoquit: vrinam potu ciet, ægrē spiratibus prodest: datur in lacte cōtra Aconitū haustum, ac Serpetium ictus. Miscetur acopis, malagmatis & antidotis. In summa efficacissima vis inest succo, secunda semini, minima ligno. Semen cōmodē porui datur pleuriticis, peripneumonicis, tussis, ischiadicis, comitialibus, vertiginosis, orthopnoicis, vrinæ difficultati, torminibus, ac serpentium moribus: ad muliebres infelsus vtile est: vuluā aperit in defecationibus hænearum decoctū, & humorem euocat. Lignum eadē habet vires, aliquātō minores. Ex aqua potum cruditatibus, torminosis, venenatorū ictibus, vulsis opitulatur, vrinam ciet, ad vulnera capitis cum tri siccā conuenit, squamas olisium extrahit, & ad vnguementorum spissamenta additur. Balsamum, vt scripsit Galenus, desiccatur & exaltatur ordine secundo. Est autem tenuium partium, adeo vt odoratum sit. Sed liquor eius subtiliorum etiam partium est quā ipsa planta, non tamen adeo calidus, vt quidam existimant, tenuitate partiu falsi. Porro fructus eius persimilis genere facultatis est, ceterum longē in subtilitate partium inferior. Cum hæ tres Balsami partes rarissima sint, imo potiùs cum his prorsus destitutæ sint Officinæ, succedanea tria excogitarunt. Liquori Balsama quæq; sua, quæ vocant artificialia substituerunt, quorum mirificas vires ad vulnera curanda omnes celebrant, & experimētis confirmant. Xylobalsamo Lentsci furculo, fortasse haud abs re, modō cariosi non sint, sed recentes, nec odorem amiserint: ea enim sunt temperie, nempe modicē calfaciente, desiccante, moderatē etiam adstringente & aromatica, vt horum puluis stomacho commodus esse possit. Iisdem qualitatibus dentis calpia ex iis, dentes & gingiuas purgant & roborant. Hoc Pseudoxylobalsamo abundat Gallia Narbonensis & Italia, Carpobalsamum Offinarum prorsus reiiciendum est, neq; enim Balsami fructus est, sed ignoræ cuiusdam plantæ, vietum, exoletum, inodorum. Quare eius penuria semine Terebinthi, vel Lentisci immaturi vtendum cēset. Pena, quod eius vires Carpobalsami facultatibus planē respondere videantur. Quin ē Terebinthi pullulantibus botris atque flagellis tempore Verno lymphidissimus liquor extillans, odoratissimus, non parū tenax, digerendo, glutinando, doloremque mulcēdo eadem quæ Opobalsamum præstare potest: cui suffragatur omnium consensu: nullus enim Balsamum confecit, qui non Terebinthinam vulgatam permiscuerit. Quare nullum ille succedaneum aptius arbitrat, cuius partes omnes omnibus partibus, liquori, ligno, semini respondeant, quā Terebinthus genuinus. Hodie ex Occidentali India præstantissimus liquor in Hispaniam defertur, quem ob excellentes & admitandas virtutes Balsamum nuncuparunt, veri illius Balsami quod in Iudæa & Aegypto nascebatur nomine. Quare Balsamum

Xylobals.
Electo.
Carpobal.
sa. Ele-
ctio.
Vires &
Temper.

Lib. simpl.

Balsamum
Indicum.

de his-
pania Ind.
Occident.
Forma.

Indicum siue Occidentale nominetur. Nascitur auctore Nicolao Monardesio in Hispania noua arbor Indis Xilo dicta, Punica malo maior, folijs Vrticæ similis, feratis & tenuibus. Ex hac duobus modis liquor elicitur. Vno multus in vulnerato arboris cortice, qui tenuis est. Liquor inde fluens renax est, subalbidus, & præstantissimus, sed ad eò paucus, vt totum sibi seruenr incolæ, nec ad nos transferatur. Altero Indis admodum familiari in eliciendis succis ex quauis a bore. Ramos atque etiam truncos arboris assulatim & minutim còculos in ampullam lebetem coniciunt, multa affusa aqua. Bulliunt omnia quantum satis sit: subleu igne refrigerati sinunt, & conchis oleum supernatans colligunt. Id vero est Balsamum quod in Hispaniam aduehitur, & quo illic vulgò vtuntur, colore ex nigro rubente, odoris suauissimi. Vasculis argenteis, vitreis, stanneis, aut fictilibus vitæ asseruatur. aliam omnem materiam penetrans. Gustu est acuto & aliquantulum amaro, vnde colligere licet adstrictiõis particeps esse, calidum & siccum fere gradu. Tribus autem modis in vsum medicum recipitur. Aut enim intus sumitur, aut foris illinitur, aut chirurgicis remedijs permiscetur. Intus sumptum maniano ventriculo asthmaticis vtile est, & vesicæ doloribus, menses ciet, vt & alio modo subditum. Eius quatuor aut quinque guttulæ vino, aut aqua rosacea in chleari exceptæ, & diluculo sensim in guttur instillatæ, sic vt linguam non contingant (eius enim Balsami sapor in ore diutius hærens forsitan nascenti morbo veteres stomachi dolores finiunt, eumque roborant: colorem commendent, & helitum. Iocinori prodest, obstructions aperit, & iuuentutem conferat. Pueris sicos iuuat, steriliũ vterum expurgat pessi modo admotum. Foris calidum capluma illitum omnes cruciatus à frigidis humoribus ortos inulcet, præsertim linteum liquore delibutum apponatur. Oedemata discutit & absunt: quilibet corporis partem roborat. Capiti illitum cerebrum reficit & fouet, nemq; noxiũ humorem absorbendo, dolores sedat. Paralyticis opitulatur, bro, ceruicæ, spina, & ea parte quæ paralytisentata est inunctis. Eadem rat omnes neruorum morbos & contractiones vtile est. Stomacho illitum euoborat, concoctionem iuuat, & flatibus obstructionsq; liberat, sicuti & lientem etiam emollit. Nephritidem & ventriculi dolores à causâ frigida & flumprouenientes, calidum loco dolenti impositum sanat. Idem præstat pancreas inditum, sicq; appositum. Vrinam cit & expellit illitum. Summo pere laudatur articuloꝝ doloribus, præsertim coxendicũ, quia omnem duritiem & tumorem resoluens discutiat. Chirurgicis medicamentis mixtum, mirum quantum valeat. Vulgò in recentibus vulneribus vtuntur: nam statim & sine suppuratione glutinat. his etiam prodest in quibus contusio adglutinationem impedit, quæ statim digerat, & reliqua præstat quæ ad vulnus glutinandum necessaria sunt, non abs re pauperum chirurgia celeri possit. Neruorum iuncturarumq; vulnera præ reliquis medicamentis ad cicatricem perducit, contractionemq; prohibet. Capitis vulnera sanat, modò cranium illæsum sit. Denique recetia omnia quilibet corporis parte, antiqua verò per se, aut cum alijs eò pertinentibus expurgat, & ad cicatricem perducit. In diuturnis febribus spina eo calente inuncta, tertio hora ante paroxysmũ, & illico quinq; aut sex guttis eius in vino sumptis modis supradictis, horrores discutuntur, si ter aut quater remedium id repetatur. Hoc Balsamum statim, atque in India innotuit, ab Hispanis vsu receptum fuit, Indis exempla securis, hoc succo vulnera sua curantium. Quare in Hispaniam de ob admirabiles eius dotes magno fuit in pretio: eius enim vnica modò decem dõ viginti ducatis æstimabatur, nunc libra non pluris quàm tribus aut quatuor ducatis valet. Romam quoque primũ illatum in eo fuit pretio, vt vnica octo ducatis venderetur. Deinde magna eius copia ad nos delata cœpit vilescere.

Idem

FRVCTVS Balsami,
Monardi.

Eodem Nicolao Monardo auctore, ex America siue Noui orbis continenti magna copia deferri ceperit Balsamū aliud per incisionē extractū ex arboribus iis similibus quæ in noua Hispania nascūtur, vbi Balsamū decoctione colligitur. Sunt autem ex arboribus vastæ magnitudinis, & ad radicem vsque ramosæ, duplici septæ cortice, altero crasso, Suberum modo, altero tenui, interno, materiam arborum amplectente.

Li. de simp.
ph. Occid.
Indiæ.

Forma.

Ex eo quod inter vtrumque corticem est spatium, incisione Balsamum profluit, alba limpidissimāque lacryma, suauissimi odoris, qui insignes suas facultates statim prodit. Idem auctor affirmat eius guttulam, alterius quod decoctione elicitur libra præstare, cuiusque arboris fructum se habere, qui pro arboris magnitudine exiguus est, nempe Ciceris aut Pisi grano non maior, gustus aliquantum amari, inclusus extrema siliqua angusta, digirum longa, alba & tenui. Eo fructu sese suffiunt Indi ad capitis dolores & defluxiones. Auctor generalis Indianarum Historiæ narrat in India & insula Hispaniola plantam quandam sponte nasci, arboris magnitudine, utpote quæ ad duorum hominum proceritatem interdum assurgat.

Usus.
Lib. II. 74.

BALSAMI folium.



Caulibus est cinereis, foliis viridibus superiore parte magis quàm inferiore, grandibus & amplis costa crassiore & elatiore per medium diuisis, foliorum pediculis non virentibus, sed rubescentibus. Fructus est racemosus, longus instar manus digitatæ. Acini eius rari, virentes, quandoque rubescentes, & qui maturescendo magis, ac magis rubescunt. Succum ex ea hoc modo extrahunt. Cymas & asparagos teneros huius plantæ colligunt, alij racemos addunt, & ex his succum exprimunt, quem in aqua coquunt ad dimidias, deinde magis ac magis ad saporem aut mellis crassitudinem. Residere sinunt, & ad usum reponunt. Vlceribus & vulneribus admovent sanguinem enim reprimunt, terget, & mirifice eis medetur, etiam vero Balsamo efficacius. Eius folium hic ad viuum est expressum, utroque extremo acuminatum, sex digitos longum, latum quatuor cum dimidio. Repertur in multis locis insulæ Hispaniolæ. Balsamum nouum vocant. Ex eius summitatibus

destillatur aqua, præstantior aqua vitæ, vulneribus vtilissima, & morbis omnibus qui à frigore ortum habent, vti dolori ventriculi, aut partis alterius, si diebus aliquot bibatur.

MACER.

Nomen
Lib. I. c. 94.
Forma
Lib. II. c. 8.



T. GRAECIS *μακρί*, ita Latinis Macer & Macir nominatur, Auicenna Talisafar, de quo breuiter sic Dioscorides. Macer est cortex flauescens, crassus, gustu perquam adstringens. Ex Barbaria aduehitur. Plinius non plura tradit. Et Macer ex India aduehitur, cortex rubens radicis magnæ, nomine arboris suæ. Qualis sit ea incompertum habeo. Plinius & Galenus ex India conuehi Macerem aiunt, Dioscorides ex Barbaria, quæ, Ptolemaeo auctore, in Indo fluuii insula est, vel vrbs. Illud maiore consideratione dignum, quod Plinius radicis, alij alterius partis, vel trunci, vel ramorum arboris corticem Maceris nomine intellexisse videntur. Quis autem sit hic cortex, hodie ignoramus, nec etiam aliunde ad nos aduehitur. Attamen Pena scribit inter extima Casia corticis magna fragmenta, de quibus dicemus, etiam repertum fuisse alium, qui ex cuiusdam arbusculæ stipitis imo exemplis, inferiore sui parte valde similis & concolor est superiori, sed minus crassus, fere inodorus, aut quod in luglandis aut Lauri redolens, gustu perpatum caloris glutinis ve mixti cum adstringente habens. Quare Macer videri possit, cum Macer Dioscoridi & Galeno adstringens sit, & calfaciat, & arboris cortex esse videatur. Macim autem Ononidinarum non esse, integumentum scilicet Nucis myristicæ, multis rationibus demonstrari potest. Est enim Macis tenuis cortex, acris odoratus, & amariusculum. Macer verò Plinio cortex rubens, radicis magnæ. Præterea vires & facultates plurimum à sese disident. Nam Macer gustu valde adstringit, vt Dioscorides ait, est. Quare contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur. (1) ex Plinio, Corticis melle decocti vsus ad dysenterias præcipuus habetur. Galenoverò Macer gustu est multum acerbo, cum leuicula quadam acrimonia odorata, iucundum sanè redolens. Videitur itaque ex mixta constare essentia, pleraque terrena frigida, paucula verò calida, & tenuium partium. Quamobrem valenter desiccant adstringitque: ob id celiacis & dysentericis miscetur facultatibus, in terrores desiccantium consistens ordine, in caloris frigorisque dissensu neutram agniter efficiens. At Macis non ita adstringit, nec tam leui est acrimonia, sed leuiusquam & fauces satis vellicat, odoratiores est, & leuiusculum amarorem cum siccitate relinquit, vt dici possit calfacere & siccare in fine secundi ordinis, vel proprio tertij. Maceris à Maci discrimen non ignorauit Serapio, qui cum ex Isaac dixisset Macim esse Nucis odoratæ operimentum, subiungit aliud esse de quo intelligit Dioscorides, scribens Macerem ligni corticem esse siue corium. Item Auicenna de Maci Nucis odoratæ inuolucro tractauit vno in loco, de Macere autem tanquam diuersa re, nomine Thalissafar, alibi. Postremò Dioscorides & Galenus de Macere illa quidem quæ suprà diximus, literis mandarunt, de Maci vero utpote incognito aromate, ne verbum quidem.

Vires.

Lib. II. c. 8.
Lib. 7. simpl.

Ca. 2. simpl.

Lib. 2. c. 44.
Lib. 2. c. 67.

MALABATHRVM BETRE. CAP. XV.

Nomen
Lib. I. c. 11

Forma



MAA'BAΘPON Græcis & *قلا*, Latinis similiter Malabathrum & folium simpliciter, & folium Indicum. De quo hæc prodicit Dioscorides. Malabathrum quidam esse putant Indicæ Nardi folium, decepti quadam odoris similitudine: multa enim Nardum olent, vt Phu, Alatum, Niris. Res autem nõ ita habet. Nam Malabathrum folium est generis, quod in India nascitur paludibus, Lentis palustri modo innatans aquis sine radice. Id collectum statim lino transsuietur, & siccatum reconditur. Ferunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus v. l. Quod si non acciderit, non amplius renasci. Probatur recens, ex nigro candicans, non fragile, integrum, odore

odore caput feriens, quod in sua odoris suavitate diu permaneat, ut Nardum sapore immiscetur, nullo satis gustu. Infirmum verò, & minutim concisum, cariosum, virus olens, improbat. De eodem sic Plinius. Dat & Malabathrum Syria, a bore folio conuolutum, arido colore, ex quo exprimitur oleum ad vnguenta, fertilior eiusdem Aegypto. Laudatius tamen ex India venit. In paludibus ibi gigni tradit Lentis modo, odoratius Croco, nigricans scabrumque, quodam salis gustu. Minus probatur candidum. Celerrime situm in vetustate sentit. Sapor eius Nardo similis esse debet sub lingua. Odor verò in vino sufferuifaci antecedit alios. Hic Plinius diuersa Malabathi genera ponit, Dioscorides vnicum. Vinum in India laudatius, ibi in paludibus gigni Lentis modo, quod Dioscorides dixit Lenticula palustris modo aquis innatare. Quodam salis gustu, Dioscorides nullo, *μὴ λυμυλῶν*, id est, nauigationis tempore aqua marina non perfusum. Minus probatur candidum, Dioscorides probat ex nigro candicans. Auicenna & Serapio quæ de Folio Indo tradiderunt, à Græcis mutuati sunt, qui cum Malabathrum non norint, ex eorum scriptis innotescere aliis non potuit. Quare veram Malabathi historiam ex Garcia hic exponemus. Indi folium siue Malabathrum Tamalapatra appellant, ex qua voce Græci & Latini suum Malabathrum detorserunt, Arabes *Ladegi Indi*, id est Folium Indum, Actuarius à Mauritanis *Tembul* nominari perperam scripsit. Est autem Folium Indum folio mali medicæ simile, angustius tamè per extremum, colore viridi, tribus per longitudinem excurrentibus costis (qua nota facile dignoscitur) odoratum, Caryophylla quadantenus redolens, non tam vehementis odoris quàm Nardus aut Macis, neque tam subtilis & acuti quàm Canella. Non

Lia. cas.

Lia. cas. 17
Cap. 13
Simpl.
Li. 1. Arom.
Ind. ca. 39.
Nomen

Forma

TAMALAPATRA

cum suo ramusculo.



igitur aquis innatat hoc folium Lentis palustris modo, ut referunt Dioscorides & Plinius, sed nascitur in procera arbore procul ab aquis, cum multis aliis in locis, tum in Cambaya. Neque tam validi sunt odoris folia hæc quàm Spica Nardi, sed suauioris, neque eo modo colliguntur atque reponuntur quo Dioscorides ait, sed collecta in fasciculos colligantur, atque ita vaneunt. Dilutior viridi colore nitent, non ex candido nigricant, & præferuntur integra, quod facultas in istis melius conservari creditur. Odore nequaquam caput feriunt, ut reliqua odorata. Plinius in Syria, Aegypto & India nasci tradit, quod cum perquisivisset Garcias à Medicis Memphiticis, Damascenis, & Alepinis, omnes vno ore negarunt in Syria aut Aegypto gigni, neque tam validi esse odoris quàm Crocum, neque Nardi esse sapore affirmat. Quod verò huius in vino sufferuifaci odorem alios antecedere scribit, eius tempore verum id esse potuit, cum adhuc ignota essent Berzuinum, Ambarum, Moschus, Calambac, id est Agallochum præstantissimum, aromata odoratissima. Hoc folium quale à Garcia describitur, eius Scholiales ad nos, ipsi etiam tenuioribus ramis interdum adhuc inhaerens & integrum adferri ait, quale & hic pictura expressit, gustu Laurini serè folij. His addit picturâ fructus cuiusdam exiguui, glandis serè forma à Cortuso misi cum hac inscriptione, Fructus Canellæ quorundam sententia, ex aliorum verò sententia, *Tembul* conuoluti in India.

Eum

Eum quoniam intellexerat aliquando vnâ cum folio Indo ad nos adferri, atque d legitimum esse folium ex Garciz descriptione coniciat. (Nam *Tembul* fructus longè diuersus est, vt in Betre dicitur) pingendum curauit, Auicenna Thalifasar missus est, quem & nos hic cum folio exhibemus. Falluntur, inquit Garcias, qui Malabathrum Caryo phyllorum folium esse putant: nam regio in qua Caryo phylla nascuntur, bienonj ferè itinere distat ab ea in qua Malabathrum ptouenit. Neque opus fore *ἡσθεὶς ἁδὲν ἴσθης* ait, si diligentiores essent pharmacopœi & Medici Lusitani: tanta enim eius copia exportari posset, quæ vniuersæ Europæ sati faceret. Eius autem penuria Canellæ solus vtendum consulit, si ea nanciscantur, *sin* minùs, Spica Nardi, non autem Maci, vt quidam voluerunt, Auicenna Thalifasar substituit aut Spicam, Bellunenſis autem Thalifasar, seu Thalifasar, seu Thalesir, seu Thalesir interpretatur folia Oliuæ Indæ. Alij dicunt, inquit, quòd est lingua auis. Rectius opinor Clusius, qui Thalifasar Auicennæ Græcorum Macerem esse cenſet, de quo Thalifasar nomine scripsit Auicenna, vt diximus. Malabathrum, Dioscoride auctore, easdem quas Nardus vires habet, sed omnia efficacius præſtat. *Vres.* Vrinam vehementius ciet, & stomacho magis prodest Malabathri vis. Oculorum inflammationibus tritum & in vino feruefactum commodè illinitur, subditum linguæ oris halitum commendat. Vestibus interpositum earum odorem feruat, & ab erosionè tuetur. Plinius, Malabathri quoque naturam, inquit, & genus, r- posuimus. Vrinam ciet, oculorum epiphoris vino expressum vtilissimè imponitur: item fronti dormire volentibus, efficacius si & nares illinantur, aut si ex aqua bibatur. Oris & halitus suauitatem commendat linguæ subditum folium, sicut & vestium odorem interpositum. Folio Indo Betre siue Berle adeò simile est, vt idè esse credant multi, etiâ qui in India peregrinati sunt. Amatus Lusitanus vtrumq; confundit. Item Odoardus Barboſa, scribens fluuium esse Betelle nuncupatum, in cuius ripis vici sunt aliquot, & horti amœnissimi ac paradisi, in quibus tanta Betelle copia colligitur (folium id est ad mandendum præstantissimum) vt iis vigilia paruula & scaphas onerent, quæ ad alias regiones & maris portus venditæ transuehunt. Hoc folium, inquit, Folium Indum vocamus, Lauri folio magnitudine par, eademque ferè specie. Hederæ modo alias arbores conscendit, & palis indicisque fulcitur. Fructu semineque caret. Folium istud in ore detentū roborandi vim habet. Quamobrem Indi omnes tam viri quàm sceminæ, noctudiūq; domi & foris id perpetuò mandunt ita præparatum. Ex ostreorum testis calcem coſciunt, in qua aqua dissoluta folium macerant, quibus adiungunt paruula quædam poma (*Arca* vocant) quæ permixta in ore tenent manduntq; nihil deglutientes, præterquàm succum qui ex superioribus tribus commixtus elicitur, quæ semper os ruſo colore, & dentes nigro inficiunt. His tradunt ventriculum à superuacuis humoribus expurgari atque exſiccari, cerebrum & cor mirè roborari, flatu discuti, sitim sedari, vt nulla apud Indos res maiori sit in pretio. Non solum loco supra dicto, sed etiam in tota India magna folij huius copia est. Persæ & Arabes *Tambul* vocant. Hæc Odoardus Barboſa. Sed hallucinantur, inquit Garcias, qui Betre folium Indum esse putant, in quo etiam errore se fuisse fatetur. Sed Nizamox Regi medicamentum roborando stomacho iussus componere, cùm medicamenta ex quibus constaret enumerasset, adderetq; id folium quod manderet, folium Indum esse, risit ille, & Auicennam ostendit Arabica lingua conscriptum, qui diuersis capitibus de Folio & Betre agebat. De Folio quidem loco supra citato, de Betre veto multò post, quod *Tembul* vocat corrupto, vt Garciz videtur, vocabulo, quod ab omnibus *Tambul* non *Tembul* vocatur. In Malauar, vt idem Garcias scribit, *Betre* vocatur, in Decan, Guzarate & Canam, *Pam*, in Malato Siri. Nascitur in omnibus Indiæ regionibus maritimis Lusitanis cognitis, in continenti non reperitur, nisi c maritimis

è maritimis delatum. Verum quidem in Dulia bado, vrbe opulenta, in Decan, in Bifnaga inueniri, sed minori certè quantitate quàm vt ad Persis & Arabes deferatur. Supra Calaiate, quod octoginta leucis ab Ormuz distat, inueniri haud erit facile. Nam neque regionem frigidam amar, vt ex China, neque folibus nimum perustam, vt Mosambique & Sofala. Est autem Betre, inquit ille, folium simile terè Mali Medicæ folio, oblongius tamen, & per extremū arcūius, venas siue costas per longitudinem excurrentes habens. Optimum censetur bene maritum, colore fuluescente, tamet si mulieres nonnullæ præferunt quod immaturum est, quia maiorem sonum edit in ore dum manditur. Corruptum si recens à planta collectū diutius manibus tractetur. Fert Betre in Maluccis fructum quēdam cōortum, la-certi caudæ similem, quem istic edunt, quod bene illis sapiat. Fuit id semen delatum Malacam, atque degustatū optimi saporis inuentum est. Setitur autem Vitis modo, addunturq; pedamēta, per quæ repens se sustineat nostratis Hederæ modo. Quidam maioris quæstus gratia Piperis, aut Arcæ arboribus id maritant, atque ita pulcherrima vmbracula conficiunt. Multam verò curam & assiduam rigationem desiderat. Betre folium mansum amarum sentitur. Quia ob causam Arcam, calcem, atque alia admiscunt. Sunt qui addant Lycium, opulenciores Caphuram de Burneo, nonnulli lignum Aloës, aut Moschum, aut Ambarum. Sic autem paratum, adeo suavis est saporis, orisque halitum adeo commendat sua fragrantia, vt perpetuū ferè illud mandant ditiores, tum etiam alij pro facultatum ratione. In solitudinibus autem & remotioribus a mari locis carè venditur. Ideo fertur Nizamoxa singulis annis in id impendere trigiesis mille aureos Lusitanicos. Hæc sunt eorum tragemata, hoc abeuntem donant, atque Rex ipse interdum propria manu potentioribus largitur, aliis verò per manus famuli. Sed quia Betre venas habet per folij longitudinem discurrentes, vngue pollicis (quæ ea de causa in acutū præfecant, non veluti nos in rotundum) eas eximunt: deinde admisto calcis momento quæ tum ob exiguam quantitatem, tum quod ex testis ostreotum concre-matis facta sit, nocere non potest) & Arcæ contusa aut contracta, folium Betre complicant, atque in os iniectum mandunt, priorem illum succum expuentes (quod tamen nonnulli non faciunt) qui cruentus videtur: deinde alta arque alia folia similiter præparata sumunt. Solent aliquem dimissuri, aut ipsi ab aditibus discedentes his foliis præparatis plena bursa fericea abeuntem honorare. Nemo autem discedere sustinet, donec Betre sit donatus: id enim est dimissionis indicium. Præterea opulenciores adituri, hoc Betre manducare pro more habent, vt odore os commendent. Est enim apud eos valde indecorum odoratum non habere anhelitum: ita vt si tenuioris fortunæ aliquem cum potentiori fabulari necesse sit, manu ori admota id faciat, ne teter aliquis odor nares altetius feriat. Sic etiam mulieres cum viris congressuræ Betre mandunt, antequàm colloquantur, existimantque ad lasciuia summam esse illecebram. Omnes eius regionis incolæ sumpto cibo mandere solent, alioqui cibos nauseam prouocaturus aiunt, & mandere assuetis oris halitum tetrum fieri si abstineant. Solent ab eius vsu aliquot dies abstinere, quibus obierūt sanguine iuncti, & in quibusdam ieiuniis. Ab eius etiam esu abstinent, & humi se abiciunt Arabes & Moalis, id est, Ali sectatores, decem diebus quibus ieiunant. Auicenna tradit Betre gingiuas confirmare, in quem etiam vsum semper ab Indis manditur: & paulo post subicit stomachum roborare, ob quam facultatem etiam ab Indis expetitur. Quod autem frigidam facultatem illi tribuat in primo gradu, & escicantem in secundo, putat Garcias exemplar vitiosum esse, aut (quod docti Arabes arbitrantur) Auicennæ in temperamenti ratione impositum fuisse. Fit enim plerumque, vt vulgus quæ calida sunt, frigida esse dicat, vt Pipet, Cardamomum, Cepam. Calidum autem

Forma.

Vfus &
Vires.

Lia. c. 699.

& sic in esse Barye ad finem secundi effectus. Garcias portus est, & in flore, ac odore indicavit.

LACCA.

CAP. XVI.

Lac. cap. 1.



Cap. 2. simpl.

In cap. 1. simpl. Dicit.

Lac. Atom. 104 cap. 6. Nomina

LACCA Officinis, Italis etiam *Lacca*, quibusdam *Lachetta*, Arabibus *Luch* vocat, & Dioscoridis Paulique *Cancanum* esse censet. Scribit enim ex Paulo gummi esse simile Myrrhae, boni odoris, debere adhibita cautione sumi. Deinde eos reprehendit, qui Carabem dixerunt esse Laccam, quamvis Carabe nonnullas facultates similes habeat. Scia quo ex sententia Dioscoridis & Athabani quem nonnulli Paulum putant, quod eius verba transferibat scribit Laccam gummi esse arboris in Arabia nascentis, cuius simile. Deinde ex sententia Rhais, ex celo descendere in ramos arboris Gube, est Mespil. Postremo ex Isaac, Laccam, inquit, quaedam rubra, quae tenuibus ignis inhaerit, et saporis suavis. Coquuntur, & ex ea panis rubro colore inhiunt, quam insectum in *Kathenes* vocant. In Armenia defertur. Sed de Lacca longe aliter scribit recentiores. Amatus Lusitanus tradit Laccam hodie a Lusitanis India deserti, nigram, translucidam, insecturis praecipue e pergam, et quae officinae compositionem praeparant, quam *Dia acci* appellant. Hanc comit non enim esse, nec arboris plantae vel alicuius lactis, sed ponitur cum rumalataum stercus, sanguineve, vel ut ceram apuit. In Regno Pegu apud Indos, cum terra pluua, vel arte pluvio irrigatur, conmixta alata quaedam terrena incolis sic disposita descendunt, in quibus Laccam generant qua de causa in Lacca ligna visuntur, quae proculdubio arboris non sunt Laccam ferentis. Garcias tradit quam Officinae Laccam vocant Arabibus, Persis, & Turcis *Lac Sumutri*, quasi dicas Laccam e Samatra, nuncupari, non quod Samatra provinciae Pegu, ubi plurima Lacca nascitur, finitima, sed quod Arabes & Turci Samatra gigni putarent. Idem nomen feruarunt incolae provinciarum Bengala, & Malabar, quia a Mauritaniis id didicerunt. Legitimum tamen in

LACCA cum suis baculis.

Cap. 5.



provinciis nomen est Lac, in Pegu vero Martaban, ubi est praestantissima, Tree, istuc a *Lamay* adferri tradit. Non vocatur *Aucul*, ut Pandeclarius scribit, neque ut corrupte apud Serapionem legitur. Pegu incolae Pegu & Martaban eam *Sambu* dixerant, unde Piper in suam regem recebat. Quomodo autem illic nascitur, ita narrat istam arborem illic inueniri foliis quodammodo Pruni, in cuius furculis & minutioribus ramis magnae formicae in terra visceribus ab his locis enatae hanc Laccam elaborant, ut apes mel conficiunt) materiam ex ipsa arbore extractas hos deinde ramulos ab arbore reuelli, atque in umbra siccare, donec decidibus ipsa Lacca veluti in tubulos coacta maneat: interdum ligni fragmenta ipsi inhaerent. Melior sincera, ligni & fragmentorum expers, de qua cui ligni fragmenta inhaerent. Inuenitur etiam solida & minime sincera, qua postea colligit, & in pollinem redigit. Haec vis or, quia multa terram admixtam habet. Non est autem arbor in qua

in qua Lacca prouenit, Myrto similis facie, aut magnitudine, vt aliqui putant, sed interdum in Nucis iuglandis magnitudinem accrescit, interdum minor est. Idem refert se in Balagnate uidisse tamulum ex arbore Betifera reuulsū, cui inhaerebat Lacca: sed quia exigua admodū quantitate aduersante, cæli temperie prouenit, negligi: multi tamen se uidisse in iis arboribus affirmabant. Formicas autem Laccam conficere perspicuum esse, quod plerumque alæ formicarū Lacce pertinet reperiuntur. Eligenda Lacca quæ præmansa pulcherrimo colore rubro inhiat. Quæ etiam ad nos aduehitur, circa ramulos elaborata est, inquit Clusius, & quauis prædura & exsucca, mansa tamen sputum efficit sanguineum, quod probitatis est indicium. Ex his intelligere licet Laccam à Cancamio Græcorum diuersam esse, quod Lacca minimè odorata sit, Cancamum autem ad suffimenta vsu patitur, quod boni odoris est indicium. Quare Auicennæ & Serapioni ignotum simile qui Cancamum Græcorum esse putarunt, quibus æquè incognita fuit. Non est autem Lacca Myrrhæ similis, quia hæc in exterioribus tamulis conchitur, & odorata non est, Myrrha ex ipso arboris trunco extillat, & odorata est. Fallitur etiam Auenenna scribens similes illi cum Carabe esse facultates: Carabe enim adstringit, Lacca obstructions aperit. Præterea Laccam in Arabia nasci falsum est, cum in Arabiam ex India deportetur. Neque in Sorbi ramulos delabitur, neque etiam Mesopotamia, vt nonnulli perperam venterunt: cum nullæ sint, auctore Garcia, in vniuersa India Sorbi neque Mesopotamia. Sed nec in Armenia prouenit, nec est Kermes Arabum, cum id nihil aliud sit, quam Coccus insectorius Græcorum. Lacca exalfacit ordine secundo, ventriculum & iecur roborat, & ab obstructionibus liberat, iecur prodest, aquas pellit. Est alia Lacca artificialis, quam insectores vendunt: quæ ex fæce brasilij & croci constat, quæ pictores maximè vtuntur in exprimendo colore rubro obscuro.

*Electio.**Vires & Temper.*

BENZON.

CAP. XVII.

BELZOE, vel Belzoim, vel Belzuinum vulgò, Garcie Benini, siue Benzuinum dicitur. Id ille veteribus prorsus incognitum fuisse scribit: neque enim apud Græcos, neque apud Arabas vllus eius descriptionē legimus. Auerrhois quidem scribit Belenizan, siue Belanzan, siue petiolam exsiccantem & exalfacientem in secundo excessu habere facultatem, stomachum humidum & languescientem exsiccare & roborare, oris odorem commendare, partes corporis confirmare, & venerem excitare: quod nonnulli Beniui esse putant, quibus Garcias non assentitur. Veteribus etiam Iudæis incognitum fuisse ex eo conicit, quod neque David, neque Salomon eius mentionerint, qui tamen odores & suffimenta maximè celebrarint. Beniui genera multa Garcias recenset. Vnum à mercatoribus maximè expetitur, quod amygdaloides vocant, quia vngues seu maculas candidas amygdalorum instar admixta habet, & quo pluribus abundat, eo præstātius habetur. Amatus Lusitanus hoc genus Myrrham Troglodyticam Dioscoridis, omnium præstantissimam esse censet. Maximè prouenit in Sian, & eius cotermina Martaban. Alterum genus nigrius inuenitur in Iaoa & Sumatra, quod vilius est. Est & genus nigrum in Sumatra, è nouellis arboribus profluens, quod ab odore grato Beniui de Boninas vocant: id superiori decuplo carius est. E nouellis autem plantis profluens amygdaloide odoratus esse ait Garcias, quia gummi multum natiuæ suæ fragrantie vetustate amittit, vt ferè reliqua huiusmodi. Sed quia candidum elegantius est, nigrum & nouellum odoratus, vtrumque permiscere solent, vt odoris fragrantie etiam elegantiam conciliant. Beniui genera à Chinesibus vocantur *Commham*, ab Arabibus *Louaniay*, quasi dicas Thus de Iaoa, quod hæc regio primum Arabibus innotuerit: Arabes

Nomina
Lia Acom.
Ind cap. 1.
Collig. p.
caj. 6.

Genera.

In cap. 71.
Iba Diosc.
Locus.

enim Thus Louan vocare diximus, Gazarate & Decan incolæ *Udo* nominant. Est autem Beniuiera arbor procera, vasa pulchra, vmbra latè diffundens ob ramorum copiam, quos venusto ordine digestos, & in altū sublaros habet. Caudice est crasso, materie pulchra & firma. Folia minora sunt aliquantò Citri, seu Limonæ foliis, non tamen adeò virentia, sed parte auersa candicantia, quæ in maioribus ramis nascuntur, ad Salicis folia magis accedūt, latiora tamen sunt, sed minùs longa. Nascuntur interdum in siluis Malaca. Vulnerātur interdum arbores vt Beniuia maiori quantitate effluat, nouellæ, vt dictū est, Beniuia de Boninas emittūt. Credidēre permulti Lasepitij lacrymam, siue Asiam odoratam esse Benzuinū, quorum sententiam Garcias improbat. Nullum enim, inquit, in condimenta vnquā Benzoinum recepit certum est. Alæ verò frequens est vsus in condiendis cibis apud Indos. Deinde in maxima pars Laseis ex India vltra Gāgem (Indi Ganga vocant) aduehitur. Beniuia vero quod in Indiam adfertur, quòdque Amygdaloides dicunt, nascitur in Sumatra & Sian (non in Armenia aut Syria, aut Cyrene) eiusque maxima pars in Indiam conuehitur, deinde in Arabiam, Persiam, & Asiam minorē, atque etiam in Palestinam Syriam, Armeniam, Africam.

BDELLIUM.

CAP. XVIII.

Nomina
Lib. 2. c. 69



ΔΕΛΛΙΟΝ Græcis, μάλδακον & βόλχον, Latini Bdelium. Est autem colore Diofconide, lacryma Sarracenica, seu Arabica arboris. Præparatur gustu amatum, translucidum taurini glurinis modo, intus pingue, facile liquefscens, ligni ac sordis expers, suffitu odoratu, vngui simile. Est etiam Bdelij genus sordidum, nigrū, vberioribus glebulis in offis conuolutum. Aspalathi odore, ex India aduectum. Deferunt etiam ex Petra oppido siccum, etiam nolum, luescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi, sed ita vitium non perinde gustui amaritudinem representat, nec adeò suffitionibus odor.

Lib. 2. c. 9.

Dioscorides hic solum gummi meminit, Plinius etiam arboris. Vicina est Babylonia, inquit in qua Bdelium nominatissimum. Arbor nigra est, magnitudine Oleæ, folio roboris, fructu caprifici naturæ. Gūmi alij Brochon appellat, alij Malacha, alij Maldacon. Nigrū verò & in offis conuolutū, Hadrobolon. Esse autem debet translucidū simile ceræ, odoratū, & cū fricatur pingue, gustu amarū citra acorem. In sacris vino perfusum, odoratius. Nascitur in Arabia, Indiaq; & Media ac Babylone. Aliqui Petaticū vocant ex Media aduectū. Facilius hoc & crustosius, amariusque, at Indicū humidius & gūmosum. Adulteratur Amygdala nuce. In nostris Aucienæ exemplaribus cōfusa est admodū & inepta Bdelij descriptio. Serapio duobus diuersis capitibus de Bdelio tractat. In priore scribit Molechil de Machi, id est Bdeliū de Mecha esse arborē lunci, quæ maturatur in Mecha, & comeditur, estq; dulcis, cuius cor est Cehilio, estq; ex genere Palmæ. In altero capite de Molochil agit, quod est Bdelium Dioscoridis. Bdelij fructum à Cortuso in sium

Lib. 2. c. 11.

Cap. 117.
Simpl.

Cap. 194.
Simpl.

BDELLII fructus Cortuso.



rei herbariæ studiosis comunicauit Clusius, quem & hic expressimus. Est nucis Iuglandis magnitudine, aut etiam amphoræ, triangulari forma, oblongiori tamen, & ad Picum quodamodò accedente, odoris, colore subcinereo, durissimo.

risuino putamine, quod pręgnans est, & nucleum continere videtur. Bdelium calfacit auctore Dioscoride, & emollit duricias, & turgentia guttura, humida scq; heetias discutit, cum ieiuna salua dilutum: vuluę spiracula laxat appositum: & lutifru, & parvus humiditatisque omnes extrahit, calculos potu comminuit: vrinam mouet, tussientibus & a serpente percussis vtilissimę datur: valer ad rupra, vulsu, laterum dolores, & discursantes spiritus: malagmatis inferitur, quę contra duricias & neruorum nodos prosunt. Contusum resoluitur affuso vino aut aqua calida. Dilucidius easdem facultates exponit Galenus. Bdelium quod Scythicum nominant, quod sanę & acius est & resinofum magis, emollientis admodum & efficacis virtutis est. Arabicum, quod dilucidius est, magis desiccet quā emollientia. Igitur recens & humidum est, & contusum facillē mollescit, ad omnia ad quę Scythicum idoneum. At quod antiquum est, & gustu admodum amarum, & acre & siccum ab eorum quę indurata emolliunt mediocritate excidit. Viuntur autem illis & potissimum Arabico, & ad bronchocelas, & hydrocelas salua natutina ieiunęque subigentes, vt emplastri consistentiam accipiat. Porro Arab cum & calculos renum in potu sumptum frangere apparet, tum vrinas ciere, & crudorum flatuum discursus, & laterum dolores, & rupturas persanare.

Temper.
Ex Vires.
Lib. 2. ca. 69.

Lib. simpl.

CAPHURA.

CAP. XIX.



CAPHOR seu *Chafur* Arabibus, recentioribus Gręcis *καμφορα*, vt etiam Latinis *Caphura* nominatur, Officinis & Italis *Camphora*, Germanis *Campher*, Gallis *Camphre*. Serapio tradit Camphoram de Panzor esse de terra Panzor, id est, de insulis propinquis regioni Sarandin, & quibus annis hunc multa fulgura, tonitrua, & terrę motus, ibi generari multā Camphoram, & cōtrā. Aiuunt etiam, inquit, in montibus Indię & Sim esse arbores Caphurę. Deinde scribit ex Isaac, Camphoram deferri ex regione Saffella, & ex regione Calca, & Dhabeac, & Harigi. Et Camphorā esse gūmi arboris nascentis in partibus illis, & esse gummi maculari coloris rubri, & lignū eius esse album, tenerū, quasi velit fieri nigrum, & Camphoram reperiri in corde ligni arboris, & in interuenis ligni. Meliorem esse quę Camphora Riach appellatur, quę spōte ex ligno arboris manat, & coloris est maculati rubri, quę sublimatur, & fit Camphora alba, Riachina dicta a nomine Riach Regis, qui ibi primus regnavit. Nomen loci Panzor. Secundum bonitatis gradum obrinet Camphora de Sauzen, crassā, coloris obscuri, nec clara sicut Riachina, & vilior. Sequitur Camphora de Carlal, fusca, vilioris etiam pietij quam Riachina. Deinde Camphora Halonichi, fragmenta ligni admixta habens, pinguis, gummosa, ad suscitū vtilis cum Costo, Myrrha & Thure in templis. Omnes hę species, inquit, clarificantur per sublimationem, & ex his prodit Camphora alba in laminis, figura paropsidum, & vocatur Camphora operata. Hęc ex Serapione. Auicennę species Camphorę sunt, Alkanfuri, & Ariagte, deinde Alzeid, & Alefcek: & est alba quę permixta est cum ligno suo. Quidam autem dixerunt quod est arbor magna, faciens vmbra multitudini animalium valde numerosę, sub qua vmbra consueuerunt habitare aluemer, seu aluemer (lupos ceruarios Bellunenſis interpretatur) & non peruenitur ad ipsam arborem nisi in tempore nord anni. Lignum eius sæpius se vidisse ait, quod est album, frangibile, leue, in cuius cavitatibus quandoque continetur aliquid de vestigijs Camphorę. Hęc ferē Auicenna. Sed de hac tora remulto certius & enucleatius scripsit Garcias. Ac primū *Capur* seu *Casur* ab omnibus Arabibus nominari, quia a pud eos literę p, & f, magnam habeant affinitatem. Quod si a quibusdam aliis alia imponantur nomina, aut mendosa esse exemplaria, aut auctores ipsos ea in re deceptos fuisse censet. Pręterea nomina locorum in quibus Auicenna &

Nomina

Cap. 14.
simpl.

Lib. 2. ca. 19.

Lib. Aromat. Ind. 1.
cap. 9.

Serapio nasci tradunt, magna ex parte corrupta esse. Nam ea, quam de Panzor vocat, est de Pacen in Samatra insula. Pro regione Calca ex qua aduehitur, è Malaca dicere debet, quoniam in Baitros loco Malacæ vicino nascitur. Ea, quam Auicenna de Alsz appellat, de Sonda esse potest, inquit Garcias, quæ est insula Malacæ vicina. In nostris tamen Auicennæ exemplaribus non legimus Camphorâ de Alsz, sed Alkanfuri, Ariogiz, deinde Alzeid & Alefcheh, vt supra diximus. Est autem Caphura nobile medicamentum, veteribus Græcis ignotum, & solis Arabibus acceptum ferendum, gummi quod in medullis ligni cadens, deinde extrahitur, aut per rimas exudat. Id in aliquot lignis se vidisse Garcias affirmat. Principio verò exudat admodum candida, sine vllis rubentibus, aut nigri-antibus maculis, non autem organis elicitur, neque ad candorem conciliandum decoquitur, vt Auicenna & Serapio tradidit. Duorum est generum, Caphura de Burneo, & quæ ex China defertur. Caphura de Burneo nunquam ad nostras vsque regiones penetrauit: nec id mirum, inquit Garcias, quia huius libra tantum est, quantæ centum librarum eius quæ ex China est, quæ secundum est genus, quæ in Soppam defertur in panes orbiculares coagmentata, diametri quinque digitorum, quæ cum coagmentata sit, compositum medicamentum, non simplex, videtur. Caphuræ de Burneo, quæ magnitudine est Milij, aut paulo maior, genera quatuor faciunt Gentiles, Baneanes, & Arabes qui eam emunt. Nam diuidunt in caput in pedes, in crura & pedes. Eius quæ ex capite est libra venit Pardan octoginta, autem Pardan monetæ aureæ apud Indos genus quod cõsistit de rem regales stellatos. Quæ ex pectore, aureis viginti: quæ ex cruribus, duodecim: quæ ex pedibus, quatuor, aut summum quinque. Nonnulli curiosiores quatuor instrumenta cuprea sumunt, inæqualibus foraminibus pertusa, per quæ Caphurâ transmittunt. Ea quæ per instrumentum maiora foramina continens transmittitur, suum habet pretium, quæ per instrumentum mediocrium foraminum, aliud: sic de ceteris intellige. Multa nascitur Caphura in Burneo, Samatra & Pacen. Quæ ex Burneo fertur, plerumque admixta habet lapidum fragmenta, aut gummi quoddam detros illis vocatum, Succino crudo persimile, aut ligni cuiusdam scobem. Sed maleficio deprehenditur facili, nullamque aliam adulterationem nouit Garcias. Nam si interdum rubentibus, aut nigricantibus maculis conspersa videatur, id ex sordidatum & impurarum manuum contrectatione, aut ex madore contrahi affirmat. Sed facili a Baneanibus id vitium emendatur. Nam in panno lineo colligatam, in calidam aquam clam demittunt, additis sapone & Limonum succo: deinde proelotam in vmbra siccant, sic multo candidior redditum pondere non multum imminuto. Id ab amico Baneane fieri vidit Garcias, qui & hoc arcanum docuit. A visis fide dignis sibi relatum fuisse idem Garcias narrat, Caphurâ arborem Nuci rugulidi similem esse, foliis tamen candidatibus, Salignis similibus, fructum & florem haudquaquam se vidisse, fieri tamen posse vt vtrumque ferat. Illud autem certo se scire, materiem esse cinerei coloris, Faginæ serè similem, interdum nigriorem, nec eam quidem leuem, aut fungosam, vt ait Auicenna (nisi forte caducâ, aut emortuâ viderit) sed mediocriter solidam. Addit plerique vastam & præaltam esse arborem, latissime se fundentem, aspectu perpulchrâ. Fabulosum est quod ad eius vmbriam omne animalium genus confugere aiunt, vt ferociora animalia de eurent: item quod scribit Serapio largioris huius prouetus augurium esse, cum frequentibus fulgens celum coruscat, aut crebro tonitruo cõstrepit. Nam cum Samatra insula (quâ nonnulli Taprobanâ putant) & circũiacentia loca lineæ Equinoctiali vicina sint, multis tonitribus subiecta sint necesse est, eamque ob causam singulis diebus imbres, aut leues pluuias habet. Quare singulis annis Caphura abundare debebant. Ex quibus perspicuum est tonitru largioris Caphuræ prouentus causam, aut indicium non esse.

Genera.

Locus.

Forma.

esse. Nonnulli Caphura ex China composita videtur ex eius parte quæ ex Burneo adfertur. Affirmarunt præterea Garciz panes illos orbiculares qui ex China deferuntur compositos esse, quoniam Caphura de Burneo in Chinam deferretur, incolis experta, ut eam alteri viliori permisceant. Cui opinioni suffragantur Baneanes de Cambaya, qui pro arcano dicunt deficientem Caphura de Burneo, solere se eius exigua quantitate cum multa Chinenſi commiscere, eamque falsò de Burneo nuncupare. Addunt item isti Baneanes Chinenſem Caphuram compositum esse medicamentum, quod tempore euaporet & corrumpatur, Caphura verò de Burneo minimè. Garciz verò compositum medicamentum non videtur, nisi ex duobus Caphuræ generibus constare dicamus. Quod Ruellius & Matthioli Lib. 2. c. 16. Serapiceni ſecuti tradunt Caphuram cæteris bonitate præſtare quæ à Rege Riach, qui primus eius dealbandæ rationem adinuenit, Riachina dicta est, vix credit Garcias, quia Indiæ Reges potentiores sunt, quàm ut huiusmodi in angonio operam dare velint. Rhafis Caphuram frigidam & humidam esse, Auicenna & Serapio, quos plerique sequuntur, frigidam & siccam ordine tertio constituunt. Temper. & Vires. Cum tamen in aquam coniecta flagret, cum sit odorata & tenuium partium, calida videtur ac incidens. In qua etiam sententia se aliquando fuisse ait Garcias, Sed cum experimento didicisset, ophthalmis & oculorum inflammationibus, atque etiam ambullis impositam non minùs quam niuem refrigerare, sententiam retractatè coactus est. Adde quòd omnes apud quos nascitur frigidam esse asserunt. Neque vero huic sententiæ repugnat, quod odorata sit, quia ob tenuitatem partium facili exhalat odor qui in superficie est. Potest & interdum facitiam esse quæ ad nos adfertur, arte & mangonio caliditatem aliquam acquirens. Genuna autem capitis dolores à calore prouenientes illita mulcet, incandescentes inflammationes restingit, præſertim iocinoris. Circumlitio nibus imponitur ad cutis nitorem conciliandum, & ad arcendas vulneta & vlcera inflammationes, et ysi pelata extinguit, aduersus gonorrhœam & albas yulæ fluxiones efficax est, cum Succino & aqua Nymphæ haulta. Idein præſtat publi, testibus & renibus illita, prius seminis Psyllij spissameto, vel Oniphacio, vel Solani succo probè macerata. Sanguinem è natibus fluentem sistit, aut cum semine Vrticæ immixta, aut cum maioris Sedi & Plantaginis succo fronti circumlita. Collyriis ad calidas oculorum lippitudines vtiliter imponitur. Renibus ac testibus illita venerem extinguit. Scribit Auicenna Caphuram vigilias excitare. Qui autem id fieri potest cum frigida sit ipsius etiam testimonio, & frigida somnum accersant? Somnum certè inducere ait Garcias, fortis & intus exigua quantitate vsurpata. Si quis verò sæpius odoratur, & naribus admoueat, cerebrum exsiccatur & vigilias inducere potest. Magni est vsus his in regionibus in quibus nascitur multis in rebus, tum etiam in cibis. Legitimæ probationem hanc esse ait Ruellius. Incalido pane ponatur, si humore madeat, sinceræ est argumentum, contra si perarescat indita, spuriz ac fictitiæ certitudo est. Nisi diligenter asseruetur in opercularis etiam capsulis nonnunquam euanescit. Turò asseruatur in vase marmoreo aut alabaſtrino, Lini & Psyllij semine sepulta. Venetias Caphuram omnem rudem important, ibique arte, igne scilicet & vitreis organis elaboratur, ut candescat atque pellucet.

Nomina

Forma.

IN Florida Noui orbis ptouinci a Galli paucos ante annos ligni caul-
dam facultares admitabiles aduersus vatios morbos expectti fuerant,
quas ab eius regionis incolis didicerant. Hos cum profugassent Hispa-
ni, & in similes morbos incidissent, ob ptaii succi alimenta, aquarum
insalubrium potationes, sub dio dormitiones, à quibsdam qui illic remanserant
Gallis illius ligni vittutes edocti, eo vli sunt, & sanitati restituti. Ob id recens in Hi-
spaniam inuehitur, de quo Nicolaus Monard. hæc ferè tradit. Arbor hæc ab Indu
Pauame nominatur, à Gallis, quos imitati sunt Hispani, nescio quam ob causam

SASSAFRAS arbor,
Monard.



Sassafras. Arbor est magna, Pini mediocri
magnitudine & forma (tamen minores inue-
niantur) vnico trunco nudo: ramis in cacu-
mine expansis, quales habet Pinus repurgata:
cortice, quem integit cinerea quædam pellicula
ex cinereo nigricante, gustu aliquantulum asperum
sed aromatico, nonnihil ad fœniculi saporis
accedente, odorato, ita vt patet eius quanta
cubiculum suo odore compleat: matene trunci
& ramorum alba, ad cinereum colorem ven-
ta, nō adeo atomatici saporis & odoris va-
tex: folio ficulneo, in tres angulos de-
nouello verò folio Pyri folium æmulans. Ad
quod vestigia angulorum habeat, semper vno
te, hoc est, nouellis foliis semper iis quæ dis-
cunt succedentibus, colore viridi oblectum
odorato, præfettim si siccum sit. An florere
beat, adhuc incompetum. Radicibus
nunc etatis, nunc tenuibus pto arboris mag-
nitudine, læuibus, sed non adeo vti lignis, p-
summa cespitum vagantibus, vt facili
possint, quod ferè commune est omnibus ar-
boribus Indicis imò referunt Hispanicis arboribus

eò translatas steriles fieri nisi in summa tetra pangantur.) Cortex radici firmus
hæret cinereus, ipsiusq; arboris cortice magis aromaticus, ideoque radicis deco-
ctum odoratius & præstantius est, & ab Hispanis istic vsutpatur. Nasctur in
ritimis, & locis temperatis, hoc est, neque nimium siccis, neq; nimium humidis
vt in pottubus S. Helenæ, & S. Matthæi: nam alibi per vniuersam Floridâ hæc fa-
cilè inuenias. Istic verò sunt integræ siluæ, quæ ob suauissimum quæ spirant odo-
rem, ab Hispanis eò primùm venientibus, arborum Canellæ esse existimabatur,
nec immetito: nam adeo odoratus est & acris huius arboris, atq; Canellæ coner,
& eisdem effectus præbet, quos Canellæ decoctum. Omnium optima est tado,
deinde rami, tertio truncus, sed cortex omnibus præfettur. Arboris & ramorum
temperamentum calidum & siccum est in secundo gradu, cortex aliquantò ca-
lidior, ad initium tertiij gradus in calore & siccitate accedens. Quibsdam ali-
dos videtur in fine primi gradus, siccus in tertio. Eius decoctum commendatur
in omni morborū genere, præfettim vetò in obstructionibus, & partibus inter-
nis toborandis ad tertianas febres & antiquas. Commodè ex saccharo propinatur
defluxione laborantibus, asthmate, pectoris vitis ex frigidityte ortis, doloribus ne-
phriticis & renun, è quibus calculos eiicit, & flatus discutit: quam etiam ob cau-
sam

Electio.

Temper.

Vires.

sam vterum ad conceptionem præparat, & menses ciet. Vonitus inhihet, concoctionem iuuat, aliumque subducit. Decocti verò præparandi hæc est ratio. Radicis cum suo cortice assularim contrafactæ vncia dimidia in tribus aquæ sextarius, si-
cili nouo duodecun horas maceratur, lento igne ad duorum sextariorum consumptionem decoquitur, colatur, & fistili vitato asseruatur. Postmodum iisdem fragmentis tantundem aquæ superinfunditur, decoquitur ad dimidij sextarij consumptionem. Illud verò obseruandum est plus aut minus ligni in decoctionem iniiciendum pro morbi magnitudine, viribus & temperamento ægrorum: minor enim quantitate & minis cocta propinatur decocti aqua biliosis quam pituitosis. Sed frequentius & vulgò quarta sextarij pars decocti prioris tepidi sumitur manè: d- inde sudatur, vellis mutatur, nec quisquam eorum qui medicamentum hoc sumplere lecto se continere cogitur. Prandium sit media gallina assa cum aliquot vuis patlis & amygdalis. Cæna sit è conseruis conuenientibus morbo qui curatur: potus secundum decoctum. Hoc sic propinatum asserit Nicolaus Monard. se singulari experimento compertum habuisse, vtilissimum esse qui pedes & manus ex podagra & chitagra sic contortos habent, vt eis vti non possint. Ad hanc item veneream non minùs vtile quam Guayaci aut Chinæ decoctum. Qui tam exquisita victus ratione vti nollent, aqua simplicem hac ratione decoquunt. Ligni assularim contrafacti semuncia plus aut minus pro conditionibus iam enumeratis, in tribus aquæ sextariis coquitur ad dimidias, ea aqua diu vtendum cum in prandio, tum in cæna, & interdu. Qui vino abstinere non norunt, eadem aqua id diluant: enim saporis & odoris gratiam vino conciliabit. Ligni huius fragrantiam absidue gestate & odorari maxime prodest aduersus pestis contagia, non neglectis aliis remedijs. Denique ob ingentem siccitatem & moderatum calorem, remedium est excellens ad omnis generis defluxiones, quoniam eas absorbit. Sed iis qui extenuati sunt & imbecilles non conuenit. Eiusdem fragmentum præmansum eo dente qui dolet, & istuc retentum, dolorem sedat. Porro supradictus ligni & corticis vsus in medicinis duntaxat receptus sit, Indi tamen recentia

MOLLE, Arbor.

folia trita vulneribus imponūt, & sicca ad alios vsus medicos seruant.

MOLLE. CAP. XXI.



ARBORIS in Peru nascentis, quam vocant Molle, plantas duas è semine natas vidit Clusius ante aliquot annos Mechliniæ, quarum hutoria hanc tradit. Erant, inquit, ex arbusculæ trunco (quia tenellæ) ex viridi nigricante, multis confperso veluti maculis cinereis, folijs pènatjs vt Fraxina, sed multò minoribus, ex viridi nigricantibus, serratis, & sub extremum angustioribus, ab arbusculis r. uulsa lacteo succo, eoque lento & viscido & odorato manabant, & ipsa folia trita Fœniculi odorem reddebant, gustata adstringentis facultatis nonnihil habere videbantur. Fructus ex quo nati sunt, Piperis ferè est magnitudine, oleagnosus, pellicula rubescente tectus, racematim coherens, vt ex eius icone hic expressa perspicere licet.

Forma.

Quem

Locu.

Quem florem habear adhuc incertum, nisi quod tradunt quidam minutum esse, Viti similem. Hæc arbor copiose nascitur in conuallibus & locis planis Peruanæ regionis, vt referunt omnes qui Occidentalium Indiarum descriptionem dederunt, sed Petrus Cieca maxime, qui eius historiam hoc modo exponit primi parte Chronici. Toro hoc tractu conspiciuntur magnæ, quædam etiam parvæ arbores, quas *Molle* appellant incolæ. Folia habent minuta, odore Fœniculi, cortice adeo commendato, vt eius decocto crurum dolores & inflammationes summa cum utilitate foueantur. Ex ramulis fiunt densiscalpia utilissima. Ex eius fructu cum aqua cocto pro costurâ modo fit vinum, siue portio admodum bona, aut acenum aut mel: tantoque in pretio sunt apud Indos hæc arbores, vt quibusdam locis eas consecratas suis idolis habeant. Addunt nonnulli eius arboris foliorum decoctum, doloribus ex frigida causâ ortis auxilio esse, gummi verò eius, quod nunc modo candidum est, lacte dissolutum oculorum caliginem abstergere.

LIGNVM AROMATICVM, LIGNVM

ad Nephritidem.

CAP. XXII.



SCRIBIT Nicolaus Monard. ligni cuiusdam fragmentum sibi a Bernardino de Burgo pharmacopola fuisse ostensum, Ligno sicuti simile, cuius corticis sapor & odor adeo aromaticus est & est, vt Nucem myristicam longè superet, imò Canellam odore superet, Piper acrimonia. Magna huius ligni quantitas in monte quodam ex India & in nauim delata ignis struendi gratia. Vnde perspicere licet quam multæ arbores & aliæ plantæ in Indiis inueniantur insigni facultate præditæ, cum ignis accendi causâ tam odoratis & aromaticis lignis vtantur, quorum cortice in puluerem redacto cor & ventriculus roborari, reliquaque membra foueri possunt, & aromatum ex Moleccis insulis, Arabiæque & Perside vsque petitorum vires implere. Mitrit etiam noua Hispania aliud quoddam ligni genus crassum & materia Pyri, cuius vsus iam diu receptus fuit in his regionibus ad rem vitæ, non difficultates & incommoda. Postea experimento compertum est eius aquam in iecoris aut lienis obstructionibus utilem esse. Fit autem hoc modo. Lignum assulatim & minutim concisum in optima & limpidissima fontana aqua maceratur, atque in ea relinquitur, donec aqua à bibentibus absumpta sit. Dimidia huius post iniectum lignum aqua caeruleum dilutiorem colorem contrahit, qui si intenditur pro temporis diuturnitate, tamen si lignum candidum sit. Id adhibetur ligno illi simili, quod aquâ croceo colore inficit. Hac aqua qui assidue vtuntur, ea vinum diluunt, & mirabiles experiuntur effectus sine vlla humorum commotione, neque alia opus est victus ratione quàm temperata: aquæ enim sapor non magis immutatur ligni iniectione quàm si pura esset, & nihil in ea maceratum. Calidum & siccum est in primo gradu.

FRUCTVS ET CORTEX AD

Dysenteriam.

CAP. XXIII.



NARRAT item Nicolaus Monard. ab adolescente quodam Hispano delatum ex Quito prouincia fructum, qui vt ex eius fragmentis (quæ altera parte læuia erant, & lurci coloris, altera aspera & admodum rubra, seu ex rubro nigricantia) conicere licebat, ex magnâ quâdam arbore natus videbatur. Is ad dysenteriam mirum in modum confert. Quod experimento comprobatur vidit in puella quæ dysenteria misere torquebatur,

cus adoleſcentiſſi ſagittariorum eius fructus renoſumè tritorum puluerem ex ſellatino calice roſarum liquore hauriendum dedit veſpere, tantundem poſtri die mane, ſtatimq; ſibi corpis fluxus, ita vt breui puelle ſanitati reſtituta ſit. Quis autem eſſet hic fructus, aut ex qua arbore naſceretur Nicol. Monard. ſcire non potuit. Idem reſcit in Nouo orbe prægrandem arborem ſolis cordis effigie, nullo fructu pronenſire. Eius corticem digiti craſſitudine, aut amphorem, ſolidum, durum & ponderoſum tenui, candicante pellicula contegi. Is ſimilis admodum eſt cortici Guayaci, vti Genſiana amarus, adſtriſtionis, & grati ſeu aromatici cuiuſdam ſaporis partiſeps. Magno eſt apud Indos in pretio, vt qui eo vtantur aduerſus omnis generis alui profluuium, eius puluerem drachmæ pondere, aut paulò amplius mane propinantes ex aqua conueniente, aut vino craſſo & rubro. Ter aut quater id remediū in repetitur, obſeruaturque in reliquis victus ratio, quæ cuiusmodi morbo neceſſaria eſt. Eius corticis fragmenti periculum iam bis fecille aſſeruit ſe alibi proſuſa ſuoceteratis, magno ſucceſſu.

FRUCTVS CHOLAGOGVS, AVELLANAE,

① Nuclei penei cathartici. CAP. XXIIII.

REVERTIS quidam ex maritimis Nicaragua & Nara quæ ſunt in Noui orbis continenti inuehiunt in Hiſpaniam auctore Nicolao Monard. qui ex quadam vaſta arbore nateiunt, Caſtanæ ſimilis, ſed callicè laxi, non vt illarum echinato. Eo calice fructus continetur Caſtanæ non multum abſimilis, ſed ſine cortice, & ſere quadrius, in duas partes diuiſis, mediam intereuſante, & totum deinde ambiente pellicula. Editur hic fructus vti ſolis, aut contuſus vino exceptus, ſi ſiccus, eius pulvis ex vino aut gallinæ uſculo ſumitur: datur etiam toſtus vt minus purget. Quod inq; tandem modo ſumptus ſine moleſtia purgat, obſeruatis hiſ quæ à purgandis obſeruari ſolent, & præparatis humoribus. Illud vero minime ſilentio prætereundum, pelliculam illam emulſorem & interſtitiā abuciendam eſſe, alioqui grauiſa ſymptomata exaraturam, veluti magnos vomitus, animum deliquia, & periculoſa profluuium. Calidus eſt in primo gradu. Narrat idem Nicol. Monard. Nouo orbe primum inuento inſulam

AVELLANAE

purgatrices.



D. Dominici quoddam Auellanarum genus nuttere, quo ſe Indi familiariter purgabant: poſtea Hiſpanos neceſſitate compulſos inſdem ſeſe purgare cepiſſe, non ſine vitæ diſcrimine. Colore & forma noſtris Auellanis ſimiles ſunt, putamine tenui, coloris ſpadiſci, triangulares, medulla interiore alba & dulci, ſic vt muli dulcedine alleſti decepti fuerint. Medicorū vulgus eas Ben magnū vocat, paruum aurem quod Cicciis eſt magnitudine, ex quo Itali oleum odoratu concieunt, quod Oleum

Ben nuncupant. Validiſſimè pituitam & bilem ſuperne & inferne purgant.

Vires &
Temper.

Nonnulli tamen eorum vehementiam aſſatione infringebāt. Coli doloribus præſens fuit remedium, ſtutus diſcutiunt, & enematibus inſectæ medioeriter euacuat. Dosis eſt à dimidia drachma ad drachmam vnā: ſed aſſidendæ ſunt. Calidi ſunt reſpectuamenti initio tertio gradu, & ſicci in ſecundo. Auellanas has ſe vididiſſe ait Chouart. Cæterum hanc, cuius iconem hic exhibemus ex Cluſio, lentis & mollis integerrima, partim ex cinereo candicante, partim nigra: hunc ſequitur putamen magis ſolidum quam in vulgaribus Auellanis, id nucleū continet Auellanæ magnitudine, candidum, ſolidum, Auellanæ vulgaris aut iliginæ glandis ſapore,

Pineis no-
dei cathar-
tici.

Forma.

Vires.

Temper.

pore, tenui membrana obductum. Integra nux altera parte sessilis est & commun-
tim binæ nasci videntur, vt interdum castaneæ. Transmittit etiam noua Hispania,
vt idem Nicolaus refert, Pineorum nucleorum genus, quo Indi se purgant,
quos imitati sunt plurimi Hispani. Nostri Pineis nucleis similes sunt, nascentes
in strobilis magnis, quales sunt Mayzi spicæ muricæ, molliori putamine, & ni-
griore quàm nostri, rotundi, intus albi, pingues, & gustu dulces. Bilem, pituitam &
aquas valenter admodum purgant, & licet auellanis mitiores, atramentum vomitum
ciant, atque ventrem subducunt. Assi neque tam valenter, neque cum tantis lar-
minibus purgant. Peculiari quadam facultate crassos humores expellunt. Quin-
que aut sex triti & vino diluti dantur pro virium robore, euacuando humore con-
uenientibus Syrupis præparato, & recta victus ratione obseruata. Calidi in tertio,
& sicci in secundo, pinguedine tamen quadam prædicti quæ siccitatem imminuit.

RICINVS AMERICVS. CAP. XXV.

Forma.



RICINI genus ex America delatum pinxit Clusius, nostratæ pado
maius, cuius siliqua triagula quæ semina continet tuberculis alpers
carer, læuisque est & cinerei coloris. Ipsum semen nostrati nigru
grum tamen & non maculosum, Curcas ab incolis nuncupatur.
Arbor quoque nostrati similis, nisi ob soli vbertatem in maiorem altitudinem

Vires.

RICINVS Americu.



crederet. Semen tanta purgandi facultate præditi
esse referebat qui Clusio dabat, vt dimidia tantum
ni vnus pars sumpta valenter supernè & infernè
mores pellat. Ex eodem oleum elici tradit Nicolaus
Monard. quod Oleum ficus inferorum Hispani
cant, quia Ricinus Hispanis *Figuera de l'Inferno*, id est,
ficus inferorum nominatur. Semine trito & in aqua di-
cocto innatans oleum cochleari colligitur, quod
modus olei parandi Americis notus est, alios non do-
cerunt. Duros tumores mollit, discutit. Sanat dolores
à frigidis humoribus & flatibus exortos, præsertim ven-
tris: ac ideò Anasarcam & Tympanitem curat inuncto ventre, aut tribus vel qu-
tuor guttis sumptum ex vino, aut infuso mixtum. Aquas enim ducit, flatibus d-
tit, pituitam crassam purgat. Doloribus colicis & ilei medetur sumptum, illor-
iniec- tum clystere. Articulorum morbis à causâ non admodum calida natus au-
liatur. Contractos artus molliter distendit. Aurium doloribus confert. Infan-
aliqui subducit, pube inuncta: lumbricos necat ac eiicit, maxime si eius vna aut al-
tera gutta è lacte aut iure propinetur. Ad psoras & capitis vlcera manantia valet.
Calidum est initio tertij gradus, humidum secundo.

LAC PINIPINICHI. CAP. XXVI.

Vires.



Lac Pinipinichi. N omnibus continentis oris Noui orbis, vt refert Nicolaus Monard,
lacteus quidam succus elicitor ex arbuscula Mali similitudine, quem
Indi Pinipinichi vocant: ex cuius ramis recisis lacteus is humor sta-
tim manat, aliquatulum densus & viscosus, cuius tres aut quatuor gut-
tae sumptæ validissime per aluum purgant bilem & aquas. Bibitur è vino, aut eius
desiccati pulvis deglutitur pauca quantitate propter nimiam vehementiam. Illud
autem peculiare habet, quod si quis eo sumpto, iusculum, vinum, aut aliud quid
iniciat, subito eius facultas infringitur & cessat. Calidus & siccus est liquor in
secundo gradu.

Temper.

COPAL,

DVo resinarum genera multum similia, teste etiam Nicolao Monard. ex Hispania noua afferuntur, quorum vnum Copal vocatur, alterum Anime. Copal resina est admodum candida, splendida, pellucida, magnis offis, Citti conditi & clati similibus, mediocriter suavis. Eam Americi in lacrimicis thuris vice adolebant. Vtilis est ad suffusus in frigidis capitis morbis. Calida ordine secundo, humida primo. Discutit ac emollit. Gomara in Mexicana Historia duo Copalis genera facit. Vnum tugosum, quod Xoloc copali vocari dicit, molle, thuri simile. Alterum multum præstantius Copalcayuel, quod plerique Myrrham existimant. Vulnerata arbore guttatim stillat liquor albus, qui statim coarctetur. Anime arboris prægrandis est resina candida, ad thuris colorem nonnihil vergens, magis oleosa quam Copal, granis sue gutti thuri similibus, grandioribus, quæ fracta luteum colorem ostendunt resinæ modo, & iucundissimum odorem spirant, & accensa facili liquefunt ac consumuntur. Est alia Anime resina orientalis, auctore Garcia, quam Lusitani ex Æthiopia Arabiæ huiusmodi in Europam deferunt. Candidior est & nitidior occidentali, magnis item offis adfertur, pellucidis, ita ut nonnulli Carabe seu Succini speciem esse suspicari sint, è quo spherule precantoriæ tornantur. Sed ij vehementer errant. Garcia hanc resinam orientalem, Cancamum Græcorum esse putat. Qua in re Amati Lusitani sententiam secutus videtur in commentariis in Dioscoridem capite de Cancamo, sic scribens. Est igitur Cancamum gummi quoddam, quod ex Guinea, Mina, Africæ, & insulis illi circumiacentibus Lusitani nostri adferunt, Animum appellantes: decidit enim gummi hoc, ut testantur illi, ex procetis arboribus, folia Myrti habentibus, quod album reperitur, & aliud subnigrum Myrtiæ quodammodo persimile, odoratum, quod Dioscorides illis de causis inter Myrtiæ species tanquam improbandi commemorat, & Minzæ a terra, vnde præcipue nascitur, eam appellat: quanquam Serapio Aminzæ nominet, vnde Lusitani corrupta voce pro Minzæ vel Aminzæ Animum vocent, & eo mulieres maxime in suffitibus, & Medici contra dolores à frigiditate ortos præcipue vtuntur. Id verò primus asseruit Brisotus Gallus, vir magna eruditione præditus, qui quum apud Lusitanos ageret, ut inde ad Indos cognoscendarum rerum nouarum cupidus nauigaret, gummi hoc vidit, quod Cancamum esse dixit. Quare cum Cancamo opus fuerit, Lusitanorum Animo vtetur. Idem Amatus capite de Myrrha, Myrrha vel Minzæ vel Aminzæ dicta, inquit, hodie quoque in Lusitania, & vniuersa Hispania paucis mutatis literis habetur, ut capite de Cancamo diximus, gummi scilicet Animum appellantes: cuius duo genera habentur, albū & nigrum, album Cancamum esse ex Brisotto didicimus, nigrum verò, Minzæ hæc Dioscoridis Myrrha est, quæ ex procetis arboribus decidit, nullo cogente artifice, aut vulnere in arbore facto. Clusius gummi illius quod Anime vocant, & Lusitanorum nauigationibus in Europam adfertur, tria inueniri geneta scribit. Primum fuluefcir, & pellucidum est, nobilissq; illud succinum crudum æmularut. Hoc Cancamum esse Amatus à Brisotto Gallo doctus contendit. Alterum genus nigricat, & ferè autino glutini simile est, siue illi resinæ quam Officinæ Colophoniam vocant. Id Amatus Myrrham Aminzæ Dioscoridis esse vult. Tertium genus pallidum est, & resinaceū retorridumque. Omnia verò iucundum in suffitibus odorem spirant, idemque videtur temperamētum sortita. Posteriota duo degustata magis siccare & amarescere deprehenduntur. Hæc Clusius. Sunt qui Anime vetum Bdelium esse putant, ob multas quas habet cum Bdelij historia notas communes, de quibus suo loco diximus. Anime Americum siue nouæ Hispaniæ colligitur, auctore Nicolao

Vnus.

Temper.

Genera.

Lib. 1. Aro.
m. 1. Ind.
cap. 8.In schol. in
lib. 1. Aro.
Ind. 1. Histo.
12.

Monard. ex arboribus mediocri altitudinis vulneratis, non aliter quàm thus ac mastiche. Valet ad suffitus in dolore capitis à frigido, & defluxionibus post purgationes: aëris vitia corrigit, suffitu caput roborat. Miscetur emplastris & ceras, quæ frigidis humoribus & flatibus discutiunt, ac roborant: imponitur capiti & cerebro inualidis, item neruosis partibus. Idem temperamentum quod & Copal. Hoc Amme occidentale Aminzam Myrrham esse putat Hermolaus.

TACAMAHACA. CAP. XXVIII.

Forma.

Vires.

Temper.

DEFERVR item ex noua Hispania, vt scribit Nicolaus Monard. aliud gummi siue resinæ genus, ab incolis Tacamahaca vocatum, quod nomen Hispani retinuerunt. Resina est proceræ arboris Populo similis, quæ fructum gerit similem Proniæ granis. Elicitur arbore lauciata. Colore est Galbani (nec desunt qui idem esse putant) frustulis tamen quibusdam albis vt in ammoniaco, odoris Saporisque ingrati. Suffitu vtero strangularas mulieres reuocari: vmbilico imposita vterum ad suam sedem redire cogit, ventriculum roborat. Ad hos vsus totam ferè mulieres absumunt. Illita sic adhaerescit, vt non nisi euanida cum effectum suum præstiterit excidat. Coquit & distillat mirificè ægritudines ex flatu & succis frigidis natos. Fluxiones sistit: neruorum vberibus medetur. Denique ad quosuis sedandos dolores nullum aliud præstans remedium, siab inflammationibus admodum calidis non oriantur. Sed & is admodum vilis est in morbi declinatione, ad discutiendum qui superest humor. Calfacit in principio tertij gradus, siccat secundo. Præterea vim facis adstringentem obinet.

CARAGNA. CAP. XXIX.

Forma.

Vires.

Temper.

EX continentis parte interiore, per Carthaginem & Nouam Americæ provincias deserti scripsit Nicolaus Monard. resinam coloris Tacamahaca, odorisque eiusdem, sed grauioris. Est & liquidior, glutinosior, splendidior, magis oleosa. Lingua Indica Caragna vocatur, quod nomen etiam Hispani adhuc seruant. Potest ad omnia ad quæ Tacamahaca, sed effectū celeriore & certiore. Temperamenti est calidioris. Vulneratibore colligitur superiorum modo. Ex eadem Carthagine Noui orbis prouallaram fuisse ait Caragnam quandam puriorem, & Balsami modo limpidam, periore multo præstantiorem, vtiliorem & odoratiorem.

LIQUIDAMBAR, ET EIVS

Oleum. CAP. XXX.

Forma.

Vires.

RESINAM odoratam Liquidambar ad nos ex Hispania noua ferri referunt Nicolaus Monard. & Historiæ Mexicanæ auctor. Manat ex incisa vasta arbore, quam Americi vocant *Ocoçol*. Huic folium est hederæ, cortex crassus, cinereus, quo secto aut ex cauato Liquidambar huius. Indigenæ huic corticem confractum admiscunt, quoniam ita suauiore odorem mittit dum vritur. Odor styracis, qui celari non potest, præsertim vbi magna est Liquidambaræ copia, quoniam in rades ac vias propinquas latissime diffinitur. Ex ea resina recenti ac pingui in humido loco reposita stillat sponte Oleum pretiosissimum ob maximam odoris iucunditatem. Quidam machinis exprimit, vt manicis inficiendis vnguentariis vendant. Sed id bonitate ac pretio longè inferius est. Vt præstantissima quæque fraude hominum adulterantur & interpellantur: quidam quæstus causa ex ramis arborum concisis, & in aqua feruefactis Liquidambar innatantem colligunt, altera longè deteriore. Liquidambar

da nbar frigidis omnibus morbis opitulatur. Eadem vis & olei sui, sed cum maiore partium tenuitate. Calfacit propemodum tertio gradu. *Temper.*

GUMMI AD PODAGRAM, SVLPHVR

Quintess. CAP. XXXI.

REERT Nicolaus Monard. se ab Episcopo Carthaginensi dono accepisse gummi genus quoddam (cuius arborem describere non poterat) ex cōtinenti Noui orbis delatum, quo se istic podagrici purgant hoc modo. Istius gummi fragmentum Nucis Ponticæ magnitudine *Vires.* stillatio aquæ liquore totam noctem macerant, postridiè manè percolant & expriment, eam aquam ad duas vncias hauriunt, neque quicquam cibi sumunt ante meridiem. Eo medicamento purgatur humor qui podagram creat sine molestia. Inspidum est & inodorum. Calidum videtur in primo gradu. Mittit Quoque prouincia Peruana Sulphur viuum præstantissimum, viri modo pellucidum, colore auri purissimi, cuius fragmentum pusillum lucernæ admotum odorem maximum sulphuris eiacular, fumo viridi permixtum, sed antequàm incendatur nullum sulphuris odorem præbet. Huius puluis vino dissolutus, & per aliquot dies vespere faciei illitus (purgato prius corpore) inflammationes curat, scabiem delecto oleo rosaceo mixtus. Drachmæ pondere cum oui luteo sumptus, coli doloribus, nephritidi, neruorumque contractionibus & ictero utilis est. Calidum & siccum esse hoc sulphur summo excessu ait Nicolaus Monard. Quare mirum non sine causâ videatur eo inflammationes curari. Ex Nicaragua aliud sulphuris genus aduehi idem scribit, colore cinereo, densum, minimè transparens, nihilque cum alto commune habens præter odorem.

RESINA ABIEGNA INDICA.

Resina Carthaginensis. CAP. XXXII.

LX NOVI orbis continenti etiam asportari tradit Nicolaus Monard. liquorem siue resinam, quàm abiegnam vocant, ex arboribus spuris quæ neque Pinus, neque Cupressi dici possunt, sed Pino aliores sunt, & Cupressi modo rectæ. In harum arborum cacumine vesiculæ quædam enascuntur nunc magnæ, nunc parvæ, quibus contractis guttatim stillat liquor admirandus, quem Indi diligenter conchis excipiunt, sed tanto labore & molestia ut multi exiguam admodum quantitatem singulis diebus cogant. Ad eadem omnia, ad quæ Balsamo vtuntur: nam vulnera optimè curat, dolores ex materia frigida & flatulenta progenitos mitigat. Item utilis est stomachi vitiis ab humore frigido aut flatibus sumpta ex modico vino albo, ut in Balsamo dictum est. Idem Nicolaus Monard. auctor est, nunc etiam mitti à Carthagine Noui orbis prouincia, resinam quandam purissimam & odoratissimam, abiegna aut Terebinthina Veneta multo præstantiorem, iisdem facultatibus seu maioribus præditam quàm sit selectissima Terebinthina. Experientia docuit utiliter iniici neruorum, articulorum pedumque vulneribus, & antiquis vlceribus: magno etiam commode ea elota & præparata matronæ sibi faciem oblinunt. *Vires.*

Lib. 2. Am.
Indic. hi-
stocap. 21.

SCRIBIT Garcias Mungo semen esse viride, quod per mensem sit nigrum, Coriandri sicci magnitudine, pabulum equarum interdum etiam hominum. Guzarate & Decan incolæ in hoc modo vtuntur. Febricitans decem, nonnunquam quatuordecim diebus cibo abstinet, post quos huius fructus decoctum illi propinat, usque nihil pulpæ remanserit: deinde cortice delibratum Mungo, & Oritani decoctum febricitanti exhibent: panem vero triticeum non nisi post multum quod frumento careant hæc prouinciæ, nam etiam si non stercorentur & tur agri, sed superficie tenus duntaxat arentur, natua sua pinguedine & vi etiam interdum sine pluuia frumentum mense Nouembri sibi credunt in Ianuario maturum & colligendum exhibent. Nasci etiam solent hoc fructus

Lib. 2. 418. Palæstina, eiusque Auicennam meminisse, & vocasse Messe, Bellanense præterem, Mens. In nostris tamen publicis exemplaribus legimus Mes. Interpretantur & in margine Mes. Mex autem debere dici a claudius Arabibus se didicisse ait Garcias. Alio in loco putat Auicennam eius mense fecisse, vbi prohibet auiculas cum Mex edim nostris tamen libris non Mes. Mes ex aratum est. Et Serapio, Mes, inquit, id est, Robur est granum paucum

Lib. 2. fen.
p. cap. 7.

Cap. 106.
simpl.

MUNGO similis
fructu.



cut Orobus magna, viridis coloris &c. Caterum Mungo à Garcia descripto optimè conuenit fructus a Clusio depictus & hic expressus, nisi calidus esset, Mungo vocandus, quantum ex eius effectu colligere licet. Is fructus descriptus à Valerando Durzo, inquit Clusius, ex Ormiz, est Piperis magnitudine, rotundus, striatus, qui Congrana ita æmulatur, vt primò intuentibus Coriandri videatur, maius tamen & nigrum: membrana lupulæ granum continet nigricans calidi gustus. Præterea ex eodem Clusio patet eandem fructus ab Alphonsio Pautio Medico Ferrariensi misit iconem habere

BUNA.



bemus, quem Buna à nonnullis, ab aliis Elia nominari tradit. Est igitur Buna Fagare magnitudine, aut paulò amplior, oblongior plerumque colore ex cinereo nigricante, cortice tenui, & vultu sulcum quendam per longitudinem vultuque habente, per quem facile in duas æquales partes diuiditur, quæ singula grana continent oblonga, altera parte plana, fuluescentia, gustu acido. Aiunt in Alexandria potionem quandam fieri ex iis, vim refrigerandi non mediocrem obtinentem.



VAR ex Indiis occidentalibus aduecta est tam planta hic appicta, quam fructus, Tunc Indis vocatur & Tunas. In maris Petuani insulis, Hispaniola, & aliis, mirabile folium istud spinosum ruti ac sponte oritur, vnico folio, humi ad medium vsque defosso, productis ex sese radicibus, postea folia supernè ex ipso accrescunt, ex iis alia, ita vt continuata serie

Nomina

Locus.

Forma.

FICUS Indica, siue

Opuntia.



sti & Plinij Opuntiam esse, non sine ratione quis suspicetur. Sic enim Theophrastus. παραπλίσιον δὲ τῷ τῆς, μᾶλλον δὲ τῶν τοῦ θαλάσσιου, ἔστιν ὡς τῶν φύλλων ἀφαιρέσει, ὡς φασὶ περὶ πάντα πόλιν εἶναι, ὅ καὶ ἰατρικῶς ἔστιν ὅτι. Id est, Huic (Fico Indicæ) simile est, vel potius quodammodo mirabilius, si qua ex foliis radicem mittat, qualem circa Opuntem herbulam esse aiunt, quæ & esu suauius est. Et Plinius, Item circa Opuntem (Opus Locorum Epicnemidiorum oppidum lib. 4. cap. 7.) Opuntia est herba etiam homini dulcis. Mirumque è folio eius radicem fieri, ac sic etiam nasci. In iisdem insulis atque etiam in continenti sponte crescit arbuscula superiori valde cognata, quæ Indis Ferruminatrix vocatur, nobis Opuntia Ostocollos dici potest, quod artuum fracturis & luxationibus mirè proficit. Ramos profert foliis refertos aspectu deformibus, admodum spissis & spinosis, Tunc foliis simillimis, vt describit auctor generalis Indiarum historix. Rami isti folia primùm fuere, ex singulis singula oriuntur, atque ex his alia, quæ demùm indurantur, & mutuo sibi ipsi succedente foliorum sobole in ramos abeunt, ac tandem arboris magnitudinem adipiscuntur, quæ perpetuò vires, caudice in imo & ramis cineritiis, asperis. Fructum fert superiore minorem & spinosiorē, purpureum, viscidum, succum remittentem, & ad inficiendos pannos infertur tenacissimæ. Folia spinis exemptis trita, & cataplasmatibus modo imposita fracta ossa mirè glutinant & ferruminant. Sed illa prius locis suis aptissimè repo-

Lib. 1. hist. cap. 12.

Lib. 1. c. 17.

Ostocollos

Forma.

Lib. 10. c. 1.

ni ac restitui oportet. Nam ad id opus cataplasma cum aqua in partem co-
pit, ita parti hæret, vt auulsi prædictæ sit. Ea vero sanata statim sponte ex-
cidit.

ROSA DE HIERICHO, *Loniceri.*

CAP. XXXV.

Nomen

Forma.



ROSAM de Hiericho, sive Hiericunthis, siue Hiericunthe vocant ab Hiericunthe oppido. Monachu & mulie-
Rosam Martæ. Hanc describit Lonicerus
ticem esse Labruscæ similem, sed minus
nosua, odoratum, ramulis durissimis, &
sublaui, haccis inter se racemam com-
nibus, flore violæ candido. Lonicerus &
dam alij Amomum esse falso crederent
de re paulo post dicemus. Rosam hanc
cilæ ex semine recenti, auctore Pen-
autem senaria parua, compacta, racemosa
compacta, glutinosa, Sorci minor, & com-
eis cancellatim reticulatimque impleta
contenta. Hac Rosa vtuntur superflua
hiericulæ ad partus horam cognoscendam
vt aiunt, in aquam demissa non parum
quam partus nasci incipiat.

CANELLA, CASSIA, CINNAMOMUM

CAP. XXXVI.

Nomen

*Libra. 12.
& 19.*

*Cap. 91.
simpl.*

QUAT Graecis *καρδαμωμ* & *Ευδαργωμ* nominatur, Latini Cassia &
Cassia lignea, Arabibus *Selicha*, *Seliche*, siue *Selshacha*, Itali *Camella*, *Camella*,
Canela, Gallis *Canelle*, Germanis *Zimmet*, seu *Zimmet rœzlin*. Cane-
tem Etymologiam dici vult *καρὰ τὸ καρύον*, quasi *καρύον* &
καρύον (καρὰ τὸ καρύον). Quod vero Graeci *καρδαμωμ*, Latini quoque Cinnamomum
dicunt, Plinius etiam Cinnamum, Arabes *Darfeni*. De utroque scortum
Dioscorides Cassia multa sunt genera, quæ circa Arabiam aromatica nunc
tut. Virgas seu ramulos habet crassi corticis, folia Piperis (alij *ipui*), id est, *hu-*
legunt, & ita Serapio legit. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, Corallina
valde angusta, crassa, longa, fistulosa, gustu mordens, & cum multo seruore ad
gens non cum aliquanto seruore, vt Ruellius vertit, est enim *καρδαμωμ*
καρδαμωμ, quod & Plinius confirmat, a gustu, inquit, quàm maximè mordens
tica, vinoso odore, cumismodi est quæ ab incolis Achy nominatur, ab Alexand
necorioribus Daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea & nigricans *Zi-*
gromine, quæ Rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum
cum tener antedicta. Tertia cui Mosylitico blasto, id est, germi-
Re aquæ viles, vt quæ Asyphemum dicitur, nigra, insuauis, cortice
fo vt quæ Daica & Citro vocatur nomine barbaro. Similiter
cassia, quam vt explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec ac-
ec arbor

fit, & inque mellea corticem habet. Inuenitur etiam quædam fistula,
 mollis, leuis, ramosa antea præfertur. Damnatur candidior, scabra, hircinum
 visus olens, & quæ non habet fistulam crassam, sed scabram & tenuem. Deinde de
 Cinnamomo hæc scripsit. Cinnamomi genera plura patrium sibi nomen vendi-
 centia præfertur tamē Mosyliticum, quod Calsix, cui Mosyliti cognomen est, ali-
 quam referat effigiem: sed in eo genere recens, nigrum, ex vinoso in cinereum ve-
 ritas, leuis, tenuibus ramulis ac frequentibus nodis cinctum, perquam iucundè
 odans. Optimi fere iudicium iucundi odoris proprietate constare: nescitur enim
 cu optimo, eoq; quod peculiare est, odor Rutæ, aut Cardamomo proprius. Ipsi-
 tes acre, mordens & cum calfactione quadatenus salsum, quod conficanti no-
 tum est etiam, & friano puluerulentum, leuibus tamē internodijs appareat. Si cer-
 ritur fieri vole. Valde ab radice suspensum, facilis est huiusmodi probatio: namque
 si in arena mellea quædam esse videtur. Quæ autem corticis spiritum sine habita-
 tione in nare primo conculcitur, olfactum explemè, de ceteris digitis mellea
 diutius. Est etiam montanum, crassum, paululum, suilescens admodum. Terrium
 Mosylitico perquam suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus
 gemulis. Quartum sangosum, candicans, aspectu ruberolum, vile ac triabile, ma-
 gis laetæ radicum, quæ Calsiam repræsentat. Quintu genus odore nares se-
 nescit submersum, & cortice fistula Calsix simile, tangenti firmum, rotundius nigrum,
 densa radice in nare. Id quæ Thonis, Calsix, Myrti aut Anomali odore in spirant,
 minus suauiter inest. Delictio sibi in, album, rugosum: ac læte, & lignolum
 circa radices, ut inutile relicto. Est etiamnum simile aliud, cui Pseudocinnamo-
 mo nomen est, vile, inualidi odoris, solutarumq; virium. Vocatur etiam Zingiber,
 cum tamen sit Xylocinnamomum, præbens quandam Cinnamomi faciem. Est
 autem lignosum Cinnamomum, sarmenta longa, robustaque ferens, odore longè
 Cinnamomo inferiore. Sunt qui Xylocinnamomum à Cinnamomo genere dis-
 fecte dicant, quod à natura eius abhorreat. Plinius recitat is quæ de Cinnamo-
 mo & Calsia fabulosa narratur antiquitas, subiicit, Cinnamomum, idemq; Cinnamomum
 nascitur in Æthiopia Troglodytis cōubio permixta. Ij mercatores id à cō-
 terminis, vehunt per maria vasta ratibus, quas neque gubernacula regant, neque
 iam trahant vel impellant, non vela, non ratio vlla adiuet, cum omnium iustar
 sit sint homo tantum & audacia. Præterea hybernū mare exigunt circa bru-
 tum, Euris tunc maxime flātibus. Hi recto cursu per sinus unpellū, atque à pro-
 montorijs ambitu Argeste deferūt in portum Gebanitarum, qui vocatur Ocila.
 Quamobrem illi maxime id petunt, produntq; vix quinto anno reuerti negotia-
 tores, & multos interire. Cōtrā reuehunt vitrea, athena, vestes fibulæq; cum armil-
 lis & monilibus. Ergo negotiatio illa feminarum maxime fide cōstat. Ipse frutex
 duum cubitorum altitudine amplissimus, palmique minimus, quatuor digitorū
 crassitudinis statim à terra sex digitis furculosus, arido similis. Cum vitet nō odo-
 ratus, folio Origani, siccitate gaudēs, steriliore imbre, cædua natior. Gignitur in
 planis quidem, sed difficilissimis in vepribus rubisque difficilis collectu. Metitur nō
 nisi permiserit Deus. Iouem hunc intelligunt aliqui: Añabinum illi vocant, quæ
 draginta quatuor boum caprarumq; & arietum extis impetratur venia cadendi.
 Non tamē aut ante ortum Solis, aut post occasum licet. Sarmenta hasta diuidit sa-
 cerdos, Deoque partem ponit, reliquum mercator in nassas condit (melius in na-
 ues.) Est & alia fama, cū Sole diuidi, cernatq; partes fieri, dein sorte cremæ discerni,
 quodq; Soli cesserit relinqui, ac sponte cōhætare. Præcipua bonitas virgultorum
 tenuissimis partibus ad longitudinem palmi. Secunda proximis breuiore mēsurā,
 atque ita ordine. Viliissimum quod radicibus proximum, quoniam ibi minimum
 corticis, in quo summa gratia. Qua de causā præferuntur cacumina, vbi plurimus

cortex. Ipsum verò lignum in fastidio est, propter Origani acrimoniam, & cinnamomum vocatur. Quidam Cinnami duo genera tradidère, candidus, & nigrusq;. Quondam præferebatur candidum, nunc contra nigrum laudatur, atque etiam varium præferunt candido. Certissima tamen æstimatio, ne sit scabrum, atque inter sese tritum tardè frietur. Damnatur in primis molle, aut cui albet cortex. Ius eius à Gebanitarum Rege solo proficiscitur: is edicto mercatu vendit. Pretia quondam fuère in libras denarium mille. Auctum id parte dimidia est, in census, ut ferunt, filius ira Barbarorum. Id accideritne ob iniquitatè præpositum, an forte, non satis constat. Austros ibi tam ardentes flare, ut æstatis ibi silvas accendat apud auctores inuenimus. Et mox, frutex & Cassia est, iuxtaq; Cinnami campus nascitur, sed in montibus, crassiore sarmento, tenui cute verius quàm corio, quem contra ac in Cinnamo leuari & exinaniri pretium est. Amplitudo fruticis trium cubitorum. Colos triplex. Cùm primùm emicat, candidus, pedali mollior, deinde tubescit addito semipede, ultra nigricans. Hæc pars maximè laudatur, deinde proxima: damnatur verò candida. Consecant surculos longitudine binorum cubitorum. Mox præsuunt recentibus coriis quadrupedum ob id interemptis, ut iis putrescentibus vermiculi lignum erodant & excauent corticem tutum amaritudine (legendum & excauent, cortice tuto amaritudine.) Probatum rectè, & quæ sit odoris mollissimi, gustu quàm maximè feruens potius, quam leni tempore leuiter mordens, colore purpureo, quæq; plurima minimum ponderis. Cuius breui tunicarum fistula, & nõ fragili. Lactam vocant talem Barbari nomen. Alia est Balsamodes ab odore simili appellata, sed amara, ideoq; vtilior. Mollis sicut nigra vnguentis. Hæc Plinius, quorum magnam partem ex Theophrasto exscriptis sic enim de Cinnamomo & Cassia scribit. De Cinnamomo & Cassia referunt. Vtrūque fruticem esse non magnum, sed magnitudine Viticis æquum, Amerinæ, ut vertit Gaza) multis ramis constantem & lignosum. Cinnamomum excisum in quinas partes diuidi: id optimum esse, quod germinibus præcipuum fuerit, quod ad palmi longitudinem cæditur, aut paulò maius. Secundum locum tenet quod sequitur, quod & breuius cæditur. Est & tertium, ac quartum: vltimum omnium deterrimum radici proximum, quod minimum corticis habeatis ramus utilis est, non lignum. Quam ob causam quod ex cacuminibus decerpitur, omnibus præfertur, quia plurimum corticis habeat. Hæc quidam sic referunt. Alii ticosum esse Cinnamomum aiunt: duo eius esse genera, vnum nigrum, alterum candidum. De quo hæc fabula narratur, ipsum in cõuallibus nasci, in his siluestres, morfu necem inferentes, aduersus quos munitis manibus pedibusque defendere, atque ita Cinnamomum legere, quod cùm exportauerint, eo in tres partes diuiso, cum Sole fortiri, & quæcūque illi sorte obtigerit, eam relinquere, abeunt, statim eam flagrantem cõspicere. Sed hæc planè fabula est. Cassiam autem ferunt virgultis esse crassioribus (*παχυλίπας* pro *πυλίσπας* rectè legit Gaza) valde nervosis, nec posse cortice exui, cum verò corticem esse vtilem. Cùm virgulta secat longitudine binum digitorum (Plinius habet lōgitudine binum cubitorum aut paulo maiora abscindunt, recentiq; bouis corio ea consuunt, ut ex eo & lignis putrescentibus vermiculi gignantur qui lignum erodant, corticem verò non attingunt propter amarorem & odoris acrimoniam. Galenus Dioscoridem secutus lib. de Antidotis multa Cassiæ genera recēset, eamq; cæteris præfert, quæ Zizir cognominatur, Cinnamomique adeo æmulam esse ait, ut essent suo tempore, qui eam Cinnamomi loco venderent. Idem eodem in loco tradit Cassiam sæpenumerum in Cinnamomum transmutari, seq; vidisse eximiam Cassiæ ramulos omni ex parte Cinnamomum referētes. Contrà vidisse se Cinnamomi surculos Cassiæ præfere similes, adeo ut asserat pro qualibet Cinnamomi parte in componendū

camentis, duas selectæ Calsiæ adhiberi posse item describit quoddam aliud deterioris Calsiæ genus, quod iunior Andromachus Calsiam fistulam nominat, quod fistularum modo inanis cauâque sit, & crassi corticis, cuiusmodi in vulgari Cinnamomo frequentissima conspicitur. Eius vero historiam sic persequitur eodem in loco Galenus. De Cinnamomo contraria iis quæ de Opobalsamo diximus, compertum habeo: persuasum namque est mihi ipsum omnium cognitu facillimum esse illis, qui sæpe optimū viderunt. Optimum veto consequi nemo potest, nisi repositum ab Imperatoribus inruatur, sex generibus quodammodo distributum. Siquidem & in hoc ipso, velut & in Calsia, optimi ad deterrimū tam magna differentia est, vt optima Calsia a pessimo Cinnamomo parūm distet. Neq; vero Cinnamomi virtus ad vsum apta longo tempore durat: triginta siquidem annos, quam a principio vim habuit, integram non conseruat. Nugantur autem qui Cinnamomum ex iis medicamentis esse dicunt, quæ senectutem non sentiunt. Atqui ego non centum, neque ducentū annorum interuentu, sed pauciorum, si quis ad tantum numerum conferat, iam aliquam mutationem vetustiori Cinnamomo factam obseruauit. Quo tempore enim Antonino Imperatori Theriacam patavi, vasa lignea in quibus eiusdem generis Cinnamomum inerat, multa cōspexi, alia Traiani, quædam Adriani, nonnulla Antonini, quī post Adriani Imperator fuit, ætate reposita omniaq; hæc sese & saporis & odoris imbecillitate vehementiq; tantū superabant, quantum & tempore differebant. Omne Barbarorum tectis arca cubitos quatuor & medium longa, Romam perlata cum fuisset, in qua Cinnamomi primi generis integra arbor erat, ex eoque Marco Antonino Imperatori antidotum quandam composuissē, ipsum cæteris multum præstare deprehendi, adeo vt Imperator quoque ea degustata medicinz cōcoctionem, velut in aliis fieri solet, expectare noluerit, sed etiam ea vsus sit, nondum integrè duobus mēsis elapsis. Antonino successit Commodus, qui nec Theriacæ, nec Cinnamomi curam vllam habuit, sub quo non solum arboris illius quod superfuerat omne dissipatum est, verū etiam quodcūque post Adriani tempora comportatum fuerat. Quo factum est, vt nunc Imperator Seuerus cū me sibi antidotum eo modo conficere iussisset, quo Antonino cōfeceram, ex Cinnamomo Traiani & Adriani tēpore reposito sumere coactus sim, imbecillioraq; planè visa sunt, & tamen nondum triginta anni intercesserant. Hic tamen optimi Cinnamomi notas quasdam necessarias subiscere volumus, ipsum summo perē bene olere, inexplicabilēque præ cæteris bonum quēdam odorem spirare, ac calidum gustantibus se multū exhibere, non tamen ita vt mordicando tristitiam palato inferat: colorem denique talem habere, qualem si quis lacti nigrum colorem admisceat, atque cærulei aliquantū addat. Ex hoc igitur quantum volebam, vt mos mihi fuit, cū accepissē, ramusculos paucos apud me reposui ex apotheca, in quare meas omnes pretiosas seruabam. Verū ipsa combusta, quo tempore & delibrum Pacis incensum est, & hæc & aliæ quinque Cinnamomi species, quas mihi conquisieram, perire. Neque itaque cū Severo Imperatori Theriacam componerem, ex Cinnamomo Adriani tempore reposito quod optimum visum est cōposui. Super sunt adhuc ibi multa vasa lignea, quæ omnia habent pluriūm radicū, vel pluriūm ramorum, vel Cinnamomorum differentias: nullum ramen veluti truncus in plures ramos diuisus attollitur, sed Verarri vtriusque figuram præ se fert, atque etiam magis Damafonij, quod è Creta ad nos adfertur. Quævis autē Cinnamomi species ab vna radice, seu frutex quidam paruus consurgit, emittitq; hæc sex, illa septem virgulta, vel paulò plura pauciorāve, non æquali ramen omnia longitudine: verū quod maximum est, pedis Romani dimidium non excedit. Vniuersa autem Cinnamomi natura similis est quodammodò optimæ Calsiæ

Cassia. Hactenus Galenus. Strabo cum Theophrasto, Dioscoride, Plinio, Cinnamomum in Arabia gigni dicit, atque etiam in India, ea scilicet parte quæ ad Austrum vergit. Quia cum hæc Arabia & Æthiopia Sole persimilis sit, ea omnia, ut ipse ait, gignit aromata, nempe Cinnamomum, Cassiam, & alia, perinde ac illa.

Lib. 9. c. 19. Idem testatur Aristoteles in Historia animalium. In Arabia Cinnamomum avis appellatur, quæ furculos Cinnamomi portare, ac nidos ex iis cõficere aiunt. Nidificat in excelsis arboribus & ramis, sed incolæ sagittis plûbatis nidos petunt, atque ita decussum in terra Cinnamomum legunt. Quæ Plinius muruatus, in Arabia, inquit, Cinnamologus avis appellatur, Cinnami furculis nidificat. Plûbatis eos sagittis decutiunt indigenæ mercis gratia. Aristoteli avis non *κιννάμωδος* dicitur, sed *κιννάμωμος* eodem cum planta nomine. Verùm Iulius Solinus de eadem re scripsit, avem ipsam nõ Cinnamomum, sed Cinnamologum appellat, atque etiam addit Cinnamomum hoc pretiis vendi amplioribus, quod magis, quàm aliud incensum porrent. Auicenna & Serapio nihil aliud de Cassia & Cinnamomo literis addunt, quàm quod ex Dioscoride & Galeno descripsérunt. Ex quibus omnibus intelliget studiosus lector, quàm fabulosâ, varia, & incerta de Cassia & Cinnamomo à veteribus Græcis & Latinis auctoribus perscripta sint: tam longis enim dihe-
 Lib. 1. c. 11. & 114. busque navigationibus, ex regionibus tum parùm notis petebantur hæc aromata, ut perfectam horum cognitionem sibi comparare non potuerint. Primum Dioscorides succinctè admodum Cassiam dixit esse virgultis crassi corticis, Piperis simili: Cinnamomi verò descriptionem prorsus omisit. Theophrastus Cassiam & Cinnamomum magnitudine Viticis, multos ramos habere, lignosos. Plinius Cinnamomum dixit fruticem esse duorum cubitorum altitudine amplissimum, & mi-
 Lib. 12. c. 1. que minimum, & cætera quæ supra posuimus. Cassiam fruticem esse altitudine trium cubitorum, &c. Galenus arcam Romam delatam fuisse tradit e Ba-
 Lib. 12. c. 1. rorum regione, longitudine cubitorum quatuor cum dimidio, in quo inter Cinnamomi arbor erat. Quibus indicat Cinnamomum esse arborem. Idem tribit vnâquamque Cinnamomi speciem, ab vna radice, seu fruticem quædam parâ con-
 Lib. 12. c. 1. surgere, adeò ut maiora eius virgulta dimidium Romanum pedem non excedant. Quibus innuit Cinnamomum in paruorum fruticum genere esse. Quid vero vult Galenus cum dicit Cinnamomorum nullum veluti truncum in plures diuisum attolli, sed Veratti vtriusque figuram præ se ferre, aut etiam magis Dionysii? Ad hæc cum Cassiam & Cinnamomum diuersas arbores esse statuit. Est & id permixtum, quod ait Cassiam sæpe in Cinnamomum transmutari, scilicet, vidisse ex parte Cassiæ ramulos omni ex parte Cinnamomum referentes: contra Cinnamomi furculos Cassiæ prorsus persimiles. Cassiæ genera Galenus recenset eadem quæ Dioscorides: item Cinnamomi sex, à Dioscoride etiam declarata. Theophrastus Cinnamomum in quinque partes diuidit, ut diximus. Eidem & Plinio duo tantum taxat Cinnamomi genera sunt, candidum & nigrum. Iam verò præfati illi regum & natalis locos aperte & disertè non designant. Dioscorides Cassiam in Arabia odoriferam provenire scribit, Plinius Cinnamomum in Æthiopia, moribus coniungens Æthiops mercari id à conterminis. Quod si apud illos nasceretur, cur ab aliis id emerit? Multò absurdius quod sequitur, Æthiopes eas merces per valla maria vehere. Nam si contermini sunt qui vendunt, tam longa navigatione quid opus est: ut nunc, ita & olim à Molucis in superiorem Indiam Cinnamomum vehabatur, mercimonium id exercente quæ ad mare rubrum iacet Æthiops gente, quos Abyssinos vocamus, ob commodam Oceani propinquitatem. Quæ etiam Plinium fecellit, ut rectè Dalechamplus annotauit. His fabulas addidere non solum Herodotus, sed etiam Theophrastus & Plinius. Fabulosum enim est scotos fructus præfui recentibus coriis boum, ut iis putrescentibus vermiculi lignum exierint &c. &c.

& excauent cortice tubo amaritudine. His expositis nunc discutiedum an veram hodie Calsiam habeamus, sitq; ea quæ Canella vulgo vocatur. Deinde an ab ea Cinnamomum differat, an verò genuino careamus. Primum recentiores omnes, qui doctrina & iudicio præstant, censuerunt Officinarum Cinnamomum, vulgò Canella dictum, legitimam esse præscorum Calsiam: cuius genera a Dioscoride & Galeno tradita intei noscere poterit is: qui magnā huius copiam in mercatorum apothecis diligentius perquisierit, & examinaverit. Quare ex Officinis omnibus reicienda segmenta & frustra quædam, nec odore, nec sapore, nec viribus commendanda, quæ Calsiæ lignæ siue odoratæ vice tum Medici, tum seplasiarij diu vsurparunt. Inter quæ cum sint nonnulla quæ præter odorem saporemque quibus ferè carent, Calsiæ Dioscoridis admodum similia videantur, eius Pseudocalsiam esse non temerè quis dixerit: medicamentorum verò compositionibus Xylolocalsiam, id est, Calsiam ligneam, siue Calsiam odoratam postulantibus, Canella nostra adhibeatur. At cum hæc Calsia etiam Calsia fistula nominetur, quoniam ligno exempta tubuli seu fistulæ specie est, Mauritanique Siliquam Aegyptiam, siue Calsiam nigram, siue Catharticam vulgò dictam etiam Calsiam fistulam vocent siue sua, siue interpretum culpa, cauendum ne hac homonymia decipiamur, præsertim in medicamentis à Mauritanis inuentis, quæ Calsiam fistulam expectant, quæ Siliqua Aegyptia, siue Calsia cathartica, non illa odorata intelligenda est. Quantum ad Cinnamomum attinet, quidam credunt in capsis Canella siue vulgari Cinnamomo refferis, fragmenta veri, ac legitimi Cinnamomi reperiri posse ab iis qui & deligere & distinguere nouerunt. Pena scribit se Calsiam ad Cinnamomum proximè accedentem vidisse in Officina Gulielmi Driesch pharmacopœi Antuerpiensis. Erat verò multorum iudicio furculus ille Cinnamomi, bacillo solido, fractu facili, Cinnamomi cortice obiecto, cui etiamnum cuticula pullo colore obducta fuit. Clusius in Scholiis in Historiam Aromat. Indic. Garciaz, asserit se tres vidisse Cinnamomi furculos. Erant ij recti, non enodes, sed nodis quibusdam sine ramulorum vestigiis palmum à sese distitis insigniti. Cortex tenuis, subcineris quodammodò coloris, iucundi odoris, suavis gustus, sed qui sua ærimoniam aliquantulum linguam vellicet. Lignum certè inodorum est & insipidum, non minùs quàm Salicis ramus, cui perquàm similis est. Retinet autem cortex suauem illam cum odoris tum saporis iucunditatem (tamen si totis quadraginta aut amplius annis à matre reuulsi sunt ramuli: atque eam etiam maiore, quàm nostra Canella. Illud autem hodiernum Cinnamomum neque idem cum Calsia, neque multum diuersum esse certum est, inquit Pena. Nam si viriusque notas ex Dioscoride perpendas, videbis easdem ferè esse vires, non disparem usum. Si recentioribus assentiaris & exploratoribus, eiusdem arboris non ita diuersas partes esse dices. Quod Galenus innuit, cum dicit Calsiam sæpe in Cinnamomum transmutari, seq; vidisse eximie Calsiæ ramulos Cinnamomum prorsus referre. Còtrà se vidisse Cinnamomi furculos Calsiæ prorsus persimiles. Quibus tanta horum cognatio significatur, vt Galeni auctoritate freti quidam putent Calsiam & Cinnamomum ex vna & eadem arbore provenire, sed ex diuersis eius partibus, nimirum Cinnamomum ex summis & tenerioribus furculis, Calsiam ex aliis. Alij nos verò Cinnamomo destitutos esse contendunt, idque quod Cinnamomum Officinis dicitur, nihil aliud esse quàm Calsiam ligneam, siue odoratam, quæ vulgò Canella nominatur, quos secutus est Matthiolus, qui contra veterum & recentiorum omnium qui de Cinnamomo & Calsia tractarunt sententiam, Cinnamomum lignum non corticem esse ait. Ex iis recentioribus Garciaz horum historiam luculentè describit his ferè verbis. Propter locorum distantiam, inquit, & minùs frequentatas has regiones à negotiatoribus, probè cognita Calsiæ historia veteribus

Lib. c. l. y.

Lib. Arom.
Indic. c. y.

non

non fuit. Nam qui eam Ormuz & Arabiam deferabant, Chinenſes erant. Ormuz deinde in Alep emporium totius Syriæ nobiliſſimum ab aliis negotioribus tranſferebatur. Qui vero inde eam ad Græcos deportabant, aut apud ſe naſci, aut in Æthiopia dicebant, multiſque eum ſuperſtitioſis, æquid duntaxat à ſacerdotibus, ut ex Theophrasto & Plinio diximus. Cæterum neque Caſiam, neque Cinnamomum apud Æthiopes aut Arabes naſci, Luſitanorum navigationibus palàm factum fuiſſe ait Garcias, qui totam illam oram circumperagrunt, magnâque ex parte reſtriſſimè peragrarunt: nullam autem Caſiam aut Cinnamomum ſe vidiffè affirmarunt. Dicit aliquis Canellam quidem apud eos non naſci, & propterea ab Indis petere: ſed legitima Caſia & vero Cinnamomo eos non catere, forſè autem à Barbaris & inconditis populis ignorari. Qui reſponder Garcias, familiares ſe habere eruditos Medicos Arabes, Turcas & Coracones, qui omnes Canellam craſſiorem Caſiam ligneam appellant. Prætereà nonnullos Luſitanos totam Æthiopiam ſub Ægypto (quam nunc Guineam vocant) non ſolum ſecundum mare, ſed in mediterraneis peragraſſe, ſed ab inſula D. Thomæ uſque ad Sofala & Mozambique, & inde Goam peninſulas, pleroſque alios à promontorio Bonæ Spei (cum naufragium paſi eſſent) uſque ad Mozambique & Melindam, ita ut utramque Æthiopiam, ſuper & infra Ægyptum perluſtrarint: nullam tamen ab his conſpectam illuc fuiſſe Canellam vel Caſiam. Neque credendum eſt ipſos incolas tam nobilia medicamenta ignorariſſe, aut tacituros fuiſſe. Nam quemadmodum barbariſſima, & quæ inſulam D. Laurentij incolit, mercatoribus, qui eò interdum deſcendunt, fructum quandam auellanz magnitudine oſtendit, quia Caryophylla ſimiles, eadem ratione credendum eſt Æthiops Cinnamomum & Caſiam, admodum aromata Luſitanis demonſtratuſſe. Porrò Caſia lignea Arabum Perſis, Indis *Sabbaſch* vocatur, à vulgo autem Indorum eodem nomine, quæ Canella: nullum enim inter Canellam & Caſiam diſcrimen faciunt. Neque uerà quiſpiam Caſiam à Canella differentem vidit. Cæterum quod Canella uerſa Cinnamomi & Caſiæ nomina indita fuerint, occaſionem præbet perſtat Garcias mercatores Chinenſes, (nàm annales urbis Ormuz produnt quadringentas naues e China vno eodémque tempore eo appuliſſe, quæ ſua regione aurum, ſericum, vaſa murrhina, moſchum, margaritas, cuprum, aliâſque merces eueherent, nonnullas ex eis in Malaca vendeabant, Siam, Nucem myſtilicam, Macim, Caryophylla, lignum Aloës contra in ſuas naues inferebant. Quæ rurfus in Zeilam & Malauar diuendebant, indeque ſumebant Canellam, ex Zeilam, videlicet laudatiſſimam, ex Malauar minus ſelectam ſimiliter & ex Iaoa, unde etiam Piper Cardamomumque euehebant, eaque omnia deinde Ormuz, aut in Arabiæ oram maritimam perſerebant. Intergati autem iſti Chinenſes, quæ nam eſſent hæc aromata, & unde aduherent fabulas illas narrabant quas recenset Herodorus, ut iis commentis earum pretium augeretur. Cùm autem eam, quæ in Zeilam proueniſſet, Canellam ab ea, quam in Iaoa & Malauar ſumpſerant, diſſerre conſpicerent, diuina iſi indidit nomina, cùm tamen eiſdem generis eſſent cortices, pro ſolè etiam variatè duntaxat differentes, ut plerumque idem fructus pro regionum & caliditatis differentia ſuauior fieri, aut à naturali bonitate degenerare ſoler. Ementes ergo incolæ Ormuz eam Canellam à Chinenſibus, Darchini, quod Perſis lignum Chinenſe ſignificat, appellarunt. Deinde Alexandriam vehentes, ut eam Græcis eò conſtuentibus cariùs venderent, Cinnamomum vocarunt, quod ſignificat lignum odoratum, quaſi Amomum ex China delatum. Deterioria autem Canella, quæ ſcilicet ex Iaoa & Malauar delata eſſet, idem nomen quo Canella appellatur

appellatur, indiderunt, scilicet *Cais manis*, quod lingua Malaya dulce lignum sonat, duo diuersa nomina eidem rei imponentes. Graeci corrupto vocabulo Caisiam dixerunt. Vñs est Auicenna cum Rhafé & reliquis Arabibus vocabulo Persico Darchini, vt plerisque aliis Persicis solet. Nam Canella cuiuscunque generis Arabicè *Quersaa* & *Quersa* dicitur. Reliqua verò nomina apud Arabas corrupta sunt, vt *Darsihahen*, & similia. Vocatur in Zeilam *Cuordo*, in Malaya, vt dictum est, *Cais manis*, in Malauar *Camraa*. Nam quod Serapio Darchini arborem de China interpretatur, corruptum est, & ab interprete additum. Quate Garcias Caisiam, Cinnamomum, & nostram Canellam, vnum idémque medicamentum esse censet, atque ita depingit. Arbor est magnitudine Olez, interdum minor, multis onusta ramis, non iis quidem contortis, sed rectis, sernicè, foliis colore quidem ad Lauri, forma verò ad Citri folia accedente (non autem foliis Iridis, vt fabulose quidam scripsere.) Floribus candidis, fructu nigro & rotundo, auellanae ferè magnitudine, aut exiguis oliuiis simili. Est autem Canella nihil aliud quam secundus & interior arboris cortex. Nam hæc arbor duplici cortice munita est, veluti Suber, non eo tamen adeò crasso & distincto. Hoc confirmat

Forma.

CANELLAE solum & bacillus.

XYLOCASSIA.



Pena, qui scribit Venetos institores Londini ostendisse corticem pollicem crassum, scabrum, callosum, fœtis Illici aut Olez concolorem, interiùs verò conuexum mollius, superficie, odore, sapore, colore, gustu quadantenus Canellæ vulgaris. Idcirco doctiorum Medicorum sententia, Caisiæ arboris extimum & crassissimum corticem iudicatum fuisse. Similiter adnotauit Clusius in Scholiis in Garcie historiam, interdum inueniri fragmenta, quæ non videntur interior ille cortex, sed omnino superior, cinerea quodammodo pellicula obductus. Exemplus ergo cortex crasso illo & exteriori libro repurgatur, deinde in laminulas quadrangulas sectus humi abiicitur, atque ita per sese conuoluitur, vt vnius rami integer cortex videatur, cum tamen partes sint duntaxat corticis intubulos digiti crassitudine conuolutæ, truncus verò interdum femoris crassitie

Locus.

Li. 12. ca. 19.
Lib. 1. An-
tidot.

Cap. 44.

reperitur. Roseum autem illum, siue ex cinereo vinosum colorem Soli calore contrahit: qui non probè paratus, candicans siue cinerei coloris nimis vero Solis ardoribus adustus, niger. Exempto cortice tribus postea annis ab ea arbore abstinetur. Frequentes sunt hæc arbores in Zeilam, solèbātque vili emi Canella: sed triginta ab hinc annis nemo eam emere potuit præter Procuratorem regionum negotiorum, quem Factorem vocant. Zeilanicis minores sunt ex arbores, quæ ignobiliores Canellam ferunt in provincia Malauar, & in laoa, siue laua, non tamen adeò pusillæ, vt Plinius & Celenus esse scribunt. Sunt verò omnes siluestres & sponte nascentes. Nulquam alibi, quod sciam, inquit Garcias, nascitur Canella, tamen si Franciscus de Tamara scribat in freto maris Erythræi Cinnamomi arbores & Lauros maris æstu interdum opertas inueniri. At Lusitani singulis annis per mare Erythræum nauigant, nullam tamen eiusmodi arborem se vidisse referunt. Patereâ Occidentalis Indiæ Historia refert Canellam istic nasci, quod verum non esse Garcias arbitratur: eam enim narrat calices glandisque Suberinodo ferre, cum legitima Canella veluti oliuas tantum ferat. Quare alia erit species arbor. Quotquot tamen Historiam Peruanam descripserunt, istius Canellam in provincia Sumaco nasci tradunt, meminerunt. Est verò ex eorum descriptione, Canellæ arbor vasta admodum, folio Laurino, fructu raccemato coherente, sed qui calice Suberino simili contineatur, ampliore tamen, & cauo, colore nigricante. Huius arboris fructui, foliis, cortici & radice (Canellæ saporem & odorem habeant) longè calices præferuntur, quod duntaxat puluis in vsu est. Nam si Canellæ modo cum cibus decoquantur tantum abest vt suauitatem eduliis concilient, vt potius eorum faculas & poris gratia decoctione euanescat. Horum puluere ad diuersos morbos vsatur, sed præsertim aduersus coli, intestinorum, & stomachi dolores in febribus eum propinant. Quamuis autem multæ sint huius generis arbores siluestres, diligenter tamen & magna cura eas in prædiis suis colunt, siue culta longè melior atque in vicinas regiones deferunt, alias merces ad vitam humanam necessarias hoc aromate redempturi. Hæc Franciscus Gonzales Historia generali. Nec vt eadem Historia Occidentalis Indiæ narrat, si Canella nascitur, nam è Malaca Chinam cum aliis mercibus deferretur, tellexit verò Garcias plurimam etiam Canellam in insula Mindanao nasci, vicinis insulis, sed ex procul à China absunt. Putarunt etiam nonnulli in insula nasci Canellam, quod apud aliquos auctores scriptum inuenerunt Cinnamum Alepinum. Sed sciant, non magis istic, quàm in Hispaniis nasci. Verum eum ex illis regionibus Otmuz, & inde Alep deportabatur, factum esse, vt incorruptam Canellam inde in Europam aduectam ab ipsa vire Alep comminarent. Quamuis autem Zeilanica cæteris præferatur, inuenitur tamen etiam interdum ignobilis, qualis est quæ crassiori cortice constar, minisque in tubulos conuoluitur, quod non sit eiusdem anni: quo enim vetustior cortex, eo deterior. Quæ verò in Malauar nascitur, tota ferè est deterior, tantum, à Zeilanica differt, vt centenæ Zeilanicæ libræ decem aureos pendant, Malauricæ verò libræ quadringentæ vnum duntaxat aureum. Ludouicus de Barthelemy in nauigatione sua scribit in Zeilam insula Indiæ nasci Canellæ arborum Laurum proximè referentem præsertim foliis: item baccas Lauri modicæ, sed minores & candidiores. Hæc Canella siue Cinnamomum (nihil minus inter ea discriminis ponit) cortex est huius arboris, cuius ramos tertio quoque anno secant, & cortice spoliant: truncum vero pilulæsum relinquunt. Sicut Odoardus Barbosa scripsit in Zeilam Indiæ insula nasci optimam Canellam

loci montisus et ab hinc Lauro simili. Arriani in natione orientali quibz refert duorum dierum itinere ab impoito Mordo dicta locum esse. Mollum nuncupatum, in quo vixit Casia copia provenit. Idem in antiquum esse Aromata dictum Orientem versus, in quo nascitur Casia, Zingib. & Aligi, & alia aromata. In quam Arriani navigationem is qui scripsit, quod de Casia & Zingib. Canellæ gesseribus ab Arriano proditum est, diligenter examinatum esse annotavit, nempe ea nasci in Troglodytica parte, vel in Aromata & Mollis, unde mercatores emunt, & ad alias partes transportant. Similiter quod Plinius dicit, Cinnamomum nasci in Æthiopia Troglodytica, confirmat, quæ id ab antiquis auctoribus teste Strabone Cinnamomum sepe appellata fuit, quod etiam confirmavit Ptolemæus. At nunc tota Troglodytica & Æthiopia probe cognitis, certum est neque Cinnamomum, neque aromatum speciem ullam illic nasci, dempto Zingibere, quod in regno quodam Damute nuncupato provenit. Thevetus partim Garcie assentitur, partim ab eo multum discepat. Narrat ab insula quæ Monorique dicitur celebriores esse Causi & Subanin, propè quas optima Canella provenit, quam Maluarici Caus-mani appellant, quæ vox dulce lignum significat, creditque Thevetus Græcos corrupto inde nomine Casiam ligneam appellasse. Ac reuera veteres plerique, inquit, existimarunt arborem, quæ Casiam, & eam quæ Cinamomum & Canellam fert, eandem plane esse, quod falsum est, etiam si Garcias id asserere voluerit: tantum enim differt hæc ab illa, quantum glandifera arbor à Castanea arbore. Caterum Canellam Arabes appellant *Querfaa*, alij *Quirfa*, Zeylam incolæ *Cuurde*, in Iavan insula *Camea*, in Ormuz *Darchmi* dicitur, id est, Lignum Chinense. Arbor hæc in montibus nascitur, Lauro nostrati similis, cuius ramuli duntaxat, & tenuiores surculi stato anni tempore Regis iussu amputantur & vaneunt. Ramulis multum brachiata est, in quorum extremis flores sunt parvi, quibus Solis feruore statim flaccescentibus & delapsis succedit fructus, ferè rotundus, Nucis ouellanz magnitudine, ex cuius nucleo oleum exprimitur, inodorum, nisi sit igni excoctum, quo ægri nervos & ceteras corporis partes male affectas illinunt. Canella quæ ad nos aduehitur, secundus est arboris cortex, qui dissectus in sese conuoluitur, & colorem mutat, Radix utilis est, nec non succus qui ex arbore manat, iisque confert maxime, qui sanguinis ex naribus profluuium obnoxij sunt, oisique halitum commendat. Scire autem licet nullam Canellæ arborem, neque in Africa, neque in Asia minore, neque in Peru, neque in Europa provenire, quicquid scribant Plinius & Herodotus. Hæc ex Theveto. Superest vt Cinnamomi & Casie vires ex veteribus explicemus. Casia vim habet calfaciendi, inquit Dioscorides, vrinam ciendi, siccandi, & leuiter adstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ efficiendæ claritatis gratia concinnantur, & ad ma-

ARBORE CANELLÆ,

Theveti.



dit fructus, ferè rotundus, Nucis ouellanz magnitudine, ex cuius nucleo oleum exprimitur, inodorum, nisi sit igni excoctum, quo ægri nervos & ceteras corporis partes male affectas illinunt. Canella quæ ad nos aduehitur, secundus est arboris cortex, qui dissectus in sese conuoluitur, & colorem mutat, Radix utilis est, nec non succus qui ex arbore manat, iisque confert maxime, qui sanguinis ex naribus profluuium obnoxij sunt, oisique halitum commendat. Scire autem licet nullam Canellæ arborem, neque in Africa, neque in Asia minore, neque in Peru, neque in Europa provenire, quicquid scribant Plinius & Herodotus. Hæc ex Theveto. Superest vt Cinnamomi & Casie vires ex veteribus explicemus. Casia vim habet calfaciendi, inquit Dioscorides, vrinam ciendi, siccandi, & leuiter adstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ efficiendæ claritatis gratia concinnantur, & ad ma-

Temper.
Ex Viret.
Lib. I. cas.

Lignosa & cortices tenet. Illis cum radice dila, mellea trahit, comit. propterea
 morbi pota auxiliatur. Aduerfus omniaque inflammationis, tumoris, & morbi
 vicia potu proficiunt. Feminis in fatis decidendis aut fuloribus post illud
 dilatationem vulvæ. Ea duplo pondere medicamentis mixta cinnamomum
 cem supplet, si ipsum defuit: nam eodem effectus præbet, ad plurimam partem
 utilis. Cinnamomum omne, eodem auctore, exallicet, emoluit & res
 coquit, vrinam citat: tam menses quam parius potum, aut et Myrrha sup-
 positum pellit, contra bestias quæ virum eiulantur, venenæque cinnamomum
 sitiem extenuat, leuigines & vitia cutis in facie ex melle illitum. Contra
 contra tusses, deluxiones, hydropem, nephritidem, & vrinæ dila-
 eflicax est. Vnguentis pretiosis inferi solet. In summa materia ad omnia
 Garcias contra Dioscoridis & Galeni auctoritatem monet rogare. Me-
 & pharmacopæcos omnes, ne Calsiam duplici pondere pro Cinnamomum
 positionibus immisceant. Tum ne posthac Calsiæ loco Candelam
 præferbant, sed selectissima vtantur, cum tanta sit eius copia. Galenus
 bit Calsiam exsiccare & exalfacere tertio quodammodo ordine, sed & tunc
 admodum esse partium, gustu verò plurimam in se acrem deprehendit,
 ter quoque non nihil adstringere. Quamobrem ob hæc omnia mellea
 mulque digerere quæ in corpore sunt excrementa: ad hæc robur etiam
 strumentis addere. Idoneam verò etiam suppressis menses, cum videtur
 copia simul & crassitudine excrementorum quod sufficiat cruentum non
 Cinnamomum verò summè tenuium esse partium, non sicutque cinnamomum
 dum, sed ex tertio ordine. Nihil autem æquè desiccare eodem quoque
 exalfaciendi facultate, propter tenuitatem essentia. Garcias auctor est
 stillare ex Calsiæ radice liquorem Caphuram redolentem. Sed Rex verò
 diceb vulnerari, ne arbores pereant. Præterea elici aquam vitreis organis
 ipsis floribus, sed quæ fragrantia & odoris suauitate ei cedat, quæ ex
 bus nondum resiccatis elicitur. Vtilis est hic liquor stillatitius ad plures
 Nam stomachi imbecillitatem roborat, coli dolores a causa frigida
 nientes illico lenit. Faciei colorem commendat & oris halitum. Præterea
 condiendos suauioresque efficiendos cibos perquam idoneus. Ex Candelæ
 cis oleum exprimitur, quemadmodum ex oliuis, sebaceum quodammodo
 saponi Gallico simile, inodorum, nisi calfactum sit, tunc enim Cinnamomum
 aliquantum oler, & vtuntur aduersus ventriculi, & nervorum frigus
 intemperiem.

Lib. 4. hist.
 An. m. ind.
 cap. 16.

Lib. 7 simpl.



Vob Græci *πίπερ*, id Piper Latini dicunt, Arabes *Fulfil* & *Fulfil*, Itali *Nomina*
Pepere, Getmani *Pfiffer*, Hispani *Pimenta*, Galli *Pauvre*. De eo
 Dioscor. hæc prodidit. Piper arborem tradunt nasci in India, breuem,
 quæ inter initia prælongum fructum veluti siliquam promit, quod est
 longum Piper, habens intus aliquid tenui Milio simile, quod tadem in perfectum
 Piper euadit. Id autem suis temporibus dehiscens, tacemos emittit grana ferentes
 qualia videmus. Ea acerba candidum Piper faciunt, aptum ocularibus remediis, anti-
 dotois, & theriacis medicamentis. Longum vero vehementius mordet, & subamarum
 est, quia immaturum decerpitur, antidotois & theriacis medicamentis expetitur.
 Nigrum vero candido suauius, actius, orti gratius, & quod non nisi maturum colligatur,
 magis odoratum, nec non ad condimenta vtilius. Sed candidum & subacer-
 bum antedictis infirmius est. Piperis radix Costo similis est. Eligendum est gra-
 uissimum, plenum, nigrum, non valde rugosum, recens, non fursuosum. Inuenitur
 etiam in genere nigri, nutrimento destitutum, inane, leue, quod vocatur *brasma*.
 Plinius, Passim vero, inquit, quæ Piper gignunt arbores, Iuniperis nostri sunt si-
 miles: quæquam in fronte Caucaſi solibus apposita gigni tantum eas aliqui tradi-
 dete. Semina à Iunipero distant paruis siliquis, quales in Phaseolis videmus. Hæ
 priusquam dehiscant decerpunt, tostæque, sole faciunt quod vocatur Piper longum:
 paulatim vero dehiscences per maturitatem ostendunt candidum Piper, quod
 deinde tostum solibus, colore rugisque mutatur. Dioscorides arborem Piperifera-
 ram neque delineauit, neque cuiquam alteri assimilauit. Plinius Iunipero compa-
 rauit in cæteris haud multum dissentient. Theophrastus dixit tantum Piper fru-
 ctum esse, cuius genera duo. Vnum enim rotundum Erui modo, cute carneque
 constans, sicuti Lauti baccæ, subrubrum. Alterum oblongum, nigrum (contrà, ro-
 tundum *μύλα*, nigrum, oblongum *ἐπιρροβρον* subrubrum dicendum videtur) semina
 patua Papauetis continens. Longè hoc validius altero. Auicenna & Serapio, quæ
 de Pipere tradiderunt, ex Græcis excerpserunt. At Dioscorides, Theophrastus, & hos
 secutus Plinius Pipetis plantæ formam, ac notas ignorarunt, ut ait Garcias, neque
 natales locos probè designarunt. Quod minùs mirum videri debet: regionis enim
 procul disitæ, idèquæ minùs bene cognitæ, nec perlustratæ plantam non inſpec-
 tione notam, sed auditione tantum acceptam, alienam fidem secuti deſcribunt.
 Illud magis mirum Arabas & recentiores in eundem errorem incidisse. Quare
 veram Pipetis historiam ex aliis teferemus. Ac primum ex Garcia. Maxima, in-
 quit, Pipetis quantitas prouenit in Malauar, tota ea maritima regione quæ à pro-
 montorio Comorim ad Cananot vsque pertingit. Nascitur etiam in Malacca: ma-
 ritimis, sed bonitate superiori cedens, & magna ex parte inane. Prouenit similiter
 in insulis Iauæ vicinis, & Sunda, & Cuda, aliisque locis. Sed id in Chinaram regio-
 nem tantum deportatur, & loco natali consumitur, præter id quod in Pegu &
 Martaban deuehitur. Maxima etiam eius pars quæ in Malauar oritur, in vsum in-
 colarum cedit, tametsi regio ampla non sit: nonnihil etiam à maritimis eius re-
 gionis populis absumentur. Pars eius defertur in Balagate bubulis coriis. Et magna
 copia (quamuis edicto Regio vetitum sit) à Mauritanijs per mare Erythræum ex-
 portatur, id suffutantibus ipsis incolis. Inuenitur etiam Piper supra Cananor, qua
 Septentrionem spectat, sed adè exiguâ quantitate, ut ipsis incolis non sufficiat,
 & externo importato opus habeant. Erenim non gaudet planta hæc locis desertis
 ac mediterraneis. Quantum verò distent hæc regiones à Caucaſo monte, ex Geo-
 graphijs satis liquet. Piper Maluatica lingua Molanga dicitur, Malacitana, Loda,
 in Guzarate & Decan, Meriche, in Bengala, Morois, longum Piper quod solum

Lib. 12. c. 7.

Lib. 9. hist.
cap. 12.Lib. 6. cap. 19.
Cap. 17.
impl.Lib. 1. Arom.
Ind. ca. 11.
Locus.

Nomina

istit provenit Pimpilim, Arabibus medicis, tum vulgò *Fisfel*. Tamen Avicenna Fulful & Fulfel appellat, quem secutus est Serapio. Seritur Pipens planta ad radices alterius arboris magna ex parte iuxta arborem Faufel, aut Palmam sitam Garcias vidit) ad cuius fastigium vsque sese conuoluendo conscendit, solus raris, Mali Assyrij effigie, sed minoribus, in extremo acutis virentibus, gustu aliquantum calidis, & folij Betre sapore. Fructus vuarum modo racematim coheret, immixtos tamen sunt Piperis racemi, & fructus ipse minor, semperque virens, donec siccetur, & perfectam maturitatem consequatur, quæ incidit circiter medium *Jacuarum*. Radix pusilla, nō Costo similis, vt vult Dioscorides, quia Costus radix non est, sed lignum. Verum inter plantam quæ Piper nigrum fert, & eam quæ candidum parua est differentia, vt à nemine quàm ab incolis dignosci possit, quemadmodum Vitem quæ viam fert nigram ab ea quæ candidam non dignoscimus, nisi cum vuas habent, & eas quidem maturas. Quæ autem Piper longum edit, longe alia est planta, quæq; non plus habet similitudinis cum superioribus quam *Costus* cum ouo. Præterea Piper longum in Bengala provenit, quæ regio quingentarum miliarum spatia à Malauar distat, vbi nigrum & candidum gignuntur. Quare *Dioscorides* secutus eandem plantam Piper longum, candidum & nigrum

Forma.

L. 8. simpl.

ARBOR Piperifera, Theueti.



PIPER nigrum & album.



proferte falso credidit. Candidi plantæ rariores sunt, nec nisi certis *Malabar* & *Malacæ* locis rarè nascuntur. Condiuntur aceto & sale recentes adhuc, & utuntur Piperis nigri racemi, & vsui afferuntur, cuiusmodi racemos interdum cum Zingiberis radicibus muria conditis Antuerpiæ reperiri ait Clusius, oblongos quidem & graciles, neque ita fæctos, vt sunt vuarum racemi, ex quo eorum iconem expressam hic exhibemus. Arabes & Persæ Medici Piper calidum tertio ordine statuunt. Sed empirici cuiusmodi sunt maxima pars Indicorum Medicorum, frigidum Piper faciunt, vt & pleraq; alia aromata, quæ reuerà excalfaciunt. Solent magnates candido Pipere vti quemadmodum nos sale. Venenis resistere &

L. 8. 113 ocularibus medicamentis vtile esse asserunt, quod & Dioscorides annosus

OTOMUS

omniū, inquit, excoquit, urinam ciet, cōcoquit, trahit, discutit, absterget quæ tenebras oculis offundunt. Piper horribus febrium periodicis siue potu, siue illitu subuenit: serpentium moribus auxiliatur, partus extrahit, conceptum adimere creditur statim à concubitu suppositum: tussi omnibusque pectoris vitis siue eclegmate, siue potu succurrit: angina eo & melle vitiliter petunguntur. Potum cum recētibus Lauri foliis tormina discutit. Cum vua passa commanducatum pituitam à capite elicit: dolores sedat, appetentiam mouet, concoctionem adiuuat ad intinctus esculentorum additum. Strumas cum pisce discutit, vitiligines cum nitro terget. Radix ora gustantium accendit, saliuam ciet, lienem reprimat cum aceto illita, aut pota. Caput etiam purgat cum semine Staphisagria manducata. Garcias candidi Piperis loco, quod calidius est & odoratius, nigrum præscribendum esse non consiluit, nisi in candidi penuria. Similiter nec longum Piper candidi aut nigri loco, cum prorsus diuersæ sint plantæ, & nigrum cum candido

Lib. 1. cap. 99

PIPER, *Math.*PIPER *Aethiopicum, Math.*

magis conveniat. Idem alius generis Piperis meminit, q̄ lingua Maluarica à Canara Canaricum nuncupatur. Est autem id inane, eoque vtuntur ad pituitam à capite eliciendam, ad dentium dolores, & in cholericis affectu. Annotauit Clusius Scholiastes Antuerpiam inuehi solitum aliud Piperis genus, quod Lusitani Pimienta delrabo, id est, Piper caudatum vocant. Sed veritus Rex Lusitanie ne legitimum Piper alterius inuentione vilesceret, id amplius deferri edicto vetuit. Erat id Cubebis fere simile, pediculo subnixum exiguo, rotundum, plenum, aliquantulum rugosum, nigricans, eadem acrimonia qua Piper præditum, aromatum, racematim coherens. Amomum esse nonnulli perperam existimarunt. Est & aliud Piperis genus quod Aethiopicum vocatur, à Serapione Granum Zelim & Piper Nigrorum, atq; ita describit. Habzeli, inquit, id est, Granum Zelim, granum est pingue, magnitudine Ciceris, foris flauum, intus album, boni saporis. Adfertur ex Barbaria, vbi vocatur Croni, Piper etiam Nigrorum nuncupatur: quam reuera Piper Nigrorum sit aliud. Specie Phaseolis simile est, sed granis &

Piper Canaricum.

Piper Caudatum.

Cap. 127. simpl.

corucibus minoribus, colore nigro, sapore acri sicuti Piper. Ex regione Nigro-
rum deferitur, & doloribus dentium confert. Hęc Serapio. Hoc Piper sic depuratum
dedit Matthiolus. Sunt qui perperam Carpesium esse opinentur. Nicolaus Mo-
nard. aliud Piper longum Americum depinxit, cuius toto continentis tractu, in

PIPER longum.



quo Nara, Carthago, atque etiam in nouo
Regno magnus est vsus. Id oblongum est,
maiori acrimonia præditum Orientali,
magisq; aromaticum, ac iucundius deo-
re quàm Capsicum: quin etiam Piperi

gro tum sapore, tum suauitate præferendum. Atq; cuiusdam plantæ fructus est, ob-
longus est, crassitudine quidem funiculi, & dimidij pedis longitudine, veluti
nulis multis constans, circa pediculum oblongum, cōtinuo & coniuncto ordine
dispositis, veluti in semine plātaginis, quibus ademptis pediculus nudus con-
citur. Recens viridis est, sole maturefcit, & nigrescit. Calidus est tercio gra-
tior

CARDAMOMVM. CAP. XXXVIII.

Nomina
Lib. 1. c. 4.



ΑΡΔΑΜΩΜΟΝ Græcè, vt Latine Cardamomum, Arabicè
dumēni vocatur. Dioscorides de Cardamomo tractans id non
bit, sed duntaxat quibus in locis nascatur optimū, qualeque
sit, docet his verbis. Cardamomum optimum est, quod in Co-
ne, Armenia, Bosphorōque deuehitur. In India quoque & Arabia prouenit
debet plenum, frangenti contumax, oclusum farctumq; (Quod enim ha-
di non est, exoletum iudicatur) & gustu acre, subamarum, & odore capu-

Lib. 12. c. 13.

Plinius de eodem aliter hæc scripsit. Simile his (Amomo & Amomidi & ne-
ne & frutice Cardamomum, semine oblongo. Metitur eodē modo & in
Quatuor eius genera. Vitidissimum ac pingue, acutis angulis, contumax
quod maxime laudatur. Proximum è rufo candicans: tertium breuius atq; ni-
Peius tamen varium, & facile tritu, odorisque parui, qui verus Costo vicinus
debet. Hoc & apud Medos nascitur. Quod semine oblongo dixit Plinius, de
nis conceptaculo siue calice intelligendum videtur. Ex quibus verò aucto-
quatuor eius genera faciat, nescio. Dioscorides enim, Galenus & ceteri
ci vnius tantum Cardamomi meminerunt. Quod maxime laudari ait ve-
mum ac pingue, acutis angulis, Dioscorides requirit oclusum plenumque.
duo ὄπλυστος, id est, frangenti contumax, quod Plinius contumax fricanti, vi-
tasse legendum sit contumax frianti. Auicenna de Cardamomo duobus disti-
ctis capitibus tractauit. Priore de Cardamomo, id est, Sacola, de quo postea d-

Lib. 1. c. 196.

mus: altero de Cardamomo, id est, Cardamomo. Quo capite easdem plane vires ei
alsignat, quas suo Cardamomo Dioscorides. Ex quo perspicuum est, de Græcorum
Cardamomo Auicennam hic verba facere. Item Serapio nomine Cardamomi
eodem prorsus refert quæ Dioscorides & Galenus de suo Cardamomo. Sed Car-

Genera.

momumne Græcorum sit quod vulgò in Officinis habetur, id in cōtrouersia est.
Matthiolus tria Cardamomi genera ad nos adferri scribit, maius, medium, & mi-
nus. Maioris inuolucrum fici faciem refert, materia compactum tenaci, lentæ ac
læui, Indicę nucis innolucro, aut Palmæ elates non absimili, staminibus multo
longitudinem discurrentibus. Intus semine farctū est subrubro colore, grans in-
æqualibus, multis intercurrentibus membranis albicantibus, quibus semina con-
teguntur, quæ Melegettas quidam appellauere, quod Milium Indicum referant,
quod Itali Melegam vocant, saporis acuti, odoris iucundi ac suavis, vnde Grana
Paradisi à multis vocitantur. Medium folliculo contegitur oblongo, triquetro,
striatōque, retuso in summitate cacumine, in quo semen conditur, mem-

CARDAMOMI spec. Math.



quod; sicut in ob-
longum, pyramidum,
oblongum, altera
parte denticulata, multis
transversim in me-
dianibus lineis, co-
re ex albo rufescenti.
Minus folliculo con-
stat breui, facie trian-
gulari, sagittata, nu-
clei effigie, olivaceis
tamen antheris, me-
dia intus dissidente

membrana. Vtrinque semen est altera parte caua linea diuisum, subrotundum & tactu lubasperum. Omhium semen est fractu facile, acre, cum quadam odoris sapo-
risque suauitate, & sine vlla amaritudine. Maius tamen acrius est, & aromaticius quid
magis respiciens. Minus vt medium acrimoniae vehementia superat, ita & odoris
fragrantia. Maius Cardamomum videri possit, inquit Matthiolus, id esse quo vete-
res Graeci vsi sunt, quod suo e Cardamomo apud Galenum folliculos abiciat Ze-
no, & quod in Theriaca carmine descripta folliculorum Cardamomi mentio fiat.
Praeterea alio in loco Galenus ex Pamphilo myropola transcribens Cardamomi
delebrati meminit. At repugnat sapor, in quo nulla prorsus amaritudo percipitur,
que in Galeni Cardamomo adeo euidens est, vt eo vermes intestinorum necari
affirmeret. Adhuc illius sapor suauis est, nec caput tentat, nec frangenti contumax
est, sed dentibus facillime cedit. Quare maius illud Matthioli Cardamomum, vete-
rum Graecorum Cardamomum minimè fuerit: neque etiam medium, neque mi-
nus, id quod ex sequentibus perspicuum fiet, quibus de Cardamomo vulgari Offi-
cinarum dicemus potissimum ex Garcia. Quod Cardamomum vocant, inquit,
aroma est in India notissimum, ob frequentem eius vsum, cuius etiam magna pars
in Europam, Africam, & Asiam deuehitur. Quam verò rectè sit illi Cardamomi
nomen inditum, alius discipandum reliquit. Certè Auicenna peculiare e-
ripit caput de Saccolaa, quod diuim generum esse tradit. Alterum Saccolaa quærit, id
est, magnum, alterum Saccolaa ceguer, id est, minus. His nominibus cognum
esse vtrumque Cardamomum cum Medicis Arabibus, tum mercatoribus. In Ma-
liar vocatur *Etremelli*, in Zeilan *Ençal*, in Bengala. Gazarate & Decan interidum
Hil, interdum *Elachi*, idque inter Mauritanos nam à gentilibus indigenis omniū
supra dictarum prouinciarum *Dore* nuncupatur. Quæ diuersitas & nominum
confusio multis errandi occasionem præbuit: alij enim Indicis vocabules, alij Ara-
bicum vsi sunt. Nam quod Serapio alterum Saccolaa, alterum Hilbane vocat, men-
dolum est, & Hil duntaxat scribendum. Quod si Bane quis adici velit, potius Ba-
ra dicendum censet Garcias, quod lingua Canarina magnum significat. At Sera-
pio nomine Hilbane Cardamomum minus intelligit. Nihil igitur aliud est Sac-
colaa omnium Arabum, aut Saccule Auicennæ, aut Elachi, quam quod vulgo Car-
damomum vocant Officina, veteribus tum Graecis, tum Latinis incognitum, de
quo sic Auicenna. Saccolaa quid est? Aliud est magnum sicut Cicer nigrum, quod
cum frangitur, interius habet granum album, mordicans linguam sicut Cubeba,
in quo est aromaticitas. Et aliud est paruum sicut Lens, aromaticum etiam. Sera-
pio etiam de vtraque huius Cardamomi specie ex auctoritate Isaac fusiùs agit.
Nasçitur, & feritur auctore Garcia, leguminum modo, altitudine quando summa,
cubiti, in quo dependent siliquæ parua granula interdum vsque ad viginti conti-
nentes.

Lib. 1. An-
tiodot.

Lib. 7. com-
pos. med.
loca. cap. 3.

Lib. 1. Aro-
lib. 11. cap. 14.

Nomina

Cap. 64.
simpl.

Lib. 1. cap. 15.
Forma.

- nentes. Progenit vtrumq; in India præfertim ab Emporio Gale ut vique nanor: tamen aliis etiam locis Malauar, & in laoa nascens, non vniuersum ad vni-
Locu. piofum, neque cortice tam candido. Optimum est fœtus noster, quod
Electio. est altero, & facultate maius dici potest. Id verum Græcorum Cardamomum
 esse nequit. Nam Galenus scribit Cardamomum non esse tam calidum
 quam Nasturtium, sed suauius & magis fragrans cum quadam amaritudine. Quod
 notas omnes, præfertim amaritudinem Cardamomo nostro non conuenienter
 perentia docet. Dioscorides verò commendat quod ex Comagene, Arabiæ
 Bosphoroque adfertur (tamen in India quoque & Arabia prouenit & dicitur
 gendumque plenum, frangenti contumax, gustu acre, subamarum, odore
 tentans. Nostrium contra in regiones illas defertur, ex quibus Dioscorides
 deferri scribit. Sed neque id frangenti contumax est, neque caput tenax, nec
 amarum, neque gustu adeò acri vt Caryophylla. Neque vllum ex Plinij
 Cardamomum cum nostro conuenit, quod fragile esse debet, siliqua candicante
 tus nigris. Ex iis etiam satis liquet errasse eos qui Caplicon siue Siquale
 Mauritianorum Cardamomo exhibuerunt. Item eos qui Melegretanum Carda-
 mum Dioscoridis esse putant, nam Melegeta Dioscoridi non fuit quædam
 damomum maius coloris esse cinerei aiunt, Nigellaq; id tertium
 in Officinis habetur, quoniam Nigella in his omnibus prouinciis non
 Quod verò Melegeta Cardamomum minus non sit, satis ex vtroque
 in India nascitur perspicuum est, quorum alterum Cardamomum, vt vo-
 ius est, alterum minus, eiusdem tamen formæ, & magnitudine duntaxat
Vfus. tia. Multi vsus est in his prouinciis in quibus prouenit. Etenim cum
 iam diximus) manditur, pituitaq; caput & stomachum expurgat, & Stomachum
Temper. miscetur. Hæc ex Garcia. Scribit Auicenna Saccola calidum & siccum
Et Vires. uo gradu, cum calore adstrictionem illi inesse, præcipue in cortice. Vomitus
 vomitus & nausæ cum mastiche & aqua vtriusq; granatorum. Serapion
 dit Cardamomum maius minore minus esse acre, & maiore adstringendi
 dirum, præcipue cortices & folliculos. Calidum siccumque esse primum
 resoluet, ventriculum roborare, concoctionem iuuare, valere ad syncopas
 vomitus maximè cum suo cortice & folliculis, cum mastiche, ligno Aloë
 Mentha & vino granatorum. Minus eodem gradu calidum, & iisdem
 præditum, sed subtiliorum partium: quare concoctionem magis iuuare,
 ris, pectoris & ventriculi superuacuos humores magis exsiccare. Græcorum
 Lib. 1. c. 6. rò Cardamomum, auctore Dioscoride, calfaciendi vim habet. Potum
 facit ad comitiales, ischiadicos, tussis, neruorum resolutionem. Item ad
 vultu: latas ventris tineas excutit. Ex vino autem potum renibus, diffi-
 nax, à scorpiione ictis, neque non omnibus venenum vibrantibus auxilio est. De
 cortice radicis Lauri epota drachma calculos comminuit: partus sustinuit
 Lib. 7. sim. scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad vnguentorum spissamenta additur
 nus, Cardamomum, inquit, est facultatis admodum calidæ, non tamen vsque ad
 vt Nasturtium, sed quantò suauius, magisque fragrans est Nasturtio, tanto & im-
 becillius ei calida facultas inest: nec enim vlcerare idoneum est, vel ipsum
 se illitum. Porro adiunctum habet quiddam etiam amaritudinis, quia
 interficet, & cum aceto valenter pfortas deterget. Apud Indos solo eo autem
 tele mixto ad oris fetorem, pituitam purgandam, & stomachum roborandum
 ximopete commendatur.

CUBEBAE. CAP. XXXIX.

ACTVARIVS *κουβίβαι* fructus vocat, quos nos Cubebas, Arabes Medici *Cubebe* & *Quabebe*, vulgus *Quabebechini*, in laoa vbi frequens nascitur *Cumuc*, reliqui Indi præterquam in Malayo *Cubabchini*. Non est autem nomen huic fructui inditum quod in China nascatur, quia ex Cunda & laoa, vbi plurimus est, in Chinam perferatur, sed quia Chineses qui Oceanum Indicum nauigabant, hunc fructum, quem in supradictis insulis emersant cum aliis mercibus, in alios maris Indici portus & emporia transfuebant. Silvestris est planta & sponte nascens, neque multorum generum, vt quidam putauerunt, Malo vulgari similis, minor tamen, foliis Piperis, sed angustioribus, per arboreas Hederae, aut verius Piperis modo repens, non Myrti effigie, neque foliis Myrto similibus. Fructus racematum cohaeret, non vt in vua coaceruatus, sed singulis grans ex singulis pediculis pendentibus. Flos est odoratus. Piperis generis non est, quoniam plurimum Piperis ex Cunda aduehitur, quod nihil differt à Maluarico, hic vero fructus minima quantitate istic nascitur, qui cum ipsa planta diuersi generis est. Cubebarum rarior vsus est in Europa, nisi in medicamentorum compositionibus: apud Indos vero frequens est earum in vino macerata, vbi vsus ad excitandam venerem, tum etiam in laoa ad exaltaciendum ventriculum. Tanto autem in pretio est hic fructus ut in locis in quibus nascitur, vt cum incolae desinunt, anequàm efferti sinant, veriti ne alibi locus nascatur. Hinc fortasse fit, vt corruptioni magis sit obnoxius in Europa. Id quod à Lusitanis fide dignis se accepisse ait Garcias, qui longo tempore in laoa insula habitauerant. Multi Auicennae, Serapionis, Actuarii auctoritate nixi, Cubebas legitimum Galeni Carpesium esse censuerunt. Etenim Auicenna de Cubebis scribens, ea omnia ferè exscripsit quae à Galeno de Carpesio dicuntur. Serapio Myrtum siluestrem siue Ruscum Dioscoridis, & Galeni Carpesium eodem Cubebae nomine, eodemque capite descripsit. Actuarius Mauritanorum nomina secutus in quibusdam medicamentis Carpesium miscet, quod Barbaris *κουβίβαι* vocant. At illorum Cubebae vulgaribus & Officinarum nostrarum Cubebis permultum differunt: neque enim is Rusci historia conuenit, neque fructus cum sine Galeni Carpesium dici possunt, de quo scribit, *λεπτά δὲ ἔστι τὰ καί φθ, παραπλήσια τοῖς ἀρίμοις τῷ χιναρόντι*, id est, tenuia esse sarmenta, Cinamomi virgultus similia. Et alibi, Carpesium simile esse Phu, non gustu tantum, sed & facultate. Nec minùs errarunt qui Cubebas Viticis semè esse asseruerunt, cum vtriusque historia & facultates plurimum dissideant. Cubebae nostrae cum odoratae sint, & præter odoris gratiam gustu actimoniam & amaroris tantillum relinquant, dicere possumus eas exaltacere initio tertij ordinis, & in fine eiusdem exsiccare. Quare languentem ex pituita ventriculum, vel ex flatibus roborare, pectus à lentis crassisque humoribus expurgare, lienem iuuare, flatus discutere, & frigidis vteri malis auxiliari. Diu cum mastiche mansuetam à capite trahunt, & cerebrum roborant.

AMOMVM. CAP. XL.

RAECIS *ἀμόμον*, Latinis etiam Amomum dicitur, Arabibus *Flamensis* siue *Hamana*. De hoc breuiter sic Dioscorides. Amomum parvus est frutex, ex ligno sese conuoluens in racemi modum: florem habet paruum ceu Violæ albæ. Folia Bryoniz similia sunt. Id in Armenia, Media, & Ponto nasci innuit Dioscorides, cum dicit. Optimum Armeniacum aureo

Nomina

Forma

Vsu.

Cubebae
non sunt
Carpesii.
L. 2. c. 44.
Lib. 7. 6m.

Temper.
V. 1. 1.

Nomina
Lib. 1. c. 4.

Forma.


Locus.

aureo colore, ligno subtufo, valde odorato. Medicum, quia in campestribus & aquis nascitur, infirmus est. Magnum autem & subuiride est, tactu tenerum, frutice vinoso, odore Origani (*ὀρεγανίζον* expresserunt vetus interpres & Hermolaus. Codices vulgatiore habent *ορυγανίζον*, odore Rutæ:) Ponticum vero subrufum, paruum, fragile, racemosum, fructu plenum, & odore nares feriens. Adulteratur herba simili, quæ Amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia flore Origani. Plinius de eodē hæc tradit. Amomi vna in vfu est, Indica Vite Labrusca (rectius fortasse ex Indica Vite) vt alij existimauere, frutice myrti-
Lib. 1. c. 3. broso Diofcorides) palmi altitudine, carpiturque cum radice, manipulari leuiter componitur protinus si agile. Laudatur quam maxime Punici mali tomentum, nec rugosis, colore rufo. Secunda bonitas pallido. Herbaceum peris, pellum candidum, quod & vetustate euenit. Pretium vix in libras x. x. fructu vix in mo. x. l. viii. Nascitur & in Armeniæ parte, quæ vocatur Orene, & in Media, & in Ponto. Adulteratur foliis Punicis, & gummi liquido, vt cohzteat, omnisque sese in vix modum. Est & quæ vocatur Amomis, minus venosa, & acrior, ac minus odorata: quo apparet aut aliud esse, aut colligi immaturum. Hoc quod Diofcorides Amomum Plinius intellexisse videtur, cum Indicā Labruscā esse ait, cui folia Vitæ albæ tribuit, atque eosdem natales Theophrastus, cum mun, inquit, atque Amomum, alij ex Media, alij ex India cum Nardo & alijs aut plurimis aduehi narrant. Sed de Amomo magna est inter auctores confusio. Alij verò Amomo nos carere existimant, eiq; ex Galeni præcepto Amomum substituunt. Alij Hierichuntinam rosam Amomum esse comperisse, non sine errore, quod folia Bryoniæ non habeat, nec odorata sit adeo, vt nardum, cuiusque Origanum resipiat, sicuti Amomū. Quidam, inquit Martialis, ex Apulæ monte pumilum quoddam semen deferunt, colore nigro, odore volatili, paululum aromaticum, gustu acre, quod pro legitimo Amomo venditur. Diofcorides seminis Amomi non meminit, sed Amomum racemosum, et ligno se conuoluens in racemi modum dixit. Quare nos vero Amomum racemosius riores censuerunt. Garcias historici Amomum Indicum auctores, de Amomo scribere narrant percontatum aliquando à quodam phar-maco Hispano, sed religione Iudæo, qui Hierichuntinam habitabat, quid esset Amomum. Eum respondisse Hebræica lingua *Hamama* nuncupari, quod pedem columbinum significat, stirpem hanc nouisse, quam tamen apud Indos non vidisset. Postea se euocatum à Nizamoxa Rege in Decam potentissimo, Moscos eruditos tum Persas, tum Turcas, quos singulis magnis stipendiis domi alebat, interrogasse, si Amomum haberent, dixisse illos istic quidem non nasci, sed inter alia aromata quæ ad Regem ex Asia Persia, & Atabia conficiendis alepharmacis deferrentur, Amomum etiā aduehi: cuiusque plantulis se ab eis donatum, id cum Diofcoridis descriptione contulisse, & venustissimè quadrasse, ac licet in siccum, pedem columbinum representasse. Sed figuram nec prolixiore oratione, nec pictura Garcias expressit. Eius verò Scholiastes nobis vix depicta est exhibuit, ad Valerandum Doræum dī-pictam & eruditum pharmacopœum Amomum: *Amomum*

AMOMVM & Amomu.



Amomum.



Amomum.

Amomidis nomine ex Ormuz celebri sinus Arabici emporio missa. Neutram tamen cum Plinij & Dioscoridis Amomo conuenire ille purat, nisi id forte sit quo se Garcias donatum, quodque pedem columbinum referre alij. Nam hæc fragmenta, aliquot sunt ramuli, foliis quibusdam adeo frequentibus onusti, vt ex folijs folijs constare videatur (veluti in Titbymalo paralyo videre licet) quæ in extremo ita sunt disposita, vt flosculum aut rosulam efforment. Ramuli isti simul compacti non ineptè pedem columbinum (qualis columbarum est, quæ pedes, vt ita dicam, plumatos habent) referre videntur, nullo tamen singulari odore aut sapore præditi sunt. Cæterum cum auctor hic pedem columbinum memorat, atque etiam Serapio, minimè intelligunt id Geranij genus, quod Herbarij Pedem columbinum vocant, sed Amomum ipsum, vt ex Serapionis descriptione perspicere licet. Quare ineptissimè faciunt, neque ex Serapionis aut aliorum Arabum auctoritate, qui Pedè columbinum vulgarem Herbariorum, Amomo substituunt. Huius vires Dioscorides his ferè verbis explicat. Vim habet calfaciendi, adstringendi, exsiccandi. Somnum allicit, & illirum fronti dolorem sedat. Inflammationes & melicidas concoquit & discutit. Iuuat quos scorpius percussit ex ocimo illieum: podagricis confert: inflammationes oculorum viscerumque lenit ex vua passa: ad vuluarum vitia in pessis aut in scisionibus vtile est. Decoctum iocinorosis, nephriticis, podagricis potu conuenit. Antidotis miscetur, & preciosissimis vnguentis. Amomum, inquit Galenus. Acoro similem facultatem obinet, nisi quod Acorum siccius sit, maiore autem concoquendi facultate Amomum.

Cap. 169. simpl.

Lib. c. 14.

Lib. 6. simi.

ASPALATHVS. CAP. XLI.



ΣΠΑΛΑΘΟΣ Græcis & ἰπποκρίστη, Aspalathus Latinis dicitur & Erylisceptrum, Arabibus Darshichahun. Aspalathus, vt describit Dioscorides, frutex est lignosus, multis spinis horrens. Nasitur in Istro, Nisyro, Syria & Rhodo, quo ad vnguentorum spissamenta vnguentarij vtuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubescens, aut purpurascens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est alterum genus candidum, lignolum, inodorum, quod deterius habetur. Plinius non eadem omnino tradit. In eodem tractu Aspalathus nascitur spina candida (& lignosa, Dioscorides) magnitudine arboris modicæ (Dioscoridi frutex est) flore rosæ (id prorsus omisit Dioscorides.) Radix vnguentis expetitur (lignum Dioscor.) Tradunt in quocunque frutice curuetur arcus cælestis, eandem quæ sit Aspalatho suauitatem odoris exillere, sed in Aspalatho inenarrabilem quandam. Quidam eum Erylisceptrum vocant, alij sceptrum. Probatio eius in colore rufo, vel igneo, tactuq; spisso (rubescente vel purpurascente Dioscor. tactuque denso & graui) & odore castorei. Dioscorides insulas habet, id est, odore iucundo. Idem alibi oscitanter Orientalè alium à Rhodio facit, his verbis. Per Hispanias quidem multi & inter odores, & ad vnguenta vtuntur illa (melius, alia) Aspalathu vocantes. Est sine dubio hoc nomine spina siluestris in Oriente, vt diximus, candida, magnitudine arboris iustæ. Sed & frutex humilior, atque spinosus in Nisyro, & Rhodiorum insulis (legendum ex Dioscoride in Nisyro, Istro, & Rhodiorum insula) quæ alij Erylisceptru, alij Adiphartheon, siue Diptacon, siue Diacheton vocant (fortè melius Adiptacon, quoniam locis siccioribus gaudet, & Diareton, id est, eximia magnificæq; virtutis.) Optimus qui minimè ferulaceus (grauis & densus Diosco.) rubens, & in purpuram vergens detracto cortice. Nasitur pluribus locis, sed non vbiq; odoratus. Auicenna etiam à Dioscoride dissentit, cum ait Aspalathum arborem esse crassam, quæ spinas grandes habet, qua vnguentarij ad vnguentorum spissamenta vtuntur. Aspalathu quidam Santalum rubru esse crediderunt. Sed eos falli constat tum ex iis quæ de Santalo

Nemina

Lib. i. c. 9.

Forma.

Locu.

Electie

Lib. i. c. 11.

Lib. 24. c. 17

diximus, tum ex multorum qui ad Orientales Indias aliasq; Novi orbis terras nauigantur scriptis, qui omnes vno consensu affirmant se cōtinuas Santalorum retorum & procerorum siluas uidisse. Aspalathus verò humilis est frutex, suauiter odoratus, amaricante gustu. Quæ uox Santalo non cōueniunt, neque enim odoratum est, nisi odorem ex albo pallidoque & aliis aromatis, quibus permixtum fuerit, contraxerit, qui breui euanescit, neq; amarum est. Alij pro vero Aspalatho id usurparūt quod Rhodium Oleastrum appellant, quo olim pharmacopœi Aspalathi vice utebantur: cuius materies cum partim nigra sit, partim ex nigro flauoque venosa, neque rubra, neq; subrubra, præterea cum ex Olearum sit genere, ut Rhodij narrant, in Rhodo insula frequens, & oliuas ferat, cum etiam nullis spinis armata sit, neque detracto cortice rubescat, Aspalathus dici nullo modo potest. Ac, ut verum faciamur, Officinis olim omnibus hodie quoque permixtus incoctus fuit geminus Aspalathus. Verum recentiorum diligenti peruestigatione factum est, inquit Pena, ut tres lignorum differentie nobis immoerint, quarum quælibet Aspalathi nomine digna sit. Primam uidisse se ait Veronæ, & dono accepisse a doctis pharmacopœis Francisco Calceolario & Andrea Bellicoco, qui eam cum suis miscuit & doctorum Medicorum Veronensium consilio, frustum quod habuit, densum, solidum & compactum esse, quasi ex cuiusdam fructus parte resectum, radiis fibris, graue, colore buxæ, sed saturatiore, suauissimum re & pertinaci, sapore non ita amaro, nec gustu insuauis. Altera speciem uarias aduectam Rhodo, missam Nicolao Comasco erudito Medico, apud eum maximum truncum uidisse, detracto cortice rubentem, Taxo concoloris odore adeò fragrantem, ut quàm latè parebat cœnaculum, eximio infundere. Terciam albicantem foris, intus torulo subflauo, aut citreo, Santali albae & simillimam Rosam sapore nullam gustanti exhibere manifestam qualitatem tantillum calidi, quod vix gustu discerni possit. Hanc alij Aspalathi speciem Oleastri Rhodij aut Santali arbitrantur. Aspalathi vires hæc sunt ex Dioscoridis Vim calfaciendi habet cum adstrictione. Vnde decoctum cum vino ad retrahenda vlcera colluenda conuenit, ad nomas genitalium, & sordida narium vlcerum dicitur, subditum in pello partum extrahit, aluum sistit eius decoctum, & reiectionem potu cohibet: urinæ difficultatem inflationesque discutit. Partem ferè tradit. Sanat ietra oris vlcera & ozænas, genitalia exulcerata aut calantia (vlcera sordida & depascētia genitalium, Diosco.) item rhagadas: omnes potu discutit, & strangurias cortex. Sanguinem reddentibus medetur domus eius. Aluum sistit cortex. Dilucidius verò Galenus hæc declarat. Aspalathus quidem acris simul & adstringens est, facultate verò ex dissimilibus constat, nempe partibus suis acerbis excalfaciens, partibus vero aliis, austeris scilicet, refrigerans. Quare vtriusque ratione desiccatur, atque hac ratione aduersus potum fluxiones est utilis. Auicenna calidum esse in primo gradu, siccum in primo, usque ad tertium scribit. Cætera ex Galeno & Dioscoride transcripsit.

Aspalathi
genera.

Lib. 1. c. 19.

Temper.

¶ Vir.

Lib. 6. sim.

COSTVS.

CAP. XLII.

Nomina
Lib. 1. cap.



ὈΣΤΟΣ Græcis dicitur, Latinis Costus, Arabibus *Coffas* sine Chyl. Dioscorides eius genera & delectum declarat omiſſa deſcriptione Præcellit, inquit, Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris suauitatis. Secundum locum sibi vendicat Indicus, plenus, & niger, & Indicus. Tercius est Syriacus, grauis, colore buxæ, & odore feruens. Optimus Indicus, albus, abunde plenus, densus, aridus, a teredinibus non exesus, sine macula, gustu calidus ac mordens. De eodem Plinius hæc breuius scribit. Radix & l.

Lib. 12. c. 43.

(lege, radix Costi & folium) Indis est maximo pretio. Radix gustu feruens, odore eximio, frutice aliàs inutili. Primo statim introitu amnis Indi in Patale insula duo sunt eius genera, nigrum, & quod melius, candidum. Antecanz species sunt tres. Arabicus est, inquit, alius, levis, aromaticus. Alter est Indus, qui est magis levis. Tertius est amarus, grauis odoris, qui nominatur garyophyllata. In quo à Dioscoride dissentit, scribente tertium esse Syriacum, grauem, colore buxco, & odore feruentem. Serapio de Costo omnia ex Dioscoride & Galeno exscripsit. Officinæ Arabes secutz Costum fecere duplicem, dulciem & amarum. Dioscorides tamen & Plinius neque dulcis, neque amari mentionem ullam fecerunt. Galeno vero omnis Costus amarus est, & ex Græcis quæ Costum quendam dulcem esse dicat, reperies neminem, nisi si ex recentioribus sint, qui Arabas hac in re & permultis aliis sint imitati, in quibus est Actuarius, qui dulcis Costi meminit. Hos tamen Pena excusat, quòd Costus dulcis collatione quadam cum acriore & amariore vocetur, ut eadem plantæ radix cum recentior est, mitior multo, vetustior vero amarore & feruore ingratiior facta, amara, aut inamæna dicatur. Aliam huius diuisionis causam ex Garcia in sequentibus proferemus. Vt sit, Officinarum Costus adulterinus est: neque enim vlla est odoris suauitate, neque gustu mordens & feruidus, neque ita acris & calidus, ut etiam exulceret, ut ait Galenus, sed fusca radix, grauis, inodora, Helenij compa-cto concretionem ignora. Quamobrem sunt qui Zedoariam legitimum Costum esse contendunt. At hæc minus odora, minus aromatica est, gustuque grata. Alij Angelicam nigrum Costum sine Indicum faciunt, propter odorem suauem & insignes vires. Sed non est peregrina planta, imò Europæ familiarissima, nihil adstrictionis habens, neque exulcerans. Arabici Costi radices omnibus ad- stipulantibus notis se habere Matthiolus ait, à Francisco Calceolario pharmaco-pero Veronenfi ad se missas, Indici verò frustum à Cecchino Martinello mis- sum, quod secum ex India detulerat, quæ cum forma tum substantia differunt:

Lib. 1. c. 10.

Cap. 108. simpl.

In cap. 15. lib. 1.

Lib. 1. Aro. Ind. cap. 10.

Nomencl.

Cap. 108. simpl.

Costus genus vnum

COSTVS Indicu.



quin tamen Costi genera sint non dubitat, cum ex Dioscoride Arabicus ab Indico non pa- rum differat, hic quoque à Syriaco. Arabi- cum tamen alteri præfert. Garcias Costi hi- storiam paulò aliter descripsit. Costus, inquit, Arabibus dicitur *Cost*, aut *Cast*, in Guzarate *Uplot*, in Malaca, vbi eius plurimus est vsus, *Pacho*, & inde vehitur in Chinæ regionem. Græci & Latini ab Arabibus nomen mutuati sunt: nam in Serapione & aliis *Chost* & *Chast* corruptum est, legendumque *Cost*, *Cast* & *Costi*. Huius etsi tria genera veteres consti- tuant, ut diximus, tamen Garcias vnicum duntaxat Costi genus esse tradit, atque se à negotiatoribus perquisiuisse Arabibus, Persi- cis & Turcis, vbinam tanta Costi copia consu- meretur, quæ apud eos ex India exportaretur. Respōdissè maximam partem in Asia minori & Syria consumi, atque etiam apud Arabas & Per- sas. Rursus interrogatos an aliis quispiam Co- stus apud eos nasceretur, id negassè. Idem per- contactum fuisse à Nizamabuci Medicis, sed ne-

gasse se Costumatum vidisse vnquam, quam qui ex India ad eos delectum
 Quod autem tam diuersa nomina sortitus sit, in causa est: negatur
 tar, qui ex variis regionibus oriundi erant. Quid autem Arabes eius di-
 nera faciant, amarum & dulce, id euenit, quod istud medicamentum
 recens est, & incorruptum, nullius amaritudinis sit particeps, candidum
 persistit: cum autem vetustate corrumpi incipit, amaritudinem contrahit,
 nigricans. Describunt autem Costum qui videntur Sambuci effigie, & Ar-
 buti aut Azimbri magnitudine, (Quid sit Azimbri nescio. Clusius Lape-
 rum suspicatur intelligi, quod Zimbri Lusitanis sit luniperus) florem odorem
 ferens. Præcellit qui intus candidus est, cortice cinereo. Inuenitur enim o-
 lore Buxi, cortice pallecente. Tanta odoris fragrantia pollet, ut plerique
 nares feriat, & dolorem capitis excitet, gustu nec amaro, nec dulci
 iam senescens interdum amarescat: nam recens acri gustu est, ut reliqua ar-
 mara. Nascitur circa Guzarate, inter Bengala, Delli & Cambaya, in An-
 don & Chitor. Inde multi currus Vplot, Spica, Chrysocolla, alique
 bus onusti aduehuntur in Regni metropolim Amadabar, quæ in deorsum
 & in Cambayete urbem non procul à mari: vnde postea per Indiam in Arabiam
 quam Africæ partem, & vniuersam Europam diffunditur. Hic vniuersis
 multis medicamentis Indici Medici. Nec mirum si eius loco veniat ad-
 rino Officinæ procul à Lusitania disitæ, quoniam exigua admodum
 in Lusitaniam deferitur. Sed hic obseruandum est, quod & annotant
 veterum Costum radicem fuisse, non lignum. Plinius enim radicem
 appellauit. Dioscorides cum Helenij Comageni radicibus adulterari
 dicem esse inuit: nam trunci aut rami lignum tantam non habent
 ce affinitatem, ut radice adulterari possit. At Garciz Costus, ut
 indicare videtur, nihil aliud fere quàm lignum est, suo cortice continens
 Lib. 1. c. 22. certè minimum corticis habet. Er de Pipere scribens Costum radicem
 sed lignum asserit. Quare aut veterum Costum non describit, aut Ar-
 Costus (si is quem describit illorum Costus est) à Græcorum veterum
 diuersus videtur. Costi genus Antuerpiam è Lusitania adfertur, ut & ad
 Clusius, solidum, cortice cinereo, intus candicans, interdum cinereo
 Odorata est admodum radix, violaceum seu irinum spirans odorem, pas-
 dum manditur. Ei caulis fragmentum, quod è terra extat, sæpe intus
 spicitur, ferulaceum quiddam referens, & fungosam medullam continens,
 perspicuum sit Costo Garciz belle conusum.

COSTVS Syriacus,

& Arabicus.



Eius iconem ex Clusio, qualis ex sicca terra
 exprimi potuit, hic appinximus. Paucis ab
 annis è Syria & Aegypto Venetias aduehitur
 radix Zedoariæ aut Zingiberis effigie, quæ
 lerandus Dourzus materiæ medicæ positor
 verum Costum esse iudicauit. Radix est inae-
 dida, inquit Pena, leuis, minimè graui, per
 crassa, vnciam & sesquiunciam longa, hinc
 tuberibus oblongis altrinsecus donata, odore
 stu acri, odore intenso & iucundo Cupressi, ut
 Cedri Libani quadantenus. Interdum bursa ve-
 tur, uti vulgata odore & sapore similis, sicut
 vtraque, cætera similes. Initio nomine Zin-
 ris siluestris vendebant. Hæc radix si ge-

Costus non est, inquit Pena, tamen quia radix est, & eximia odori saporisque acis gratia aromaticam pollet, parem Costo laudem & gratiam merito adeptam est. Pictam ex Pena hęc exhibemus. Idem Pena duas alias adices Costum admodum similes depinxit a Rupellesi Medico Launaio donatas, quas

COSTVS Moluccensis
corticifus.



ille a naucleris ē Moluccis redeuntibus acceperat. Horum altera maior arboris masculula cortex videtur, & figura Sambuci adultioris & cineracei, rugis & plicis frequens, sapore & odore æquē vehementi. Altera minor radice Solani siluestris valde simili, colore pullo diluto, gustu vrente, ut vix ardorem lingua ferre queat. Illis persuasum erat Costi speciem esse, etsi parum odora esset.

Quod ut non inficiatur Pena, ita priorem ut portiore retinet, & hasce ambas Moluccenses minus odoras iudicio studiosorum sic pictas subdidit. Costo vis exaltativa, aucto *Vires & Temper.* re Dioscoride. Vrinam ciet, menses pellit, *Liaca.*

vulvæ morbis tam inpositu quam soto & suffitu auxiliatur. Contra viperarum morsus vncias duas bibere prodest: item adversus pectoris dolores, conuulsa, inflationēque ex vino & Absinthio. Venerem ex multo stimular, latus ventris tinea pellit ex aqua: horroribus ex oleo ante febrium accessiones, & neruorum resolutionibus oblinitur: vitia cutis in facie cum aqua vel melle illitus emendat. Additur in antidota & malagmata. De eo sic Galenus. Costus leuiculam planè amaram, plurimam autem acrem, & calidam in se qualitatem, simul & facultatem continet, adeo ut etiam exulceret. Vnde ipso cum oleo perfricant corpus ante accessiones in rigoribus per circuitus redeuntibus. Sic verò etiam in resolutis & ischiadicis, atque in lumina in quibus ex-calfacere partem quamvis, aut ex alto in superficiem attrahere aliquem humorem opus est, ad Costum confugitur. Eadem de causa vrinam mentisque prouocat: & ad rupta, conuulsa, ac laterum dolores convenit. Porro ob amaritudinem quæ illi inest, lumbricos latos enecat. Ob eandem & ad contractas velut à Sole maculas cum aqua aut melle vsurpant. Inest item staturosa illi humiditas, per quam & venerem excitat cum vino mulso. *Lib. 7. sim.*

Nomina
Cap. 792.
simpl.

Forma.

Locus.

Temper.

Uires.

Lib. 734.

Cap. 743.

Cap. 736.

Cap. 762.

simpl.

Lib. 743.

QUAE Officinis Zedoaria, Græcis recentioribus *ῥαδιόρα* dicitur, iudem Officinis Zurumbet & Zerumbet. Quæ dux radices peregrinæ, ex facultatibus potius quàm ex ipsarum plantarum partibus notæ, Græcis veteribus incognitæ fuerunt. Quare ex aliis petendæ descriptiones. Serapio de iis sic scribit ex auctoritate Isaac. Zurumbet, id est, Zedoaria, sunt radices rotundæ, similes radicibus Aristolochiæ rotundæ tum facie, tum magnitudine, verum sapore & colore Zingiber æmulantur. Deseruntur ex Chinarum regione. Excalcificat & siccæ ordine secundo. Flatus discutit, & propria quadam facultate impinguat. Pòst sumpta graue virus animæ, quod aluum, cepa, vel vinum excitauerit, abigit. Venenatorum animalium moribus confert, aluum sistit, vteri abscessus resoluit, vomitiones reprimat, coli dolores a flatibus totos mulcet. Auicenna Zedoariam dixit esse portiones similes Aristolochiæ, minus tamen. Addit meliorem esse illam quæ cum Napello crescit, eiusque viuitate Napelli vires plurimum debilitari. Aliquantò pòst Zeduar siue Algeduar Zedoariam esse opinatur. Alio capite Zurumbet ait esse lignum simile Cypero, sed maius, & minus odoratum, eisdemque eius vires recenset, quas Serapio ex diuersis auctoribus suo Zurumbet, id est, Zedoariæ assignare diximus. Hoc tantum distat, quòd Auicenna Zurumbet calidum & siccum esse ordine tertio ponit, Aben Mesue apud Serapionem calidum & siccum secundo duntaxat. Hæc conferre moribus venenatorum, ille valde conferre moribus venenatorum videtur, ira ut ad Zedoariam proximè accedat. Quibus verbis innuit aliquid esse inter Zurumbet & Zedoariam discriminis. Serapio alio capite Zurumbet aliud describit hisce planè verbis. Zurumbet est ex speciebus odoriferis, & propter hoc admiscetur confectioibus aromaticis, & est calidum & siccum ptope tertium gradum, & est in virtute sua simile Cassiæ lignæ & Cubebis. Et dixit Cassidonium. Si non habes Cinnamomum, pone pro eo Zurumbet. Hæc se ex Galieno & Paulo transulisse ait, ne detracta quidem aut addita vna litera, quibus ut falsò Galenum citat, ita Pauli orationem, qua de Arnabone agit, verbum conuertit. Sic enim ille. Arnabo ex aromaticis est, vnde maxime in vnguenta miscetur, ut quòd calidæ ac siccæ sit facultatis in tertio ordine Cassiæ aut Carpesio similis. Vnde etiam Possidonium (perperam in Serapione Cassidonium legitur pro Possidonium) Cinnamomo nò præsentem, hoc vsum se dicit. Perspicuè videre licet Serapionem Zurumbet cum Pauli Arnabone eisdem statuere. His subiungit descriptionem Zurumbet auctore Isaac. Est arbor magna quæ nascitur in montibus, in Oriente, nullum ferens fructum, folia vero longa in viridi cirrina, foliis Salicis similia, ramos eiusdem coloris: odore est Citri, calida & sicca, adstringens. Resoluit & aluum sistit. Inest & ei partium facilitas. Ex quibus perspicere licet Serapioni Zurumbet & Zedoariam easdem esse radices, nisi deprauata sint eius exemplaria, item aliud Zerumbet arborem: Auicennæ verò diuersas esse plantas, ut qui Zedoariam radices Aristolochiæ radicibus cõparat, Zerumbet lignum Cypero nisi hic sit interpretum error, qui Zurumbet Aristolochiæ radicibus, Zedoariam Cypero cõparasse debuissent, præsertim cum ei quæ Cypero similis est, easdem prorsus tribuerit vires quas Serapio Zedoariæ, ut ostendimus. Quod & indicat Bellunensis, cum scribit. Zedoaria apud Arabes quosdam appellatur Cyperi Indi, quia nascitur in India, & aliis datur Cyperi. Hæc Arabes de Zedoaria & Zerumbet literis mandarunt. Ex quibus expedere oportet, an dux radices, quæ in Officinis Zedoariæ & Zerumbet nomine ve-

nunt, ex sint quibus vsi sunt Arabes. Qui dubitat, imprimis descriptionē competere negant, quod nostra vulgaris radix sit oblonga, lævis, foris candicans, intus ex flavo rufescens, aromatica, amara, figura Zingiberis, valde acris. Matthiolus radicem hanc ob id non esse Zedoariam non censet, quod longa sit: esse enim quas-

In cap. 14.
lib. 2.

ZERUMBET Serapionis, & Zedoaria eiusdem radices partes.



dam radices longas, alias rotundas Aristolochia: similes, quales à Calzolario pharmacopœo Veronensi se accepisse narrat, quæ Zedoaria nomine comprehenduntur, quod eiusdem sint saporis, coloris, & odoris, nec nisi forma differat, ut quemadmodum Aristolochia: ita Zedoaria: duo sint genera, alterum longum, alterum rotundum. Pena & Lobellius hac de re ita statuunt. Zedoariam & Zerumbet ut nominis, sic eiusdem radice partes esse, nec secus inuicem differre, quam Cyperum rotundum vel longum à suis coherentibus radicibus cuiusmodi videndi & habendi copia fuit Antuerpiæ in Myropolio simplicium dilectissimo Francisci Pennini. Eoque Serapionem Zedoariam eandem cum Zurubet dixisse, ut quemadmodum Doronicis, Aristolochiis & Oenanthis euenit, variam nancisci radice molem, alias oblongam, teretem, alias orbiculatam & nodosam, sic euenisse Zedoaria: cuius natura, sicut & nominis particeps est Zerumbet, quia amator, feruor, odor, color, ingratus vehementior gustus, modus, durities, duratio eadem, & vsus ad colicos cruciatus, præsertim aduersus venena certissimus. Vnde Zedoaria: nomē fluxisse ingeniose cōiectatur Pena. Indeque videntur Auicenna, Serapio, ac Arabes nonnulli designasse antidota multa, ampliore, ut solent, nominis Zedoaria: ambitu, ut quemadmodum Bezzardica generatim vocarunt quæ vitam tuentur, ita celebrem quandam arborem foliis lignis, odore Citri, eodē Zedoaria: aut Zerumbet nomine donarint. Eo etiam significatu Auicenna dixisse meliorem esse Zedoariam, quasi dicat

Lib. 6734.

Antidotum, quæ radicibus Napelli adnascitur, eiusque & aliorum venenorum esse Theriacam, qualem se expertum fuisse ait, & copiosam eruisse in variis montibus, quod fabulosum esse Garcias dixit. Ergo triplicem Zedoariam Arabes innuere voluisse Pena existimat, oblongam vulgatiorem ad Cyperum propius accedentē, & huius speciem Zerumbet rariorem nobis rotundam dētam, tertiam egregiam illam arborem, hodie incognitam. Non desunt qui Zedoariam Officinarum Costum Arabicum, vel Syriacum Dioscoridis esse opinentur, quod multæ ei Costi notæ satis quadrare videantur. Diuersi prorsus Zedoariam nobis enarrat Garcias, quam Geiduar vocat Auicenna, magnitudine glandis, eiusdem ferè formæ, colore sublucido. In regionibus Chinesium provinciarum finitimis nascitur. Ait magno emi, nec facile inueniri, nisi apud circūforaneos quosdam & circulatores, qui peregrinationibus, & stipem emendicando vitam sustinent. Ab his (quod mirum videri debet) Reges & magnates Geiduar emere. Hoc Dioscoridi incognitum fuisse, atque etiam Auicennæ. Porro ad plurima vile esse, præsertim aduersus venena, & venenatorum animalium ictus morsusque. Id Europæ quoque hodie ignotum esse ex descriptione liquet, nec facile cognosci posse ob has quas adfert causas. Nam

Lib. Arom.
Indic. 643.

Lib. Arom.
Ind. ca. 44.

Lib. 1. Art.
Iod. ca. 44.

Zedoaria nostra nihil minus est quam hoc Geiduar. De Zerubet verò hæc tradit Arabibus, Persis, & Turcis *Zemba* vocari, in Guzarate, Decan, & Canata, *Cachora*, in Malauar *Cue*. Copiose prouenit in Malauar prouincia, videlicet in Calcut & Cananor, tum sira, tum sponte in siluosis earūd. in regionum locis, vnde a multis Zingibet siluestre dicitur, nec id sine ratione, inquit, quoniam eius folia Zingiberis foliis similia sunt, maiora ramen, & magis aperta, radix Zingibere maior. Radicem erutam air conceidi & sicari, deinde in Arabiam, Persiamq; deferri, in Gida & Alexandriam, inde postea Venetias, & alias regiones transferri. Conditum etiam saccharo, & præstantiorem esse Zingibere candido. Ex quibus ille *Comar* Auicennæ ignotam fuisse Zedoariam, vti iam diximus, solam vero Zerumbam & Zerumbet cognitum. Cum enim vidisset radices quasdam in frustra rotunda, alias in oblonga sectas ad sinum Persicum vehi, duo genera existimasse, Zerumbam, de quo nomine Zedoariæ prius tractat, & Zerumbet, de quo postea. Hæc de foliis quæ non viderat prætermisisse, radices quales ex India in alias regiones deferbantur duarum expressisse. Serapionis verò emendatos codices scripsisse, & expositionem Zerumbet, id est Zedoaria, non habere, sed ab interprete adiectam, qui differentiam inter Zedoariam & Zerumbam, siue Zerumbet ignorabat. Sed ex eo perspicue deprehendi air, quod Zedoariam ex Chinorum regione conueniat dicat Serapio. Certum enim esse Zedoariam in Chinorum regione nasci, & in India reperiri: Zerumbam autem copiose in India nasci. Sed quid Zedoaria & Zerumbet sentiendum sit, item de Garciaz Zedoaria iam Finis habemus. Reprehendit etiam eos Garciaz, qui Pauli Arnabonem eundem esse cum Zerumbet opinantur: quia Arnabo Pauli acrius procera, suauis odore fragrans. Zerumbam graminea planta. Quam in se ipsemet reprehendens est, cum apud Paulum de Arnabo scribentem nulla arboris mentio fiat, ac nonnullis quidem, sed ex aromaticis esse, ideo in conguento addi, & cætera quæ supra posuimus. Annotat Clusius inueniri Antiochie quosdam aromatariorum Zedoariæ genus, *Blozzumar*, quod tuberosam Zedoariam significat, nuncupatum, rotundum instar Aristolochiæ rotundæ, foris nigricans, interdum rei coloris, intus candicans, gustu vulgaris Zedoariæ. Eam radicem quoniam multum curauimus.

ZERUMBET Serapionis, Clusio.

Lib. 7. ca. 3.



Serapionis Zerumbet conuenit Clusio videtur, hic exprimendam ex eodem curauimus.

TERRA MERITA. CAP. XLIII.

Nomina
Lib. 1. ca. 4.

PERGRINA hæc radix, Curcuma Officinis dicta, Gallis *Terra Merita*, Cyperus Indicus Dioscoridis esse creditur. Sic enim ille. Aliud Cyperi genus tradunt in India nasci Zingiberis effigie, quod manducatum Croci vim reddit, gustu amaro sentitur, & illatum præstare Plinij vim exhibet. Quæ omnes notæ Curcumæ Officinarum aptissime conueniunt. Est enim radix Zingiberis effigie, crocei intus coloris, quæ in Macedonia croceum colorem reddit, amara, cuius & in psilothris usus est. Sed cum Dioscorides Zingiberi radicem hanc comparet, & reuerà Zingiberi propior sit quam Cypero, mirum est cur Cyperi speciem fecerit. Quare verisimile est eum quæ Indico Cypero scripsit, ab aliis auditione accepisse, & speciem Cyperi esse apud quodam

Forma.

quodlibet, quodque fuisse minus apud diuina, vt annotauit Pena, Zingiberis
radices pueras, candidiores, odoratas Cyperi modo. Est enim Curcuma vnde exi-
gua cum Cyperi similitudo, cum Zingibere magna. Præterea vires quasdam simi-
les habet, præter croceum succum quem mansu emittit cum Zingibere, tamen si
gustu ingratiore, ingratiore, facultate verò viscera ab obstruptione liberandi po-
tiore. Idem, inquit Pena, cursiores & mulierculæ cum Zingibere miscant ad icterū.
Vis autem illa pilothri videtur elanguescere, longo temporis & locorum inter-
uallo, atque teredine, cui obnoxia est, minus tamen quam Zingiber. Pistosus &
chymistis quam medicamentis hodie frequentior est, attamen in elephorum as-
sumitur Diacurcuma nuncupatum aduersus ægrotudines inueteratas, hydropem,
& cachexiam perutile. Hic non omittendū quod prudenter animaduertit Mar-
thiolus, Curcumam Serapionis non esse eam de qua hic agimus. Illa enim nihil
aliud est quàm Chelidonium Dioscoridis. Quod vel Serapionis typus, vel inter-
pretis errore ac cidit: nam Curcuma neque Mauritani, neque Græcorum est vo-
cabulum. Mauritani enim Chelidonium *Kaurach* vocant: ex quo perspicuum est
Curcumam pro *Kaurach* in Serapione deprauatè legi. Quod cum Medicis, tum
seplasiarij non animaduertissent, & cuiusnam plantæ hæ radices essent ignora-
rent, eas Chelidonijs maioris radices esse crediderunt, ob cretæ siccæ similitudi-
nem, quæ sunt Cyperi Indici. Quare deprauatam Serapionis lectionem secuti, has
Curcumam nuncuparunt.

Vires.

In cas. 12.
Cap. 196.
impl.

CHINA RADIX.

CAP. XLV.




CHINA, vt scribit Nicolaus Monard. Orientalis Indiæ prouincia est,
Scythiis atque Sericanis finitima. Est Chinatum regio vastissima, vt
refert Garcias ab Horto, quæ ad Moscouiam vsque extendi creditur.
Addit Chinenses esse Asiaticos Scythas: & quamuis barbari esse exi-
mentur, in negotiatione tamen, & in artificijs quæ manu perficiuntur esse ad-
dum industrios, neque cuiquam regioni in literarum cognitione cedere: habere
etiam leges scriptas Imperatorio iuri similes, & apud eos doctrinæ esse gradus &
præmia, eruditique viri. Regis, totiusque regni moderationem comitantur. His ad-
dit artem Typographicam tam vetustam apud illos esse, vt omnem hominum
memoriam superet, & semper apud illos usurpatam fuisse. Hæc Garcias. Scuit in
tota hac prouincia, atque in lapæ lues venerea, cui malo vt succurrerent, benignus
Deus radicis vsum dedit, quæ apud eos nascitur, à nobis à loco natali China nun-
cupata, quemadmodum Guayaci Noui orbis incolis, qui eodè morbo infestan-
tur. Scribit idem Garcias plantam ab indigenis vocari Lampatan, trium aut qua-
tuor cubitorum altitudine assurgere, cauliculis tenuibus, quos rara cingunt folia,
Mali Assyrii iunioris similitudine radicem palmi lōgitudine, interdum crassam,
nonnunquam tenuem, quæ recens enata admodum tenella est, & cruda & elixa
mandi potest. Vnicam duntaxat plantam in Goa se vidisse, eamque perpusillam,
quæ siccitate periit antequam excreuisset. Si feratur ea radix, iuxta arbores feren-
dam esse aiunt, quoniam Hederae modo eas scandit & amplectitur. Aliter descri-
bit Nicolaus Monard. Chinam Arundinis maioris radici similem esse, nodosam,
intus albam, interdum rufescentem, foris tubram. Optimam esse recentem, pon-
de, osam, solidam, pinguem, non cariosam, inspidam. Eius figura ex recentissi-
ma, & suis propaginibus adhuc coherente hic expressa est, quæ demonstrat eam
sub terra serpere, ac variis ex locis teretes, ac lignosos processus emittere, quibus
noua ra licū al arum soboles adnascitur, & incrementum capessit, multis & tenui-
bus alioque fibris capillata, quibus nutrimentum attrahit. Est autem grandior &
adulterior radix scabris & inæqualibus nodis tuberosa, cortice obscurius virente
Galanga

L. & Arom.
Ind. cap.

Electio.

CHINA radix.



Galangæ ferè modo velti, cum coctis & fuculentis, cum exaruit fungosa, & intrinsecus rubro dilutè pallida, quæ diutius tenet & seredine facillè viriatur. Quod si æstus mercatores foramina à reredinum enascens carie facta obturât bolo Armenia aqua, velut cemento quodam, obducunt; ex quo pari fraude totam radicis molemque & nativum illius colorem ementur, & alius addit. Illam præferunt quæ postior est, & quæ quantum in eius arida & sicca potest, maximè fuculenta est, quæ a ter carie, putredine est illa; quibus vitis ostendit, quæ recondita fuit, & in longum conservata. Saporis est fatui, perinde ac Satureæ citra omnem adstrictiōem, aut quicquid substantiæ occurrunt. Illa & alia præteritus insipidum, nō aliter quam Hellebori tegri, colore subnigrum, seu cinereum videtur. Eam ob causam æstus radicem hanc vocauerunt, quemadmodum & olim aquam salubrem omnis qualitatis exquirunt.

- Locus.* Nascitur hæc radix in China Orientalis Indiæ regione, vt dictum est, & in multis locis, Arundinis aut Vluæ palustris modo. Nicolaus Monard. auctor est, quod in Occidua India provenire, seq. vidisse huiusmodi radices alias paluas, & quædam in Hispania nova a D. Frâncisco de Mendozza collectas, & recedens inde delatas. Decocti ex China radice propinandi, & eius vtendi hæc est ratio. Quævis is quæ in omnibus morbis observare decet, nimirum natura morbi, & tempore regione, sexu, ætate, temperamento ægri, atque exquisitè purgati, & re, radicis vncia minutim concisa fictili nouo imponitur: huic infunditur aquæ sextarii tres, maceratur viginri horas fictili obturato, coquitur lento igne ex ignis accenso ad dimidias, frigescit, colatur, atque in fictili nouo aut vitreo vase servatur. Eius aquæ calidæ vncias decem æger hauriet, duas horas aut paulo diutius sudabit: sudore deterso indusium & lintheamina mundis & calfactis mutabit: postea in lectulo duas aut tres horas perdurabit: deinde vestitus calidè se in cubiculo continebit. Circiter vndecimam prandebit. Prima mensa iusculum sumit, deinde pullum coctum, aut gallinæ quartam partem, aut veruecinam aliquam elixam aliquando assam cum pauco sale: pro bellariis carnes Coroneorum, aut simile. Poterit & simplicio iusculo passas vuas, aut pruna passâ coctâ edere. Quibus panis bene cocti crustis, aut biscocto vescetur. Potus erit eadem aqua, si ieiunus sumpsit, aut dilutior. Si inter pastus bibere velit, eadem aqua cum coctiva aliqua propinabitur. Qui igitur hac radice vtuntur, tenui illa victus ratione non egent, qualis in Guyaci vlu requiritur. Abstinendum tamen est a bubariis suillis carnibus, piscibus, crudis fructibus, tametsi ne à piscibus quidem in China regione abstineant, quoniam magni sunt helluones. Aliquando tenera China radice Chineses vtuntur cum carne elixa, quemadmodum & nos napsi coctis cum carnibus elixis. Mirabiles sunt eius virtutes ad luis venæ ex cuius efficacioris est in inueteratis morbis, in quibus videlicet magni sunt tumores, & vlcera maligna, quàm in recentioribus. Nec solum ad eos morbos valet, qui contagio luis venereæ commune aliquid habent, sed etiâ ad tremores, paralysin,

articulorum dolores, ischiada, podagram, tumores scirrhomides & cedematodes. Strumas etiam extirpat, succurrit ventriculi imbecillitati, inueterato capitis dolori, calculo, & vesicæ vlceribus. Primum innotescere cœpit huius radices vsus post annum 1535. adferentibus eam in Indiam Chinesibus quibusdam ea luc infectis, qua se interea dum illic negotiarentur curarent. Postea Lusitani reliquo orbi communicarunt.

RADIX CONTRA VENENA, CARLO SANCTO,

RADIX S. HELENÆ. CAP. XLVI.

X CHARCIS Peruana prouincia, ita referente Nicolao Monardi radices quædam aduehuntur Iridis radicibus valde similes, sed minores & ficulnei folij odore. Hispani Indias inhabitantes *Contrayerva* appellant, quasi dicas alexypharmatum, quoniam earum puluis ex vino albo sumptus, aduersus omne venenum, cum seuque sit generis, præsentissimum est remedium (vino sublimato excepto, quod sola lactis potione extinguitur) vomitione ilud reicere faciens, aut per sudores euacuare. Sed & amatoria pocula, eo puluere hausto, reiciuntur. Venter etiam animalia pellit. Gustata radix aromaticum quiddam sapit cum acrimonia coniunctum. Quare calida videtur in secundo gradu. Nicolaus Monardi narrat ante triennium ex prouincia Mechioacan delatam esse radicem quandam *Carlo sancto* dictam, cuius insignes facultates prædicant. Nostro Lupulo similis est, & periculis se conuoluit illius more,

*RADIX Carlo sancto,
Monardi.*



re, quibus si cateat, per huiusmodi spargitur & diffunditur: sola etiam Lupulo similia, colore viridis, sed obscuriore, odore graui neque florem, neque fructum fert. Radix crasso capite est, ex quo alia radices oriuntur digiti maioris crassitudine, colore candicante: cortex qui facile separatur, cuiusque vsus est, odore aromatico, gustu amaro cum quadam acrimonia: nervus radice cortice spoliatus, multis quasi fibris, seu tabellis tenuissimis constare conspicitur, quæ singillatim separari possunt. Nascentur temperatissimis prouinciis Mechioacan locis solo neque nimio siccis, neque humido. Calida & sicca initio secundi gradus. Radicis cortex manet aiquanto tempore

Locus.

Temper.

& Vires.

re commanducatus, multam pituitam, aliosque humores ex capite elicit, eamque ob causam rheumatismos & capitis dolores & defluxiones curat: in nonnullis etiam vomitu multam bilem & pituitam à stomacho expellens, sed illius decoctum, maxime, cuius gratia ventriculum noxiis humoribus liberat, eumque roborat, purgationem tamen præcedere necesse est. Idem commanducatus gingiuis abscedentibus auxilio est, dentisque stabilit, eosque à scabritia & corruptione liberat orisque halitum commendat: sed postea vino os eluendum ad amaritudinem tollendam. Pulueris exigua quantitas ex vino albo, aut Adianti, aut Canellæ decocto sumpta vuluam obstructionibus liberat, menses prouocat, flatu discutit, purgato prius corpore, & alio (dum eo remedio uteretur) ex æquis partibus Liquidambar, & vnguenti Dialthæe inuncta. Cordis affectibus, his præsertim qui ex vteri sympathia oriuntur, auxilio est puluis ut antè sumptus, aut illius decoctum hoc modo præparatum. Radicis minutim coniectæ drachmæ dux in aquæ sextario & dimidio coquantur ad dimidias, corticis Citri in puluerem reducti drachmæ quatuor, pulueris Canellæ drachmæ dux statim iniiciuntur, ac denuo feruent, deinde colantur.

Itius

Istius decocti sex vicez singulis diebus manè addito saccharo propinquantur, purgato tamen prius ut decet corpore. Eundem puluerem & idem decoctum nonnulli in morbi Hispanici affectibus, atque in epilepsia commendant. Narrat idem

Radix S. Helena.

PATER noster, vel Radix S. Helena, Monardi.



Locus.

locis humidis Sicea initio, calida in fine secundi gradus exsistit. Indici pulvis conterunt, totique corpori inducunt balneari: quoque tim constringunt, & membra, ut inquit, suo grato odore roborant. Hæc cum vino haultus in ventriculi doloribus, urinæ difficultatibus & nephritis commendatur. Hæc planta, sicut annotat Clusius, ut ex eius descriptione tribusque colligere licet, ad Cyperi genus aliquod referri poterit.

PERSEA.

CAP. XLVII.

Nomina



ROBOR *περσία* Græcis, similiter Latinis Persea nominatur. Persion ipsam etiam appellant. Qui hanc arborem eandem estimant, & Malum Persicam vulgò noram, de qua tam sumus, certè hallucinati sunt, ut ex Theophrasti, Dioscoridis, Plinii testimoniis perspicuum fiet. Perseam veram Theophrastus his verbis

Lib. 4. hist. cap. 2.
Forma.

PERSEA America, Matthioli.



Lib. 4. hist. cap. 2.

pingit. Est in Ægypto alia arbor Persea vocata, aspectu magna, & pulchra, sed figura similis Pyro, & foliis, & floribus, & ramis, & ta figura, præterquàm quòd hæc folio perenne est, illa deciduo. Fructum autem fert multum, ipsumque omni tempore maturum ed nouo semper veterem occupante. Maturitatem sub Etesiarum flatum. Reliquum enim tollunt & reponunt. Est autem Pyro magnitudine par, figura oblongus, Amygdali facie, colore herbidas. Intus nucem habet quæ admodum Prunum, sed multò minorem & molliorem, carnem verò valde dulcem, succadam, & concoctu facilem: nihil enim ædus eos, qui multum ederint. Arbor hæc radum excellit tum longitudine, tum crassitudine, tum etiam multitudine. Materia est robusta, & actu pulchra, nigra Loti modo, ex qua sicuti cera, lectulos, mensulas, atque alia huiusmodi conficiunt. Persea Dioscoridi arbore est in Ægypto, fructum ferens cibo idoneum, Romæ utilem, in quo phalanga Cranocolaptes nomine inueniuntur, præsertim in Thebesi.

Am. 2.

Arida folia in saram redacta, illitu sanguinis eruptiones sistant. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exiriosam esse, translatamque in Aegyptum murata natura in cibos receptam. Hæc Dioscor. cum antea alio capite de Persicis egisset. Galenus duobus locis de Persica malo, & Persea seorsum tractat. Persicam, inquit, vidi in Alexandria: ex magnis & ipsa est arboribus. Narrant autem fructum huius apud Persas adeo esse noxium, ut eos qui edent interimar, qui tamen si in Aegyptum transferatur, sit esculentus, manditurq; non alter quam pyra & mala, quibus etiam magnitudine conuenit. Idem cum dixisset Persicæ folia vincentem habere amaram qualitatē, & cætera, multo post scribit, Persæ folia adstringentem vinu modicam participare, adeo ut queant etiam nonnunquam vriter sanguinis eruptione affectis partibus imponi: ac rursus, In sola Alexandria, inquit, Persæ arborem vidi, at non in alia Romanis subdita gente. Quidam Persion ipsam etiam appellant, aiuntq; in Persis lethalem eius arboris fructum esse, cum tamen in Aegypto innoxius sit. Quare cum Persæ hitoria Persicæ Malo nullis notis conueniat, cum Dioscorides & Galenus diuersis locis de his tractauerint, scripseritque Galenus se in Alexandria solum Persæam vidisse, Persica verò in Asia, Græcia, Italia notissima esse, apertè demonstrat Persæam à Persica plurimum differre. Iam verò Plinius Persæam a malo Persica perspicuè diuersam facit his verbis. Persicæ arbores serò, & cum disscultare transire, ut quæ in Rhodo nihil ferant, quod primum ab Aegypto earum fuerat hospitium. Falsum est venenatam cum cruciatu in Persis gigni, & penarum causa a Regibus translatam in Aegyptum terra mitigatam. Id enim de Persea diligentiores tradunt, quæ in totum alia est, Myxis rubentibus similis, nec extra Orientem nasci voluit. Eam quoque eruditores negauerunt ex Perside propter supplicia translatam, sed a Perseo Memphi satam: & ob id Alexandria illa coronari victores ibi instituisse, vel ut in manuscripto legimus, coronam victoriæ sibi instituisse in honorem atavi sui. Semper autem folia habet, & poma, subnascentibus aliis. Quod autem Plinius hic non ex Perside translatam, sed à Perseo Memphi satam ait, Nicander Perseum Mycenis, non Memphi Persæam plantasse his versibus cecinit.

In Alexi.

Καίτε χαλκευθὲν ἰσὺν ἀργύρεον ἰλαίν,
 Σελήν' ἀπὸ περσέως χάριτα βλάψας ἰσὺν ἰσὺ.
 Περσὸς περὶ τοῖς ποσσὶ λατὼν κρητὶδα γαῖαν,
 Αὐχὺν ἀποτμήξας ἀρπὴν γυναικὶ μεδύσσης
 Ρ' εἶτα μυκνύσῃσιν ἐνὶ ξυστῇ ἀνέρας,
 Κρητὸς νῆα δῶρα.

Quos sic Gortæus conuertit.

Tunsa quoque interdum quæ Persea protulit ossa
 Palladio noxam depellent mixta liquori.
 Hanc olim Perseus postquam Cephæa liquit
 Arua, & secunde præcidit colla Medusæ,
 Cephæi noua dona, Mycenis intulit aruis.

Nicander autem hoc loco aduersus cerussæ venenum remedia docens, Persææ nukes pro Persicorum nucleis intelligere videtur. Nam Dioscorides contra cerussam *περσικὴν ὀφθαλμὸν* exhibet. Paulus verò, sicut hic Nicander, *περσέως χάριτα* ad id laudat, ut ipse Nicander inter Persæam, & Persicam Malum nihil discriminis nouisse videatur, & contra ipsam imprimis dictum esse credibile sit, quod ex Plinio supra memorauimus. Præterea idem Nicander octauum phalangij genus phalanzæ muser circa faces noctu volitanti simile esse ait, & Persææ folius innutriti.

Lib. 6.
Lib. 1. c. 10.

In Tberia.

Τῷ ἰκέδω περσέως (καὶ σίρπ') πικρὰ λουσι.

Hoc Phalangij genus à Nicandro nominatim non expressum, Ciano, colapram esse scribit eius Scholiastes, quem & καραδαρυσιν appellari scribit, vti que nonne, ab eo quod caput impetat, sic nuncupatum, quod etiam Dioscorides de Persea tradit, ἡ δὲ τὰ λεγόμενα κρανὸν ἔχει τὴν φάλαγγα διέμοικε. Idem Scholiastes hoc loco Sofstratum citat, qui scribit Perseam Rhodaceneam vocari, & ex Αἴθιοπία in Ægyptum transplantatam fuisse. ἔστι δὲ, inquit, ὅτι οὗτος ῥαλός ἐν τῷ περὶ βλάστη, & διακίνηται τὴν τερροίαν, ἢ ῥοδακηνίαν καλεῖται, φασὶν ἂν ποιεῖται ἀπὸ αἰθιοπίας ἐν αἰγυπτίῳ μετακινῆσθαι. At Rhodaceneam ostendimus, nihil aliud esse quam Malum Perlicam, & Rhodacena, Perlica Mala. Gorraus idem Nicandri interpret, iis versibus quos modo citauimus subiungit. Persea ossa Perficorum ossa, siue nuclei, eundem in locum amaritudinem. Proinde ea acciunt, & detergent. Est autem Persea arbor, a Perico dicta, & cetera. Ex quibus intelligitur, Nicandri interpretes & Sofstratum per errorem Perseam, & Malum Perlicam eandem arborem putasse. Fructus eius pericam hic damus affabre expressam, quem fructum ex Ægypto Dalechampsius habuit, cum Theophrasti descriptione optime congruentem. Nam pyri magnitudinem, quam præ se fert (pendebat enim vicius quatuor & semissemis stamnis) superiore parte per pediculo hæret, multis locis ruberosam, in mucronem conueniunt sensim desinentem, colore, cum diu exsiccatus fuerit, qualis erat is que vidimus, totus saturate rufa, pulpa semidigiti crassa, dulci, & gustu suavi, in carnem coeetente, totus fructus seu pyri specie, foris rufescentem, intus cornu candidi protinus colore & dantur cum inaruit: in medio eius cauo nucleum vidimus: aquam enim suauem eo concludi putamus quæ tempore abumitur.

*PERSEA Ameria, Clusij,
cum fructu, Dalech.*

Lib. ca. 2.

Forma.



Fructus is aliquandiu aqua maceratus maceraginem in ea emisit succumque valde viscidum, & valde suauem. Annis aliquot ante liber Clusij stirpium per Hispanias ostentatum prodissit, hæc describeremus: eam per diuersam, vt arbitror, à superiore Perseam apponimus, quam in solo Valentino vnam vidit in monasterio D. Virginis, cui comen de Iesu, primo ab vrbe Valentia lapide in America eò delata fertur. Pyro simile est, in latum diffusa, perpetua coma virens, ramis viridi pallefcentibus, foliis Lauri laui foliz, parte superna virentibus, inferiore cinereis, firmis, neruis aliquot per obliquum discurrentibus, odore & sapore commendatis, cum adstrictione linguam mordicantibus. Flos illi est Lauri ferè, copiosus, racematum compactus, pallidus, sex foliolis constans: fructus per omnia pino similis, deinde tempore pyri modo oblongus, nigro colore, iucundo sapore, nucleum cordis effigie continet, gustu castaneæ, aut dulci amygdalæ haud ablimili. Vere florentem vidit. Autumno fructum ferè intellexit. Hæc Clusius.

CEREVS



positiois & figuram sortita. Intrus torulus ligneus, carpi crassitie, obductus est c. losa carne, & succo Aloës: gummeo enim turget, perquam amaro lentore: flores in vestigio summo promit, referente qui acruhit, digitalis purpuræ fructus: hilari purpura miniata rubet, sicut ferè effigie, gustu non insipido.

PERUVIANA ALIA FACIE ARBORIVS ITEM
INNASCENS. CAP. XLIX.



IDEM celo & natal bus ramorum arborum Indicarū debemus hanc vnde auulserunt qui Morgano miserunt, cespere larioe, sessilis caudicibus incumbit, fibrillis cepaceis radicata: vnde proximè surgunt folia inuicem conuoluta, tunicea, inferius fermè palmum lata, numerosa, quadantenus Aloës, aut Scyllæ: & superne in ligulas prætenues, mucronatas desinentia: purpureum, striatum, concavum alis donatum scapum Hastulæ regie, aut Aloës, duorum & trium cubitorum ambientia, quæ multis glumosis siliculis spicantur, Auenæ sita: magnitudine verò & sericeo tomento candido Apocinum, vel Aselepiadem repræsentant, & semine, sed Conifæ exili gustu salso, ingrato, nitroso, fortè quia in aura maritima adoleuit, vt Aloës illic in sabuletis.



TOPVLVS America.



VISCVM Indicum aut Penam Peruanam insulis nullquam abstrahimus & truncis arborum nostrarum modum adumbrare scilicet, sed transierunt ex radice capite. gramineis gracilibus, diu quadratenus, sed alio citibus comodo virentibus, a medio summo tenuibus, luncosis, striatis, sesquipedi longis, quibus folia semper virent, Vnde etiam duplo maiora, crassiora, luncosiora, nervum folium medium interculis vtrinque sessis, v. luti sesquipedem non parum admittendi.

TOPVLVS AMERICA.

CAP. LI.

XNOVO othe eleantes ac praestantes montes, glos illinc reuertis attulit est Pena, ex quo exhibemus. Virgulta sunt aliquando xuosa, & per sesquipalium palmum geniculata, veluti in sectione, et partium nodosa: vnde exoritur, singulo singula folia, ora exquisita, vltimaque nisi qua pediculus haeret, rigida, latiora, arboris Indae, cui floribus natim exeunt, praeter longis oculis, stipa multis, exiguis, plane Populi modo, hanc Populum Peruvianam vocare fuit: gustu perquam adstringent, lulum calfaciente, subalfo.

PALMACEA, SEV ARVN
NACEA PINNATA SPI
NOSA. CAP. LII

SUNT huius plantae indurati rami foliosi, minus intuenti effigie, quippe sambucini, aut sunt

sunt, fistulosi & medullae pleni, recti, rotundi, octonum aut denum costis, sed per longitudinem triplici cartilagine, digitorum lati, pinnati autem inflexi: & oris extremis modice fimbriis sinuatae sunt cartilagines, foliolis ornatae, solertis opificis sapientiam arguentes. Alii autem

PALMACEA *pumara*
spinosa.

NERII facie arbor, Pena.

arboris truncum aut bacillum hic proximè exprimendum curauimus qualem vnà accepimus: quod carpi crassitie est longa halia & cortice nigro, densòque vestitur, tuberculis crassiss, senticosis, creberrimis in clauis modum muricato, solido, graui & præduro ligno.

NERII FACIE ARBOR

Pena. CAP. LIII.



ARBORIS peregrinæ Nerij facie ramulum, cuius perpulchræ sunt siliquæ, pingendum curauit Pena, & paucis descripsit. Propendent siliquæ de ramis & surculis Sambuci palustris, modullosis, pallidis, pullis, nodosis, sesquipedalium & pedem longis vaginis, cuticeis, vno coactis septenis aut nouenis, singulis gracilem lampetram experimentibus. Intus farciuntur pelliculis cepaceis & tomentosis, adeò exuium serpentis eminentibus, & quiddam cadaueruli anguini simile inuoluentibus, vt pueris terrori sit: consimili florum exortu oblongi exeunt caliculi, Herbar sanctæ aut Stramonix.

FAGARA Auicenna. CAP. LIIII.



MAHALEB meminit Clusius in Historia Aromat. Indicorum de Fagara Auicennæ hæc scribens. Fagara fructus est Ciceri arietini magnitudine, cortice tenui cõstans ex cinereo nigricante, cui subest tenue putamen nucleum continens satis solidum, & tenui nigraq; membrana obductum. Integer fructus cum magnitudine tum forma & colore adeò similis est ei

FAGARA, Auicenna.



quem Officinæ Coccu Indu, Galli Coque de leuant appellant, vt primo aspectu fallere, & pro eo sumi possit. Meminit huius Auicenna, ca. 260. hoc modo. Fagara quid est: Granu simile Ciceri, habens granum Mahaleb, & in concavitate eius est granum nigrum, sicut Schehedene, & alportatur de Sofala. Collocat verò eam in tertio calefacientium & liccantium ordine, atque stomachi & hepatis frigiditati valem esse, concoctionemque iuuare, & aluum constringere scribit.

Forma.
Thevetus
cap. 22. lib.
sing.
Dives.



VLTAE sunt alix siluestres & peregrinae plantę admirabiles, quarum nonnullę solis descriptionibus nobis notę esse potuerunt, quod ij qui in exreris illas regiones nauigarunt, in quibus proueniunt, earum figuras non expreſſerint. Inter arbores in Regno Senegę una est glandiferarum noſtrarum craſſitudine, fructum ferens dactylis parem, ex cuius nucleo oleum expriment miris virtutibus præditum. Aquę permiſtū crocei colore planè inficit, quo tingunt pocula, ac pileos quosdam ex iunci, vel orizę, pileis contextos. Præterea id oleum odore eſt Violę Martiz, olei noſtri ſaporis. Quamobrem multi piſces, orizam, aliõsque cibos eo condiunt.

PALMAPINVS, SIVE CONIFERA.

CAP. LVI.



VICARIS Palmę congenereſ eſſe multas ſilueſtres in ſinu Guineę Oceani occidentui, quę ſterileſ ſunt, nec niſi exilitate à ſatiuſ abſunt, Pena intellexit ex mercatoribus Gallobritoniſ, qui illuc quorundam ferè commercij cauſa adeunt. Inter quas & alię Angli inſtitutores non parum venuſtam & miram hanc iconẽ hic expreſſam ibi oriri illi aſſerunt,

PALMAPINVS
ſilueſtris.PALMAPINVS, ſive
Conifera, Pena.

Forma.

eiuſdemque ramos luculenta conorum ſætura onuſtos attulerunt: quorum arborem quaſi quandam ex Palma & Pino hybridam natura ludibunda videtur conſtaſſe. Lignum ipſum fungoſa eſt Palmę proſum textura, in villoſorum dehileſcens, & ſquamoſa cute loriatum, ſaſtigiato termitę numeroſis & in orbẽ exortis ſurcu'oſis ligulis quadraginta, aut quinquaginta, compactiſi vertibulorum & ſquamarũ ſerie pyxidatim articulatis, pedem longis, rotundis, parum compreſſis, quarum ſingulis comiſſuris ſinguli numeroſi coni altiùſ inſeruntur triceni, aut quadrageni, qui mediocrem conum Cedri ementiuntur, puluillis in quincuncem ſpilitis, reticulatoq; & imbricatim extuberante ventriculoſo nucis cortice fuſco, non polito, craſſitie & concrecione nucis Indicę, intus nucleum glandẽ ſive oleaginam ſeſquiunciam, aut duas uncias longam, præduro, & in farinam ægetrunda, gultu glandis & caſtanę, quę ſunt ei genti panis ſupplementum.

GENIPAT

GENIPAT. CAP. LVII.

M

ACXI æstimatur in America arbor, quæ Genipat dicitur, maximè fructus eiusdem nominis causam non quòd esculentus sit, sed quod alios vsus Barbaris præbear. Arboris folia Nuci iuglandi similia sunt, fructus ferè in ramorum extremo provenit, aliis aliis impositis mirando quodam modo. In magnitudine, coloreque Persicis nostris similis est, ex cuius succo vniuersum corpus inficiunt hoc modo. Miseri illi, & bruti homines, cum succum ex hoc fructu aliter exprimere nesciant, illum mandunt, ac si voraturi essent, deinde ore reiciunt, & manibus veluti spongiam exprimunt, ut succum emittat, qui admodum limpidus est. Profecturi igitur illi aut ad stragem aliquam edendam, aut ad inuisendos amicos, aut ad solenne aliquod, totum corpus hoc liquore madefaciunt. In quo magis in corpore exsiccatur, eo magis narium colorem acquirit, qui vix verbis exprimi potest: est enim quodammodo inter nigrum & cæruleum, siue eum colorem qui vulgò azurus dicitur, medius. Hoc insecti Barbari incedunt, non minùs ornatos sese existimantes, quàm nos nostris coccineis, ac sericis vestibus. Est alia arbor etiam Genipat appellata, cuius fructus maior est, & edulis.

Forma.
Thevetus
cap. 32. lib.
ling.

Vsui.

HYVOVRAHE. CAP. LVIII.

S

ILENTIO non prætereunda arbor, quam ob raras dotes Barbari Hyvourahæ appellant, id est, tem raram. Arbor est procera, cortice coloris argentei, ligno rubescente, gustu ferè salso, aut ligni glycyrrhizæ. Corticis mira est virtus, & mirandus effectus. Quare eodem est in pretio apud Barbaros, quo Gaiacum apud nos. Fuerunt etiam qui Gaiacum verum esse existimauerint, à quibus dissenit Thevetus. Quicquid enim similes Gaiaco vires habet, Gaiacum dici non oportet. Nihilominus Christiani hoc cortice Gaiaci loco vtuntur ad curandum morbum Indicum hoc modo. Corticis huius, qui recens ab arbore sua auulsus lacteum succum emittit, quantum sanis sit in particulas concidunt, tres quatuorve horas in aqua decoquunt, donec vini rubelli colorem acquisierit. Hoc decoctio quindecim vel videnti diebus vritur continuis, cum tenui victu, qua ratione, ut audio, curatur optimè morbus Indicus, nec is modò, sed quiuis alius, qui à frigidis & pituitosis humoribus pendet, qui huiusmodi decoctio attenuantur, ac probè exsiccantur. Eundem Americi in morbis vsurpant. Estq; huius porio etiam sanis suauissima. Est etiam aliud in hac arbore præstantissimum, nimirum fructus ipsius pruni nostri medioeris magnitudine, auri obryzi colore, nucleum concludens mirè suauem & delicatum, ægris, & iis quibus prorsus deiecta est appetècia vtilissimum. Præterea hæc arbor quindeno quoque anno tantum fructum profert, quod plerisque incredibile videri possit: id tamen affirmare asseueratione possum, quod curiosius perferutatus sum, didicique à senioribus Americis, quorum vnus arborem mihi ostendit, mihiq; asseruit se roto vitæ tempore ter quaterve solum huius fructum gustasse.

Forma.

Thevetus
cap. 40.

Vires.

PENOAHSOU. CAP. LIX.

E

ST etiam in America arbor Penoahsou dicta, cortice odoris planè admirandi, foliis Portulacæ, valde spissis, per petuo virentibus. Fructus edit magnos, grandioris pomini ignitudine, orbiculatos, pilæ maioris modo, minime edules, immo venenosos. Singuli senas nuces vitæ adueniunt, amygdalis nostris similes, nisi quod latiusculæ sunt, & magis com-

Forma.
Thevetus
cap. 41.

preffa in fingulis finguli nuclei conduntur, qui ad fananda vulnera mirifice faciunt, quibus etiam vtuntur Barbari ſagittis ic̃ti, aut quouis alio modo in præliis vulnerati, ex his contuſis oleum exprimentes ruſum, eoque vulnera illinentes.

PALMA VINIFERA. CAP. LX.

Forma.
Theuetus
Cap. ii.

PROMONTORIUM *Æthiopum*, nunc Promontorium viride, vt inſinitis arboribus, fruticibusque maximè fructiferis, ita etiam Palmis tum ob aëris naturam, tum ſummam ſoli fertilitatem abundat. Eſt autem ex Palmarum genere arbor pulcherrima, ſive proceriſſima, ſive perpetuam viriditatem, atque alias ſpecioſæ arboris dotes contempletis. Hanc inſtrumento aliquo incidunt, & aperiunt, tanto hiatu, vt in eum pugnis immitti poſſit, qui à terra pede vno, aut plurimùm duobus abſit. Inde manat ſuccus, quem vaſis terreis excipiunt ad huium uſque pertingentibus. Ex Palma Cichorin cuiusmodi ſuccum elici guſtu ſuauiſſimum poſteà dicemus. Hinc in alia tractant, reponuntque in quoidianam potionem, quam Mignol appellant. Vt autem integrum diutius cōſeruent, modicos ſales, vt nos in omphacium noſtrum, addunt, à quibus conſumpto humore crudo & immaturo liquor incorruptus perſtat. Colore verò & conſiſtentia vinis albis Campaniæ noſtræ, & Andium ſimilis, ſtus ſuauiſſimi, ad refrigerandum & ad ſedandam ſitim, cui incolæ ob contuſos & ſummos ætus maximè obnoxij ſunt, conuenientiſſimus, quique non minore apud eos eſt in pretio, quàm apud nos vina noſtra præſtantiora, quamuis etiam arboris fructus, qui parui ſunt dactyli, ſint guſtu acerbi, nec edi facile poſſunt.

Vini.

ARBORES VENENATAE. CAP. LXI.

Theuetus
Cap. 61.
lib. Sing.

INTER Peru & Canibales multæ ſunt inſulæ, quæ vniuſi inpetirent, quem Caſique nominant, in quarum maxima, in qua ſepes Rex habitat, Gaia cum arbor copioſiſſimè proſperit. Item alia fruſciferens pilæ magnitudine viſu ſpecioſum, ſed venenatum. Huius colligitas Barbari imbunt, iis aduerſus hoſtes in præliis uſuri. Eſt etiam alia, qua ſcatificata ſuccus emanat mortifer: radices tamen ſunt eſculentæ, ex quibus farinam faciunt qua veſcuntur. Hæc in gratiam eorum qui rerum naturæ ſunt, nouiſſimè cognitione delectantur, ex Theueto deſcriptum. Quæ hæc de Baxama ita ſedit. Ab inſula Ormuz decem miliatibus diſtat ea quæ Quionne nominatur, e regione illius ſita, olim Principum quorundam delictæ, nunc inculta & deſerta, tum quod magna ex parte diruta ſit ob vehementes terræ motus, tum ob viperarum, aſpidum, colubrorum, qui colore à noſtris valde diſſerunt, atque ſerpentium omnis generis copiam, quæ illic ſtabulantur, ex quibus tam venenata & peſtilens aura exhalat, vt non ſolum homines perimat, qui vel à quātulūm moram illic ſecerint, ſed etiam ſtirpes ipſas inſiciat, in quibus eſt arbor Baxama, cuius fructus vel minimum deguſtatus, mox ſuffocat, id quod ipſus eadem vmbra præſtat, ſi quis vel quadrantem horæ ſub ea moreretur. Cum tamen alibi in regionibus etuſidæ arboris radix venenorum omnium ſit antidotus, illic lethalis, nec non & folium ipſius, & fructus qui Rabuxit vocatur.

T. 1. Coſm.
lib. 10. c. 7.

ARBOR FINIVM REGVNDORVM. Cap. LXII.

Lib. Exot.
Exot. 17.
Exot. 18.

Exot. 18.
p.

QUASDAM alias nobiliſſimas ex *Æthiopia*, *Arabia*, *Troglodytica*, *India*, *Sarinatia*, *Scythia* plantas ex Scaligero recenſendas eſſe ducimus, etiam a nauigatoribus, & Hiſtoriæ Indiæ ſcriptoribus memorie proditas. Ab arbore finium regundorum incipi-mus. Nominis oblitus Ioannes Balada familiaris meus, inquit Scaliger, qui multos annos in

du. pera

diis præcipit, *fecit* ut in his moribus et in his. Tamam esse fr. quentibus virgulis, venit Ponica, folium Ponicæ, fructus quales Castaneæ cum resinaceo. Inrus coccus ruber, quo vitæur ad tincturas & pigmentas. Non enim literas habet Mexicij, apud quos nascitur, sicuti neque olim Ægyptij ante Theuich. Sed in tabellis pictis feruant agrorum facies, finisque prædiorum. Quæritur caula ut eam Scaliger appellat finium regundorum arborem, donec alius felicitior nomen apponat verum.

MANGA. AMBA. CAP. LXIII.


S. T. in M. Luat Manga arbor Pyrifacie, cuius fructus Persico p. 1. a. imato. Cuius color viridis immaturo: Augusto mense cuius maturitate desipit lucens, simul acquirit splendendum nitore. Cuius, ut plurimum, mellis et sapotis. Os inquit licet amygdalo. Inmaturum condunt veluluas. Ambu nomen. Ludou. Bononiensis in Itinerario suo in Calicut nasci tradidit. Cetera plane eadem habet. Garcias in Aromat. Indico. Historia tradit omnium qui apud Indos nascuntur fructuum præstantissimum esse eum quem apli Mangas vocant. Colletur in regionibus calidioribus mense Aprili, in aliis Maio & Junio, interdu in latere Octobri & Nouembri, ceterum pro regionum natura & diuersitate variæ etiam saporis bonitate. Habere se in prædio suo quod est in Bombaim arborem huiusmodi fructus ferentem, quæ litera est. Nam Maio mense fructum fert saporis qui sem & odoris gratia excellens, sub hiem vero Autumni alium superiorem magis commendabilem. Colore est is fructus ex viridi rubescente, & odore gratissimo. Exempto cortice editur, aut sine vino, aut generoso aliquo vino maceratus, veluti Persica. Conditur etiam saccharo, interdum verò & aceto, & oleo, & sale, inspersis in eius medullis iingibere & aliis. Nonnunquam editur cum sale, & nonnunquam elixis. Frigidus vero est & humidus, quèndum Persica. Eius osculis affatis alui profluvia sili aiunt, quod vetum esse Garcias deprehendit. Nucleis vero recentibus lumbricos & ventis tinea necati sciunt, quod rationi consentaneum est ob eorum amarorem.

GVANABANDVS. CAP. LXIIII.

G VANABANUS arbor Pini stipite, proceta, folio magno, oblongo, fructus Melonis magnitudine. Cortici color viridis, splendor C. doni, dignitas crassitudo. Caro intus candida, dulcedine lactis coacta, semina continet phasiolacea. Generalis hystoria Indiarum auctor corticem viridem tenuem esse vt Pyri, superficieque squamulis dis-

Exec. 48.
C.
Forma.
Lib. 3. c. 17.

GUANABANI
fructus, Onedo.



Oniedus Guanabanus, & uterque ab eo diuersus esse curus, ex Scaligero meminimus. Sic in Historia sua suum describit Oniedus. Guanabanus procera arbor est, & formosa, folio fere Mali citrix virente: fructu pulcherrimo, medioctis Melonis magnitudine, qui tamē interdum in capitis pueri crassitudinē excreſcāt. Cortex huic fructui viridis, & qui quibusdam squamis distinctus videatur, vt strobilus, laxioribus tamen, neque ita tumentibus, quandoquidem totus cortex tenuis sit, neque crassior quam in *Perr.* Cato candidissima, saporisq; delicatissimi, quæ facile cremoris lactis instar in ore resoluitur. Per eius carnē sparsa sunt semina magna, Cucurbitarū seminibus aliquāto maiora & nigricantia. Frigidus est hic fructus, & per altus visilis. Nam tamenſi quis integrum Guanabanum deuoret,

Lib. 8. c. 7.

deuoret, nullum inde seminem occurrentem. Infirma est liquorum vis. Hæc Ouedus. Scholiastes vero huiusmodi Aroniarum, sive Saligeri Garbati, esse opinatur, qui superioribus annis ex Æthiopie Mozambique Antuerpiani allati est fructus crassus, sesquipedali longitudine, cui densus durusque cortex, tenui molliorque ut in Cydoniis, sed viridilanugine obductus, aliquot per longitudinem excurrentibus venis, siue potius sulcis, ut in Melonibus, extrema parte in mucronem dinut, superiori vero quæ e ramis dependet, pediculo innixet. Siccus, durus, & fibrosus. Continet hic fructus pulpam candicantem, qua Æthiopes in sibi summi ardoris utuntur suis sedandæ gratia: iucunda tamen aciditas e perdit. Huiusmodi friabilis est, sic ut digitis irrita in pollinem relinatur, remanens tamen per se aciditate. Per hanc partem sunt semina renibus, aut Anagyridis leuini, fere nulli millima, nigro tamen colore nitentia, ac ex vmbilico fibris pulcherrimis. Huic simillimum, foliis tamen ab hoc diuersis, ex Theueto supra descriptum, cuius nunc heus Nigitarum.

MAMEI. CAP. LXV.

Exci. 181. 9.
Forma.



MAMEI arboris tum facies tota Castaneæ, tum magnitudo sed maximum, fructus non solum ingentis Persici, sed etiam quædam Cydonij superat globû. Nuculas duas habemus, inquit Scholasticus, in quibus fert, quarum altera pene æquat Persicum, altera longior, quæ postquam addita aut circumiecta pulpæ corpulentia totum ambum metiri. Rubro colore pulpa est. Coram fructus fulvus. Sapor Persici. Lib. 1. 10.

Lib. 1. 10. arbore hæc ex Ouedi historia decerpimus. Mamei arbor est speciosa

MAMEI
folium.



gnæ Nucis ingladi proceritate, foliis palmatis amplexiformibus, crassioribus, altera parte viridioribus, palmi longæ & proportionem latis. Huius fructus est omnium qui in Hispaniola dicta proueniunt gustui suauissimus, quandoque perfecte, quandoque imperfecte rotundus, pugni fere longitudine æquans, aliquando minor, cortice conueniente, modice aspero, Pyrorum siluestrium non, non autem crassiorque esset. Sunt qui vnum, alij duos fere conuenientes nucleos in pomi medio intersiliis distinctos, acrimonia me nibracula tenui opertos, delibratæ castaneæ coloris, quorum pulpam si secueris, iudicabis castaneæ, præterquam quod re, similem, sed interior acinus fellis est amaritudinis, tunicula contextus, quam inter & priorem illam nonnullam caro sine pulpa intercedit fere fulva, Persici duritiam, sed, aut meliori, non tamen tam succulenta est, neque tam

ra. Pulpæ isti digitalis est crassitudo in maioribus, minor in minoribus.

GVAIAVA. CAP. LXVI.

Exci. 181. 9.
Forma.



GVAIAVA est arbor, tum fructus, Mali facie. Sed color fructus niger. In quo semen nigrum, minutum, rotundum eximie ipsius naturæ. Paulo folius hæc arbor ex Ouedo describenda, inquit, arbor est Indis omnibus vulgaræ cognitionis, Amaranthi foliis maiori longitudine par, sed ramis rarioribus, foliis minus viridantibus, laniatis, paulo minoribus, crassioribus, & vniuis eminentioribus. Poma profunde longiuscula, aut rotunda, alia inuis rubra & punicea, alia rosea, sed fere omnia viridia, aut lutea cum profus maturuerint. Horum quædam sunt magnitudine quæque Passipoma Galli vocant, quædam tamen minoribus, quædam

quantum

quatuor partes distincta est, quarum singulae granulis sunt repletae durissimis, quae tamen quo minus deglutiantur non impediunt, cortex Pyri inuscatelli cortici similis, eodem modo eximitur, flos quadatenus Aurantiae aut Citri in aliis florem refert, in quibusdam florum Gelsemini odore, eoq; suauiore. Huius arboris quaedam siluestris est, alia satiuus fructus esu suauis, concoctu facilis, alui profluuiis utilis, nam alstringit, praeterim si paulum immaturus & duriusculus edatur, ut arbor Guyabota, ita fructus Guyaba dicitur.

BRVSATHAER. CAP. LXVII.



DChinarum sinum marinae sunt arbores visenda vastitate: tanta, inquam, ut in eis imminente magnitudinis aubus stabulari liceat. Etenim tam grandes sunt, ut eis etiam grauiora animalia inter se sustollatur, atq; auferantur. Has arbores vocant incolae Brutathae: fructus ferunt anguribus non minores. Eadem scripsit M. Anton. Pigafetta in Itinerario suo.

Exec. 181.
20.

CACHI. CICCARA. CAP. LXVIII.



PINOSA est arbor in Malauar, cuius folium non pingunt. Ipsa Cachi, fructus Ciccara dicitur, longitudine pedali, humanae coxae crassitudine. Pondus fidem superat. Cortici color primum viridis, matrescens in luteo fuscus. Corpus firmiusculum, compressioni tamen ita cedit, ut frangatur. Temporis quoque suapte natura impatient. Haud enim ita multo postquam detractus sit, fit rugosum. Totius forma ut Pinex Nucis. Intus enim camerulae membranis distinguuntur, ut in Punica. Pulpa odor suauissimus. Sapor mistus ex Melone moschato, Persico arantio dulci, & melle. Intus poma ducenta quinquagena ad trecentena usque, flicorum tum specie, tum dulcedine, sine cortice, ut aiunt. Membranulis tamen distingui necesse est, quibus segregentur, ut ouorum vitella. In his pomis fructiculus est alius, figura castaneae, qui ad eundem quo castanea modum inter coquendum crepitat, esculentusque est. Etiam bobus in pastum datur. Exit et truncus fructus, sicut & lumeiz, id est, Sycomoro. inter spinas & frondes: interdum, quod magis mirum est, e radice subtus terra, unde prodit. Hic longe praestantior regibus dono datur. Legitur mense Decembri. Eadem prorsus scripsit Ludou. Bonon. in Itiner. suo, nasci que in Calicut. Eadem etiam Nicolaus Costin. in Itiner. nisi quod non fructus ait bubus pro cibo praebere, sed eorum cortices. Praeterea arborem grandi Fico similem esse, foliis diuisis Palmae modo, ligno buxo, ad multa utili.

Exec. 184.
21.
Forma.

Tempus.

MELO CORCOPALI. CAP. LXIX.



ORCOPAL Indiae prouincia est, in qua Cydonij magnitudine & foliis arbor. Praegrandem gerit fructum, Melonis figura, eodemque sulcatum modo. Intra quem terna, quaternave grana, acinorum vix facie, acore cerasi. Melo hic & edendo est, & ad medicinas utilis. Videntur melipilum colore albo, mali magnitudine. Eadem Ludo. Bono. in Itiner. Thevetus in Promontorio Comari fertilissimo prouenire tradit arborem Malo Cydoniae magnitudine & foliis similem, cuius fructum Corcopal vocant, esu gratissimum, gustu suauissimum, quo etiam aegrotantes vtuntur, quia prauos humores per alium expurgat.

Exec. 185.
22.
Forma.
Vfus.

Thevet.
Colm lib.
11. caput.

DARIAN. CAMALANGA. CAP. LXX.



VPERIORI Meloni similis Taprobanae, quae nunc Sumatra, fructus, qui Darian dicitur. Anguriae magnitudo, cortex viridis. Eius in visceribus quini fructus Arancij quantitate, & figura, sed oblonga: butyri sapore suauissimo. Haec etiam Nicol. Costin. in Itinerario. In eadem

Exec. 186.
23.
Forma.

Vfus.

eadem

eadem Carcopal Camolaga fructus esitatur, sesquipedem maior, Cucurbitæ colore. Humi iacet ut Melo. Pulpæ plurimum. Condimenta ex ea vel cucurbitinis, quas Carabassadas Hispani vocant, vel Citriis meliora, atque sapidiora. Eadem Ludou. Bonon. in Itinerario suo.

ET TALCH. CAP. LXXI.

EXERC. 181.
19.

Forma.

Virt.



RANDIOREM Iuniperū quæ Cedrum maxime æmulatur, Harar vocant Arabes, Afri nominant Ettalch. Eius medulla in Numidia candida, in Æthiopia nigra, in Libya purpurea: qua in scobem comminuta dicuntur Afri Medici felicissimo successu vice Gaiaci ad morbum Indicum profligandum uti. Hunc morbum tres nationes, Gallia Neapolitana, ubi se inuenisse putant: Itali a Gallis in quibus primum aiunt sese illum conspexisse: Germani ab Hispanis, qui ex India tam pretiosam mercem conuexerunt, nominant. Ego, inquit Scaliger, merito ac iure Indicum. In descriptione nonne partis Africæ legimus Ettalch grandem & spinosam esse arborem, foliis Iuniperi, quæ gummi mastiche simile emittit, quo Afri mastichen adulterant, quod colore & nonnihil odore mastichen referat. Cætera prorsus eadem. Ea prorsus videtur esse Oxycedrus supra descripta. Meminit Theuetus arboris Etache, quæ in insula Cuoue provenit valde spinosa, & Iuniperi similis.

GOR, ARANCIA, LIMONES, AMBULON.

CAP. LXXII.

EXERC. 181.
20.



D fluuium, qui Niger dicitur, nullæ arbores fructifera præcipuas admodum. Inter quas una, cuius fructus castaneæ similes, sed amarus. Gor vocant incolæ. Ioannes Leo lib. 1. descriptionis Africæ tradit has arbores mirandæ esse proceritatis, satis procul a mari, in continente. In Indiæ insula Zeilam cortex Aranciis dulcis est, & suavis Limones autem proveniunt ibi, sua specie, pusilli, qui nullum porro capiunt incrementum, sapore dulcissimi. Siluestrium Limonū arbores in Sytia, Ægypto, Africa, fructibus pomis admodum exiguis, acidissimis. Aruchet insula fert arborem, cuius cortice fructus exit candidus, saccharati specie, & magnitudine coriandri. Ambulon ei nomen est.

EXERC. 181.
24.

ARBOR MHTPOΣΙΔΗΡΟΣ. CAP. LXXIII.

EXERC. 17.



RACEM fortasse nomen à nobis inditum, inquit Scaliger, plantæ historiæ conueniet, quàm ingenio nostro. Tam enim est prope mendacium, quàm nos à voluntario mendacio alieni. Animi tamen gratia reponentur hic. In laua maiore aiunt raram esse arborem cuius medulla terrea sitexilis illa quidem, cæterum porrecta ab imo ad summum plantæ fastigium. Ex ea frustum qui gerat, ferro esse impenetrabilem. Eadem refert Nicol. Costin. in Itinerario suo, ut & ea quæ sequuntur.

MUSA ARBOR. CAP. LXXIII.



Nomina
L. 1. c. 491.
M. th. 110.
L. 1. Dioc.

ALMARUM quoque generis quidam putant esse arborem, quæ in Ægypto Cypròque, & Syria non procul ab urbe Alep vulgo nominata provenit, quam qui illuc nauigant Musam appellant. Arabibus ut Serapioni & Auicennæ Musa Maum, & Amula dicitur, in Sytia Mose. Græci Christianique qui Syriam incolunt, & Iudæi, arborem eam esse aiunt, cuius fructus edit Adam. Quod ridiculum esse scribit Garcias in Aromaticum Indicorum Historia. Id verò multò magis, quod scribit quidam Franciscan.

scanus, fructum hunc laudabilem Musā vocari, quod Musis degnus sit, aut quod earum sit cibus. Nascitur in Candia, Decan, Guzarate & Bengala, vocaturque illis Quelli. Nascitur etiam in Malauar, vbi Palan, & in Malayo, vbi Pican, & in ea Africæ parte quam Guineam appellant, vbi Bananas dicitur. Arbor est quintum seminumve cubitorum proceritate, quæ ex stolonibus alterius fertur, solus arundinacens, longè lateque sese diffundentibus, adeo

MUSA arbor.



MUSA cum fructu.



ut ternum cubitorum longitudinem quandoque excedat, latitudine sesqui cubitum æquens, lata crassaque per medium excurrente costa. Ea Aestate vel natura sua, vel solis ardore, sic arescunt, & veluti torrentur, ut mense Septembri nudæ tantum remaneant costæ, decidente foliorum materia, quod admodum sit tenuis. Caudice vnico constat sine ramis, squamoso cortice vestitus, Palmæ vel Arundinis modo. Ex vertice germen emergit molli corpore, longitudine fere cubitali, à quo alia prodeunt, ternum quaternumve digitorum intervallo, ex quibus circumminent fructus parui cucumeris magnitudine, per maturitatem quodammodo flavescentes ficum instar cortice contexti, eodè quoque modo quo ficus spoliantur. Substantia pulpæ melopeponibus similis nullo intus osse, neque semine. Li principio gustantibus insipidi esse quodammodo iudicantur, nec ita gustatui suauis: sed qui his vesci per seuerant, magis ac magis in dies oblectantur, occulta quadam saporis suauitate ita allecti, ut nunquam eis saturari posse videantur. Musæ meminit Auicenna, ut diximus, item Serapio his verbis. Musæ excalfacit in medio primi abscessus, humectat autem in eius fine. Paucum præbet alimentum. Priuatim prodest thoracis, pulmonis, ac vesicæ ardoribus. Aluum emollit, verùm liberalior eius vsus stomacho aduersatur, ac tunc obstruit. Quamobrem si quis cum frigidi sit temperamenti ea copiosius vescatur, subinde aquâ mulsam, oxymeli, aut zingiber conditū sumat necesse est. Fertū in vtero alit, renibus opitulatur, vrinam ciet, & venerem stimulat. Hæc Serapio. Si Musæ hæc Palmæ genus est, quodnam id sit ex rot generibus quæ ex Theophrasto recensuimus, dictū difficile est, nisi quis id esse iudicet, quod Theophrastus in Cypro nasci prodidit, folio cæteris ampliore, & folio longè maiore, magnitudine Mali Punici & figura oblongo. Carolus Clusius in ea est opinione ut existimet Musam Arabum eam esse plantam, cuius Plinius meminit his verbis. Maior alia pomò, & suauitate præcellentior, quo sapientes Indorum

Lib. c. 494.
cap. 24.
Vires &
Temper.

Lib. 1. hist.
cap. 38.

In Arom.
Ind. hist.
cap. 24. 1.
Lib. 1. c. 6.

M V S A Paouera Theueti.



Lib. 4. c. 19.
Lib. 8. c. 1.
Cap. 33. sim.
Ame.
Theuet.
Colmog.
T. 1. lib. 4.
cap. 1.
Mauze

T. 4. Colm.
lib. 12. c. 19.
Photel.

uiuunt. Folium alas auium imitatur longitudine trium cubitorum, latitudine duum: fructum corrice emittit, admirabilem succi dulcedine, vt vno quaternos faciet. Arbori nomen Palæ, pommo Arienæ. Plurima est in Sydracis, expeditio-num Alexandri termino, & c. Nam fere omnia, inquit ille, pulcherrimè ad Musæ descriptione quadrant. Huc accedit quòd in Prouincia Malauar, quæ supra Indum flumen est, intra vero Gangem, Palan adhuc nomen retineat, a quo Latini suum Pala mutuati videntur. Ceterum meminit huius fructus Ludouicus Rous lib. 6. Nauigationum suarum. Ouiedus nomen improprio Platanum appellat. Theuetis arborem hanc Paquouere Americis vocari tradit, fructum Paouera. Arborem Mauze in Ægypto vocatam describit non maiorem sicu mediocri, cuius folia quinque aut sex pedes longa sunt, duos lata, fructus in caule coacervatus, non secus ac dactyli in Palma, crassus & longus mediocris cucumeris instar, densissimus atque suauissimus quem domi suspendit vt

vt nos vnas penfiles eoque sæpe solo tanquam optimo viuuntur alimento. Arbor tenella est & fragilis, adeò vt nisi maxima truncum haberet coxæ hominis crassitudine parem, minima tibix, in cremiorum non in arborum numero recensenda foret. In America semel aut summum bis fructus fert. In Æthiopia & Arabia vicinisque insulis etiam trisera est. Idem Theuetus in regione Catay nasci arborem fert quæ Photel nominatur Fructu edit magnum, Muzæ Ægyptiæ fructus, sed paulò breuiorem: quam ob causam nonnulli sicum Pharaonis vocant præter cæteras dotes, ad sedandam sitim & febrium ardentium æstus resistendos perutilis est: folium Plantaginis habet, sed paulò spissius. Arbor octo cubitorum altitudinem fere superat. In ramorum eius vtraque parte fructus provenit, ligno ipsi hærens, sub foliis occultatus, quæ arthritidi mirè profunt.

NANA. CAP. LXXV.

Theuet.
cap. 46.
singul.
Americæ



PUTEX in America provenit, folium habens lato lunci folio simile fructus Nana à Brasilianis nuncupatur, citruli mediocris magnitudine, toto ambitu Pinæ nucis specie, fuscus cum maturuit. Mite excellit hic fructus tum dulcoris, tum suauitatis gratia quouis saccharo præstantior, non maturus tam insuauis vt os vinceret. Semen nullum profert quare fusculo feritur. Non nisi conditus ad nos deferri possit, quia post maturitatem diu seruari nequit. Hoc ægri frequentius vescuntur, quàm vllò alio cibo. Hic fructum describere videtur Ouiedus nomine Yayama his verbis à Clusio traditis. Nascitur in Hispaniola, cæterisque vicinis insulis fructus, quem Hispani à Pinæ nucis similitudine Pinas appellant, non quòd eiusmodi squamas lignosas habeat, sed quòd eius cortex simili modo distinctus videatur, tamen non squamarum, sed peponis modo cultello integer auferatur. Vt autem succi bonitate & suauitate reliquos fructus hic antecellit, ita color illi pulcherrimus ex luteo viridescens, paulatim per maturitatem virore euanescente. Odor ei iucundissimus, qualis

Lib. 7. c. 14.
Yayama
Indorū.

fer

NANA fructus, sine
Yayama.

ferè in eo Persicorum genere, quod a malis & cotoneis nomen apud Italos & Hispanos inueniunt: magnitudo illi vulgaris melonis. Nascuntur vero singuli fructus ex Cardui genere aspero & spinoso, cui folia oblonga, ex quorum medio profilit caulis rotundus, vnicum ferès fructum, qui post decimum aut duodecimum mensem demum maturefcit. Eo sublato nullus præterea in planta nascitur fructus, ideoque ea velut inutilis abucitur. In extremo fructus, interdum etiam in extremo caule sub fructu enascuntur veluti germina & turiones quidam, qui fructui magnum addunt ornamentum: hi sunt tanquã semen: panguntur enim tribus sub terra digitis, sic vt media turionum pars extra terram extet, atque radices agunt, suoque tempore fructum perficiunt. Varia sunt eius genera, quæ pro linguarum varietate diuersis nominibus nuncupantur: tres vero distinctæ species notantur. Prior Yayama ab incolis appellata, altera Boniama, tertia Yayagua. Postrema carne est candida, gustu vinoso, sed acido & acerbo. Boniama carne est candida, gustu dulci, & quodam-

modo satuo. Yayama reliquis oblongior est, & bonitate illis præstat, carne fuluescente, gustu dulci & suauis. Per omnium tamen carnem sparæ sunt fibræ quædam tenuissimæ, quæ tametsi palatum inter edendum non offendant, gingiuas tamen lædunt, si quis crebrius eis vescatur. Quibusdam locis nascuntur etiam hæc genera spontè in agris copiose, at quibus cultura accessit longè sunt iis suauiores, & cultoris beneficium abunde penant. Huius fructus abundantia auctoritatè eius minuit. Sed tamen & his insularibus cum bonitate, tum magnitudine præstant qui in continenti nascuntur. Maturus fructus quindecim tantum aut viginii diebus conseruari potest. Hactenus Ouiedus. Narrat etiam Theuetus Necumere maris Indici insulam innumeris fructibus abundare, inter quos qui ipsorum lingua Melenken nominatur, magnus est nucis pinex specie, cortice luteo, quo spoliata carnem & in particulas confectam si degustaueris, saccharum ore continere dixeris cum pauxilla nucis muscatæ portiuncula permixtum. Hoc Barbari præferunt ad sedandam sitim vtuntur. Fructui Nana satis similis est, nisi quod Melenken in arbore prouenit. Mori ferè proceritate, nigro cortice vestita, folio quadatenus rubescente, longitudine & latitudine folij Angelicæ. Nana autem planta est foliis lunco similis, nunquam ad tantam altitudinem accrescens.

ARBOR GEHVPH. CAP. LXXVI.

ALIT Taprobana insula hodie Sumatra nuncupata atborem admirandæ facultatis, vt refert Theuetus, quæ illic Gehuph, in India Cobbam dicitur. Foliis est paruis, quemadmodum & arbor quæ siliquam catharticam fert, ramis breuioribus, cortice flauescente, lue croceo: fructu crassiusculo & rotundo pilæ luforæ instar, in quo nux auellanæ par coërcetur, quæ nucleum includit valde amarum, qui lingux admodum radicis Angelicæ saporem refert. Fructus ad sedandam sitim commodissi-

Cosmog.
Tab. II.
capa.
Forma.

ARBOR *Gchuph.*FICUS *Nigritarum.*

Forma.

Thevetus
cap. 10.
lib. 6. cap. 4.
T. 1. Colm.
lib. 3. cap. 4.

lib. 8. c. 4.

mus. Eo tamen nucleus quamvis durus, licet
pietantior: ex eo enim indigantur, et
ciunt, seduloque cōstant, quia ad hunc & lie-
nis dolores maxime confert: quibus doloribus
cum affliguntur, primum dies aliquot parci-
simo vtuntur victu: deinde octo dierum spa-
tio oleum sumunt: quo tempore morbus par-
larim minuitur, & tandem curatur. Quod si
qui oleum sumere noluerint, veluti puen &
mulierculæ, eo ventriculum, spinam dorsū,
latera inungunt. Idem articularis morbi, cui
hucus insula incolæ valde obnoxij sunt, reme-
dium est. Ex eadem arbore omni
mi manat vtilissimum. Ex eo enim cum me-
diocri oleo supradicto dissoluto, cataplasmata
conficiunt quæ pellibus illiunt, & paribus la-
borantibus applicant. Hanc arbore videtur
tet prope ædes suas, & in hortis colunt.

FICUS NIGRITARVM.

CAP. LXXVII.

NUNC siluestres plantæ dicuntur
quæ peregrinæ sunt, non illæ quæ
idem in Syria, aut Egypto genitæ,
sed in Nouo, & veteribus Cosmo-
graphis incognito orbe, scilicet in America, seu
Francia Antarctica, quas illic Andreas The-
vetus vidit, obseruauit, aut à peritioribus tunc
didicit, & literatum monumentis conscripsit.
Ac primum in Regno Senegæ promontorium
est, ab incolis lalont, à nostris qui primi illic
nauigarunt Cap Veto, id est, promontorium
Viride nuncupatum, ab arborum fructuumque
toto ferè anno illic virefcentium copia. In
hoc promontorium tres sunt parue insulæ, non
tinenti propinquæ, pulcherrimarum arborum
fetaces, à nullis tamen habitatæ. In vna harum
prouenit arbor quæ folia fert Ficus nostris
similia, fructum pedes duos, aut circiter lon-
gum, proportionem crassum, ad longitudinem
crassitudinemque Cypriarum cucurbitæ æqua-
cedentem. Quidam hunc esitant, non aliter
quàm nos melones nostros. Intus semen est re-
ni leporino figura simile, magnitudine fabæ. Alij eo simias nutriunt. Sunt qui ex
eo maturo, & tempestinè exsiccato pulchra monilia conficiunt. Huic arbori si-
leni ferè, sed folio valde diuersam arborem describit Ouedus in Indica Historia,
quam Higüero vocat nomine tetrasyllabo. Arbor est prægrandis, inquit, velut
Motus nigra, fructum ferens cucurbitæ rotundæ, interdum verò oblongæ simi-
lem. Ex rotundo pateras & alterius generis vasa conficiunt. Matrone est robusta,
aque

FOLIV M dictam

Figuera.



atque apra sedibus, subsellis, ephippiis, aliisque operibus fabricandis: Mali enim Medice, aut Punice materiam esse dices. Cortice facile dehbratur. Folio est oblongo, angusto, in extremo latiore, à quo ad pediculum vsque paulatim angustius fit. Indi nonnunquam in aliorum fructuum penuria hoc vescuuntur, id est, eius carne, quæ cucurbitæ carni cum adhuc viret, similis est. Corticis color & forma cucurbitæ. Vulpis est hæc arbor in Hispaniola, reliquisque insulis, & huius Indiarum continente. Priori similiorem fructum non tamen eundem memocat Theuetus, qui in insula Zipangu prouenit magno meloni par, cui nomen Chiuef, quod Syriacè ficum significat. Fructus is suauissimus est, cum manditur mannæ modo in ore liquefcens. Semina intrus continet qualia in cucumere nostro reperiuntur, cortice cum maturuit croceo, folio arboris eximie viridi exquiritè rotundo, aureo nûmo Gallico pari.

Colmog.
T. 2. lib. 22.
cap. 10.

AHOVAI.

CAP. LXXVIII.



RORE hæc in America etiam prouenit, ea ferè proceritate qua Pyrus nostra, foliis tres quatuorve digitos longis, duos latis, toto anno virentibus. Cortice inregitur candicante, succum album, si ramulus abscindatur, & quasi lacteum fundente. Arbor ipsa concisa vehementer tetrum abominandûmque odorem spirat. Quare nullus eius omnino apud

Forma.
Theocrit.
cap. 36. lib.
sing.

AHOVAI.



Barbaros vsus, ne ad ignem quidem accendendum. Fructum proferit castaneæ mediocris magnitudine, album, Græcæ literæ Δ figura.


Vitis.

Huic, præsertim nucleo, venenata & mortifera vis inest, quo Barbari ex leuissima quaque occasione vxores iis irati necant, & contra vxores viros suos. Quam ob causam exteri à Barbaris hos fructus recens collectos, nec precibus, nec pretio impetrare possunt, imò filios suos ab illis proxis abstinere iubent, priusquam nucleum exemerint, quo exempto ex corticibus tintinabula conficiunt, tibiisque applicant, Vfus.

pendent vacui fructus eo quem exprimi iussimus modo. His Canibales ad crura alligatis in suis saltationibus uti solent, quemadmodum apud Mauritanos atque etiam Hispanos nolarum & tinrinabulorum vsus est: mirum enim quantum hi fructus ex mutua collisione sonitum edant. Posteriori meminit The-

FRUCTVS Higüero,
ex Clusio.

AHOVAT Theueti,
ex Clusio.



uetus cap. 36. singular. Americæ: deinde subiungit eadem de Ahouai, quæ hoc capite retulimus: tum icones duas, priorem sine inscriptione, alteram cum hac Ahouay Theueti. Lobellius priorem inscribit nomine fructus Higüero apud Clusium.

HAIRI.

CAP. LXXIX.

Forma.
Theuetus
cap. 36. bb.
singul.



Vfus.

Lib. 2. c. 17.

HAIRI in America arbor est, folio palmeo, ligno marmori nigro simili, quamobrem multi Ebenum esse existimant: quorum sententiam Theuetus non approbat. Nam Ebeni lignum nitidius splendet. Deinde arbor hæc tota spinosa est, minimè verò Ebenus. Postremò Ebenus in Æthiopia & Calicuto nascitur. Lignum istud ferri modo ad ima aquæ sedit: quare Barbari ex eo enses conficiunt, atque monilia. Adeoque durum ac validum est, ut ex eo sagittæ quasvis ferreas loricas penetrare possint. Fructum edit palæ luforiz magnitudine, altero extremo quodammodo acutum. Intus nucleus est niuei candoris. Huic quantenus similem fructum nomine Yayama descripsit Ouiedus, de quo suo loco dicemus.

VHEBE



Atc arbor excellēssima est, ramis in sese per transtuerfum insertis, vt non natura, sed arte id fieri existimare possit, qui arborem contemplatus tuerit. Folio est Brasicæ, fructu in quibusdam ramis pedis vnius longitudine, quo apum examina nutriuntur, quæ in cauum arboris sese recipiunt, illic mel ceramque conficiunt. Mel hoc magno apud Barbaros est in pretio, quod eo agros alant, cum farina recenti petmixto, quam ex siccatis tulsisq; radicibus in vltus reponunt. Est animal nomine *Heyrat*, id est, Bestia mellis, fuscum, felis nostri domestici magnitudine, quod vndique ad huiusmodi arbores accurrit, mellis, quod in iis reperitur, avidissimum. Id ea arte ex cauis arborum vnguibus edueit, vt apes non lædat, neque ab iis lædatur.

Forma.
Th uetus
cap. n. lib.
ling.

Ufus.

COHYNE.

CAP. LXXXI.



IN AMERICA regio est *Morpon* nominata, quam hodie incolunt Lusitani. Ea plurimorum & optimorum fructuum fetax est, eius præsertim quem Nana appellari diximus. In iis etiam est fructus eius arboris quam *Cohyne* vocant, quæ folium habet Lauri, fructum Citrulli medioeris magnitudine, cui struthocameli figura, qui edulis non est, aspectu tamē pulcher, præsertim in ipsa arborē ramis eo onustis. Barbari ex ipso pocula faciunt: præterea arcanum quoddam, & planè stupeum mysterium. Excauat hunc fructum mulo, seminibusve aliis implent. Deinde baculo patē vna in tertam defixo, altera in fructum inserto, cum toto amb tu speciosis plumis exornant, singulæque in singulis tuguriis binos ternosve huiusmodi fructus seruant, magnosque habent in honore: quod iis miseri idololatæ diuinitatem quandam inesse existimant, nihilq; aliud quod sensu peticipiatur adorant quàm hoc instrumentum, quod cum tangitur, percutiturve tinnitum reddit: adeoque sunt vecordes, vt cum tinnit, & percussum resonat summum illum Deum esse putent, quem sua lingua *Toupan* nominant, qui loquatur, quique ipsis, maxime verò ipsorum prophetis omina præfagiat. Recitatur eadem Historia à Clusio in scholiis cap. ii. lib. 2. de Aromatib. Indiciis, vbi ait fructum huius arboris vocari *Maraka* & *Tamaraka*.

Forma.
Thevetus
cap. 14. lib.
ling.
Ufus.

COHYNE.



Nomina

Forma.

Theop. us
cap. 9. lib.
sing. & T.
2. C. Smo.
lib. 2. cap.

QUAE arbor Brasilia, Gallicè l'Arbre du Brésil nominatur, ab Americæ incolis Oroboutan dicitur. Specie est pulcherrima, procera, recta, tam crassa quàm quævis alia, foliis Buxo similibus, æquè parvis, sed densis & perpetuò virentibus: cortice cinereo, ligno rubro, maxime eius intima parte, siue corde, quod præstantius est, cuiusque maior copia à mercatoribus coëmitur, ita ut ex tam crasso caudice, quem vix tres homines amplecti possint, non excindatur matrix hominis coxa crassior. Arbor hæc neque fructum, neque gummi ullum profert. In Barbarorum regione, qui Canibales appellantur, provenit: multò præstantior in regione Morpiu, & promontorio Fric dicto. Inodora est, & insecturis tantum dicata. In eadem America nascuntur arbores quædam ligno luteo, ex quo enses fiunt, alix ligno purpureo, ex quo pulcherrima tinctura fieri posset, alix ligno candidissimo & tenerimo, nulliusque apud Americanos pretij.

ACAIOV.

CAP. LXXXIII.

Forma.
Theop. 2.
et lib. 9.

PARS illa Americæ quæ Anthropophagi illi tenent, quos Canibales appellant, maximam copiam fructuum, herbarum, radicum siccissimarum, earumque arborum producit, quas Acaiov vocant. Est autem arbor Acaiov folio Pyri nostræ, paulò magis acuminato, & extremo rubescente. Fructum edit pugni magnitudine, oui asserini figura, ex quo nonnulli potionis genus quoddam parant: quanquam is edulis non sit, sorbo nondum maturitatē perfectam adepro gustu similis. Huius extremo adnascitur veluti nux, maioris castaneæ magnitudine, leporini renis figura. Nucleus inclusus esui suavissimus est, modò ignem leviter attigerit. Cortex oleo totus madet, gustu acerrimo, ex quo Barbari maiorem olei copiam, quàm nos ex nucibus nostris, elicere possent. Illic alix reperiuntur arbores quarum fructus perniciosi sunt, in quibus est illa quæ Haouay nominatur.

DRACO

IN INSULA à Lusitania Medetia dicta, veteribus à quibusdam Drac-
bor auctore Theueto, ab incolis & Lusitanis Draco dicta, quæ hinc
anni tempore optimè gummi fundit, quod antiquissimi Medetici
appellant rectè ne an sècus, dubitari perforaro arboris super prope

DRACO arbor.



FOLIUM arboris sangui-
nis Draconis.




radi, em suis lato & profundo lacu. Præterea
fructum profert luteum, cerasi notum ma-
gnitudine, refrigerando corpori, & multo-
siti, in febre, ac in fumis ardoribus adu-
mum. Succus is huc gummi fundit, est, si-
cinnabari, sed diuersitate nate non distat: il-
lud enim liquor est, hæc solus, & ex Africa
solum deferitur, nam nos, conitar, quorum vix
reperitur, quæ pictorum intus coloribus sa-
tisfaciat. In ea tamen re statuenda ambam he-
sitat. Hoc enim gummi sanguinea Draconis
esse haud diffitetur, etsi ratio id admodum non
suadeat, nisi Africæ barbari unde primum de-
ferebatur hic liquor, arborem hunc fundentē,
lingua sua Draconem appellauit: non aude-
tamen affirmare plantam quæ hoc gumi emit-
tit, eam esse quæ in Africa nascitur, cum figura
differant. Tandem vtrumque id in esse illi per-
suaudent facultates & vires planè eadem: ut ab
his didicist quos diligenter percontatus est. Sed
nemini dubitandum sanguinem Draconis ar-
boris siue gummi, verum esse Cinnabari, quod
nos hodie ex insulis ananar, quæ olim Fortu-
natæ dictæ sunt, habemus, quodque Officinæ
sincerum & minime adulteratum vocant san-
guinem Draconi in lacrymis, à facit tio, quod
in ossa panis modo cogitur, distinguat. res.
Prius illud etiam Dioscor. sanguinem Draconis
a quibusdam existimari dixit, de quo & Plinius
hæc falsò tradidit. Milton vocant Græci mi-
nium, quidam Cinnabari: unde natus error
Indico Cinnabaris nomine. Sic enim appellant
illi saniem Draconis elisi elephantorum mo-
rientium pondere, permisso vtriusque anima-
lis sanguine. At Cinnabari minium non est,
sed liquor arboris quæ diximus, neque sanguis
siue sanies Draconis & elephant: iam enim
priscorum temporibus Arrianus in Periplo no-
uit Cinnabari lacrymam esse arboris. Et Ca-
damostus in libro Nauigationum narrat in in-
sula Portus sancti, vna ex Canariis, colligi san-
guinem Draconis, qui lacryma est arboris, quæ
stato anni tempore ferro vulne æretur, ex qua
plaga anno proximo fluebat gumi, quod æhe-
nis decoctum & desæcatum, sanguis est, quem

lib. 3. c. 10.

Lib. 3. c. 7.

Cap. 4.

FOLIUM arboris Draconis ex Indis delatum.



Vires.
Liscasog.

FRUCTVS Sanguinis Draconis.



Lib. a. stirp.
Hispa. ed.

Forma.



acido, magnitudine exigui Cerasi. Ex trunco per Caniculæ æstus humor emanat, qui in rubram lacrymam densatus, sanguis Draconis appellatur, ob ipsius arboris Draconem. Materia trunci firma est, ferrumq; difficile admittit, quod veluti fibris transversis & oblique excurrentibus constat. At rami cum mœtuo prægnâtes sint, facile cædi possunt. Hæc Clusius, qui solum quale Olysi pone

quem Draconis appellant. Fructum editum instar, gustu suauem, coloris cærulei (aliis lutei) Eius insulæ incolæ siluam Draconum vocant, & aduenas eam adeûtes huiusmodi nomine per iocum deterrent. Pena eius arboris folium depinxit, quale hîc intueri licet, ex Occidentis Indis delatum, coriaceum, cui simile aut par latitudine aut crassitudine vix vllum est. Ex Palmæ congeneri arbore euulsum videtur: quin ipsa tota textura asserem bieubitum latum, quaternos, aut quinos cubitos longum refert, regulæ modo fornicatum, media secundum longitudinem costâ, semidigitum crassa, carinatum, superna quasi præfectum esset, margine digitali, tenuiore, duriore elauditur. Vniuersum solum a summitate ad imum in villos quadâtenus similes, quæ obducunt nucem Indicam, aut capillitium Indis funibus aptum discerpitur, quemadmodum totum est testoriis ædium & storeis accommodum. Vim habet sanguis Draconis auctores in coride, hæmatite lapillo eandem: conueniunt oculorum medicamenta, verum efficacius magis enim adstringit, & sanguinem cohibet. Ambustis igni & papularum eruptionibus escerato medetur. His quæ dudum de hac arboris commentati fueramus, adiungere libuit ea, quæ de eadem Clusius obseruauit & nuper edidit. Hanc arborem primùm Olysi pone se vidit, anno salutis humanæ, 1564. post monasterium D. Virgini sacrum, cui nomen à Gram, monachis ignotam & neglectam. Est Draconis procera arbor, inquit, Pinum procul intulæ referens, adeo æquales semperque virentes ramus habet. Huic truncus crassus, valde scaber, multis ramis dehiscens, octo aut nouem bieubitales ramos æquales & nudos sustinet, qui narses in summo finduntur in alios ternos aut quatuor ramos cubitales, aut paulò ampliores, brachialisque crassitudinis, etiam nudos, ex quibus capitibus folia prodeunt cubitalia, maiusculi pollicis latitudine, in medio densiora, & eminentiore quodammodo costâ, veluti Iridis folia, tenuia & rubentia in lateribus, mucronibus planè referentia, semper virentia. Fructum profert colore flauescentem, sapore aliquantulum

vidit, descripsit Pena multò grandius & habitius, ex India delatum. Iis fabulam, opinor, affinxit Nicolaus Monardis, cum scripsit ex Noui orbis cōtinenti allatum ab Episcopo Carthaginienſi fructū arboris ex qua manat lacryma illa, quā sanguinem Draconis vocant, cuius fructus sublata cute illico Dracunculus apparet, tanto artificio à natura fabricatus, vt à peritiſſimo aliquo artifice in marmore ſculptus videatur, collo oblongo, ore hianſe, ſpina aculeis horrida, cauda oblonga, & pedibus ſpiciuis. Id quod in fructu eiufdem arboris ſe vidiffe negat Cluſius, qui fructum aſſetis ſe habuiſſe Ceraſi magnitudine, rotundum, læuem, tenui pelle contectum, qua ſublata nucleus totus offeus conſpiciebatur, ſine vlla animalis, nedum Dracunculi effigie. Adhæc idem Nicolaus arborem ſcribit eſſe cortice ſatis tenui, & qui facile incidi poſſit, cui prorsus repugnat à Cluſio tradita deſcriptio.

Lib. ſimpl. Occid.

In Schol. in Nucl.

AGNVS SCYTHICA, BORAMETZ. CAP. LXXXV.

SUPERIORA Indum putes, prævt eſt admirabilis Tartaricus frutex, inquit Scaliger. Tartarum horda primaria Zanolha eſt, vniuerſiſſimæ nobilitatis commendatione. In eo agro ſerunt ſemen, ſeminis melonis ſimilimum, ſed minùs oblongum. Ex eo ſatu planta exit, quam borametz, id eſt, Agnum vocant. Creſcit enim agni figura, ad pedum ſerè cernum altitudinem: quem pedibus, vngulis, auribus, toto capite, præterquam cornibus repræſentat. Pro cornibus pilos gerit ſingularis cornu ſpecie. Obducitur corio tenuiſſimo: cuius detractū vſus ad tegmina capitum incolis. Ferunt internā pulſam gammari referre carnes. Cæterum è vulnere quoque ſanguinem manare. Dulcedine eſſe admirabili. Radicem humò exertam ſurrigere ad vmbilicum vſque. Illud miraculi fouet magnitudinem. Quandiu vicinis obſidetur herbulis, tandiu viuere, quaſi agnum in læto paſcuo. Abſumptis illis tabeſcere, atque interire. Idq; non ſolùm vel caſu, vel tractu temporis, ſed etiam experiundi gratia, ſubtractis, atque ablatis euenire. Quin illud auget admirationem, appeti à lupis eam, non item ab aliis beſtiis, quæ carne veſcantur. Hoc quaſi condimentum, atq; intritum, ad fabulæ & agni alluſionem. Illud ſcire velim, inquit Scaliger, ab vno ſtipite quatuor diſſita crura cum ſuis pedibus, qui poſſint prouenire atque produci. Eadē Sigismundus Liber refert in ſuis cōmentariis De rebus Maſchoitarū.

Exer. 184. 29.

Forma.

ARECA PALMA SCRIPTORIA, TAL.

Arbor maximus foliu. CAP. LXXXVI.

EST Palmæ ſpecies gracilior, procera, foliis læuiſſimis. Inter quæ racematim hærent poma, nucum magnitudine, alba. Fructus is pro bellariis manditur à potentioribus. Areca nomen eſt. Fertur in mercatus, magna æſtimatione recens. Seruatur & in modum palmularum ſiccata. Vartomanus Areca vocat arborem, fructum Coffol, Ludouicus Romanus lib. Nauigat. 5. cap. 7. Chofolo vocat, Garcias lib. 1. cap. 15. Hiſtorix Aromaticum Indic. Fauſel & Arecam, de quo multò plura ſuprà hoc ipſo libro diximus. Sunt & humiſſa Palmeta, inquit Scaliger, folio tam politæ ſuperficiæ, vt eo pro chartis vtantur ad ſcribendum. In Prouincia Mangi arboreſt Tal nomine, folio grandi quod chartæ vſum præbet in tota India. Fructus proſert magnis Napis ſimiles. Quod cortici ſubeſt tenerum eſt, dulce, eſu gratum: cortex tamen melior & ſuauior à quibusdam Vguetal nominatur. Nicolaus Coſtinus prodidit haud procul ab vrbe Cæſi reperiit vniones. Ibidem naſci arborem ſine fructu, cuius folia ſex btachia ſunt longa, totidem lata, adeò tenuia, vt compreſſa comprehendī manu poſſint, quibus chartæ vice vtuntur ad ſcribendum, & ad pluuiam

Exer. 185. 6.

Forma.

Vſus.

Exer. 186. Nic. Coſt. itine.

Forma.

Theoſ. T. 1. Coſmog. lib. 1. ca. 24. in inner.

Forma.

Vſus.

pluuiam arcendam: folio enim expaffo, tres quatuorve in itinere ita operantur, ut pluuias non metuant.

GUIABARA, COPEY. CAP. LXXXVII.

Lib. 3. cap. 13.
& 14.

Nomina
Forma.



Lias duas papyraceas arbores hic defcribimus ex Ouiedo, quæ in infula Hispaniola proueniunt. Minor *Guabara* Barbaris dicitur, Hispanis *Uuero*, ab uua, quod pro fructu uuas ferat. Materia est uelut belcente, rotunda, densa, atque ideo optima, præsertim ad carbonem ramis expansis. Uuas edit rarius sparsas, atque à sele disitas, roseæ aut mori concolores, exigua carum parte esculenta: nam acini sunt auellanzæ nucis magnitudine, nucleum tam crassum cõcludentes, ut parum carnis supersit. Folij figuram hic depictam uideris, ab aliorum arborum folijs planè diuersam, atque ideo memoratu dignam: maximum palmæ manus magnitudine par est, dempto pediculo. Id Hispanis in infula Hispaniola & finitimis bellum gerentibus papyri & aramenti usum præbebat: tota enim hæc regio charta ad scribendum & aramento prorsus caret. Foliū istud viride est, aliquando rubrum, crassum & æquè spissum ac duo *Hederæ* folia simul. In parte tam prona quàm supina literas pingunt acicula, aut stylo aliquo, modò recens esset, & eodem die decerptum, quæ candidæ apparebant, ita diuersi à folio coloris, ut faciliè legi possent: que enim foliū literas transmittit, & costa per medium eius excurrens et si crassiuscula sit, tam venulæ ab ea deductæ sunt tenues: ut scribens manum nihil aut parum remorentur. Alia papyracea arbor *Copey* nuncupata in eadem uia crescit, *Guabara* procerior, folio specie quodam simili, sed duplò maiore, crassiore, & ad scribendum aptiore cum acicula aut stylo aliquo, venulæ exiliiores sunt quàm superioris, & minus obstanti impedimentum adferunt. Quamobrem cum Hispaniolam & ceteras insulas Hispani sibirogarent, iis foliis chartarum lusoriarum vice utebantur, quod in iis Regum, Reginarum, equorum, & aliorum huiusmodi figuras faciliè imprænerent, nec faciliè rumpantur.

FOLIUM *Guabara*.



FOLIUM *Copey*.



ARBOR FOLIIS AMBVLANTIBVS.

CAP.

LXXXVIII.

Pigafet. in
im.
Forma.
Vis mi-
ra.



NSYLAR *Cimbubon* vicina est alia, in qua nascitur arbor, cuius folia, cum in terram deciderint, gradiuntur perinde ac si uiuerent. Ea Mori foliis multum similia sunt, parte utraque binos pedes breues, & acuos habent, quibus abstractis sanguis minimè manat. Statim acque foliū quis atigerit, illud mouetur & abit. M. Anton. Pigafet. 8. octo dies vnum in scutula habuit, quod cum tangeret, circa scutulam ibat: nullaque alia re quam aëre viuere exilimabat.

IN medicamentis & stirpibus Indicis nobis incognitis non abs re fore duxi, inquit Garcias lib. 2. Arom. Hist. cap. 1. initium facere ab arbore quadam, quæ nō nisi à Solis occasu vsque ad eius ortum floret, interdiu minime. Arbor est Oleæ magnitudine, foliis Pruno similibus, flore noctu (dum scilicet floret) odoratissimo, nullius quod sciam vsus propter teneritatem, nisi quod stotum pediculis, qui lutei sunt, huius vrbs incolæ vtuntur cibus tingendis, siquidem Cypri modo inficiunt. Et volūt etiam nonnulli aquam stillatitiam florum, oculis vtilem esse admoto lineo panno hac intincto. Peculiaris est hæc arbor Goæ, quam è Malaca allatam asserūt. Eam sane nusquam alibi per Indiam vidi. Hanc Goæ *Parizataco*, in Malayo *Singadi* vocant. Arboris tristis nomen illi inditum, quòd duntaxat noctu floreat. Fabulantur aurem indigenæ, Sarrapæ cuidam nomine Parizataco elegantem fuisse filiam, quæ cū Solem deperiret, eam ille compresserit. Cū vero postea illam relinqueret alterius amore irretitus, Parizataci filia præ amoris impatientia sibi ipsi mortem consecuerit. Ex cuius crematæ cineribus (nam adhuc vruntur in hac regione cadauera) hæc nara est arbor, cuius flores adeò Solē exhorrent, vt eum videre non sustineant. Hactenus Garcias. Pretium verò operæ fuerit audire quæ de eadē planta Christophorus Acosta Africanus, Medicus, refert. Is igitur libro Aromaticum & medicamentorum in Orientali India nascentium, Arboris Tristis natales & qualitates ita describit, & quamdam iconem repræsentat. Nonnullis Indiarum locis, præsertim verò in Malabar frequentissima nascitur arbor quædam, magnitudine & forma ferè Pruni, nullis prædita tamis tenuibus, & certa per spacia nodulo distinctis, è quo vtrinque singularia folia enascuntur Pruni foliorum magnitudine, mollia & lanuginosa parte auersa, quemadmodum fere Saluæ folia, & viridia nonnihilq; aspera parte interiore, nō adeò serrata in circuitu, vt Pruni folia, neque tam multis venis prædita. E' singulorum foliorum sede nascitur pediculus quinq; capitula summa sui parte sustinens, quæ quatuor foliis subrotundis cōstant, è quorū medio quinque flores exiliunt candidi, elegantes, Aureæ mali floribus magnitudine & figura pares, tenuiores tamen, elegantiores, & odoratiore, pediculo magis ad rubrum quàm ad flauum colorem tendēte, quo in illis regionibus edulia ringunt, quemadmodum apud nos vulgò fir Croco: fructus magnitudine lupini est, vitescens, cordis effigie, per medium secundum longitudinem sectus, continens in vtraque parte quoddam receptaculum, in quo semen occluditur, magnitudine seminis Ceratij siue Siliquæ, cordis effigiem retinens, album, tenerum, membrana subuirente tectum, nonnihil amarum. Vocatur hæc arbor in Canani *Parizataco*, in Malayo *Singadi*, in Decan *Pul*, ab Arabibus *Guart*, à Persis & Turcis *Gul*. Res est profectò obseruatione dignissima, conspiciere hanc elegantissimam arborē nocte pulcherrimis, suauissimèq; olentibus floribus onustam & hilarem, & simul atque à Solis radiis illustratam, non modò flores omnes in terram abiicere, sed totam arborem cum suis foliis quodammodo marcidā apparere. Inter omnes sanè quos vnquam odoratus sum flores nullum meo iudicio memini cum hoc comparandum, præferrim initio dum quis repente locum ingreditur vbi hæc arbor est constitit: nam postquàm manu contacti sunt, exiguis & euanius est odor. Indigenæ istos flores cor reficere censent, sed amariusculi sunt: nam recenter ex arbore collectos & in cibus degustavi, & nonnullam amaritudinem semper deprehendi. Gentiles etiam medici eius semen inter medicamenta cor reficientia recensent. Multi proteges, tribuni, arque alij priuati hanc arborem in Lusitaniam transfere voluerunt, sed irritò conatu. Noui etiam quosdā qui semē cōmodo tempore collectum

Forma
ex Gar-
cia.

Nomina

Acosta
descripio

Nomen
clatura
varia.

Odor.

Florum
vires.

ARBOR *Tristis, Acofta.*ARBORIS *Tristis* ramus
cum flore & fructu, *Clusij.**Mogli.*

ris Indicæ cuius flores odoratissimi aperiuntur, & oriente Sole decidunt: quibus
notis maxime ad arboris *Tristis* historiam accedit,

& maturum, vasculis figulinis vitratis atque bene obrutis, item argenteis, pyxidibusque ligneis in Lusitaniam detulerunt, ibique cum omni cura & diligentia seuerunt, sed nunquam nasci voluit. In Malabar autem & Goa, locisque vicinis cum tanta facilitate nascitur, ut quilibet rami in terram depacti comprehendant. Hæc ille, ut Hispanica eius quidem verba interpretatus est Clusius. Qui & ipse harum rerum studiosissimus, quæ ab ornatisimo viro multisque peregrinationibus claro, Dn. Fabricio Mordente Salernitano, qui aliquot annis Goræ vicinisque in India locis vixit, familiaribus sermonibus acceperat, quia publicè omnibus communicauit, eorum te hic etiam vsu & voluptate fraudare nolumus, præsertim cum ex rami cum suis floribus ab ipso expressis collatione cum *Acoftæ* delineatione facta, non parum rota huius plætæ historia illustretur. Assurgit, inquit, ea arbor interdum ad trium hominum altitudinem, iustamque crassitiem adquirens: amos habet multis alis concauos, & folus Myrti foliis quàm similimisonustos: in tenerioribus ramis nascuntur flores pediculis ex foliorum interna sede prodeuntibus inhzrentes, copiosi, hoc est, terni, quaterni, aut plures simul terè congesti, candidi, lasiniini floribus formamagnitudinèque pares, foliisque macronatis, ut illi, constantes, sed pleniores multiplicesque foliorum textura, odoris fragrantissimi, & haud multum à lasiniini florum odore dissimilis. Notum autem solent ij flores explicari, & oriente Sole, simulatque ab ipsis radiis illustrari incipiunt, ilico decidere vel antipathia quadâ, vel præ nimia succi renuitate, quem solares radij absorbunt: nam quos Sol non attingit, diutius in arbore hzere solent. Studiosè verò colliguntur ij flores propter odoris fragrantiam, & vitreis organis odoratissima ex illis aqua elicitur, quæ aqua de Mogli dicitur asserente Fabricio, quoniâ Malauarica lingua arborem *Mogli* vocant, floresque idem nomen mutuati sunt. Eius fructum obseruasse negat quem verò adpingi iussimus, sub finem anni 1579. missus est Viennensi cuidam mercatori pro fructu arboris



ADMIRATIONE prorsus dignum est, quod se ab eodem Fabricio Clusius acceperisse ait de arbore, quam Ficum Indicam ipse appellat: quamque nos, ut ab illo depicta est, hic representari curauimus. Sed quandoquidem, inquit, in Indicarum arborum narrationem incidimus, silentio minime premendam duxi miraculo verè dignam eam arborem, de qua idem Fabricius apud me verba fecit. In magnam altitudinem vnico trunco ooque admodum crasso assurgere solet ramos deinde in omnia circum latera expandit, qui tenues quasdam fibras siue filamenta, qualia in Cuscuta vulgò nuncupata conspicimus, coloris, dum recentia sunt, cerei siue aurei demittunt. His, ubi terram attigerint, firmantur, nouamque quasi prolem generant: etenim magnam crassitiem paulatim adquirunt, & veluti in nouos arborum caudices transeunt, qui nouos rursus summa sui parte in latera ramos spargentes, nouis denuo fibris deorsum missis sese propagant. Sic alij deinceps rami in infinitum, ut interdum vnica arbor suis propaginibus integrum ferè miliare Italicum in ambitu occupet, sitque difficile, quæ primaria sit arbor, siue omnium istarum prolium parens diiudicare, præterquam ex trunci amplitudine, quæ nonnunquam in matre tanta est, ut trium virosum vlmis vix apprehendi queat. Verùm non modò inferiores rami siue fibras spargunt, sed etià in arbore summi: ideoque vnica arbor densissimam siluam efficit. Sub eas autem arbores adiūm sibi paraturi incolæ, hbras iam in truncos conuersas, tenuiores scilicet, excindere solent, atque ea ratione veluti concamerationes & umbracula facere arcendi caloris gratia: adeo enim densis ramulis reliqui maiores ramus luxuriat, ut Solis radij nulla ratione penetrare queant: imò concaui istarum fornicum multiplicésque sinus scindunt inæqualiter inde refulgentem aëra, quæ causa est ut Echo multis in locis ter atque etiam sæpius humanas voces reddat. Vidit verò, qui mihi referebat, interdum octingentos aut mille viros, quo in numero ipse fuisset, vniushuiusmodi arboris umbra regi atque affirmabat terna etiam hominū milia sub tali arbore latere posse. Folia fert in nouellis ramis Mali coronæ folijs similia, supernè viridia, infernè candicantia, & lanugine, uti illa, pubescentia, quæ mirum in modum ab Elephantis expectantur, ideoque in eorum pabulum cedere solent. Fructus extremi pollicis articuli magnitudine, sicubus exiguis similis, colore foris & intrus sanguineo, granisque, uti vulgares ficus, plenus, dulcis quidem & edulis, verum saporis minus grati quàm illæ: nascitur autem inter folia, quemadmodum vulgares ficus, hoc est in nouellis ramis, quæ parte folia illis inhærent. Prouenit in insula Goa, locisque vicinis. Dispicendum superest an veteribus cognita non fuerit hæc arbor, eiùve historia literarum monumentis tradita, quandoquidè illam Indix partem Alexandri Macedonis victor: & Europæis etiam hominibus aperuerunt. Q. Curtius lib. 9. Histor. rerum ab Alexandro gestarum, refert, Alexandrum Poro rege, & Hydaspæ amne superato, ad interiora Indix processisse. Siluas

Forma.

Ficus Indica: nota amplitudo

FICVS Indica.



Fructus.

An veteribus cognita fuerit.

autem fuisse prope immensum spatium diffusas, procerisque & in extensam altitudinem editis arboribus umbras: plerosque ramos instar ingentium stipitem flexos in humum, rursus qua se curauerant erigi, adeo ut species esset non rami resurgentis, sed arboris ex sua radice generatæ. Plinius verò lib. 11. naturæ Hist.

Ficus Indica Plinij.

cap. 5. de Indicis arboribus agens, in hæc verba scribit. Ficus ibi exilia poma ferit. Ipsa se semper serens, vastis diffunditur ramis: quorum imi adeo in terram incuruantur, ut annuo spatio infigantur, novamque propaginem faciant circa parentem in orbem quodam opere topiario. Intra septem eam æstivant pastores, pascunt pascunt & munitam vallo arboris, decora specie subter intuenti, proculve, sunt quo ambitu. Superiores eius rami in excelsum emicant siluosa multitudine, vitiis tris corpore, ut sexaginta pedes plerumque orbe colligant, umbra vero bifida operiant. Foliotum laritudo peltæ effigiem Macedonicæ (quæ à Xenophonte dederæ folio comparatur) habet: ea causa fructum integens crescere prohibet, rariorque est, nec saxeæ magnitudinem excedens, sed per folia folibus coctus præcipue tempore, dignus miraculo arboris. Gignitur circa Acelsem maxime annis.

Indica arbor admirabilis.

& lib. 7. cap. 1. Hæc (inquit) facit vbertas soli, temperies cæli, aquarum abundantia (si libeat credere) ut sub vna Ficu turmæ condantur equitum. Strabonem Geograph. lib. 5. similem etiam arborem describit, tamen si nullo nomine in finem, ut verbis. India multas quidem admirabiles arbores fert, è quibus est, cuius rami ad terram propendent, foliis non minoribus clypeo. Onesicritus curiosius ea, quæ sunt in Musicana terra Indiæ australissima, refert arbores quasi inanes esse, quarum rami cum ad duodenos cubitos creuerint, reliquum incrementum primum facit, deflecti quousque terram contingant, deinde terram subeant, ac cesagant veluti traduces, mox rursus in truncum exeant, à quo postquam auerterint, eodem modo flectantur, & aliam propaginem efficiant, rursusque aliam: sic deinceps, ut ab vna arbore longum umbraculum fiat, tabernaculo multis columnis nitenti simile. Ex quibus descriptionibus facile cuius colligere licet, eam arborem, de qua nobis institutus est sermo, illos auctores intelligere voluisse. Sed diligentius presiusque Theophrastus, qui Alexandri coætanus fuit, quique haud dubie eorum narrationes curiose excepit, qui sub Alexandro in Indica expeditione militauerunt. Is enim simili planè modo, paucis duntaxat notis variatibus Indicam describit, qualis illa arbor est, cuius historiam ex Fabrij narratione didimus. Plantarum igitur historiarum lib. 4. cap. 5. sic ait. Indica autem regio arborem Ficum vocatam fert, quæ è ramis radices demittit singulis annis, ut primo volumine retulimus: demittit autem non ex nouellis, sed ex anniculis, atque etiam verustioribus. Illæ se terræ coniungentes, ceu septem circum arborem faciunt, ita ut veluti tabernaculum condatur, quo etiam morari homines solent. Radices autem nascentes evidentiissimè à ramis discernuntur: sunt enim candidiores, hirsutæ, (διαιρέται) tortuosæque, binæque fronde foliatæ (διεφολωται). Item arbor comam supernam lasciuam gerit, (ἡ ἄνω τῆς αἰνῆς καὶ ἀνὰ πάλαν) totaque fornicato ambitu pulchrè orbiculatur, & magnitudine vehementer excelsit: quippe umbram bino stadio facere fertur: & crassitudine caudicis plerasque ultra quam sexaginta graduum (ἑξήκοντα) pedis vestigiorum orbem colligere, magna verò ex parte quadraginta.

Ficus Indica Theophrasti. Cap. 12.

Folium pelta non minus habet, (potius ad similitudinem quam ad amplitudinem referenda hæc comparatio) fructum admodum paruum, magnitudine cicero, sicut similemquam arborem Græci Ficum eam arborem appellabunt. Paucos vero admodum fructus fert, non tantum pro arboris magnitudine, sed etiam omnibus rebus. Nasctur arbor hæc circa Acelsem annum. Hactenus Theophrastus. Cum itaque tam multis notis Ficus Indica à veteribus descripta, cum admirandæ huius arboris in India nascentis (cuius nomen vulgare sibi excidisse serio dolet Fabricius)

historia conueniat, eo audacius illi Ficus Indicæ nomen indidi, præsertim cum illam ipsam esse certò mihi persuadeam. Garciam autem illius nullam mentionem facere inter tot exoticas arbores locis Goanæ insulæ vicinis nascentes, quarum descriptiones in Aromatum historia aspersit, satis mirari nequeo. Nos porro iconem ex Fabricij narratione, quàm concinnè ex ipsius etiam iudicio fieri potuit, adumbrare iussimus in studioforum rei herbariæ gratiam. Cæterum cum hac arbore cognationem habere videtur, quam Ouedus Indicæ historiæ lib. 9. describit his verbis Latine ex Italico expressis. Mang'le arbor est inter eas quæ in occidentali India vulgò nascuntur selectissima, cum ad ædificiorum fabricas, tum ad reliqua fabrilia opera. Crescit vlginosis locis, littore maris, & ripis fluminum torrentiumq; qui in mare dilabuntur: folia habet Pyri maioribus foliis similia, crassiora tamen, & aliquantum longiora: siliquas duorum palmorum longitudinis aut maiores, crassasq; Cæsiæ solutæ fructui pares, fusci coloris, pulpam medullæ osium similem continentes, qua Indi aliorum eduliorum penuria vescuntur: etenim sacis amara est, salubrem tamen cibum esse ferunt. Ego eius nihilominus esu in morbum incidi, licet adeo delicati palati non sim, nec ab iis cibis abstinere in penuria soleam, quibus alios vesci video: imò etià nulla urgente penuria degustare soleo, vt commodius describere queam: eaq; ratione hunc fructum degustavi, sed beutorum animantium & siuestrum hominum potius cibus est. Admiranda est eius natura, plurimæ enim simul crescunt, multæque eius rami deorsum vergere & in radices conuerti videntur: nam præter plurimos quos erectos foliisque onustos atq; ab inuicem seiunctos vt reliquæ arbores habet, multis etiam aliis cum crassioribus tum tenuioribus aphyllis sese ad aquam vsque demittentibus, & sub terra aut arena radices tigentes prædita est, qui vbi apprehenderint, alios ramos sursum vergentes profecerunt: non enim minùs sitimenter hærent quam prinarius arboris truncus, sic vt arbor multis caudicibus simul connexis constare videatur, egregio sanè spectaculo, & singulari huius arboris natura.

Mang'le arbor.

ARBOR FARINIFERA. CAP. XCI.



NOTISSIMA est & omnium ore celebrata nobilis illa Francisci Drake Angli recens vniuersi orbis circumnauigatio. Is cum superioribus annis ab ea expeditione reuersus forchibus auspiciis in Angliam omnium stupore, nec minori cum fauore & gratulatione appulisset, Carolus Clutius, qui ea in insula tunc temporis fortè agebat, & ipse rerum novarum audiendum studio & cupiditate incensus, his, qui eundem in illa nauigatione comitari erant, sese vt applicaret operæ dedit, adq; ipsum adeo præfectum Drake sibi parauit aditum: à quo exceptus perhumaniter, quorum addiscendorum desiderio tenebatur, omnia ea beneuolè & pleraque alia scitu dignissima ipsius ex ore accepit, quæ cum eiusdem comitū & grauiū alioquin & fide dignorum relatione omnino consenserint. Horum ego omnium, tum aliorum quorundam exoticorum fructuum, quos in Britannica ista peregrinatione acquisiui, breues descriptiones, & nonnullorum etiam icones in rei herbariæ studioforum gratiam exhibere, inquit, volui, non minùs gratas eis futuras sperans aliis lucubrationibus prius in lucem à me editis. Hæc de nouis suis plantarū aliquot descriptionibus Clusius, quas nos pro instituto nostro ex Notis, quas in Garcie Aromatum historia post tertiam editionem idem conscripsit, desumpsi, desumptis ipsius Clusij verbis aliquot capitibus hic apposuimus: quibus Arboris, quæ Farinifera vocat, Fructus Beretini, & accao, Vinterani corticis, Drakenæ radicis, Variorū præterea fructuum peregrinarum iucundissima continetur historia. In Tarenate ergo, inquit, insula

Beretini fructus historia.

ARBORIS *Farinifera,*
Pani fragmenta.



Æquatori proxima ad Arcticū polum vergente nascitur arborea quædam planta, cuius truncus humanæ coxæ crassitiem æquat, decem pedum altitudinem attingit, summo fastigio in orbiculatum caput Brasiliæ capitatæ instar extuberans, in cuius mediotulio natura quandam candidam farinam produxit ad illius insulæ homines tenuioris fortunæ sustentandos: eam etenim diligenter colligunt, deinde adfusa, siue inspersa potius modica aqua fermentant, pin-sunt, & in formulas quasdam cocti in late constantes immittunt longa serie, atque per æ-censis circūquaque admotis & superetana impositis coquunt. Sunt verò ij panes siue placen-tæ interdum palmares, vnciali crassitie, quibus illius insulæ incolæ calidis & recenter coctis vescuntur: ubi induruerunt tepida aqua macerantes pultis modo edunt. Insuper di saporem esse, cum degustarē, hic panis mihi visus est. Vbi injecto Piperis aut Cinnamomi momētum saccharo, nonnullis delicis esse queat. Eiusmodi panis bina fragmenta qualia nostri Morgani opera accipi, hac tabella exprimi curauimus.

FRUCTVS BERETINVS. CAP. XCII.

Arboris
Beretinis
Forma.



IN EADEM insula celsissimas inuenerunt arbores Quercu maiores, foliis laurinis, crassis, splendentibus, & minimè in ambitu ferratis, quæ oblongiusculum fructum ferūt, exiguis ilignis glandibus similem, nullo tamen calice, ut ipsi referunt, inclusum, cortice tenui cinereo, interdum atro, rectum, nucleum continentem oblongiusculum, candidum, nullo (dum induruit) manifesto sapore præditum, tenui membrana rectum.

FRUCTVS Beretinus.

Fructus
Vfus.



Similibus arboribus abundat Beretina insula illi vicina, ad quam postea delari sumus: cuius in illis illarum arborum fructum, quem prius non attigerant, edulem esse didicerunt. Eo deinde more leguminum elixo, aut in farinam coctulo, & pultis modo cocto & inspissato, alterius cibi penuria cum in ea insula, tum in naut famē subleuarunt. Eam arborem etiam alunt omnes Moluccæ insulæ. Eum porro fructum, cuius iconem hac tabella exprimimus, cum C. V. Dn. Richardus Garth Cancellariæ Londinensis Primicerius,

vir insigni pietate & doctrina præditus, atque humanissimus, & optime de me meritis, tum uoster Morganus, mihi liberaliter communicarunt. Eorundem munere librum arboris habui, tenuissimæ membranæ instar candidum, quo omnis generis scriptura perinde atque vulgari papyro excipi queat. Eum in laua insula aliarum mercium permutatione Drake comites acceperant

CELEREM etiam per vniuersam Americam multiq; vñs fructum, Peruanæ prouinciæ litora legentes, secum detulerunt, *Cacao* appellatum, cuius cum luculenta descriptio apud Benzoniem extet, qui miles aliquot annis Noui orbis prouincias peragrauit, ipsius verba, vt ab Vriano Calueto Latina facta sunt, hic subiicere libuit. In Nicaragua Noui orbis prouincia pomi quoddam genus peculiare est, neque Hispaniolæ, neque vlli alicui Indiarum parti concessum. Pyri nostri specie ferme est, ligno in exte-riore rotundo, nucis crassitudine, & dimidio amplius, optimi & iucundissimi saporis: arbor proceræ, exiguis foliis vestitur. Hispani cum primùm eam prouinciæ subegerunt, propter vberissimam omnium rerum ibi repertam copiam, eam Paradisum Mahumetis nuncuparunt. Duo inter cætera fert hæc tellus nulli præterea Indiarum regioni concessa, excepta Guattimala, Hondurensis prouinciæ & Mexici finibus, totòque nouæ Hispaniæ tractu. Vnum pauonum quoddam genus est, qui in Europam translatus vulgò Gallinæ Indicæ vocantur. Alterum, id quod *Cacaute* vulgò vocant, quod monetæ vñs illis præbet. Id fert arbor modicæ magnitudinis, nec nisi calido loco & opaco viu-rit. Simul ac sole tactum est contabescit: itaque ferè in siluis vmbroso & humido loco feritur: neque id satis, sed iuxta eius generis arborem aliam editiorem plantant: quæ simulac adolefcere cœpit, eius cacumen ita concinnant aptantque, vt adulta ea arbor Cacaute inumbret, defendatque ita ab æstu, vt Solis radius lædi non possit. Fructus amygdalarum speciem referens, siliquis quibusdam velut cucurbitis ineluditur, crassitudine & latitudine Cucumeris, annuo spatio maturarescit. Matutas eas vbi legere, excussis folliculis fructum super storeis expansum ad solem exponunt, donec humorem exudauerit. Porum ex eo confectum, in testa fictili ad focum exsiccat: mox lapidibus, quibus pinsitur panis, contusum & comolitur, fufumque in pateras (quæ cucurbitæ specie è certis arboribus per omnem Indiam enascuntur) paulatim aqua temperant, atque interdum paululo pipere, quali vulgò vtuntur, coniunt, eoque in potu vtuntur. Porcorum ea verius col-

Pomi Ni-caraguz.

Paradisus Mahumetia.

Cacao huius Rona.

C A C A O .



luues quàm hominum portio. Quum eam prouinciæ peragrarem, plusquàm integrum annum ab tali lora abhorruui: sed quum mihi vini copia non esset, ne semper aquam bibere cogerer, alios imitari didici. Ea cælia sapore aliquantùm amaro, satiat & refrigerat corpus, minimè tamen inebriat hæc præcipua & carissima merx earum regionum est: neque quicquam aliud Indi maiore in pretio habent, vbi quidem in vñs est. Hactenus Benzo. Amygdalæ planè similis est hic fructus suo putamine exemptæ, membrana tectus tenui, nigra, nucleò, qui in binas aut ternas partes diuidatur, subfusco & cinereis venis distincto, adstringentis & ingrati gustus: quare non mirum est, si qui primùm degustant à potione ex eo confecta abhorreant, ego profectò puram aquam longè prætulim. Eam tamen claris hominibus propinant, vt nos aromatites vinum solemus, referentibus iis qui pauculos fructus retulerunt, è quibus binos habui.

Vvinteranus
cortex huius.

Forma.

VILHELMVS Vvinterus, qui generosum Franciscum Drake ad Magellanicum vsque fretum comitatus est, nec ulterius progressus, nauim cui præerat in Angliam anno 1579. reduxit, collectum istuc corticem retulit, vilioti Canellæ tum substantia, tum colore non

VVINTERANVS cortex.

Vires.



admodum dissimilem, plerumque tamen crassiores, & parte externa vel cinereum, vel aliquando etiam fuscum, & vlmei corticis modo scabrum, interna nonnunquam dissectum & multis rimulis hiantem vt Tilix cortex, interdum etiam admodum solidum & durum, odore non ingrato, sed gustu perquam acti, & linguam faucibusque non leuius vrentre quam pipet. Illius facultates nullas exploratas habuit: sed eo, dum recens esset, partim melle condito, vt acrimoniâ deponeret, partim resiccato & in pollinem trito, vt in eduliis Canellæ aliorumque aromatum vicem præberet, vsi sunt quia nauim vehebantur. Postea tamen intellexi aduersus stomachacis siue scorbuti morbum, quo eorum nonnulli in illa nauigatione affecti fuerant, optimo successu vsos esse. Plurimum mihi accedere videtur ad Ligni aromatici corticem, cuius D. Monardes in Simplicium historia meminit, tametsi singularem illam odoris fragrantiam, quam suo cortici tribuit, in hoc deprehendere non potuerim.

DRAKENA RADIX. CAP. XCV.

Drakenæ
radicis huius.

Forma.



SEMPERUALI plerumque crassitudine prælongaque hæc radix est, subinde in nodos & inæqualia capita extuberans, & in summis capitibus, veluti è crassis squamis contexta, Dentariæ enneaphylli (quam in Pannonica describo) modo, foris nigricans, & rugosa dracæque cum resiccata est, intus alba: fibris tenuibus sparsim nascentibus prædita, interdum maiusculis fractisque contumacibus, è quibus alij nodi dependent. Nullo manifesto odore polere deprehenditur sed gustu non nihil adstringente & linguam exsiccante initio esse videtur, deinde diutius præmanfa, tenuem suauemque acrimoniâ in ore relinquit. Magnam affinitatem habere videtur cum Radice S. Helenæ, de qua D. Monardes in lib. Simplicium è Nouo orbe delatorum. Sed cum M. Eliot qui Dn. Drake comes fuit, Hispanos in Peru maximo in pretio habere, nec pretio redimi posse referat, ab illis que didicisse folia præfens venenum esse, ipsam autem

autem non modò illius, sed reliquorum etiam venenorum antidotum esse, atque cor & vitales facultates roborare, si pollinis modo trita, manè ex pauxillo vino albo hauriatur, ex aqua verò febris ardores mitigare. Earum facultatum ratione, valde conveniret cum radicibus venenis aduersantibus, de quibus eodem libro Monardes: in his tamen aromaticum saporem & caloris gradum desidero quem iis radicibus tribuit. Ipse Drake sanè cùm mihi eas, quas hic exprimo, cum Petuano lapide Bezar donaret, summæ esse æstimationis apud Peruanos asserbat.

VARII FRUCTVS PEREGRINI. CAP. XCVI.

DONATOS sibi ab amicis, cùm Londini esset anno 1581. peregrinos alii quor fructus, refert idem Clusius. Horum, inquit, maior ex eo genere est, quod in annorariuncula ad caput 26. lib. 1. Historiz Aromaticum secundo loco descripsi, sed longè amplior, utpote qui ternas vncias longitudine superet, crassitie vnam, altitudine duas ferè æquet, alioqui forma & colore eidem planè similis: nempe crasso cortice seu putamine constans, inferiore parte sessili, rugoso, scabròve & cinereo, superna autem & gibba leui subrufo, vel potiùs spadiceo, ita ut anima' culum duro corio tectum videatur. Prægnans est, & nucleum intus continet duas vncias longum, vnam larum, geminum, extrema parte simul coherentem, tenui cinereâque membrana tectum, materie firma ut amygdalæ aut castaneæ recentes, subfusca, pingui, & oleaginosa, odore faris iucundo prædita, & gustu non ingraro. Eum accepit Lusitanus quidam mercator Petrus de Frias nuncupatus à prouincix Peru Prorege, pro fructu illius arboris in Nouo orbe nascentis, ex qua Balsamum elicitur, cum ipso Balsami oleo. Verum, si D. Monardis descriptioni credendum est, longè minor est Balsami fructus. Consule finem capitis 8. ipsius Hist. Simplic. ex Nouo orbe delatorù, quam pridem Latinam fecimus. Alter nucis iuglandis ferè magnitudine est, extrema parte latiuscu-

Balsami
fructus.

BALSAMI fructus.



lus, totus rugosus, atque ut nucis iuglandis putamen inæqualis, niger, sed magna ex parte veluti crusta quadam durissima & cinerea tectus leuis est & minime ponderosus, tamen si admodum solidus sit, & saxeæ duritie præditus, nec minus in aqua si bñdat quàm lapis: contra-ctus crasso durissimòque cortice constare deprehenditur, & nucleum candidum, succulentum, grati saporis, iucundique odoris, oleum ferè Macis referentis continere, in binas partes sectum & tenui candidaq; membrana diuisum, alia insuper paulo crassiore firmiorèque inclusum. Eiusmodi ante plurimos annos Antwerpæ inter aromata inuentos memini. Magnam similitudinem habet tertius cum prima nuce in adnotationibus ad 26. cap. 1. lib. Hist. Aromaticum descripta, sed paulò minor est, angulosus, niger, crassioribus quibusdani firmisque villis ipsi incumbens & firmiter inhaerentibus obseptus, altera parte tribus foraminum vestigiis insignitus, quorum tertium maiusculum est & infra spectat. Præduro putamine constat, & prægnans

II.

III.

VARIII fructus
peregrini, Clusij.



NVX LUTEL.
Alij fructus peregrini Clusij.



prægnans est, nam concussus crepitat & sonum edit. Quartus, nucis auellana: magnitudine, & eiusdem colore, putamine duro, veluti in duas partes diuiso, nucleum intus continens.

Similes aliquando Granatæ in Hispaniis accepi ab Ill. Dn. Didaco ab Sruniga, recēs ex Aphrica (*Elpenon de Velez* arce ab Hispaniis occupata) delatos, nucleum continentes album, dulcem: quas ad Vnguentariæ nucis genus aliquod referendas existimabam. Quintus, duntaxat nucleus

est suo putamine siue cortice exemptus, firmus, tenui membrana fusca & multis venis distincta, firmiterque ipsi nucleo inhaerente tectus: ipsa materies firma est, candida, pulpe nucis Indicæ siue Cocci similis, nullo quidem odore prædita, sed satis grato sapore. Calidum in primo gradu, aut secundi initio arbitror. Sextus, orbiculari ferè rotunditate & tanquam toro

elaboratus est, ovo passerino minor, flauus omni ex parte, nisi in altera extremitate subfusa macula insignitus esset, solidus, lapideique duritiæ, & in aqua subsidens. Priores quinque à Iacobo Gareto iuniore Aromatario, viro inue-

getrimo accepi: sextum ab humanissimo doctissimoque viro Dn. Ioanne Rizio Ser. Reginz Angliæ Elizabethæ pharmacopœo, qui multis beneficiis dum Londini essem me affecit. Eum verò à C. V. Nicolao Rallio accepisse fatebatur. At postquam Viennam redij, in multis exoticis fructus, quos, ut alia pleraque

ratione, suis capsis inclusos adferuo, alios inueni quos à nemine adhuc descriptos existimo. Rem itaque minimè ingratam studiosis me tracturum arbitratus sum, si illorum breues descriptiones, atque icones superioribus aduicerem.

Prior, alteri iam memoraro non admodum dissimilis est, sed minor, & Ponticam nucem non excedens (tamen iuglandi ferè æquales videre meminerim) lævis, splendens, cinerei coloris, & saxeæ duritiæ præditus, licet in aquam demersus supernaret, inæqualis aliquantulum, & compressus, uti pisæ quæ in eadem siliqua nata sese mutuo contigerunt. Alter, onalis, Iudæo lapidi

magnitudine par, & eius formam exceptus striis pulcherrimè exprimens, ex rufo nigricantis coloris est, ut maiores nonnullæ galæ leuis, & aquæ impositus supernatans, duro putamine constans, ac nucleum continens. Tertius, illo minor, & mediocrem nucem auellanam non excedens, orbicularis ferè, nisi infima parte paulò augustior in triangularem veluti cuspide

desinens, colore alteri similis est, & tamen leuis, in aqua subsidens & inuoluptens, duro crassoque putamine constat, & nucleum candidum tenui fusca membrana

brana tectum continer. Vtrumque hunc anno humanæ salutis 1579. Londini natus sum à nostro H. Morgano, qui ex ea Nigritarum in Aphrica regione quæ vulgo Guinea appellatur, & circiter quinque gradus ab æquatore distat, eodem anno delatos assererebar: eam ob causam initio subsequæntis anni, maiorem vnum,



& minores duos, quorum alter suo putamine exemptus erat, terræ in fictili credidi: sed neuter natus est, quemadmodum nec sequentium nonnulli, quos cum in Belgio, tum hic terræ commisi. Quarto spherica penè est figura, magnitudo ferè vncialis, putamen crassum admodum & durum, perpetuis tuberculis vndique oblitum, coloris flavescentis, linea eminentiore transuersum secante, quam, vt in iuglandibus, putaminum coniunctionem & commissuram esse arbitror. Quinto planè spherica est forma, magnitudo vulgaris globuli bombardici, putamen eiusdem cum superiore coloris, & perpetuis similiter tuberculis, at non adeò crassis oblitum, nullaque linea cinctum. Sextus, officinarû Nuce vomica maior est, planus idem atque similis coloris, nempe cinereus, superna parte paulò eminentior, & in ambitu quodammodo sinuosus, infima verò, quinque grana inter se disiuncta, & veluti ipsi impreta ostendens, inespilorum setaniorum ossiculis non valde absumpta, quæ exempla, satis alta lacuna-



rum vestigia relinquunt. Totus linea duritie præditus est. Septimi forma etiam plana est, sed à superiore discrepans, rugosa & nonnullis locis intunicens, color ex cinerèo nigricans, qualis in nonnullis *Cassia* fructibus, quorum iconem & historiam libro Aromatum cap. de Anacardio dedi. Is per medium sectus nulla grana, sed splendentem quandam nigrumque succum iam cõcretum & induratum duxat cõcinere deprehenditur: itaq; inter fructus potius viria quàm inter fructus numerandum censeo. Hos omnes cum Acaciz veræ siliquis & seminibus, paruis quibusdã cõchylis, & aliis quisquiliis in Piperis repurgatione & delectu aliquando inuentos memini. Sequentes verò olim nouo orbe delatos ex Hispaniis accepimus.

Octauum, Pinei alicuius generis nucleos esse existimo, adeò nostratis pineæ nucis siue strobili nucleos referunt, licet plerumque nostris sint & longiores & crassiores: durum similiter putamen & idem color. In nono quædam est varietas: nam alter altero maior & amplior est, licet color & forma propemodum eadem. Planus est & oblongiusculus, altera parte latior, altera angustior, glaber & læuis, totus fusci aut inrerdum spadicei coloris, nisi linea quædam candicans, qua parte suo fructui adhæsit (nam altero inclusus fuisse videtur) varium faceret: prægnans est, & sonitum edit. Hi duo *Pepinas del Peru*, id est, acinorum Peruanorum nomine insignes missi fuere. Decimus *Cassia* solutius, aut Ceratiorum semen magnitudine æquar, cui etiam forma persimilis est, sed tumidior aliquantùm, & colore differens, qui in hoc egregiè tubet vt in *Oxyacanthæ* fructu, solidus & durus, atque in aqua subsidens & imum petens: siliqua aut alio fructu inclusum fuisse arbitror. Eum nomine *Maes* accepi. Postremum locum occupabit *Rhaphis* ille coloris *Macouze* simili, hoc est, ex spadiceo nigricante, sed planiore lōgioreque forma, hi lo non admodum magno, cuius ad epistolam Petri de Olina Nicolao Monardes

inscriptam,

PAVATE, *Acoffa*

tur, rotundum semen, lentiscini magnitudine, ex viridi nigricans, & ubi maturuerit nigrum. Caudex & rami cinerei sunt coloris, radix alba & insipida, cum nonnulla tamen amaritudine, odoris propemodum expers. Tamen si utilis sit *Vfus.* hæc planta aduersus alui profluvia, quemadmodum superiores dux, cum illis tamen minimè comparari potest, quandoquidem imbecillior est: itaq; qui superiores nouit, ea haudquaquam utetur in alui profluuiis, ac in curando duntaxat omnis generis erysipelate, & eo præsertim quod è mæta bile ortum est: etenim insigni virtute aduersus hunc morbum pollere deprehensum est. Teritur & maceratur huius plânæ truncus siue radix orizæ decocto (*Cane* vocant) aliquot horis quiescere finitur ut acefcat hæc aqua: erysipelas deinde ea inungitur, bibendâque propinarur sufficiente quantitate bis in die, purgato priùs ventriculo. Eadem ratione præbetur radix orizæ decocto macerata iis qui iecoris inflammatione laborât, & febrium ardoribus: addito autem succi foliorum Tamarindi momento vulnerum libia cum quaque inungi solent ad inflammationes prohibendas, & humorum defluxus cohibendos. Quoniam verò iis in prouinciis multò maiore quantitate hoc tertium genus quàm secundum *Cornu* nuncupatum crescit, inco-

læ eo vtuntur.

MAMBV, siue arbor Tabaxir.

CAP. XCIX.



NVENIUNTUR interdù hæc arbores siue arundines, vocatæ *Mambu*, in quibus nascitur Tabaxir, tantæ amplitudinis & crassitie ut ex ea cymbas faciant, quæ binos viros capere possint, non quidem eas excauantes, sed relictis solum duobus internodiis excidentibus. Conscendere verò solent similes cymbas bini Indi, iisq; nudi (nam nudos incedere in iis regionibus moris est) sederéque singuli in eius extremitatibus, iunctis cruribus, tenentésque singulis manibus remos trium aut quatuor palmorum longitudinis, quibus eas cymbas impellunt tanta dexteritate, ut etiam aduerso rapidoque flumine summa celeritate nauigare possint, quæadmodum meis oculis conspexi in flumine Crâganor, in quo plurimus est *vfus* cymbarum ex hac arundine confectarum, quoniam qui eis vehuntur securiores sese existimant à Crocodilis, quos illi *Crocodili.* *Caymanes* vocant, magno numero in eo flumine versari solitis. Nam cum ij ferocissimi sint, sæpenumero in naues maiusculas & minusculas impetum facere solent, ut eos qui illis vehuntur apprehendant. Si enim

aut in flumine, aut in litore hominē, bouem, bubalum, aprum, porcum, aut quodcumque tandem aliud animal comprehendere possint, illico deuorant. Indigenæ autem affirmant nunquam compertum esse, vt eos qui cymbis ex Mambu confectis vehuntur appetant, sed sæpenuerò conspectos esse natantes proxime illis, at tamen eas præterire sine noxa.

LIGNVM MOLVCCENSE. CAP. C.

Forma.



NVENITVR in Moluccis arbor quædam domestica Mali cotoneæ magnitudine, cuius folia Maluæ vulgaris foliis sunt similia, fructus verò auellanis, sed minor, molliore cortice & nigricante. Seruitur liturque in hortis diligenter, nec alibi facili inuenias: tanti enim ab incolis æstimatur, vt peregrinos ne ad eius quidem conspectum adueniant. Incolæ *Panana* appellant. Cum verò istic Regis nomine gubernaret prædictam & animosissimus Dominus Ludouicus de Tayde, ipsius nomine hæc arbor dicitur fuisse, quoniam ille primus nobis eius insignes facultates aperuit. Accidit enim nobilis quidam Lusitanus, Henricus de Lima vocatus, dum in Moluccis versatur, animaduertit quanta cura & diligentia incolæ hanc arborem colerent, quantique æstiuarent, atque idè illius facultates apprimè intelligere cupiens, nonnullas tandem edoctus est. Nactus igitur trunci huius arboris partem, exstulit Proregi, bonarum rerum, & naturæ secretorum studiosissimo, tamen camentum valde necessarium, cognitūque dignum, & nostris hominibus hæc inauditum. Anno autem sexagesimo primo supra millesimum & quingentesimum interrogans me Prorex, an aliquid de hac arbore inauissem, aliquot facultates retuli quas ab aliis didicissem, conquerens arborem nondum licuisse videre: tum ille eius quod habebat fragmento me donauit, imperans vt cum iudicio & ratione experirer, nec ullius vitam periclitarer, deinde rerum successum significarem: quod me facturum recepi. Eius itaque ligni periculum feci, cum nonnullis agris quorū curam habebam in nosocomiis, tum in variis morbis quæ longa nauigatione plerumque oriri solent dum in Lusitaniam redirem, per pauillum facultatum relationibus quas intellexerā, & vtendi methodo, partem istam nobilis ille in Moluccis didicerat. Illius semen iam antè videram mihi donatum ad aucupandum: etenim eo in aucupis vtuntur non modò in illa regione, sed etiam in multis Indiæ prouinciis, ad quas eius rei gratia venale deferunt. Eius pauillum cum oriza cocta mixtum auibus siluestribus exponunt: quæ degustat, decidunt sopitæ & stupide: quæ verò auidius id edūt, moriuntur antequam illud auxilium præberi possit, quod est, vt frigida caput perfundatur. Graculi omnium tiffimè eo degustato extinguuntur. Nunc ad salubrem huius arboris usum accedamus, cuius pauillum hodie plurimi facio. Intus sumptum, aut foris assumptum, omnibus venenis resistit. Intrò assumitur magno commodo ex aqua rosea vel vulgari, auiumque iusculo eius pulueris apta quantitas pro necessitate, & ægri natura, modo decem grana non excedat, sed infra id pondus consistat. Ad perarum, Regulorum (qui serpentes pileati appellantur, & admodum noxi sunt aliorumque similibus aspidum aut serpentum morsus bibitur hic pulvis ex aqua ipsius moribus pulvis inspergitur. Eadem ratione præbent in vulneribus quæ sagittis toxico illitis facta sunt, quibus illius regionis incolæ plurimum vtuntur. Puluerem verò ex hoc ligno sibi parant lima è pelle marinæ caniculæ contexta, aut tenui aliqua ferrea lima. Robustissimo cuique dimidius eius scrupulis, & tepida aut rosacea, aut gallinarum iusculo tepente, summi: nec diuturna autem diei præcedentis parca esse debet euacuat enim omnes humores, præsertim crassos, lentos, & melancholicos: conuenit quartanis, diuturnis, &

Vfus.

Vires.

bus continuis, iliacis, colicisq; doloribus, flatibus, hydropis, arenulis, renum calculis, vrinæ difficultatibus, seu summa colericæ passioni, alijsq; morbis, veluti articularum & tibiæ inueteratis doloribus, scirrhis & scrofulis. Omnis generis lumbricos necat, & appetentiam deiectam reuocat: & si nimia sit euacuatio, bibat æger dimidium cyathum *Cania*, hoc est, decocti orizæ, aut aucularum comedat: subito cessabit, quod sane multa laude dignum est, paucisq; medicamentis vulgare, vt in potestate sit medici aut ægri, purgari quantum cupierit. Huc accedit quod neque furorem, neque tadium, neque metum dum sumitur pariat, positisq; sine dixerat obseruatione, etiam is qui sua negotia foris peragunt, propinquant, vti et is deprehendi qui vnus mecum eadem nauis vehebantur, nullum sentientes incommodum, tamen si dum purgarentur nulla dixta viderentur, viuere: neq; solutissimè. Obseruaui etiam illius præstantiam in inueteratis capitis doloribus, hemierania, apoplexia, aurium tinnitu, arthritide, ventriculi & vteri affectibus & asthma. Propterea huius illi plurimum, sæpius in diuersis naturis, ætatibus & locis, feliciter vsus sum, & sine ulla molestia, nisi quod in biliosis naturis, calidisq; ventriculis non nihil molestiæ pareret donec cibum sumerent, & in nonnullis vomitum excitaret: sed biliosis hunc puluerem nonnunquam dedi syrupo acetoso aut carambola condita exceptum, aut in catapotia cum saccharo rosato efformatum. Exhibendus est summo mane, neque cibus aut potus concedendus donec purgati sint quantum necessarium videtur, tum demum cyathus iusculi gallinarum tepidi datur, dimidiaq; aut integra hora post conceditur pullus gallinaceus, & paululum vini aqua bene diluti, deinde toto illo die potu abstinet ad cœnam vsque, quæ parca erit, & facilis concoctionis. Subsequenti die sumitur saccharum rosatum cum aqua buglossi, aut borraginis, aut communi, atque iniicitur clyster ad aluum eluendam. Solet vero interdum in nonnullis ani pruritus & excoriationem excitare, atque in aliquibus (sed paucis admodum) hæmorrhoides. Hæc sunt quæ de hoc ligno Panaua conspexi & intellexi. Nunc verò in illis regionibus magnus est eius vsus, tantaq; æstimatio, vt sine metu in multis morbis supra enumeratis vsurpent. Ego bis illud sumpsi in coli dolore & hemierania, mihiq; salutare esse deprehendi. Ceterum cum propter eius insignes facultates incolæ plurimi faciant, easq; quantum in ipsis est, celare nos studeant, quæ proculdubio longè plures sunt quam quas nouimus, sperandum est temporis (quod omnia reuelat) successu reliquarum, quæ nobis adhuc ignotæ sunt, notitiam nos consequuturos: easq; in libro quem præ manibus habemus fideliter enarrabimus, si, antè quàm in lucem prodeat, intellexerimus.

MORINGA. CAP. CI.

FENTISCI magnitudine est Moringa, cui persimilia habet folia: paucis prædita est ramis, eamque ob causam exiguam præbet umbram, multis nodis scatet, adeoq; fragilis est, vt facillimè cum ipse frutex, tum rami confringantur: folia saturatius virent, viuidiq; sunt coloris, saporis vero foliorum napi: fructum fert pedalem, raphani crassitie, octo angulis insignitum, colore dilutiore inter viridem & cinereum, intus candidum, medullo sum, & in certa receptacula distinctum, quibus contingitur rotunda semina. Eruo similia, virentia, & admodum tenera, sed sapore quàm folia acriore. Editur hic fructus cum carnibus coctus, aut alio modo paratus. Huius arboris radix vnicor- nu, & lapidis Bezar vices supplet, verâque theriaca est qua vulgò incolæ vtuntur cum aduersus omnis generis venena, tum morsus serpentium maximè noxiorum, vulgò *Culebras de Capillo* dictorum, aliorumque insectorum, & virulentorum animalium, cum intro sumpta, tum foris applicata. In colerica quam vocant passio-

Forma

MORINGA, Acafa.

Locus.

Nomina

Negundo mas.

Negundo
femina.

Forma.

Temper.
& Virt.NEGUNDO mas,
Acafa.

ne singularis efficaciz esse deprehenditur. Moritur remediis melancholicos humores purgantibus: & probè nota est elephantiasis laborantibus, quorum plurimos eius continuo curari perhibent. Abunde nascitur variis Indiarum locis, sed præsertim tota provincia Malabar secundum flumen Mangate, ubi ad modum luxuriat, multosque fructus profert, quæ vulgo in agro venduntur perinde atque Libani in Hispania Arabes & Turcæ *Morian* appellant, *Perla* Tem, Guzaratenfes *Turica*.

NEGUNDO. CAP CII.

DVAR arbores multis Indiæ locis, præsertim verò prouta Malabar inveniuntur, in usum adeò commendatæ, ut multis morbis vitales esse deprehendantur. Earum prior masculina censetur, & à Canarinis *Varalo Njunde* appellatur, Amygdalæ magnitudine, totius superne rentibus, inferne hirsutis, foliorum Salsæ modo, & in ambitu serratis, quæ procul a speciebus Sambuci foliis similima videntur.

Negundo femina nuncupata, aut *Nach* insularis, vulgò in Canarin *Njergundi* dicta, in Balagate *Sambali*, in Malabar *Node*: utraq; verò tam mas quam femina Arabibus, Persis & Decan incolis *Bache* vocatur, Turcis *Au*. Eadem magnitudine qua prior assurgit, folia verò habet ampliora, rotundioraque, neque in ambitu serrata, foliis Populi albe perquam similia. Vtriusque generis folia Saluam odore & sapore referunt: degustata tamen magis amara & acris deprehenduntur: in plurimis foliis partem aversa summo mane in hærens conspicitur, quæ quædam candida, quæ nocte ex illis emanat. Vtriusque flos cinerei coloris est, plurimum ad Rorismarini florem accedit. Vtriusque fructus admodum similis est Piperi nigro, acris gustus quidem, sed minimè vrentis uti Piper, ac Zingiberi propemodum par. Arbores moderate calidam faciunt, & semini paulo plus caloris tribuunt. Folia, flores, fructus contusi, aurum aqua decocta, vel in oleo fricta vilitur imponuntur omnibus doloribus ex quacumque causa provenientibus: præsertim articulo- rum doloribus ex frigida causa natis, atque in tumoribus & cõfusions, mirabiles præbet effectus. Vlceribus etiam vetustis folia trita imponuntur felici successu, quandoquidem eorum materiam digerunt, eaq; emundant: & ad cicatricem perducunt, modò corpus non sit impurum. Et sanè in vulneribus, apostumis

NEGUNDO *semina,*
Acosta.NIMBO, *Acosta.*

tibus & contusionibus adeo vtilem experientur, vt chirurgorum operam minime requirant. Mulieres horum foliorum decocto omni tempore vniuersum corpus lauant: tantæque inualir persuasio apud illas, Negundo folia, flores & fructus vtilia esse ad iuuandum concepitum, vt eum qui contrarium persuadere conetur, lapidibus obrutæ sint. Obstetricibus etiâ, quas illi *Dagis* vocant, apprime nota est hæc arbor. Adeo frequens est huius arboris vsus ad medendum in illis regionibus, vt nisi Deus præcisos ramos multiplici futura renasci faceret, iam diu fuissent consumptæ arbores, aut certè maximi pretij nunc essent: sed quo magis præciduntur rami, eo felicius renascuntur, perpetuæque fronde virent.

NIMBO. CAP. CIII.



LIA est arbor medico in vsu admodum commedata à Christianis & Gentilibus, reliquisq; earum Indiae prouinciarum incolis, rara ta-

men admodum: sed qui eam cognoscunt Nimbo *Nomina*

appellant, Malabareses *Bepole*. Magni-

tudine est Fraxini, cui procul aspicientibus persi-

milis videtur: folia vtrinque viridia sunt, nec

ab altera parte incana lanugine pnbescunt, in am-

bitu serrata & mucronata: rami multis foliis lu-

xuriant, floribusque abundant exiguis, albis,

quinque foliolis constantibus, flauis in medio

staminulis, Lotiq; siluestris siue Trifolij odorati

odorem referentibus: fructus est paruis oliuis

similis, subluteus, cortice admodum tenui præ-

ditus, nasciturq; ex ramulorum alis. Huius ar-

boris folia nonnihil amaricant, saluberrimæque

sunt trita & cum succo limonũ imposita vulne-

ribus sordidis, cuniculosis, callosisq; cum ho-

minum tum iumentorum: digerunt enim, emun-

dant, hæcica sunt, & ad cicatricem perducunt.

Foliorum item succus perutilis est siue per os

sumptus solus, aut ex vino, aut aqua, aut gallinæ

iufculo, siue vmbilico impositus solus, aut cum

fellis bubuli momento, aut aceto, aut aloë, ad

necandos & expellendos omnis generis lumbricos:

quamobrem familiare admodum, & pet-

quam salubre medicamentum est omnibus illius regionis incolis, præsertim Malabar prouinciæ, quoniam lumbricis valde sunt obnoxij. Magnus est etiam eorum vsus tum florum & fructus in articulorum doloribus, tumoribus, membro- rum debilitate, & apostematibus. Oleum item ex eius fructu expressum, multo

est in vfu in neruotum do'lotibus. Eoq; vulnera, neruorum puncturas, & cōmōdiones cutant Malabarenfes.

IACA. CAP. CIIII.

Nomen. ASCITVA arbor in nonnullis Indiæ insulis secundum aquas, licet nullum medicum vsum præbeat, propter amplitudinem tamē & fructus elegantiam minimē prætermittenda est. Eam Malabarenfes *Iaca*, Guzaratenfes *Panax*, Canatini *Panaſu*, Arabes *Panax* & *Iata* nuncupant, Perſæ mutato p. in f. *Fanax*. Vasta est arbor, foliis palmaris amplitudinis prædita, dilutē vitentibus, neruo crasso &

Forma.

IACA, *Ascite*



Fructus
duo gene-
ra.

duto per longitudinem excurrente: analum tectū non ē getminibus aut foliotum, sed quemadmodum aliz arbotes, sed ex ipso trunco & arboribusque ramis nascens, longum, crassius, obscutiū virens, crasso durōque cortice totum vndique veluti adamantum cuspidibus fectū, quæ in spinam breuem, viridem, nigroque aculeo præditam desinunt, admodum similem Durionis spinæ, sed minimē acutam aut punctatam, tamen minitari videatur. Horum fructuum minimus est maximæ cucurbitæ acutitudine atque etiam maior, præsertim in Malabar, vbi præstantiores nascuntur: nam qui in Goa proueniūt, minores & peiores sunt atque magis insipidi. Cū maturus est hic fructus, bonum odorem spirat, eiusque duas differētiæ cōstituunt, vnā *Barca* appellatam, & præstantiorem, alteram *Papa* aut *Girasal* dictam, minorem bonam: deprehenditur postrema ex mollitie, quoniam si manu apprehendas, digiti cedit.

Vires.

Præstantissimi verō fructus pretium quadraginta matauedis non excedit, hoc est, paulō plus regali castellano. Per longitudinem secti hi fructus, intus eandidi, & densa carne præditi apparent, ac veluti in capsulas aut receptacula diuisi, plena castaneis longioribus & etasioribus quā sint dactyli siue palmulæ, cinetea tunica tectis, & intus albis castanearum vulgariū modo, gustu terrestri & aspero, si virides edantur, multosque fluxus generantibus: at si vti Hispanicæ castaneæ assentur, gustu lapido & venerem excitantibus, ob quam solam tem plebs frequentius vti solet. Sunt autem singulæ hæ castaneæ pulpa flauescēte & aliquantulum lenta inuoluta, & pulpam Durionis nonnihil reſetente, tamen ab eo differat. Grati saporis est, præsertim quæ in Iaca *Barca* cognominata continetur, optimi Melonis pulpæ admodum similis: dura tamen concoctionis est, & admodum grauat ventriculū: atque, vt illarum prouinciarum medici aiunt, si in ventriculo eorumpatur, noxios & venenosos humores genat: quique frequentius hoc fructu vescuntur, facili in pestilentem illum & pessimum morbum *Morxi* appellatum incidunt.



Rvetvs est in Malaca adeo grati saporis & odoris, vt reliquis qui in ea provincia gignuntur, tamen si pluri sint & boni, præferendi videantur. Cuius præstantia, & quoniam Doctor ab Orta illius etiam meminit capite de Datuta, licet eum non videret, me impulit vt de eo scriberem tanquam oculatus testis, tamen si in medicina nullum locum obtineat. Vocatur hic fructus in Malayo (quæ provincia est vbi gignitur) *Duriam*: ipsius flos *Buaa*: arbor ipsa *Batan*. Prægrandis est hæc arbor, materie valida & solida,

Nomini

DVRIONES, *Acosta*.

Forma.



crasso cinereoque cortice tecta, multis ramis luxurians, & copiosum fructum præbens: flores habet ex albo non nihil flauescientes: folia, dimidij palmi longitudine, duorum aut amplius digitorum latitudine, in ambrum tenuiter serrata, parte externa dilutius virentia, interna verò saturiore virore, & quodammodo ad rufum tendente prædita: fructum Melonis magnitudine, denso cortice septum, eoque multis breuibus crassiq; & pungentibus aculeis horrente, foris viridi & veluti struis quibusdam quemadmodum Melo secundum longitudinem distinctio: intus vetò cōcamerationes quatuor secundum longitudinē habet, singulas tria aut quatuor receptacula cōtinentes, quibus singuli fructus insunt admodum cādidi vti lactis pingue, magnitudine oui gallinacei, gustu suauiore odoratioreq; quàm sit cōdimentum illud ab Hispanis *Maniar blanco* appellatum, nō tamen adeo molles aut glutinosi: nam qui cādore illo non sunt præditi sed flauescūt, putridi sunt, aut æris iniuria pluuiæ corrupti. Optimi cēsentur qui tres dūtaxat fructus in singulis concamerationibus, deinde qui quatuor obtinent: nam qui quinque habēt, improbi censentur, quemadmodum & illi qui fissuras aliquas habēt: non solēt verò in singulis malis plures quàm viginti fructus cōtineri, itq; singuli inclusum habēt nucleum, mali Persici nucleo similem, non rotundum, sed oblo giuſculum, gustu insipido, quique guttu exasperet, veluti mespila viridia, propterea nō eduntur. Calidus & humidus est hic fructus: & qui edere volunt, pede leuiter comprimere & frangere solent propter spinas quibus oblitus est. Qui nunquam his fructus ederunt, cum primū illos olfaciunt, videntur putridas cōpās odorari: sed postquàm degustarunt, præ reliquis cibis bene olere & sapere censent. Est verò tanta in existimatione, apud eos qui gulæ dediti sunt hic fructus, vt putent neminem eo posse saturari, propterea varia dant illi epitheta. Memini videre quædam Epigrammata ab eleganti Poëta in laudem eius conscripta: quæ (si hic locus ferret vt adscriberentur) non dubito quin lectori plurimū essent placitura. Tanta tamen est huius fructus in Malaca abundantia, vt singuli non pluri quàm quatuor marauedis veneant, præsertim mensibus Iunio, Iulio, & Augusto: nam reliquis pretiū intenditur pro hominum arbitrio. Admiratione porro digna est Betele cum hoc fructu antipathia quæ profectò tanta est, vt si quis in nauem Durionibus plenam, ædēve aut concamerationem, vbi obseruentur, aliquot Betele folia reponat,

Fructus
delectus.Tempus
Vsu.

Pretium.

corrumpantur & putrescant omnes. Et, sicut ex Durionum immodico esculentus inflammetur & grauetur, folio Betele supra ventriculum imposito mitigatur inflammatio, tumorq; tollitur. Et, si à Durionum escu ingeratur alio Betele folia, nullam noxam sentiet, quantumvis multos ederit. Inde fit, turba ob eius gustum suauem, vt vulgò dicatur, neminem eorum escu posse satiare.

MANGAS.

CAP. CVI.

Forma.



ASTA hæc est arbor & multis ramis prædita, fructibusque fert magna ex parte anserino ovo maiorem, nonnullis interdum minoribus locis binas libras, aut amplius pendentem. In eadem verò arborum præsertim colore differentes isti fructus conspiciuntur: alij enim dilati, alij haustus, quidam etiam ex viridi rubescunt: grati admodum saporis odore, & quando non est corruptus, Duracinis Persicis (quæ à carne huiusmodi

Locus.

MANGAS, Acasta.

Nomina

Temper.
& Vires.

Melocotonea vulgò appellantur) præstat. multis prouinciis nascitur, vt in Malabar, Guzarate, Balagate, Bengala, Pegu, & alia, aliisque Indiæ locis, & in Ormuz præcellit. Nominatur *Mangas*, in Cambogia *Ambo*, a Persis & Turcis *Ambo*: permixtus in arbore ab Aprili in Nouembrem videtur, interdum, pro locorum natura & situ. Eius hic fructus in laminas sectus aut sine vino, aut vino maceratus. Conditur etiam facilius commodius adseruari possit, atque ut cucullo aperitur, & in eius medio lignum giber recens, allia, sinapi, sal, cum oleo & aliis inspergantur, vt vel cum oriza edant, vel eorum conditarum modo. Salunt etiam & exsiccant, atque in forum venalem proferunt. Tigidus & humidus est, tamen si vulgus calidius constituat, & multas morationes in eorum qui vescuntur vetriculo parere affirmet. Quæ & indigenæ medici calidum faciunt, & viciant, dicentes serpiginem, erysipelas, bilis febres, phlegmonas, & scabiem generare. Quod fortè accidit ab eius in ventriculo corrup-

tionis: sed eo tempore quo inuenitur hic fructus, propter immoderatum usum in similes morbos incidunt etiam nonnulli qui illo abstinere. Antequàm promaturus sit, gustu adstringente est, & ea pars quæ osiculo vicinior est, acerior: sed maturus dulcis & sapidus est. Præduro putamine, vndiqueque tomato, aut duris fibris transactis & oblique excurrentibus operto tegitur nucleus longus, nucleulus & crassiusculus, magnitudine iligneæ glandis, candidus & candida cunctis gustu amaro dum crudus est, ideòque aduersus lumbricos & alui profluvia: tostus verò iligneas glandes sapit. Inuenitur etiam huius genus sine osiculo palato admodum gratum. Aliud eius genus siluestre reperitur *Mangas braui* nuncupatur, adeò præsentis veneni, vt indigenæ illo sese mutuo perimant: nam si quis paululum ederit, ilicò moritur: interdum oleum admiscunt ad exacuendam eius vim, utq; celeriore perniciem adferat: sed quocumque tandem modo sumptum, adeò celeriter perimit, vt hætenus nullum sit repertum antidotum ad eius venenositatem compescendam. Dilutè vitet, & aliquantulum splendet, lacteo succo abunde, pauciq;

Mangas
silvestre &
aliud genus.
Vires.

pauciq;

paucaque carne præditus est, nam crasso cortice solummodo integitur osciculum prædurum & cartilagineum, Cotonei tamen mali magnitudine est. Per vniuersum prouinciam Malabar prouenit copiose hæc arbor, domestica siue siliua minor, prætoribusque & crassioribus foliis. Pueri his fructibus, aurcorum malorum loco sese mutuò petere consueuerunt.

ANANAS SILVESTRIS. CAP. CVII.

ALTIVS assurgit Nanâ à nobis descripta supra huius libri cap. 73. quæ Ananas silvestris nuncupatur: namque truncum habet hastæ magnitudine læuem admodum, rotundum & Mali aureæ crassitie, spinis horridum: folia spinosis cuspidibus prædita, & per ambitum mollibus spinis lepra. Singulæ arbores secundum radicem summa tellure magnam foliorum comam fundunt, maiorum quam quæ in arbore sunt, quæque procul intuentibus Aloës foliis similima videantur, tenuiorum

Forma.

ANANAS silvestris, Acaftæ.



tamen, pluribus spinis horridorum, & dilute vi-
rentiû: adnatis se propagat, alixque stirpes ex aliis
enascuntur, præsertim in sepibus & hortorum
ambitu quos egregiè muniunt. Rami foliorum
simul glomeratorum capita proferunt flauen-
tium admodum, & tenerorum, suauissimi odo-
ris, quæ nihil aliud sunt quam flos ipse: ex horû
singulis spica prodit Arundinis spicæ non absi-
milis, sed crassior, còpactior, & elegantior, odo-
re Cedri. E ramis dependent fructus, *Ananas*
bravo, id est, Ananas silvestres dicti, quoniâ cum
domesticis nonnullam habeant similitudinem,
Melonis magnitudine, coloris rubri elegantis
& oculos oblectâtis, toti in partes diuisi quem-
admodum cupressini strobili, seu nuces exsic-
catae, sed tuberculis foris obfusi, vt procul spe-
ctantibus magni pinei strobili appareant. Ca-
pitum tenetiora folia seu flores crudi eduntur
cauidósque sapiunt, sed exiguum alimentum
præbent. Fructus (quem pauci degustant) sa-
pore vtrumque suauis præditus est, adstrictionis ta-
men austeræ, & palato patum gratæ particeps.

Virg.

Succi plena est tota planta cum suis radicibus. Huius sex vel octo vnciæ ex saccha-
ro summo mane sumptæ præsentissimum certissimumque censentur esse remediû
aduersus iccoris & renum calores, renum vlcera, purulentas vrinas, & penis exco-
riationem: nam magna ex parte post tertium diem sanantur. Vtilem etiam in
diabete esse ferunt: non sum expertus. Arabes admodum laudant aduersus eos-
dem morbos & erysipelas: & *Queura* vocant, quemadmodum in Decan, Persæ
Ananasæ, & *Angali* florem (qui caput illud foliorum odoratum est) Arabes
Cbuxtaid, Persæ *Pixcoxburh* dicunt: Tutcis est ignota. Habere hanc plantam ali-
quot notas non dissimiles Aloë Americanæ, annotat Clusius.

Nomina

CARAMB

Nomen.

Forma.

Fructus.

Vfus.



RECTVS quem Malabarici
sitani *Carambolas* appellant, in
Can *Cumarix*, in Canara *Cumari*
& *Carabel*, in Malayo *Bolimba*, &
Peris *Chamaroch* dicitur, nascitur in arbore Lo-
ronez magnitudine, foliis Mali, paulo lon-
gioribus, coloris viridis saturatioris, & gulis ma-
rioribus: floribus parvis quinque foliolis com-
positis ex albo rufescentibus, nullo quidem o-
re gratis, sed aspectu elegantibus, & gustu
lucido acetofo. Ipse vero fructus natus est
gallinacei magnitudinem æquat, oblongus
uescens, atque veluti in quatuor partes
sulcis illis paulo altius impressis magnam
tiam addentibus: in meditullio continet
nata tenera saporis aciditate palato grata. Ma-
ius vsus est in medicina & in cibis: namque ma-
lum exhibent in biliosis febribus, & facit
conditum syrupi acetosi loco præbent. An-
ni eius succo, cum aliis medicamentis
frescentibus, collyria parare solent ad oculorum

nubeculas tollendas. Obstetricæ (quæ illis *Daya* dicitur) vidi fructu sicco & in pul-
uerem contrito, & foliis Betele vrentem ad secundinas à partu expellendas, &
tumq; mortuum educendum. Eius etiam muria conditi frequens est vsus,
gratis sit saporis, & appetentiam excitet.

IAMBOS ACOSTÆ.

CAP. CIX.

Forma.

Fructus.



LIVS est in India fructus, qui
aspectus elegantiam, suavitatem
rem & saporem, tum etiam ob
in medicina vsum, dignus est
historiam hic apponam. Arbor vero quæ hæc
fructum præbet, vasta est, maximam Malum au-
ream quæ in Hispaniis nascatur æquans, multis
ramis in latum expâsis, multamq; umbram præ-
bentibus prædita, aspectuque pulcherrima,
caudex maiorésque rami cinereo cortice
guntur: folia pulcherrima sunt, lævia, palmu aut
amplius longa, crassiore nervo per longitudi-
nem, multis autem obliquis venis in latera ex-
currentibus, parte superna saturatius, inferna ve-
rò dilutius virent: a flores ex rubro purpura
tes, viuidi admodum coloris, multis staminibus
in medio præditi, aspectu pulcherrimi, galeæ ca-
preolorum vitis simili. Fructus magnitudine est
Pyri quod à Rege cognomen accepit, ei que
duo sunt genera: vnus enim adeo obscurè ruber
ut niger videatur, magna; ex parte obscurè lo-

caret, & succi bonitate præstat: alter ex candido rubescit, & osiculum continet album, durum, non admodum rotundum, osiculi quod in Persico malo est magnitudine, læue, & candida hirsuraq; membrana tectum, qui licet superiori bonitate cedat, dignus tamē est delicatissimorum etiam hominum palato. Vtiusque odor suauissimam rosam refert, frigidus & humidus est, & admodum tener, cortice adeo tenui & molli tectus, ut cultello auferti non queat. Alit̃ suas radices terræ infigit hæc arbor, & post quattum annum fit fructifera: fructu sæpius eodem anno perficit, & nunquam sine flore aut fructu conspicitur, cum idem rami floribus, fructu viridi & maturo semper ferē onusti sint, decidētibusque quotidie floribus (sic ut solum rubro colore rinctum quandoque videatur) noui subnascantur, fructusque alij primum enascantur, alij maturescant, alij iam maturi colligantur. Succus arbore maturi facili decidunt: comprehensi vero rami ad fructus colligendos, facillime ab arbore reuelluntur. Ante reliquos cibos initio mensē edi solent atque in interdū. Malabares & Canarini hunc fructū *Jamboli* vocant, Lusitani istic habitantes *Jambos*, Arabes *Tupha*, Indi, Persæ *Tuphar*, Turci *Alma*: Lusitani arbore *Jambiro* appellant. Flores & fructus saccharo condiri solent, ut, frequenter vtuntur in biliosis febribus, & extinguendæ sitis gratia.

Nomina

MALA INDICA, ACOSTAE. CAP. CX.



MAGNA est arbor multis foliis & floribus prædita, & copioso fructu: folia minus rotunda sunt Mali foliis, tamen si ea æmulentur: supernè saturate virent, infernè candicant & pubescunt vti Saluiz folia, gustu adstringente: flores exigui, candidi, quinque foliolis constantes, inodori. Fructus Iuiubis, seu Ziziphis similes, alij aliis maiores & suauiores, nunquam verò tam probè maturescunt ut conseruari queant & in alias regiones transferri vti Zizypha, & perpetuò non nihil adstrictionis retinentes: vnde colligitur minimè pectori vtiles esse quemadmodum Zizypha. Huic arbori nomen est in Canara *For*, in Decan *Ber*, & in Malayo *Vidaras*, apud Lusitanos *Mançanas de la India*, id est, Mala Indica. Præferuntur fructus in Malaca nati Malabaricus: sed iis adhuc præstantiores quos Balagare proferunt. Conspicitur hæc arbor ætare alatis formicis perpetuò onusta, quæ in ramis eius Laccam elaborant.

Forma.

Fructus.

Nomina

IAMBOLOINS.

CAP. CXI.

VIVS arboris materies cortice integitur coloris fetē eiusdem cum Lentisci cortice: folia Arbuti similia habet, sed Myrti vitentis foliorum sapore: fructus Cordubēsisbus oliuis maturis similes, adstringentis gustus, & fauces contrahentis. Nullum vsum in medicina obtinent, sed eduntur cum oriza cocta, nam appetentiam excitant. Vulgus *Jambolans* appellat.

ALIVS est fructus, *Iangomas* nuncupatus, Sorbis ferè similis colore, & immaturis prunis sapore: quibus & arborem similem habet, (sed spinis oblitam) & folia & flores. Nasceitur cum sponte in agris, & in hortis etiam colitur. Fructus licet maturus digitis prius emolliendus est antequàm edi possit: attamen adstrictionem illam haud mediocrem, nequaquàm adhuc deponit: eaque de causa illius usus est ubi adstric-
cone opus habent.

AMBA RE, *Acosta.*



Forma.

Nomina

PINEI nuclei Malva-
cans, *Acosta.*



Forma.

Usus.

AMBA RE. CAP. CXIII.

CRASSA magna; est hæc arbor, foliaq; habet Iuglandis foliis magnitudine respondentia, sed non eius formæ, dilutius virentia, & venis elaborata, quæ illis magnam gratiam addunt: flores exiguos candidos, fructus Iuglandis magnitudine dilutius virentes, & com-
quàm illa leuiore: odoris grauis & gustus ac-
bi dum adhuc virent, coloris verò flauis in ma-
ris, gravioris odoris, & gustus grata ac-
commendabilis, medullam continente, cin-
ginosam & duram, è duris nervis obli-
textis constantem. Hanc arborem appellant Canari-
nari *Ambare*, fructum *Ambares*, Persæ *Ambareth*, Turci *Harb*, Lusitani *Ambares*, quemad-
dum Canarini. Propter fructus gratiam ac-
tatem eum omphacij, seu agrestis loco citis
admiscent: maturum ex sale & aceto edunt, ex-
citat enim edendi appetitum. Indi adue-
lios humores vtilem esse perhibent. Salis
aceto conditus, diu conservari potest.

PINEI NUCLEI MALVACANS
CAP. CXIII.

ALIV in hortis quibusdam
labar, tum etiam in nonnullis
sponte nascitur arbor magnitu-
dine Pyri, cuius folia inferne draco-
virore prædita sunt, supernè autem saruro, ad-
modum tenella & mollia, quæ gustata vade
acria deprehenduntur, & linguam diu vellicant.
fructus triangularis, auellanz magnitudinis, &
terius in multa receptacula distinctus, in quibus
semen est album, solidum, rotundum, Piceo nu-
cleo suo putamine exempto par. Eo fructu be-
quenter vtuntur Indi, cum in curandis quibus-
dam morbis, tum etiam in suis nequitur. Binos
eiusmodi nucleos tenui membrana quæ
com-
com-
com-

concegit liberatos erunt, & clysteribus vulgaribus admiscēt aduersus schiaticam, & vrinæ difficultatem: seu propinant cum gallinæ iusculo ad educēdos putridos, lentos, crassosq; & frigidos humores, & asthmaticos curandos, aduersus quē morbum plurimū commendant, & frequenter vtuntur. Ex aqua tritis impetigines inunctæ primū tamen diligenter confricatæ & abraſæ, probè & breui temporis spatio curantur: sed admodū vrunt, vt experientia didici. Improbæ etiam mulieres illarum prouinciarum suis maritis parum aquæ, quatuor grana siue nucleos edendos præbent vt eos interimant. Vulgò appellatur hic fructus *Pinones de Maluco*, hoc est, Pinei nuclei Malucani, quòd istæ frequentes sint arbores hunc fructum ferentes, multūque & familiaris admodū sit illius vsus in purgationibus à Canarinis *Gepalu*.

CHARAMEI.

CAP. CXV.



Pius arboris duo sunt genera. Vnum Mespili amplitudine, foliis Pyro similibus, dilutè virentibus, fructu auellanis simili, admodū flauo, eleganter in multos angulos desinente, sapore Omphacij, & grata aciditate, quem vel immaturum vel maturum, vel sale conditum vulgariter edunt. Alterum genus eiusdem est magnitudinis, foliaq; habet

Forma.

CHARAMEI, Acosta.



Malo minora, fructum verò priore maiorem, cuius decocto cum Santalis aduersus febres vtuntur Canarini Medici. Crescit in siluis & montibus procul à mari disitis. E primi generis, quod secundū aquas nascitur, arboribus, seligunt Decanini & Canarini eam quæ longius à mari abest: eius radice corticem (cui lacteus succus inest) quatuor digitorum longitudine sumentes cum drachma sinapi probè terunt, & asthmaticis exhibent: valenter enim purgat per aluum & vomitum. Quod si immodica subsequatur euacuatio, Carambolas fructum vnum viridem edunt, vel aceti Canarini haustū sumunt (quod nihil aliud est quàm aqua decoctionis orizæ vno aut altero die seruata donec aceſcat, Canarinis aceti vices præbens, & medicum vsum præstans) & si profluuium nō cessat, ægris caput frigida ablunt. Magnus est horū Charameis vsus in illis prouinciis, & ad orexim ciendam edere solēt immaturos, maturos, siliatos, vel sale & aceto conditos vt antè dixi, aut aliis edulis quibus aciditatem conciliare volunt admiscēt.

Locu.

Vitis.

Vsu.

Vocantur in Canara, Decan, & vulgò *Charameu*, Arabibus, Persis & Turcis *Ambela*.

Nomina

ARBORIS CORTEX AD RHEVMATISMOS UTILIS.

CAP. XVI.



NICOLAUS Monardes lib. 3. Historiæ simplicium medicamentorum ex Nouo orbe delatorum, quorum in medicina vsus est, Peruani cuiusdam corticis, quem ad rheumatismos ab Indis efficacissimè adhiberi ait, his verbis meminit. Inter reliqua mihi ex Peruani: vsus est crassius quidam cortex, quem ex vasta arbore Ylmo simili cum amplitudine tum

Locus. forma detractum ferunt. Nascitur ad ripas fluminis cuiusdam viginti leucis à Lima distantis: nec alibi in India facile reperias. Indi capitis doli modibus, rheumatismis, aut alioqui capitis grauedine laborâtes, huius arboris corticem in tenuissimum puluerem comminuunt, & naribus imponunt: humores enim signifer educit, qua ratione liberantur: quod verum esse nos ipsi experti sumus. Secundum caloris gradum excedere videtur.

PACAL. CAP. CXVII.

Forma. **N**EXVSDEM, inquit idem, fluminis ripas nascitur altera arbor, quam Indi *Pacal* vocant, iam descripta multò minor. Huius ligni vñ cineribus cum sapone mixtis, Indi ad tollendos lichenes etiam fedissimos vtuntur, cum qui in capite nascuntur, tum qui reos corporis partes occupant sed & vetustas cicatrices emaculare dicitur. *Pacal* huius ligni etiam accipi, cuius facultates experiemur.

CACHOS. CXVIII.

Forma. **M**ISSVM præterea sibi idem Monardes fuisse ait plantæ semen, quod apud Indos æstimationis, *Cachos* vocatur. Nascitur arbusculi modo, insigni virore prædita est, folio rotundo & tenui: fructu fert. Male infans similem, altera parte sessilem, altera turbinatum, cinerei coloris, grati saporis & acrimoniæ expertis, minutum admodum semen continet. Inuenitur duntaxat in Peruanis montibus. Magnæ est apud Indos, vt dixi, æstimationis, ob insignes facultates. Nam vrinas ciet, arenulas & calculum in rebus pellit, quòdque præstantius est, illius vñ calculum in vesica comminui ferunt, & molli ad huc sit, vñ sique medicamentis comminui queat: eiusque rei tam multa proferunt exempla, vt admirationem mihi pariat: nam ea est mea opinio, vel calculum haudquaquam expelli posse, solamque exemptionem illius remedium esse, nullum autem medicamentum adeò efficax esse, vt eum confringere valeat. aiunt ramen illius semen tritum ex aqua aliqua ad eam rem vtili sumptum, calculum in lutum dissoluere, quod excrementum denuo concresecat, & in lapideâ duritiâ conuertatur. Adolescentem vidi, cui hoc obtigisse scio. Is cum vesicæ calculo torqueretur, idq; à lichoeromitis qui calculum deprehenderant intellexisset, & symptomatis quæ pariebatur agnoscerem, hominem veris initio ad fontem qui de petra cognominatur ablegauit, vbi cum duos menses hæsisset, à calculo liber rediit, & omne lutum, quod paulatim eiecerat, denuo in lapidea fragmenta coneritum secum in charta detulit. Pauculum semen quod habemus terræ commutemus, & si nascetur vtetur, vt eius facultates quas in hoc morbo adco prædicant experiamur.

FRUCTVS SVB TERRA NASCENS.

CAP. CXIX.

Forma. **M**ISSVS eidem etiam est ex Peru fructus sub terra natus, pulcher admodum aspectu, & grati saporis, qui & radice caret, neque aliquam planam proferit, aut ab vlla planta producit, sed solummodo sub terra nascitur quemadmodum tubera: dimidij digiti magnitudine æquat, rotundus est & contortus, & affabre elaboratus, coloris spadicei, nucleus intus contrinens, resonantem dum siccus est, amygdalæ similem, cortice sulco, intus album & in duas partes diuisum vti amygdalæ. Grati saporis est, & auellanam gustu refert. Inuenitur apud flumen Maranon, nec vsquam alibi per vnusum Indiam

Inflammatio rectis & exsiccat, sed torrens præstat: apponitur secundis mensis bellario in loco, quoniam versiculis admodum exsiccat & colat: sed si liberalius edatur, capitis gaudinem generat. Eum admodum xilimant cum Indicum Hispani, nec immerito, quoniam eos qui ad me misi sunt degustans, grati esse saporis deprehendi. Temperatus esse videtur.

FRUCTVS LEVCOMA NVNCVPATVS.

CAP.

CXX.



RBORIS etiam fructum inde accepit, quem Indi *Leucoma* nuncupant: similis est nostrati castaneæ cum colore, cum magnitudine, tum etiam scissili illa & albicante parte quam castanea obtinet. Prægnans esse videtur, sed quoniam binos duntaxat accepi, confringere nolui, cum alterum seuerim & non prodierit, alterum in aliud sationis tempus seuerim. Arbor in qua prouenit vix est magnitudinis, materiq; firmæ & robustæ, folia Arbuti obtinet. Fructum edulem gratiq; saporis esse aiunt, & alui profluuiâ sistere quoniam adstringit temperatum asserunt.

Forma;

Arbor;

SAPONARIÆ SPHÆRVLÆ. CAP. CXXI.



ASSVLÂ ipsi præterea missa fuit subere contexta, plena sphæruulis admodum rotundis & nigris atque splendentibus, sic vt ex Ebena confectæ viderentur. Ex verò constabant ex fructu in pumila arbore nascēte magis incurua quàm recta, veluti Ruscus, cuius folia filici sunt iunilia. Ferunt ij frutices rotundum fructum nucis magnitudine lenta quadam pulpa tectum, qua sublata relinquitur sphæra quadam maxime rotunda, coloris nigri, adeo dura, vt nisi malleo, aut alia quapiam re solida & dura confringi queat. Saponis vicem præbent hi fructus, quoniam si binis, aut tribus cum calida aqua vestes eluantur, multò nitidiores redduntur, quàm si saponis librâli pondere elox: torrent plurimam etenim spumam excitant, eisdemque effectus præbent quos sapo, paulatim liquecentes, donec solæ sphærule supersint, quæ nucleus sunt huius fructus: perforantur deinde hæ sphærule, fiuntque ex iis precatæ corona: adeo elegantes vt ex Ebena confectas dicas, tum diutini vsus, quoniam difficulter confinguntur. Est verò is fructus adeo amarus, vt nulla quadrupes, aut auis eum degustent. Aliquot ex iis terræ credidi, quæ enatæ sunt, foliaq; gestant admodum elegantia, & viridia: fructum suo tempore prolaturas existimo, paruulæ enim adhuc sunt plantæ. Describit quoque hunc fructum Ouiedus Indicæ Historiæ lib. 9. quod & ad Monardem annotauit Clusius. Sūt, inquit Ouiedus, in his insulis (Hispaniola videlicet) & cōtinenti quædam arbores, quæ à precatiis sphæruulis & à saponē cognomen acceperunt, quatum folia Filicis folia nonnihil referunt, licet minora sint. Celsæ sunt & formosæ, fructum ferentes auellanæ, aut cerasij magnitudine, cotolla insignitum, minimè edulem, qui sole exsiccat subflauum colorem retinet, is osiculum intus continet globulo bombardario æqualem, rotundum, nigrum, ac si solis radiis opponatur, subrusum, quod semen exiguum & amarum habet. Ex his osiculis perforatis fiunt precatioræ corollæ, non inelegantiores quàm si ex Ebena confectæ essent, imò iis præstant, cum quod leuiores sint, tum non adeo fragiles. Fructu integro cum aqua calida pannis expurgantur perinde atque saponē: at si quis frequentius eo vtatur, pannos vrit & corrumptis semel duntaxat necessitatis causâ eluisse sufficiat. Pulpa osiculum ambiens ea est quæ saponis vicem præbet.

Arbor;

Fructus;

incolæ Papyrum & crudū, & elixum, & aſſum, ſuccum deuorāt, & quod manſum eſt expuunt. Talis igitur eſt Papyrus, & tales uſus præbet. Naſcitur & in Syria circa lacum in quo & Calamus odoratus, vnde & Antigonus nauium funes faciebat. Eadem ſerè Plinius tradit ex eodem Theophrasto. Papyrus ergo naſcitur in paluſtribus Ægypti, aut quieſcentibus Nili aquis, ubi euagare ſtagnant, duo cubita non excedente altitudine gurgitum, brachiali radicis obliq̃ue craſſitudine, triangulis lateribus, decem non ampliùs cubitorum longitudine in gracilitatem, ſtiſtigatum (legendum videtur ex Theophrasto, Brachiali radicis obliq̃ue craſſitudine, decem non ampliùs cubitorū longitudine, triangulis lateribus. Theophrastus tamen radicem capri robuſti hominis craſſitudine eſſe ait, longitudine decem cubitis maiore.) thyrsi modo cacumen includens (ſic Gaza reddidit quod Theophrastus *καὶ τὸν θυρσὸς ἔχει*, quod apriùs conuertitſſet, Comam ſiue iubam utilem habent & inualidam: thyrsus enim à coma differt.) Semine nullo, aut uſu eius alio quàm floris ad deos coronandos. Radicibus pro ligno incolæ vrentur, non ignis tantum gratia, ſed ad alia quoque vtenſilia vaſorum. Ex ipſo quidem Papyro nauigia texunt, & è libro vela tegeteſque, necnon & veſtem eriam ſtragulam, & funes. (Ex biblo Theophrastus eadem texti ſcripſit, nimirum ex Papyro ſiue Papyri caule, id eſt, caulis tenuis & philuris, non autem libro ſiue extimo cortice. Sed omiſit Plinius mortalibus maximè neceſſarium huius plantæ uſum à Theophrasto poſitum, nempe ex biblo texti biblia, id eſt, chartas, etiam externis noſiſſimas, cum Græci longè plura chartis tradiderint, quàm ipſi met Ægypti, apud quos Papyrus naſcitur, memorabiliū rerum monumenta faxi, obeliſci & pyramidibus inſcribere ſoliti.) Mandunt quoque crudum decoctumq̃, ſuccum tantum deuorantes (Dioſcorides & eum ſecuri, vr Pierius in Hieroglyphicis, falſò purarunt radicem *ἔχει τριβύχην* τῆς, id eſt, alimenti non nihil præbere, ideoq̃ Ægyptios *δυνασταις μὲν τὸν ἀποχυνδίζον*, mandere exugereq̃, ſuccum, τὸ δὲ δυναστικὸν ἐν τοῖς νομίαις. Nam præter Theophrasti perſpicuam hac de re narrationem, Herodotus in Euterpe apertiffimè refert Ægyptios Papyri è paluſtribus collectæ annua meſſe partem ſuperiorem præciſam in alios uſus quàm alimentorum vettere, inferiore autem cubiti longitudine & mandere & comelleſſe, eximia quadam ſuauiſſime, cum in luculento furno torretur. Ante fruges inuentas priſcis Ægyptiis uſitatiffimum & frequentiffimum eum cibum fuiſſe ex Oro cognoviſſimus: ſcribit enim Ægyptios antiquiſſimam, & omni memoria priorè originem ſuam ſignificantes, Papyri ſaſciculum pinxiſſe, quoniam eo primum veſcerentur.) Naſcitur & in Syria circa quem odoratus ille Calamus lacum. Neque aliis uſus eſt quàm inde funibus Rex Antigonus in naualibus rebz, Sparto nondum communicato. Nuper & in Euphrate naſci circa Babylonem Papyrus intellectum eſt eundem uſum habere chartæ. Hiſ ſubiungit Plinius chartarum genera, earumq̃, conficiendarum rationem explicat, oratione quidem ſatis obſcura & perplexa, vr in re antiquiſſima, & nobis ignota, quam ex doctiſſimis eruditiffimi Dacleham pij in Plinium obſervationibus, & ex Guilandino perſpicuam reddere & enucleare conabimur. Preparantur, inquit Plinius, ex eo (Papyri ſcapo) chartæ, diuiſo (ſcapo) acu in prætenues, ſed quàm laſiſſimas philuras (rectiùs fortaſſe longiſſimas, Guilandinus mauult laſiſſimas.) Principatus medio (ſubaudi Papyro, ex vetuſto codice, mediis ſcilicet philuris) atque inde ſciſſuræ ordine. Hieratica (ideſt princeps & primaria) appellabatur antiquitus religioſis tantum voluminibus dicata, quæ ab adulatione Auguſti nomen accepit, (ablutione ex vetuſto codice & Iſidoro, Hieratica, inquit, ſubcolorata, Auguſtea facta abluendo candidior,) ſicut ſecūda Liuiæ à coniuge eius. Ita deſcendit Hieratica in tertium nomen. Proximū Amphitheatricæ datum fuerat à confeſturæ loco (Guiland. Arthribitica, ab

Lib. 19. ca.

Lib. 19. ca.
& 12.

Lib. 2. 10.

Arthribica præfectura, cuius meminerunt Strabo, Ptolemæus, Stephanus. Arthribin etiam memorat auctor. Quidam Amphitheatricem dici potuisse suspicatur, quod in Amphitheattis Ægypti, Alexandriæq; potissimum, à concursu populi vacuis cōficerentur, ut solent mercenarij opifices in locis publicis à vulgi turba non occupatis artem suam exercere. Forrasis & id Romæ factum in aliquo Amphitheatro, vnde nomen. Excepit hanc Romæ Fannij sagax officina, tenuitq; curiosa interpolatione principalem fecit è plebeia, & nomen ei dedit. Quæ non esset ita recurata, in suo (nomine) mansit Amphitheatrica. Post hanc Saitica ab oppido (Sai) vbi maxima fertilitas (Papyri suba.) ex vilioribus ramētis (philuræ) propriorq; etiānum & cortici Taniorica à vicino loco (Guillandinus legit Tanica à Tani ciuitate, hodie Damiata) pondere iam hæc nō bonitate vanalis. Nam Emporetica inutilis scribendo, inuolucris chartarū, segestriumq; meritis vltim præbet (Quidam legūt segestrium, *καὶ τῶν ἑλκῶν, σκευαζέτω, καὶ γὰρ οὐκ ἔστιν*. Varroni tamē segestria dicūtur stramenta è segete, quibus lecticas inuoluebāt, ut ab imbre, puluete, & externis quibusuis iniurijs defenderent. Alij quæuis *ἐνδύματα* & inuolucra sic appellari putant, quod iis segerantur, seponantur ac separantur quæ occurrunt. Sunt etiam segestria vela aut tegumenta culicia, ex pilis caprarū aut hircorū contexta Procopio lib. 2. belli Persici, & Suidæ. Sueronius in Augusto, segestrio aut lodicula inuolurus, non ut vulgò festerio. Cuiacius 13. Obseruat. idēd à mercatoribus cognominata. Post hanc Papyrus est, extremumq; eius scapo simile, ac ne funibus quidem nisi in humore vile. Vetus codices habent extimū, quod probat Dalechampius, pro extimo ac supremo cortice. In hoc Plinij loco Guillandinus Turnebum accitet insimulat, res chartæ species inuehentem, Hieratica, Augustam, Liuiam, cum vna eadēmq; sit Ægyptiis dicta Hieratica, quoniā religiosus & sacris tantum voluminibus dicata esset, Romanis adulatione prima Augusta, adulatione secunda Liuia, ut obscurius & ignotius, ordinēque tantū tertium eius nomen fuerit Hieratica. At qui totum hæc de re Plinij sermonem diligentius expendit, Turnebum & Ruellium à Guillandino iniuste reprobos fuisse iudicabit. Cum enim chartarū genera pro latitudinis differentia recenset perspicue plures eius species constituit. Emporeticæ digitos sex esse vult, Saiticæ pauciores novem, Amphitheatricæ novem, Fannianæ decem, Hieraticæ vndecim, optimis vero duabus, id est Augustæ & Liuianæ (ut paulò post ostendemus) tredecim. Præterea Augustā & Liuianā eandem nō esse apertissimè demonstrant hæc Plinij verba. Augustæ in Epistolis auctoritas relicta. Liuiana suam tenuit, cui nihil e prima erat, sed omnia è secunda. Hæc ad Guillandini opinionē refellendam, tuendāq; Turnebi & Ruellij sententiam satis valent, sed multò magis quæ sequuntur, in quibus ex Dalechampi iudicio & deprauata quædā corriguntur, & obscura declarantur. Verba Plinij sunt. Texuntur omnes tabulæ madentes Nili aqua. Turbidus liquor vim glutinis præbet, cum primo supina tabula scheda adlinitur, longiorē Papyri, quæ potuisset se segminibus (aliās segminibus) vtrinque amputatis. Transueta postea crates peragitur. Premitur (aliās premuntur) deinde prælis, & siccantur Sole plagulæ, atque inter se iunguntur, proximarum semper bonitatis diminutione ad detrimas. Nunquam plutes (philuræ subaud.) scapo quā vicenæ. Hic Guillandinus Turnebum & Ruellium ignorantix accusat, quod locum non intellexerint, nec viderint tabulas hic dici Papyri schedas, quæ auulse compinguntur, non autem asseres philuris subditos, super quibus glutinatur. At contra hæc testis, ille perperam sensisse videtur. Nam dum charta fiebat, necesse fuit tabulā subici, super qua discederentur textæ & transuerse philuræ, quæ glutino, vel aqua Nili turbida cōmitterentur, quod Plinius his verbis indicat. Texuntur omnes tabula madente Nili aqua: sic enim ex manuscripti codicis fide legendū censet Dalechampi.

Idem

Idem ex iis verbis perspicuū fit (cum primo supina tabula scheda adlinitur). Quæ sic accipit Guilandinus, cum primo scheda, id est, philura adlinitur & insternitur tabula supina, auferēdi casu, id est, exposita in longum eadē philura. Quod sanè reperitionis genus insulsum minimè cōuenit succinēt Plinij breuitati, cum presius dici potuisset & aptius (cum primo supina scheda adlinitur) quibus verbis nihil clarius, nec cōgruentius esse potest. Supinam schedā idem exponit recto situ positam, quomodo Liuius supinas manus dixit erectas, matronis in publico dolore ad cælum & Deos tendētibz. Dalechampius verò supinā schedam interpreta-
tur, cuius pars quæ in scapo vergebat introrsum, cum super tabula distenditur, extorsum vertitur, nec tabulæ lignum tāgit sic enim posita, quia mollior, humidior ac tenerior est, facilius superinectā aliam amplexatur & retinet. Idē Guilandinus legēdum putat (transuersa postea cute peragitur.) At manifesti pti codicis integritas vulgatam lectionem nihil immutādam esse suadet: cōmodius enim & cōcinnius appellari nō potuit chartarum textus, quā cratis nomine, ob rectas transuersasq; philuras sibi mutuō superincubentes, quæ cratis vel elatrorū figura est. Porro plagula est chartæ iam cōfectæ, ac suis philuris, siue schedis, siue ramentis textæ velut lamina, quā chartæ nostræ ex linreis tritis cōfectæ folium vulgus vocat. An verò in apicis locis chartæ siccarentur an vmbrosis & persflatis. nō est indignum scitu quod id pertineat ad Plinij literam vel emōdandam vel cōfirmandam. Verum id quidem est, quæ solo a quæ humore glutinātur disillire, cum vapore solis inarescūt. At quæ luto pingui, aut pollinis flore aqua diluto coherant, solis tepore & æstu, atq; adeo ignis calore tenacius cōmittuntur. Itaq; qui chartas densas libris compingendis, aut tegēdis mercibus cōficiunt, vbi prælo chartæ quadratam plagulam satis presserint, insolatu siccāt, & librarij voluminū quæ consueuntur posteriora glutine obliata, vel igni admouēt, vel soli exponunt, vt citius resiccēntur. Quamobrem & olim chartas insolatu durari siccariq; solitas vero ab simile nō est. Deinde Plinius Lib. ij. c. 12
chartarum species ex latitudinis differentia, & earum ordinem exponit. Magna in latitudine eorum differētia, tredecim digitorum optimis. Duæ detrahūt Hieratica, Fanniana denos habet. Et vno minūs Amphitheatica. Pauciores Saitica: nec malleo sufficit. Nam Emporeticæ breuitas sex digitos nō excedit. Præterea spectantur in chartis, tenuitas, densitas, cādor, læuor. Primatum mutauit Claudius Cæsar. Nimia quippe Augustæ tenuitas tolerādis non sufficiebat calamis. Ad hoc trāsmittens literas lituræ metum adferebat aduersis, & aliās indecoro visu per trāslucida. Igitur & secundo corio statumina facta sunt ē primo subtegmine. Auxit & latitudinem. Pedalis erat mēsurā, & cubitalis macrocolis. Sed ratio deprehendit vitium, vnus schedæ reuulsione plures infestāte paginas. Ob hoc præclara omnibus Claudia: Augustæ, in epistolis auctoritas relicta: Liuiana suam tenuit, cui nihil ē prima erat, sed omnia ē secūda, cui nihil primum erat, sed omnia secūda, ex vetusto codice.) Scabrieia lauigatur dēte cōchæve, sed caducæ literæ fiunt. Minus sorbet politura charta, magis splēdet. Rebellat sæpe humor incuriosē datus, primoq; malleo deprehēditur, aut etiam odore, cum fuerit indiligētiōr. Deprehēditur & lentigo oculis, sed inserta mediis glutinamētis tania, fungo Papyri bibula, vix nisi litera fundente se tantum inest fraudis. Alius igitur iterum texendis labor. Glutinum vulgare ē pollinis flore temperatur seruente aqua, minimo aceti aspersu. Nam fragile gummique fragilia sunt. Diligentior cura molli panis fermētati colato aqua seruente. Minimum hoc modo intergerij: atque etiam Nili lenitas superatur. Hæ sunt ex Plinio Chartarum species. Prima est latitudinis decem digitorum, quales sunt Augusta & Liuiana: aliæ enim esse nō potuerunt quā hæ, ab adulatio ne Augusti & Liuiæ principem locum nactæ, reiecta in tertium bonitatis & nobilitatis locum Hieratica, quæ secunda est digitorum vndecim. Tertiā Fanniana, de-

cem. Quarta Amphitheatrica, nouem. Quinta Saitica, pauciorum nouem, *αὐγούστα* octo, quæ nec malleo sufficit, vel quod tam angusta sit, ut malleum qua parte ferri, latiore non admittat, vel tam fragilis sit, ut malleo percussa disrumpatur. Sexta Emporetica, sex digitorum. Taniticam cortici propiorē, & venalem pondere non bonitate in hoc censu non reposuit. Hæ fuerūt chartarum differētiæ dum vixit Augustus, mutatæ postea à Claudio. Nimiā enim Augustæ tenuitas tolerādis non sufficiebat calamis, quo minis pertunderent ac perforarēt, & transmittens literas, id est, literarum atramentum, literarū metum afferebar auersis. Sic enim legēdum ex vertusto codice. Nam aduersa charta est exterior, & oculis nostris obiecta, quam scribētes intuemur, in qua calamus properat. Auerſa posterior, & à tergo posita. Litera verò effusi sparsiq; atramēti in bibula charta est macula, ei similis quam penna scripturam delētes inducimus. Apparet certē ea magis in auersa chartæ facie, illuc subeunte atramēto, vr̄ cū aduersa iam aliquid scriptum est, in auersa maculis nigris scedata præterea nihil pingi queat. Igitur & secundo corio statumina facta sunt, & primo subtegmine. Vetus codex habet, Igitur & secundo corio statumina facta sunt, ut primo subtegmina, sensu nihil discerpāte, etiā si statumina legimus. Stamen id est quod colo obuolutum mulieres nent. Est & in textinis filum directum, intra quod subtegmē siue trama currit trāuersim. Statumen vero ndica siue palus quo vitis fulcitur. Auctoris ergo sensus est. In charta Claudij siue primo corio ē rectis philuris cōfecto additum est secundum velut subtegmē siue trama ex schedis trāuersis textum, sic huic impacta pro tertio corio siue statumina siue statumina sursum ē rectis philuris composita, velut in primo corio. Auxit & latitudinem. Pedalis erat mēsurā, & cubitalis macrocolis. Sed ratio deprehēdit vitium, vnus schedæ reuulsioe ampliores infestāte paginas. Sic vetustus codex. *Μακροκόλι* *ἀπὸ τῶν μικρῶν καλλῶν* dicta putat Guilandinus, Dalechampius *ἀπὸ τῶν μακρῶν καλλῶν*, à longis velut artubus, & mēbris. Mensura pedalis & eubitalis, id est, sesquicubitalis harum chartarum an in lōgitudinem an in latitudinem exporrigeretur, Plinius non statuit: in latitudinem potius existimat Dalechampius, de latitudine enim hic agitur: & scapi Papyri, vnde schedæ distrahebantur, nota est lōgitudine superioribus, circiter quatuor pedum, quæ ad pedis vel cubiti mēsuram conuerti nō potuit: quamuis *μακροκόλι* nomē longitudinem potius indicet quā latitudinem. Cū autem vnus schedæ reuulsione ampliores vel plures infestati paginas dixit, docet nos plagulas chartæ confectæ, siccæ, malleæ, laugatæ plicati soltas in paginas, ut sit & in nostris linteis, quæ quo complures essent, magis scriptura conturbaretur ac læderetur, si quis vnā philuram vel improbitate ac malicia, vel corruptam ac vitiosam exemisset. Augustam epistolis laudatam testatur Martialis, salutatricemque vocat.

Lib. 9.

Marcus amat nostras Antonius Attice musas,

Charta salutaris si modò vera refert.

Ex his pro æstimationis ac pretij ordine, & latitudinis varietate, quoniam pariter esset omnium longitudo, chartas numerare, & in suis classibus recēdissimus. Augusti tempore Macrocolas primas, pedem aut sesquipedem latus, Augustam & Liuiam optimas, digitos tredecim, Hieraticam vndeceim, Fanniam decem, Amphitheatricam nouem, Saiticam, & quam omisit auctor Taniticā u pauciores, nempe septē vel octo, Emporeticā sex: quas omnes anteiuit & bonitatis & dignatione Claudia, principatu Claudij texta, ex duobus statiminibus siue statum nibus, & interiecto vno subtegmine optimis, nempe Augustæ & Liuianæ aliquo latior, ut suspicari licet, ad digitos quatuordecim vel quindecim. Ex his cuius per spiciuū esse potest, Guilandinum non rectē affirmasse Augustam & Liuiam, Hieraticam eandē esse chartam. Hic nō sunt omittēda chartarum vitia quatuor, quæ

auctor

auctor ponit, scabritiam, rebellem cōtinuam, lentiginem, tantam vnā vel plures. Scabritia, inquit, læuigatur dēte, &c. Id est, Scabritiæ remediū est dēte vel concha politura, moderatione tamen adhibita, ne vehementius atteratur. Nam quomodo ex cōplanatione & erugatione splendat magis, fulgenteq; nitore oculis placeat, validiore tamē attritu nō sorbet atamētum sed respuit, & si quæ literæ appictæ sint, instabilis & fugax est scriptura, nec permanet. Alterum vitium est rebellio. Rebellat humor incuriosē datus, cum artificis operæ & studio toluclatur peruenacius, nec omne cōij spatiū ex æquo rigat & oblinat, sed alicubi subsistit copiosior, alicubi parciore affunditur, vnde plagularum fit inæqualis & superficies, & resiccatio. Nam cum probe curatam, subactam, tractatamq; chartam esse putat artifex, neq; quicquid aliud operæ suæ præterea desiderare, tum cōtra eius spem vitium id detegitur, & tanqua recrudescit, quod eius diligētiæ negotiū faciat itaq; retexenda charta, & eodē labore domanda, atq; peruincēda quo prius. Malleo deprehēditur id vitium, aut quod percussam laceret, aut quod eminentiora tubera, de pressiorib; lacunas plagularum inæquali percussu tundat, & inuenta dēte rigare tufas ostendat. Prodit eam abē etiā odor, charta præsertim negligētius prælo cōpressa & liccata, mucidus fœtidusq; putrescente ac situm olente humore, qui nec prælo est elisus, nec insolatu dissipatus. Deprehēditur & lentigo oculis, &c. Lentiginē in charta Plinius appellat nœuos, sordes, decoloris punctorum notas, & maculosas velut alpergines, quæ fiebāt dum cōpingerētur coria, si quid illaberetur impurius, quod natiuū colorem inquinaret, aut si quid in schedis cōortum & conglobatum chartam infuscatet. Oculis id cognoscebatur, vel conspecta statim charta, si maculæ in aperto forēt, vel ad solem explicata, si altius insiderēt (Sed inserta me diis glutinamentis tenia.) Quartum ac postremum vitium est tænia, non, ut Guilandinus arbitratur, philuta vel scheda, sed oblongus & angustus in plagulis ductus, nullo glutine, aut pingui humore lius & pertus, in quo sola Papyri fungosa & bibula raritas absq; vllō tectorio calamis scribētium occurrit, & litetam siue atramētū picturam dum haurit diffundit. Quod nec ictu mallei, nec oculotū conspectu exploratum sed scriptura tantum, tum picta litera liquefcēs vtraq; parte cōbibitur, & tam aduersam quā auersam partem inquinat. Hæc de Papyro & veterum chartis ex Plinio & Dalechampij observationibus studioso lectori fortasse nō iniucunda exponere voluimus. Papyrus Niloticam siue Ægyptiam ex Ægypto delatam, & qualē describunt Theophrastus & Plinius, Penā in horto Pisano florentem se legisse ait, quam Cypero cōgenerem facit & similimā, verū elegantiotem multo, iunceo, arundinaceo vobis. Iquetro caule, medulla fæcto comētitiā, stipitibus multis, proceris, lœnibus, nitidis surrectis, senū, interdum septenū cubitorum altitudine, quibus ad imum tantū folia insunt Cyperi aut Sparganii repanda, radicibus arundinaceis, fibrosis, floribus valde speciosis, lucnētam in ambitu cæsariem referentibus, numerosis gracilibus thyrsulis, dēso & æquali comarum stipatu, & apicibus prominentibus, Ferulæ in modum collectis, nō ut in Cypero sparsis, quos circa ortum ambiunt radiatim foliola

PAPYRVS Ægyptius,
Penā.



quoniam & in Syria Cœle (vt suo loco retulimus) nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa, cognomine teuchites, proximus Babylonius, pessimus ex Africa, ac sine odore. Est autem rotundus, vinosæ mordacitatis ad linguam. Syncerus in confricando odorem rosæ emittit, rubentibus fragmentis. Quæ si cum Dioscoride conferas, quædam manca, alia perperam notata perspicies. Neque enim ex Dioscoride luncus ex Nabathæa teuchites cognominatur, sed Babylonius. Quare sic Plinij locus explendus videtur. Laudatissimus ex Nabathæa, proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin, pessimus, &c. Est autem *τρίχως*, *ἀγρίων*, vas, vnde *τρίχως* *χρίων*, quod vasis afferretur. Neque vinosam mordacitarem luncus huic inesse ait Dioscorides, sed linguam mordere *μὲν* *παλαιοὶ* *πυρρῶς*, id est, cum multo feruore: neque rubentia fragmenta, sed *χρυσῶν* *καὶ* *καὶ* *πυρρῶν*, id est, fissilem & purpurascens. Quod uterque de rosæ odore dixit, id negat Garcias: nam tritum quidem ait iucundum odorem spirare, sed non rosæ: annotatque Dioscoridem in his aromatis sæpe incertis comparationibus *υἱ*. Auicenna duo lunci genera statuit, vnum Arabicum, & boni odoris, alterum in Agiami natum, quo vocabulo Damascum ait intelligi Garcias. Alij luncum Agiami accipiunt luncum vulgarem, de quo Dioscorides lib. 4. vt eo capite Auicenna duo capita Dioscoridis commisceat, vnum de luncis odorato, alterum de luncis vulgari, qui locis humidis nascitur: nam Agiami exponit Bellunensis natum in loco humido & palustri. Illud verò æquè absurdum quod subiicit ex Dioscoridis auctoritate, luncum odoratum duarum esse specierum, quarum vna est quæ non habet fructum, altera quæ fructum habet nigrum: neque enim Dioscorides ita distinxit, neque fructus lunci odorati vsquam meminit. Serapio ex Abotania tradit luncum odoratum radicem habere similem Chulem, latiore tamen, cum minoribus tuberibus, ramulos tenues, qui fructum ferunt similem floribus Arundinis, sed gratiorem & minorem. Quid autem Serapioni sit Chulem nescio, nisi fortasse sit gramen, aut herba vulgaris Græcis *τρίχως* dicta. Pandectarius

Lib. 3. cap. 19.

Cap. 42. 1

Cap. 42.

IVNCVS odoratus,
Matthioli.SCHOENANTHI flores,
Lobelij.

Vocat

Incap. 36. vocat Chulem herbam capillarem. Recētiore accutatius & magis signatē Scho-
liba. nanthi speciem expresseſerunt. Matthiolus, qui se arculam florum Schoenanthi ple-
Forma. nam habere ait, folia ei Caricis vel Zeæ tribuit, robustiora tamē, sursum spectan-
 tia, ex quibus culmi geniculati, & in horum summitate flores exeunt odorati. Ra-
 dix subest ima parte villosa odoratāque, sed odor tempore perit. Clusius in scho-
Lib. 2. cap. liis in Garciz historiam refert natas sibi fuisse lunci odorati plantas ex semine
 Italia misso. Is teneris multis culmis assurgit, tenerioribus foliis quā Gamen,
 siue *mix*, quā plurimū refert, linguam mordicantibus iucunda & aromatica
 quadam acrimonia, quæ trita gratum quidem spirant odorem, sed in quo Rosæ
 odor non appareat: nam manducata potius Rosæ præsertim saccharo conditæ
 odorem æmulari videntur. Nullum protulit florem, quod seriū proveniret. Ra-
 dix fuit numerosa, capillacea, non, ut dixit Serapio, nodosa, gustu feruido & aro-
 matico. Tandem frigidioribus perit, ut annua planta esse videatur. Eius iconem
 ex eodem Clusio hic proponimus, cui addidit Lobellius flores spicatum ē g
 secundum caulem Lilij titū hærentes, quos etiam hic appinximus. Nascentur in
Locu. Mazcate & Calaiate Arabiz provinciis maxima copia Garcia teste, non aliter
Lib. 2. cap. quā Gamen vulgare in Hispania, quo pascuntur animalia. Ab incolis vocatur
Nomina *Sachbar*, à nonnullis *Haxu cachule*, id est, herba lotoria, siue lotionibus idonea.
 Aliis etiam nominibus Arabes Schoenanthum nuncupant, ut Auicenna Adhar,
 Serapio Adher, ut diximus, quos sequuntur Arabici omnes & Persici Medici. Flo-
 rem verò vocant Foca, Persæ qui ad supradictas vsque provincias pertingunt,
 Alaf, quod herbam significat. Apud Indos Herba Mazcatensis appellatur. Sunt
 qui Paleam de Mequa vocant, alij Pastum camelorum, nec immeritò. Non sunt
 tamen istic adeò frequentes cameli, ut totum gramen cum floribus depascantur.
 Sunt enim etiam asini, muli, equi, boves, capræ & oves, quæ nullum aliud pabu-
Liba Anel. lum norunt, quā hunc luncum. Quare non temere scribit Galenus nescire
 quomodo Schoeni anthos, id est, lunci odorati florem vocent, cum floris copiam
 non admodum suppediter. Nam etsi tota adferatur herba, sunt tamen eius supe-
 riores partes à camelis sæpe depastæ: vescuntur enim ea, & delectantur maxime,
 non quòd tanius sit illis camelorum summitates depascentium numerus, ut na-
 lus vnquam flos nobis compareat, sed quòd trunca sæpe adferretur herba,
 nempe radix, folium, caulis, flores autem ferè nulli, quemadmodum hodie videtur
 in emporiis magnam plantæ copiam, flores autem perpaucos, tum quia plurimæ
 illic animantes iis ut cæteris graminibus vescendo summities absumunt, tum
 quia flores papposi tenuisque facillè dilabuntur. Huic florum paucitati accedit
 institorum negligentia, qui nullos adferunt, medicis hos non postulantibus,
 quòd eorum vñs desierit. Defertur quidem in Indiam in medicum vñm vsur-
 pandus. Maxima tamen copia in fasciculos colligatos naubus inferunt equum
 mercatores, ut equis substernant, ne stercoreis & vrinæ pædore offendantur: nam
 simul atque maduerit in mare abiiciunt, & recentem substernunt. Sed & nauez
 fasciculos aliquot secum aduehere solent, quos in India vendunt. Refert idem
 Garcias se in insula Dio vili emisse multos lunci fasciculos, quos in Lusitaniam
 cum aliis aromatibus mitteret, nullum tamen florem se vidisse. Sed nec ab incolis
 in pretio habebatur, nec eius vñus apud eos vñs nisi in lotionibus: eo enim se &
 iumenta sua lauant. Arabes verò & Persæ Medici ad medicamenta duntaxat vsu-
 pant. Schoenanthum nostrum ex Alexandria Ægypti ad nos aduehiunt, eo im-
 portatum ex locis antedictis. Sed in eo deligendo diligentia magna est adhiben-
 da: id enim palearum quarundam & herbarum festucis impostores adulerant.
 Ad hæc ne verustate vires amiserit diligenter expendendum. Hæc enim vitia mul-
 tis persuaserunt Schoenanthum Officinarum spurium & illegitimum esse. Sed sal-
 lunant

luntur illi, quoniam tum descriptio, tum vires perspicue eos refutant. Nam quod radices primum medico vsui conuenientes illi non inesse contendunt, sed capillorum modo tenues, deinde paleas ipsas nullam gustantibus acrimoniam relinquere, postremo Schœnanthum vulgare luncum non proferre, sed calamos geniculatos Tritici vel Hordei modo, in iis vehemēter errant: siue enim tenues sint radices, siue crassæ, nihil ad historiam atinet, modò iis viribus præditæ sint quæ eis tribuuntur, quibus ideò destitutæ non sunt quòd sint capillacæ, nam Dioscorides eas non descriptit. Quod Schœnanthum nostrum acrimonia careat, id falsum est: id enim quod vetustate euanidum & exoletum non fuerit, linguam manus vellicat. Quod luncum ferat, non calamos quos ferre debeat, apertè Dioscoridi refragatur, scribentibus: *ῥίζης δὲ τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τῶν καλῶν, καὶ τοῖς μύσχοις*, id est, Vfus est floris, calamorum, & radicis. Illud verò absurdissimum, Galangam lunci odorati radicem esse, cùm Galanga auctore Garcia in China nascatur, quæ bis mille leucis ab Arabia distat, & plurimùm à luncio odorato differt tum foliis, tum radice, nec nisi sacra proueniat, luncus autem sponte nascatur, nec feratur. Alij aliis rationibus nostrum Schœnanthum vt adulterinum improbāt. Primum quòd caulem Cyperi non habeat, vt Dioscorides in Cypero testatur: deinde quòd radices nostro Phu similes non sint: præterea quòd antiquis florum, caulis, radicem vsus tantum fuerit, non foliorum, quibus hodie tantum vtuntur: adhuc quòd in nostro Schœnanthi tum caule tum radice nullus prorsus calor percipiatur, nec sapor, sed in foliis quibus Dioscorides non vtitur. Quæ facile refelluntur. Dioscorides enim Cyperi caulem nulla adiectione dixit esse *ἵμοιεν χρόνῳ*, id est, similem esse luncio, vulgari scilicet. Quare Ruellius perperam caulem lunci odorati vertit. Cùm enim Dioscorides Schœnantho calamum tribuat, Cyperi autem caulis calamus non sit, nec rotundus, nec geniculatus calami instar, sed angulosus, vt ad huius discrimen luncus ille odoratus rotundus cognominatus sit à veteribus, quoniam pacto Dioscorides capite de Cypero ei lunci odorati rotunditatem assignasset: Idem nuspiam Phu radicem Schœnantho similem dixit: sic enim capite de Phu, *ρίζα δὲ ἡ μὲν ἀνωτέρα πλεονεχὺς διατεταμένη μακρὴ τὸ πάχος, ἀπὸ τοῦ ἑσπέρου ἔχει ὑπερπερὶ χρόνῳ, ἢ μέγας ἰσχυρὸς*. Id est, radix Phu superior digiti parui crassitudinem æquat, ex obliquo fibras seu radículas habens lunci & Ellebori nigri modo. Hic fibras radices Phu fibris radice lunci simpliciter comparat, vt hic quoq; Ruellius malè lunci odorati verterit. Quod autem Schœnanti nostri caules & radices in minimè in medicina vsurpentur, sed folia duntaxat, nò euenit, quòd patescit illæ sapore, odore, viribusque careant, (sunt enim omnes odoratæ & efficaces) sed quia post Dioscoridis tēpora incuria Medicorum ita inualuerit vsus, proculdubio reuocandus, vniuersæque planta vtendum in posterum, quod testatur Galenus his verbis. Ego quidem mihi testis esse possum, habere me nunc ad manus aliquot lunci odorati plantas, quarum calami ac radices non minùs sunt acres quàm folia. Quare qui Schœnanthi nostri natales ac facultates diligentius examinauerit, id ex Arabia in Alexandriam, inde ad nos importari ex negotiatoribus certò intelliget, ac legitimi facultatibus præditum esse testabuntur Medici omnes, qui id sæpe in medicamenta vsurparunt. Eas autem facultates Dioscorides ita declarat. lunci odorati floris, radicis est vsus. Vim vrinæ faciendæ habet, menses pellit, inflationes discutit, caput aggrauat, modicè adstringit, comminuit, concoquit, & venarum spiracula aperit: flos eius in potu utilis est sanguinem reicientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocinoris & renum. Miscetur antidotis. Radix adstringentior est: ideò fastidiis stomachi, hydropicis, conuulsis drachma vna cum pari pondere Piperis per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad desidentium fatus vtile est. Plinius aliter de iis

scripsit. Discutit inflationes, ob id stomacho utilis, bilēque & sanguinem re-
cientibus. Singultus sedat, tuctus mouet, urinam ciet, vesicæ medetur. Ad mulie-
bres vsus decoquitur, opisthotonicis cum resina arida imponitur. Dioscorides
florem duntaxat stomacho utilem esse dixit, & sanguinem tantum reicientibus.
Quod Plinius ad muliebres vsus decoquit, ille decoctum ad inflammationes vel-
ut feminis insidentibus utile. Vterque urinam ciete. Reliqua, quæ Plinius ha-
bet, Dioscorides prætermisit. Galenus de iisdem hæc prodidit. Schæni anchios
modicè calfacit, modicè etiam adstringit, nec planè à renuitatis natura alienus est.
Quare urinam mouet, mensesque ciet, adhibicum siue in fotum, siue in pono-
nem. Prodest & stomachi, & iecoris, & ventris inflammationibus. Magis adstrin-
git radix. Flos calidus est. Porro in omnibus sui partibus, in aliis magis, in aliis mi-
nus gustantibus apparet adstrictio. Quare hæmoptoicorum medicinis admisit-
tur. Hæc Galenus. Et si in Officinis verus odoratus luncus reperiatur, tamē odor
& sapor adeò euauerunt, virēsque tempore ira imbecilles factæ sunt, ut putent
nonnulli hunc non aliam esse plantam, inquit Pena, quàm quæ passim in Adriati-
cis frequens, & nonnunquam in mediterraneis, litoribus, & sabuletis occurrat, pla-
nè specie, magnitudine, culmōque concolori similem luncō odorato meminit-
que ille sibi obrusam à pharmacopœis Venetiis & Monspelij, qui afferma-
rent veri esse congenerem. Verùm ab illius præstantia longius abest, quàm Can-
na vulgaris à Calamo aromatico deinde folius est gramineis, & longè dissimilem
florem profert. Conicere possit quispiam luncum esse odoratum, quem in Cam-
pania inueniri memorat Plinius.

CALAMVS AROMATICVS.

CAP. CXXV.

Nomina



ΚΑΛΑΜΟΣ ἀρωματικός, Latine Calamus aromaticus, potius quàm
odoratus. Auicenna & ceteri Arabes omnes Cassah & Aldirita vo-
cant. Cassah enim Calamus est, Aldirita ex aromatibus. Dirire enim
idem quod aroma. Serapio corrupto vocabulo Hassabel derire. De

Lib. 1. cap. 17.

Cap. 169.
Simpl.CALAMVS aromaticus,
Matioli.

Lib. 1. cap. 17.

Lib. 1. cap. 17.



hoc Dioscorides sic breuiter. Calamus aroma-
ticus in India nascitur. Melior est fuluus den-
se geniculatus, & qui in assulas multas frangit
plena araneorum histula, albicans, viscidus in
mandendo, & astringens cum aliquâ acrimo-
nia. Et Plinius, Calamus, inquit, in Arabia na-
scens, communis Indis atque Syriæ est: in qua
vincit omnes, à nostro mari centum quinquag-
inta stadiis. Inter Libanum montem, alium-
que ignobilem, non (ut quidam existimauerunt)
Anrilibanum in conualle modica iuxta lacum
cuius palustria æstate siccantur, trientis ab eo
stadiis Calamus & luncus odorati gignuntur.
Nihil ergo à ceteris sui generis differunt aspe-
ctu. Sed Calamus præstantior odore statim è lon-
gino inuitat, mollior tactu, meliorque qui
minus fragilis, & qui assulose potius quàm Ra-
phani modo frangitur. Inest histula araneum,
quod vocant florem (aliàs, araneum, quem vo-
cant florem.) Præstantior cui numerosus, aliàs,
numerosior.) Reliqua probatio, ut niger sit (Dio-
scoridi ξιππός, id est, fuluus.) Damnatur aliubi
(quidam legunt, aliis.) Melior quo breuior &
crassior,

crassior, lentusque in frangendo. Quæ ferè ex Theophrasto Plinius transcripsit. Lib 9. hist. cap. 7.
 Sic enim ille. Calamus & luncus trans Libanum montem, inter ipsum Libanum
 & alium quendam montem paruum (ignobilem Plinius dixit) in conuallē parua,
 non, vt quidam d. xere, inter Libanum & Antilibanum. Etenim inter hos campus
 est amplius & pulcher, quem Aulonem vocant. Vbi vero Calamus & luncus pro-
 ueniunt, lacus magnus est, iuxta quem palustribus siccatis istienascuntur. Occupant
 locum triginta stadiis ampliore. Virides nequaquam esse videntur, (Sic legit Ga-
 za, vt & vulgata exemplaria, & ἀεικῶσι δὲ χλωροί: Guilandinus legit, ἐκ ὄρουσι δὲ
 χλωροί, id est, virides modici sunt) sed siccati facie nihil ab aliis differunt. Locum
 ingredienti protinus odor sentitur, non tamen longius expirat, vt quidam refe-
 runt. Sequitur in Græco, ταῖς περιφερύταις ἐπὶ τῶν χάρων: quæ omisit Gaza, &
 reuera de prauata sunt, ac sic restituenda. ταῖς περιφερύταις ναυοῖς περὶ τῶν χάρων, id
 est, à nauibus quæ eo cursum tenēt sentiri. Hic enim locus a mari pluribus quàm
 centum quinquaginta stadiis abest. Sed Arabia regionis assilatam odoratam esse
 aiunt. Hæc Theophrastus, qui quæ de loco illo nariat, ex aliorum setinonibus &
 fide narrat. Is campus est, auctore Guilandino, vallis quem intersecat Iordanus.
 Lacus verò Genesareticus, D. Matthæo mare Galilee, D. Ioanni mare Tyberiadis.
 Serapio & Auicenna magnam partem eorum, quæ de calamo tradiderunt, ex
 Græcis descripsere. Quæ omnia quia graphice Calami aromatici partes omnes
 non depingunt, dubitandi occasionem præbuerunt, num radices, quæ passim in
 Officinis prostant hoc nomine, pro legitimo Calamo habendæ sint. Brasauolus has
 pro vero calamo habet. Fuchsius easdem veti Calami aromatici radices esse putat.
 At plures, itaq; rei herbariæ peritissimi, has vulgares radices Acori veri radices esse
 statuerunt, & perperam in Officinis pro Calamo vsurpatas fuisse. Qui non solum
 odore, cæterisq; facultatibus, sed etiam natura & rota effigie ab Acoro dissidet. Pri-
 mum quæ Calami feruntur esse radices, Iridi persimiles sunt. geniculatæ, reflexæ,
 subalbidæ, acres, odore præstantes, &, vt ait Galen. etiam subamaræ. Deinde folia
 quæ nonnunquã cum planta ipsa adferuntur, plane sunt Iridis. Quæ omnia Acorum
 plane referunt, quale Dioscorides depinxit. At Calamus verus eodem auctore
 fuluus est: assulatim frangitur, tubum arundinaceum seu fistulam habet araneo-
 rum plenam, lentus est in mandendo, adstringēs & subacris. Ad hæc ex Arundinū
 est genere Theophrasto & Plinio testibus, id quod etiam ipsum nomen demon-
 strat, atque etiam ipsius caulem seu arundinem non radicem in medicum vsum
 assumi. Sed vulgaris Calami radix, quæ Acori esse probauimus, neq; assulatim fran-
 gitur, sed transuersim Iridis, vel Raphani modo, neq; fistulam seu arundinem fert,
 sed caulem Iridis, graciliorem tamen, & longiorē, neq; adstringit, neque subacris
 est, sed planè acris, neq; amaritudine caret auctore Galeno, quæ Calamo vero de-
 est. Garcias Calamum aromaticum quo Officina in Lusitania vtuntur, eundē esse
 asserit cum eo qui in India magno est vsui tum vitis, tum mulieribus, & iumentis.
 In Guzarate vocari ait *Vas*, in Decan *Bache*, in Malabat *Vazabu*, in Malayo *Diam*
gao, in Persia *Heger*. Seritur, inquit, per vniuersam Indiam, plurimus verò in Guza-
 rate, & Balagnate, Goæ etiam, vbi multus est eius vsus, in hortis satus provenit, sed
 perpaucus. Sciscitatus est Garcias à multis Coracone incolis & Arabib⁹, num apud
 eos nasceretur Calamus: item an esset eis cognitus, eoq; vteretur. Negarunt omnes
 apud se inueniri, nisi ab Indis aduectum, probeq; sibi cognitum, utpote cuius apud
 eos plurimus esset vsus. Non falli tamen eos ait qui Arabicum vocant. Nam ex
 India in Arabiam deferretur, & inde in alias regiones, neq; qui Alexandrinum ap-
 pellant, quoniam hinc Alexandriā, deinde Barut & Tripolim Syriæ deferretur. Is ve-
 ro quo se in India vti Garcias ait, radix non est (pusilla enim est eius radix) sed ip-
 sius Calami cum aliquatula interdum radices parte fragmentū. Ex iis perspicuum

est, Calamum, cuius meminit Garcias, lōgè aliud esse à Calamo Officinarij pos-
stratum, quin potius eius Calamum legitimum videri à veteribus descriptum. Ma-
re quāplurimi in ea perseverant sentētia, Calamum nostrum vulgarem Acon esse
radices, nosq; legitimo Calamo carere. Quem si quis nactus sit, sciat has eius vires
ex Dioscoride. Calamus aromaticus urinā potu ciet: quare cū Graminis aut Apj
semine coctus & potus, utilis est hydropicis, nephriticis, stillicidio urinz, rupelq;
Menses & potu & appositu pellit: tussis iussu medetur per se, aut ex resina terebin-
thina hausto per arundinem fumo: ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus
imponitur. Suffitionibus, malagmaticisq; odoris gratia cōmiscetur. Ex Galeno. Cala-
mus leuculam quādam adstrictionem, ac minimam acrimoniam habet. Magis
ex parte essentia eius terrena est & areea, in frigiditatis caliditatisq; cōgatione
perata. Quamobrem moderate urinam mouet, & facultatibus, quæ iecori & sto-
macho imponuntur, misceri potest. Tum in fomenta quoque veri, quæ plūrimo
nes gratia, aut irritandis mensibus assumuntur, admiscetur. Habeatur igitur
di ordinis eorum quæ exalfaciunt & desiccant, valentiū tamen desiccant quæ
exalfaciant. Inest quoque ei quādam partium tenuitas.

ZINGIBER. CAP. CXXVI.

Nomina

Lib. 2. c. 94.



RACIS voce barbara *ῥιγγίβερ*, & *ῥιγγίβερ*, & *ῥιγγίβερ* dicitur, Latini
Zingiber & Gingiber, Arabibus *Zingibel*, Italis *Gengere*, Germanis
Ingher, Hispanis *Gingure*, Gallis *Gingembre*. Dioscorides vltimū
tius quā plantæ speciem expressit his verbis. Gingiber sui generis
planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens, qua virente a
perinde atq; nos Ruta vtitur, & in primis potibus & edulis admiscet. Huius
ces Cyperi modo paræ sunt, candicantes & odoratæ, atq; Piper sapore imitatur.
Eligi debent quæ teredinem nō senserunt. A multis tamen ob id cōdiuntur, quæ
celeriter cariem sentiant. Breuius etiam Plinius de Pipere scribens. Nō est, inquit,
huius arboris radix, vt aliqui existimauere, quod vocat Zimpiberi, alij vero Zingiberi,

Lib. 12. c. 7.

ZINGIBER, Penn.



Lib. 1. Aro.

Ind. c. 41.

Nomina

Cap. 26.

suppl.

Forma.

beri, quāquā sapore simile. Id enim in Arabia
atq; Troglodytica in villis nascitur, paræ
bæ radice candida. Celeriter ea cariem
quāuis in tanta amaritudine. Dioscorides om-
ni reliqua delineatione, radiculas tantum
morat vt Cyperi, cui tamen admodum
nō sunt, & maiores, nec pendulæ Cypentidis
tu. Plinius dixit tantum paræ herbæ radicem
esse candidam. Quare ampliore eius de-
criptionem ex Garcia & aliis hīc ponemus. Zing-
iber, vt docet Garcias, appellatur Arabibus, Per-
sis, & Turcis, *Gingibil*, non *Lengibel*, vt corrupte
legimus in Serapione: in Guzarate, *Dian*,
Bengala cū adhuc recens est & viride, *Adi*,
siccatur verò *Sulte*, in Malabar tam viride quā
siccum, *Imgi*, in Malayo, *Aliaa*. Est aut Zing-
iber folijs Iridi aquaticæ aut Gladiolo, nō Ar-
dini) similibus, magis tamen nigricantibus
le cum folijs duorum aut trium palmorum
tudine, radice etiam Iridis, multo
Cyperi, nō serpente, vt volunt quidam
ad-
modum acri, præsertim eius quod in Bacum
natur

natum est, ob nimiam quæ in ea exuperat humiditatem. Ludouicus de Barthema scribit erui radicem quatuor, & octo, & duodecim viciarium pondo, neque enim omnibus eadem est amplitudo: caulem trium, aut quatuor palmorum longitudine: cum eruitur Zingiber, relinqui internodium in scrobe, terræque operiri, seu semen eius radices proximo anno producantur alium fructum, id est, Zingiber. Et Antonius Pigafetta narrat in insula Thidore nasci Zingiber, idque recens edi panis modo, quod recens acie non sit veluti est siccum. Arborem non esse, sed paruum plantam, quæ caules ferat palmum altos, Arundini similes, folia item similia, sed angustiora & breuiora, quorum nullus usus, sed radices tantum quæ est Zingiber. Nascitur id in omnibus Indiæ provinciis cognitis, semine aut radice sarum. *Locus.* Nam quod sponte nascitur, exigui est momenti. Optimum & frequentissimum est Maluanicum, Arabibus & Persis maxime expetitur. Secundum locum obinet, quod in Bengala crescit. Tertium, quod in Dabul, & Bacain, totaque ea ora maritima. In solitudinibus & mediterraneis vix inuenitur, neque inde ad nos adfertur. Prouenit etiam in insulis D. Laurentij, & Comaro, quæ Æthiopiz sunt conterminæ. Vnde sumpta occasione dixerunt nonnulli apud Æthiopes & Arabas nasci. Galenus è Barbaria conuehi scripsit. Si per Barbariam Indiam intelligit, inquit Garcias, rectè quidem. At si per Barbariam eam Africæ partem, quæ hodie Barbaria nominatur, malè. Dioscor. in Troglodytica Arabia nasci tradidit. At apud Troglodytas quidem & Æthiopes nascitur, sed adeo exigua quantitate, ut vix incolis sufficiat, in Arabia verò minimè: nam ad Arabes ipsos importatur. Quod idem dixit Zingiber primis edulis admisceri, id verum esse confirmat Garcias, quod idem hodie quoque apud Indos obseruetur. Hæc etiam radix minutim concisa, & aliis herbis admixta, in acetariis additur cum aceto, oleo & sale: ac etiam cum carnibus ac piscibus coquitur. Quare rectè Dioscorides dixit Zingiber cibo conueniens esse, & cum condimento assumi, excalfactoriam vim habere, & concoquentem, aluum leniter mollire, stomacho vtile esse, efficax aduersus ea quæ oculis caliginem offundunt, in antidota addi. Quod autem aluum mollire ait, id intelligendum si recentes & teneræ adhuc radices edantur, multa adhuc in iis humiditate aluum molliente, & lubricante: nam vetustiores & exhausta humiditate siccæ aluum potius adstringunt. Galenus de iisdem hæc prodidit. Zingiberis radix utilis est, quam vtrique ex Barbaria ad nos conuehunt. Excalfacit potenter, sed non primo statim occurso velut Piper. Vnde sanè & minùs esse subtilium partium quam Piper existimandum, siquidem in tenues solueretur partes, & celeritimè actû ut illud fieret calidû. Apparet enim adhuc illaboratam, & crassiore quâdam ei inesse substantiam, nec eam siccam & terrestrem, sed humidam potius atque aqueam. Quo fit ut facili perforetur, cum scilicet excrementitia insit humiditas. Hæc Galenus. Succulentæ adhuc & recens conditæ radices ex Indiæ variis locis adferuntur maxime commendandæ, longè minùs verò hæc quas iam siccæ, & vi emolliente exoletas, lixiuio maceratas saccharo condiunt Venetiis. Describit paulò aliter Christophorus Acoſta Zingiber, qui in Noui orbis regionibus simplicium cognoscendorum studio peregrinatus, oculis multa & ipse subiecit, in quibus non rarò ei cum Garcia & aliis non satis conuenit. Planta hæc igitur est, ut is vult, ad trium quatuorve cubitorum altitudinem assurgens: folia habet quàm similia foliis Lachrymæ Iob, seu Ilij Solis: caulis crassitudine Asphodeli, quam & Halſulam regiam appellat. Tota foliorum quodam quasi congestu velut compacta est, ut humiles Arundines virides referte illam velledicas. Radices eadem ferè Lirij Cardeni siue Iridis radicibus. Frequentissima tota India Orientali nascitur, veluti in Bengala, Dabul, Becain. Fert & vniuersa prouincia Malabar, ubi eius longè est maximus proventus. Zingiber quod boni

*Locus.**Eleotia.**Lib. 6. 6m.**Lib. 6. 14.**Vires.**Temper.**Lib. 6. 6m.**Zingiberis ex Acoſta descriptio.**Forma.**Locus.*



tate præſtat, è ſemine vel radice, vti in præſentibus præſtat mandant viſum eſt, provenit. Sed in præſentibus locis non ſolum, ſponte naſcitur, ſed in præſentibus ianeis tamen rarum, mari inus copioſius. Toto anno viret. Id vti aſſeruent, Decembris & Ianuario menſibus legunt, ſiccant, terunt in mortario qui & argillacea operiunt, vt obturatis ea poris & foraminibus quibus id totum ocellatum eſt, difficiliùs corumpatur: recentius enim in præſentibus humo perdurat, conſervatque quod habet humoris, atq; ita à terebinibus tutius defenditur. Eriamnum vnde guſtatum leuiter adunt, minusq; quàm cum ſiccum eſt mordicat: quodque vda magis & humecta ſunt in quibus naſcitur loca, eo minus retinet acrimonia, quia & ceverſa moleſtius eſt quo ſicciora illa magis inopia aquarum ſitientia. Primis menſibus virens adhuc commendatur, & dapes vici acetarij inchoat. Neq; edendi modò cauſas eſt, ſtomachum acueſ, verùm etiam aluum ſollicitat, cuiusque idem profluuium ex cruditate conſiſtit. Hæ radices ſaccharo condiuntur, bene

contuſæ priùs, multiſque aquis macerata & elotæ quo magis magiſq; dulceſcunt. Quæ verò ex iis tempeſtiue lectæ ſunt, diligenter accurata, mundata, præparataq; antè quàm ſaccharo incoquantur optimè ſunt, gratioſiſq; guſtus, & cum melleaſtur, teneriores: vt quæ filaenta in ore relinquunt & amaricant, male. Improbat idem Dioſcoridis & Galeni ſententiã de Zingiberis locis natalibus, quod & vti ex aliis antè notauimus. Neque magis illi aſſentitur, eius radices Cypri præparatas tradenti, cum plane, inquit, cum noſtra iconè conueniant. Neq; vti addit, quòd aut minoris faciat, aut reſiciat quiſquam Zingiber quod tera ocellatum videat, quaſi id eo conſilio factum ſit, vt prauis & carie corrupti vitiæ eorum diſſimulentur & obtegantur. Alia longè eſt eius ratio, quàm vt vel hac de cauſa vel quo inde aliquid ad pondus accedat, ita procurent nempe ea quam tam diligimus, conſeruandi gratia. Hæc quidem de Zingibere Acoſta. Alia porro eſt

MECHINVM, *Pena.*



Mechinum
patrum,



dix Zingiberi cognata, quæ Zingiber ſuſcum & Mechinum Officinis dicitur. Id nò ſolum a Zingibere differt quòd eo immaturius ſit aut improbius, vt etiam declarat Pena, ſed potius ſpecie & concretionè (caret enim fibris & filamentis) perſpicuitate, ſuſcedine, ſoliditate & acriore guſtu, nec terebine exedi ſolita. Id etiam conditur. Eodem Pena pictam exhibemus raram Mechinum ſpeciem, & nuper adferri ceptam. Vulgatum Zingiber aut Mechinum reſert, ſed elegantiore aſpectu, colore Mechini, cortice Zingiberis albi, ſed ſquamatiſ geniculato, & ſetè articulato veluti Doronieum, aſpectu pellucido, guſtu quàm Zingiberis multò acriore & ſicciorè, carie non exelò.



VALENTIORIBUS GRÆCIS γαλάνγα, vulgo etiam Galanga dicitur, vteribus incognita videtur fuisse, nisi Arabes, ut ait Pena, Galaticum A. otum, quod cæteris Dioscorides præfert, in Galangam, siue Galangam nomenclaturam deprauarint, ut qui forte Galangam Acori speciem esse putarent. Arabes omnes *Galangam* vocant. Quare Serapio & Mauritanii omnes corrupte *Kalangen* & *Galungen* scribunt. Est autem Galanga duplex. Vna minor, odorata, quæ à Chinatum regione in Indiam, inde in Lusitaniam deferretur. Eam incolæ *Lauanilon* appellant. Altera maior, crassior, ignauior tamen, & viribus infirmior. Nascitur in Iava, & ab incolis *Lancuaz* nominatur. Tamen in India *Lancuaz* vtriusque appellatur. Serapioni & Auicennæ, auctore Garcia, non satis perspecta fuit vtriusque Galangæ historia. Nam Serapio nec maioris, nec minoris meminit, & inepte describit. Est vena, inquit, in crassitudine caligineæ, & cortex eius est ruber, & intus eius est puluerulentum. Auicenna diuersis capitibus de Galanga scripsit. Vno nomine Calungiam, dicitque frusta esse inuoluta rubra & nigra, quibus hæsitans subdit Mesangne dicit esse Calutudar ipsam, de quo Calutudar, siue, ut Garcia vocat, Caléhendar alio capite dixerat, & Galangam ex Mesangne interpretatus est. Sed quo nomine Galangam minorem, siue Chinensem, quæ præstantior est, quo item maiorem Iauanensem, quæ ignobilior, intelligat, non exponit, cum tamen hæc ab illa non solum facultatibus, sed etiam forma differat, ut ex descriptionibus perspicuum fiet. Galanga maior binum sæpe cubitum altitudine attollitur, foliis mucronatis, cuspidis lanceæ modo, ut ait Garcia, vel, ut Pena, foliis lris aut Xyridis, nigricantibus, angustioribus tamen, flore candido, radice crassa, nodosa Atûdinis modo, vel Acori palustis vulgaris, ut ait Pena,

Nomina

Genera.

L. J. A. 100
Ind. 200
C. 200
um. 1

L. J. C.

L. J. C.

Forma.

GALANGA maior & minor, Pena.



ex fulco intus forisque rufescente. Minor duorum palmorum altitudine fruticat, foliis Myrti, ut ait Garcia, quibus à Galanga maiore plurimum dissidet, quam alioqui radice nodosa, & similiter colorata (nisi quod minor est) viribus, odore, sapore, colore & nomine proximè sefert. Hæc aliis Cyperi species, aliis Acori videtur. At quamuis radices aspectu, duritie, odore, sapore, & nonnihil figura Cyperum longum repræsentent, certè folia, si Myrti sunt, ab utroque illorum plurimum distant. Non defuere etiam qui Galangam Acotum Dioscoridis esse cõtenderunt. At diligens radicum inspectio & collatio faciliè ipsorum sententiam refellet. Nam Acori (quod verum ac genuinum nos habere demonstrauimus) radix est alba, odora, amara, etiam te-

ste Galeno, fractu facilis, colore & concretionem Iridi similis. Galangæ radix ex fusco intus forisque rufescent, fragenti est contumax. Præterea reclamant vites. Minor enim odorata est, sapore admodum acti, adeo ut mansa Pipetis vel Zingiberis modo linguam & fauces vellicet, aromatico, minimè amaro: crassior viribus est imbecillior, colore etiam dilutiore, minùs odorata, adstringit, quæ vis A. oro non inest. Quare Iridi aduersus vuluarum vitia substitui non potest, quod amem requirunt Dioscorides & Galenus. Galanga itaque calfacit & exsiccac ordine tertio. Ventriculum robotat, eius dolores vel à frigore, vel à flatibus ortos sedat. Naribus admodum refrigerato cerebro utilis est: ore tètèra anhelitum commendat.

Temp.

Facit & ad cordis palpitacionem. Coli dolores mulcet, si à flaribus proveniat. Prodest flatuosis vteri affectibus: venerem roborat, refrigeraros renes calacit. Denique frigidis omnibus morbis aduersatur. Multò verò ineptior est *coron* opinio, qui Galangam Schœnanthi radicem esse voluit. Nam Schœnanthi radix inutilis est, Galanga vtilissima ad ea omnia quæ diximus. Adhæc Schœnanthi in Mazcate, Calaiate Arabiæ provinciis nascitur, Galanga in China & Iaua, siue Iaoa regionibus procul ab Arabia remotis. Age verò, quando vsibus humanis hoc medicamentum apprimè necessariū est, dignūque vel eo quod pharmacopola in suis officinis perperuò habeant, cum superiore descriptione nouam Acoſtæ etiam hic conferre libet. Habere enim nonnulla quidem illis non dissimilia: sed multò consideratione digniora ea sunt, à quibus, nobis ex illorum auctoritate traditis, omnino dissentit. Indicta & iisdem quædam haud prætermittenda refert, quæ nos vñ cum ipsius quam vides Galangæ iconè eo libentius mutuabimur. Vnde eius, Aromatum historia, hæc sunt. Duplex est Galanga. Vna minor & odorata, quæ cum Rhabarbaro ex Chinarum regione in Indiam aduehitur, & inde in Lutaniam deferretur, incolis *Lauandou* dicta. Altera maior, plurima nascens in Iaua

Galangæ ex
Acoſtæ
floræ.

Genera.

G A L A N G A, Acoſtæ.

Forma.



Nomina

Vfus.

& Malabar, cuius descriptionem, quod maiore sit in vsu, hic damus. Ea duorum cubitorum altitudine crescit, nonnunquam amplior, fere indiore præferim solo: folia habet Orchidæ Dioscorid. lib. 3. descriptæ similia, longiora tamen & latiora, superne saturatiùs inferne dilucius virentia: caulem ex foliorum inuolucris constantem, uti in Orchidum generibus: florem candidum, inodorum: semē exiguum, neglectum, radicem secundum caput crassam & bulbosam, reliqua ex parte Zingiberi similem, sed maiorem, nonnunquam capirula Hastulæ regis modo proferentem. Seritur radice quæ modo in modum sese propagat. Appellatur a *Calu*anis & Brachmenis (quibus maximo est in vñ cum in hominum tum iumentorum morbo, quique eam ordinariè cum Oriza, vel piscibus vel in acetariis edunt) *Carcham*, ab Arabibus *Calugian*, in Iaua *Lancuax*, in Malabar *Cua*. Adeo autem vulgatis est apud Malabarentes huius radicis vsus, ut non modò in medendis morbis eam vsurpent, sed in farinam etiam coqueant, ex qua Cocci seu nucis Indicæ lacte, nonnunquam

quam Sura, au Iagra excepta, certum quoddam panis genus pinſunt in tenuium placentalium formam: *Apas* vocant. In deliciis est hic panis, præbentque iis qui ventriculi debilitate, & frigiditate laborant, in alui doloribus, vteri affectibus & urinæ difficultatibus: quo postremo in morbo miram eius efficaciam experientur, siue ob humores crassos & pirituosos, flatūs ve, aut arenulas in vtericibus aut collo vesicæ congestas, urinæ difficultas orra sit, vel etiam ex carnis excreſcentia in collo vesicæ collo aut meatibus nata. Præbent verò edendum hunc panem, deinde inustum Nimpha (quæ veluti aqua ardens est) concedunt, in inguinalibus vero pubem & collum vesicæ folia Nympha decocta in aqua & macerata à quibus calentia applicant. Clusius tamen, qui illa Acoſtæ hæctenus Latinæ consuetudini tradidit, neque Acoſtam, neque Garciam ab Orra sibi satisfacere in Galangæ maiore

maioris descriptione, ait: præsertim si ea, qua Europæ Officinæ viuunt, legitima est Galanga maior. Etenim eius radices maiorem similitudinem habere cum Iridis (folia duntaxat foliis Iridis similia facere Penam supra retinimus) quam cum Asphodeli aut Zingiberis radicibus. Sibi quæ omnino persuadet, Galangam nostram maiorem Iridis genus esse, huic fortè simile, quod ipse in sua Pannonicarum stirpem historia primum posuit. Nihil tamen statuit.

PETVM.

CAP. CXXVIII.



VENADMODVM hortis omnibus magno est ornamento, ut facultatibus insignibus celeberrima est herba, quam Petum ab Indis vocari refert Theuetus, Nicolaus Monard. *Picelt*, Ouiedus in Hispaniola insula *Petebeccuc*. Hispani *Tabaco* nominarunt ab insula quadam eius nominis, in qua frequentissima reperitur. Galli, quod Ioannes Nicotius, regius aliquando in Lusitania orator, eius semen primus ad Reginam Regis Galliarum detulerit, illiusque facultates docuerit, Nicotianam & Herba Reginarum nuncuparunt. Alij Herbam sanctam ob admirandas eius virtutes. Alij Buglossum antarcticum. Ad magnam altitudinem assurgit, & Limoniam malum æquat: in Gallia, Belgio, Anglia, rrium cubitorum est proceritate, sæpissime quatuor aut quinque cum maturè semen satum fuerit in calidioribus tractibus Aquitanie & Linguagorhæ: caule recto, crasso, multis & gradibus ramis brachiato, tam pingui, maxime cum adoleuit, ut melle illius videatur: foliis numerosis, longis, amplis,

Nomina

Forma.

NICOTIANA siue
Tabacum.



Symphyti magni foliis latioribus, & rotundioribus, Personarum vel Hippolapathi fatui facis similibus, carnosius, pinguibus, aliquantum hirsutis, colore viridi dilutiore, iniucundo odore, acri admodum gustu cum quodam lentore. Florem fert in summis ramis copiosam, oblongum, tubæ modo cauum, extrema parte larum & pentagonum, ex albo dilutè purpurascentem. Huic succedunt caliculi siue capitula oblonga, exigua, semine plena ex rufo nigricante, pusillo, Papaueris multò minore. Radix est satis crassa, multifida, lignosa, intus crocea & amara, quæ faciliè cortice suo spoliatur. Alterum Tabacum minus pinxit Lobellius, foliis Hyoscyami lutei mucronatis, angustioribus, pediculo hærentibus, floribus minoribus aliquantò, non absimilibus, saturationibus & purpurantibus. Item aliud minimum. Dodrantalis est herba, scilicet non diuersa, eodè etiam feruido vrentèque gustu. Floresculi Hyoscyami lutei multò minores, ex flauo herbacei. Folia Doronici aut Plantaginis angustifolia, minora & angustiora Pulmonariæ. Radix pusilla, fibrata. Nascitur Petum plerisque Indiæ locis,

humidis & umbrosis, & exulto læuiq; solo. Non multis ab hinc annis ex Hesperia Indiæ nouo orbe, Lusitanie, Gallie, Belgii, Angliæ facta fuit inquilina. Seritur illic omni tempore. In frigidioribus regionibus Augusto aut Septembri ferenda, quia semen exiguum diutissime sub terra latet antequam germinet: deinde à primis

Tempus.

frigoribus

SAN A sancta, siue Tabacum minimum, Lobelii.

*Temper.
C. Vire.*



frigoribus auditur. Semel autem facta, & semina ad maturitatē eam perduxerit, seipsam deorsum fecit, nec opus habet alia ratione. Floret in calidioribus regionibus Iunio & Iulio mensibus: semen Septembri maturescit. Folio, quod dicitur, usus est, eaq; ut asseruari possint a Nicolao Monard. filo traiecit in umbra suspenduntur, & siccantur: deinde iis aut integris, aut in puluerem tritis vtuntur. Calidam siue & luscā plantam hanc in secūdo gradu idem Nicolaus Monard. tradit, idē calidius, resoluere, abstergere, & aliquantum adstringere, vt exsequentibus facultatibus colligere licet. Folia eius, inquit, calfacta & imposita cephalæ & hemicranie præsentī sunt remedia, si morbus à causa frigida, aut à flatibus ortus fuerit. Sæpius vero sunt repetenda ad perfectam vsque curationem. Sunt qui caput oleo florum Mararantie prius inungunt. Idem remedium in oculo non vile est, & totius corporis doloribus ab eadem causa orris. Dentium dolores a causa frigida non modò finit dentē prius deestibulo quo luteo eius succo delibuto, & pulula eius

eius folio confecta denti indita, sed etiam ne putredo serpar prohibet. Pectoris vitis, vt tussi veteri, asthmatis, & similibus ex frigido humore prouenientibus morbis, foliorum decoctum ex aqua, & eclegma ex eius decocto vitia sunt. Serapium ex saccharo & foliorum eius decocto paratum, & parua quantitate sumptum patres humores ex pectore elicet. Asthmaticis interdum fumus eorū ore exceptus opitulatur: sed necessarias euacuationes præcedere oportet, si morbus induratus dederit. Sub cineribus calfacta folia, & sordida non excusis cineribus, calidæ aque sæpius imposita dolori ventriculi qui fit à frigida causā, aut à flatibus in ipso generatis auxilio sunt. Viridia folia alij manibus oleo inunctis confringunt, & imponunt. Ventriculi & lienis obstructionibus folia paxillo aceto intrita, diu illita vitia sunt: quibus deinde folia calefacta aut lineus pannus succo foliorū calenti intinctus superimponuntur. Foliorum inopia puluis communi vnguento obstructiones aperienti excipitur, & pars obstructa, aut tumore affecta diu illatur. Indicæ mulieres in puerorum, atque etiam grandiorum stomachi cruditatibus valde commendant. Nam ventre prius inuncto oleo lucernatum, & folis sub cineribus calefactis, altero regioni ventriculi, altero tergori, quā ventriculum spectat, impositis, eas cruditates cōcoquant, & aluum emolliunt, si quoties opus erit renouentur. Latas & teretes ventris tineas expellit foliorum succus cum saccharo coctus & depuratus parua quantitate sumptus. Vmbilico tamen etiam folium tantum imponendum, & aluus enemate eluenda. Nephriticis doloribus folia sub cineribus, vt dictum est, calfacta, & quā calidē fieri potest apposita, magnum adferunt doloris leuamentum, idem remedium quoties opus fuerit repetendo. Commodè etiam clysteribus iniiciuntur, atque etiam fomentationibus & emplastris admiscetur. In suffocationibus vteri folia probè calfacta, & vmbilico vteri regioni imposita præsens adferunt remedium. Quod si animi delirium affligatur, eorundem fumus naribus obiectus illico illas liberat. Quod remedium Indicis mulieribus adeò vulgare est, vt ea de causā huius plantæ folia adferunt.

afferunt. Articulorum doloribus (si ab humoribus frigidis, vel non nimium calidis fiant) efficacissimè folia calida adhibentur, aut eorum succo pannus lineus intinctus: humores enim digerunt & resolvunt, ideoq; tumoribus etiam ædematoidis, foliorum succo calido priùs elotis, utilissimè imponuntur. Perniones sanare, si ter aut quater huius plantæ foliis fricentur, deinde pedes aqua calida cum sale abluantur, experientia docuit. Venenis & toxico perniciosissimo, quo Cannibales sagittas inhiunt, hac ratione resistere didicerunt Hispani (nam ante sublimatum vulnibus inspergebant.) Cùm Cannibales ad D. Ioannem de portu diuite nauigassent, Indos & Hispanos nonnullos qui illic erant, telis suis venenatis conficiebant, pleròq; vulnerabant, qui cùm sublimato carerent, à quodam Indo edocti sunt Tabaci succum expressum vulneribus imponere, deinde folio ipsius trita. Illico sedati dolores, & ea symptomata quæ huiusmodi venena subsequi solent: tandem veneno superato vulnera curata. Eadem de causâ venenatis pestiferisque carbunculis imposita crustas inducunt, deinde curationem adferunt: & ad ictus morsuque venenatorum animalium plurimum conferunt. Recentibus vulneribus imposita sanguinem sistunt, eaque glutinant. Quod si maiuscula sint, vino prius eluantur, & labiis vulnerum coniunctis succus foliorum inspergendus, & ipsa folia trita supra vulnus alliganda: postridie reliquisq; diebus sequentibus eadem faciendi: victusque ratio necessaria obseruanda. Vetera vlcera gangrænasque succus instillatus, & folia trita imposita detergunt, curant, & ad cicatricem perducingunt, purgato videlicet priùs corpore, & missione sanguinis, si necessaria fuerit, facta, obseruata etiam conueniente victus ratione. Porro non modò in hominibus eiusmodi vlcera curare, sed etiam in animalibus experientia ipsa docuit. Nam per vniuersam Indiam frequentia vlcera vaccas, boues, & alia animalia infestant, quæ faciliè ob summam regionis humiditatè putrescunt & vermibus scatent, quibus solebant inspergere sublimatum, melioribus remediis destituti. Sed cùm magno istis vaneat, plerumq; quod vulneribus inspergebatur, pluris cõstabat, quàm animal quod curabatur æstimari potuisset. Quare Tabaci facultates in hominibus experti, illius etiam vsum ad purrida, scetida, vermibusque scatentia animalium vlcera transulerunt, atque adeò compererunt succum eius instillatum non modò vermes necare, sed etiam vlcera mundare, deinde ad cicatricem perducere: prodest etiam iumentorum exulcerationibus, ideoque Indi Tabaci folia semper circumsferunt. Scribit Nicol. Monard. se quendam nouisse narium vlcere laborantem, è quo sanies manabat non sine contagij suspitione, consuluisse quæ foliorum huius plantæ succum instillari, à secunda instillatione vermes multos excidisse, deinde pauciores, & post aliquot dies sanatum fuisse vlcus, sed quæ erosa erant non restituta. Illius etiam foliis impetigines & capitis scabies confricantur. Fuit ista planta ab Indicis sacerdotibus celebrata ad responsa danda. Etenim moris erat apud Indos sacerdotes de bellorum euentu, aliisque magni momèti negotiis consulere. Sacerdos consultus istius plantæ folia sicca vrebat, & eorum fumum tubulo quodam in os excipiebat, deinde quasi in ecstasi quandam raptus cadebat omni motu priuatus, & sic aliquandiu permanebat. Discussa eius fumi facultate ad se redibat, referebatque negotium cum dæmone contulisse, responsaq; dabat ambigua, vt, vt cunq; euentus succederet, illis faciliè persuaderet, sic se prædixisse, eoque modo Barbaros illos iniserè decipiebat. Vulgus etiam Indorum eundem fumum per os & nares excipit animi gratia, cùm somnia videre, & extra se quasi rapi volunt, atq; etiam de suorum negotiorum euentu ex insomniis quæ illis apparuerint pronuntiatum. Præterea Indi oneribus ferendis, aut aliis laboribus defatigati eiusdem plantæ fumum hauriunt, & illico quasi mente alienati corruunt, excitati verò resocillatos eo somno, & vires recuperatas sentiunt. Eadem vtuntur sitis famisque sedandæ

sedandæ gratia hoc modo. Testas cochlearum quarundam vrunt, & terunt calces modo: huius & foliorum æquas partes mandunt diu, donec ex virtisque massa fiat, quam in pilulas piffo maiores conformant, in vmbra siccant, & in vsum reponunt. Facturi iter per deferta, in quibus neque cibum, neque potum inuētuos se putant, eas pilulas secum deferunt, ex quibus vnā inter labrum inferius & dentes reponentes, eius liquorem assidue sorbent: ea absumpta aliam reponunt, atque item aliam, donec peregrinationem absoluerint triduanam interdum, aut etiam quadriduanam: quo tempore neque famem sibi molestant esse, neque suum asserunt. Horum exemplo naucleri plerique istinc redeuntes gestant pusilla infundibula ex folio Palmæ, aut storea confecta, quorum vni extremo inferia sunt conuoluta & comminuta huius plantæ folia siccata: istud igni accendunt, atque altero extremo hianti ore quantūm plurimūm possunt, inspirando fumum hauriunt, vnde sibi famē sitimque sedari, vires instaurari, spiritus exhilarari asserunt: soporūq; iucunda ebrietate cerebrum dictitant, incredibilem pituitæ copiam plerūq; educi. Sunt qui eius folia singulis diebus manē à ieiuniis mandi iubent, vt podagra liberentur, quoniam multam pituitam in os attrahunt, eamque in partes inferiores defluere prohibent. Carolus Stephanus in Prædio rustico experientia comprobatum esse scribit, folia strumis vtiliter illini, eiusq; stillatitium liquorem asthmaticis auxilio esse. In summa, Panacea quædam est ad omnis generis morbos. Quidam Nicotianæ speciem esse putant plantam, quam Hyoscyamum luteum vocant, quia vidissent non paucos huius fumo hausto remulentos fieri. At non rectè sentiunt, quia Nicotianæ fumus, vt se expertum fuisse ait Pena, non citò inebriat, nec si-gore dementat, vt Hyoscyamus, sed quodam aromatico vapore ventriculos cerebri imbuat.

ZARZA PARILLA. CAP. CXXIX.

EX NOVI orbis, siue Americæ provinciis etiam prodiit Zarza parilla, & Chinæ radici successit: eique laudem eripuit, quod non nisi cariosa & longa vectura euasida, atque marcida ad nos peruenire so-leat Zarzam parillam Hispani, qui primi eius vsum in Europam ex Peru inuexere, breuiore itinere, atque idēo integrioribus viribus ad nos trans-mittant, ad multos variōsq; morbos præstantissimum medicamentum. Qui primi il-lie viderunt, Zarzæ parillæ nomen indiderunt propter magnam similitudinem quā habet cum Zarza parilla Hispanica, id est, Smilace aspera, quasi dicas Rubi viticulā, nec Hispanis, inquit Matthiolus, Zarza parilla aliud est, quā Rubus vi-riculosus: Parra enim Hispanis viris dicitur, Parilla viticula, & Zarza rubus. Eim apud indigenas nomen spinosam vitem Latinis significare, Lopus Lusitanus au-ctor est. Planta est, vt describit Nicolaus Monardes, quæ multis radicibus nūtur, duos cubitos, aut eo ampliū longis, colore cinereo dilutiore, tam a'tē interdum demissis, vt qui integras eruere velit, ei profundē admodū fodere opus sit, ramis nodosis & lignosis, qui faciliē desiccantur: florēsne an fructum proferat, ignorat. Hac quæ in Hispania noua prouenit, multo meliorem & efficaciorē postcā proruli prouincia Honduras, à superiore differentem, quod illa candidior est ad pallorem accedens, & gracilior, hæc verò cinerea, nigrior atque crassior. Deligitur nigrior, recens, non cariosa, fractu contumax, quæq; assularim frangitur, & ponderosa: nam quæ cariem sensit, & dum frangitur puluerulenta est, iuuulis existimatur. Gustu inspidam esse ait, & sine acrimonia, nec eius aquam hordea-cea sapidiorem. Hanc credunt multi nihil aliud esse quā Smilacem asperā Dios-coridis: quibus assentitur Matthiolus eiusq; sententiæ auctorem citat Lucam Ghinum, qui se vidisse affirmavit apud Florentiæ Ducem Zarzæ parillæ integram plantam

Nomen.

Forma.

Electio.

ZARZA parilla,
Matthioli.

ZARZA parilla,
Americæ.



plantam ex Hispania delatam, quæ omnibus suis partibus ac notis nihil ab aspera Smilace differebat, imò nihil aliud esse censuit, quàm genuinam Smilacem asperâ. Id quod paulò post experientia deprehendit, quia asperæ Smilacis radicem decocto multos curauit lue venerea affectos. Idem quoque ab aliis factitatum fuisse, præsertim Romæ. Alij diuersas plantas esse contendunt, maximè Pena, de harum differentia differens his penè verbis. Smilacis radices geniculatæ sunt, articulatæ segmentis, candidæ, foris nitentes, Graminis aut Arûdinis vallatoris modo. At in Zarza parilla ab vno radicis trunco magno, prædure, strumoso, rugosissq; capitibus hinc inde, subtus, vt in Asparago, vel Rusco oriuntur numerosa eiuldẽ coloris flagella, æquabilia, & sine geniculis, vel nodis recta, flexilia, cortice duriusculo, pullo, magis striato in longitudine, interdum vicinũ pedum, farinacea intus medulla, non ita ingrata, sed viscida, non nihil emplastica, amaricante, nec tamen calorem prodente. Quare perspicuum est non magis esse radices Smilacis, Rubi, Clematidis alterius Viornæ dictæ, quàm sint Cinnamomi, vt nec arbores quædam tum Indiæ Orientalis, tum Occidentalis sunt nostra Laurus, tametsi hæc eadem quæ illæ præstent. Neque si Colutea similima est Sennæ, ideo statim eadẽ astruenda. Idem de Zarza & Rubo dicendum. Nam stipites Zarzæ ex eodem radicis grandi & capitato nodo, lignoso, intus flauescente, Aristolochiæ rotundæ tuberosæ magnitudine & colore exeuntes, pollicem aut maximum Rubum crassitie superant: sed præduri lignosissq; etebros nodos admodum extantes circa articulas commissuras erebriorum vncialium, frequentiumq; interuallorum, atque aculeos aduncos deorsum versus non nihil depressos & rigidos habent, & Rubo valde similes sunt aspectu porius quàm Smilaci. Verùm gustu non sunt adstringente, sed fermè insipido, nec vt radicis emplastico, eoque minùs efficaci. Folia intellexit ille ab amicis qui viderunt non multum abesse à Smilaceis. Hæc sunt Zarzæ parilla à nostratibus aliquatenus similibus discrimina. Nicolaus Monard. illam ca-

Temper.
& Vri.

In cap. III.
lib. I.

lidam & siccam esse in secundo gradu tradit. Primum circiter viginti ab hac annis nobis innouit. Hodie in multis morborum generibus frequē eius est vsus, videlicet in defluxionibus, flatibus, frigidis vteri morbis, & aliis plurimis, modò acuti non sint, aut iis febris accesserit. Certum est tamen iis qui calida præsertim hepatis intemperie laborant, non conuenire: nimium etenim exalfaciunt: sed ventriculos frigidos fouet, & flatus mirificè discutit. Vis illi exalfaciens, & extenuis, inquit Matthiolus, & quæ valenter sudorem prouocet. Valet autem non solum ad luem veneream curandam, sed ad quosuis articularum dolores, ad omnia cutis vitia, vlcera contumacia, lichenas. Auxiliatur iis qui cedemate laborant. Peculiariter verò frigidis capitis & cerebri affectibus medetur. Hac Indos sic vti solitos refert Nicolaus Monard. Zarzæ parillæ selibram minutim concisam aqua macerant, dein in mortario tandiu tundunt, donec in muccaginem quandam resoluatur, quam deinde colant & exprimunt. Eius liquoris ita expressi satis capacem cyathum calidum manè hauriunt, deinde stragulis sese operiunt, & duarum horarum spatio sudant. Quod si interdum sitis vrgeat, idem liquor illis est potus. Sub noctem alium eiusdem calentis cyathum hauriunt, & tantūdem temporis quantum manè sudant. Hic ordo triduo integro obseruatur, vt nihil aliud edant, aut bibant, præter eum humorem expressæ Zarzæ parillæ. Eadem ratione præparatam ait Nicolaus Monard. se plerumque initio propinasse, multòque melius sic morbos curasse quàm nunc, cum ob seculi nostri delicias eodem quo Guyacum modo propinetur. Videlicet duæ eius vnciæ lotæ, confractæ, & minutim concisæ in nouum fictile cum tribus aquæ sextariis iniiciuntur, 24. horas macerantur, obturato fictili coquantur lento igne è prunis accēso, quoad sextarij duo fuerint consumpti, refrigerantur, colantur, & fictili vitrato, aut vase vitreo reconduntur. Eadem deinde Zarzæ parilla fictili aqua pleno maceratur, aliquantulum feruet, frigida colatur, & fictili vitrato asseuatur. Putgarus æger vt decet, manè decem vncias prioris decocti hauriet, sudabit duas horas: deinde omnia ea perficiet, quæ in sumendo Guyaci aut Chinæ decocto facienda præcipere solent. Similiter etiam tenui victu utetur, habita semper vitium ratione. Nam post sudores vus passas, pruna cocta, amygdala, & panem biscoctum edet. Si vires imbecilles fuerint, conceditur vsus carniū pulli asii, aut auicularum montanarum, & de secunda aqua bibet. Quindecim dies, aliquando viginti, nonnunquam triginta, interdum quadraginta huius medicamenti vsū continuabit pro morbi magnitudine & virium robore. Matthiolus eius vncias quatuor in libris quindecim aquæ (in quibus 24. horas maceratæ prius fuerint) decoquit ad dimidias. Pena non minoris quantitaris instituenda esse decocta censet, quàm decem aquæ libratum ad vncias duas, vel tres, vel quatuor radices: nam citius, ait, dissipat aqua (nisi in diplomate decoctum faciendum præceperint) quàm radicum vires bulliendo eductæ fuerint: radices enim corculum lori instar durum tam citò vires non deponit. Nicolaus Monard. cum vncias duas in tribus aquæ sextariis, id est, in libris quinque decoquendas decernit, de recentiore, opinor, intelligit, & quæ, quòd succulenta sitis & tenera adhuc sit, facilius aquæ vires suas impertiat, quàm quæ ad nos longiore itinere defertur, & ob id magis arida & exsucca cum sit, longiore tempore, atque ideo in copiosiore aqua decoquenda: paucior enim aqua longiore decoctione exhalaret.



PN TERTIO volumine nauigationum, libro vndecimo generalis Historiæ Indiarum, legimus in insulæ Hispaniolæ locis multis copiosissimam nasci herbam, quam Perebecenuc vocant, mirabilis aduersus vlcera efficacix. Multa folia fect, in extremo acuminata, lanceolæ ferro similima, vt natura nobis indicatè voluisse videatur herbas curandis

Forma.

PEREBECENVC.



vulneribus ferro factis perutiles. Folia ista satis tenuia sunt, viridia, & in summo cæsia, petioli quibus sustinentur similiter cæsis, coloris. Quædam folia sunt non acuminata, sed rotunda, sed & hæc & illa coloris sunt ex cinereo cæsis. Flores edit rubros & lōgos in umbella Fœniculi modo, sed magis dispersos, tenues. Ad hominis proceritatem tota planta assurgit, admirandi effectus: facillè enim & citra dolorem vlcenbus omnibus medetur, etiam si cacoëthe sint & admodum contumacia. Huius manipulum in aquæ sextatio decoquunt, quoad tertia pars supersit. In eo decocto penè refrigerato lineum pannum intingunt, quo vlcus abluunt, exsiccatò herbæ crudæ succum infundunt, aut linamenta succo intrincta admovent. Id

bis die repetentes facillè vlcera quantumuis maligna curant, non autem vulnera recentia manu illata.

MECHIOACAN.

CAP. CXXXI.



IN INDIS maris Oceani prouincia est quadraginta miliaribus supra Mexicum, Mechioach dicta, cuius præcipua & fecundior pars vernacula Indorum lingua *Chimicula* nominatur, ab Hispanis totius regni nomine *Mechioacan*. Omnium harum Indiarum autè & præsertim a genti fertilissima regio est: præterea temperata & salubri fruiut aëte, mularum & salubrium plantatum feracissima, adeo vt has ob causas vicini Indi ægri eò se transportandos cutent, morborum remedia quæ sùnt, & sanitatem recuperari. Ad hæc frumento, fructibus, siluestribus animalibus abundat: multi in ea aquæ dulcis fontes scaturiunt, quorum nonnulli optimorum piscium copiam alunt. Quare incolæ cæteris Indis vegetiores, alacriores, meliùs colorati degunt. Hanc subiugauit Ferdinandus Cortesius anno salutis humanæ 1524. quò statim appulerūt Franciscani, & monasterium condiderunt: cuius primas cum longo & periculoso morbo affligeretur, & Gazoucin Cacique, id est, dominus totius regionis medico suo Indo curandum tradidisset, quòd iam summam cum Franciscano illo amicitiam contaxisset, cōsiderato morbo dixit medicus curatum iri ægrum, si radicis cuiusdam fatinam vellet sumere, quam recuperandæ sanitatis audissimus Franciscanus perlibenter cum modico vino sumpsit, qua ita purgatus sine dolore & molestia vlla fuit, vt eadem die meliùs habuerit, atque tandem sanitati pristinæ restitutus fuerit. Huius exemplo cæteri Franciscani, atque Hispani quidam cum in morbos incidissent, eodem remedio sepius vsi sunt, tam felici successu, vt in eis visum fuerit cæteris fratribus qui in Mexico erant tam excellens remedium communicare: vnde rursus ob mirabiles effectus, eius fama per nouam Hispaniam & omnes Indias ita peruagata est, vt spretis Rhubarbato, atque aliis vñatis remediis, hac sola radice in purgandis ægris vterentur. Hinc in Hispaniam, inde in

MECHIOACAN, Pena.

Nomina

Forma.

*MECHIOACAN,**Dodonæi.*

Electio.

Temper.

Vires.

Galliam, Germaniam, Italiam delata est.

Nomine totius prouinciz, in qua prouenit, Mechioacā nominatur, ab Indis vulgo Rhabarbarum Indicum. Nicolaus Monard. plantam vidit Hispali apud Franciscanos ex ipsa prouincia Mechioacan delatam, multis annis luxuriantem, supra tetram expansis, colore cinereo, qui vicinas perticas, aut pergulas fundunt, & multiplici nexu amplectuntur, frons rotundis in mucronem desinentibus, secundū pediculum amplis, fibrosis, adeo verò delicatis, vt humore carere videatur: fructu Coriadi sicci magnitudine, racematum coherente, qui Septembri maturefcit: radice crassa, Bryoniz modo, vt non defuerint qui eandem plantam esse putarent, aut saltem ei congenerē. Sed multū differunt: nam Bryoniz radix & vitidis & sicea admodū acris est, Mechioacan vero insipida, & sine acrimonia v. l. a. Pena quoque eos qui sunt in ea opinione peninde falli censet, atque illos qui Laurum, Cinnamomū, & Smilacem asperam Zatzam parillam, aliāque multas exoticas eadem specie cum nostratibus faciunt. Eam radicem ab Hispanis acceptam sic ille pingendam curauit. Ea integra ad nos raro defertur, sed in laminas grades & taleolas confecta, ex quo magnam esse radicem, & siccā, & sine matrice. Hanc, inquit Pena, non videri qui nosse cupit, intueatur Bryoniz radicem: hanc enim cortice eiusdem coloris, rugis & feruaginitudine iisdem. Sed huius taleolę transversum sectę siccandi causā, intus multas et ciliā centro ad ambitum parallelis distinguunt, mādendo sapore farinaceo, nec acridodorem ingrato est, ceterū albida & friabilis vt Bryonia. Optima recens, non cariōsa, intus candida: vetustior enim nigrescit, toramulenti cariōsa & leuior euadit. Milij semine obruta seruat, aut lino picato siue resuato inuoluta. Calida videtur esse primo gradu, siccā secundo, constarēque partibus subtilibus aëreis cum quadam adstrictione. Picuitam maximē & aquas euacuat: iterum, cephalicā, strumas & epilepsiam curat: veteres fluxiones sistit, articulorum, coli, & renū doloribus vtilis est.

Conuenit etiam vteri doloribus, asthmā, tussī veteri, & lue venet- a vexari. In febribus nocturnis, compositis, phlegmaticis, quotidianis, erraticis, iis quę ex viscerum obstructione pendent commodissimē datur, in ardentibus & acutis minimē. His assentitur Pena, qui huius radicis puluisculo solo drachmę pondere, ex vino albo aut iusculo propinato commodissimē qualibet die, hora & ætate,

nulla molestia, aut incommodo, quinquies, sexies, aut septies flauis hydropicorum aquas eductas, pituitasue qualis se comperisse affirmat. Molestus non est huius radices vsus, quia nullius ingrati saporis particeps est: ideo pueris, senibus, & iis qui cetera medicamenta auersantur utilis. Eius autem sumenda ratio talis est. Præparatis humoribus qui euacuandi fuerint, purgato etiam corpore enematis & sanguinis missione ex medici consilio, huius radices leuiter confuse puluis vino albo maceratus, aut aqua Anisi, Fœniculi, aut Cinnamonomi (si quis à vino abhorret) summo manè propinatur, dimidia drachmæ pondere pueris, vnius drachmæ iuuenibus & adolescentibus, duarum verò drachmarum viris & mulieribus. Nec inutiliter datur ex syrupo rosato cathartico. Post sumptum hoc medicamentum brevis somnus conceditur, iis præsertim qui vomitibus obnoxij sunt. Facta purgatione datur iusculum, ac paulò post cibis, qualis dari solet iis qui purgantur. Fiunt nonnunquam ex eodem puluere cataportia Coriandri sicci magnitudine cum syrupo aliquo, vel electario. Auctor est Nicolaus Monard. in potestate esse medici, aut eius qui Mechioacan sumperit, eam quàm velit humoris quantitatem purgare: sumpto enim iusculo, vel quouis alio cibo, eius vim purgatricem illico listi atque infringi, id quod negant alij, quoniam ei opinioni quotidiana experientia refragatur. Alia nunc ex continenti adfertur radix Mechioacan, quæ circa Nicaragua

Gerra.

*FLOS Mechioacan,
Monardis.*



gna & Quito nascitur, vbi diligenter colitur, & magno in vsu est ob admirandas eius vires, longè præstantior ea quæ ex noua Hispania deferri consuevit, cuius, flos semen, & ramuli etiam delati sunt. Erat verò is flos quasi Mali aureæ, quinque folijs constans maioribus, è cuius umbilico protuberat calix, siue vesicula quædam auellanzæ magnitudine, membrana tenui operta, albicante, quæ in duas cellulas tenuissima pellicula secretas diuiditur, & in singulis bina grana Ciceris magnitudine, colore per maturitatem nigro, gustu insipido contine-

bantur, quæ molli & spongiosa terra commodè nascuntur. Mittit etiam Promontorium D. Helenæ, quod in eodem quo Nicaragua tractu est, aliud Mechioacan genus siluestrius, quod grauius symptomata excitat, vt vomitus immodicos, totmina, alui profluvia. Quam ob causam Scammonæa nuncupatur, sed nemo periculo semel facto vitatur. Simile est altericùm folio rum farnentis, tum radice, sed per omnia minoribus: ipsa etiam radix acrimoniæ nonnihil habet. Memorat Petrus Cieca in prima parte Peruanæ Historiæ in prouincia Quimbaya, cuius metropolis Carthago magna, nasci tenues quasdam radices digiti crassitudine inter arbores, quarum si fragmentum brachiali longitudine aquæ sextario per noctem maceretur in vase aliquo, maiorem aquæ partem ea nocte absumi. Ex ea quæ supererit aqua, qui tres uncias sumperit, adeò benignè purgatur, ac si Rhabarbaro purgaretur, & aliquoties periculum se fecisse scribit, magno purgatorum commodo.

Radix
Quim-
baya.

Ta. Colm.
hb. g. ca. a.

Forma.

Eam morbis curandis vtuntur, perinde ac nos Guayaco.

REGERT Theuetus in vtraque ora
fluij Senega multa esse Regna,
præsertim in ea quæ meridiæ spe-
ctat, Regnum Mely, in ea quæ Se-
ptentrionem, Regnum Tombotu. In his periti
sunt Medici multi, quos *Bystrans* appellant mor-
bus qui illic frequentiùs grassatur *Borecul* no-
minatur, aut *Zaul* Æthiopum lingua, qui ex im-
modica venere, cui multum obnoxij sunt, ortum
habet. Genitales partes potissimùm is occupat,
in homine Asab, in fœmina Assabaras nomina-
tas. Ad huius morbi curationem decoctis mul-
tis vtuntur, sed potissimùm decocto herbæ, quæ
Achanaca dicitur. Huius folia bifurcata & acu-
minata sunt, Brassicæ amplioris folijs similima,
sed non ita crassa, & tenuiore costa. In horum
medio fructus nascitur, oui magnitudine, colore
luteo, quæ *Assard* nuncupant, alij *Lefach* nomine
serpentis cõcoloris. Fructus is magno apud eos
est in pretio. Tota planta tibiz hominis crassi-
tudine. Eam morbis curandis vtuntur, perinde ac nos Guayaco.

FABÆ PURGATRICES. CAP. CXXXIII.

Forma.

IN NOMINE Dei & Carthagine continentis prouincijs Fabæ pur-
gatrices nascuntur, vt narrat Nicolaus Monard. quæ nostris similes
sunt, sed minores, eiusdem cum nostris formæ & coloris, pellicula
quadam tenui, qualis est Ceparum tunica exterior, illas per mediũ
intersecante, quæ cum cortice abiicienda est, alioqui tanta vehemẽtia superne &
inferne purgans, vt in vitæ discrimen sumentem coniiciat. Assædæ verò sunt, vt
illarum acrimonia infringatur, deinde in puluerem comminuẽdæ. Datur hic pul-
uis vino, aut saccharo exceptus ad cochleate vnum, deinde haustus vini sumitur.
Apud Indos hoc medicamentum celebre est, ob sumendi facilitatem: nam sine
molestia bilem, pituitam, & serofos humores multò leuiùs & faciliùs quàm supe-
riora medicamenta purgat. Dantur hæ Fabæ in febribus diuturnis, in coli dolo-

Vires.

FABÆ Purgatrices,
Monard.Phaseolus
Ind. Clus.

ribus, & articulorum morbis. Dosis assatarum
esto à quaternario numero ad senarium, plu-
riùsve aut pauciorum pro egri viribus. Clusius
aliquot peregrinos fructus se accepisse scripsit
Fabæ purgatricis nomine, sed nullum habuit
qui Fabæ purgatrici à Nicol. Monard. descen-
deret conueniret. Quare potiùs inter Phaseolos re-
censendos putauit. Prioris iconem hanc exhi-
buit. Orbiculari ferme est forma, sed planus
vtrinque & quodammodò puluinatus, digiti
vnus crassitudine, duorum verò latitudine aut
ampliore, vno latiore aliquantulum cauo, quo
videlicet hilus esse solet, & siliquæ in qua con-
tinetur adhæret: cortex durus & lignosus, leuius
ex rubro

ex rubro nigricans: quod intus continetur album, firmum, & in duas partes natura sectile, vt sunt omnia Phaseolacea, sapore primū quali sunt omnia ferē legumina, sed illico linguam mordicante & acri: quo fit vt purgandi facultate præditus esse possit. Nascitur in insula D. Thomæ dicta, & cordis effigiem quale vulgò

Locu.

PHASEOLVS alter

Indicus, Clusij.



PHASEOLVS Brasili-
anus, Clusij.



pingi solet imitatur: idcirco à quibusdā Cor D. Thomæ nuncupatur. Eius obiter meminit Petrus Cieca prima parte Chronici. Alter Phaseolus vulgari haud dissimilis est, sed minor, densior, nigricans, hilo prominente, & tenis formam minimè referente. Idē Clusius cūm Vlyssipone esset, habuisse se scribit aliud Phaseoli genus ex Brasilia Americæ prouinciæ delatū, admodū recens, pollicari latitudine, crassum, colore rufescente, magno hilo, & parte extrema veluti sessili. Eiusmodi quatuor aut quinque siliquis prægrandibus continentur, qui recentes & virentes adhuc tusi & impositi bubones venereos curare dicuntur. Flore traditur ex rubro pallescente. Clusius iuniorē duntaxat plantam vidit ē semine natam, quæ foliis Phaseolo vulgari ferē similis erat, nisi quòd minora erāt, & aërta patte hirsuta, præsertim teneriora folia, & extremi caules tenui mollique lanugine fuluescente obfiti. Brasiliiani *Maionna* vocant. Similes planè, & colore, qui ex cinereo candicans est, duntaxat differentes ex Africæ Mauritania delatos se vidiſſe Clusius ait. Lobellius se

SILIQVA Phaseoli Bra-
siliensis, Lobel.



vidisse & habuisse scribit purgatrices Fabas, & Phaseolos, quales expressit Clusius. Siliquam etiam pictam dedit, quæ dodrantalis est, admodum elegans, duas vncias lata, quaternis & quinis loculis ventricosa, carnosa, corticosa & coriacea, siliquæ Carobiz vulgò dictæ concolor, in numeris rugis exarata, qualis icone delineatur.

*PHASEOLI parvi ex
America.*



Idem Clusius vidit nō procul Olyssipone in monasterio quodam Phaseoli genus vulgari nostrati adeò simile, vt nostrum putares. Pergulas istic vestiebat opere topiario, flore purpureo: at siliquæ scabræ sunt, breuiiores, & duplò latiores quàm nostri vulgaris: fructus exiguus, pisi vulgaris magnitudine, intus niger, nisi qua parte siliquæ adhæret, quæ candida est. Brasilianis frequentem esse aiunt, & Lusitanis istic habitantibus Fabæ braua, id est, Fabam siluestrem nuncupari. His appinxit Lobellius Phaseolos paruos ex America delatos.

HERBA IOANNIS INFANTIS, GVACATANE,

Hordeolum. CAP. CXXXIIII.

Forma.

Vires.



Vt in Hispania Noua primi militarunt, eamque subiugarunt, herba quadam vsi sunt in curandis vulneribus, vt refert Nicolaus Monard. quam primus ostendit Indus quidam Hispani famulus nomine Ioannis infantis, à quo illa nomen accepit. Exigua est planta, foliis exalidis, aliquantulum villosis. Viridis præmansa aut trita, vulneribusque imposita sanguinem sistit atque conglutinat. Nervorum aliorumque partium vulnera digerit & mundat, tandem ad cicatricem perducit. Iisdem viribus polteristica in puluerem redacta. Idem Nicola. Monard. refert ad se missam fuisse ex Hispania Noua plantulam quandam sine radice (Indi Guacatane nuncupant) nostro Polio montano haud absimilem, sed inodoram. An florem, an fructum proferat, ignorat. Ad hæmorrhoides commendatur hac ratione. Eius plantæ decocto ex vino (si calor absit) alioque et aqua hæmorrhoides abluuntur, deinde blandè siccantur, postmodum eiusdem plantæ puluere insperguntur. Dolores ex frigore & stantibus

Forma.

GVACATANE,

Monardus.

Vires.



ortos in quacunque corporis parte sedat, si locus resina prius inunctus, tenuissimo eius puluere inspergatur, & pannus lineus superimponatur: nam illico adhærebit cerati modo, nec inde amouebitur nisi dolore sedato. Eius puluis leuibus vulneribus impositus præsertim inguinum, ea mundat, & ad cicatricem perducit. Præterea narrat Nicola. Monard. ad se perlata esse cum aliquot aliis plantis ex Hispania Noua, semina cuiusdam plantæ, quæ *Cenadilla* istic vocatur, id est, Hordeolum, à similitudine quam cum Hordeo nostrate habet, in spica & vaginulis quibus semen includitur, sed minus, & Lini semine neutiquam maius, verum longè aliis facultatibus præditum. Etenim nunquam auditum est aliquam aliam plantam adeò vrente & caustica vi præditam, ita vt vbi cauterium necessarium est in gangrænis, & impuris putridisque vlceribus, eisdem præbeat effectus, quos non modò sublimarum, sed etiam ignis præstare posset. Etenim vermes in vlceribus necat, putridaque vlcera ex purgat puluis eius sensim inspersus, maiore minorque

quantitate

HORDEOLVM, Monard.



quantitate pro vlcis magnitudine, adhibitis præferuâtibus quæ in huiusmodi remediis vsurpant solent. Itaque cum eius facultates infringere volunt, puluerem stillatio liquore colaturum aut plantaginis excipiunt, linumque aut ellychnium eo intinctum vlcibus & gangranis imponunt: deinde sarcotica medicamenta adhibentur pro petiti chirurgi iudicio. Eadem ratione vsurpatur in animalium malignis vlcibus, quibus plerumque infestantur. Miras item fuisse ad se aliquot alias plantas idem auctor refert sine nomine, quarum vnus ex aqua decoctum calidè sumptum pectoris vitis auxilio est. Altera partus mortuos secundasque morantes trahit. Tertia, si, cum maxime viget, quispiam colligere volens duntaxat contingat, illico flaccescit & procumbit. Quarta per solum diffusa est & expansa, si quis tamen eam attingat, statim contrahitur vt Brassica Murciana. Helleborus etiam niger Hispanico similis, & iisdem facultatibus præditus. Multa præterea alia medicamenta in Indiis occidentilibus inueniuntur,

in quibus facultatibus donata, quæ cum tempore sua innotescant, diligentia & industria illorum, qui non sibi se, sed in commune natos meminerunt.

HETICH AMERICVM.

CAP. CXXXV.



EXTERNAS etiam quasdam hortenses plantas adscribamus atque in primis Hetich, quæ radix est Rapis magnis, quales apud Lemouices nascuntur, similes, cuius dux reperiuntur species eiusdem crassitudinis. Vna quæ coctura flauescit, altera quæ albescit. Vtraque solum habet Malux, semen nullum. Quare barbari Americi ipsam radicem in taleolas concisam pangunt, quæ sic copiolissima prouenit. Hanc magno cuidam propheta (Chariabæ prophetam vocant) acceptam tulerunt, qui puellæ cuidam obuius dono dedit, eamque ferendi, vendique modum docuit, itaque successit, vt ad postereros continuato eius vsu, nullo ferè alio nunc vescantur cibo, sitq; iis adeo vñtatus, ac nobis panis, cum antea, vt narrant, herbas, radicesque siluestres beluarum more depascerentur. Hetich Octum esse Plinij putat Dalechampius, pro quo apud Theophrastum mendosè legimus Vingum. Sic Plinius. Mandunt & Octum, cui pauca folia minimaque, verum radix magna. Theoph. verò, ἀραιὰ δὲ καὶ

Nomina

Genera

Forma

Lib. II. cap. II.

τοῦ, cui pauca folia minimaque, verum radix magna. Theoph. verò, ἀραιὰ δὲ καὶ ὅτι ἐστὶν ἡ ῥίζα τοῦ καυλοῦ, (alias vñtata) ἡ ῥίζα γὰρ φάλλου μεγάλου, καὶ ὁ βλαστὶς αὐτοῦ ῥαχὺς, ὃ ὡς μακρὰ, ὃ ἔστιν ὡς περὶ χερσὶν, διαφύεται τι, ἡ ἰαδικαία, ὃ πολλὰ λήγουσι ὅταν ὁ ποταμὸς

ποταμὸς ἀποβίη, ὅστις ἐστὶν βρύχης. Id est, Similiter & quod in Ægypto Octum appellat. Folia eius magna, germen breue, (non, vt Gaza, pusillum) radix longa, sapore præstanti, cibo idonea, quæ pro fructu colligitur, cum amnis in alueum transierit, eo quæ deorum aras coronant. Quæ Theophrastus folia ampla, Plinius pauca & minima dixit.

MANIHOT.

CAP. CXXXVI.

Folia.

Vitis.

Lib. 2. hist.
cap. 16.

LIA radix hæc est, brachij crassitudine, pedis vnus & dimid, aut pedum duorum longitudine, sæpius tortuosa, & obliqua. Hanc emittit frutex parvus, quatuor pedes circiter altus. folia habet ei plateæ quæ vulgo ab herbariis Patæ leonis dicitur similia, in ramulorum vertice lena septenave, quorum singula dimidium pedem longa sunt, tres digitos lata. Barbari ex radice, quam Manihot appellant, hoc modo farinam faciunt. Radices siccas siue recentes tundunt, siue radunt lato arboris cortice plurimis durissimisq; lapillis conferto. Dein incerniculo cribratas in vase cum aqua igni imposita commouent, ita vt hæc farina in grumulos coeat, mannæ granatæ similis, quæ recens optima est, & plurimum succi corpori suppeditat. Huius parandæ negotium totum mulieribus committitur, perinde ac viris indignum. Scire autem licet à regione quæ Peru dicitur, Canada, & Florida insulis, tota continente inter Oceanum & Magellanicum, scilicet in America, & eorum regione quæ Canibales appellantur, vsque ad fretum Magellanicum, id est, quater mille miliariorum spatio, nullum cibum vsitatorem frequentiorémque esse, eaque farina cum carne & piscibus omnes vesci, non aliter quàm nos pane, admirando quodam modo, nunquam admouentes manum ori, sed procul longioréque quam pedis vnus spatio, magnæque dexteritate in os conicientes, ac Christianos irridentes, si aliter comedant. Quidam Arachidnam Theophrasti, Manihot esse putant, Ignose verò, de quo proximo capite agitur, eiusdè τὸ ἀράχιδος siue ἀράχης ὅμοιον,

MANIHOT.

YUCA.



non, ut apud Plinium legitur, Aracidnam, & Aracum. De quibushæc Theophrastus. *ὅθεν αὐτὴ τῆς ἀραχίδου καὶ τῆς ἁμύνου τῆς ἀράκου. φέρεται γὰρ ἀμφοτέρω καὶ τὸν ἐκ ἐλαφίου τὸν ἀνὰ καὶ μίαν μὲν ρίζαν τὸ ἄρκυδιον τὸ τοῦ παχέως ἔχει, τὴν δὲ βαθεύου. τὰς δὲ ἀλλὰς, ἵψ' αὖν ὁ καρπὸς, λεπτοτέρως, καὶ ἐπ' αἰσῶ, καὶ γυμνάσας πολλὰ χυμὸν. φάνε δὲ μέγας χυμὸς τῆς ὕδατος, φῶλον δὲ ὑδρότερον ἔχει τούτου, ὅδ' ἕμωι τοῖς φῶλλοις, ἀλλ' ὥσπερ ἀμφοτέρωτα μάλ' ἔστι, καὶ φαίνεται θαυμάσιον.* Id est, veluti Arachidnæ radix, cuius quod Araco simile est. Vtrumque enim fructum fert non minorem eo qui in supernis plantæ partibus nascitur. Et radicem quidem vnam carnosam & crassam, quæ in altum demittitur, cæteras, in quibus fructus, tenuiores, & summo cespice & quaquaversum diffusas. Locis gaudet arenosis. Neutrum folium habet, neque foliis quicquam simile, sed potius quasi utrinque fructum edant, quod mirum videtur. Plinius. Aracidna quidem & Aracos cum habeant radices ramosas ac multiplices, nec folium, nec herbam ullam, aut quicquam aliud supra terram habent. Satis igitur conuenit historia radices, nisi Theophrastus scriberet neutrum folium habere, neque foliis quicquam simile. Nam utrumque radicem vnam habet crassam & carnosam, quæ in profundum recta descendit, alias præterea tenuiores, in summa terra, multifariam diuisas, quibus fructus, id est, noua soboles, inhaeret ac innascitur, ut in herba quam Dodon. Chamæbalanon vocat. Aucototes huius semine æiunt peregrinæ utriusque plantæ historiam Theophrasto sua commentanti parum integra fide recitariam fuisse.

IGNAME, BATAT, AGIS. CAP. CXXLVII.



IN Brasilia, & Hispaniola insula vocata, Batat dicitur quod in terra Themistitan Agis, in Sancti Thomæ insula, Igname. Radix est Napi figura aut Rapi, nigro cortice, infernè sparsa quasi in brachia. Ei calidior sapor, sed suauior ac tenerior. Sub cineribus assa atque elixa ventur. Medullæ color haud vnus omnibus. Itaque in species varias digesserunt. Prima est quæ ab Hispanis Igname cicorro dicitur. Sola hæc annum durat incorrupta: quocirca in naues imponunt pro comæatu. Tres præterea species, temporis omnes impatientes. Excellentissimo sapore illa quæ nascitur in agro Benin. Quæ à Manicongo minùs nobilis. Vltimo in pretio lutea est, colore quasi Carotæ dictæ. Eius lactio mira, quippe non radice feritur, sed talea sicut Olea. Samentis fructu in fissum in partes aliquot, modò quidpiam corticis seruatum sit, deponit. ridicam propter pangunt. Eius namque stipes aduoluitur Lupuli more. Folium in Citrio, æquè nitidum, sed minus ac tenuius. Quinto mense messis tempestina. indicium ubi folia siccantur. Radix ut Atundinis, aut Diacontij, quaternas quinque soboles edit. Siccata seruatur. Hæc Scaliger. Eadem planè reperies apud aucotem nauigationis ad Insulam S. Thomæ. Primus opifex qui ad panis vicem accedere iussit hanc radicem, eiusque usum supplere famelicæ regioni, cavit & id, ut non in futuram messem radix auulsa sereretur, sed in annonam potius seruata, cederet pactorum samentorum fructificationi: vnde soboles succrederet in futurum prouentum.

Forma.

Genera.

Exerc. 17. Scalig. ibi.

BATATAS (Cuscy. CAP. CXXXVIII.



SCRIBIT Pena ad Sisatum non parum accedere radices illas quæ in insulis Nouo orbe non procul dissitis suapte sponte oriuntur. Batades vernaculè tum indigenæ tum Hispani illic vocant, Angli Potatoes, quibus illi tum ut cibo, tum ut veneris itricamento frequenter vtuntur. Singuli bulbi tetetes, oblongi Napum utrinque obesus aquant, color pulchellus illis foris, albidus intus, sapor gratus valde & tener quasi Milij delicatioris, aut Fabæ frefæ, eoque gustu insulæ sint nisi condiantur: cum sale, aceto, & oleo

Batades.

Forma.

Ignames. oleo interdum eduntur, & vino perfunduntur, nonnunquam coctæ prunis. Hæc congenetes sunt & persimiles quæ ab Hesperia, Æthiopia, & Guinea afferuntur, Ignames vocatæ: folia utrisque hederacea & maluacea esse dicuntur. De his planta in horro diximus. Integram tamen plantæ iconem & historiam ex Clusio adscribere operæ pretium fuerit. Veteribus plura hæc ignota fuit, idè nullum nomē Græcum aut Latinum proditum. Hispani & indigenæ, ut diximus, vocant Battades, atque etiam Camotes, & Amotes, quidam etiam Aies, tamen non nihil, ut aiunt, inter se differant, siquæ

Cap. 60.

BATATAS, Clusij.



Battatas radix longè & suavior & tenerior. Tria plantæ huius genera in Betica se obseruasse ait Clusius, colore externo inter se differentia, atque etiam gustus suauitate. Nam aut cortex externus rubescit siue purpurascit (& hoc genus præstantissimum censetur) aut pallidus, aut candidus est: omnes verò radices intus albæ. Producit autem Cucumeris satui modo sarmenta, per humum sparsa, satis crassa, & succulenta, & læuia, in quibus folia utcumque carnosa, ex viridi caducantia, Ari foliis, seu potius Spinachij haud dissimilia: radix dodrantalis est, Raphani prægrandis nonnunquam amplitudine, utrinque obtusa. Sponte nascitur in Nouo orbe vicinisque insulis, vnde primum in Hispaniam delata est: nunc verò multis

FAALIM, Theueti.



Cosmo. T. lib. 4. c. 7.

Betica: maritimis locis feritur in taleolas dissectæ: principatum autem obtinet Malaca nata. Editur ab ipsis incolis aut cruda, aut cocta: nunc Hispanis etiam in deliciis, ob saporis iucunditatem & teneritatem, præsertim si in cineribus cocta, & exteriore pelle repurgata, & in taleolas secta ex pauxillo vino, stillatitiique rosarum liquoris & sacchari momento edatur.

FAALIM Theueti. CAP. CXXXIX.

ELEONIO, ut narrat Theuetus, foliis præsertim similis est herba quæ Faalim vernacula lingua nuncupatur in Mombaze insula, olerum optimorum & simplicium medicamentorum omnis generis feracissima, atque eorum potissimum quæ venenis serpentium omnium, quibus regio hæc abundat, aduersantur. Huius herbæ experimentum se vidisse ait in duobus comorosis a serpente partim in aquis, partim in terra degente, quam illic *Alefah* vocat: cuius morsus adeo lethalis est, ut nisi statim succus huius herbæ admoueat, necesse sit hominem interire.

LIGNO

BINAE stirpes tradente Acoſta in Malabar inueniuntur plurimum diſſimiles cum forma, tum naſcendi modo, vno tamen eodemq; nomine nuncupatę Lignum Colubrinum, quod ſingulę mirum, in modum vtilis ſint aduerſus colubrorum morſus, Prior naſcitur Hederę modo, colore Dracunculi maioris, ſive Serpentarię: folia illi ſunt Bryonię ferę ſimilia, integra tamen initio, neruoq; prædita per longitudinem excurrente, & quin que aut ſex venis in latera vergentibus: ſucceſſu temporis accedunt exigua foramina, quę paulatim cum foliis incrementum ſumunt donec tandem omnino folia ſcindant, eaq; vitis foliis ſimilia reddant: conſpiciuntur enim interdum in eadem ſtirpe folia integra, alia exiguis, nonnulla maioribus foraminibus prædita, omniaq; adeo inter ſe diſſimilia, vt minimę eiudem plantę folia eſſe videantur. Tantam verò habet hoc lignum cum colubro ſimilitudinem, vt qui non norit, aut de die viderit, ſi ad Lunę ſplendorem noctu conſpiciat, viuum colubrum eſſe exiſtimet. Vulgò cenſetur præſantiſſimum remedium aduerſus colubrorum & viperarum morſus: incolę ſanę, dum in agros rendunt, magna ex parte circumferre, ſolēt hoc lignum (ſunt enim in ea prouincia multę vipetę, varięque ſerpentũ genera) aiuntque ſolo eius odore ſerpentes fugari: &, ſi dum colubros venantur, eos attingere hoc ligno queant, ilicò rumpi & extingui. Altera admodum breuis eſt & tenuis,

LIGNVM Colubrinum

I. Acoſta.



LIGNVM Colubrinum

II. Acoſta.



etiaq; ſolummodò folia habet mollia, læua, ſaturatiùs virentia: ſtorem aut fructum non conſpexi, nec quenquam inueni qui ſe vidiffe aſſereret: radix oblonga & tenuis eſt, minimo digito minor, hinc inde nonnunquam extuberans, & ſumma telure ſerpens: exterior eius cortex valde tenuis eſt & cinereus, nullo, dum guſtatur, manifeſto ſapore prædius, deinde tamen guſtum in ore relinquens ſuauem, & vti Moſchus odoratum. Fiſſus eſt vndiq; hic cortex, & ſponte ſeſe expedit ab alio craſſiore ſtuoq; cortice ſubtus naſcente, qui odorem Loti ſilueſtris ſive Triſolij odo-

LIGNVM Colubrinum,
Acoſta.



Vires.

rati vulgaris refert, & ſaporem Glycyrrhiza dulciorem: præmanſus autem odore admodum ſuavi, nec iniucunda mordicatione, momentanea tamen præditus eſſe deprehenditur. Ipſa materies lignoſa eſt, candida, dura & inſipida: folia Napi ſaporem referunt: germen producit hæc radix ſupra terrâ circiter quatuor uncias longum, in caput extuberans. Nomen huius plantæ apud Canarinos eſt *Duda Sali*. Trita radix cum aqua roſacea aut vulgari, vel cum vino (indifferenter enim vtuntur) præſens ceterumq; aſſerunt remediū aduerſus omnis generis ſerpentū inorſus. Plurimum etiā eius eſt uſus in febribus continuis, tertianiſq; ſyncope, ventriculi debilitate, & cordis tremore daturq; aduerſus omnis generis venena. Multi mihi ſanctè affirmarunt dummodò manu hanc radicem tenerent, nullos ſerpentes, vel alia ſimilia virulenta inſecta formidare, & certiffimum eſſe ſerpentes & vi peras eius aſpectum minimè ferre poſſe, ſed fugere, celerrimèq; in aliam partem ſeſe proripere, ſi quis ante ſerpentes eam proiiceret. Perutilis etiam cenſetur iis quibus anhelus ab ore vitiatò aut dentibus corruptis fueret, modò eam continuo mandant, dentiumq; cauſi geſtent. Prouenit locis humidis, & inter arbores, præſertim verò ſecundum eas quæ *Angelus* nuncupatur, nec procul à mari. Inuenitur & tertium Colubri ligni genus in eadem prouincia, vaſtæ arboris magnitudine, de quo in alio libro agemus. Neutrum verò, inquit Cluſius ad ſuperiora Acoſtæ, horū ligni Colubri generum cum Garciz ligno colubrino cōuenire facilè animaduertet, qui vtriuſque deſcriptiones diligenter conferet. Secundi verò generis Garciz deſcripti fragmentum quinque unciam longitudinis, quòdque, vt conſpicere licebat, duarum unciarum craſſitudinem æquarat, mihi nò modò oſtendit Londini anno 1581. C. V. D. Heſtor Nunez Medicus Luſitanus, ſed etiam dimidia eius parte liberaliter donauit. Eius porrò materies firma eſt, candida, venis quibuſdam diſtincta, nò diſſimilis Fraxini ligno, cortex autem qui eam integrit candicans, & quaſi cinereus. Vtraque verò, ſi quis deguſtet, amaro ſapore prædita eſſe deprehenditur. Eius fragmenti iconem lectoris oculis ſubiecimus.

DATA.

CAP. CXLI.

Genera.

ITA ſunt huius plantæ genera, quorum quo frequentius vtuntur, primo loco deſcribemus: eius enim adeò vulgaris eſt uſus, vt pauca ſint meretrices, quæ inter ſua *κρητὰ* illud non recondant, ob eas quas poſteà ſubnectemus cauſas. Primum Althex magnitudine caulem habet, nec admodum illi diſſimilem, in plures tamè ramos diuiſum: folia cū magnitudine tum forma Stramoniz folijs ſimilima, verū magis in circuiu ſerrata, vti ſerè Xanthij folia: flores albos, Smilacis læuis (quam Hiſpani *Correguela* vocant, hoc eſt, Conuoluulum maiorem appellant) floribus omnino reſpondentes: fructum Stramoniz, rotundum, nucem luglandem magnitudine æquantem, viridi colore præditum, & ſpinis mollibus, minimeq; pungentibus vndique ſeptum, plenum ſemine Lenticulæ ſimili, eiufdemq; coloris, cordis humani effigie, guſtus amari: radicem albam, Raphani odore, quæq; ſi diu naribus admoueat, ſternutamenta ciet, cuius cortex non nihil amaricat, minùs tamen eo qui caulem & ramos ambit.

DATURA, Acoſta.



ambit. Naſcitur vmbroſis locis, & ſecundum *Locus.*
 aquas. Nomen huic plantæ in Malabar eſt *Vn-*
mata caya, in Canara *Dauro*, apud Arabes *Ma-*
na, apud Perſas & Turcos *Datura*, apud Luſita-
 nos *Datura* & *la Burladora*, hoc eſt, faceta. Litera-
 ti pleriq; atq; etiam maxima pars Medicorum
 iſtic degētium, legitimam Nucem Merhel Ara-
 bum eſſe cenſent, frigidamq; exceſſu tertio, & ſic
 cam ſecundi ſine conſtituunt. Mala inualuit cō-
 ſuetudo apud impudicas mulieres, vt huius ſe-
 minis in puluerem triti dimidiam drachmā ex
 vino, aut alia quæ magis aridæ materia præ-
 beātemiſer qui eum hauſit diu velut mente alie
 natus remanet, aut ridens, aut eiulans, aut dor-
 miens, plerumq; etiam alteri colloquens & re-
 ſpondens, vt interdum etiam ſana mente prædi-
 tum eſſe credas, tamen ſi mentis non ſit compos,
 neque eum agnoſcat cum quo ſermones cōfert,
 & colloqui habitū planè ſit imminuor, poſtquā
 ad ſerediit. Sunt verò nōnulli ad eō exercitatæ
 in hoc medicamento exhibēdo, idq; ſic tempe-
 rare norunt, vt ad certas, eaſq; quot velint ho-
 ras, quibus id propinant, mentem adimant. Multa ſanc̃ eius rei exempla, quæ vel
 ego ipſe vidi, vel ab aliis audiui, huc adducere poſſem, ſed cū ad rem nihil faciāt
 præmittenda eſſe duxi illud ſolū addam, neminem qui ſimile ſumpſiſſet, ne-
 carum vnquam comperiſſe, tamen ſi non nullos conſpexerim per aliquot dies per-
 turbatos ferri, quod fortè acciderat ob immodicam quantitatem exhibitam: quæ
 ſi fuerit nimia, interimit, quoniam hoc ſemen pernicioſa qualitate non caret, li-
 cet Gentiles ad prouocandas vrinas cum Pipere & foliis Betele id exhibere ſoleāt,
 & peruiſe eſſe dicant. Ego verò nunquam obſeruauī, nec experiri volui, cū alia
 medicamenta ad eam rem vtilia non deſint. Porro ſi ad eorum qui hoc ſemē hau-
 ſerunt curam euocentur Hiſpani Medici, medicamēta vomitum clientia exhibēt,
 vt quidquid in ventriculo hæſit reiiciant, acres deinde clyſteres iniiciunt ad eua-
 cuandum, forteſq; ligaturas adhibent ad diuertēdum, tum etiam cucurbitulas ad-
 ponunt & venam ſecant. Gentiles verò Medici & Chriſtiani indigenæ cū à cu-
 curbitulis & venæ ſectiōne abhorreant, nihil aliud quā vomitum prouocant,
 forteſq; ligaturas & fricationes adhibent, quæ ſi non ſufficiant, balnea ex aqua cal-
 ida præſcribunt ad eliciendum ſudorem: porro à vomitu vinum propinant, cui
 Piper & Cinamomum admiſcent. In cibis verò audaciores ſunt Hiſpani: namque
 euacuata materia gallinas edendas præbent, & vinum dulce, aut paſſum exhibent.
 Radicis Daturæ drachma ex vino pota ſomnum profundum inducit, in quo varia
 inſomnia, & miræ rerum facies obuerſantur. Semine verò per noctem in aceto
 macerato, deinde exactè trito, vtiliter illinuntur herpes miliares & eryſipelata
 ſerpentia: nam breui ſanantur. Quantum ex ſuperiore Daturæ primæ deſcriptio-
 ne colligere licet, eandem eſſe cum Turcorum, qui Conſtantinopoli viuunt, *Toru-*
le, cuius uſus illis per quā familiaris eſt, exiſtimat Cluſius. Reliqua duo genera
 faciæ & fructu ſuperiori ferè reſpondent, ſed flores colore variant: etenim ſecundi
 flores, licet forma priori ſint ſimiles, colore tamen ſtauo ſunt, & ſecundū pedic-
 ulum non nihil rubent: tertij flores Hyoſcyami floribus magis accedunt. Cæte-
 rum neutro ex poſtremis duobus vtuntur, niſi ad necem inferendā. Nihilominus

*Nomina**Temper.*
*& Vires.**Tavla.*

tamen Brachmenes Medici ex secundi semine (quod floribus est flauis) catapotia faciunt, granorum Piperis magnitudine, magnæ sanè efficaciz ad sistenda alui profluuia, quibus adiuncta sit febris ardens, atque etiam in dysenteris. Fiant verò hunc in modum carapotia. *℞.* seminis secundi generis drachmam vnam, Piperis nigri & longi, Sandali albi, Atincar, radicem *Byssa* (adfertur ea ex Bengala & Patanne montibus) foliorum Bangue, singulorum dimidium drachmam: omnia ista diligenter cum aqua terunt in marmore, quo pictores suos colores terere solent, deinde catapotia efformant, è quibus exhibent quantum commodum videtur. Mea est cum aliis plerisque opinio, ut nucem Methellam Seramoniz fructum esse credam, qui per omnia similis est fructui Daturæ: atque si non nihil ab eo differt, id locorum varietati adscribendum censeo.

BANGVE. CAP. CXLII.



BANGVE simile ferè est Cannabi, cuius Dioscorid. lib. 3. meminit. Caulem habet quinque palmorum longitudine, quadrangulum, colore dilutius virente, fractu contrumacem, nec adeò concavum, ut cannabinus caulis, cuius cortex non minùs quàm illius in fila diduci potest. Folia cannabina supernè virentia, infernè incana lanugine pubescètia, gustu terre-

BANGVE.



stri & insipido: semen cannabino minus, neque adeò candidum. Indi semine & foliis vescuntur, cum ut validiores in te veneres fiant, tum ad excitandam cibi appetentiam. Fit et hoc Bangue composicio vulgaris admodum vñs in iis regionibus, ad varios effectus: enim magnates & militiæ præfecti, ut laborum obleti securius & liberius dormiant, seminis & foliorum in puluerem redactorum quantum videtur sumunt, illique addunt Arecam sue auellanam Indicam viridem, opij nonnihil pro arbitrio: omnia saccharo excepta decoquant: si verò in somno varias rerum species sibi obuersari cupiunt, addunt præterea selectissimam camphoram, caryophyllos, nucem moschatam & macis: si verò hilares esse volunt & faceti, & præsertim in venerem prociuios, ambaro & moscho additis saccharo excipiunt, & electarium faciunt. Multi mihi affirmarunt huius semen & folia ad libidinem ciendam mirè esse efficaciz: vnde colligere licet, nihil affinitatis habere cum Cannabi, licet illi admodum similis sit, quandoquidem

auctore Dioscoride loco suprà dicto Cannabis calida & sicca est, & genituram extinguat. Dicitur Arabibus *Ash*, Persis, Decan & plurimarum aliarum regionum incolis *Bangue*, Turcis *Afarath*. Sed & hoc Bangue, ut scribit Clusius, plurimam affinitatem habere videtur cum Turcorum Constantinopoli degentium *Maslac*, quo ad varios effectus vtuntur: nonnulli etiam vescuntur excitandæ veneris gratia.



NONULLIS Afiz locis planta quædam inuenitur, vulgò *Herba vi-*
ua nuncupata, à circumforaneis illis *Iogues* appellatis *Herba amoris*, ab *Nomina*
 Arabibus & Turcis *Suluc*, & à Persis *Sulac*. Exiguam habet radi-
 cem, è qua supra terram exiliunt octo ramuli duos digitos longi, fo-
 liis vtrinque in ordinem digestis & inrer se respondentibus onustis, quæ plurimùm *Forma.*

HERBA VIVA,
Acosta.



ad Erui tenella folia accedunt, nec dissimilia
 sunt foliis prioris Polypodij, cuius iconem La-
 cuna exhibet lib. 4. cap. 187. sed longè tenuiora,
 & vtrinque læuia, & grato virore oculos pa-
 scentia, vti Tamarindorum folia: è medio radi-
 cis capite exiliunt pedunculi (nam caule caret)
 quatuor, singuli suum florè sustinentes flauum,
 aspectu pulcherrimum, minoribus Caryophyl-
 leis similem, sed sine odore. Nascitur calidis &
 humidis locis. Adeò mira est huius plantulæ na-
 tura, vt eam humana ratio assequi nequeat.

Locu.

Nam cum maximè viret, gratissimæque est aspe-
 ctu, si quis illà apprehendere cupiat, illicò folia
 contrahit, atque sub tenues ramulos recondit:
 si verò apprehendat, subito adeò marcida con-
 spicitur, vt exsiccati patet: sed quod maiore ad-
 miratione dignū est, si manum retrahat, illicò
 nitorem recuperat, & toties marcescit aut reui-
 rescit quoties comprehenditur, aut manus ab
 ea retrahitur. Mihi autem relatum est Philo-
 sophum quandam in Malabar, dum nimis cu-
 riosè huius plantæ naturam obseruare cupit,
 amentem esse redditum. Plantam ego conspe-

xi, eamque cum suo cespite, ipsam minimè contingens, erui, & in hortum quen-
 dam transtuli, vbi permansit, at fatuum minimè vidi. Interrogati à me nonnulli
 indigenæ Medici, an aliquas huius plantæ facultates perspectas haberent, illam-
 que in vsum medicum adhiberent, affirmarunt vtilem esse ad virgines corruptas
 in integrum (si credere fas est) restituendas & ad reconciliandum amorem miræ
 esse efficaciz. Gentilis Medicus, & pro ea regione satis doctus, cum adeò cupidum
 cognoscendi huius herbæ facultates conspiceret, ait, vnam se edocturum adeò
 compertam & certam, vt ceruicem pro pignore deponeret, nisi eam sic se habere
 compertirem. Nempe vt illi cuiuspiam mulieris, qualiscunque etiam statys, nomē
 modo indicarem, se effecturum vt illa in omnibus mihi obsequeretur, dummodò
 ex ipsius præscripto herba vteret. Sed conditionem respui quādoquidem res adeò
 illicita esset. Nihil igitur aliud post diligentem inquisitionem de hac planta inrel-
 ligere potui, quàm apud Gentiles, præsertim verò Brachmenes Canarinos & Io-
 gues in magna estimatione esse. Quodam die mihi accidit plantas conquirenti
 non procul à flumine Mangate, vt Gentilem quandam humi sedentem, & verba
 quædam obmurmurantem, tanquam oraret, fortè conspicerem, quem cum com-
 pellaßem, nihil respondit, sed meo interpreti, quem comitem duxeram, manu
 duntaxat innuit: is hominem intelligens, celeriter sese inde proripuit, meque se-
 cedere iussit, inquit, Gentilem illum incantatorem esse cuiusdam illius regionis
 Capitanei quem *Cajmal* appellant, & istic sortes iacere supra Herbam viuam, id

fieri solete reputato prius circa ipsam plantā solo ad hominis longitudinē, recitāq; quxdā concepta verba, & expectari primā aū aut tem animatam quæ illā plantā prætergrederetur dum verba obmuturaret, cuius sanguine (si cōprehendi posset) petuenda esset, sin minùs alterius eiusdem speciei, idq; cum multis ceteris moniis, quas prætermitto, cū indignæ sint vt scriptis mandentur. Conspecti deinde istam plantam siccam inter supellectilem mulieris prostituta pudicitiz.

HERBA MIMOSA. CAP. CXLIII.



LI A planta inuenitur in quibusdam hortis, quinque palmorum longitudinis, & vicinis arbutis aut patietibus incumbens, tenui caule, eleganti vitore prædita nec admodum rotundo, per interualla exiguis & pungentibus spinis obsito, foliis supetiotibus haud absimilibus, Filicis feminæ foliis minoribus. Gaudet humidis & petrosis: & *Herba mimosa* nuncupatur, quoniam manu admota senescit & matescit, manu vetò remota pristinum vitore recipit, sed non adeò celeriter vti prior. Naturam habet plurimum ab Arbore tristi differente: nam singulis noctibus Sole occidente senescit & siccatur quodammodò, sic vt contabuisse videatur: oriente vetò Sole vigorem denuò recipit, quantòque Sol magis feruet, eò magis vitet, totòque die folia ad Solem conuertit. Odore & sapore est Glycyrrhizæ: vulgoq; ab indigenis folia inanduntur aduersus tulsim,

ad pectus repurgandū, & vocem clatiorē tenum etiam dolotibus vtilis esse censetur, & recentia vulnera glutinat. Multis notis (annotat Clusius) hæc planta cōuenit cum Fœnogræco siluestri Tragi, siue Polygalo Cordi & Glycyrrhizæ siluestri Gesnietis, cuius folia & radices degustata Glycyrrhizæ sapiunt: nam eius folia noctu interdū contrahuntur (quod in multis leguminaceis plātis vsu venit) at spinis caret caulis, nisi pro spinis sumere libeat tenues illas & mucronatas appendices sedis foliorum alatotum inhxerentes.

HERBA MALVCANA. CAP. CXLV.

MORVM aut trium cubitorum longitudinem adquirit hæc planta, nonnunquam etiam locis vberioribus & humidis, quinque cubitos superans, eleganti virote prædita, caule tenui, tenero, nonnihil concavo, imbecillo, & nisi vti laminum pergulis sustineatur, humi sese diffundente, quemadmodum Hedera, & multos tamos spargente, qui subinde radices agunt vt Mentha & Melissophyllon, adeoque serpunt, vt planta sola vel ramus transpositus breui temporis spatio magnum locum occupet: folia habet tennella & mollia, in ambitu serrata, magnitudine & forma Sambuci foliis respondentia: storem croceum Chamæmeli flori admodum similem, paulò tamen maiorem. Toto anno viret & luxuriat. Vulgò nuncupatur Remedium pauperum, & Destuctio Chirurgorum, Canarini *Brungara aradua* appellat, id est, quæ flore est croceo. Frequenter vtuntur cū in Maluco (vnde primam originem traxisse creditur, quod istic abundè nascatur, & plurima admisceatur chirurgicis remediis) tum in omnibus Indiæ prouinciis, in quibus diligenter colitur, & in pectio habetur, nec iniuria. Coquuntur huius plantæ folia in oleo, & cum cera inspissantur

tur vnguenti modo. Mirificè curat id vnguentum omnis generis vlcera cùm recentia tum antiqua, etiam si sanguinolenta, sordida, cuniculosa, maligna & putrida sint: mirè esse efficaciz deprehendi in tibiærum vulneribus inueteratis, & recentibus vulneribus. Alia est præterea huius stirpis vtendæ ratio. Eius enim caulem & ramos superiore cortice denudant, & sumunt membranam illà tenuem quæ media est inter exteriorem corticem & caulem, quæq; faciliè, vt in Cannabi, reuellitur: eam oleo nucis Indicæ madentem, ipsius plantæ solus inuoluunt, & sub

MALVCANA, Acaia.



cineribus calidis recondunt: vbi incaluerit & emollita fuerit, conterunt, & recentibus cruentisque vulneribus imponunt seu grandia sint, seu minora: & paucis diebus non sine admiratione conglutinant absque illa inflammatione aut apostemate: lenit enim dolorè, sanguinisq; fluxu cohibet, breuiter, nullo alio medicamento adhibito omnino ad cicatricem perducit: singulare etiam pethibent esse remedium aduersus nervorum punctiones, & vulnera. Eodè præterea modo adhibetur in apostemate aperto ad emundandum, carnem generandum, & ad cicatricem perducendum: item in inueteratis vlceribus & cuniculosis, in quibus ea solummodò trita interdum apponitur. Porro quoniam ista remedia huius plantæ certissima sunt, vulgariter iis vtuntur in vniuersis illis prouinciis, & magna habent in æstimatione: multi præterea alij qui inde nauigant vnguentum ex hac herba cum oleo & cera cõfectũ, secũ cõferre solent, tantã fiduciã in eo collocantes, quasi omnia chirurgica remedia, apud se haberent: itaq;

quacunq; occasione in qua chirurgorum opera requiri posset, subitò ad vnguentum ex herba Malucana cõfectũ confugiunt, tanquam indubitatum remedium.

SARGAÇO.

(CAP. CXLVI.)

IN CELEBRI illa nec minùs metuenda navigatione del *Sargaço* (sic enim totum illud Oceani spatium à decimo octauo gradu ad trigesimum quartum ab æquinoctiali ad septentrionem tendens, qui in Indias nauigant, appellant) cõspicitur profundũ & spatiosum æquor rectum herba quadam *Sargaço* nuncupata, palmum longa, tenuibus ramulis in glomos conuoluta, foliis angustis, tenuibus, & dimidiã vnciam longis, in ambitu admodum serratis, colore subrufo, gustu insipido, siue insensibili mordicatione prædito, qui potius ex aquæ salugine contractus, quàm ipsi plantæ innatus videatur. Ad singulorum foliorum exortus inhæret semen rotundum vtigranum Piperis vani & vacui, tenui corallio albo, interdum autem corallio rubro & albo omnino elaboratum, tenerum admodum dum primùm ex aqua educitur, & durum si exsiccati sinatur, sed propter tenuitatem admodum fragile, salsa aqua plenum. Nulla radix in hac planta cõspicitur, sed sola rupturæ vestigia apparent, atque in profundo arenosòq; maris alueo nasci, reuolueradices obtinere credibile est, tametsi nonnulli opinentur rapido aquarum, quæ ex multis insulis in Oceanum influunt, cursu istam herbam euelli & simul trahi. Cùm eam opinionem pertinaciter tueretur naclerus illius nauis qua vehebat, subortaque esset inter nauigandum hoc mare malacia, quantum acies oculorum extēdi potuit, id vndiq;

Locu.

Forma.

SARGAÇO, *Acafta.*

Vires.



ista planta coniectum vidimus, demissisq; nonnullis iunioribus nauris qui eam herbam à naui propellerent, aquàmque repurgarent, apertè conspeximus eius herbæ glomos simul implexos ex alto mari emergentes, vbi demissa bolæ de nullus fundus tentari potuit. Hæc planta aceto & sale condita eiusdem saporis est cum Crithmo, siue Fœniculo marino, & in eius penuria sumi posset, rum etiam Capparum loco à nauigantibus edi. Iussi illam receuter è mari sumptam capris quas in naui vehebamus obici, & auidè sanè vesecebantur. Nullas eius facultates comperi, sed quidam è nostris nautis vinee difficultate laborans, & arenulas crassasque humores eiiciens, crudam eam & coctam forrè edit, quoniam illi bene saperet paucos post dies affirmavit mihi, magnum ex illius esu se sentire commodum, secumque dentulit, vt peracta nauigatione in continenti viretur. Considerandum Clusius admonet, an non sit Lenticula marina ferraris foliis Lobellii, cuius iconem inter marinas stirpes ad Oblætionum calcem exhibet.

GRANADILLA. [CAP. CXLVII.]

Nomen.



LATVS mihi ex continenti herbæ fructus est (ait idem) quæ in Peruanis montibus, vbi sponte nascitur, *Granadilla* appellatur, quod nomen illi imposuerunt Hispani ob similitudinem quam cum nostris Malis granatis habet, nam eiusdem ferè est amplitudinis, atque etiam coloris, quando maturus est, nisi quòd corona careat: nunc in siccatu, si ageretur, sonitum edit semen intus oclusum, quod Pyri semini simile est, aliquantò maius, tuberculis quibusdam eleganter elaboratum, & aspectu iucundum: pulpa candida est, & saporis expers. Planta hunc fructum ferens Hederæ similis est, eodèmq; modo repit & scandit quocunque loco ponatur. Elegans est cum fructu onusta cõspicitur, propter eius amplitudinem: florem habet albæ Rosæ perisilem, in cuius foliis aliquæ veluti passionis Christi figuræ delineatæ conspiciuntur, quas magna diligentia istic pictas existimes: eam ob causam elegantissimus est flos. Fructus ipse sunt Granatula iam dicta, quæ matura acidulo liquore abundant, & semine plena sunt: aperiuntur vt ova, & liquor ille cum magna voluptate sorberetur cum ab Indis, tum ab Hispanis: nec etiam si multos sorbeas vllam ventriculi grauedinem sentis, sed potiùs aluum emolliri. Herba rara est, quæ duntaxat vno in loco inuenitur. Fructus temperatus esse videtur, & aliquantulum humidus.

Forma
plantæ.

FLOS SANGVINEVS. [CAP. CXLVIII.]



SEMEN ex Peru delarum terræ commississe, vt eius elegantiam potius conspiceret, quàm quòd vlla medica facultate præditus esset, scribit Monardes. Ipsa planta duos circiter palmos assurgit, ramis rectis, quos ambiunt rotunda & tenuia folia admodum virentia: flores in summis ramis nascuntur atque admodum colore fulgentes, quinque foliis cõstantes, in quo

in quorum singulis sanguinea & maximè rutilans macula impressa est, oblongo cucullo extremos flores occupante & longè prominente. Elegans est flos, ad pen- siles hortos exornandos aptissimus: nam & semine & furculis faciliè nascitur. Gustatus eodem sapore & odore quo Nasturtium esse deprehenditur: insigniter calidus est.

PAYCO.

CAP. CXLIX.



ES & herba quædã ipsi ex Peru missa est, istic Payco nūcupata, cuius folia Plantaginis foliis cū forma, tum colore sunt similia, quæ siccata, admodū tenuia sunt, & gustata valde acria calidæque de- prehenduntur. Eius pulvis ex vino sumptus, nephreticum dolorem é flatibus, aut si frigida causâ provenientem tollit: ipsa verò planta cocta, & emplastri in modum dolenti loco imposita, eundem effectum præbet: quod certissimum esse ipsa experientia didicisse testatur.

Vires.

HERBA AD RENVM MORBOS
UTILIS.

CAP. CL.



LIA item, inquit, missa est, admodū utilis ad renum affectus é cali- da causâ natos, illto parti dolenti eius succo cum rosaceo vnguento mixto, & foliis ipsius plantæ superimpositis: in erysipelate & inflam- mationibus succus impositus valde confert: nam inflammationem tollit, & dolorem mitigat. Sunt verò ea folia quasi Lactucæ primū enatæ & tenerioris, similiq; virore præditæ, quæ gustata insipida deprehenduntur, sic vt herba perfrigida videatur.

LACTVCA SILVESTRIS PYMILA.

CAP.

CLI.



LIA M præterea herbam attulerunt, Lactucam siluestem vocatam: cuius folia Lactucæ foliis sunt similia, ex atro virentia. Vires idem subiungit. Dentium enim, ait, dolorem tollit foliorum decoctum, & diutius in ore, qua parte dentes dolent, retentum. Idem præstat foliorum succus dentium cauis instillatus, herba trita superimposita. Sapore admo- dum amaro est: calidiorem existimo, quàm in primo gradu.

HERBA AD RVPTVRAS UTILIS.

CAP.

CLII.



AVLVLM cuiusdam plantæ sibi idem missum fuisse narrat, cuius formam, quòd ob siccitatem omnino contracta & comminuta esset, obseruare non potuit. Hanc, inquit, scribunt miram habere facultatem in rupturis cū puerorum tum adukorum, & rem ita se habe- re alicunt. Ea vitur Indus quidam recenti contusa & rupturæ imposita, adhibi- ro deinde miro quodam ligaturæ genere: quoniam etiam sine braccis non minùs firmiter ligati incedunt, quàm si braccati essent, vt mihi retulit quidam qui simi- li morbo liberatus erat eius plantæ & ligaturæ vsu. Talem ligaturam (si adeò fir- ma sit vt ille referebat) solam sufficere posse existimo, nulla herba aliâve re im- posita: quoniam hic quendam Cordubensem conspexi, qui omnes herniosos sola ligatura curabat, nullis adhibitis braccis: quod verissimum est, & hic adhuc viuunt qui ab eo curati fuêre.

VERBE

Locus.

Forma.

Virtus.



CRAISIT mihi (verba sunt Monardis) nobilis ille virex Peru, secundum flumina è montibus eorum regnorum delabentia plurimam Verbenam crescere, illi quæ in Hispania nascitur similem, perpetuò virentem, quæ Indi in multis morbis curandis vtuntur præsertim aduersus omnis generis venena, & in his qui in cibis toxicum aut simile aliquid hauserunt. Nobilis quædam matrona ex Peru rediens mihi asseruit semel annis ægram fuisse, cumque plurimorum medicorum opera vñ fuisset, Indum tandem quandam accessisse, qui in plantarum scientia celebris habebatur, quique inter Indos Medicum agebat, Verbenæ succum depuratum illi propinasse, à cuius vsu post paucos dies lumbricum eiecisset (colubrum ipsa nuncupabat) hirsutum, pede longiorem, crassum, cauda bifida, deinde omnino conualuisset. Ipsam porò nobili cuidam viro in Peru, qui continuè ægrotabat, singulis diebus manè eundem succum saccharo permixtum sumere persuasisse, (ita enim ipsa hauserat ob amarorem) illum deinde plurimos lumbricos reiecissee longos, tenues, atque inter cæteros vnum albi cinguli instar longissimum, & tum demum integram valentiam recepisse. Id postea consilium plurimis aliis qui malè affecti erant, & lumbricos habere suspicio erat, dedit, qui omnes sumpto Verbenæ succo, multas ventris tineas eiecerunt, & sanati sunt. Illud remedium adeò certum affirmabatur, vt vnum è suis famulis ostenderet, qui ob morbi grauitatem philtum, aut medicata pocula hausisse diceretur, quicquid epoto Verbenæ succo, vomitu multa variis coloribus distincta ex ventriculo reiecisisset, quæ medicata pharmaca esse asserbant, deinde conualuisse. Quod verò ad incantationes & medicata pocula attinet, quod ego vidi hic subiiciam. Ioannis de Quintana Dueñas primarij cuius famulus vomitu reiecit me præsentem magnum tenuium & spadiceorum capillorum glomum, adseruabitque in papyro inuolutos plures alios quos binis horis ante euomuerat: quibus reiectis nulla amplius molestia torquebatur, præter eam quam vehementer vomitus induxerat. Ioannes Langius Medicus Germanus vir doctissimus refert mulierem se vidisse plurimum de ventriculi dolore conquerentem, reiectis multis vitri & murrhinorum vasorum fragmentis atque piscium scinis, sanitatem esse adsequutam. Aliud simile exemplum refert Beniuenius, lib. de Morbis mirandis. Sed quod maiorem mihi admirationem parit, est: Agricola, grauissimis ventris doloribus afflictum, cum nullis medicamentis mitigari dolor posset, sibi cultro guttur præcidisse: eius deinde cadaver cum secuisset & aperuissent, inuentam in ventre fuisse magnam similium capillorum, quales superiorem vomitu reiecissee dixi, quantitatem, & ferrea fragmenta. Has ego res dæmonis præstigijs tribuo: nam ad naturalium classem referri minimè possunt. Clusius tamen non dissimilia superiotibus, nec minùs mira, duo exempla affert, ne quis tantum illa Monardi credat. Accepisse verò primùm se ait à Francisco Zinnig Sereniss. Principis Marthæ Archiducis Austriæ, &c. pharmacopœo cum in sua arte peritissimus, tum diligentissimus: alterius ipse est testis. Lucas Farel, inquit, eiusdem Principis coquus, qui primùm apud D. Mariam Hungariæ reginam, deinde apud Margaretam Parmensem ducem in simili ministerio fuerat, singulis interdum annis, nonnunquam semestribus, vel trimestribus internallis, per annum elicet tenuem quandam lentamque materiam, angusti cinguli instar oblongam, candidam & crispam, non eam quidè continuam & integram, sed quam per fragmenta sex, duodecim, atque etiam quindecim vñas longa eximere cogit. Solet verò ante symptomata plerumque grauem in pectore sub dextra mamilla dolorem perpeti, quem vt leuet, aggregatiuis catapotius corpus purgat, eamque, quam dixi, materiam

materiam excernit, tum demum morbo liberatur. Is verò, quoniam plerumque ranta capitis grauedine afficitur, vt domo egredi, aut quoquam prodire nequeat, ex quorundam consilio Verbenæ radicem collo appensam gestat. Et mox de capillorum eiectis glomis. Simile, inquit, exemplum ante multos annos accidere memini Iureconsulto N. Vlierden celebri apud Anruerpianos causarum patrono, qui certis anni temporibus materiam in multos veluti muliebrum capillorum glomos congestam per aluum excernere solebat, qua reiecta meliùs habebatnam alioqui macilentus pallensque semper cum esset, aduersa valetudine ante ista symptomata plerumque corripiebatur.

HERBA MORTEM AUT VITAM IN MORBIS
PRÆVNNTIANS. CAP. CLIIII.

AND 1562. Comite de Nieua in Peru commorante, in eius familia mulier quædam illi inferuens maritum habuit graui morbo decubentem, cuius causa cum ipsam admodum tristem Indus quidam primarius conspiceret, interrogauit an scire cuperet, vtrum ex eo morbo periturus esset, an superstes futurus maritus, herbe ramum se illi missurum, quem in mariti sinistra manu poneret, eamque deinde diutius comprimeret: nam si superstes futurus esset, quamdiu eam herbam manu teneret, alacrem & lætum, sin moriturus, mœstum & anxium fore. Missum ab Indo ramum marito in manum dat, comprimereque iubet: sed illico tanta mœstitia & anxietas ipsum oppressit, vt illa, metuens ne subito extringeretur, ramum ex manu tolleret & abiceret: deinde paucos post dies extinctus est. Cupienti mihi, inquit Monardes, an ista vera essent perferuari, nobilis quidam, qui multis annis in Peru vixerat, certum esse affirmabat, & vsitatum esse apud Indos in ægitudinibus id facere, quod sanè magnam mihi admirationem attulit.

COCA. CAP. CLV.

SCRIBIT idem, cum tam multis annis celebrem illam apud Indos plantam, quam Coca nuncupant, & tanta cura & diligentia serunt, atque colunt, quoniam omnes eam in quotidianos suos vsus & oblationes conuertunt, videre cuperet, ad se perlatam esse. Est verò *Forma:* ea, vt tradit vlnæ magnitudine, foliis Myrti paulò maioribus (quæ veluti aliud folium simili forma in meditullio delineatum habent) mollibus, dilutiùs virëtibus: fructu racematim coherente, vt Myrti fructus rubente quando maturefcit, eiusdemque magnitudinis, quando verò plenam maturitatem adepsit, nigricante: tum verò herbe est mœsis, quæ collecta in canistris, aliisque rebus, ad exsiccandum reponitur vt meliùs conseruari & in alias partes transferri queat: nam è montibus in alios montes defertur mercimonij gratia, proque aliis mercibus commutatur, vestibus, gregibus, sale, & aliis rebus, quia illis pro pecunia est. Reconditur semen in Mastiche, atque inde exemptum alibi feritur in terra bene culta, per suos ordines & series, vt apud nos Fabæ, aut Pisi. *Opus:* Vulgaris est eius vsus inter Indos ad multas res, tum ad eas quæ ad iter necessariæ sunt, tum quæ ad voluptatem in suis ædibus feruiunt, hoc modo. Conchylia, aut ostreorum conchas vniunt, & calcis modo comminuunt: folia deinde Cocæ dentibus atterunt, & subinde puluerem illum Conchyliorum vstorum admiscunt, & simul quasi fermentant, vt ramen minor sit calcis quàm foliorum quantitas: ex hac massa trochiscos, seu or

seu orbiculos conficiunt, & siccandos exponunt. Quando iis vti volunt, vnum orbiculum in ore sumunt, eumque exugunt, subinde in ore nunc hac, nunc illac versantes, & quamdiu possunt retinentes, vno absumpto alium sumunt, deinde tertium, sic pergentes toto tempore quo iis in longis itineribus conficiendis opus habent, præsertim si per loca fiant, vbi nulla, aut cibi, aut aquæ copia est, quoniam horum orbiculorum sorbitione, famē, sitimque sibi leuari, & vires sustentari asserunt. Si duntaxat voluptatis gratia vti volunt, solam Cocam mandunt, eamque in ore versant, donec omnis facultas absumpta sit, deinde aliam sumunt. At si inebriari, aut aliquantulum extra se rapi, & veluti mente alienari, Cocæ Tabaci folia admiscunt, atque simul mandunt & sorbent: ea ratione extra se feruntur veluti homines ebrii, magnam voluptatem inde capientes. Et profectò res admiratione non caret, inquit, conspicere quàm isti Indi oblectentur mente & sensu quasi priuari, quandoquidem eius rei gratia Cocam cum Tabaco sumant, aut solum Tabacum, vt in secundo huius Historiæ libro de Tabaco diximus. Hæc Monardes. Sed & Benzo lib. 3. cap. 20. Cocæ in hanc sententiâ meminit, Peregrinè profecturi (de Peruanis loquitur) rubro quodam bitumine faciem oblinunt, herbamque ore clausam (Cocam ipsi appellant) velut panchrestum quoddam pharmacum circumferunt. Quippe eius præsidio freri, integrum diem, nullius nec cibi, nec potus egentes iter faciunt. Atque hoc quidem herbæ genus, earum rerum, quibus mercaturam exercent, præcipuum est.

TVBULI AD ASTHMA VTILES.

CAP.

CLVI.



QUAE DE Tubulis quoque ad asthma vtilibus, qui ex Hispaniola adferuntur, narrat eodem lib. simpl. medic. 3. Monardes, nullius melius quàm ipsius verbis, vt ea Clusius interpretatus est, intelligere potes. Aduchuntur è noua, inquit, Hispania Tubuli quidam Cannarum, interiore & exteriore parte quodam gummi illiti, quod meo iudicio Tabaci succo infectum est, & caput tentat: eo, ni fallor, cannam inungunt, vtq; tenax est, hinc ter inhaeret, colorisq; nigri est, induratum autem non est tenax; incenditur Tubulus ea parte qua bitumen est, altera verò in ore sumitur, fumusque excipitur, qui omnem pituitatem & purulentos humores è pectore educit: eo verò vtuntur cum asthma se premi & veluti suffocari sentiunt. Primatem quandam, qui sæpius asthma laborat, eius vsu plurimum vtilitatis consequutum obseruauit: simile commodum ante ex Tabaci fumo percipere solebat: propterea aio Tabaci succum admixtum esse oportere: turum autem vtriusque esse vsum ipsa experientia in multis docet. Nonnullos ægros & asthma vexatos ex India redeûtes obseruauit Tabaci folia viuidia mandentes, & succum inde promanantem sorbentes ad purulentas materias expellendas, qui licet inebriarentur, plurimam tamen vilitatem sensisse apparebat cum ad pus, tum ad pituitam pectori inhaerentem propellendam. Mirum est quàm insignes & variæ Tabaci facultates singulis adhuc diebus deteguntur: nam præter eas, quas secundo libro descripsi, tantumdem adhuc proferre possem, quas postea & referentibus aliis intellexi, & ipse obseruauit.



INDEX HISTORIÆ PLANTARVM LOCVPLETISSIMVS, LATINVS, GRÆCVS, ARABICVS, GALLICVS, ITALICVS, HISPANICVS, GERMANICVS, BELGICVS, BORMICVS, ANGLICVS:

Quo non arborum modò & fruticum, subfruticum, herbarum, radicum, corticùmque, verùm etiam fructuum, succorum, lacrymarum, oleorum, aliorumque id genus nomenclaturæ ordine alphabetico diligentissimè recensentur, appositis fideliter suo quoq; loco paginarum arithmeticis numeris: vt nullo labore summa eorù omnium capita, quæ fusè libris his totis xvi. explicantur inueniri possit.



A	BALZEMER	<i>Acacia</i> . 160. eis duo gene ra. <i>ibid.</i>	<i>Acerum ex malis.</i>	289	
	<i>Perfis, quæ</i>	<i>& 161. 162.</i>	<i>Achamæa Theruti.</i>	1904	
	<i>Scennæ vul</i>	<i>Acacia, omnis acrimonia prorsus</i>	<i>Achillea.</i>	772	
	<i>go. pag. 218</i>	<i>expers.</i>	<i>163.</i>	<i>Achillea montana, Pene.</i>	<i>ibid.</i>
	<i>Abbel, Sabi</i>	<i>Acacia vera iurebat. <i>ibid.</i></i>	<i>Achillea fideriti, Matth.</i>	<i>ibid.</i>	
	<i>ne aut gene</i>	<i>Acacia.</i>	<i>Achillea fideritis Dioscor.</i>	1278	
	<i>ra ipsi fructus est, non luni-</i>	<i>Acacia Plinij.</i>	<i>Achra.</i>	308	
	<i>peri.</i>	<i>1846</i>	<i>Acidala.</i>	602	
		<i>Acanthice Maltiche.</i>	<i>Acilact Græcis hodie quid.</i>	2426	
		<i>184</i>	<i>Acinus quid.</i>	398	
<i>Abies.</i>	53	<i>Acanthus.</i>	<i>171</i>	<i>Acinus. 919. Matth.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Abietis album, <i>ibid.</i></i>	94	<i>Acanthium.</i>	1445. Matth. 1446	<i>Acinus, sine Clamepodium silue-</i>	<i>ibid.</i>
<i>Abietis lacryma.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Acanthium montanum Dale.</i>	<i>champy.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Abies unde dicta.</i>	1161	<i>ibid.</i>	<i>Achamithum Spine alba alterum</i>		
<i>Abrotanum odoratum humile,</i>		<i>genus.</i>	<i>1462</i>	<i>Aconitum.</i>	1712
<i>Labellij 939. Inderum, eius-</i>	<i>ibid.</i>	<i>Acanthium spina alba sylacitru,</i>	<i>Fuchsy.</i>	<i>Aconitum aliud, Dalech.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Abrotanum.</i>	936. <i>femina &</i>	<i>Acanthus.</i>	1442. 1443	<i>Aconitum candidum <i>ibid.</i></i>	<i>ibid.</i>
<i>& mas, Matth. 937. femina</i>		<i>Acanthus sativus Matth.</i>	1443	<i>Aconitum lycallanum 11. & 111.</i>	
<i>& mas, Dodonæi.</i>	938	<i>Acanthus sylacitru, Carduus</i>	<i>pratensis, Tragi.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Abrotanum femina Fuchsy, Ab-</i>		<i>Acanthus sylacitru Dalech.</i>	1444	<i>Aconitum v. v. 1. v. 11. Matth. ibi.</i>	
<i>sinthium Ponticu Dodon.</i>	945	<i>Acinus quid.</i>	1453	<i>Aconitum v. 111. & 1x. Mat. 1741</i>	
<i>Abfinthium.</i>	940	<i>Acarna, Carlina sylacitru minor,</i>	<i>Clasy.</i>	<i>1484</i>	
<i>Abfinthium vulgare. 943. Pen-</i>		<i>Acarna Therophrasti, Anguillare,</i>	<i>Labellij.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>ticum, Matth. ibid. Ponticum</i>		<i>Acarna Valerandi altera.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Aconitis lycallani genus aliud, Da-</i>	<i>1744</i>
<i>Tridactylum, Herbariorum,</i>		<i>Acer, vel Aceris, & eum genera.</i>	94. & 95	<i>letham.</i>	1744
<i>Labell. ibid. Scriphtum seu</i>		<i>Acer album.</i>	210	<i>Aconitum monacoccon Cordi 1312</i>	
<i>marinum, Matth. ibid. Scrip-</i>		<i>Aceris radix.</i>	210	<i>Aconitum pardalanchet Diosco-</i>	<i>1312</i>
<i>htium Aegyptium, Matth. 944</i>		<i>Acetabulum.</i>	1608	<i>ridis, Fuchsy.</i>	1312
<i>Scriphtum Dodonæi. ibidem.</i>		<i>Acetabulum a'cerum.</i>	1312	<i>Aconitum pardalanchet Dod.</i>	1203
<i>Scriphtum veru, Pene & Lob.</i>		<i>Acetosa Officinarium.</i>	605	<i>ibid.</i>	1735
<i>ibid Ponticum Dodonæi 945.</i>		<i>Acetosa rotunda vulgi.</i>	601	<i>Aconitum pardalanchet minor,</i>	
<i>arborescens, Lob. 946. album</i>				<i>Matth.</i>	1737
<i>capitulis scabri, eiusdem. ibi.</i>					
<i>anaphisillum Dodo. ibid.</i>					
<i>Abrotanum succinea.</i>	932				

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Aconitum pardalianches</i> Plinij.		<i>Aglis.</i>	1909	<i>Aleca vulgaris</i> L. herb.	1191
<i>ibid.</i>		<i>Aglaphotis.</i>	815	<i>Alchymilla.</i>	1171
<i>Aconitum pardalianches</i> Theophrast. ex Matth.	1618	<i>Agnam quidem esse cerasent. v. Theophr.</i>	111	<i>Alchymilla.</i>	1181
<i>Aconitum naxa.</i>	1744	<i>Agnus Castus officinarum.</i>	280	<i>Alchymilla.</i>	1191
<i>Aceps.</i>	105	<i>Agnus Scythicus. Barometz.</i>	1849	<i>Alchymilla.</i>	1200. 1201
<i>Aconitum & Aconitum.</i>	1617	<i>Agræstia omnia propemodum sui generis domestica valentiora sunt.</i>	530	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aconitum verum. Matthioli.</i>	1618	<i>Agræstia omnia hortensibus actiora & succiora.</i>	1544	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aconitum cum flore Robini, regis Francorum Herbarij.</i>	1618	<i>Agræstia.</i>	1480	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aconitum luteum falsum. Matthioli.</i>	1619	<i>Agrimonia officinarum.</i>	46. 146	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aconitum veri radices perperam necne in officinas pro Calamo versutæ.</i>	1889	<i>Agrimonia officinarum.</i>	1251	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aconitum radix.</i>	1891	<i>Agrion officinarum.</i>	665	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aconitum.</i>	1485. Theophr. <i>ibid.</i>	<i>Abrus. 1843. 2 beati, ex Clusio.</i>	1844	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aitæa Plinij, Ebulus nec ne sit.</i>	269	<i>Abrus.</i>	1128	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aitæa.</i>	712	<i>Abrus sen 4 biga.</i>	1159	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aitæa.</i>	1473	<i>Abrus adulterina Clusij.</i>	1161	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aitæa 1480. Aitæa.</i>	1435	<i>Abrus, Iouis Barba officinarum.</i>	1161	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aitæa.</i>	447	<i>Abrus 1128.</i>		<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aitæa muscata.</i>	1275. 277	<i>Abrus dasyphyllum, Dalechampi.</i>	1121	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aitæa passoris.</i>	7 2	<i>Abrus minus, sine Sempernium minus Dodonæi.</i>	1 29	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aitæa passoris.</i>	1275. 1277	<i>Abrus minus, sine Sempernium Dodonæi.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Adiantum.</i>	999	<i>Abrus minus Matthioli idem cum proximo.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Adiantum Palma in Aegypto.</i>	365	<i>Abrus minus semina Fuchij.</i>		<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Adiantum fructus immaturus.</i>	366	<i>Crasula minor sen Vermiculata.</i>	1130	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Adiantum flos.</i>	841	<i>Abrus minimum repens, tertium Diastiridis.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Adiantum sine Anthemidis, Matthei.</i>	970	<i>Abrus Telephium Dalechampi.</i>	1 31	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Adiantum.</i>	374 375	<i>Abrus montanum.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aegilops.</i>	10. 403. 405	<i>Abrus arborescens. ibid. Matthioli.</i>		<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aegilops Dodonæi.</i>	406	<i>Abrus maritimum.</i>	1386	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aegilops Idæorum.</i>	3 6 6	<i>Abrus vulgo hodierni Græcorum.</i>	1693	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aegilops Labellij & Pennæ.</i>	406	<i>Alabasterites.</i>	1256	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aegilops secunda Matthioli radii & folijs diversa. ibid.</i>		<i>Alabasterites altera.</i>	1140	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aegilops Plinij.</i>	1625	<i>Alacernus Clusij.</i>	138 159	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aitæa.</i>	416 417	<i>Alba spina.</i>	119	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aitæa.</i>	1480	<i>Albacum sine Albicinis.</i>	1588	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aitæa.</i>	1305	<i>Albacum Plinio quid.</i>	2 6	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Aitæa Officinæ.</i>	1588	<i>Albus spinus.</i>	114. 115	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Agallochum.</i>	1769. 1 sine Xylalac.	<i>Albanna officinarum. 232. quoniam illa arbor sit.</i>	25	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Agallochum verum officinis ignotum.</i>	1770	<i>Albanna radices officinarum. 1:00</i>		<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Agaricum.</i>	11	<i>Alca.</i>	591	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Agaricus 1701. vel Agaricum.</i>		<i>Alca Matthioli.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Agaricus Matthioli.</i>	1704	<i>Alca Officinæ.</i>	457	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Agaricum.</i>	777	<i>Alca peregrina folio sequa.</i>	595	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Agaricum secundum & tertium. Matthioli.</i>	778	<i>Alca Veneta Dodonæi.</i>	594	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Agaricum aliud quorundam. ibid.</i>		<i>Alca versuaria.</i>	595	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Agaricum Dalech.</i>	1184	<i>Alca villosa. ibid. Dalechampi.</i>	594	<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Agaricum Fernacellum Dalech. ibid.</i>				<i>Alchymilla.</i>	1204
<i>Agaricum purpureum Dalech. ibid.</i>				<i>Alchymilla.</i>	1204

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Alfue repens</i> , Clusij.	1419	<i>Ameos Officinarium.</i>	694	<i>111.1111. eiusdem.</i>	843
<i>Alfue verna.</i>	1214	<i>Amerumnan.</i>	1128	<i>Anemone V. Matthioli.</i>	844
<i>Althea.</i>	589	<i>Amerina felix.</i>	274	<i>Anemone hortenſis Trazi.</i>	ibid.
<i>Althea altera Matthioli.</i>	592	<i>Amerina duplex.</i>	278	<i>Anemone I Dodon. Jatsſel. l. 1.</i>	10-
<i>Althea arborea Lobelij.</i>	191	<i>Amni.</i>	694	<i>bel. & Clus.</i>	845
<i>Althea frutes. Clusij.</i>	ibid.	<i>Amni Fuchſij.</i>	695	<i>An mone II. Dod. tenuſol. III.</i>	111.
<i>Althea lignoſa Dalechampij.</i>	592	<i>Amni Matthioli.</i>	ibid.	<i>Clus. ſine Gegamiſolia, Lobel.</i>	ibid.
<i>Althea paluſtris. Pena.</i>	102	<i>Amni vulgare.</i>	416	<i>ibid.</i>	
<i>Althea Threſorati.</i>	592	<i>Amomum.</i>	1813	<i>Anemone III. Dod. anguſtiſo-</i>	lia, Clusij.
<i>Alterum. ſine Altercaneum</i>		<i>Amomum & Amomis.</i>	1814	<i>ibid.</i>	846
<i>Arabum.</i>	1716	<i>Amomum Plinij.</i>	600	<i>Anemone latifolia prima, Clusij.</i>	ibid.
<i>Alum. ſen Alus.</i>	1074	<i>Ampelopraſum Matthioli.</i>	1543	<i>Anemone I I I I. Dodon. morli-</i>	plex rubra Clusij.
<i>Alum.</i>	1174	<i>Ampelopraſum ſine Petrum ſil-</i>		<i>ibid.</i>	
<i>Alumen catinum.</i>	1378	<i>utire Lobelij.</i>	1544	<i>Anemone V. & V I. Dodon.</i>	847
<i>Alupum & Alupia.</i>	1680	<i>Ampelos agria.</i>	1414	<i>Anemone v'riſolia flore multipli-</i>	ci, Clusij.
<i>Alupum Matthioli.</i>	ibid.	<i>Amurca.</i>	146	<i>ibid.</i>	
<i>Alupum Pena. Herba terribilis</i>		<i>Amygdala ex amaris & dulces</i>		<i>Anemone triſolia, Dodonai.</i>	ibid.
<i>Narbonenſis.</i>	ibid.	<i>ſunt.</i>	316	<i>Anemone tenuſolia flore multi-</i>	plici, Clusij.
<i>Aluſſon quorundam, Cyriſi facie.</i>	264	<i>Amygdala preſumpta ebrietas</i>		<i>ibid.</i>	848
<i>Aluſſum. 1141. Dodonaj.</i>	ibid.	<i>prohibent.</i>	318	<i>Anemone, ſiſi xemi.</i>	970.
<i>Dalecham. ibid. Matth. 1142.</i>		<i>Amygdalum duo genera.</i>	316	<i>Anemone corniculata maior Pe-</i>	na. 1713. 714. minor cluſ. ibid.
<i>minus Dalechamp.</i>	ibid.	<i>Amygdalarum facultates.</i>	317	<i>Anemone Ga eni latea lib. 2. non</i>	vixit an eadem ſit germanica.
<i>Aluſſum teſtorum. perperam.</i>	1181	<i>Amygdalus.</i>	316	<i>1715</i>	
<i>Aluſſum Germanicum Echoides</i>		<i>Amygdalus prima omnium flo-</i>	317	<i>Anethum.</i>	693
<i>Lobelij.</i>	1143	<i>res.</i>	317	<i>Angelica.</i>	714
<i>Aluſſum Trigonum Dalechamp-</i>	ibid.	<i>Amilum & Siligine.</i>	375	<i>Angelica fatina Matthioli.</i>	ibid.
<i>py.</i>	ibid.	<i>Anacardium.</i>	1764	<i>Angelica ſilueſtris Fuchſij.</i>	718
<i>Amaraculides.</i>	99	<i>Anagallis.</i>	1216	<i>Angelica ſilueſtris I edon. ibid.</i>	
<i>Amaracus.</i>	881	<i>Anagallis aquatica 1090. Dodo-</i>		<i>Angelica ſilueſtris I edon. ibid.</i>	
<i>Amaracus ſine Maiorani, Ma-</i>		<i>nei. ibid. altera Lobelij. ibid.</i>		<i>Angelica ſilueſtris Matthioli.</i>	ibid.
<i>thioli. 881. tenuſolia, eiufd.</i>	ibid.	<i>Anagallis aquatica Dodon. 1146.</i>		<i>ibid.</i>	
<i>Amaracus Fuchſij.</i>	ibid.	<i>Anagallis mas.</i>	126	<i>Angina Lini.</i>	1683
<i>Amaro dulcis.</i>	1138	<i>Anagallis ſarina.</i>	1217	<i>Anguria.</i>	619. 620
<i>Amaro dulcis.</i>	1413	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Anguria, Citrulus Officinarius.</i>	615
<i>Amarago.</i>	561	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Anime.</i>	1791
<i>Amarantus.</i>	870	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Aniſum.</i>	622
<i>Amarantus anguſtiſolus, Lobel-</i>	ibid.	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Anolis.</i>	447
<i>ij.</i>	871	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Anonymus.</i>	993
<i>Amarantus holoſericus, Lobel.</i>	ibid.	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Anonymus.</i>	170
<i>ibid.</i>		<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Ancon.</i>	264
<i>Amarantus lateus.</i>	779	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Antenphorbium, 1690. Dodonai.</i>	1692
<i>Amarantus purpureus Matthioli.</i>	ibid.	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Anthemides.</i>	968
<i>ibid.</i>	871	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Anthemis chryſanthemos Dodo-</i>	nai. 969. Pena & Lobel. ibid.
<i>Amarantus tricolor.</i>	540	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Anthemis eranthemos, Dodonai.</i>	970. Dalechampij.
<i>Amarina.</i>	133	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>ibid.</i>	971
<i>Amba & Amba.</i>	1870	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Anthemis eranthemos ſine Con-</i>	ſulida regalis Fuchſij.
<i>Ambare, Acoſta.</i>	1874	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>ibid.</i>	970
<i>Ambulij in Gazarate quid.</i>	1689	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Anthemis leucanthemos. Mat-</i>	thioli.
<i>Amblatum Cordij.</i>	1196	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>ibid.</i>	969
<i>Ambroſia.</i>	1118	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Antemius leucanth. ninea An-</i>	glorum flore multiplica.
<i>Ambroſia.</i>	1147	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Antemium ſiliſum.</i>	438
<i>Ambroſia prima, Matth.</i>	1148	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Antemius Meſſulus.</i>	198
<i>Ambroſia altera Matth. ibid.</i>		<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Antheram qui ſores Roſarum ap-</i>	pellant, errant.
<i>Ambroſia hortenſis procerius, Lo-</i>	ibid.	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>ibid.</i>	126
<i>belij.</i>	ibid.	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>		<i>Anthericus.</i>	1588
<i>Ambroſia montana Dalechampij</i>	ibid.	<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>			
<i>ibid.</i>		<i>Anagallis latea Lobelij. ibid.</i>			
<i>Ambrosia.</i>	555-556	<i>Anemone</i>	841		
<i>Ambrosia.</i>	1838	<i>Anemone I. A. Matthioli. 842. I I.</i>			

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Anthora.</i>	1747	<i>Apium, & Apium hortense, aut</i>	<i>Artemisia prima vulgaris.</i>	950
<i>Anthora, sine Anthora Matth.</i>		<i>sativum.</i>	<i>Leptophyllis maritima.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Napellum Majis.</i>	1748	<i>Apium montanum.</i>	<i>sericea Leptophyllis, Penn.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Anthoxanthos.</i>	603	<i>Apium montanum Dalech.</i>	<i>Menclonius alia.</i>	951. <i>Men-</i>
<i>Anthracum, Plinij.</i>	791	<i>Apium palustre, Fuchsg.</i>	<i>clonius quorundam, alii du-</i>	<i>broscia, ibid. Martia, Lob.</i>
<i>Anthriscus.</i>	1148	<i>Apium palustre, Matth.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Anthriscus. 1180. Plinius Anthriscus,</i>		<i>Apium risus, seu Apium silvestre.</i>	<i>Artemisia Tragentes, aut Tag-</i>	
<i>aliquodem referente Anticel-</i>		<i>1028. 1029. 1032. & 1036.</i>	<i>tes.</i>	955
<i>lus.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Apium saxatile.</i>	<i>Articocum. 1436. Articocum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Anthriscus clanculosus.</i>	492	<i>Apium silvestre, Dalech.</i>	<i>Arum.</i>	1196
<i>Anthriscus II. Herbariorum.</i>	1149	<i>Apium silvestre, Dodonai.</i>	<i>Arum Egyptianum cum flore,</i>	
<i>Anthriscus altera Italorum, Lo-</i>		<i>Apocynum.</i>	<i>Micans.</i>	1198
<i>bellij.</i>	1150	<i>Apocynum Matth. 1731. repens,</i>	<i>Arum, Matthioli. 1597. alind mi-</i>	
<i>Anthriscus maior.</i>	509	<i>cusidem.</i>	<i>nus, eiusdem.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Anthriscus marina Narbonensis,</i>		<i>Apollinum Euboeicum.</i>	<i>Arundo.</i>	985
<i>Alfonsi folio, Penn.</i>	1181	<i>Apollinaris.</i>	<i>Arundo domestica Matthioli.</i>	999
<i>Anthriscus marina altera Narbon-</i>		<i>Apronia vertic.</i>	<i>vallasteria, Dodonai. 1000. pa-</i>	
<i>Penn.</i>	1182	<i>Aprona Punicia.</i>	<i>lustris Matthi. ibid. cygosa.</i>	
<i>Anthriscus montana.</i>	1150	<i>Aqua ex Lignis floribus.</i>	<i>ibid. minima.</i>	1101
<i>Anthriscus Perihandia lentifolia,</i>		<i>Aqua ex Sambuci floribus.</i>	<i>Arundo seu Canna Indica, Cla-</i>	
<i>Penn.</i>	1181	<i>Aquifolium.</i>	<i>vis, ibid. Dalechampii.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Anthriscus prior Dodonai.</i>	1180	<i>Aquilegia sine Aquilina.</i>	<i>Arundo saccharifera.</i>	1002
<i>altera, eiusdem.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Aquilina minor, Dalech.</i>	<i>Asa foetida cinerum.</i>	711
<i>Anthriscus Valentina, Clus.</i>	1181	<i>Aquilina plenius & multis flori-</i>	<i>Asa foetida magnus apud Indas</i>	
<i>Anethicon Sefameides.</i>	1668	<i>bus, Lob.</i>	<i>visas.</i>	719
<i>Anticiccon elieborus.</i>	1669	<i>Arabis seu Arabis, sine Draba.</i>	<i>Asarina, Matthioli. 915. Lobelij.</i>	
<i>Antipathes, sine coralium pi-</i>		<i>Arabis, seu Draba, Dodon. seu</i>	<i>ibid.</i>	
<i>grum.</i>	1176	<i>Thibasis Creticum.</i>	<i>Asarum 913. Matthioli.</i>	914
<i>Antirrhinum.</i>	1319	<i>Arabi, seu Draba, Matth. ibid.</i>	<i>Asarum muri.</i>	1134
<i>Antirrhinum magnum Dodona-</i>		<i>Asarum cum flore Micani, an-</i>	<i>Ascalia.</i>	1440
<i>nei.</i>	1341	<i>gustifolium.</i>	<i>Asclepias 1144. Asclepias nigra</i>	
<i>Antirrhinum parvum Dodonai,</i>		<i>Arilla quid.</i>	<i>Dalechampii.</i>	1245
<i>sine Oramum.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Arilla haec.</i>	<i>Asyrum, Asyrum, Asystander,</i>	
<i>Antirrhinum Matth.</i>	1340	<i>Arillida quæ, & cur dista.</i>	<i>1151.</i>	
<i>Antirrhinum II. & III. Matth.</i>		<i>Arillolechna, Arillolechia Offici-</i>	<i>Aspalathus.</i>	1185
<i>ibid. III. eiusdem.</i>	1341	<i>narum.</i>	<i>Aspalathus I. Monstefolium.</i>	
<i>Antirrhinum Tragi.</i>	1342	<i>Arillolechia fumina sine rotun-</i>	<i>1281</i>	
<i>S. Antony herba.</i>	1316	<i>da.</i>	<i>Aspalathus II. Hispanis, quibus-</i>	
<i>Aspargia.</i>	562	<i>Arillolechia longa Matth. Clemati-</i>	<i>dam alter scorpionis.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Aspargia Dalech. Heracium ma-</i>		<i>sum, Penn. & Lob.</i>	<i>Asperagus.</i>	1109
<i>nus primum Dodon.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Arillolechia rotunda Dod. & Cla-</i>	<i>Asperagus spongium in radice</i>	
<i>Asparin.</i>	1330	<i>vis, 976. longiorundem.</i>	<i>habet.</i>	620
<i>Asparin Pl. n.</i>	1142	<i>longa Fuch. ibid. Sarracenia</i>	<i>Asperagi marini species quoru-</i>	
<i>Asper Dalech.</i>	561	<i>Dod. Clematis prior, Clus. ib.</i>	<i>dam.</i>	1295
<i>Aphaca.</i>	478	<i>Clematis Dodon.</i>	<i>Asperagus sativus.</i>	610
<i>Aphaca vera, Vicia Matth. ibid.</i>		<i>Arifol. hiarotunda quorundem</i>	<i>Asperagus sylvestris Matthioli</i>	
<i>Aphaca Dalechampii.</i>	562	<i>herbariorum.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Apharca.</i>	158	<i>Armeria.</i>	<i>Asperagus sylvestris & peten-</i>	
<i>Apharca quare Plinius non me-</i>		<i>Armeria Veronica coronaria. ibi.</i>	<i>1473</i>	
<i>minert.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Armeria prima Dodonai, sine Ca-</i>	<i>Asperu acaralea, Lobelij.</i>	870
<i>Aphrocorodon.</i>	1525	<i>ryphyllum minor sylvestris, Lo-</i>	<i>Asperula Dodonai, sine Asper-</i>	
<i>Aphyllanthus. 864. primum, se-</i>		<i>bellij.</i>	<i>gula.</i>	<i>ibid.</i>
<i>cundum, tertium.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Armeria secunda sine sylvestris,</i>	<i>Asphalicon.</i>	525
<i>Apiana Brasica.</i>	319. 123	<i>Dodonai.</i>	<i>Asphodelus.</i>	1188
<i>Apiana recentissimum quorundam.</i>		<i>Armeria, sine Armeria.</i>	<i>Asphodelus bulbosus, Galeni.</i>	1189
<i>1430</i>		<i>Arnebo Pauli.</i>	<i>Asphodelus luteus, Dodon.</i>	1190
<i>Apialtrum.</i>	957. 1027. 1037	<i>Arneboffum.</i>	<i>Asphodelus luteus minor, Lob.</i>	
<i>Appurcus & temperam.</i>	704	<i>Arrethobon herbariorum.</i>	<i>Asphodelus minor, Dod. & Cla-</i>	
<i>Apus istius.</i>	618	<i>Artemisia.</i>	<i>vis.</i>	1189
<i>Apus. 129. Matthioli.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Artemisia cinerea.</i>	<i>Asphodelus palustris.</i>	993
<i>Fuchsg.</i>	1396	<i>Artemisia factida.</i>	<i>Asplenium.</i>	1125

Asplenium

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Afflenum majus, & *filiofre*
quorundam 121
Afflenum filiofre 115
Afflu Macedonia. 3. & 6
Alder Atticu. 859. *Matthio* 171
 & aliter. 860
Affer Atticu *supinus*, *Clasj.*
 861
Affer *Comzoides*, *G. fueri*. *ibid.*
Affer *luteus*. 1349
Affer *luteus*, *sine* *Oculus* *Christi*
minor. 1135
Affer *luteus*, *alter* *Oculus* *hrii*
minor. *ibid.*
Affer *montani* *birfatus*, *Pena.*
ibid.
Affer *montani*, *ibid* *luteus* 1134
Affer *non* *Atticus* *Tragi* 1312
Affleris *sine* *Stellaria*, *Dalecham*
py. 184
Afragaloides *Lobellj.* 488 489
Afragalus. 1346
Afragalus *ferti* *Clasj.* 1348
Afragalus *Matthioli*. 1247
Afragalus *purpureus*. *ibid.*
Afragalus *quorundam*. 1595
Afragalus *Syracus* *Lobellj* 1248
Afrantia *nigra*. 1218
Afrantia *nigra* *Gesneri*. 1636
Ahyllis, *vel* *Alhyru*, *Lachia* 1545
Afur. 1687
Affa. 1237
Athanasia. 915
Athanasia *fen* *Tanaceti*, *Matth.*
ibid.
Athanasia *alencanibemos*. 1147
Atinia *f. lmi*. 80
Atrachylis. 1467. 1468
Atrachylis *flore* *purpurea*. *ibid.*
Atrachylis *marina* *Pyncocemon*
Pena. *ibid.*
Arabis *fen* *Draba* *altera*, *Pena* &
Lobellj. *ibid.*
Arathus. 479 480
Araxis *Galen.* 411
Arantia. 1838
Arantia *sine* *Arantia* *mala*, *non*
fuit *Cestiana*. 288
Arantia *sine* *Arantia* *Poma*. 301
 302
Arbor *Brachy.* 1846
Arbor *farinifera*. 1855
Arbor *farinifera* *panis* *fragmē*
ta. 1856
Arbor *finium* *regundorum*. 1824
Arbor *filiis* *ambulantibus*. 1850
Arbor *G. h. pb.* 184. 1842
Arbor *lutea*. 116. 220
Arbor *in* *Indi* *con.* 1818
Arbor *Noni* *arbu*, *ex* *qua* *Balsa-*
mum. 1775

Arbor *Paradisaa*. 110
Arbor *Syraca*, *Lotos* 148
 1812
Arbor *tanforia*. 1812
Arbor *tristis* 1851. *Acrota*. 1812
Arbor *vita*, *Thmia* *genus*. 60
Arbores *caritae* *in* *orbem* *decallo*
necantur, *exceptio* *Tabern.* 13
Arbores *insolutes* *qua* *dicanur*.
 180
Arbores *peculiares* *habes* *Syria*.
 315
Arbores *sterilis* *aliquos*. 80
Arbores *filiofre* *quibus* *sola* *no*
decidunt. 41
Arbores *venenata*. 1814
Arboris *cortex* *ad* *thumaisifens*
utilis. 1875
Arboris *tristis* *rami* *cum* *flore* &
fru *tu*, *Clasj.* 1812
Arborem *ex* *fariculis* *tanca* *ana*
liferis. 1397 1148
Arborem *variari* *in* *materia* *du*
turni *as*. 14
Archangelis *a* 1246. *Arbunus*. 155
Archangelica *radona*. 76
Archamia *Herbariorum*. 1604
Archuellion 1101
Arctium & *Arctio* *alterum* 1014
Arctium. 1306
Arctium *quorundam* *Dalecham-*
pij 1107
Arctium *Dodonai* *ex* *radice* *Cafa*
res. 1307
Arctium. 1306. 1307
Arca *sine* *Faufel*, *Clasj.* 1766
Arca *Palma* *scriptoria*, *Tal*, *ar-*
bor *maximus* *solum*. 1849
Argemone *fen* *Argemone*. 440
Argemone *capitulo* *longiore*. 440
Argemone *minor*, *capitulis* *bre-*
uioribus. 440
Argentina. 1047. 1064
Arinca. 375 389
Arisarum 1599 *prims* & *alterum*
Matthioli. *ibid.*
Atrachylis *quorundam*. 1450
Atrachylis *quorundam* *Matthio-*
li. 1268
Atragana *Theophrasti*. 1408
Atramenti *Scriptoris* *optimi* *con-*
fiscndis *ratio*. 1617
Atriplex, *Fillo* *Atriplexum*. 535
Atriplex *Hispantensis*. 143
Atriplex *marina* *f. l.* 537. 532
Atriplex *farina*. 335
Atriplex *filiofre* *l. Matthioli*,
prima *editionis*. 535. 126
Atriplex *filiofre* *l. Matthioli*,
l. polygona *filiis* *secunda* *editio-*
nis. *ibid.*
Atriplex *filiofre* *l. l.* *ibid.*

Atriplex *filiofre* *l. l.* *ibid.*
Aureana *indica* 1766. *Matthio*
li. 1767
Aureana. 319
Aureana *cathartica*. 1719
Aureana *cucis* *in* *us*. 10
Aureana *omnibus* *non* *idem* *sa-*
por. 39
Aurea. 403
Aurea *herba*. 404
Auslingua *officini* *semen* *Fra-*
xini *dicitur*. 85
Auricula *leporis*. 416 740
Auri *u'a* *maris* 112. 117. *Mat-*
thioli *ibid* *al* *era*, *Dodon* *ibid.*
Auricula *maris* *Tragi*. 365
Aurum *a* *175*, *Myani*. 817
Aufar. 1627
 R
Baccharis *radix*. 129
Bacchar, *Baccarus*, *Baccaris*
Officinarum 913
Baccharis 914 *Matthioli*. *ibid.*
Baccharis *Antonjelenium*, *any*
z. *maior* *Antonjoli* 917
Baccharis *officinarum* & *Mat-*
thioli *qu.* 1045
Baccifera *arbores*. 15
Balani. 364
Ba *antist* *ca* *Tanea*. 31
Balanus *terrestris*. 1347
Balanus *Myrteifera*. 366
Balanifolium *quid*. 304. *cim* *gene-*
ra *ibid.* *vires*. 305
Ballaria. 814
Ballota. 1152
Ballota *crispa*. *ibid.*
Ballota *crispa* *maior*. *ibid.*
Ballota *Matthioli*. *ibid.*
Balsamin *sine* *Balsamina*. 629.
 & 1277
Balsamina *cucumerina* *punicea*,
 629
Balsamina *Furbsj.* 631
Balsamina *Matth.* 610
Balsamine *officinarum*. 676
Balsaminum *fen* *Balsamina* *far-*
mina, *Matthioli*. 60
Balsamina 677
Balsamina *Dodonai*. 678
Balsaminifolium. 1775
Balsamo *fructu*. 1819
Balsamum. 1770
Balsamum *Alpinum*. 170
Balsamum *crispum*, *Lobellj* 672
Balsamum *indianum* *sine* *Oculi*
dale. 1773 1774
Balsamum *italicum* *uligine*. 192
Balsamum *nonum*. 1775
Balsam *Clasj.* 190. 1510
Balm. 767

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Zangue.</i>	194	<i>Betula vel Betulla.</i>	91	<i>Brassica rubra</i> aliquot speciei. 133
<i>Baptisecula.</i>	436	<i>Bifolium</i> sive <i>Ophrys</i> Pliny. 1260		<i>Brassica sativa alba vulgaris</i> , sive <i>sativa</i> . 120
<i>Barbacastra.</i>	1080	<i>Bipinnella</i> seu <i>Bipennula</i> . 1087		<i>Brassica sativa</i> genera 120. 121.
<i>Barba hirci.</i>	1078	<i>Bislangna.</i>	108	122. 123. 124
<i>Barbarea.</i>	610	<i>Bismalme officinarum.</i>	190	<i>Brassica siluestris.</i>
<i>Barbarea, vulgi.</i>	1094	<i>Bistorta</i> , 1235. <i>N. ashioli</i> ibid. maior. ibid.		<i>Brassica siluestris</i> duo speciei <i>Cer-</i>
<i>Barberia.</i>	806	<i>Bistorta</i> quorundam falsi. 1082		di. 125
<i>Bardana minor.</i>	1036	<i>Blapsifecula</i> . 436. <i>Blataria</i> . Matt.		<i>Brassica tenuifolia laciniata</i> 121.
<i>Basilia minor Gemma.</i>	1561	1305.		124
<i>Basilicum siluestre quorundam.</i>	912	<i>Blechnum.</i>	1122	<i>Brassica verticum</i> genus <i>Fuch</i> 124
<i>Bardana officinarum.</i>	1034	<i>Blitum.</i>	338	<i>Bria siluestris.</i>
<i>Batus.</i>	1909	<i>Blitum album minus.</i>	338	<i>Britannica</i> . 1081. <i>vera</i> , <i>Daler</i> . 132
<i>Batisfocle.</i>	436	<i>Blitum rubrum minus.</i>	339	<i>Britannica Diofcoridis.</i>
<i>Batrachium.</i>	875	<i>Blitum rubrum minus.</i>	ibid.	<i>Britannica Pliny.</i>
<i>Batrachium.</i>	1017	<i>Belbecastanum</i> 773. <i>mai</i> . <i>Trallian-</i>		<i>Briza.</i>
<i>Batrachium Apuley.</i>	1019. 1034	<i>ni</i> ibid. <i>femina</i> , <i>Dalechampy.</i>		<i>Broomus herba</i> <i>Lobelly</i> . 404. 405.
<i>Baucia officinarum.</i>	719	ibid.		<i>alutra sterilis</i> , <i>emfoc</i> . ibid.
<i>Bavama arbor.</i>	1834	<i>Belbecastanum grandium</i> , <i>Dodon-</i>		<i>Brunella.</i>
<i>Bellidium.</i>	1757. 1782	<i>nei</i> . <i>Bonum.</i>	774	<i>Brusabac.</i>
<i>Bellid fructus Cortusi.</i>	ibid.	<i>Bolleti quercu.</i>	10	<i>Brusum.</i>
<i>Bellid secundum genus.</i>	368	<i>Bombax officinar.</i>	121	<i>Brusum officinarum.</i>
<i>Bethon.</i>	1049. 1050	<i>Bonema.</i>	1841	<i>Brutes arbor.</i>
<i>Bethum.</i>	879	<i>Bonifacia.</i>	108	<i>Bryon.</i>
<i>Bedeget Seplesiariorum.</i>	127	<i>Bonus Henricus</i> planta. 602. <i>vi-</i>		<i>Bryonia.</i>
<i>Bethon album</i> . 1186. <i>rubrum</i> . ibid.		<i>res.</i>	608	<i>Bryonia & Bryonias</i> <i>Cela.</i>
<i>Bethon album Salmauinum.</i>	817	<i>Boramerz.</i>	1849	<i>Bryonia nigra.</i>
<i>Bethonrubrum seplesiarium, falsi.</i>	1014	<i>Boragus.</i>	362. 367	<i>Bryonia nigra</i> quorundam. 1425
		<i>Borda.</i>	1380	<i>Bubenium.</i>
<i>Bellitagi.</i>	1687	<i>Borrega</i> 578. <i>nostra</i> , <i>veterum</i> 68		<i>Bugla & Bugula.</i>
<i>Bellid 853. maior, Fuchij.</i>	ibid.	<i>Buglosium.</i>	ibid.	<i>Buglosia, & Buglossum</i>
<i>Bellid cernula Pena.</i>	815	<i>Borrajo minima</i> , <i>Herbariorum.</i>		<i>Buglossum Amarcicum.</i>
<i>Bellid lutea Dalechampy.</i>	1349	581		<i>Buglossum magnum</i> sive <i>italicu-</i>
<i>Bellid maior, media, minoris spec-</i>		<i>Betris.</i>	932. 1147. 1148	<i>sine Romanum.</i>
<i>ies tres</i> . <i>Matth.</i>	814	<i>Branca virgata.</i>	1443	<i>Buglosium minus</i> <i>sativa</i> <i>Dod.</i>
<i>Bellid siluestris minor.</i>	815	<i>Branca virgata aculeata</i> <i>Lobelly.</i>		<i>Buglossum minus siluestris</i> <i>Dul-</i>
<i>Ben album officinarum.</i>	683	1445		<i>nei.</i>
<i>Ben magnum & parum.</i>	1789	<i>Brassica</i> 518. <i>vnde dicta</i> ibid. <i>Bra-</i>		<i>Buglossum sepe viridis</i> , <i>Pena.</i>
<i>Benedicta.</i>	685	<i>sica agrestis</i> genera. 124. 125		<i>Buglossum siluestre.</i>
<i>Benzoin.</i>	1782	<i>Brassica curculionum</i> <i>sedet.</i> 129		<i>Buglossum sine</i> <i>Matth.</i>
<i>Berberis officinarum.</i>	134. 137	<i>Brassica alba cristata.</i>	120	<i>Buglossum vulgare.</i>
<i>Beroceta.</i>	297	<i>Brassica Asperagodes</i> <i>Dalechamp.</i>		<i>Bulapathum.</i>
<i>Beta.</i>	531. 1155. 1261	122		<i>Bullina.</i>
<i>Beta agrestis Lapsathum dicta postej.</i>	601	<i>Brassica canina.</i> 1 628. 1730.		<i>Bulline Pliny.</i>
<i>Beta candida.</i>	531. 532.	<i>Brassica campestris</i> <i>Clusij.</i> 525		<i>Bulbi proprie</i> qui dicuntur. 1308
<i>Beta erythrorrhizas Dodonci.</i>	532	<i>Brassica capitata albida.</i>	521	<i>Bulbi esculenti</i> genus <i>maius</i> <i>Dodon-</i>
	533	<i>Brassica capitata polycephalos.</i>		<i>donci</i> . <i>Huacanthus</i> <i>Manbony-</i>
<i>Beta nigra.</i>	532. 532	ibid.		<i>minus</i> <i>cinsid.</i>
<i>Beta narinosa & Dalecham</i>	532.	<i>Brassica cristata</i> <i>Tragi.</i> 523. 524		<i>Bulbonac seu Bulbonac officin-</i>
533		<i>Brassica marina</i> toto genere <i>dis-</i>		<i>rum.</i>
<i>Beta romana.</i>	531	<i>sert</i> a <i>Brassica</i> , nec aliud quod		<i>Bulbus.</i>
<i>Betarubra vulgarior</i> <i>Lobelly.</i>	532	<i>nomen commune habet.</i> 526		<i>Bulberis</i> genera multa sive <i>ma-</i>
<i>Betarubra Matthioli.</i>	533	<i>Brassica marina</i> , <i>Soldanella</i> <i>offi-</i>		<i>nobis</i> <i>hodie</i> <i>incognita.</i>
<i>Beta siluestris</i> , <i>Pliny.</i>	1014	<i>cinarum.</i>	ibid.	<i>Bulbus affinis</i> <i>Dalech</i> <i>Tigman</i>
<i>Betonica.</i>	1282	<i>Brassica marina siluestris</i> , <i>monof-</i>		<i>Theophrasti.</i>
<i>Betonica aquatica.</i>	1316	<i>permos</i> <i>Pena.</i>	527	<i>Bulbus agrestis & frangulur-</i>
<i>Betonica rauh.</i>	1318	<i>Brassica nigra</i> <i>Dodon.</i>	523	<i>rim.</i>
<i>Betonica species altera Fuchij.</i>	806	<i>Brassica Pompeiana</i> , aut <i>Cypria.</i>		<i>Bulbus crieophorus</i> <i>Dodon.</i>
		<i>Brassica florida</i> <i>Dod.</i>	521. 522.	<i>Clusij.</i>
		<i>Brassica pratensis.</i>	1444	<i>Bulbus maritimus</i> <i>crinitus</i>
		<i>Brassica Reposa.</i>	522	<i>Bulbus parv</i> <i>emfali</i> <i>Pena.</i>

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Bulbus <i>fringilla Fuchsij & Dodon.</i>	1502	Calamagrostis Lobellij, vulgo Leche.	414	Cannabis mar.	497
Bulbus <i>vomitorius Matth.</i>	1503	Calamintha.	904	Cannabis <i>serotina.</i>	ibid.
Bumelia <i>Fraxinosa.</i>	82	Calamintha II. & III. <i>Diosc.</i>	907	Cannabis <i>fringilla Dalech.</i>	497
Buna.	1794	Calamintha <i>aquatica, Mart.</i>	606	Cannabini <i>quorundam.</i>	1001
Bunias à Bunio plurimum differt	644	Calamintha <i>montana Mart.</i>	805	Cantabrica <i>Plinij.</i>	1416
Bunium.	774	altera <i>eiusdem.</i>	ibid.	Caphura.	1783
Bunium <i>Dioscor. Dodon.</i>	773	Calamintha <i>montana præstantior</i>		Capillaris.	1211
Euphthalmum.	862	Pena & Lobellij	ibid.	Capillus <i>Veneris.</i>	1208
Euphthalmum.	1118	Calamintha II <i>incana, Loh.</i>	906	Capita <i>Rosarum quid.</i>	126. 128
Euphthalmum <i>alterum, Pena.</i>	861	Calaminthe.	675	Capnos.	1291
Euphthalmum, <i>Dodon.</i>	861	Calamita.	115. 116	Capnos <i>alba latifolia, Lobellij.</i>	1294. 1295
Euphthalmum <i>Dodon. & Anguil.</i>	1618	Calamus <i>aromaticus 1838. Mart.</i>	ibid.	Capnos <i>Fabacea radice, Pena & Lobellij.</i>	1294
Euphthalmum <i>verum, Dalech.</i>	863	Calamus <i>aromaticus officinarum.</i>	1618	Capnos <i>tennisfolia Clusij.</i>	ibid.
Euphron.	435	Calathiana <i>Viola.</i>	814	Capparis.	155
Euphron <i>alterum latifolium, Lobellij.</i>	436	Calathiana <i>Verna, Dalech.</i>	ibid.	Capparis <i>leguminosa.</i>	456
Euphron <i>Dodon.</i>	ibid.	Calceolus <i>Ataria.</i>	1146	Capparis <i>vires & rufi in medic.</i>	156. 157
Euphron <i>Plinij.</i>	694	Calceifraga <i>Plinij.</i>	1671	Capparis <i>præstantissima ex Alexandria Aegypti Venetias af.</i>	157
Euphron <i>Plinij.</i>	436	Calceutopa <i>offic.</i>	1473	scruntur.	157
Euphron <i>passora.</i>	1097	Calendula.	811	Caprificum.	335
Euphron <i>Theophr.</i>	1519	Calix.	1100	Caprificum.	1086
Euphron, <i>Dodon.</i>	1018	Callion.	596	Caprificum.	1427
Euphron <i>radices in Gallia Narbon.</i>	95	Callitriche <i>Plinij, quorundam.</i>	1011	Caprilla.	414. 413
Euphron <i>sen Buxum.</i>	165	Callitriche <i>Plinij, quorundam.</i>	1091	Caprilla.	660
Euphron <i>asini.</i>	1471	Callitrichon.	1109	Caprilla.	631
Euphron, <i>quod quidem valuit, Gaia cambron est.</i>	166	Calomache.	699	Caprilla.	613
C		Caltha <i>hortensis.</i>	811	Caprilla <i>Brasilianum (Lafy).</i>	613
Calabina <i>Aloc.</i>	1695	Caltha <i>palastris.</i>	1049	Caprilla <i>latum Dodon.</i>	612
Calabina.	1308	Caltha <i>palastris quorundam Herbariorum.</i>	1013	Caprilla <i>maius & minus, sen P.</i>	ibid.
Calanum.	ibid.	Caltha <i>potarum.</i>	811	Caprilla <i>oblongum Dodon.</i>	ibid.
Cacca.	1857	Camemilla <i>fatua sen inodora.</i>	1345	Caprilla <i>rotundum Dalech.</i>	613
Cacanea.	ibid.	Camemilla <i>fatida & canin.</i>	1344	Caprilla <i>galimacum Belgarum.</i>	489
Cachy Caccara.	1837	Camemilla & Camemilla <i>Romana.</i>	918	Caprilla <i>monachi.</i>	564
Cachrys <i>quercus Alibaniensis di.</i>	10	Camemilla <i>vulgi & officinarum.</i>	1344	Caprilla <i>quorundam.</i>	1341
Cachys.	1876	Camemilla.	1343. 1344	Carabe.	5780
Cachrys <i>quid.</i>	ibid.	Campana <i>sive Campanula carna.</i>	1343. 1344	Caragna.	1794
Cachrys <i>verior, Libanotis Ga.</i>	764	lea <i>sive hortensis, 826. 817. mi.</i>		Carabalis <i>Aegle.</i>	1872
Calis Siculis.	1440	lea <i>rotundifolia, Lobellij.</i>	ibid.	Carbunculus.	418
Calis <i>1437. Calis Matth.</i>	1438	lea <i>lesens maior, eiusd.</i>	ibid.	Cardamine.	658
Calubul.	1429	lea <i>limfoka, Pena.</i>	818	Cardamine <i>Actij.</i>	665
Cadytas.	1613	Campanula <i>sive Cetrucaria Fuch.</i>	1197	Cardamine <i>altera, sine Simplicibus.</i>	659
Capa & Cape.	1536	Campanula <i>pratensis.</i>	814	Cardamine <i>III. Dalech. minima</i>	ibid.
Capa <i>asculoma.</i>	1501	Camphorata.	1100	Cardamine <i>V. Dalech. odorata ibi.</i>	660
Capa <i>filialis Mart. 1539. Ascaenia</i>	ibid.	Camphorata <i>maior.</i>	1564	Cardamine <i>trifolia Lobellij.</i>	660
Capa <i>marina.</i>	1575	Camphorata <i>minor, Herbar.</i>	1179	Cardamomum.	1810
Capa <i>novitate quadam infensa à Da.</i>	532	Canaria <i>Plinij.</i>	426	Cardamomi <i>species Matth.</i>	1811
Capa <i>fatua Matth.</i>	1538	Canarium <i>Græcorum Garcia.</i>	1791	Carduata <i>Herbariorum.</i>	1119
Capa <i>scitula de Matthijs II. & Ca.</i>	1538	Candelaregis & Candelaria.	1198	Carduata <i>1149. Matthijs ibid.</i>	1452
Capa <i>Calamella.</i>	ibid.	Canella.	1796	Carduatum.	1452
Casius, Clusij.	1765	Canella <i>arbor, Theophr.</i>	1805	Carduatum <i>Pena.</i>	1459
Cakile <i>Scrapiamu, Lobellij.</i>	1595	Canella <i>folium & bacillus.</i>	1803	Carduatum <i>imma Septentrionalis.</i>	1454
Calabrina.	1221	Canina <i>lingua.</i>	1261	Carduatum <i>aculeat. 1438. latif. ibi.</i>	1440
Calamagrostis. 1006. I. II. III. & IIII.	ibid.	Canunbu, seu Rabus <i>canin.</i>	121		
		Canne.	598		
		Cannabis.	496		

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Carduus araphyllus</i> , Dalec. 1471	<i>Caryophyllus Indicum</i> . 839. maior	<i>Cedrelate</i> . 16
<i>Carduus benedictus</i> , Cnicus filine- stris alter. 1410	& minor, Matthioli. <i>ibid.</i>	<i>Cedria</i> & <i>Cedrium</i> interdum ab authoribus confunduntur. 38
<i>Carduus bulbosus</i> Mößelschium. 1469	<i>Caryophyllus montanus</i> alter non- nullarum. 1190	<i>Cedria</i> sine resina ex <i>Cedra</i> . 57.
<i>Carduus Chondrillodes</i> , Dalech. 1470	<i>Carota</i> . 364-367	:8 41 & 42
<i>Carduus echinatus</i> Gesneri. 1431	<i>Cassia</i> & <i>Cassia</i> lignea. 1796	<i>Cedrides</i> sunt <i>Oxycedridacea</i> . 36.
<i>Carduus eriocephalus</i> seu <i>tomentosus</i> . 1488	<i>Cassia</i> cartartica. 113	& 39
<i>Carduus serotus</i> , Lobellij. 1489	<i>Cassia</i> bitula. <i>ibid.</i> & 1799	<i>Cedri</i> genera tria. <i>ibid.</i>
<i>Carduus fallens</i> . 1447	<i>Cassia</i> lignea maritima. 1385	<i>Cedri</i> ad varios fabricari; us. 42
<i>Carduus lacteus</i> . 1474	<i>Cassia</i> nigra. 113	<i>Cedrium</i> vinum. <i>ibid.</i>
<i>Carduus lacteus</i> Matthioli. 1464	<i>Cassia</i> salustina. <i>ibid.</i>	<i>Cedrium</i> sine <i>Cedria</i> . 74
<i>Carduus Leimania</i> Theophr. 1444	<i>Cassia</i> vires. 114	<i>Cedro</i> digna. 42
<i>Carduus Maria</i> . 1462. 1464.	<i>Cassiam</i> veram hodie habeamus nicæ. 1801	<i>Cedromea</i> . 298
<i>Carduus Pitahaya</i> fructum serēs. 1442	<i>Cassia</i> . 1681	<i>Cedrorum</i> & <i>Cedridum</i> vires. 43
<i>Carduus pratensis</i> Tragi. 1443. & 1444	<i>Cassia</i> Matthioli. <i>ibid.</i>	<i>Cedrule</i> . 36
<i>Carduus Spherocephalus</i> acutus Dodon. 1482	<i>Callanea</i> . 30	<i>Cedrus</i> . 51
<i>Carduus stellatus</i> . 1473	<i>Callanea</i> equina, nouum <i>Callanea</i> genus, Matth. 33	<i>Cedrus</i> Atlantica Plinij. 61
<i>Carduus stellatus</i> Dalech. 1470	<i>Callanea</i> Humilis, Ioannij Cau- ly. <i>ibid.</i>	<i>Cedrus</i> carum & versatissimum scilicet. 42
<i>Carduus varius</i> & <i>suauis</i> . 1452	<i>Callanea</i> genera, forma, locus, tempus, vires. 31-32	<i>Cedrus</i> Lycia, Thua Bellonia. 19
<i>Carduus Veneris</i> . 1447	<i>Callanea</i> glandium proflammi- ma. <i>ibid.</i>	<i>Cedrus</i> nullas fert vias, sed mu- scum edoratum. 58
<i>Carex</i> Tragi. 1007	<i>Callanea</i> hirsuta apud Virgi- lium. 31	<i>Cedris</i> Serapius quid. 160
<i>Cerica</i> . 1651	<i>Callanea</i> omnium glandium ep- tima. 22	<i>Cedris</i> Plinius non meminit & quare. 163
<i>Cerica</i> . 335	<i>Callanea</i> populares & <i>cedrina</i> à P'imo dila. 31. 32	<i>Cedrus</i> Theophrasti. 158, 159
<i>Cerina</i> . 1452. 1453. 1474. & 1458	<i>Callanea</i> quomodo coqui debeant. 33	<i>Celidonia</i> Officinarum. 1149
<i>Cerina</i> . 1464. 1475	<i>Callanea</i> ut afferuntur. <i>ibid.</i>	<i>Celidonia</i> minor, Officinarum. 1048
<i>Cerina</i> si' <i>nostris</i> . 1483	<i>Callifrangula</i> . 1085	<i>Cel'ris</i> . 347
<i>Cerota</i> . 534-719	<i>Cataner</i> vel <i>Catemer</i> . 848	<i>Cemos</i> . 1342
<i>Cerota</i> Matthioli altera. 712	<i>Catanan</i> & <i>Dodona</i> . 1366	<i>Centaurea</i> Officinarum. 1246
<i>Cerota</i> vulgaris. <i>ibid.</i>	<i>Catanan</i> prior quorundā. 1670	<i>Centaurea</i> minor officin. <i>ibid.</i>
<i>Carpinus</i> aceris genus est, non P'imi. 81	<i>Catanan</i> posterior quorundā. 1670	<i>Centauris</i> . <i>ibid.</i>
<i>Carpinus</i> . 94	<i>Catanan</i> quorundā. 1190	<i>Centaureum</i> . <i>ibid.</i>
<i>Carpobolus</i> officinarum. 1773	<i>Catoputia</i> maior. 1630	<i>Centaureum</i> internum prius Dali- champy. 1190
<i>Carrham</i> v' <i>officinarum</i> . 1409	<i>Catoputia</i> minor. 1657	<i>Centaureum</i> internum alterum Da- lechampy. 1291
<i>Carrum</i> & <i>Carcum</i> , officin. Car- ni. 693	<i>Cate</i> sine <i>Cate</i> arbor apud Indos. 150	<i>Centaureum</i> minus. 1287
<i>Carrum</i> Matthioli. 694	<i>Cattaria</i> quorundā. 905. 906	<i>Centaureum</i> minus alterum Cla. 1288
<i>Caryophyllata</i> . 685	<i>Cattaria</i> . 908	<i>Centaureum</i> minus. 1289
<i>Caryophyllatum</i> Feroneusium flo- re <i>Sanicula</i> v' sine. Lob 1109	<i>Caucalis</i> . 714	<i>Centaureum</i> muthi, Dalech. 1291
<i>Caryophyllata</i> Matthioli. 1486	<i>Caucalis</i> , <i>Dodona</i> . 715	<i>Centifolia</i> Rosa. 124
<i>Caryophyllata</i> montana Dale- champy. <i>ibid.</i>	<i>Caucalis</i> , Matth. 714	<i>Centimorbia</i> . 1042
<i>Caryophyllata</i> montana Matth. <i>ibid.</i>	<i>Caucalis</i> , Pene. 715	<i>Centrum</i> galli. 965
<i>Caryophyllata</i> sine Genio alpina, Pene. 687	<i>Caucasus</i> quidam vocant <i>Moly</i> Indicum. 1594	<i>Centumcapita</i> . 1418
<i>Caryophyllum</i> & <i>Caryophyllus</i> . 173	<i>Cauda</i> equina officinarum. 1069	<i>Centumculis</i> & <i>Centumculis</i> herba. 1191
<i>Caryophylli</i> aromatici Matthio- li. 1759	<i>Cauda</i> muris. 1328	<i>Cepa</i> <i>Dodona</i> , non recte. 1070
<i>Caryophylli</i> nostrates. 805	<i>Caulis</i> . 518	<i>Cepa</i> Matthioli. 1346
<i>Caryophyllus</i> altilis & <i>silagistris</i> . 807	<i>Caulis</i> capitatus. 521	<i>Cerasa</i> antieria Matthioli. 90
	<i>Caulis</i> erupum. 522	<i>Cerasa</i> canina vulgo <i>Nidam</i> qua ducuntur. 174
	<i>Ceanothus</i> , <i>Acanthus</i> <i>Anguilla-</i> <i>ra</i> . 1489	<i>Cerasa</i> ex vino pediculo plati 90
	<i>Ceanothus</i> lenis Gesneri. 132	<i>Cerasa</i> <i>miliana</i> . 600
	<i>Ceanothus</i> <i>spina</i> Theophrasti. 131	<i>Cerasa</i> <i>racemosa</i> . 110
	<i>Cedrelean</i> . 38	<i>Cerasa</i> si' <i>nostris</i> . <i>ibid.</i>
		<i>Cerassa</i> <i>Macedonica</i> . 102
		<i>Cerasorum</i> ex sapore, colore, ius- que sumpta differentia. 92

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Cicer Frausum quorundam</i>	462	<i>Cistus folio Sappachi, Clusij.</i>	ibid.	<i>Coca.</i>	1921
<i>Cicer orobium.</i>	462	<i>Cistus folio thymis, Clusij.</i>	ibid.	<i>Coccolon vocant Conifra.</i>	41
<i>Cicer satinum.</i>	461	<i>Cistus annu^s uterque Clusij.</i>	226.	<i>Cochlos.</i>	1741
<i>Cicer sylvestre 1. Dalech.</i>	464		227	<i>Coccos.</i>	164
<i>Cicer sylvestre 1. Dalech.</i>	ibid.	<i>Cisti duo. Pena.</i>	232	<i>Coccos.</i>	17
<i>Cicer sylvestre Matthioli.</i>	463	<i>Cisti Ledi genera decem, Clusij.</i>		<i>Cocci insectarii arbuscula Ma-</i>	
<i>Cicer sylvestre Pena.</i>	ibid.		231. 234. 135. 236	<i>thioli.</i>	23
<i>Cichoriacea.</i>	514	<i>Cistus maritimus, Dalechampi.</i>		<i>Cocci nistemporis legator, vi-</i>	
<i>Cichorian.</i>	565		1361	<i>tia ibid. aut probe accutur.</i>	
<i>Cichorium bulbosum.</i>	1392	<i>Citonia Malis officinar.</i>	290	<i>Coccos haphica.</i>	29
<i>Cichorium Constantinopolitanum</i>		<i>Citrage.</i>	917	<i>Coccos à Cremisus, quod appl-</i>	
<i>Matthioli.</i>	519	<i>Citria, Citrea, Citromela.</i>	298	<i>Lani, differt.</i>	ibid.
<i>Cichorium sevidum.</i>	577	<i>Citria mala Theophrasti seculo in</i>		<i>Cochlearia.</i>	1910
<i>Cichorium luteum Dodon.</i>	562	<i>cibum usum nō venerat.</i>	299	<i>Co, hlearia Britannica, Dodon.</i>	
<i>Cichorium stransum Myconi.</i>	559 560	<i>Citria cruda incibus hodie cū car-</i>			1082
		<i>nis estatis.</i>	301	<i>Cochlearia Britannica, Lob.</i>	1110
<i>Cichorium sylvestre Pena.</i>	557	<i>Citry mali an apud antiquos fa-</i>		<i>Cochlearia, Dodonai.</i>	ibid.
<i>Cici.</i>	1630. 1631	<i>tilia fuerit mentio.</i>	299	<i>Coffal vel Choffalo.</i>	1649
<i>Cicata.</i>	788	<i>Citrium, Mali Medice frullus.</i>		<i>Coggytra Theophrasti, fise Cog-</i>	
<i>Cicataria.</i>	760		301	<i>gytra.</i>	191
<i>Cicataria. 789. alba, & rub. ibid.</i>		<i>Citrulus Officinarum.</i>	625	<i>Cohus.</i>	1841
<i>Cicataria latifolia fetidissima cū</i>		<i>Citrum, Thaision Homeri Macro-</i>		<i>Coix. 1624. Myconi.</i>	1613
<i>flore, Lobel.</i>	790	<i>bio.</i>	61	<i>Coix Theophrasti.</i>	1779
<i>Cicataria altera latifolia fetidissi-</i>		<i>Clematidis species.</i>	812. 833	<i>Colchicum Anglicū Lobellij.</i>	1971
<i>ma sine flore, Lobel y. ibid.</i>		<i>Clematis.</i>	976 977	<i>Colchicum Ephemerum.</i>	1770
<i>Cicataria maxima fetida, Lobel-</i>		<i>Clematis altera Batica. 1433. 1414</i>		<i>Colchicum thyricon, fise Gra: d</i>	
<i>ly.</i>	790	<i>Clematis altera minor longifolia,</i>		<i>is veneralum, Lobellij.</i>	1974
<i>Cicataria palustris, Lobellij.</i>	1093	<i>Lobellij.</i>	1434	<i>Colchicum montanum cum fer,</i>	
<i>Cinerealis.</i>	1209	<i>Clematis altera vrens.</i>	1171	<i>Clusij.</i>	1972
<i>Cineraria.</i>	1383	<i>Clematis III. Matthioli.</i>	1407.	<i>Colchicum montanū minor, Clo-</i>	
<i>Cinna.</i>	410 414		1408	<i>si.</i>	ibid.
<i>Cinnabari.</i>	1847	<i>Clematis prior.</i>	211	<i>Colchicum Orientale Matthioli.</i>	
<i>Cinnamomi vice, Sabina dupli-</i>		<i>Cleomecium.</i>	930	<i>1572. alterum eiusdem. ibid.</i>	
<i>substituitur.</i>	184	<i>Clinopodium ibid. prius, & alte-</i>		<i>Colocasia 1577. & Colocasia ve-</i>	
<i>Cinnamomū 1796. & Cinnamū.</i>		<i>ram Matthioli.</i>	931	<i>res.</i>	461
<i>Circa.</i>	1411	<i>Clinopodium sylvestre.</i>	912	<i>Colocyntha.</i>	614
<i>Circa 1338. Dalechamp.</i>	ibid.	<i>Clymeum Discor. quorundam.</i>		<i>Colocynthis 1675. Matthioli 1676</i>	
<i>Circa Tragi.</i>	871		1316	<i>Colocynthis species sex Card.</i>	
<i>Circium.</i>	1726	<i>Clymenum Matthioli.</i>	470	<i>1676 1677</i>	
<i>Cirsium.</i>	579	<i>Clymeum minus.</i>	1357	<i>Colocynthis Pyrifermis Lobellij.</i>	
<i>Cirsium.</i>	582	<i>Coccos.</i>	1449	<i>ibid.</i>	
<i>Cirsium Anglicum.</i>	583 584	<i>Cocoron.</i>	270	<i>Colophonis Resina.</i>	73
<i>Cirsium Dodonai.</i>	583	<i>Cocoron.</i>	1667	<i>Colubrina.</i>	1181
<i>Cirsium aliud Dodonai.</i>	ibid.	<i>Cocoron.</i>	1363	<i>Colubrina.</i>	1608
<i>Cirsium Germanicum Loniceri.</i>	584	<i>Cocoron album Dalechampij.</i>		<i>Colubaris, Colubaria, Colubi-</i>	
<i>Cirsium luteū Sequanarum.</i>	1483	<i>ibid.</i>		<i>na.</i>	1094
<i>Cirsium maius singularibus capi-</i>		<i>Cocoron a'bum: Matthioli 1364</i>		<i>Columbina.</i>	810
<i>tulis.</i>	584	<i>Cocoron aliud Theophrasti, Mat-</i>		<i>Colus Ionia, Lobellij.</i>	966
<i>Cissarion.</i>	231	<i>thioli.</i>	1365	<i>Colusa Scorpisides.</i>	217
<i>Cistus sine Cistini.</i>	212. 213	<i>Cocoron Alifanfi Pantij.</i>	1669	<i>Colusa V'ficaria.</i>	214
<i>Cisti sp. ces.</i>	869	<i>Cocoron nigrum Mycon</i>	11364	<i>Colymbades Olina qua.</i>	344
<i>Cisti virei.</i>	214	<i>Cocoron nigrum quorundam.</i>	1201	<i>Colyta & Colusa diuersi plas-</i>	
<i>Cisti maris species quinque, Clu-</i>		<i>Cocostum.</i>	1666	<i>ta.</i>	215
<i>si.</i>	ibid. & 225. 226	<i>Cocinum Triphyllum.</i>	504	<i>Colyta tertia Theophrasti.</i>	210
<i>Cistus femina eiusdem.</i>	226	<i>Cocosa.</i>	1449	<i>Camara.</i>	196
<i>Cistus Halim. folio, Clusij.</i>	ibid.	<i>Cocosa alter, Clusij.</i>	ibid.	<i>Camara.</i>	615
<i>Cistus alter folio Hama, prece-</i>		<i>Cocosa sativus, Matthioli ibid.</i>		<i>Comoricha Ibyric gentilis disc-</i>	
<i>rior prior, Clusij.</i>	ibid.	<i>Cocosa sylvestris prior, Atracidis</i>		<i>tur quam Ibyricam Graecis</i>	
<i>Cistus folio Lauandula, Clusij.</i>	ibid.	<i>Dalech.</i>	1450	<i>cant.</i>	217
		<i>Coagulam terre, Plinij.</i>	1073	<i>Compheua, vel Crempeua, vel</i>	
		<i>Cobbum.</i>	1841	<i>Compheua.</i>	540

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM

<i>Candace Antenna Thun.</i> 1732	<i>Corchorus Dalechampi.</i> 165	<i>Cotyledon secunda.</i> <i>ibid.</i>
<i>Candardum Plinij.</i> 315	<i>Coriandrum.</i> 735	<i>Cotyledon 11. Matthioli.</i> <i>ibid.</i>
<i>Caserea Plinij & Lobelij.</i> 1023	<i>Coriandrum alterum minus odoratum, Lobe l.</i> <i>ibid.</i>	<i>Cracca.</i> 479
<i>Caserna trichodes.</i> 1022	<i>Coriandrum officinarum.</i> <i>ibid.</i>	<i>Crambs.</i> 319, 324
<i>Caserna trichodes, sine Trichomanes aquaticum Dalechampi.</i> 1023	<i>Coriandrum sativum, Matthioli.</i> <i>ibid.</i>	<i>Crapula.</i> 73
<i>Caserta arboris.</i> 35	<i>Coriadrum singlere Myconij.</i> 716	<i>Craſſincium Aceris genus.</i> 94
<i>Casertas arbores sex generu facit Plinius.</i> 48	<i>Corsan & Corsanum.</i> 715	<i>Craſſula & Craſſula maior.</i> 1375
<i>Casifera: omnes arbores non bene notas habuit Plinius.</i> 43	<i>Coris. 1. 58. Matthioli.</i> <i>ibid.</i>	<i>Craſſula minor seu Vermicula.</i> 1130
<i>Casifedi fructus.</i> 39	<i>Cornu ceruſi Herbariorum.</i> 668	<i>Craſſula officinarum.</i> 1128
<i>Casifigo.</i> 1637, 1638	<i>Cornu femina.</i> 197	<i>Cratægi Sorbus terminalis Tra</i>
<i>Casifigo altera.</i> 1639	<i>Cornu mai.</i> 319	<i>gi & Matthioli.</i> 59
<i>Casifida arca nemorum, Pena.</i> 1173	<i>Corona Imperialis, Dodon.</i> 1405	<i>Cratægonum.</i> 420
<i>Consolida maior officinaru.</i> 4107	<i>Corona fratrum, Herbarioru.</i> 488	<i>Cratægonum secundum quorundam.</i> 1108
<i>Consolida media sine Symphytum.</i> 1075	<i>Corona Regis.</i> 511, 618	<i>Cremaphra, vel Comphena.</i> 146
<i>Consolida minor.</i> 1310	<i>Corona Veneris.</i> 676	<i>Crepis Dalechampi.</i> 562
<i>Consolida minor quorundam.</i> 813	<i>Coronopus.</i> 668	<i>Cressina vicia.</i> 134, 135
<i>Consolida regalis, Fuchij.</i> 970	<i>Coronopus Mafſilienſis Pena.</i> 670	<i>Criſſinum viciu.</i> 114
<i>Coſſida Regia sine Regalis, Herbariorum.</i> 698	<i>Coronopus Matthioli.</i> 669	<i>Criſſinobarbentis Herbarioru.</i> 154
<i>Consolida Sarracenic.</i> 1170	<i>Coronopus quorundam.</i> 1214	<i>Criſſinobellerſen vulgaris.</i> 678
<i>Coſſida Sarracenic maior.</i> 1271	<i>Coronopus repens Lobe l.</i> 671	<i>Creta marina officinar.</i> 767
<i>Consolida Sarracenicæ tertius, Tra</i>	<i>Coronopus Ruellij ex Dodon.</i> 670	<i>Crias. A. p. l. y.</i> 1206
<i>gi.</i> <i>ibid.</i>	<i>Coronopus ſylaeſtris sine Serpenti</i>	<i>Criauia.</i> 1209
<i>Consolanus. 1423, 1424, 1425.</i>	<i>na.</i> 669	<i>Criſſa galinacea Dodonæi.</i> 1073
<i>maior, minorque.</i> <i>ibid.</i>	<i>Corragæ ad Lucanis dicta aqua vul</i>	<i>Criſſa galli altera seu Pithirum.</i>
<i>Consolanus folio Altheæ Claſſij.</i> 1216	<i>go Corragæ.</i> 578	1074
<i>Consolanus minimus Claſſij.</i> <i>ibid.</i>	<i>Corruda.</i> 609, 1473	<i>Criſſum ſpecies Matthioli.</i> 1379
<i>Cous.</i> 4151	<i>Corruda altera Claſſij.</i> 612, 611	<i>Criſſum Chryſanthemum 10</i>
<i>Coryza marina Dalechampi.</i> 366	<i>Corruda tertia Claſſij.</i> <i>ibid.</i>	<i>danæ.</i> <i>ibid.</i>
<i>Coryza montana Myconij.</i> 1201	<i>Corruda Dodonæi.</i> 611	<i>Criſſum Diſcoridis.</i> 264
<i>Coryza ſtricta quorundam.</i> 1681	<i>Corruda Pena.</i> 611	<i>Criſſum Matthioli.</i> 757
<i>Coryza. 1043. maior & minor,</i>	<i>Coryſium.</i> 1077	<i>Criſſum Matthioli, Baſis Plu</i>
<i>Matthioli 1044. media, craſſa.</i>	<i>Cortex P. intertrans.</i> 1815	<i>ny.</i> 768
<i>1045. minima, Lobelij.</i> <i>ibid.</i>	<i>Cortex Roſarum quid.</i> 115	<i>Criſſum 11. Matthioli.</i> 1396
<i>Coryza magna Pena 1046. mi</i>	<i>Coraſa.</i> 1169	<i>Criſſum Diſcoridis.</i> 52
<i>nor vera inſidem.</i> <i>ibid.</i>	<i>Cora.</i> 1862	<i>Criſſum quartus Matthioli.</i>
<i>Copa.</i> 1791	<i>Corydalis Galeni.</i> 1192	1460
<i>Copra.</i> 1762	<i>Corylus satua.</i> 319	<i>Crocodilium.</i> 1475
<i>Cornidicum.</i> 197	<i>Coryni ſylaeſtris.</i> 101	<i>Crocus.</i> 1331
<i>Cornimunda.</i> 1215	<i>Corymbe.</i> 814	<i>Crocus abſque flore Matth.</i> 1532
<i>Corn 11. Thoma.</i> 3905	<i>Corymbi.</i> 1416, 1417	<i>Crocus montanus, Claſſij.</i> 1535
<i>Corallina.</i> 1367	<i>Caſſus hortenfis.</i> 678	<i>Crocus ſativus Aſiaticus.</i> 1532
<i>Corallina Britanica Pena.</i> 1371	<i>Caſſus illyricus.</i> 718	<i>Crocus ſerotinus cum flore, Lobel</i>
<i>Coralli frutex.</i> 1374	<i>Caſſus Indicus.</i> 1817	<i>ly.</i> 1535
<i>Coralli vires.</i> 1376	<i>Caſſus Malacceſis corticoſus.</i> 1819	<i>Crocus ſylaeſtris 1. & 11. Dalech</i>
<i>Coralium unde dictum.</i> 1175	<i>Caſſus Syriacus & Arabicus.</i> 1818	<i>py 1513. 11. inſidem.</i> 1534
<i>Corallium album & rubrum Lo</i>	<i>Cattinus Plinij.</i> 14	<i>Croc. vernum maior Claſſij.</i> <i>ibid.</i>
<i>be l.</i> <i>ibid.</i>	<i>Catanea.</i> 294	<i>Croc. vernus minor 1. & 11.</i>
<i>Corallides sine Coralli albi va</i>	<i>Cataneum Malum priuſum Ca</i>	<i>luſſij.</i> 1534
<i>rietat.</i> 1376	<i>naminis.</i> 296	<i>Crocodilium, Carſina caſtem</i>
<i>Corallides altera.</i> 110	<i>Cottana.</i> 335	<i>habens.</i> 1476
<i>Corchorus Lobelij.</i> 55, 366	<i>Cotula.</i> 1191	<i>Crocodilium Nonſiſſenſium Da</i>
<i>Cordatus.</i> 1263	<i>Cotula ſerida.</i> 954	<i>lech.</i> <i>ibid.</i>
	<i>Cotula ſerida 1144. Dodon.</i> 1345	<i>Croton.</i> 1610
	<i>Cotula non ſerida, seu inodora</i>	<i>Crocota alia.</i> 1142, 1343
	<i>Euphthalmum Fuchij.</i> <i>ibid.</i>	<i>Cropina B. l. y. erum.</i> 167
	<i>Cotyledon.</i> 1211, 1608	<i>Crocota, sine Gentiana minor,</i>
	<i>Cotyledon aquatica.</i> 1090	<i>Matthioli.</i> 1259
	<i>Cotyledon 3. Dalechampi.</i> 1322	<i>Crocota, sine Gentiana minima,</i>
		<i>Matthioli.</i> <i>ibid.</i>
		<i>Crocota</i>

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM

Cycliata minima, Matth. 1260
Cobiba 142 143, 1813
Cucubalus Pliny, sine *Ocymoides*
repens, 1419
Cuca lata, 1106
Cucula, 596
Cucumer agrestis, Matthioli, 1673
Cucumer, vel *Cucumis sativus* 619
Cucumis angurinus, 611
Cucumis Indicus, 614
Cucumis vulgaris, 611
Cucumis puniceus, 619
Cucumis sativus non, 610
Cucumis Turcicus Fuch. 616, 617
Cucumis *hinc* *triv*, *erraticus*, &
angurinus, *agrim* *Officin* 1672
Cucurbita, 614
Cucurbita cameraria longa, 615
Cucurbita cameraria maior, 616
Cucurbita cameraria minor, *ibid.*
Cucurbita Indica longa, *Cucumis*
Turcicus Fuchsy *ibid.* & 617
Cucurbita Indica rotunda, 616
Cucurbita laciniata, 618
Cucurbita hinc *triv*, 1675
Cucurbita verrucosa, 617
Cuminum sativum, 616
Cuminum sativum Matth 697
Cuminum *hinc* *triv* *l.* Matth *ibid.*
Cuminum *hinc* *triv* *l.* Matth *ibid.*
Cuminum *hinc* *triv* *l.* *Matthioli*
ibid. 698
Cuminum *hinc* *triv* *l.* *Matthioli*
Pene, *ibid.*
Cunila, 836
Cunila bubula, 744
Cunila 816, *gallinacea*, *bubula*,
ecchalea *sen* *capitata*, *ibid.*
Cunila & *Canilago*, 1044
Cupressus, 57
Cupressus carici non *sentis*, 59
Cupressus Cretica, 181
Cupressus humilis *sen* *pumila* 940
Cupressus *in* *Creta* *quocunque* *lo-*
co *terram* *monstris* *quissiam*,
nisi *serai* *tr* *alia*, *gignunt*, *ac*
propius *emica*, 58
Cupressus pumila, *hinc* *hortensis*,
Gallorum, 938
Cupressus trifera *est*, (*l.* *eius* *tem-*
peramenta & *vires*, *ibid.*
Cuscuta Officinaria, 1811
Cuscutum, 17
Cuscuta Herbariorum & *Offici-*
narum, 1683
Cyamus, 460
Cyamus, 436
Cyamus maior 437, *minor*, *ibid.*
Cyamus *rep* *ns*, *ibid.*
Cyamus *supinus*, *ibid.*
Cytis *quid* *vocat*, 364

Cyclamen Officina, 1604
Cyclamen, *ibid.*
Cyclaminus altera *Dodones*, 1413
Cyclaminus altera *orbicu* *lari*, *Do-*
donci, 1606
Cyclaminus altera *Hederaci* *fol-*
liu, *Labell*, *ibid.*
Cyclaminus altera *Luca* *Christi*,
1419
Cyclaminus prior *Matth*, 1605
Cyclaminus tertius *Pliny* *quarun-*
dam, 1738
Cyclaminus vulgaris *Lab*, 1604
Cyma *in* *Brassica* *quid*, 518
Cymbalaria *Matth*, 1113
Cymbalaria, *ibid.*
Cyminum Officinarium, 696
Cynara, 1416
Cynara non aculeata *Matth*, 1419
Dodones, *ibid.*
Cynara vu *garis* *Matth*, *ibid.*
Cynia, 1618
Cyncephalus Apulej, 1339
Cyncephalus, 810
Cynocrambe, 1618
Cynocrambe, *Matth*, *ibid.*
Cynoglossos, 181
Cynoglossum, *Officin*, *Cinoglossa*,
1161
Cynoglossum pusillum *Narban-*
se, 1161
Cynoglossum vulgare *floridum*
Matth *secundum* *Pliny*, *ibid.*
Cynoglossum *Matth*, *ibid.*
Cynoglossum vulgare *Matthioli*,
Lycopsis *Lacuna*, 1163
Cynomorion, 485
Cynomorion, 1730
Cynorrhodon, 1492
Cynorrhodon *Palaestanthou* *vina*
imagine *expressa*, 117
Cynorrhodon *vineris* *Rosam* *a-*
munem *hinc* *strem* *Plinius* *ap-*
pellat, 115, 126
Cynorrhodon *quid*, 111
Cynorrhodon *Rosa* *duo* *genera*, *hinc*
utrum *Rosa* *vulgare*, & *Cy-*
norrhodon *Palaestanthou*, 115
Cynobati *in* *re* *medica* *vires*, 113
Cynobati *on* *cam* *Chamabato* *con-*
fundit *Plinius*, 111
Cynosbaton *quidam* *Capparin* *ap-*
pellant, 115
Cynosorchis, 1549
Cynosorchis *Conopsea*, 1563
Cynosorchis *Uracanthus* *Gemma* *ibi*,
Cynosorchis *leptophylla* *Gemma*,
1564
Cynosorchis maior *Label* *Scrapia*,
Dioscor *Gemma*, 1516
Cynosorchis palustris *altera* *lapis*

des, *Gemma*, 1554
Cynosorchis palustris *pluripila*,
Gemma, 1554
Cyperus *efolens*, 1554
Cyperus & *Cyperus*, 998
Cyperus Indicus *Dioscor*, 1811
Cyperus *longum* *odoratum*, *Labell*,
991 *aquaticum*, *causa* *radice*
inodora, *causa* *ibid*, *Grama-*
nensis *seu* *Melastom*, *Pene*, 991
Cyperus *Officinarius*, 57
Cypria *ammodala*, 116
Cypripedium, *ibid.*
Cytisus, 111, 112
Cytisus *quid*, 104, 105
Cytisus *appellatio* *quibus* *compe-*
tat, 117
Cytisus, 118
Cytisus *diversi* *diversi* *antidoti*,
Cytisus *Matth*, *Trago*, *Giffon*,
Alpinus *Dalech* *vinn* & *alio*
Pene, *primus*, *secundus*, *ter-*
tius, *quartus* *hinc* *pluripila* *Cy-*
ti *face* *hinc* *pluripila* *quar-*
dam *Labell*, 119, 120, 121
121, 123, 124

D

Dactylis, 161, 164
Dalmatica *maior* *triv*, 161
Damasium, 11, 116
Damasium, *sen* *Alisma* *Duf-*
coridis *verum*, *quarundam*
10, 17
Damasium, *sen* *Alisma*, *Ma-*
thioli, *ibid.*
Damasium *stellatum*, 101
Alpinum, *ibid.*
Daphnoides 210, *eius* *hinc*
obscura *est*, *ibid.*
Daphnoides *planta* *acerrima*,
fermidissima, 11
Dardania, *Apulej*, 1054
Darian *Camalanga*, 1157
Datura, *Atropa*, 1157
Daucus, *Daucum*, & *Daucum*,
716
Daucus *alterum* *genus* *Fuch*, 765
Daucus *l.* *genus* *Dalech*, 77
Daucus *l.* *genus* *Dalech* *ibid.*
Daucus *l.* *Matth*, 716
Daucus *l.* *Matth*, *ibid.*
Daucus *Officinarius*, 719
Daucus *pratensis* *Dalech*, 718
Delpheum *Pliny*, 166
Dendrotrichum, 35
Dendromala, 583, 112
Dens caninus, 411, 414, 164
Dens caninus *Belgarum*, 1167
Dens leani, 119
Dentaria

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Dentaria maior</i> Marsh. 1296 mi- nar. <i>ibid</i> & 1297	<i>Draba.</i> 663, 664 1181	<i>Elemmi lacrima</i> seu <i>Gummi</i> Eof. ni officinar. 13
<i>Dentellaria</i> 1045, 1139. <i>Dalecham</i> py. <i>ibid.</i> altera <i>Dodonai</i> . <i>ibid.</i>	<i>Draco arbor.</i> 1847	<i>Eleoscinum.</i> 700 701
<i>Dentellaria</i> , <i>rubra</i> <i>Dalecham</i> py. 1297	<i>Dracunculus minor.</i> 1596	<i>Elacana.</i> 1794
<i>Dentel'aria</i> <i>Rondeletij.</i> <i>ibid.</i>	<i>Dracunculus.</i> <i>ibid.</i> & 1185	<i>Electrysum</i> , & <i>El. isochrysum</i> 775
<i>Denticulata</i> <i>Cassia.</i> 1189	<i>Dracunculus hortenſis.</i> 685	<i>Electrysum</i> , <i>Matthioli.</i> 776 <i>itali</i> . <i>ibid.</i>
<i>Denticulata</i> <i>Dalecham.</i> 1296	<i>Dracunculus, sine Serpētaria ma-</i> <i>ior</i> <i>Dodon.</i> 1602	<i>Elaphogloss.</i> 879
<i>Destruſſia</i> <i>Chirurgorum.</i> 1296	<i>Dracunculus pal'ſtrū.</i> 1601	<i>Elleboraster maxima flore</i> & <i>ſe-</i> <i>mine</i> <i>pregnans.</i> 1638
<i>Dysſenſia.</i> 1268	<i>Drakenradix.</i> 1858	<i>Elleboraster Belgicarum</i> , <i>Lobelij.</i> 1639
<i>Dutammii</i> in <i>Creta</i> <i>legendi</i> <i>cauſa.</i> 116	<i>Dryſum</i> <i>Cord.</i> 1181	<i>Elleborine.</i> 1111
<i>Dutammum.</i> 168	<i>Drupa ſicca</i> <i>que.</i> 342. <i>oleum</i> <i>ex</i> <i>hu.</i> 345	<i>Elleborine ferruginea</i> <i>Dalecham-</i> <i>pi.</i> 146
<i>Dutammum album.</i> 872	<i>Dryophanon</i> <i>Plinij.</i> 664, 1125	<i>Elleborine Dioſcoridū.</i> 1116
<i>Dutammum</i> & <i>Pſendodutamm</i> <i>um.</i> 892	<i>Dryopteris</i> 1127. <i>Matthioli.</i> <i>ibid.</i>	<i>Elleborine Dodonaej.</i> 1312
<i>Dutammum verum.</i> 893	<i>Dryopteris</i> <i>Dalecham.</i> 1213	<i>Elleborine, ſine Epipacti, quorundam.</i> <i>dam.</i> 828
<i>Digitalis</i> 831. <i>purpurea.</i> <i>ibid.</i> <i>pur-</i> <i>purea</i> <i>aut alba</i> <i>Lobelij.</i> <i>ibid.</i>	<i>Dryopteris alta</i> <i>Dodon.</i> 1127	<i>Elleborine, Matthioli.</i> 1312
<i>Digitaleſ.</i> 1128	<i>Dryopteris nigra</i> <i>Dodon-</i> <i>typi.</i> 1128	<i>Ell. barine</i> <i>Punica.</i> 146
<i>Digitis</i> <i>extrinſi</i> <i>Antenna.</i> 1169	<i>Drypis</i> <i>Lonicerj.</i> 1479	<i>Elleborine quorundam.</i> 1260
<i>Dilegſine</i> <i>Delegi</i> <i>Amuſina.</i> 1687	<i>Drypis</i> <i>Tgeopter. Anguillara.</i> <i>ibi.</i> 1480	<i>Ellebori nigri</i> <i>vires.</i> 1639
<i>Diomyſia.</i> 1156	<i>Dulcamara.</i> 1338	<i>Elleborum</i> <i>vel Elleborine</i> <i>voca-</i> <i>tur</i> <i>in</i> <i>ſyl'ſtica</i> <i>quod alijs</i> <i>Se-</i> <i>ſamadaſ.</i> 1648
<i>Disspyras</i> <i>ſine</i> <i>Faba</i> <i>Graca, angu-</i> <i>ſi ſolia</i> <i>ſeu</i> <i>Lot'</i> <i>Africana.</i> 149	<i>Dulcamara</i> <i>Cordis.</i> 1605	<i>Elleborum nigrum, Matth.</i> <i>flore</i> <i>purpurea.</i> 1634
<i>Disspyras</i> <i>ſine</i> <i>Faba</i> <i>Graca, laſi-</i> <i>ſolia, Plendolatu</i> <i>Matth.</i> <i>ibid.</i>	<i>Dulcamara</i> <i>Herbariorum</i> 1407	<i>Elleborum nigrum quorundam.</i> 1268
<i>Dipcadi candidu</i> <i>ſloribus</i> <i>Lobel-</i> <i>ij.</i> 153	<i>Dulcamara ſine</i> <i>Falsi ſyl'ſtrij</i> <i>Matthio.</i> 1413	<i>Elleborum album.</i> 1631
<i>Dipcadi Chalcedonicum.</i> <i>Bulbu-</i> <i>rum</i> <i>interius</i> <i>Matthioli.</i> <i>ibid.</i>	<i>Dulcibunum.</i> 1184	<i>Elleborus albus, Matthioli.</i> 1632
<i>Dipſacum</i> 1447. <i>Matthioli</i> <i>ibi</i> <i>ſa-</i> <i>tinum</i> <i>alter, euſid.</i> <i>ibid.</i>	<i>Dulcis radix.</i> 247	<i>Elleborus niger.</i> 1633
<i>Dipſacum</i> <i>immoſum</i> <i>diſtus.</i> 1471	<i>Durania</i> <i>unde</i> <i>diſta.</i> 293 294	<i>Elleborus niger II. Dodonaej.</i> 1616
<i>Dipſacum ſylueſtre</i> <i>maior</i> <i>Fuch-</i> <i>ſij.</i> 1448	<i>Durum.</i> 1869	<i>Elleborus niger III. Dodonai.</i> <i>ibi.</i> & 1637
<i>Dipſacum ſylueſtre</i> <i>minor</i> <i>ſeu</i> <i>Vir-</i> <i>ga paſſoris, Matthio.</i> <i>ibid.</i>	<i>E</i>	<i>Elleborus niger adulterinus: ſiue</i> <i>ſtrū, Fuchſij.</i> 1637
<i>Dorca</i> 1338	<i>E</i>	<i>Elleborus niger III. Matthioli.</i> 1635
<i>Dorca.</i> 473-474	<i>E</i>	<i>Elleborus niger Matthioli, ſo-</i> <i>re herbacea.</i> 1639
<i>Dorca ſine</i> <i>Herba aurea</i> <i>Nerbo-</i> <i>menſium, Pena.</i> 1273	<i>E</i>	<i>Flymus.</i> 411
<i>Doripetrum.</i> 1344	<i>E</i>	<i>Embelgi.</i> 1687
<i>Doricum.</i> 1101	<i>E</i>	<i>Empetrum.</i> 1111, 1671
<i>Doronicum</i> <i>brachiata</i> <i>radice, Aca-</i> <i>nium</i> <i>pardalianches</i> <i>Plinij</i> & <i>Matth.</i> 1103	<i>E</i>	<i>Empetrum phacides, Herba ter-</i> <i>ribilis</i> <i>Nardoucinum.</i> 1771
<i>Doronicum minus</i> <i>Officinatum,</i> <i>Pena</i> & <i>Lobelij.</i> 1101	<i>E</i>	<i>Empetrum Rondeletij.</i> 767
<i>Doronicum Rom.</i> <i>Aconitū</i> <i>par</i> <i>dalianches</i> <i>antiquorū, Dod.</i> 1737	<i>E</i>	<i>Empetron quorundam.</i> 1113
<i>Doronicum</i> <i>radice ſcorpj figura,</i> <i>Dalecham.</i> 1203	<i>E</i>	<i>Empetrum Tragi.</i> 1126
<i>Dorycnium</i> <i>cogener</i> <i>planta</i> <i>Cloſij.</i> 1714	<i>E</i>	<i>Endivia vulgarior</i> <i>officinarum.</i> 546
<i>Dorycnium</i> <i>Monſſelienſe</i> <i>Dale-</i> <i>cham</i> py. <i>ibid.</i>	<i>E</i>	<i>Endivia Tragi.</i> 564
	<i>E</i>	<i>Eunaphyllum</i> <i>Plinij</i> <i>quorundam.</i> 1637
	<i>E</i>	<i>Eunaphyllum</i> <i>Plinij.</i> 1140
	<i>E</i>	<i>Enſi ſine</i> <i>Enſiculus.</i> 1610
	<i>E</i>	<i>Enula</i> <i>Campana, officinarū.</i> 867
	<i>E</i>	<i>Ephemeron.</i> 1570
	<i>E</i>	<i>Ephemeron non lethale, Matthi.</i> 1574

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Epibrosus.</i>	1069	<i>Eryngium aliud montanum, Dalech.</i>	1460	<i>tum in medicamentis.</i>	1460
<i>Epimedium.</i>	1094. <i>Dodonæi.</i>	1095	<i>Eryngium planum Matth. ibid.</i>		455
<i>Epimelus arbor.</i>	196		<i>Eryngium pusillum planum Moutoni, Lobellj.</i>	1461	<i>Fabæ quare abstinendum.</i>
<i>Epimelus.</i>	198		<i>Erysimum.</i>	612	<i>vis Philagoræ.</i>
<i>Epimelus altera, Cotenaster Gesneri.</i>	199		<i>Erysimum Dodonæi.</i>	544	<i>Fabæ temperamenta quæ sunt.</i>
<i>Epimelus, Mésili genus.</i>	331		<i>Erysimum Theophrasti.</i>	383	<i>Fabæ Aegyptiæ usus & virtus.</i>
<i>Epipactis.</i>	1311		<i>Erysimum verum.</i>	613	<i>Faba crassa.</i>
<i>Epipactis Angustata.</i>	1116		<i>Erythrocyperum.</i>	1815	<i>Fabata seu Fabatapula.</i>
<i>Epipactis, quarundam.</i>	818		<i>Erythrodanum.</i>	1329	<i>Faba fœca seu strilla.</i>
<i>Epipetrou.</i>	912		<i>Erythrodanum marinum.</i>	1385. & 1386	<i>Faba Græca.</i>
<i>Epithimum. 1681. Matthiæ.</i>	1681				<i>Faba Pantica.</i>
<i>Epithimum Græcorum & Arabû Lobellj.</i>	ibid.		<i>Esculum eandem cum Palyphyllo quidam faciunt, Plinius tam quæ diversarum triusque nominis.</i>	8	<i>Faba silvestris.</i>
<i>Equaniam Galæ.</i>	703				<i>Fabæ purgatives.</i>
<i>Equisetum, Equiseta, Equisetiv, Equisetu.</i>	1069		<i>Esculum mai & semina s. unde ducatur. ibid. & 6</i>		<i>Fabago Belgarum. sive Psyllu Parisiense.</i>
<i>Equiseti 1 apparatus, Dodo.</i>	1069		<i>Esula sine Ezula.</i>	1652	<i>Fabaria.</i>
<i>Equisetum 1.</i>	ibid.		<i>Esula maior Dodonæi Hist. part. 1653</i>		<i>Fabaria Matth. & Fuch. ibid.</i>
<i>Equiseti minoris flores.</i>	1070		<i>Esula minor Dodon. Hist. part. ibid.</i>		<i>Fagara Auzienna.</i>
<i>Equisetum alterum sive minus Matth. ibid.</i>	ibid.		<i>Esula minor Italorum.</i>	1648	<i>Fagus. 14. Fagus Latiora & Græcorum Phagoprosus duces.</i>
<i>Equisetum tertium & quartum, Matthiæ.</i>	1071		<i>Esula rotunda officinar.</i>	1658	<i>Far.</i>
<i>Equisetum lunctum Tragi.</i>	ibid.		<i>Esula maior Germanica, Penn. 1654</i>		<i>Far præ omni frumento graviore terribus & surpatum.</i>
<i>Eranthemum.</i>	968. 969		<i>Esula tera & Lobellj.</i>	1655	<i>Far Clusium Dalechampj.</i>
<i>Ereuthodanum Theophrasti, quarundam.</i>	1062		<i>Esula dulcis, Tragi.</i>	1656	<i>Farris nomine & ea ab antiquis minus Latinorum nominata.</i>
<i>Erica. 185 eius quindecim species. ibid. & 186. 187. 188. 189. 190.</i>	Erica. 1482		<i>Esula minima, Tragi.</i>	ibid.	588
<i>Erica Alexandrina Corusj.</i>	1669		<i>Esula silvestris Tragi.</i>	1655	<i>Farris parandi ratio.</i>
<i>Erica prima & quarta Classificata.</i>	224		<i>Esula.</i>	1838	<i>Farrago.</i>
<i>Erica primi generis.</i>	1200		<i>Esula.</i>	1838	<i>Farsara officinarum.</i>
<i>Ericæ quæ & Atyrice.</i>	181		<i>Esula.</i>	1838	<i>Farranum, sive Farsagium, Matthiæ.</i>
<i>Erigeron, Latius senectis.</i>	174		<i>Esula.</i>	1838	<i>Fausel sine Fissel & Fufel.</i>
<i>Erinacea Clusj.</i>	1485		<i>Esula.</i>	1838	<i>Febrynga.</i>
<i>Erinus sive Erinceus. 1086. Matth. & Dalech.</i>	1086		<i>Esula.</i>	1838	<i>Felctera ibid. & Ferula.</i>
<i>Eristalis.</i>	1118		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ferulago & Ferula eadem cum diversæ plantæ sint.</i>
<i>Eristhales, Dalechampj.</i>	1094		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ferula Galbamsfera Lobellj.</i>
<i>Eristhales.</i>	1128		<i>Esula.</i>	1838	
<i>Eruanga.</i>	484		<i>Esula.</i>	1838	755
<i>Eruca 649. satina.</i>	ibid.		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ferula Matth.</i>
<i>Eruca cinerea.</i>	1383		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ferraria.</i>
<i>Eruca cinerea Dalechampj.</i>	651		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ferrum Equinum.</i>
<i>Eruca maritima.</i>	1394		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ferruminatrix.</i>
<i>Eruca muralis, Dalechampj.</i>	1134		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ferruminatrix arbuscula.</i>
<i>Eruca palustris.</i>	650		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ferus culus.</i>
<i>Eruca peregrina Clusj.</i>	651		<i>Esula.</i>	1838	<i>Festuca.</i>
<i>Eruca silvestris.</i>	650		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ficaria.</i>
<i>Eruca silvestris angustifolia.</i>	651		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ficaria grana.</i>
<i>Eruca silvestris Ochros.</i>	465		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ficus.</i>
<i>Eruca silvestris Dodo.</i>	462		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ficus pangendi nona ratio.</i>
<i>Eruca.</i>	468		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ficus vites & temperam. ibid. & 337. 338</i>
<i>Eruca silvestre.</i>	469		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ficus quæ arte persona admodum sunt & in casibus, sicut sensibus pelluntur.</i>
<i>Eryngium.</i>	1458		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ficus Aegyptia.</i>
<i>Eryngium, & Eryngium luteum.</i>	1458		<i>Esula.</i>	1838	<i>Ficus Idaea.</i>
	1458				
<i>Eryngium pusillum Clusj.</i>	1463				

<i>F</i>	
<i>Fadum, Thenet.</i>	1910
<i>Faba seu Fabulum.</i>	451
<i>Faba diversæ in terram maiores & minores producantur & alia atque alia forma.</i>	452
<i>Faba usus & virtus, cum in cibis,</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Ficus Idæa</i> Theophrasti, Alexandrina Plinij.	191	<i>Feniculum aquaticum</i> , Dalecha.	1023	<i>Fucus sine Alga</i> Luribacca. 1574	
<i>Ficus Indica</i>	1353	<i>Feniculum percinum</i> .	745	<i>Fucus sine Phœnis marinus</i> & <i>Al</i>	
<i>Ficus Indica</i> sine Opuntia.	1795	<i>Feniculum tertiosum</i> , Dalec.	749	ga	1569
<i>Ficus inferorum</i> .	1790	<i>Fennigra cum</i> .	480	<i>Fucus sine Alga marina</i> grami-	173
<i>Ficus Nigritarum</i> .	1842	<i>Fennigra cum</i> alterum Dodon.	481	nica.	
<i>Ficus nostris satina</i> .	336	<i>Fennigra cum</i> sativum Matthi.	480	<i>Fucus</i> seu <i>Alga marina</i> , Lobellj.	
<i>Ficus Phœnias</i> .	1840	<i>Fennigra cum</i> siliquifere Dalech.	481	ibid.	
<i>Filago</i> .	1115	<i>Fennigra cum</i> siliquifere Tragi.	350	<i>Fucus marini</i> temperamenta & vi	res.
<i>Filicula</i> & <i>Felicula</i> .	1115 1219	<i>Felinum arboris sanguinis</i> Drac-	1447	ibid.	
<i>Filipendula</i> , <i>Ceanothe multorum</i> .	781	<i>Felinum arboris</i> Dracanis ex In-	1848	<i>Fucus</i> , sine <i>Alga</i> tinctoria. 1572	
<i>Filipendula Alpina</i> .	1158	dis delatum.	1810	<i>Fucus capillatus</i> sine <i>Corallina</i> .	1171
<i>Filiquastrum</i> .	1215	<i>Felinum</i> capry.	1843	<i>Fucus</i> Ferulaceus Lobellj.	1573
<i>Filius ante patrem fructus</i> Lys-	1069	<i>Felinum</i> dulcium Higuera.	1843	<i>Fula</i> .	1702
machij purpurei filiquastrum.	1060	<i>Felinum</i> & <i>felinum</i> Indicum.	1776	<i>Fumaria</i> .	1191
<i>Filix</i> .	1222	<i>Felinum</i> majusculum.	727	<i>Fumaria bulbosa</i> Matthioli.	1191
<i>Filix aquatica</i> , Dodon.	1225	<i>Felinum</i> odoratum quorundam.	986	<i>Fumaria lutea</i> sine montana Co-	1192
<i>Filix arboris</i> , Tragi.	ibid.	<i>Fragaria</i> .	63	tydalis Matthioli.	1192
<i>Filix flore scens</i> , Tragi.	ibid.	<i>Fragaria</i> .	ibid	<i>Fumaria phragmites</i> , Dod.	1192
<i>Filix mas</i> , Matth. 1222. formi-	ibi.	<i>Fraxinea</i> , seu utramque albi,	872	<i>Fumaria species</i> Japcon.	1193
<i>Filix querna</i> & <i>Filix quercus</i> .	12-7	à quibusdā pumila <i>Fraxinus</i> .	872	1194	
<i>Filix saxatilis</i> , Tragi.	1216	<i>Fraxinus</i> , & eiuſmodi genera.	82	<i>Fumus terra officinarum</i> .	1191
<i>Fistula officinar.</i>	160	<i>Fraxinus fraxinæ</i> & pilale.	84	<i>Fungic quercus</i> .	10
<i>Fiumula</i> 1171. Dod. ibid. Matth.	ibid	<i>Fraxinus quibus locis gaudet,</i>	85	<i>Fungi</i> & <i>Tubera</i> 1185. 1186 1187	
<i>Flammula aquatica</i> . 1041. 1042		cuiusque varietates ibid. &	85	<i>Fungus nō est quæ hypocrisis</i> .	124
<i>Flammula a vulgi</i>	1035	<i>Fraxinus ligni vſus extrema pag.</i>	99	<i>Fusarium</i> & <i>Enfaria</i>	170
<i>de Floribus</i> & <i>Cereis</i> .	794	<i>Fraxinus dubia</i> .	1550	<i>Fusaria abietis pars superior.</i>	1153
<i>Flas amellus</i> , Virgilj.	1048	<i>Fritillaria</i>	1550	<i>Fusus agrestis</i> .	1467
<i>Flas amoris</i> , Herbariorum.	870	<i>Fritillus Balsami Peruvian, Ma-</i>	1775		
<i>Flas Agnolia</i> .	1408	nardi.	1775		
<i>Flas canceri</i> , quorundam.	1001	<i>Fritillus chalcogus</i> .	1789		
<i>Flas coccineus</i> .	876	<i>Fritillus</i> & <i>Cortex ad dysenteria</i> .	1788		
<i>Flas Constantinopolitanus</i> , alijs		<i>Fritillus higuera ex Classe</i> .	1844		
<i>Hierosolimitanus</i> , alijs Creti-	819	<i>Fritillus leucoma nūcupatus</i> .	1877		
<i>Flas coronarius</i> Herbariorum.	355	<i>Fritillus sanguinis</i> Dracanis.	1848		
<i>Flas cuculi</i> .	619	<i>Fritillus sub terra nascens</i> .	1876		
<i>Flas cuculi</i> Tragi.	1063	<i>Fritillus varij peregrj</i> .	1859. 860		
<i>Flas & Iacobi</i> , Fuchsj.	575	<i>Fritillus quid.</i>	371		
<i>Flas Iouis</i> .	1408	<i>Fritillus nomen frumento, frumen-</i>	371		
<i>Flas Mechiaean</i> , Monardi.	1901	tum tritico latum patet.	371		
<i>Florum regium multis opinantur</i>		<i>Fritillus morbi</i> .	513		
esse Delphinium.	1743	<i>Fritillus morbi verius quam pe-</i>	47		
<i>Flas sanguineus</i> .	1918	lites, quæ.	371		
<i>Flas Salis</i> .	869	<i>Frumentacea quæ dicuntur</i> .	371		
<i>Flas Solis minor</i> , Lobell.	874	<i>Frumenti genera</i> .	371 373 374		
<i>Flas solis</i> , Matth.	740	<i>Frumentum Canariense</i> .	415		
<i>Flas syriacus</i> .	1624	<i>Frumentum italicum ante cui-</i>			
<i>Flas Trinitatis</i> .	800	us laudatum.	373. quæ cuius ab		
<i>Flas Trollius</i> .	1034	eo dotes.	ibid.		
<i>Flas vicia</i> .	970	<i>Frumentum Sceranicum</i> Ery-			
<i>Feniculum</i> .	663	mum Theop. & seu Plinij.	383		
<i>Feniculum marinum</i> .	1671				
<i>Feniculum siliquifere</i> Louice i.	689				
<i>Feniculum vulgare</i> .	689				

G

<i>G^aiacum quale</i> .	166
<i>Galea</i> .	487
<i>Galea</i> 1893. maior & minor.	
<i>Pena</i> ibid. Acosta.	1894
<i>Galaxias</i> .	1474
<i>Galbanifera Ferula</i> , Lobell.	754.
755	
<i>Galbulus</i> , ita vocatur. Cupressi	571
nux.	
<i>Galea</i> .	975-976
<i>Galega montana</i> Dalecham.	1119
<i>Galeopsis</i> , Fuchsj. ordi.	11085
<i>Galeopsis</i> intera Dalecham.	1248
<i>Galeopsis</i> , vel <i>Calopsis</i> .	1247.
Matth.	ibid.
<i>Galeopsis purpurea</i> , Lobell.	1248
<i>Galium</i> . 1088. laicum, Matth.	
ibid. album, quorundam.	ibid.
<i>Gal a</i> .	15
<i>Galla excrementa quercus</i> . 8. & 9	
<i>Galla quercus</i> fructus à Diap-	
pellatur.	15
<i>Gallium</i> duo genera, Opharisis	
& hominis.	1516
<i>Galla animalis ex seignis</i> .	17
<i>Ex Gal a annona</i> . pestilentis an-	
na bellorum, hyemis, praesagia	
ducuntur.	ibid.
<i>Galla crus apoleij</i> .	416

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Gallitricum.</i>	965	<i>Glandes Platyphilli perfectæ & imperfectæ.</i>	3	<i>Gramen.</i> 1001. <i>aquaticum.</i> ibid.
<i>Gallitricum, sine Sclarea.</i>	966	<i>Glandes Sardiana. 30. Ionis, ibid.</i>		<i>aculeatum.</i> ibid.
<i>Garofinum.</i>	943	<i>Euboica.</i>	ibid.	<i>terrum.</i> 1004. <i>nigrum.</i> ibid.
<i>Garum elens.</i>	ibid.	<i>Glandifera quadam arboris Smi-</i>		<i>gulum.</i> ibid. <i>Parnasi.</i> 1001. 74
<i>Gelæsa Tragi.</i>	940	<i>laxes appellata.</i>	24	<i>nasi duplicata flore.</i> Lobell.
<i>Gelsemium.</i>	1430	<i>Glandifera arborū varia genera.</i>	1	<i>ibid. aliud Parnasi.</i> ibid.
<i>Geminulis.</i>	964	<i>Glandis calix.</i>	15	<i>Gramen aruleatum Matthi.</i> 431
<i>Geniularis.</i>	814	<i>Glandis nomine Latinis omnis fructus continetur.</i>	1	<i>Gramen bulbosum, nodosum.</i> 434
<i>Genipat.</i>	1833	<i>Glandis nomine permulta fructuum genera comprehenduntur.</i>	320	<i>Gramen Cyperoides.</i> 432-438
<i>Geniſſa.</i>	167	<i>Glandium esus apud varias gentes.</i>	13 & 14	<i>Gramen anthoxanthum Dalech.</i>
<i>Geniſſa nominis raris.</i>	168	<i>Glandium praestantissima Castanea.</i>	32	425, 426
<i>Geniſſa angulosa sine vulgaris.</i>		<i>Glaſs.</i> quæ proprie dicuntur.	1	<i>Gramen artem Dalech.</i> 430
172		<i>Glaſs Cerri.</i>	7	<i>Gramen bulbosum Dalechampi.</i>
<i>Geniſſa humilis, sine Tinctorius flas.</i>	174	<i>Glaſs Saberi peſſima.</i>	23	427
<i>Geniſſa minima.</i>	173	<i>Glaſs vnguentaria.</i> 365, 1684		<i>Gramen echinatum Dalechampi.</i>
<i>Geniſſa iluensis.</i>	174	<i>Glaſs vnguentaria filiginea cū fructu, Pen.</i>	1685	432
<i>Geniſſa ſiniſſa.</i>	164	<i>Glaſſum.</i>	499-500	<i>Gramen glanſum Dalechampi.</i>
<i>Geniſſa tinctoria Cluſij.</i>	175	<i>Glaſſatio & cultus.</i>	500	429
<i>Geniſſa in medicis correſſio.</i>	170	<i>Glaſſum montanum, Dalech.</i>	1203	<i>Gramen innocuum Dalechampi.</i>
<i>Geniſſella.</i>	171	<i>Glaſſum Dioſcoridis.</i>	618	424, 425
<i>Gentiana.</i>	1158	<i>Glaſs.</i>	487	<i>Gramen lanatum Dalechampi.</i>
<i>Gentianella. 82. minima latifolia.</i>		<i>Glaſs Cluſij.</i>	488	<i>ibid.</i>
<i>ibid. anguſtiſolia.</i>	829	<i>Glaſs Dodonæi.</i>	487	<i>Gramen leucanthemum Dalech.</i>
<i>Geranium Echierides.</i>	1142	<i>Glaſs vulgaris.</i>	250	425, 426
<i>Geranium.</i>	1175	<i>Glaſon Aceris genus.</i>	94	<i>Gramen minimum Dalechampi.</i>
<i>Geranium batrachoides.</i>	1179	<i>Glabularia.</i>	865	424
<i>Geranium batrachoides alterum longius radicans.</i>	Lobell.	<i>Glua quid.</i>	377	<i>Gramen murorum Dalechampi.</i>
1180		<i>Gluten Albulin Anicenna, Reſina Terbinthina.</i>	62	428
<i>Geranium l. quorundam, Dalech.</i>	1275	<i>Glycerhiza seu Glycerhizan.</i>	247	<i>Gramen nemorum Dalechampi.</i>
1275		<i>Glycerhiza Echinata Dod. ibid.</i>		429
<i>Geranium gramineum Dodon.</i>	1278	<i>Glycerhiza Echinata Matth. ibid.</i>		<i>Gramen pinnatum Dalechampi.</i>
<i>Geranium tuberosum Dod.</i>	1276	<i>Glycerhiza non Echinata, Scythica herba.</i>	248	431
<i>Geranium h. maius des.</i>	1278, 1279	<i>Glycerhiza a quibus locis vel pinrima vel optima noſcatur.</i>	250.	<i>Gramen pratense Dalechampi.</i>
<i>Geranium ſuſum Lobell.</i>	1279	<i>vires.</i>	251	425
<i>Geranium l. Matth.</i>	1275	<i>Glycerhiza radix pro palu Scythia in aquarum penuria.</i>	250	<i>Gramen ſpicatum Dalechampi.</i>
<i>Geranium aliud ſecundum, Matt.</i>	1277	<i>Glycerhiza ſylveſtris. ibid. &</i>	251	<i>Gramen triglach, seu cornu leonum Dalechampi.</i>
Geranium II. Dioſcoridis, III. Matthioli. Peſ columbinus.	1276	<i>Gnaphalium.</i>	1115	439
<i>Geranium IIII. Matth.</i>	1180	<i>Gnaphalium, Matth.</i>	ibid.	<i>Gramen exile.</i> 431
<i>Geranium VI. Matthioli.</i>	ibid.	<i>Gnaphalium marinum.</i>	1187. Dalech. ibid. tomentofum.	<i>Gramen filicem, seu palustre.</i>
<i>Geranium tertium Plinij, Acon muscata.</i>	1277	<i>Gnaphalium montanum Dalech.</i>	116	428
<i>Geronto pegon, sine Saſiſſia Italo rum.</i>	1079	<i>Gnaphalium vulgare, Fuchſij.</i>	1115	<i>Gramen herdeaceum, Halim Thym.</i>
<i>Gerium.</i>	1518	<i>Gnaphalium, sine Linum pratense, Tragi.</i>	102. 6	427
<i>Gerum Alpinum Pena.</i>	687	<i>Gomphana.</i>	540	<i>Gramen Iuncum vel Arundo naceum, quorundam.</i>
<i>Gerum Plinij.</i>	685	<i>Gor.</i>	1838	1001
<i>Gingerber.</i>	1890	<i>Gospion, seu Gofopium.</i>	221	<i>Gramen Leucanthemum.</i> 423
<i>Gingidium.</i>	709	<i>Gramen.</i>	420	<i>Gramen Manna.</i> 414
<i>Gingidium ſeliſi Bancia, Syriacū Lobell.</i>	710			<i>Gramen Manna prius Matthi.</i>
<i>Gingidium Matth.</i>	ibid.			414
<i>Gib.</i>	444 812			<i>Gramen Manna ſecundum Dodon.</i>
<i>Githago.</i>	438			<i>ibid.</i>
<i>Gladium. 1420. Matthioli.</i>	ibid.			<i>Gramen minimum.</i> 432-433
<i>Gladuſ ſpecies a noſtrate diuerſe.</i>	1625			<i>Gramen nodosum.</i> 429

<i>Gramen Parnass. Cordi & Lant- ceri.</i>	1160	<i>Gummi ex Rhus.</i>	109	<i>Helianthe.</i>	84
<i>Gramen polyanthes, Aegilops Pli- ni.</i>	428	<i>Capala.</i>	1875	<i>Helianthemum sine flis. folis. Hef- sopum nemorosus, Dode.</i>	869
<i>Gramen tertium Plinianum.</i>	1128	<i>Gymnocriban.</i>	198	<i>Helianthi species, Pene.</i>	ibid.
<i>Gramen tomentosum, Alopecurus vera Plin. & Theophrasti.</i>	410	<i>Gynecante.</i>	1413	<i>Helicem Ariades quid vocit.</i>	174.
<i>Gramen vulgare Math. Dalech. Lobell. Dod.</i>	421				
<i>Gramen vulgatum pratense.</i>	422				
<i>Gramen foliatum.</i>	434				
<i>Gramen Typhinum.</i>	432. 433				
<i>Gramadille.</i>	1978				
<i>Grana Juniperi.</i>	66				
<i>Grana tinctoria officina quid.</i>	17				
<i>Grana Paradisi.</i>	1810				
<i>Granistiniory duo genera Nona- chis in Mesum.</i>	29				
<i>Grani tinctoria vires & sancta- tes.</i>	30				
<i>Grannum.</i>	27				
<i>Grannum quid.</i>	377				
<i>Grannum Cnidium nō est Clame- le fructus.</i>	1666				
<i>Grannum Cnidium perpetuum vocatur Laurus lauracea.</i>	213				
<i>Grannum Nil.</i>	1425				
<i>Grannum regium.</i>	1850				
<i>Grannum tinctorium, aut flavum.</i>	151				
<i>Gratia Dei.</i>	416 869. 1085				
<i>Gratia Dei Germanica.</i>	1279. 1381				
<i>Gratiola, Matthio.</i>	1085				
<i>Gratiola, recentiorum.</i>	869				
<i>Grossularia, alba, 13. rubra, 13. ni- gra.</i>	133				
<i>Grossus.</i>	335				
<i>Gruina & Grimalis.</i>	1275				
<i>Gruinalis, Dod.</i>	1278				
<i>Guaacatane Atowardu.</i>	1906				
<i>Guaiaicum Patavinum.</i>	350				
<i>Guaiana.</i>	1836				
<i>Guaianabum.</i>	1835				
<i>Guaianabum fructus, Onitida ibid.</i>					
<i>Guaianum seu Gaiacum.</i>	1749				
<i>Guaibara Lepry.</i>	1810				
<i>Gulaca. F. f. f. calcaus, in Nuce quid.</i>	321				
<i>Gummi ex Acaciae tellio.</i>	164				
<i>Gummi Arabicum officina di- lum.</i>	ibid.				
<i>Gummi dragaganti.</i>	1477				
<i>Gummi sicconi officinarum.</i>	113				
<i>Gummi Juniperinum.</i>	68. 69				
<i>Gummi majus f. f. f. similimum in Chendrilla ramalis.</i>	516				
<i>Gummi non ligni igni lignatur, ni- si additis alijs, sed citatur.</i>	133				
<i>Gummi optimum ex Spina Ae- gyptia.</i>	160				
<i>Gummi ad podagram.</i>	1793				
		<i>H</i>			
		<i>Hachis arbor Indica.</i>	151		
		<i>Haldadi Serapioni & A- nucenna, Lycium.</i>	151		
		<i>Hairi.</i>	1844		
		<i>Hamaderen Theophrasti.</i>	481		
		<i>Halicacabum.</i>	596. 598		
		<i>Halicacabum peregrinum, seu F- siccata repens iuchij.</i>	598		
		<i>Halicacabum peregrinum sine F- siccata repens Mats.</i>	ibid.		
		<i>Halicacabum.</i>	1719		
		<i>Halmatia.</i>	295		
		<i>Halmus. 129. eius historia contra- versa.</i>	ibid.		
		<i>Halmus verus Dalechamp.</i>	265		
		<i>Halmus vulgaris Matth.</i>	552		
		<i>Haliphilus. & 7 unde dila 7</i>			
		<i>Haliphilus Sequanorum.</i>	ibid.		
		<i>Halmades Olina que.</i>	344		
		<i>Hamamelis quare sic dila.</i>	1. 8		
		<i>Hamamelis Sibeni.</i>	202		
		<i>Hammay arbor.</i>	1846		
		<i>Haplophilis Metello qui dican- tur.</i>	518		
		<i>Harar seu Juniperum, maior & minor.</i>	184		
		<i>Harmala.</i>	972		
		<i>Harmala Syriaca.</i>	1669		
		<i>Hastularegia.</i>	1588		
		<i>Hastula Regia, sine Aphodelos.</i>	1588		
		<i>Matthio.</i>	1588		
		<i>Hastig, Serapioni.</i>	1687		
		<i>Hedera tria genera Theophr.</i>	1221		
		<i>Hedera arboris Matthio.</i>	1418		
		<i>Hedera Ciliffa.</i>	1421		
		<i>Hedera Dioscoridis Dalechp.</i>	1420		
		<i>Hedera Helix Matth.</i>	1419		
		<i>Hedera mollis.</i>	1310. 1424		
		<i>Hedera terrestris.</i>	1100		
		<i>Hedera terrestris Malacocissis, Mat.</i>	1321		
		<i>Hedysmos sine Cichorium luteu Dodan.</i>	564		
		<i>Hedysmos Dalec.</i>	564		
		<i>Hedysarum.</i>	444		
		<i>Hedysarum Dod. I.</i>	445		
		<i>Hedysarum alterum Diodora. ibi.</i>			
		<i>Hedysarum Dodan III.</i>	ibid.		
		<i>Hedysarum alterum, Clypeatum Lobell.</i>	446		
		<i>Hedysarum maius, sine Securida- ca; Matth.</i>	444		
		<i>Hedysarum minus Matth.</i>	445		
		<i>Hedysarum minimum.</i>	446		
		<i>Helennium. 867. minus Dioscori.</i>	868		
				<i>Helianthe.</i>	84
				<i>Helianthemum sine flis. folis. Hef- sopum nemorosus, Dode.</i>	869
				<i>Helianthi species, Pene.</i>	ibid.
				<i>Helicem Ariades quid vocit.</i>	174.
				<i>Helicem.</i>	1241
				<i>Helicem Cistampes.</i>	1242
				<i>Matth. 1414. Dod.</i>	ibid.
				<i>Hemeris Idaeorum.</i>	4
				<i>Hemerocallis.</i>	1497
				<i>Hemerocallis Constantino polata- mū phoenice unico flore.</i>	1500
				<i>Hemerocallis Herbariorum.</i>	1493.
				<i>Hemerocallis prior & altera Mas ibid.</i>	1498
				<i>Hemerocallis Palentina.</i>	1499
				<i>Hemeroc.</i>	1286
				<i>Hemianthis.</i>	1161. 1227
				<i>Hemiontis altera Dalecha.</i>	1218
				<i>Hemiontis Matth.</i>	1217
				<i>Hemiontis minor Pene.</i>	1118
				<i>Hemiontis.</i>	1215
				<i>Hepatica.</i>	1083
				<i>Hepatica aquatica, sine palustris.</i>	
				<i>Hepatica sine Hepaticum Trifo- lum.</i>	1274
				<i>Hepatica polyanthes Lobell.</i>	ibid.
				<i>Hepaticorum & unde dila.</i>	1251
				<i>Heraclis.</i>	1241
				<i>Heraclitis nux.</i>	30
				<i>Heraclion.</i>	1009
				<i>Herba alba.</i>	4. 2
				<i>Herba alba Pliny.</i>	ibid.
				<i>Herba S. Antoni.</i>	974 & 1359.
				<i>Herba aurea Narbonnefium.</i>	741
				<i>Herba aurea Narbonnefium.</i>	1273
				<i>Herba aurea, Pene & Lobell.</i>	ibid.
				<i>Herba S. Barbara.</i>	650
				<i>Herba Belladonna dila forma.</i>	1741
				<i>Herba cancri, recentiorum.</i>	1349
				<i>Herba calia.</i>	835
				<i>Herba Christi, aut natalitia.</i>	1619
				<i>Herba cinerea.</i>	651
				<i>Herba felis, Mat.</i>	508

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Herba fortis.</i>	1270	<i>Herba venti.</i>	841849	<i>Hirci Babula.</i>	418
<i>Herba Hungarica.</i>	497	<i>Herba venti, Parietaria Cordi, Si-</i>		<i>Hyris spina.</i>	1470
<i>Herba S. Jacobi</i>	575	<i>deritis genus.</i>	1120	<i>Hirculus.</i>	
<i>Herbampia Plinij.</i>	1115. 1125.	<i>Hermodactylus officinarum.</i>	1573	<i>Hirundinaria</i>	
1187		<i>Hermodactylus Italorum.</i>	1567	<i>Hirudinaria Herbarum.</i>	1144
<i>Herbatannus infantis.</i>	1906	<i>Hermodactylus quorundam.</i>		<i>Hirundinaria mar.</i>	1149
<i>Herba ludaea.</i>	1118	1612.		<i>Hirundinaria minor.</i>	48
<i>Herbaliter, qui & Flus tinell-</i>		<i>Hermodactylus verus Matth.</i>		<i>Hircia sine lacte America.</i>	
<i>rim.</i>	174-51	1573		<i>Holcus Plinij</i>	427 18
<i>Herba Malucana.</i>	1916	<i>Herniaria, sive Herba Turca.</i>		<i>Holofibrum. 987. altera. ibid.</i>	
<i>Herba margarita.</i>	851	1126		<i>Holofium. 1188. Matthioli. ibid.</i>	
<i>Herba D. Aetaria.</i>	678	<i>Hesperis Theophrasti quorundam</i>		<i>quorundam.</i>	ibid.
<i>Herba amara marina ob salu-</i>		1360		<i>Holofium Leonici.</i>	1189
<i>tem insitam non tam refrige-</i>		<i>Helich Americum.</i>	1907	<i>Holofium Ruellij.</i>	412
<i>re, quam adstringere cogere-</i>		<i>Hibiscum Pasticata.</i>	721	<i>Holofium Salmanticense, Clusij.</i>	1189
<i>que videntur.</i>	1573	<i>Hierabotan.</i>	1334	<i>Hordelum, Marardij.</i>	1906
<i>Herba mimosia.</i>	1916	<i>Hierabotan mar. & fuma, De</i>		<i>Horden.</i>	1918
<i>Herbamiliaria.</i>	412	<i>denai.</i>	1337	<i>Horden diffusum, ibid. pulfi-</i>	
<i>Herbamirabilis.</i>	540	<i>Hieracium.</i>	549	<i>stium.</i>	159
<i>Herba de Monteferrato.</i>	16-8	<i>Hieracium macrocaulon Dalech.</i>		<i>Hordenmin cibus antiquissimum.</i>	401
<i>Herba mara.</i>	1339	570		<i>Horden mundum.</i>	ibid.
<i>Herba merem aut vitam in mor-</i>		<i>Hieracium magnum Dalecham-</i>		<i>Horden minimum.</i>	416
<i>bis prænunciant.</i>	1921	569		<i>Horminum. 964. filiostris Mar.</i>	
<i>Herba muralis.</i>	1-41	<i>Hieracium minus Dalechampi.</i>		<i>& Fuchij.</i>	595
<i>Herba in Cannarijs insula, Ori-</i>		<i>maini Matth.</i>	ibid.	<i>Hyacinthus.</i>	254, 256, 113
<i>celle dista.</i>	175	<i>Hieracium Matthioli, Dodonai.</i>		<i>Hyacinthus albus, seu femina.</i>	
<i>Herba paradisi & arthetica</i>	833	561		<i>Fuchij.</i>	118
<i>Herba Paridis.</i>	1737	<i>Hieracium Narbonense falcata fi-</i>		<i>Hyacinthus autumnalis, Dodon.</i>	1513
<i>Herba Petri.</i>	1312	<i>liqua Lobelij.</i>	570	<i>Hyacinthus autumnalis maior, Te-</i>	
<i>Herbapedicularis & pituitaria.</i>		<i>Hieracium Sabaudum Pena &</i>		<i>phum Theoph.</i>	1514
1629		<i>Lobelij.</i>	570	<i>Hyacinthus brachialis, Orientalis</i>	
<i>Herba S. Petri.</i>	1671	<i>Hilum in faba quid.</i>	492	<i>Gemma ex Lobello.</i>	1518
<i>Herba Phonica.</i>	416	<i>Hippa.</i>	1232	<i>Hyacinthus caruleus maior, Fuch-</i>	
<i>Herbapudica, Herba asclimome-</i>		<i>Hippa herba à Plinio ex Theo-</i>		<i>fij.</i>	1111
<i>ne.</i>	1878	<i>phragis pro Hippae hoc effica-</i>		<i>Hyacinthus caruleus minor</i>	
<i>Herbapulicaria.</i>	1-72	<i>cis equius, incipit consilia. 250</i>		<i>Fuchij.</i>	11
<i>Herba Regina.</i>	1595	<i>Hippobates. Hippobasium 1485.</i>		<i>Hyacinthus cornutus albus, Loh.</i>	1412
<i>Herba ad renem morbos vitulis.</i>		1701		<i>Hyacinthus compositi maioris gen-</i>	
19-9		<i>Hippobates Dioscorid.</i>	1567	<i>na effigies, Lob.</i>	ibid.
<i>Herba Roberti.</i>	1120	<i>Hippobates Dod ex codice Casa-</i>		<i>Hyacinthus cornutus albus, Loh.</i>	1412
<i>Herba Roberti, Gerardij III. genus</i>		<i>rea.</i>	1705	<i>Hyacinthus compositi maioris gen-</i>	
<i>Matth.</i>	1278	<i>Hippobasium quorundam, Da-</i>		<i>na effigies, Lob.</i>	ibid.
<i>Herba ad rupturas vitilis.</i>	1949	<i>lechampi.</i>	1486	<i>Hyacinthus cornutus minor Li-</i>	
<i>Herba sacra.</i>	1314	<i>Hippoglossum Matthioli.</i>	205	<i>bine Plinij.</i>	1711
<i>Herba sacra, Agrippa.</i>	881	<i>Hippoglossum Valentini Clusij</i>		<i>Hyacinthus Dioscorid. non scop-</i>	
<i>Herba sacra quorundam.</i>	1335	1681		<i>tus, Dodonaei.</i>	1527
<i>Herba sagittalis.</i>	1334	<i>Hippopapatum.</i>	600	<i>Hyacinthus Dodon.</i>	ibid.
<i>Herba sinila.</i>	1895	<i>Hippopapatum hortenfe.</i>	607	<i>Hyacinthus latifolius, T. dila-</i>	
<i>Herba scelerata, Apulei.</i>	1027	<i>Hippopapatum ratundo folio, Lo-</i>		<i>1516</i>	
<i>Herba scripta, Angulera.</i>	1273	<i>bellij.</i>	606	<i>Hyacinthus Libanici Lob.</i>	11
<i>Herba stillaria.</i>	870	<i>Hippopapatum satinum latifo-</i>		<i>Hyacinthus maior, Bulbon filio-</i>	
<i>Herba Symeonis.</i>	193	<i>lium, Lobelij.</i>	ibid.	<i>stris.</i>	17
<i>Herba terribilis Narbonensium.</i>		<i>Hippopapatum silvestre Matth.</i>		<i>Hyacinthus Orientalis Graeci.</i>	
1671 1680		ibid.		<i>Label y.</i>	
<i>Herba Trinitatis.</i>	800	<i>Hippopapathorum vires & tem-</i>		<i>Hyacinthus Orientalis minor pe-</i>	
<i>Herba Trinitatis. Matthioli.</i>		<i>peramenta.</i>	907	<i>hambros, Lob.</i>	ibid.
1274		<i>Hippomeratrum.</i>	688. 690	<i>Hyacinthus Orientalis i. Mar.</i>	
<i>Herba Trinitatis, quorundam.</i>		<i>Hippocelinum.</i>	700. 706	<i>1509 11. cinsid.</i>	ibid.
1095		<i>Hippocelinum Matth. sine Leni-</i>		<i>Hyacinthus Oudij.</i>	1494
<i>Herba Turca.</i>	1116	<i>stium vulgare.</i>	703	<i>Hyacinthus poetarum latifolius,</i>	
<i>Herbavina, Aegla</i>	1915	<i>Hippuris.</i>	1069	<i>Lob.</i>	

INDEX HISTORIE PLANTARVM

<i>Lob.</i>	1614.1615	<i>& Lobel.</i>	936	<i>Idea viti.</i>	808
<i>Hyacinthus poeticus Hyfpanicus,</i>		<i>Hyfpanus montana, Fuchfij.</i>	934.	<i>Isosminum.</i>	1450
<i>Labell.</i>	1615	<i>Arabum flore rub. o., Labellij.</i>		<i>Ilex Gallia Narbonenfis & Pro-</i>	
<i>Hyacinthus poeticus Hyfpanicus,</i>		<i>ibid.</i>		<i>nensis frequentiffima.</i>	21
<i>Lob.</i>	1580	<i>Hyfpanus nemorenfis.</i>	849 1100	<i>Ilex maxime atatem ferit ibid.</i>	
<i>Hyacinthus poeticus Pena & Lob.</i>		<i>Hyfpanus nemorenfis & laica.</i>		<i>Ilexcamunus filiciftrum profun-</i>	
1510		936		<i>difsimas radices habet. ibid.</i>	
<i>Hyacinthus flellaris albicans Lo-</i>		<i>Hyfpanus nemorenfis quorundam.</i>		<i>Ilex rufus in medicam. ibid. &</i>	
<i>bell.</i>	1514	1564		<i>ad materiam.</i>	23
<i>Hyacinthus flellaris alium Lufita-</i>		<i>Hyfpanus fatium vulgari.</i>	931.	<i>Ilex vocatur hiberfemina</i>	23
<i>linis.</i>	ibid.	<i>vulgari ex codice Cafarea.</i>		<i>Ilicu pro habere rufus.</i>	ibid.
<i>Hydrolapathum.</i>	600	<i>ibid.</i>		<i>Ilex aquifolia.</i>	27
<i>Hydrolapathum maius Lobelij.</i>		<i>Hymenrahe.</i>	1813	<i>Illecebra.</i>	1128.1110
604				<i>Imperatoria.</i>	726
<i>Hydrolapathum minus Labellij.</i>				<i>Impetratoria Matthioli.</i>	737
605				<i>Impetrax.</i>	718
<i>Hydropiper.</i>	1038			<i>Impia Plinij.</i>	1125.1187
<i>Hydropiper Lancculatum. ibid.</i>		I <i>Are in Perfia mari vocatur Co-</i>		<i>Iguame.</i>	1909
<i>Hydropiper, Matth. ibid. alteru,</i>		<i>ra lum.</i>	1371	<i>Inguinalis</i>	819
<i>Dalechampi.</i>	1039	<i>laca, Acclia.</i>	1898	<i>Intubus & Intubum</i>	554
<i>Pseudocampariorum femina, Dodonai.</i>		<i>laca 192 montana Dalecham-</i>		<i>Intubum cryfium.</i>	557
<i>ibid. aliud, Dalech.</i>	1040	<i>ibid. albae fidei ibid maior</i>		<i>Intubum fatium anguifolium</i>	
<i>Hyphar & Arcadum.</i>	17	<i>Labellij.</i>	ibid.	<i>Dodo</i>	516
<i>Hypocum</i>	1081.1715	<i>Iacea humilis, Hieracij folio, Pen.</i>		<i>Intubum fatium anguifolium</i>	
<i>Hypocum Matth 441 eufdem</i>		1191		<i>Matth.</i>	ibid.
<i>non fine error.</i>	595	<i>Iacea incana, Dalech.</i>	1594	<i>Intubif fatium latifolium ibid.</i>	
<i>Hypericum 1153 Matthi.</i>	ibid.	<i>Iaceaincana folio Olea Labellij.</i>		<i>Intubum filiciftrum anguifolium</i>	
<i>Hypericum humi fitatum, Clafij.</i>		1191		<i>Matthioli.</i>	557
1154		<i>Iacea lata Clafij.</i>	1474	<i>Intubum filiciftrum latifolium, C-</i>	
<i>Hypericum Syriacum & Alexā-</i>		<i>Iacea maior lata, Pena.</i>	1193	<i>chorum fatium Matthioli, Se-</i>	
<i>drinum Labellij 155.</i>		<i>Iaceamontana Narbonenfis Lo-</i>		<i>vi fatia Labelij.</i>	ibid.
<i>Hypericum tomentofum, Labellij.</i>		<i>bellij.</i>	1191	<i>Intata Gaze.</i>	155
1154		<i>Iacea nigra Dodon.</i>	1098	<i>Intula, & Intula Campana.</i>	867
<i>Hyphnu.</i>	1323	<i>Iacea rubra maior lacimofa</i>		<i>Ionis Barba.</i>	194.1128
<i>Hypocheriu.</i>	563	<i>ibid.</i>		<i>Ionis flus.</i>	1408
<i>Hypocitii. 113 unde ducatur.</i>		<i>Iacoba, fine Senetio maior.</i>		<i>Ionis glandes.</i>	30
<i>114, cuius genera ibid Fungus</i>		<i>5-4 575</i>		<i>Iphyrum Theophr.</i>	806
<i>non efl vt quidam volunt</i>		<i>Iacoba marina Dodonai.</i>	184	<i>Iringue officinarum.</i>	1458
<i>ibid.</i>		<i>Iacobaamarissima, Pena.</i>	183	<i>Iris 652. Matth.</i>	618
<i>Hypociftia vulgata adulterina efl</i>		<i>Iagra</i>	1-62	<i>Iris alura Matthioli.</i>	ibid.
124		<i>Iambolans.</i>	1873	<i>Iris Plinij.</i>	383
<i>Hypogloffum.</i>	206 207	<i>Iambus Acclia.</i>	1872	<i>Iru.</i>	254.1609
<i>Hypogloffa</i>	208	<i>Iangemat. 1874. Iafum Plinij.</i>		<i>Iru & Irees vulgata Herbario-</i>	
<i>Hypoglofidium.</i>	ibid.	<i>Iafme montana</i>	1104	<i>difim, Incepta.</i>	1611
<i>Hypomeleides.</i>	99	<i>Iafminum album Matthioli.</i>		<i>Iru agreflu.</i>	1570
<i>Hypofcyamus.</i>	1716	1430		<i>Iru anguifolia flore laeo, Claf</i>	
<i>Hypofcyamus peregrinus, Dalecha.</i>		<i>Iafminum luteum.</i>	1187	1611	
1718		<i>Iafminum panicum Dalecham.</i>		<i>Iru biflora, Clafij & Dodonai.</i>	
<i>Hypofcyamus, Mar.</i>	1716	1431		1612. 613	
<i>Hypofcyamus albus, Matthioli.</i>		<i>Iafminum rubrum Dalecham.</i>		<i>Iru bulbifa anguifolia flore va-</i>	
1717		1412.1433		<i>rio, Clafij & Dodon.</i>	1615
<i>Hypofcyamus niger Matthioli luteu,</i>		<i>Iberici.</i>	665	<i>Iru bulbifalatifolia. Clafij. 1615.</i>	
<i>Dodo</i>	ibid.	<i>Iberu, Fuchfij & Dod. Naffurtu</i>		1614	
<i>Hypofcyamus 111, Matthioli</i>	1718	<i>filiciftrum.</i>	655	<i>Iris Palmaria maior.</i>	ibid.
<i>Hypofcyamus Peruvianus.</i>	618	<i>Iberu, fine Lepidium Matthioli,</i>		<i>Iru domeftica Matthioli.</i>	
<i>Hyofnu Plinij.</i>	1067	666		1610	
<i>Hyofnu & Hyfpanum vulgare.</i>		<i>Ibige.</i>	1159	<i>Iru flore ceruleo polyanthes, Lo-</i>	
931		<i>Ibicus.</i>	589 591	<i>bellij.</i>	1613. 614
<i>Hyfpanum folio Origani, Dalecha.</i>		<i>Idea Ficu noftre, vulgo Franga-</i>		<i>Iru lutea variata.</i>	1616
933		<i>la.</i>	200	<i>Iru perfoliata & faxatilia.</i>	1611
<i>Hyfpanum gemina Gracorum, Pen.</i>		<i>Idea radix.</i>	192		

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Tris siluestris, Matthioli. *ibid.*
Tris siluestris altera, Matthioli.
ibid.
Tris tuberosa. 1573
Tris tuberosa, Dod. 1612. 1613
Tris. 499
Tris siluestris. *ibid.*
Tris siluestris Matthioli. *ibid.*
Tris siluestris Lob. *accaria* *pubi*
da. 500
Tris in Quercu & Nuce arbore
quid. 324
Tris. 414
Tris. 1595
Tris. 1463
Tris placens. 1571
Tris. 1118
Tris, vel *ut* *alg.* *Osef.* 131. 132.
133
Tris, Dodon. 1910. Matthioli.
ibid.
Tris arthetica. 1159
Tris muscata. 955
Tris muscata *Neonipelicum*.
1148
Tris muscata officinarum 1159
Tris sine Hircia America 717
Tris & Inglandes. 30. 310
Tris officinar. 1156
Tris Salimanticensis, Clusij.
1185
Tris. 984
Tris floridus, Matth. 1019
Tris lenis 984. *Lenis & oxy-*
chrenis. Dodon. 985 *melan-*
cranis *ibid.* *clanatus*, Dale h.
985. *Lenis*. 988. *floridus* *Mat*
thioli. 989 *officinar* *ibid.*
Tris marinus *gramineus*. 1395.
1396
Tris odoratus 1884
Tris odoratus Matthioli. 1885
Tris quadratus, Celsi, *triangu-*
lus & angulosus Plinij. 991
Tris Spartum *Gracia non no-*
uit 168
Tris *cinsque* *genera*. 38. 66.
67
Tris lacryma, Vernix *hodie*.
67.
Tris locus, *tempus*, *vires*.
63. 69
Tris carbo accensus & sine
cinere stratus, *ignis* *integrus* *an*
non *facit*. 69
Tris Rosa. 1491
Tris officinar. 1716
Tris (aly *ixine)* *Chamaeleon* *est* *al-*
bis. 1453
Tris. 1452. 1457. 1458
Tris planta *grinosa*, *que* *&* *Cha-*

malus albus, *Massiliem* *fi-*
rens 64
K
Alis. 1377. *magis*, *Pene* *ibi*.
maius, *iusd.* *ibid.*
Kali *Dalecha*. 1378
Kali *geusculatum* *Pena*. *ibid.*
Kermes *Arabum*. 178
L
Labrum. 103. 110
Labrum alacrum 104
Labrum veneris. 1447. Matthioli.
ibid.
Labrusca. 1406
Lac Pinipinichi. 1790
Lacutha *Theophrasti*. 151
Lacca. 1780
Lacca cum suis bacillis. *ibid.*
Lactaria herba. 1642. 1643
Lactuca *545* *eius* *genera*. *ibid.*
Lactuca crispata *Dod & Fuch.* 546
Lactuca crispata *Mat.* *ibi*
Lactuca leporina *Apulij*. 571
Lactuca marina 1172
Lactuca marina, *&* *caprina*. 1642
1643
Lactuca sativa. 546
Lactuca sativa vires & tempera-
menta. 548
Lactuca siluestris vera *Dalech.*
546.
Lactuca siluestris faculrater. 549
Lactuca siluestris *Matth.* 546
Lactuca siluestris pumila. 1919
Lactuca. 571
Lactuca *in* *Cypro*, *ex* *qua* *La-*
danium. 178
Ladanum *loci* *natales*, *electio*, *vires*,
temperamenta. 231. 232
Ladanum *cinsque* *apud* *veteres*
colligendi *modi*. 227. *hodie* *in*
Creta. 230
Ladanum segretum. 443
Ladum. 227
Lagopus. 441
Lagopus alicia angustifolia 442.
443
Lagopus maxima. *ibid.*
Lagopus vulgaris *Matthioli*. 441
Lagopus. *ibid.*
Lale Chalcedanicum. 1491
Lalifolia *Pliny*. 2
Lama, *Massiliensis*. 64
Laminum 1146. *Fuchij*. *ibid.*
Lampana. 541

Lampana *Dodon*. 66
Lampana *Matth.* *ibid.*
Lampana vera *al.* *Theopha-*
sti *Erysimum* *Dodon.* 102
Lana pratenfis. 116
Lana pratenfis, *Herbariorum*.
1016
Laneria. 1191
Laneria, *querendum*. 810
Lanaria herba, *Gaz.* 811
Lanica *Ob* *ibid.* 1007
Lanceolata officinarum, *Lanceola*
vulgi. 1104
Lapathum acutum *Officinarum*.
602
Lapathi siluestris secundum ge-
nera. 11
Lapathi siluestris tertium *genera*.
ibid. *&* 603
Lapathi siluestris quartum *genera*.
Dalech. 603
Lapathum & Lapathum. 600
Lapathum sativum. 600
Lapathum sativum *Dioscoridi*
606
Lapathum siluestre. 609
Lapathum, *nunc* *Beta* *agrestis*. 511
Lapathum vires & tempera-
ta. 607
Lappago. 1451
Lappa Bearia. 762
Lappa maior, *officinarum* 1014.
Matth. *ibid.*
Lappa minor *officinarum*. *Lappa* *minor*.
116
Lappula rustica, *Elatine* *Tragi*.
1240
Lapsana. 11
Laricem *ignem* *non* *accipere* *sed*
sum. 15
Larigna lacryma. 51
Larix & larix. 11
Larix ignota *Theophrasti* 4
Larix *nusquam* *in* *Gracia* *nata*
tur. 41
Larix *unius* *tantum* *generis* *est*.
43
Laser, *Silphij* *succus*. 719. 720
Laserpitium. 717
Laserpitium *Pena*. 718
Lassulata. 608
Lathyrus. 1617
Lathyrus *Matthioli*. *ibid.*
Lathyrus minor, *Dalecha*. *ibid.*
Lathyrus 270
Lathyrus sativus angustifolius.
ibid.
Lathyrus sativus *al.* *officinarum*, *Ch-*
amaeleon *Matth.* 270
Lathyrus *in* *Gracia* *natus* *est*.
17
Lathyrus *in* *Gracia* *natus* *est*.
171

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Lauandula, sine Lauandula.</i> 919	<i>Lepidium Matthioli.</i> 666	<i>Lignum semp ruinum.</i> 150
<i>Lauandula, sine Lauandula</i> 9 9	<i>Lepidium Pauli & Plinij.</i> <i>ibid.</i>	<i>Lignifitum Matth.</i> 744
<i>femina ibid. mai. 920. multi-</i>	<i>Leporij cuminum.</i> 441	<i>Lignifitum alterum, Lob.</i> <i>ibid.</i>
<i>fido folio Clusij.</i> <i>ibid.</i>	<i>Leporis palatum.</i> 571	<i>Lignifitum, magna que super eo</i>
<i>Lauandula vulgo vocata.</i> 1365	<i>Lencacantha.</i> 1463	<i>& Cypro sine eadem sint, sine</i>
<i>Laurer.</i> 1091	<i>Lencacantha Menfeliensium, Da</i>	<i>diuersa continentur.</i> 152
<i>Laurola femina, Chamaedaph-</i>	<i>lechamp.</i> 1465	<i>Lignifitum nigrum, Olumella.</i> 1412
<i>ne mulierum.</i> 111	<i>Lencacantha quorundam.</i> 1464	<i>Lilac Mart.</i> 355
<i>Lauricola, aut Lauraga.</i> 832	<i>Lencacantha & Lencanthemum.</i>	<i>Liloneariffum latens Bononiensis</i>
<i>Laurola officin. & Herbarier.</i>	968	<i>Lob</i> 15
119	<i>Lencas Plinij.</i> 679	<i>Liloneariffum pelyanchis, Lobell.</i>
<i>Laurum lita genera.</i> 205	<i>Leucena</i> 30	1584
<i>Laurocerasus.</i> 348	<i>Leuceron.</i> 1344	<i>Lilium Aegyptium</i> 457
<i>Laurum.</i> 351	<i>Leucographus.</i> 1474-1475	<i>Lilium album Matthioli.</i> 1492
<i>Laurum Alexandrina.</i> 208	<i>Leucopragu Plinij.</i> 1271	<i>Lilium Alexandrianum.</i> 1182
<i>Laurum diuinatrix arbor.</i> 353	<i>Leucog multa genera.</i> 271	<i>Lilium cannallium.</i> 838
<i>de Lauru Fraxinea Manardi</i>	<i>Leucoium</i> 801, 1309	<i>Lilium conualium.</i> 1574
<i>quid sentendum.</i> 205	<i>Leucium album 802. album &</i>	<i>Lilium cruciatum bulbet gerens,</i>
<i>Laurum fylvestris.</i> 110	<i>purpureum Matth ibid. autem</i>	<i>Lob 1494. aliud cruciatum eiusd.</i>
<i>Laurum Taxa.</i> 205	<i>eiusdem.</i> <i>ibid.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Laurum Timu.</i> 203, 204	<i>Leucoium bulbosum.</i> 1526	<i>Lilium inter flumina.</i> 1487
<i>Ledifpecies Bantridui.</i> 231	<i>Leucoium bulbosum minus: anti-</i>	<i>Lilium non bulbosum Hemerocal-</i>
<i>Ledum.</i> 127	<i>nale Dodonai, & Clusij.</i> 1517	<i>lu Dodonai.</i> 1499
<i>Legumina quid.</i> 407	<i>Leucoium marinum.</i> 1183	<i>Lily viret & temperam.</i> 1496
<i>Legumina unde dicta.</i> 449	<i>Leucoium maritimum Dalecha.</i>	<i>Lilium Persicum, Lobell.</i> 1495
<i>Legumina omnia spiritum & hu-</i>	1160	<i>Lilium polyrrhizon Agyreus, Pha-</i>
<i>merum impurum ingenerant</i>	<i>Leucoium maritimum minus. Da</i>	<i>langum quorundam.</i> 1496
<i>corporibus, atque hanc ob cau-</i>	<i>lechamp.</i> <i>ibid.</i>	<i>Lilium purpuratum maius, Dado,</i>
<i>sam ad venerem locuant.</i> 454	<i>Leucoium maritimum alterum la-</i>	<i>1493</i>
<i>Lemna, Theophr.</i> 1014	<i>risolium, Lobellij.</i> <i>ibid.</i>	<i>Lilium rubens quod Graci Crin.</i>
<i>Lens & Lenticula.</i> 475	<i>Leucoium Parauinum marinum,</i>	<i>1492</i>
<i>Lenticula marina Scrapionij.</i>	<i>Lobel.</i> 651	<i>Lilium rubrum, nsp bulbosum.</i>
1196	<i>Leucoium panicum. Fuchsy.</i> 803	1499
<i>Lenticula marina Scrapionij, &</i>	<i>Leucocarposolium</i> 1527	<i>Lilium siue nigre.</i> 1491, 1498
<i>Fua marina quorundam</i> 1197	<i>Leucifium vulgare.</i> 703	<i>Limeum Plinij.</i> 1736
<i>Lenticula marina ferratis folijs</i>	<i>Libadian.</i> 1186	<i>Limeum pardalanchis genus v-</i>
<i>ob</i> 1397-1398	<i>Libanotis.</i> 763	<i>no tantum folia Da cob.</i> 378
<i>Lenticula palustris, Lenticularia</i>	<i>Libanotis II. Dodonai. Dancill.</i>	<i>Limeum alterum triplicifolia.</i> 1739
<i>sen i Lenticulaque officin</i> 1014	<i>Fuchsy</i> 765	<i>Limeusium & Limeum.</i> 1186
<i>Matthioli. palustris altera e-</i>	<i>Libanotis III Dodon.</i> <i>ibid.</i>	<i>Limonites.</i> 1186
<i>iusdem</i> 1015	<i>Libanotis sine Rosmarinum Mat</i>	<i>Limonites.</i> 1838
<i>Lentifera bacca edules futura cen-</i>	<i>thio.</i> 764	<i>Limonia Malu.</i> 301
<i>duntur</i> 66	<i>Libanotis Theophr maior, Ligu-</i>	<i>Limonium.</i> 1417
<i>Lentiscina denticulipia.</i> 65	<i>ficum II Mat.</i> 766	<i>Limonium 1014. Matth. alterum</i>
<i>Lentiscum.</i> 63	<i>Libanotis minima.</i> <i>ibid.</i>	<i>eiusd. ibid. Narteniense parum</i>
<i>Lentifera frequis in Italia. Nar-</i>	<i>Lichen sen limus morbus arboru.</i>	<i>1015 aliud.</i> <i>ibid.</i>
<i>bonij provincie maritima.</i> 64	112	<i>Limonium succu.</i> 302
<i>Lentifera Nubia fassum vobadum</i>	<i>Lichen III. Matthioli, 184. Lobe.</i>	<i>Limon & Lichen morbus arboru.</i>
<i>um officin</i> 63	<i>II & III.</i> <i>ibid.</i>	152
<i>Leo, Carduus serax.</i> 1489	<i>Lichen primus.</i> 1196	<i>Linaria.</i> 1150
<i>Leontice.</i> 1308	<i>Ligna lapidea.</i> 1398	<i>Linaria.</i> 1312
<i>Leontopetalum.</i> 1608	<i>Lignum albei.</i> 1799	<i>Linaria aurea Trag.</i> 1151
<i>Leontopodium.</i> 1181 1142	<i>Lignum aromaticum, lignum ad</i>	<i>Linaria cerulea Dale. b.</i> 1151
<i>Leontopodium Leoniceri.</i> 143	<i>nephritidum.</i> 1788	<i>Linaria magna Schneider.</i> 1333
<i>Leontopodium Mart.</i> 1343	<i>Lignum Colubrinum 1911. I. & II</i>	<i>Linaria minor i Alecha.</i> 1151
<i>Leontopodium paruum Lobellij.</i>	<i>Acasta.</i> <i>ibid.</i>	<i>Linaria odrata Dodon.</i> <i>ibid.</i>
<i>ibid.</i>	<i>Lignum Indicum, 1649 sanctum</i>	<i>Linaria rubra.</i> 866
<i>Lepidum.</i> 665	1750	<i>Linaria tenuifolia Dalech.</i> 1151
<i>Lepidum Aegineta, quorundam.</i>	<i>Lignum Moluccense.</i> 1864	<i>Linaria i alienum Clusij</i> 1151
1198	<i>Lignum nobis Sequanarum.</i> 114	<i>Lingua bovis, sen Lingua bu-</i>
<i>Lepidum annuum, Lob.</i> 1197	<i>Lignum sancta crucis.</i> 19	<i>bula.</i> 578 579

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM

Lingua canis.	1104. 1261	Lotus urbana Dodon.	106	815	
Lingua ceruina	1217	Lotus Aegypti ex codice Casareo.	1076	Lychnis marina.	ibid.
Lingua ceruina officinarum	1118			Lychnis marina Anglica, Pae.	1161
Lingua, Plin. 1037 maior, Dalech.	1077	Lotus Aegypti Theophrasti	1077	Lychnis multiflora Anglica, Pae.	816
cham.	ibid	Lotus filagostris ex codice Casareo.	1076	Lychnis filagostris coronaria.	817
Lingua serpentis, vulgo dicta.	1016. 1047			Lychnis filagostris purpurea, Dodonai.	816
Linum.	1491	Lotus herba.	506	Lychnis filagostris species M. n.	817
Linum album officin.	ibid.	Lotus asperior frutescens Lobell.	510	Lychnis filagostris I. Clusij, Beben album Salmantinum ibi.	817
Linoflartium Theophrasti.	177	herba.	510	Lychnis filagostris altera Clusij, Papanerisumum quorundam.	ibid.
Linoflris recentiorum Lob.	1151	Lotus Enneaphyllos Dalecham.	509	Lychnis filagostris III. Clusij, maulculisstratis.	818
Linoflris.	1626	herba ibid.		Lychnis, filagostris IIII. Clusij.	ibid
Linum.	493	Lotus latifolia Dalechampi berba.	508	Lychnis filagostris F. Clusij, horia Lob.	ibid.
Linum peraphyllum, sine Chama-linum.	493			Lychnis filagostris minima. Fi. Clusij.	819
Linum pratense.	1116	Lotus Libycæ Dalecham herba.	508	Lychnis filagostris quorundam.	1339
Linum pratense, Tragi.	1026			Lychnis.	1198
Linum filagostris primum, Linum maritimum Penz.	494	Lotus, pratensis purpurea herba.	509	Lyc. Tannum ceruleum sine Dolphing. Dodonai.	1742
Linum filagostris secundum, flore albo.	ibid.	Lotus sativa Martii herba.	507	Lycotomum ceruleum parum Dodon.	1741
Linum filagostris tertium.	495	Lotus (herba) sativa altera Mart.		Lycopodium Galei.	625
Luparea Theophrasti seu Calceat vestigia.	214. 215	Nelotus officinarum ibid.		Lycopodium, Dodonai.	1195
Liquidambar & eius oleum.	792	Lotus filagostris Martialis herba ibid.		Lycopis.	1194
Lup. urtica eplasiariorum.	147	Lotus filagostris altera Marthioli herba.	ibid.	Lycopis Anglica Lobell.	1191
Luprasphodelus phoeniceus, Lobell.	1590	Lotus filagostris minor Dodonai herba.	ibid.	Lycopis nigra.	579
Lirium maius, aut Lirium verū, Dod.	1615	Luccola.	1047	Lycopis Lanicri.	1192
Lithospermum 1176, maius Mai.	ibid.	Luch Anicenne.	178	Lysimachia.	1098
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lunaria, sine Lunaria Græca quorundam.	805	Lysimachia, Martii 1090, alius Mart. ibi. pu purcal. Dodon.	ibid.
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lunaria Italica.	1214	Lysimachia carnica.	1096
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lunaria lutea Dalechampi.	ibid.	Lysimachia filagostris, Lob di galericulata, eiusdem.	ibid.
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lunaria maior comitatum 12.	5		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lunaria maior.	1142		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lunaria minor.	132		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lunaria alba minor carnica, Dalecham.	1314		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lunaria quorundam.	1735		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lunaria filagostris.	493		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Luparia.	1613. 1742		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lupinus.	466		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lupulus.	144		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lupulus crepitans.	ibid.		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lupulus salicarius.	ibid.		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lupulus sativus Martii.	466		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lupinus filagostris Lindai.	ibid.		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lutula.	501		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lycium quod spumefum, aptisimum medicina.	149		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lycium, Alpinum, italicum, Hispanicum.	148 149		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lycium quomodo adulteratur.			
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	149 adulteratum à legitimo quibus notis dignoscatur.	150		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lycium officinarum, adulterinum ibi.			
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lycium medicum viret.	ibid.		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lycium Dalecham.	151		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lychnis.	814		
Lithospermum 1176, minus eiusd.	ibid.	Lychnis coronaria, Marthioli.			

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Malinastilla.</i>	1730	<i>Manga amba.</i>	1835	<i>Medica silvestris prior, fructu tri-</i>	
<i>Malum.</i>	402	<i>Mangas.</i>	1870	<i>plex & diversis.</i>	<i>ibi.</i>
<i>Malva.</i>	584	<i>Manihot.</i>	1908	<i>Medica silvestris altera lunata.</i>	
<i>Malva arbor.</i>	586	<i>Manna Thuri.</i>	1753-1755	503	
<i>Malva maior I. Matthioli.</i>	585	<i>Mantzarian.</i>	457	<i>Medica silvestris altera, lunata.</i>	
<i>Malva maior II. Matthioli.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Maraka & Tamaraka.</i>	1845	1214	
<i>Malva maior III. Matthioli.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Margarides.</i>	364	<i>Medum Dioscoridis.</i>	815
<i>Malva palustris.</i>	590	<i>Marsisusumus.</i>	988	<i>Mekembe bene.</i>	1768
<i>Malva Rafia simpliciore flore, Lab-</i>		<i>Marmorata.</i>	1443	<i>Melchicengi Anicenne.</i>	1612
<i>belly.</i>	587	<i>Marenon.</i>	1286	<i>Mel Corbium insuane quamobit.</i>	
<i>Malva Rafia multiplex, Labell.</i>		<i>Marrubium.</i>	12	166	
588		<i>Marrubium. 960 album. 961. Cre-</i>		<i>Mel frugum</i>	471
<i>Malva sativa laciniata Cord.</i>	585	<i>stum. Pena.</i>	962	<i>Mel Panicum venenatum.</i>	206
<i>Malva silvestris maior.</i>	587	<i>Marrubium aquaticum.</i>	1064.	<i>Mel saccu ex flore silg.</i>	1496
<i>Malva silvestris pumila repens.</i>	586 587	1065		<i>Melampyrum.</i>	1116
<i>Malva silvestris à Theophrastu</i>		<i>Marrubium Hispanicum odore</i>		<i>Melampyrum perpusillum latum.</i>	
<i>catu qua Althaa suo nomine</i>		<i>Steechadis, Label y.</i>	684	420	
<i>dicatur.</i>	590	<i>Marrubium nigrum officinarum.</i>		<i>Melampyrum Theophrasti</i>	1178
<i>Malva vulgaris, Matth.</i>	585	1252		<i>Melampyrum sine Tristum vae</i>	
<i>Malva nificu.</i>	590	<i>Marrubium palustre sine aquati-</i>		<i>cium.</i>	419
<i>Malviana, Acoffa.</i>	1517	<i>cum.</i>	1119	<i>Melandryon Pliny.</i>	1186
<i>Malum.</i>	285	<i>Martagon, Matth.</i>	1493	<i>Me andryon Pliny, quarundam.</i>	
<i>Malorum genera præp. infinita.</i>	285	<i>Marum.</i>	883	1080	
		<i>Marum quarundam:</i>	885	<i>Melanium mentanum.</i>	1104
		<i>Marum Cyriacum, Labell.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Melanispermum.</i>	812
		<i>Marum verum, vulgo Malic.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Melanisemon.</i>	968
		<i>ibid.</i>		<i>Melanisium.</i>	812
		<i>Massetum.</i>	717	<i>Melanisium sativum, Matthioli.</i>	
<i>Malus Armenia</i>	297	<i>Massari vna.</i>	1406. 47	812	
<i>Malus canina, iusterrillu.</i>	1725	<i>Massche.</i>	62	<i>Melanisium silvestre.</i>	418
<i>Malus Citra seu Citrea.</i>		<i>Massche Acambice.</i>	64	<i>Melanisium silvestre prius, Mat-</i>	
<i>Malus Cydonia, vel Catenia.</i>	290	<i>Massichos Chia pretium.</i>	<i>ibid.</i>	<i>thioli.</i>	812
<i>Malus Limonia.</i>	301	<i>Massiche non solum Chia (quan-</i>		<i>Melanisium silvestre prius, Mat-</i>	
<i>Malus Medica & Assyria.</i>	298	<i>quæ exprostantissima) verum</i>		<i>thioli, secund. edition.</i>	813
<i>Malus Persica.</i>	293	<i>etiam Italica, atque adeo Hesper-</i>		<i>Melanisium silvestre alterum,</i>	
<i>Malus Panica. 101. eius genera</i>		<i>ita, Indica, Arabica, Panti ibi.</i>		<i>Matth.</i>	<i>ibid.</i>
<i>centrouersa. ibid. locum & vi-</i>		<i>Massche quibus, ubi apumia, &</i>		<i>Melagrus fles, Dodon.</i>	1510
<i>res.</i>	304	<i>quomodo conficiatur</i>	63 64	<i>Melenken.</i>	1843
<i>Malum.</i>	285	<i>Massche nunquam liquida est,</i>		<i>Melica</i>	410. 421
<i>Malus Arthiopia.</i>	1710	<i>sed semper in ipsa arbore spis-</i>		<i>Melilotus. 511. Melilotus corona-</i>	
<i>Malum aureum quod & quare</i>		<i>satur.</i>	69	<i>ta Pena & Lob 508. Melilotus</i>	
<i>dictum</i>	299	<i>Matthet adulteraria.</i>	64	<i>Germanica Fuchij.</i>	508
<i>Malus Epitroica, Latine orbicula</i>		<i>Matthet personata quare dicatur</i>		<i>Melilotus sine Sertua Campana.</i>	
<i>ta.</i>	189	<i>Martelia Empirica.</i>	65	511	
<i>Malus Indica, Acoffa.</i>	1873	<i>Matthet facultates.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Melilotus vulgaris sine Trifolium</i>	
<i>Malum granatum.</i>	303	<i>Matthetum.</i>	747	<i>adortum Dod.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Malum Hesperidum.</i>	299	<i>Matthet Pliny.</i>	1055	<i>Melilotus officinarum 507. 508</i>	
<i>Malus principatum in Hetruria ob</i>		<i>Mater Violarum, Dalech.</i>	799	<i>Melimela vnde dicta.</i>	287
<i>sinentia.</i>	283	<i>Matricaria.</i>	953. 1147	<i>Melimum oleum.</i>	191. 192. 193
<i>Malum Medicum & Persic.</i>	298	<i>Matricaria, Parthenium Matth.</i>		<i>Melissa Moldauica, Matthioli.</i>	
<i>Malorum temperamēta & quæ</i>		954		960	
<i>eorum usus.</i>	288	<i>Mattisalia.</i>	965	<i>Melissa officinarum</i>	957
<i>Malus Epitroica, Latine orbicula</i>		<i>Mattisalia, Herbariorum.</i>	916	<i>Melissa Turcorum alia Dalech.</i>	960
<i>ta.</i>	189	<i>Mattisalia.</i>	1417	<i>Melissophyllum.</i>	957. Matthioli
<i>Malus Indica, Acoffa.</i>	1873	<i>Mechinum, Pena.</i>	1892	<i>Id. ibid. Fuchij & Dodon.</i>	
<i>Malum granatum.</i>	303	<i>Mechinacum. 1901. Pena. 1901. Da-</i>		<i>Melissophyllum Constantinopoli-</i>	
<i>Malum Hesperidum.</i>	299	<i>don.</i>	<i>ibid.</i>	<i>tanum Matth.</i>	959
<i>Malus principatum in Hetruria ob</i>		<i>Mecanum lactuca.</i>	545 549	<i>Melocardus echinatus, Pena.</i>	
<i>sinentia.</i>	283	<i>Meconium.</i>	1711	1441. 1442	
<i>Malum Medicum & Persic.</i>	298	<i>Medica</i>	502	<i>Melo Coropa.</i>	1837
<i>Malorum temperamēta & quæ</i>		<i>Medica sativa Dodon.</i>	<i>ibi.</i>	<i>Melones</i>	
<i>eorum usus.</i>	288				

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Nelumb.</i>	612	<i>Milium ad omnia Panico præsan</i>	<i>Moschatella præsan</i>	1
<i>Nelumbæ.</i>	616.617	<i>ruv.</i>	<i>Mula.</i>	
<i>Nelapogoni.</i>	612.613	<i>Milium Saluvel Soler potum.</i>	<i>Multiradic.</i>	
<i>Nemetylon.</i>	196	1176	<i>Munga.</i>	
<i>Nemianthes.</i>	503	<i>Attilifolium.</i>	768.769.1117	
<i>Nemianthes palafre, Theophrasti.</i>		<i>Millegrana Cordi.</i>	1126	
1019. & 1010. Dalecham. cum		<i>Miltemerbia.</i>	1083	
flor.	ibid.	<i>Mirrur vel Mirrhix.</i>	1277	
<i>Nemba.</i>	671	<i>Miscipula, sine Armeria altera.</i>		
<i>Nemba aquatica, sine Sifymbria.</i>		809		
<i>Labellj.</i>	676	<i>Mogli.</i>	1852	
<i>Nemba casti.</i>	908	<i>Mulle arbor.</i>	1787	
<i>Nemba cattaria angustifolia, eius</i>		<i>Mollis Hedera.</i>	1310	
dem.	909	<i>Molluga.</i>	1116	
<i>Nemba cattaria peregrina latifolia, Labellj.</i>	ibid.	<i>Molluga, Galium album quorundam.</i>	1088	
<i>Nemba Græca.</i>	672.678	<i>Molluga altera montana, Dodon.</i>		
<i>Nemba karmansia sine crispâ.</i>	677	ibid.		
<i>Nemba Sarracenia species altera</i>		<i>Molluga vulgarior, Herbariorum.</i>		
<i>Neyoni.</i>	672	<i>Mollusca nux.</i>	320	
<i>Nemba satina crispâ Dod. prima</i>		<i>Molluscum.</i>	95.166	
671		<i>Molcho agria.</i>	1591	
<i>Nemba satina quarta Dod.</i>	673	<i>Molochi, id est, Halimus.</i>	265	
<i>Nemba satina Matth. prima, De</i>		<i>Molochia.</i>	552	
don. tertia.	671	<i>Molochia Serapionis quorundam.</i>	566	
<i>Nemba satina altera Matth.</i>	672	<i>Molucca spinosa, Dodonai.</i>	919	
<i>Nemba vires.</i>	674	<i>Molucca sine Melissa Tuncica, Da</i>		
<i>Nembastrum.</i>	671	lech. ibid. alia eiusd.	960	
<i>Nembastrum nuncum Anglicum</i>		<i>Moly.</i>	1591	
<i>Pena & Labellj.</i>	674	<i>Moly indicum, Dodonai.</i>	1592	
<i>Nembastrum Campense & cano</i>		<i>Moly Luliflorum, Lob.</i>	1593	
<i>lentj, Labellj.</i>	673	<i>Moly Mast.</i>	1594	
<i>Nembastrum minus spicatij, La</i>		<i>Molyfolys Narcissi, Labellj. ibid.</i>		
<i>bellj.</i>	674	<i>Moly serpentinum, Labellj.</i>	1593	
<i>Nembastrum vulgare Matthiæ.</i>	673	<i>Moly Theophrasti & Pliny.</i>	1594	
<i>Mercurialis.</i>	1626			
<i>Mercurialis mar. Matth.</i>	1627.	<i>Moly Tragi perperam.</i>	1591	
<i>sumina, eiusd.</i>	ibid.	<i>Molybdæna, Pliny.</i>	1041	
<i>Mercurialis fylvestris mar.</i>	1628	<i>Molybdæna Pliny, quorundam.</i>	1198	
<i>Mercurialis vitæque.</i>	1195			
<i>Mespilus species secunda, sine Epi</i>		<i>Momordica.</i>	619.1277	
<i>melis.</i>	158	<i>Momordica nostra.</i>	617	
<i>Mespilus & eius genera.</i>	312	<i>Momordica, hypoleuca.</i>	80	
<i>Mespilus Anthemon.</i>	135.136	<i>Moringa. 1865. Acosce.</i>	1866	
<i>Mespilus Anthemon.</i>	198	<i>Morran.</i>	617.1725.1727	
<i>Mespilus Aronia.</i>	135.136	<i>Moroficæ.</i>	328	
<i>Mespilus Aronia.</i>	353	<i>Morsus diaboli.</i>	564	
<i>Mespilus Setania.</i>	334	<i>Morsus diaboli genus.</i>	865	
<i>Meserana Cilanea.</i>	31	<i>Morsus diaboli, vulgi.</i>	1066	
<i>Mesum.</i>	758	<i>Morsus galline.</i>	1122.1236.1239	
<i>Mesum Matthiæ 759. alteri spu</i>		<i>Morsus Rana Herbariorum.</i>	1010	
<i>rium italicum. ibi. aliud. ibid.</i>		<i>Morus. 325. sapientissima alberti</i>		
<i>Mex. vel mes.</i>	1794	<i>dilla.</i>	326	
<i>Mezereum vulgare.</i>	110.112	<i>Mora.</i>	120	
<i>Milaci vulgo Græcorum.</i>	24	<i>Morus Aegyptia.</i>	340	
<i>Milavie Olea.</i>	341	<i>Mori laci nales, tempus, vires</i>		
<i>Milularis nullifolia.</i>	768	<i>& temperam.</i>	326.327.118	
<i>Milium.</i>	408	<i>Morsuæ.</i>	327.328	
<i>Milium Indicum.</i>	581	<i>Mora terrestris.</i>	611	
<i>Milium Indicum, sine Melica.</i>	410	<i>Moschatella cerulea.</i>	1184	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Myrsophyllum pruri & alterum</i>	<i>Napus siluestris.</i>	541	<i>Nasturtium ericiale Serapiouis.</i>	
<i>Matthie.</i>	<i>Napus syluestris Dodonai.</i>	645		663
<i>Myrrha.</i>	<i>Napy Persicum.</i>	661	<i>Nasturtium peregrinum seu Peru-</i>	
<i>Myrrha aus Idellium suo succula</i>	<i>Narcissus.</i>	1492. 1516	<i>anum, Myrsan.</i>	666
<i>Spinafo herini, Pena.</i>	<i>Narcissus totus albus Dodonai.</i>	1519	<i>Nasturtium siluestre Dalechamp.</i>	615
<i>Myrrha minima vel Amins.</i>				
1791	<i>Narcissus autumnalis minor, De-</i>		<i>Nasturtium siue fere Valentianum</i>	
<i>Myrrhich.</i>	<i>don & Clusij.</i>	1512	<i>Clusij.</i>	617
<i>Myrrhu Fuchsy 761. altera parua</i>	<i>Narcissus autumnalis quorundā</i>		<i>Nasturtium tellerum.</i>	660
<i>Lobell. ibid. Lappa Dalechamp.</i>	<i>ex Clusio.</i>	ibid.	<i>Natrix Plinij Herbariorum.</i>	449
<i>ibid.</i>	<i>Narcissus Constantiop. I. Matt.</i>		<i>Nautia.</i>	105
<i>Myrra & Murra.</i>	1523		<i>Naufragi. id est, Rhomani.</i>	1295
<i>Myrratum.</i>	<i>Narcissus II. & III. Constantino</i>		<i>Naxia Amigdala veteribus Gra-</i>	
<i>Myrsidanum Piper iperisq. ap-</i>	<i>polidanis. III. F. VI. VII. VIII</i>		<i>ecis commendata.</i>	316
<i>pellatur.</i>	<i>Matthie.</i>	1524. 1525	<i>Negundo. 866 mas. Acoffa. ibid.</i>	
<i>Myrsidanum vinum.</i>	<i>Narcissus flore multiplici, Clusij.</i>	1520	<i>formina eiusd. ibid. &</i>	1867
<i>Myrsidii.</i>			<i>Nemus officinarum</i>	1008
<i>Myrsilus Germanica.</i>	<i>Narcissus Matth.</i>	1526	<i>Nepa Galla, Scorpis Theophras-</i>	
<i>Myrtomelis Cordi.</i>	<i>Narcissus III. Matth.</i>	1583	<i>ti planta.</i>	163
<i>Myrtum.</i>	<i>Narcissus luncifolius prior, Clusij</i>		<i>Nepeta III. Tragi. Calamintha</i>	
<i>Myrtus seu Martus.</i>	1521		<i>Menthastri folio, Pena.</i>	907
<i>Myrtus Batia lasifolia domes-</i>	<i>Narcissus luncifolius, Dodonai.</i>		<i>Nery fuscus arbor, Pena.</i>	1831
<i>tica succunda, Clusij.</i>	1510		<i>Nerysiliqua.</i>	194
<i>Myrtum Batia syluestris, Clusij.</i>	<i>Narcissus luncifolius flore rotun-</i>		<i>Neri.</i>	244
239	<i>do Rasis Lob.</i>	1522	<i>Nerium sine Rhododendrum.</i>	
<i>Myrtus Brabantica.</i>	<i>Narcissus luteus multiplex Dod-</i>			244
<i>Myrtus exotica.</i>	1523		<i>Nerium Alpinum.</i>	270
<i>ex Myrti floribus destillatur aqua</i>	<i>Narcissus luteus syluestris Dodon.</i>		<i>Nerium aliud flore albo, Lobellij</i>	
<i>odoratissima.</i>	<i>ibid.</i>		<i>& Pena.</i>	246
<i>Myrtum minima angustifolia 238</i>	<i>Narcissus medius luteus De.</i>	1528.	<i>Nesien.</i>	1286
<i>Myrtum prater hanc Myrsidanā</i>	<i>alter eiusdem.</i>	ibid.	<i>Nearas.</i>	1487
<i>producit.</i>	<i>Narcissus medius purpureus De-</i>		<i>Nicolij.</i>	364
<i>Myrti in alijs preterquam in</i>	<i>don.</i>	1517	<i>Nicotiana.</i>	1895
<i>re medica vsus.</i>	<i>Narcissus montanus luncifolius</i>		<i>Nicotiana sine Tabacum.</i>	ibid.
<i>Myrtus succorum matura preci-</i>	<i>minimus, Lob.</i>	1521. 1522	<i>Nidus auis.</i>	1073
<i>pui admiranda.</i>	<i>Narcissus purpureus Plinij & Fir-</i>		<i>Nigella.</i>	812
<i>Myrtum syluestris.</i>	<i>gili.</i>	1570	<i>Nigella Citrina flore albo multi-</i>	
<i>Myrtum syluestris duplex.</i>	<i>Nardus sine Nardum & Nardi-</i>		<i>plici.</i>	ibid.
<i>Myrtus Tarentina.</i>	<i>spica.</i>	920	<i>Nigella foliosa.</i>	438
<i>Myrtus Tarentina.</i>	<i>Nardus Celtica. 923. Matthioli.</i>		<i>Nigellastrum.</i>	ibid.
<i>Myrs.</i>	924 altera, Pena.	ibid.	<i>Nimbo. 1867. Acoffa.</i>	ibid.
<i>Myxa, Myxa, Myxaria.</i>	<i>Nardus Italica.</i>	919	<i>Nolime tangere, Herbariorum.</i>	
<i>Myxus arbor siue Sebestema no-</i>	<i>Nardus montana 926. Matthie.</i>			1205
<i>stris.</i>	<i>ibid.</i>		<i>Nuces Cassianica.</i>	30
	<i>Nardus spuria Narbonensis, Pe-</i>		<i>Nuces Capress.</i>	57
	<i>na.</i>	922	<i>Nuces Græcæ.</i>	316
	<i>Nardus syluestris.</i>	927	<i>Nuce Pinæ Cannæ & Strobilus</i>	
	<i>Nartheccium Theophrasti, Ferula</i>		<i>vsu parat.</i>	52
	<i>go Galla.</i>	754	<i>Nucistregia.</i>	30
	<i>Nasturtium.</i>	654	<i>Nuces Tarentina.</i>	48
	<i>Nasturtium album Arabum.</i>	656	<i>Nucis inglandis temperaments</i>	
	<i>Nasturtium album Arabum 663</i>		<i>& vires in re medica, vsusque</i>	
	<i>Nasturtium aquaticum officina-</i>		<i>in cibis variis. 322. 313. 324.</i>	
	<i>rum.</i>	658		325
	<i>Nasturtium aquaticum Tragi &</i>		<i>Nucis nomine permulta fructuū</i>	
	<i>Herbariorum.</i>	1094	<i>genera comprehenduntur. 320</i>	
	<i>Nasturtium Babilonicum.</i>	663	<i>Nucisfolium.</i>	1758
	<i>Nasturtium horticola.</i>	655	<i>Nuciperisica.</i>	294. 295. 358
	<i>Nasturtium Indicum Dodonai.</i>		<i>Nucipinna.</i>	313
	657		<i>Nucis pini cathartici.</i>	1789
	<i>Nasturtium maritimum.</i>	1593	<i>Nucleum glandis & chalybii Pla-</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>no quid.</i>	16	<i>Ocimum parvum.</i>	680.681	<i>Oleum lincium.</i>	790
<i>Nucis inglandum & vinearū</i>		<i>Oculi, arbor Americana.</i>	1792	<i>Oleum de Kery, id. ex floribus</i>	
<i>par fere proutentur.</i>	322	<i>Oculus.</i>	1128	<i>lutei Lencas.</i>	84
<i>Nucum Panicarum vis.</i>	1153	<i>Oculi bonis.</i>	822	<i>Oleum Lantini.</i>	313
<i>Nummularia.</i>	1062	<i>Oculus Christi.</i>	1349	<i>Oleum Lantini.</i>	61
<i>Nummularia anisi Eliatis.</i>	1239	<i>Oculus Christi minor Herbariorū</i>		<i>Oleum ex Lagustis floribus.</i>	11
<i>Nurse pila.</i>	645	<i>1134. & 1135.</i>		<i>Oleum i Lilio.</i>	1496.
<i>Nux Aneilana.</i>	30	<i>Odonti is lutea.</i>	1063	<i>Oleum i Lini semine.</i>	496
<i>Nux Aneilana, eadem quatenus</i>		<i>Oenanthe.</i>	-82.1406	<i>Oleum ex Liquidamber.</i>	1731
<i>sine parva Prænestina, Heracle</i>		<i>Oenanthe aquatica, Lobelii.</i>	1093	<i>Oleum ex Malabathra.</i>	177
<i>otica.</i>	39	<i>Oenanthe l. Malbis. 782. 11. 111.</i>		<i>Oleum ex nucleis Mali Persice.</i>	
<i>Nux Follicularis.</i>	102	<i>1111. eiusdem.</i>	783		
<i>Nux Heracleatica.</i>	30	<i>Oenanthe sine Filipendula altera</i>		<i>Oleum Atassi binum.</i>	66
<i>Nux indica. 1761. Matthioli.</i>	30.	<i>montana. Pena. 784. alia eius-</i>		<i>Oleum ex Antistithi semine, val</i>	
<i>Nux Indica officinar.</i>	364	<i>dem. Cicuta facie.</i>	ibid	<i>ge Nardium.</i>	14
<i>Nux Inglesi.</i>	320	<i>Oenanthes species, Dalecham 785</i>		<i>Oleum ex Myagro.</i>	817
<i>Nux quibus locis gaudeat.</i>	322	<i>Oenanthe, Myconi. ibid. alia ei-</i>		<i>Oleum ex Myris 241. 242. eius fa</i>	
<i>Nux Melbel.</i>	628. 629	<i>dem.</i>	786	<i>cinidi ratio.</i>	144
<i>Nux moschata.</i>	1760	<i>Oenothera, & Oenotheris.</i>	823	<i>Oleum Narcissium.</i>	1026
<i>Nux myrsinica, Maris.</i>	1760	<i>Oenuria.</i>	ibid	<i>Oleum ex Nissosar.</i>	103
<i>Nux Persica & Basilica, Aneila-</i>		<i>Oefsi, vel, vi. aly. 1501. 133. 133</i>		<i>Oleum ex Nimbo.</i>	1007
<i>na.</i>	320	<i>Oefsi Theophrasti an sit Americana</i>		<i>Olei duo genera ex Noctuidis.</i>	
<i>Nux Pineæ.</i>	43	<i>salix cuius ille an sit quæm alio-</i>			
<i>Nux à Pomo quid differat.</i>	285	<i>qua meminit.</i>	278	<i>Oleum ex Nucibus inglandum.</i>	
<i>Nux Pontica sylvestris.</i>	101	<i>Officinarum Malix.</i>	63	<i>323. Cornum vocatum.</i>	124
<i>Nux Pesticaria.</i>	102	<i>Oleago, vel Oleagellus.</i>	1664	<i>visi & præstantia. ibid. &</i>	
<i>Nux Pomica & Melbel.</i>	1763	<i>Oleatium Piscum fert in Pale-</i>		<i>stinis.</i>	
<i>Nymphæa. 008 maior alba ibid.</i>		<i>stina.</i>	18	<i>Oleum ex Pennsylvan arbore A-</i>	
<i>latea maior & minor. 1009.</i>		<i>Olea sativa.</i>	342	<i>mericana.</i>	1814
<i>altera latea minor. ibid. minor</i>		<i>Oleorum genera varia.</i>	342.	<i>Oleum i Platani baccis.</i>	96
<i>alba. 1010 alia minor al-</i>			341	<i>Oleum ex Pyrethra.</i>	1170
<i>ba. ibid.</i>		<i>Olea maior ad esum, minor oleo</i>		<i>Oleum ex Ricini.</i>	1630. 1631
		<i>est aptior.</i>	343	<i>Oleum ex Ricini America.</i>	1700
		<i>Olea siliensis seu Aethiopica,</i>		<i>Oleum Rosaceum.</i>	128. 129. 130
		<i>151.</i>		<i>Oleum Sampsuchinum seu Ama-</i>	
		<i>Oleaster.</i>	ibid.	<i>racinum.</i>	311
		<i>Oleum maris rubri lacrima.</i>	153	<i>Oleum ex Sessam.</i>	432. 433
		<i>Oleum Olina fuscum, eius effectio</i>		<i>Oleum Stachadi.</i>	43
		<i>& genera.</i>	344. 345	<i>Oleum Syriacum.</i>	100
		<i>Oleum Asari.</i>	914	<i>Oleum muci virtutibus præditi</i>	
		<i>Oleum nucum Anellanarum</i>	101	<i>ex arbore tinctoria.</i>	1832
		<i>Oleum i Balano 1484. 1685. 1686</i>		<i>Oleum ex Trifolio.</i>	106
		<i>Oleum de Ben.</i>	1789	<i>Oleum i Trifolico.</i>	107
		<i>Oleum ex Canella arboris Thene</i>		<i>Oleum ex Vaccinia.</i>	101
		<i>is fructus nucleis. 1805. aliud</i>		<i>Oleum optimum i Persici.</i>	100
		<i>ex Canella baccis.</i>	1806	<i>Oleum ex vitica.</i>	1248
		<i>Oleum ex Castanis apud Indos.</i>		<i>Oleum ex Xila arbore.</i>	1774
		<i>33</i>		<i>Oleum zambacinum seu Samba-</i>	
		<i>Oleum Chal f.</i>	111	<i>cinum.</i>	147
		<i>Oleum facitum ex Chamelea.</i>		<i>Olida.</i>	141
		<i>1664</i>		<i>Olivarum generatris.</i>	342
		<i>Oleum Chimificum ex Juniperi</i>		<i>Olina Boemica, sine Oleum</i>	
		<i>ligno.</i>	69	<i>Matth.</i>	101
		<i>Oleum ex Cydonia Nelinum vo</i>		<i>Olina Phaulia, quæ & Ricini, &</i>	
		<i>catum.</i>	291. 292. 293	<i>Maierina.</i>	121
		<i>Oleum Cyprinum.</i>	253. 254	<i>Olina quære crescere oleum sal-</i>	
		<i>Oleum ex flammula.</i>	1172	<i>so exissimatur.</i>	344
		<i>Oleum ex arbore Gehoph.</i>	1842	<i>Olla.</i>	1762
		<i>Oleum ex glande.</i>	14	<i>Olu.</i>	118
		<i>Oleum Handacæ.</i>	1078	<i>Oleum multum, quæ nos negleg-</i>	
		<i>Oleum ex Hyperico.</i>	1154	<i>gimus, Græci & sicuti valde</i>	
				<i>dilectum</i>	

O

O Celli & Ocelli Dmase-
nus & Ocellus Barbari-
cou. 806
Ocellus, Lachnū coronaria 85
Ocimum. 682. 1165. 1356. 1366
Ocimum Fuchsi 982
Ocimum quædam. 912
Ocimum Valentium, Clusij. 684
Ocimum l'aleriantes. 1186
Ocimoides. 682. 930
Ocimoides Disceoidis. 1186
Ocimoides Matthioli. 682
Ocimoides minus, sine albū. 683
Ocimoides minimum. ibid.
Ocimoides repens Poligoni folio. 1429. 1410
Ocimum. 679
Ocimum antiquum 184
Ocimum aquaticum, quorūdam. 1086
Ocimum ariophyllum. 80. 681
Ocimum maximum. 680
Ocimum medium Fuchsi. ibid.
Ocimum medium Matthioli. ibid.
Ocimum montanum. 1175

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>leſtantur.</i>	564	<i>Gemma. Teſticulus herianus</i>	<i>Oſtry.</i>	180
<i>Oluſarum.</i>	793	<i>vulgaris.</i>	<i>Oſtry vel Oſtrya Theophrasti</i>	335
<i>Olyra.</i>	389	<i>Orchus ſerapias primus, Dodon.</i>		
<i>Olyra Gracernum an ſilice Latino-</i>		1554	<i>Oſtris, Linaria.</i>	1332
<i>ram.</i>	375	<i>Orchus ſphacodes Gemma.</i>	<i>Othanna Dioſcor.</i>	120
<i>Omphaciliſ Galla.</i>	15	<i>Orchus ſtratiſmatica maior, &</i>	<i>Otragua.</i>	1761
<i>Omphalocarpus.</i>	1330 1331	<i>Baſilica. y. Gemma.</i>	<i>Onlandia, Græci vulg.</i>	1330
<i>Onagra, & Onagra</i>	865	<i>Orchus ſtratiſmatica minor, Gem</i>	<i>Onlandia ſen Tulipa lutea.</i>	1331
<i>onobrychis.</i>	433. 490	<i>ma.</i>	<i>Oxalis.</i>	600 601
<i>Onobrychis prima Dod.</i>	490	<i>Orchites olina vnde dicantur.</i>	<i>Oxalis maior.</i>	604
<i>Onobrychis ſecunda.</i>	491	343	<i>Oxalis minor Matthioli.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Onobrychis tertia, purpurea Da-</i>		<i>Oreſelinum.</i>	<i>Oxalis minuta.</i>	602
<i>lechampi.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Origanum vel origanum.</i>	<i>Oxalis rotunda.</i>	605
<i>Onobrychis lutea Dalecham.</i>		<i>Origanum Heracleoticum, Matt.</i>	<i>Oxalis tuberoſa Labellj.</i>	<i>ibid.</i>
<i>ibid.</i>		<i>ibid.</i>	<i>Oxyacantha.</i>	134
<i>Onobrychis.</i>	1100 1101	<i>Origanum Onitis.</i>	<i>Oxyacantha, Acuta Spina Matth.</i>	
<i>Onoclea.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Origanum vulgare ſylveſtre ibid.</i>		
<i>Ononis.</i>	1107	<i>Ornithogalum.</i>	<i>Oxyacantha Matth.</i>	133
<i>Ononis lutea non ſpiſoſa, Natrix</i>		<i>Ornithogalum Dodon ſen Bulbum</i>	<i>Oxyacantha ſen Pſam Cypriſium ſi-</i>	
<i>Plinij Herbariorum.</i>	449	<i>leucanthemum.</i>	<i>ne Cypriſium non eſt.</i>	135
<i>Onopordon Dalech.</i>	1472	<i>Ornithogalum luteum Labellj,</i>	<i>Oxyacantha alba Galea.</i>	136
<i>Onopordon luteum Dodon.</i>	<i>ibi.</i>	<i>ſine Bulbum ſylveſtre Dodon.</i>	<i>Oxyacantha maritima Dalech.</i>	
<i>Onopordon alba Dalech.</i>	1472	1581		
<i>Onopordon tertia, Dalech.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Ornithogalum l. Matt. 1581 II.</i>	<i>Oxyacantha.</i>	137
<i>Onosma.</i>	1107	<i>cin. de n.</i>	<i>Oxyacantha.</i>	138
<i>Onosma Matth.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Ornithogalum magnum, Myconi,</i>	<i>Oxyacantha.</i>	600 601
<i>Ophioſſum Matth.</i>	1047	1583	<i>Oxyacantha.</i>	601
<i>Ophioſſum Dodon.</i>	1545	<i>Ornithogalum Narbonneſe, Dod.</i>	<i>Oxyacantha.</i>	243
<i>Ophioſſum le.</i>	155	1542	<i>Oxyacantha.</i>	160
<i>Ophrys.</i>	1260. 1261	<i>Ornithopodium.</i>	<i>Oxyacantha.</i>	93
<i>Ophthalmica.</i>	1167	<i>Ornithopodium Dod.</i>	<i>Oxyacantha.</i>	134
<i>Opien.</i>	1711	<i>Ornithopodium puſillum Pina.</i>	<i>Oxyacantha corniculata repens, O</i>	
<i>Opoballſanum.</i>	1771	487	<i>xy lutea Cluſij.</i>	1355
<i>Opeanax, officin. Opeanaxum.</i>		<i>Ornithopodium tuberoſum Dale-</i>		
741. 742		<i>champi.</i>		
<i>Opulus campeſtris.</i>	94	<i>Orni nomine Tragum vulgatum A-</i>		
<i>Opulus Calamella.</i>	157	<i>ſinum depulſit.</i>		
<i>Orchis.</i>	1549	<i>Ornus.</i>		
<i>Orchis batrachoides Gemma.</i>	1550	81 83 99		
<i>Orchis 1 ſpecies Dodon. S. Matth.</i>		<i>Orbanche.</i>		
150		<i>Orbanche Dioſcorid. alia ab Oro-</i>		
<i>Orchis 11 ſpecies Dodon. & Mat-</i>		<i>banche Theophrasti.</i>		
<i>thioli.</i>	1559	<i>Orbanche legumen, Aphaca Do-</i>		
<i>Orchis 111. Dodon.</i>	<i>ibid.</i>	<i>don.</i>		
<i>Orchis 1111. & P. Dodon. I. Matt.</i>		<i>Orbanche altera Matthioli.</i>		
1512		483		
<i>Orchis Friſia liſteralis Gemma.</i>		<i>Orbethron.</i>		
1560		223 224		
<i>Orchis Hermaphroditiſ Gemma</i>		<i>Orbom.</i>		
<i>ſine Orchis pſycoides diphylia</i>		483		
<i>ibid.</i>		<i>Orbus Creticus.</i>		
<i>Orchis meliſſia Gemma.</i>	1557	<i>Orbitum herba.</i>		
<i>Orchis myodes I. & II. Gemma.</i>		<i>Ornala Fuchſia. 964. tertia Dod.</i>		
1558		566		
<i>Orchis ornithophora folijs Lent,</i>		<i>Orynia, Tamarix Acbaia dich-</i>		
<i>Gemma.</i>	1559	<i>187</i>		
<i>Orchis ornithophora folijs macu-</i>		<i>Oryza.</i>		
<i>loſis, Gemma.</i>	<i>ibid.</i>	407		
<i>Orchis rotundus Dalechampi.</i>		<i>Oſunda, ſine Oſundaregalis.</i>		
156		1215		
<i>Orchis ſauvages vel Sincophora</i>		<i>Oſtocolum Hieroclis & Abſy-</i>		
		<i>12</i>		
		<i>Oſtocolum arborea.</i>		
		1795		
		<i>Oſtra.</i>		
		35		

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>qua & Elephantis.</i>	1761	<i>Papaner nigrum sativum flore</i>	<i>Pedicularis, seu Pedicularia</i>		
<i>Palma sancta similis arbor.</i>	1750	<i>Malva hortensis, aut Paeonia.</i>	1074		
<i>Palma villaria symbolum.</i>	169	<i>Pen. & Lob.</i>	1710	<i>Pedicularis maior, Alpina.</i>	118
<i>Palma vinefera.</i>	1834	<i>Papaner libocae maius & minus.</i>		<i>Pelafcus.</i>	110
<i>Palmacea, seu Arundinacea pin-</i>				<i>Pelethronia.</i>	115
<i>nata pinosa.</i>	1830. & 1831	<i>Papaner spontaneum sylvestris &</i>		<i>Penobson.</i>	115
<i>Palma pinus, sine Conserva.</i>	1812.	<i>hortense, Pen & Lob.</i>	1710	<i>Pentadactylon.</i>	1630
<i>filiostris ibid. Pena.</i>	ibid.	<i>Papaner spumum.</i>	1186	<i>Pentadactylon gramin.</i>	430
<i>Palmule.</i>	162	<i>Papaner spumum Diastoridis,</i>		<i>Pentaphyllum.</i>	1263
<i>Paladapum Gaz.</i>	701	<i>Anguilara.</i>	1085	<i>Pentaphyllum flore albo & rubro,</i>	
<i>Panace Heraclea.</i>	1117	<i>Papaner spumum quorundam.</i>		<i>Lob.</i>	1166
<i>Panaces & Panax.</i>	718			<i>Pentaphyllum sapinum, Tormentilla facie, Lob.</i>	ibid.
<i>Panaces Asclepium Matthio.</i>	719	<i>Papaner sylvestrisque nigrum, De-</i>		<i>Peplus, Dalech.</i>	1119
<i>Panaces Asclepium a'eternum, Da-</i>		<i>denai.</i>	1710	<i>Peplis minor Dalechamp.</i>	ibid.
<i>lechamps.</i>	740	<i>Pappus.</i>	574. 1440	<i>Peplis, Matthioli.</i>	ibid.
<i>Panaces Chironium.</i>	603	<i>Papyrus.</i>	1878	<i>Peplus, Peplus 1215. 1658. Matth.</i>	ibid.
<i>Panaces Chironium sine Flis- folis Matth.</i>	740	<i>Papyrus Aegyptia, Pena.</i>	1883		
<i>Panaces Chironium quorundam, Dodon.</i>	741	<i>Paradisus Mahumetis.</i>	1857	<i>Peplus Parisiensium.</i>	458
<i>Panaces Heracleum.</i>	836	<i>Paralytica Alpina angustifolia, Lobellj & 77. minor sine media eiusd.</i>	ibid.	<i>Pepones.</i>	612. 613
<i>Panaces Heracleum Matthioli.</i>		<i>Paritaria officinarum.</i>	1743	<i>Peponatus Dodon.</i>	617
	739	<i>Paritaria officinarum.</i>	181	<i>Pepo maximus Indicus Lobellj.</i>	
<i>Panax Caronion.</i>	738	<i>Paritaria.</i>	181		615
<i>Panax Chironium, Dodonai.</i>		<i>Paromychia Alpine folia, Lobellj.</i>	1214	<i>Perceper Anglorum.</i>	713
	741			<i>Perdicum.</i>	511. 1148. 1153
<i>Panax Heracleum.</i>	1278	<i>Paromychia altera, Rutaceo folio, Lobellj.</i>	ibid.	<i>Perdicum secundum Plinij.</i>	1153
<i>Panax Heracleum, Lobellj, Spho-</i>		<i>Paromychia altera Matthioli.</i>	1213	<i>Perditum Theophrasti.</i>	1191
<i>dulium alterum, Dodon.</i>	740	<i>Parthenis.</i>	949	<i>Perebeckum.</i>	1901
<i>Panacratium. 1578. Dalecha.</i>	579	<i>Parthenium.</i>	124. 1625	<i>Perfoliata & Perfoliatum.</i>	1312
<i>Classij.</i>	ibid.	<i>Parthenium Diastoridis, Dodo-</i>		<i>Perfoliata altera.</i>	798
<i>Panacratium maritimum.</i>	1515	<i>Parthenium.</i>	951	<i>Perfoliata, Dodon.</i>	1151
<i>Panacratium quorundam.</i>	1151	<i>Parthenium leptophyllum.</i>	1344.	<i>Perfoliata longifolia, Dalech.</i>	
<i>Panicum.</i>	411		1345		1311
<i>Panicum Indicum, alijs peregrini-</i>		<i>Parthenium maritimum mini-</i>		<i>Perfoliata species, Bisulcum 1160</i>	
<i>um ibid &</i>	411	<i>um.</i>	1395	<i>Perichymum.</i>	1417
<i>Panicum sativum.</i>	412	<i>Parthenium purpureum, Myconi.</i>		<i>Perichymum alterum quoru-</i>	
<i>Panicum sylvestris Matthioli. ibi.</i>			954	<i>dum.</i>	1605
<i>Panicum sylvestris aliud Dalech.</i>		<i>Passerin a Linaria folio, Lobellj.</i>		<i>Perichymum erecti duo generi</i>	
	413		1112	<i>Classij.</i>	1271
<i>Panis oculi, Herbariorum.</i>	1514	<i>Pastinaca.</i>	718	<i>Perichymum tertium Dod.</i>	171
<i>Pani perennis & terra.</i>	1604	<i>Pistina aquatica, Herbarioru.</i>		<i>Perichymum perfoliatu.</i>	1417
<i>Panis varia genera & consilio.</i>	378. 179. 380. 381		1092	<i>Perichymum non perfoliatum, Lob.</i>	1215
<i>Papaner.</i>	1707	<i>Pastinaca marina.</i>	1567	<i>Periplea repens, & non repen-</i>	
<i>Papaneris corniculati species, Do-</i>		<i>Pastinaca marina Pena & Lobel.</i>		<i>1731. 1732.</i>	
<i>dona.</i>	1712	<i>Crustum II. Matth.</i>	1396	<i>Perisperm.</i>	1014
<i>Papaner corniculatum alteru, Clu-</i>		<i>Pastinaca pratensis.</i>	721	<i>Persca.</i>	186
<i>si.</i>	1711	<i>Pistina sativa vulgi, Matthia.</i>		<i>Persca America, Classij, cam fo-</i>	
<i>Papaner corniculatum violaceum</i>			719	<i>lia, Dalech.</i>	1313
<i>Dodon.</i>	ibid.	<i>Pastinaca sylvestris Matthioli.</i>		<i>Persca Malu & Persica.</i>	131
<i>Papaner cornutum, Matthioli.</i>			710	<i>Persicorum genera, & quae in praestantiora.</i>	ibid.
	1712	<i>Pata leonis.</i>	1342	<i>Persicaria 1040. Matthioli.</i>	1041
<i>Papaner fimbriatum, & cristatu</i>		<i>Pater noster, vel radix S. Helena</i>		<i>passilla Lob.</i>	ibid.
<i>album, & nigrum, Lobellj.</i>		<i>Monardi.</i>	1816	<i>Persicaria non maculosa & Persi-</i>	
	1709	<i>Patten tertium Caryota genus.</i>		<i>caria vrens.</i>	1033
<i>Papaner fluidum, Erraticum, rub-</i>			364	<i>Persicaria siliquata.</i>	105
<i>rum.</i>	ibid.	<i>Panata 1861. Acasta.</i>	1363	<i>Perfolata, Plinij.</i>	1051
<i>Papaner sativum, Matthia.</i>	1708	<i>Pansa Oliva unde dicantur.</i>	343	<i>Persanata & Persenaria.</i>	1014
<i>Papaner sativum rubrum fim-</i>		<i>Paysa.</i>	1918	<i>Persanata, sine Lappa mure,</i>	
<i>briatum, Dalech.</i>	1709	<i>Pecten Veneris, Scandix quoru-</i>		<i>Mat. 1015. altera, consil. ibid.</i>	
		<i>dum.</i>	712. 713	<i>Pervaca</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Peruviana maior, Lob.</i>	833	<i>Phafolus.</i>	472	<i>Phellin.</i>	1118
<i>Peruviana officinarum.</i>	832	<i>Phafolus sativus, sine albus & vn'gar.</i>	ibid.	<i>Phyllitis laciniata Clusij.</i>	1118
<i>Peruviana alia satie arboribus item innascens.</i>	1819	<i>Phafolus sylvarum.</i>	ibid.	<i>Phyllon.</i>	1461.
<i>Pes anserinus.</i>	342	<i>Phafolus sylvestris.</i>	ibid.	<i>Phylum.</i>	1194
<i>Pes asini.</i>	911	<i>Phellandrium Plinij.</i>	725	<i>Phylum arborescens Dalech.</i>	1396
<i>Pes columbinus.</i>	1176.1177	<i>Phellandrium, Plinij.</i>	1093	<i>Phylum arborescens maius, Dalecham.</i>	1196
<i>Pes columbinus vn'gar.</i>	Herbarium.	<i>Phellodrys, eiusque quinque vera.</i>	15	<i>Phylum arborescens thelygenon Theophrasti.</i>	1197
<i>Pes cornutus Herbarium.</i>	670	<i>Phellodrys Arcadem, Dorr, vrp.</i>	146	<i>Phylum thelygenum, Dalecham.</i>	1195
<i>Pes cornu, & Pes galli, Herbarium.</i>	1017	<i>Phellodrys coccifera.</i>	27	<i>Phylum thelygenum, Matthioli.</i>	1196
<i>Pes gallicum Herbarium.</i>	670	<i>Philaterra.</i>	1186	<i>Phytoma.</i>	1197
<i>Pes grui.</i>	814	<i>Philantropus Aparine.</i>	1111	<i>Phytoma Narbonensium, Pena.</i>	1198
<i>Pes Leonis & leoninus.</i>	1175.	<i>Philetarium Ocimoides à quibusdam cognominatur.</i>	684	<i>Phytoma quorundam, Dalecha.</i>	1198
1181.1124.1144		<i>Philyra Theophrasti à Dioscor.</i>		<i>Phytoma quorundam Herbariorum.</i>	1342
<i>Pes leporis.</i>	441	<i>Philyra plantarum distat.</i>	153	<i>Picata vna. 76. vna.</i>	77
<i>Pes lupinus.</i>	1125	<i>Philyrea Dioscor.</i>	90	<i>Picea nira</i>	4349
<i>Pes casti.</i>	1396	<i>Philyrea & eius varia icones, Ma th-Scrapionis, Clusij</i>	153.	<i>Picea regina Galeni an Abugma la cryma.</i>	54
<i>Petasites.</i>	1013	<i>Philyrea Dioscoridi.</i>	252	<i>Picocotum Creta Salernensis, Pena & Lob.</i>	1456
<i>Petajia odorati flis.</i>	1014	<i>Philyca.</i>	257	<i>Picris Dalechampij, Hieracium Matth.Dodon.</i>	561
<i>Petilius flis Plinij.</i>	840	<i>Philyca tertia Dalech.</i>	258	<i>Pigamon, Dodon.</i>	180
<i>Petrapium.</i>	702	<i>Philyra.</i>	89	<i>Pilosella.</i>	1098
<i>Petrocelanum.</i>	700 706	<i>Philyrea maior Pena, tertia Clusij</i>		<i>Pilosella an Elatine.</i>	1219
<i>Petrocelanum Alexandrinum.</i>	703	<i>Philyca prima.</i>	258	<i>Pilosella maior Matth.</i>	1098
<i>Petrocelanum Dalechamp.</i>	701	<i>Philyrea minor Pena, quarta Clusij, Philyca secunda.</i>	ibid.	<i>Pilosella minor Fuchsj.</i>	ibid.
<i>Petrocelanum Macedonicum Matth.</i>	ibid.	<i>Philei. 1015 mas sine Stobe Theophr angustifolia. 1016 mas latifolia, agusta maior Matthi.</i>	1017	<i>Pilosella maxima Syriaca Label.</i>	1099
<i>Petrocelanum Macedonicum Matth.</i>	702.703	<i>ibid femina.</i>	1017	<i>Pilata Cupressi.</i>	57
<i>Petum.</i>	1835	<i>Phlemitis.</i>	1107	<i>Pimpinella, sive Pimpinella. 1087</i>	1219
<i>Pencedanum & Pencedanum.</i>	745	<i>Phlemus hychnitis.</i>	1303	<i>Pimpinella an fist Elatine.</i>	1119
<i>Pencedanum Dod.</i>	746	<i>Phlemus hychnitis clorra Syriaca, Lob.</i>	1304	<i>Pimpinella nigra.</i>	1088
<i>Pencedanum maius Italicum, Le belij.</i>	747	<i>Phlemus hychnitis Pena.</i>	1303	<i>Pimpinella, sive Sanguisferba maior, Fuchsj.</i>	1088
<i>Pencedanum Matth.</i>	746	<i>Phlox Theophrasti.</i>	800	<i>Pimpinella sive Sanguisferba minor, Matth. 1087 minor, eius ibi.</i>	786
<i>Phacades.</i>	1671	<i>Phlox sine Flamma Theophr. An guillara.</i>	871	<i>Pimpinella saxifraga maior Mat</i>	787
<i>Phacades Orisasy.</i>	1669	<i>Phenobalanus.</i>	365.366	<i>ibid.</i>	787
<i>Phanion.</i>	841	<i>Phenix.</i>	416	<i>Pimpinella saxifragaminor, Do & Lobe.</i>	78
<i>Phaum Pena & Lob.</i>	1016.1017	<i>Photel arbor Catayna.</i>	1840	<i>Pimpinella.</i>	74
<i>Phagu.</i>	5	<i>Phrinium.</i>	1487	<i>Pinnaster & eius genera.</i>	44
<i>Phagu Idaorum & Macedonum.</i>	6	<i>Phthirium.</i>	1074	<i>Pinnaster Bellony, Teda Plin.</i>	46.47.
<i>Phagus Theophrasti diversif.</i>	5	<i>Phyllis Batanicus integer, eiusque separata partes.</i>	1398	<i>Pinnaster seu pinnisylvestris quaresterilis dicatur.</i>	45
<i>Phagonebra.</i>	5	<i>Phucus marinus.</i>	1369	<i>Pinnaster alia vna male conuysit Plinij.</i>	43
<i>Phagu valentini adstringit.</i>	11	<i>Phu. 927. magnum.</i>	ibid	<i>Pinea nuc.</i>	43
<i>Phalangium.</i>	851	<i>Phu Gracum, sive peregrinum.</i>	1043	<i>Pinea nucis & oerum vis</i>	51
<i>Phalangium.</i>	1496. 594	<i>Phu minimum.</i>	1117	<i>Pini nates Malacani, Acosja.</i>	1874
<i>Phalangium, Matthioli.</i>	812. Dalechamp. ibid. ramosum, Lob.	<i>Phu minimum alterum Labelij.</i>	ibid.		
<i>ibid.</i>		<i>ibid.</i>			
<i>Phalaris.</i>	415	<i>Phu minimum, Matth.</i>	1043		
<i>Phallus Hollandicum.</i>	1398	<i>Phu sylvestre.</i>	1042		
<i>Pharmaceum.</i>	1173	<i>Phylla an memineris Plinij.</i>	158		
<i>Phasolus Brasiliensis, Clusij.</i>	1205				
<i>Phasolus alter Indicum, Clusij.</i>	ibid.				
<i>ibid.</i>					
<i>Phasolus parvi ex America.</i>	1906.				

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM

<i>Pimpinella</i> barbuscula. 1710	<i>Pityusa</i> sine <i>Efula</i> minor, Dodon.	rum.	1
<i>Pinnarum</i> in sua genera distribu- tio ex quorundam sententia.	Hill stirp. <i>Tithymalus</i> platy- phyllus. Fuchs. 1653	<i>Plantago</i> , Plin. 1040	
49	<i>Pityusa</i> sine <i>Efula</i> minor altera	<i>Plantago</i> Plinij quorundam.	1248
<i>Pinctum</i> marbus. 49	floribus rubris, Lob. 1654	<i>Podagra</i> Lini. 1059	
<i>Pinum</i> montanarum & mariti- marum differentia. 45	<i>Pix</i> quid 71. ultima pag. unde & quomodo fiat. 74	<i>Polygonia</i> castanea. 11	
<i>Pinus</i> rubea. 41	<i>Pix</i> Bruta. ibid.	<i>Polemonij</i> ali. ra figura. 137	
<i>Pinus</i> maritima duo genera, Mat. 45	<i>Pix</i> Bruta, Lycia, Idea, Naresia, sen Larcia, sine Naresia. 75.	<i>Polemonium</i> Dodon. 156	
<i>Pinus</i> Tabular, <i>Atagolalorum</i> . 47	<i>Nemataria</i> , Corticata, <i>Raphia</i> <i>Rubulana</i> , sine <i>Radulana</i> sine <i>Rafulana</i> sine r. itica. 76	<i>Polemonij</i> species Dodon. 157	
<i>Piper</i> . 1807	<i>Pix</i> Bruta maxima probata. 76	<i>Polemonia</i> Nanspel <i>Isaia</i> in teum. 157	
<i>Piper</i> <i>Aethiopicum</i> , Matth. 1809	<i>Pix</i> & <i>Resina</i> & unde manent. 69 70.	<i>Polesta</i> . 400 41	
<i>Piper</i> <i>apum</i> . 167	<i>Picu</i> bona experimentum 75	<i>Polum</i> . 400	
<i>Piper</i> <i>aquaticum</i> . 1038	<i>Vici</i> facultates. 77 78	<i>Polum</i> , 928. Matth. ibid. altera eiusd. 92. luterum, d. d. d. d. quartum, Clusij ibid. mont- anum supinum minimum La- bell. 93	
<i>Piper</i> <i>brevisolum</i> , <i>Calceolium</i> , <i>Hissinum</i> , <i>adidum</i> . 631	<i>Picu</i> liquida genus fœtidissimū. 59	<i>Polen</i> sine Pollin. 39	
<i>Piper</i> <i>Guineæ</i> . 632	<i>Picus</i> <i>v. sus</i> multiplex. 76 77	<i>Polycantha</i> Cordi. 1473	
<i>Piper</i> <i>longum</i> . 1810	<i>Plan</i> <i>a</i> leonis. 118, 1342, 166	<i>Polycan</i> huius <i>Theophrasti</i> ibid.	
<i>Piper</i> <i>v. aib</i> . 189	<i>Planta</i> <i>Cathartica</i> . 1616	<i>Polyanthemum</i> ibid.	
<i>Piper</i> <i>maritimum</i> . 1128	<i>Planta</i> congeneres <i>agrestes</i> & <i>sa- luta</i> quod differant. 388	<i>Polyanthemum</i> multiplex <i>Dod.</i> ibid.	
<i>Piper</i> quodam vocat <i>Myrtidani</i> . 139	<i>Planta</i> <i>palustris</i> . 983	<i>Polyanthemum</i> simplex <i>Dodon.</i> <i>Chrysanthemum</i> Fuchs. ibid.	
<i>Piper</i> <i>nigrum</i> & <i>album</i> . 1808	<i>Planta</i> <i>perigrina</i> . 1749	<i>Polychidum</i> . 1066	
<i>Piper</i> <i>russicum</i> , seu <i>montanum</i> . 211, 1617, 1666	<i>Planta</i> <i>pro</i> solo ac celo vim no- xiam aut salutarem habent. 1573	<i>Polyacrum</i> . 414	
<i>Piperula</i> . 694	<i>Plan</i> <i>a</i> <i>venenata</i> . 1707	<i>Polyacrum</i> . 414	
<i>Piperella</i> . 131 848	<i>Plantarum</i> differentia ab earum facultatibus. 1626	<i>Polyacrum</i> . 414	
<i>Piperisera</i> arbor <i>Theveti</i> . 18. 8	<i>Plan</i> <i>arum</i> differentia à partibus simplicia. 1489	<i>Polyacrum</i> . 414	
<i>Piperis</i> vicem apud antiquos ob- stantibus ante illius inventionem <i>Myrtidani</i> . 141	<i>Plantarum</i> <i>maritimarum</i> color. 184	<i>Polyacrum</i> . 912. <i>Dalechampia</i> & <i>Lob.</i> ibid.	
<i>Piperis</i> . 606	<i>Plantarum</i> <i>mors</i> . 1675	<i>Polyacrum</i> <i>multarum</i> , quibusdam <i>Orobrychis</i> . 412	
<i>Piperis</i> <i>Plinij</i> <i>diversa</i> à <i>Piperi</i> <i>si</i> <i>Herbariorum</i> . 611. eadem.	<i>Plantarum</i> <i>multarum</i> <i>acrior</i> aut mior <i>super</i> <i>agris</i> <i>si</i> <i>quar</i> <i>con-</i> <i>ditionem</i> . 1048	<i>Polyacrum</i> <i>reperi</i> . 419	
<i>Pistacia</i> & <i>Pissacia</i> , & <i>Pissacia</i> . 360	<i>Plantarum</i> <i>spinosarum</i> differen- tia. 1435	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pistacium</i> . 102	<i>de</i> <i>Plantis</i> <i>coruaris</i> . 877	<i>Polyacrum</i> . 412	
<i>Pistaciarum</i> arbor. 360 361	<i>Plantago</i> . 1254	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pistachia</i> . 591. 976 977	<i>Plantago</i> <i>aquatica</i> . 1055. 1057	<i>Polyacrum</i> . 412	
<i>Pistana</i> , <i>Magenis</i> . 1016	<i>Plantago</i> <i>maritima</i> . 1359	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pistachia</i> <i>lasiy</i> . 978. <i>Dodonai</i> ibid.	<i>Plantago</i> <i>major</i> Matth. 1254	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pistachia</i> <i>Plinij</i> . 193	<i>Plantago</i> <i>minor</i> , <i>longa</i> Matth. 1255	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pisti</i> non meminit <i>Diocorides</i> . 450	<i>Plantago</i> <i>minor</i> , <i>Dod.</i> ibid.	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pisum</i> . 449	<i>Plantago</i> <i>Rosea</i> , <i>Labellij</i> . 1256	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pisum</i> <i>Americum</i> . 450	<i>Plantago</i> <i>Rosea</i> , <i>Pena</i> , ibid.	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pisum</i> <i>cordatum</i> . 197	<i>Plantago</i> <i>vulgaris</i> <i>latifolia</i> , <i>Mat</i> 1244	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pisides</i> , <i>Pisum</i> <i>Piceae</i> <i>fructu</i> <i>is</i> <i>qui</i> <i>in</i> <i>conis</i> <i>invenitur</i> , & <i>coram</i> <i>viz</i> . 51	<i>Plantis</i> . 93	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pisum</i> <i>Physica</i> . 73	<i>Plantis</i> <i>umbra</i> <i>clorum</i> <i>in</i> <i>signa</i> <i>exempla</i> . 93	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pityusa</i> . 1652	<i>Platyphyllo</i> <i>mai</i> 2.3 <i>femina</i> 4.	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pityusa</i> <i>Matth</i> sine <i>Efula</i> <i>major</i> . ibid.	<i>Platyphylon</i> <i>Græcorum</i> , quidam putant esse <i>Efulum</i> <i>Latino-</i>	<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	
<i>Pityusa</i> sine <i>Efula</i> <i>minor</i> , <i>Dodon.</i> <i>Hil.</i> stirp. <i>Tithymalus</i> <i>Cypa</i> <i>ryllus</i> , <i>Fuchsij</i> . 1654		<i>Polyacrum</i> <i>alecina</i> . ibid.	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Polypodium</i>	1254	<i>Pathos caruleus</i> Theoph.	1425	<i>Pseudomayragram</i>	1148
<i>Polypodium</i>	1129	<i>Præcia vel Præcia mala</i> 107.		<i>Pseudomayragram</i> Matt.	1147
<i>Polypodium illice</i>	1210	<i>unde dilla</i>	ibid.	<i>Pseudomayragram</i>	110
<i>Polypodium primum</i> Matth.	1219	<i>Præcium officina</i>	960	<i>Pseudomayragram</i>	1123
<i>Polypodium secundum</i> Matth.		<i>Præcium fetidum</i>	1152	<i>Pseudomayragram</i>	919
1230		<i>Primula hortenſis</i> Anglica, L.		<i>Pseudomayragram bifolium</i>	1100
<i>Polypremum</i>	554	<i>& Pena.</i>	834	<i>Pseudomayragram cæterum.</i>	
<i>Polyptrichum latifolia</i> Dalecham.		<i>Primula Veru minor</i> Dod.	835		
1140		<i>Primula Veru prior</i> Matthioli.			
<i>Polyptrichum Pliny, Dalecham p.</i>		834			
ibid.		<i>Primula Veru altera</i> , Matthioli.			
<i>Polysperum Caſſiani.</i>	537	ibid.		<i>Pseudoschenaniam.</i>	1395
<i>Polysperum.</i>	444	<i>Primula Veru pachyphylla</i> , sine		<i>Pseudoschizanthi, Matt.</i>	963
<i>Polystichum.</i>	1209	<i>Auricula vſi</i> , Matth.	836	<i>Pseudoschizanthum Matthioli.</i>	822
<i>Polystichum aureum maim &</i>		<i>Primula Veru filicium, flore mol</i>		<i>Pseudoschizanthum</i>	358
<i>minus.</i>	1212	<i>tiplici.</i>	835	<i>Pseudoschizanthum quid.</i>	304
<i>Polystichum officinarum.</i>	1211	<i>Primula filicium, Lob.</i>	ibid.	<i>Pseudoschizanthum</i>	1409
<i>Poma Adami.</i>	1013-12	<i>Primula filicium flori obſcuri.</i>		<i>Pſora.</i>	1065
<i>Poma amari.</i>	626	<i>Lob.</i>	ibid.	<i>Pſorophorum.</i>	1222
<i>Poma ut ſeruitur.</i> 89. colligitur.		<i>Proſopina.</i>	1113	<i>Pſyllium 1172. Matth.</i>	ibid.
ibid &	290	<i>Proſop. ſine Aſtrition.</i>	1055	<i>Pſyllium alterum Matt.</i>	1173
<i>Poma ſilicifera, poſima.</i>	126	<i>Pruna.</i>	113	<i>Pſyllium 1168. Fuchſy.</i>	ibid.
<i>Poma uocem apud Latinos latè</i>		<i>Pruna laudatiſſima.</i>	314	<i>Pſyllium altera Matth.</i>	1169
<i>pateſt.</i> 185 unde.	126	<i>Prunella.</i>	1075-1110	<i>Pſyllium montanæ Dalecham p.</i>	
<i>Pomorum genera in Gallia propè</i>		<i>Prunella ſine Conſolida minor,</i>		ibid.	
<i>innumera.</i>	ibid.	<i>Matth.</i>	ibid.	<i>Pternix.</i>	1440
<i>Pomorum primum inuenitur.</i>	127	<i>Prunorum apud Gallos inuene-</i>		<i>Pſylliana ex borch. 399 eius parè</i>	
<i>Pomum amari ſine aureum.</i> 628		<i>ra ferè differentia.</i>	314	<i>dimodum ibi & 100. ex borch.</i>	
<i>Pomum Nicotragæ.</i>	1857	<i>Prunorum vitæ.</i> ibid. &	315	ibid.	
<i>Populi fructifera necne.</i>	87	<i>Prunus.</i>	33	<i>Pſylliana pharacopæorum poſio</i>	
<i>Populus quibus locis gaudet &</i>		<i>Prunus Schegena Matth.</i>	359	401	
<i>cui vitæ.</i>	87-88	<i>Prunus ſilicifera.</i>	130	<i>Pſyllium.</i>	890
<i>Populus Albæ, Nigra, Lybica, ſen</i>		<i>Primula Vera.</i>	833	<i>Pſyllium Regium 891. certum.</i>	
<i>Alpina.</i>	86-87	<i>Pſendanchuſa.</i>	1101	892	
<i>Populus Alpina.</i>	1210	<i>Pſendacarus ceruleus</i> Trag.	619	<i>Pſyllium ſilicifera.</i>	676
<i>Populus America.</i>	1830	<i>Pſendacarpus.</i>	1596	<i>Pſyllium maluarum quid.</i>	1689
<i>Porcelia.</i>	563	<i>Pſendobanias.</i>	690	<i>Pſyllium herba.</i>	1172
<i>Portien.</i>	1503	<i>Pſendocappium.</i>	600	<i>Pſyllium maris.</i>	1126
<i>Portum.</i>	1541	<i>Pſendocarpus.</i>	1796	<i>Pſyllium Fauceſa.</i>	1127
<i>Portum commune Matth.</i>	1542	<i>Pſendochamaſity Dod.</i>	1161	<i>Pſyllium Galorum ſine Auri-</i>	
<i>Portum ſcilium Fuchſy.</i>	1541	<i>Pſendocinnamum.</i>	1797	<i>cula maior minor, Tragi</i>	1128
<i>Portum ſcilium & capitatum</i>		<i>Pſendocoronopus Dod.</i>	670	<i>Pſyllium maior.</i>	1127
<i>Matth.</i>	1542	<i>Pſendocoffus, Matth.</i>	757	<i>Pſyllium minor Dalech.</i>	1128
<i>Portulaca.</i>	550	<i>Pſendocrania Card.</i>	197	<i>Pſyllium 849. alba Lob.</i>	ibid.
<i>Portulaca aggreſſu.</i>	1118	<i>Pſendodictamnium.</i> 892. 894.		<i>Pſyllium 1. Alpina, Dalec.</i>	850.
<i>Portulaca hortenſis ſpecies Cepæ</i>		<i>Matth. & Dod.</i>	895	<i>Pſyllium 11. Alpina, Dalec.</i>	851
<i>quibſdam</i>	1146	<i>Pſendocleberm ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium 11. Alpina, Dalec.</i>	ibid.
<i>Portulaca marina, Italiam und</i>		<i>tho.</i>	1638	<i>Pſyllium altera, Dod.</i>	ibid.
<i>geru Matth.</i>	582	<i>Pſendocyparidium.</i>	1063	<i>Pſyllium rubra, Lob.</i>	ibid.
<i>Portulaca ſarina.</i>	551	<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium.</i>	1560. 1561
<i>Portulaca ſarina cœſendavatio.</i>		<i>tho.</i>	1638	<i>Pſyllium ſilicifera.</i>	305
551		<i>Pſendocyparidium.</i>	1063	<i>Pſyllium.</i>	1298
<i>Portulaca ſilicifera.</i> 551. 1128. 1638		<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium.</i>	1688
<i>Potamogeton 1007. alter.</i>	101. 8	<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium.</i>	114
<i>Potamogeton, Caſſiori.</i>	1012	<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium.</i>	290
<i>Potentilla.</i>	1064	<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium.</i>	818
<i>Potentilla maior, Anguillara.</i> 1081		<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium.</i>	1595
<i>Potium Claſſy.</i>	1478	<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium.</i>	134-135
<i>Potium 1477. Matth. Pena &</i>		<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium flore Anthemidi.</i>	1170
<i>Lob.</i>	1488	<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium Geſneri.</i>	1170
<i>Potius ceruleum Matth.</i>	1430	<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium ſilicifera.</i>	1168
		<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium verum Matt.</i>	1170
		<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium alterum Matth. ibid.</i>	
		<i>Pſendocyperum ſine Ciſſiligo Mas</i>		<i>Pſyllium.</i>	841

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Pyrus achne. 1666
Pyrus 306. unde sic diffusi. cum
genera apud veteres. ibid. &
307. infusa hodie in Europa
ibid.
Pyrus Corica. 1595
Pyrus quadam sativa. spinis armata
1a. in Lugdunensi. 136
Pyracantha. 148
Pyracantha Chironium vocant
Graeci Spinam ex qua Lycium
fit. 149

2

Quadrifolium, Phaeum Pennae
& Lob. 1017
Quibulgi. 1687
Quercus. 185
Quercula minor. 1162
Quercus modo pro genere, modo
pro unica glandiferarum spe-
cie capitur, & unde dicitur 1.
Quercus genera quinque. 2. & 4.
Quercus genus aliud à superiori-
bus quinque in Sequano. 8.
Quercus genera Dalech. optimè
distribuit. ibid.
Quercus marina Lusitana fabu-
losa. ibid.
Quercus peregrina sine Maurita-
nica. ibid.
Quercus qua ferant præter glandem.
ibid. & 900. & 11
Quercus dignissima cognita. 11
Quercus fructum & animal ge-
nus 17
Quercus species perpetuo vi-
vens. 4
Quercus sudor. 17
Quercus vires & medicamenta.
12. & 13
Quercus corticis usus ad coria. 14.
Quinguefolium. 1263
Quinguefolium album. 1265 rub-
rum ibid. album Matth. ibid.
rubrum. Dod. ibid.
Quinguefolium lateum maius. 116
minus. ibid.
Quinguefolium. 27

R

Rabib Arabum Aphricano-
rum. 145
Radix contra venena, Certe seu-
do. *Radix* S. Helena. 1815. 1816
Radix Drakea. 1858
Radix Ideae. 192
Radix Oliva unde dicantur. 343
Radix sulphurea. 745

Radix Syriaca. Calamella. 812
Ranunculus. 1017
Ranunculus aquaticus. 1011
*Ranunculus aquaticus angustifo-
lius serratus.* Lob. 1041
Ranunculus Conflantinopolitanum
Clasf. 1034
Ranunculus flore globoso. 1033
tuberosus. 1034
Ranunculus Hederaceus. Dalech.
1031
Ranunculus hortensis prior. Dod.
1031. alter eiusdem. 1032
Ranunculus hortensis l. Fuch. al-
bus prior. sine echinatus. Dod.
1030
Ranunculus IIII. Fuch. *Laetius* al-
bus nemorensis. Dod. ibid.
Ranunculus IIII. Fuch. *luteus*.
luteus nemorensis. Dod. ibid.
Ranunculus Illyricus. 1032. *Lusi-
tanicus.* 1033
Ranunculus l. Matt. 1027. II. III.
eiusd. 1028. IIII. F. VI. eiusd.
1029
Ranunculus montanus albus. Da-
lech. 1031
Ranunculus minus polyanthes.
Lob. 1035. *flammeus aquaticus*
angustifolius. eiusd. ibid.
Ranunculus phoeniceus. Africa-
ni. 1036
Ranunculus purpureus. 1036 *lati-
folius.* ibid.
Ranunculus l. *silvestris* Fuch. an-
ticorum. Dod. 1029
Rapa quadragesima libras exci-
ditur singula. 639
Raphanus genera tria. 119
Raphanus. 634
Raphanus sine Radicula palustris.
1090
Raphanus purpureus minor. Lo.
636
Raphanus rusticus. 663
Raphanus rusticus. Matth. 636
Raphanus sativus. Matthioli.
635
Raphanus secundus. Matthioli.
ibid.
Raphanus sylvestris. 1. 95
Raphanus sylvestris Dodonaei.
635
Raphanus sylvestris officinarum.
666
Raphicum. 1608
Rapistrum. 652. 653
Rapistrum caruorum. 342
Rapistrum campestre. 1232
Rapitius colu. Catonii. 522
Rapontium. 641

Rapum & Rapa. 692
Rapum D. Antony. 1034
Rapum longum. 640
Rapum sativum orbiculatum ibi.
Rapum singulare. ibid
Rapunculus pyramidalis genus. Da-
lech. 641
Rapunculus maior Dod. 641
Rapunculus minor Dodon. ibid.
Rapunculus minor. Matthioli.
640
Regina prati Herbariarum. 1080
Remedium pampetrum. 1916
Remora araris. 447
Reseda. 1099
Reseda lutea. ibid. candida. ibid.
Resina Graeci quoniam dicitur. 61
Resina Abiegna Indica 1731. *Car-
thaginensis.* ibi
Resina ex Abiete. volatilis. Pona.
ac Picea sicca & candida. Pons
eremeticus. & vulgo pro v-
surpata. 51
Resina Colophonia. 71
Resina cretica ex Lentisco 64
Resina Lentiscina. vulgo *Massa*
6396
Resina liquida omnium presen-
tissima ex Terebinthe 61
Resinam liquidam fando Lenz.
3657
Resina picea 74. *Indica.* ibi
Resina unde manant. 6979
Resina opul. 72
Resina Sparganella. Eparg. 25
Resina Strogia Staldu. 71
Resina Strabiana. Abietina Cor-
buntina. 71
Resina *Indica* vel potius *Indica*
71
Resina *Indica* vel potius *Phrygia*
ibid.
Resina calida & sicca sunt. 77
Resina castorea. 77
Resina ex Lentisco vires. 64
Resina *resus* varius. 71
Resinifera arbores. 38
Resinabonum Herbariarum. 447
Rhabarbarum. 1699
Rhabarbarum Obegi Nemesi &
Matth. 1701
Rhabarbarum Indicum. 1701
Rhabarbarum *officinum* quorundam
1080
Rhabarbarum *manacherum* 601
606. vires. 608
Rha capitata. *Helena* folia. 1700
Rhamnus vires. 141
Rhamnus *viros* *lancea* *diagon.*
140. 141
Rhamnus. eiusque historia vult
6409

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>venetensis.</i>	138.139	<i>Rafanū genera, Prangolina, Campana, Molefia, Trachynia, Alabandica, Spinella, Centifolia, Graca seu Lychnis, Gracila, Mojibentis, Antummalū seu Carancola vā.</i>	124.125.126	<i>Sagittaria aquatica, Pliny.</i>	1016.
<i>Rhamnus Canaricus.</i>	142	<i>Rafanū loci natale.</i>	127	<i>Sagitta vel Sagittalis, Herbariarum.</i>	1016
<i>Rhamnus Catharticus.</i>	145	<i>Rafarinum & Rafarinum coronarium.</i>	763	<i>Sagitta maior, & minor, Matth.</i>	
<i>Rhepanticum aliterum angustifolius Lobel.</i>	1701	<i>Rafarinum syriacū sine Robemicum Matth.</i>	967	<i>ibid.</i>	
<i>Rhepanticum quarundam officinarum non sine errore.</i>	1286	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Sagittalis herba.</i>	1314
<i>Rha Turcicum sine Pōssum.</i>	1600	<i>Rafarinum cōnarium.</i>	967.	<i>Salatrana castanea.</i>	865.1038
<i>Rhexia.</i>	1101	<i>ibid.</i>		<i>Salicaria.</i>	1413
<i>Rhodacna male.</i>	123.124	<i>Rafarinum syriacū sine Robemicum Matth.</i>	967	<i>Salicifolium.</i>	1377
<i>Rhodiad radix.</i>	980.981	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salicornia.</i>	1377
<i>Rhododaphne.</i>	244	<i>Rafarinum cōnarium.</i>	967.	<i>Salicornia, sine Kali adasthioli.</i>	1378
<i>Rhododaphne perna.</i>	192	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salicaria.</i>	1170
<i>Rhododendru.</i>	270	<i>Rafarinum cōnarium.</i>	967.	<i>Salunca.</i>	943
<i>Rhododendrum.</i>	244	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salunca Neapolitana.</i>	986
<i>Rhodora Gallica Pliny, quorundam.</i>	1064	<i>Rafarinum cōnarium.</i>	967.	<i>Salix, trisique apud veteres variorum genera ex colore, v. s. f. n. d. uate.</i>	174. Matthioli quat.
<i>Rhois.</i>	257	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>ibid.</i>	273
<i>Rhois tria genera Plinio.</i>	107	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix alba pericalu vulgaris.</i>	
<i>Rhois multa nomina.</i>	108	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>ibid.</i>	275
<i>Rhois species Herbarij credita.</i>	109	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix Americana.</i>	111
<i>Rhopalon.</i>	1009	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix Helve Theroprafti.</i>	177
<i>Rhus vel Rhois.</i>	105.107.416	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix Homera v. s. f. n. d. uate.</i>	177
<i>Rhus siliacifolium Pliny, & altera ab illa.</i>	110	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>giperda dila.</i>	179
<i>Ribetum rubrum male quidam F. nam v. s. f. n. d. uate.</i>	134	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix humilis repens angustifolia.</i>	178
<i>Ribes Arabum.</i>	112	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix marina.</i>	179
<i>Ribes officinarum.</i>	ibid.	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix phanicephalos, sine phanicea.</i>	177
<i>Ricinus.</i>	1630 Matth.	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix phanicephalos leucophyllus Matth. & Dalei altera.</i>	176
<i>Ricinus Americus.</i>	1790	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix purpurea nigra viminalis.</i>	ibid.
<i>Rutrum.</i>	1481	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>ibid.</i>	1377
<i>Rubrum appellatio. 1. & 4.</i>		<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix 879. maior ibi minor quā & nobilis ibid siliacifolium Dod.</i>	880
<i>Ruber ab Haliphleo Plinius distinguat.</i>	3.	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix haccifera Cretici.</i>	79.880
<i>Rubum tria genera. 374. pondere & mure praestat.</i>	ibid.	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix Romana.</i>	673.678
<i>Ros. Salu & Rosella Herbariorū.</i>	1212.	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salix vicia.</i>	1109.1113
<i>Rosa.</i>	114	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Salutaris herba.</i>	139
<i>Rosa sempervirens & virens.</i>	123.	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Samara quid.</i>	80
<i>Rosa Alpina.</i>	170	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Sambucus 166 eius genera.</i>	ibid.
<i>Rosa Damascena quā & Meschia 14, & eius icon. 125. quando siliocit.</i>	128	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>167.168</i>	
<i>Rosa Damascena & Meschia & veteribus tum Graecis tum Latinis innotuit.</i>	110	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Sambucus aquatica, Thrapalm Theoprafti.</i>	270
<i>Rosa Graca.</i>	815	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Sambucus siliacifolius.</i>	98
<i>Rosae de Hiericho, Loniceri.</i>	1796	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Sambucus siliacifolius pro Mandra gora siliu desit, v. s. f. n. d. uate.</i>	ibid.
<i>Rosa Lutea, veteribus indita, & eius descriptio.</i>	115.126	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Sambucus valida.</i>	102
<i>Rosa Persana bifera.</i>	128	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Samolam Pliny, quorundam.</i>	1090
<i>Rosa siliacifolius multa varietates.</i>	127	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Samolium.</i>	881
<i>Rosa siliacifolius Anglicana Pena.</i>	ibid.	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Sanemunda.</i>	685
<i>Rosa transtamarina.</i>	584	<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Sanemunda prima, Clusij.</i>	1668
		<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Sanemunda secunda Clusij.</i>	1665
		<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Sanemunda tertia Clusij.</i>	1669
		<i>Rafarinū aculeatus.</i>	173	<i>Sanasacra sine Tabacum minus, Lobel.</i>	1395

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM

Saxifraga radix.	724	Saxifraga.	1111	1776 fine flore, cinsid.	1572
Sandales Pama.	364	Saxifraga alba, Fuchsij, sen Saxi		Scilla Aearch.	1576
Sandalo.	265	fraga quarta Matthioli.	1113	Scilla pusilla.	1578
Sanderacha.	67	Saxifraga Alpina.	1114	Scirpus quid.	988
Sanguinalis & Sanguinaria.	1113	Saxifraga altera Matthioli.	1114	Sciscima fagar.	1431
Sanguinaria & Sanguinalis fer-		Saxifraga Anglica Penn.	ibid.	Silene.	569
muna.	1073	Saxifraga aurea Dodonai.	1113	Silene, sine Scarlea, Herbarius.	
Sanguinaria radix.	1281	Saxifraga aurea, Lob.	1114	9-6.	
Sanguinella.	414-423	Saxifraga magna Matth.	1113	Selecion gramum.	1319
Sau asybra.	119	Saxifraga III. Nath.	1115	Se ymm.	14-4
Sedum erba maior, & minor.	1087	Saxifraga sen Saxifraga officinar.	786	Scelymus Dischoridis, Cynara?	
Sedus dracenis.	612			neltro, Penn.	1417
Sedum Herculi.	1286	Saxifraga Romanorum, Lob.	1114	Sc ymus Theophrasti, Clafj.	1318
Senecula.	1296	Saxifraga vera Dufcor.	1111	Scalpendrium.	1119
Senecula 1268 mar.	ibid.	Saxifraga umbellifera Anglor,		Scapa regia.	217
Senecula femina Fuchfj ibid. &		711		Scarpa Belared.	1311
1169		Saxifraga officinarum.	1111	Scardium, Scordali Plinio	302
Sentia femina Fuchfj.	1616	Scabiosa.	1065	Scardium Matthioli.	310
Senecula maior quorundam.	1181	Scabiosa Hispanica Clafj. maior.		Scordali a terra Plinj.	906
Senta'um.	1768	1110		Scordaprasum Matth. 1449, dicitur	
Santolina Dodonai, Santonicum		Scabiosamajor vulgaris Penn &		duplex Lob.	ibid.
maius Cordi.	945	Lob.	1108	Scorpoides, 1775 Dod. Matth. ibi.	
Sepus nomine Bellonius Piceas		Scabiosa Matthioli maior.	1066.	Scorpioides leguminosa.	491
descripti.	49	minor.	ibid.	Scorpioides montanum Dal.	1191
Sapium, Abietis pars inferior.		Scabiosa media Lob.	1110	Scorpio.	602-610
5-11		Scabiosa montana.	1107	Scorpio maritimus.	1317
Saponaria 8 I maior.	812	Scabiosa montana Dalech.	1108	Scorpiurus.	1111
Sponaria a'tera.	1186	Scabiosa montana ca'siderum re-		Scorpus alter, primus Plinj, sine	
Sponaria minor, Dalechampj.		gionum, Lob. & Penn.	1110	Grenipha pinosa Plux Plin. ibi.	
821		Scabiosa montana omnium mini		Scorpus alter quibusdam . . .	
Sapnaria f'hara'a.	1877	ma, Penn.	1108	Idem II. Hispani.	131
Sardiana glandes.	30	Scabiosa fapergrina Lobelij.	1108	Scorpus Theophrasti.	163-164
Sarda herba.	1018	Scabiosa, . sen Saabe salmantica		Scotzarea.	1106
Sergo s.	1917	prior, Clafj.	1109	Scotzarea Bo'mica, Mat. 1307	
Serv. phagez.	1182	Stelia	1440	Scotzon a Hispanica, Mat. ibid.	
Sarcaparilla vera.	979	Scammonia.	1662	Scortegen frumentum.	394
Saxifrag arbor Moard.	1786	Scammonium.	ibid.	Scrophularia maior.	1147
Saxifra Italorum.	1079	Scammonia, Matthioli.	1662	Scrophularia maior, Matth. 1061	
Satureia Dioscoridis & Matthi.		Scammonia maxima Montpelie		Scrophularia minor quorundam.	
897		fis.	ibid.	1048.	
Satureia duriar, Dalechampj.		Scammonia succi cuius visus est		Scrophularia secunda Dod.	1161
ibid.		quomodo collegendi, & sin-		Scrubata herba.	129-130
Saturcia mea, Dalechampj.	809	cerum ab adulterio fecerun-		Secffem officinar.	39
Satureia vulgaris, Matth.	88	doi.	ibid.	Secale.	350-361
Satyrta.	1549	Scammone succi magnus de-		Secridaca.	444
Satyrum.	1-65	lectus habendus, quia nullus		Securidaca montana Mat.	491
Satyrum Baclicum maius, Dod.		nisi varre adulteras ad nos		Sedar.	345
1566. alterum eiusdem.	1569	affertur.	1664	Sedum.	1128
minus.	ibid.	Scammonej facultates.	1663	Sedum minimum arborescens.	
Satyrum caltra'um Gemme.	1564	Scammonium tenue Plinj quatu'		Lobel.	1313
Satyrum Dalehampt forte p'en-		dum.	1426	Sedum minimū tertium, Lob.	1113
do hermadiylm. Matthioli.		Stranaria.	72	Segetalis.	1510
1567		Standex, Pelten Veneris quoru'		Selago Plinj.	184
Satyrum erythronium Matthioli		dum.	ibid.	Selago Plinj, sine Comphoca	
ibid.		Standalaceum.	660	1209-1210	
Satyrum primum Matthioli	1568	Stariola.	546 515 556	Selago Plinj quorundam.	1724
Satyrum rubrum Dalecha.	5-6	Statum velle, efflu	1091	Selinus Biglica.	39
Satyrum trifolium, seu album,		Stecha, id est Althæa marina	184	Semen.	184
Dalech.	1367	Stechanambi flores, Lob.	1885	Semen fan Tum Matthioli.	945
Savina officina.	182	Stella.	1375	Semen fan Tum, Semen lambi-	
Sauron.	645	Stella Hispanica sine flore, Clafj.		rum, em: uicta off. 1775	

INDEX HISTORIE PLANTARVM

941.944	unde dilla.	ibid.	si patens eius significatum.
Semina ut a vermiculis non- rodantur.	59	Sesula & Sesulum.	726
Seminalis.	1123	Sesula vel Sesamm.	612
Semperuivum.	1123	Sesamides Cordi.	1639
Semperuivum arborescens alterum		Sesamides magnum & parum.	1668
Matthioli.	1132	Sesamides minus Dalechampi.	1670
Semperuivum marinum quorun- dam amarum Colameia.	1693	Sesamides minus Gesneri.	1938
Semperuivum mantanum.	1196	Sesamides minus Matthioli.	1670
Senecio.	174	Sesamides parum sine vicinis des minimum.	681
Senecio fortidus Dalechampi.	176	Sesamm & Sesama.	482
Senecio maior sine Flos S. Iacobi		Sesamm verum.	482
Fuchsi.	175	Seseli.	748
Senecio maior sine Flos S. Iacobi.		Seseli Aethiopicum Beattihol.	748
Matthioli.	176	Seseli Aethiopicum verum.	748
Senecio Matthioli.	175	Seseli Majilicense.	744.749
Senecioides species Dodon.	177	Seseli Majilicense, Pena.	749
Senecioides genui Myceni.	ibi	Seseli Peloponnesense, Matthioli.	749
Seneca. 117. quare Alexandrina	218	Seseli Peloponnesense folio Cicuta.	Pena.
Senia folij an folliculū magis pur- get.	ibid.	Seseli Peloponnesense folio Cicuta.	quorundam.
Senio Mauritiorum.	119	Seseli pratenfense, Lobellij.	752
Seniu.	1435	Sesania vel Sesanios Majilic.	334
Seniu quid.	1435	Scutolapathus.	141
Sesifolium.	1167	Scutoma a. he.	ibi
Serapias candida flore, Lobellij.	1562	Sicla, pro Sicula, Bera omnis ho- die à Medici nominatur.	511
Serapias Dioscor. Gemma. Orchu		Sida.	1011.1012
Basilica altera. Cynoscorbiu al- tera maior Lobellij.	1577	Sideritis.	1117
Serapias femina pratenfis, sine		Sideritis alia.	1112
Palma Christi, atque basilica		Sideritis prima, Matthioli.	1117
alterum Dod.	1569	Sideritis secunda, Matthioli.	1118
Serapias minor rubra, Gemma.		Sideritis tertia, Matthioli.	ibid.
1562		Sideritis quarta, Matthioli.	ibid.
Serapias montana folio leni G. m		Sideritis Monspeliensium.	1120
m.	1561	Sideritis Monspeliensis, Pena.	1122
Serapias palustris altera leptophy- la. Gemma.	1162	Sideritis montana, Pena.	ibid.
Serapias palustris III. Gemma.		Sideritis pratenfis lutea.	1121
1563		Sideritis pratenfis rubra.	ibid.
Sericacalypha 357 controuersum		Sideritis, Querna folia, Dalech.	ibid
an eadem.	ibi	Sideritis quorundam.	1241
Seriu.	546.554.566	Sideritis tertia quorundam, ma- gno errore.	1294
Seris fatua Lobellij.	57	Sidia qua dicantur.	855
Serpentaria.	1104.1185.1601	Sidium quid.	304
Serpentaria maior vulgo dicta.	ibid.	Sigallum beatae Mariae.	1411. 1412
Serpentaria minor, Matthioli.	1596	Sigallum Salomonis.	1623
Serpentaria minor, Matthioli.	1602	Silaum Pliny. quorundam.	1093
maior, eisd.	1603	Silene stemonum officinarum.	744
Serpina omnium minima, Lobellij.	669	Siler montanum officinarum of- ficinarum.	748.749
Serpillum 901. Matthioli & Ner- banense Lob.	ibid.	Sila Pliny.	748
Serpillum 2190 Dioscor.	1682	Silicia.	480.482
Seruaula.	1162. 128. 1357	Silicia.	480
Serta vel Serula Campana.	511	Siligo tritici species.	374. quon la

Sifmbrum

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Sifimbrium hortense.</i>	677	<i>Solea equina, sine Securidaca mō-</i>	<i>Spina quid.</i>	148
<i>Sifimbrium filastre.</i>	ibid.	<i>tana, Matth.</i>	<i>Spina unde nomen accepit.</i>	161
<i>Siffrinchion Dodonæi.</i>	1579. 1580	<i>Solidago.</i>	<i>Spina & Spina Aegyptia.</i>	160
<i>minus Clasy.</i>	1580	<i>Solidago medica.</i>	<i>Spina aru.</i>	334
<i>Siffrinchium quorundam.</i>	1615	<i>Solidago minor.</i>	<i>Spina alba.</i>	131. 133. 1461
<i>Sium.</i>	1091	<i>Solidago Sarracenica.</i>	<i>Spina alba Dalechampi.</i>	ibid.
<i>Sium alterum, Frute folia.</i>	1094	<i>Solidago Sarracenica Fuchij.</i>	<i>Spina alba hortensis Fuchij.</i>	ibid.
<i>Sium non odoratum Trag.</i>	1090	<i>Lob.</i>	<i>Spina alba altera Matthioli.</i>	1461
<i>Sium verum, Matthioli.</i>	1091. 1091	<i>Solis flos, & Sol Indiani.</i>	<i>Spina alba Matth.</i>	1462
<i>gare, eiusdem. ibid. Grateu,</i>		<i>Somphos.</i>	<i>Spina Appendix Plumj.</i>	137. 137.
<i>maius Dodonæi.</i>	ibid.	<i>Sonchus.</i>	<i>quare ita appellata.</i>	138
<i>Smilax.</i>	14. 1421	<i>Sonchus asperior Lob.</i>	<i>Spina Arabica.</i>	160. 1467
<i>Smilacis anceps & multiplex si-</i>		<i>Sonchus asper Matth.</i>	<i>Spina Arabica & Aegyptia.</i>	1466
<i>gnificatio errorem sapie inducit</i>		<i>Sonchus dendroideus Dalechamp.</i>	<i>Spina infestior.</i>	145
<i>in re herbaria.</i>	14		<i>Spina mollis.</i>	181
<i>Smilax Arcadium.</i>	ibid.		<i>Spina peregrina.</i>	1481. 131
<i>Smilax aspera Matthioli.</i>	1422		<i>Spina purgatoria.</i>	1486
<i>Smilax hortensis, seu Delichus.</i>			<i>Spina regia.</i>	1464
	473. 474		<i>Spinacea, sine Spinachis, seu Spi-</i>	
<i>Smilax humilis angustifolia.</i>			<i>macum olim 543 veteribus in</i>	
<i>non ferrata.</i>	25		<i>cognita.</i>	141
<i>Smilax Lenii Matth.</i>	1423		<i>Spininicta.</i>	111
<i>Smyrniolum.</i>	706		<i>Spinus.</i>	133
<i>Smyrniolum Creticum.</i>	707		<i>Spinus cernuus.</i>	119
<i>Smyrniolum Matth.</i>	ibid.		<i>Spica & Theoph.</i>	106
<i>Smyrniolum verum Dioscoridis &</i>			<i>Splith a bono quorundam.</i>	1194
<i>Dodon.</i>	ibid.		<i>Splith Ilyriarum.</i>	1192. 1193
<i>Socoterina Alci.</i>	1693. 1695		<i>Spondylium.</i>	711
<i>Solanum.</i>	596. 1719		<i>Spondylium alterum Dodon.</i>	739
<i>Solanum arborescens.</i>	600		<i>Spigia in radicibus Asperagis.</i>	
<i>Solanum Halicacabum, Matthioli.</i>			<i>Spirry Belgarum & Anglarum</i>	
	597			1331
<i>Solanum hortense.</i>	ibid.		<i>Squilla.</i>	1375
<i>Solanum hortense Gracorum.</i>	1429		<i>Squinanthum officina.</i>	1194
<i>Solanum Indicum, seu Americū,</i>			<i>Stachys 962. Matthioli 963. Fuchij.</i>	
<i>Dalechampij.</i>	1499		<i>ibid.</i>	
<i>Solanum ligneum, vel lignosum.</i>			<i>Stachys Lusitanica quorundam,</i>	
	1407. 1413		<i>Lob.</i>	964
<i>Solanum lignosum quorundam</i>			<i>Stacte.</i>	1751. 1756
<i>Herbariorum.</i>	1338		<i>Scaphus agria.</i>	1408
<i>Solanum manic forma.</i>	1721		<i>Scaphogorgia. 1629. Matthioli.</i>	
<i>Solanum monocot Gefneri.</i>	1312		<i>Scaphylodendron.</i>	113
<i>Solanum pomiferum Herbariorū.</i>			<i>Statice Dalech.</i>	109
	632		<i>Stella leguminosa Labelij.</i>	495
<i>Solanum somnificum, Fuchij.</i>			<i>Stellaris. 1175. 1181. 1142. 1164.</i>	
	1721			1473
<i>Solanum somnificum, Matthioli.</i>			<i>Stelephora.</i>	419
	1710		<i>Stela Enboicarum.</i>	17
<i>Solanum somnificum alterum.</i>			<i>Stephanomellis, Plumj. quorundam</i>	
<i>Matthioli.</i>	1720			1064
<i>Solanorum vires & temperamen-</i>			<i>Stephanos Alexandri.</i>	210
<i>ta.</i>	598		<i>Strogethorus.</i>	113
<i>Solaris.</i>	1349		<i>Stroben, Ladannum quidam dicit</i>	
<i>Solarium maius, Herbarior. mor-</i>			<i>rust.</i>	117
<i>sale officinar. Solarium lethale,</i>			<i>Strochus viridis, Dalech.</i>	781
<i>quorundam.</i>	1721		<i>Stropei plurima isidem quidam</i>	
<i>Solarium officinarum.</i>	596		<i>bus, viribusque prædita. for-</i>	
<i>Solihoffella.</i>	1037		<i>ma & generis sunt diversæ.</i>	
<i>Soldanella officinarum.</i>	526		<i>Stropei multa belustrope & be-</i>	
<i>Solea equina.</i>	492		<i>lusiopie.</i>	1348
<i>Solea equina, Dalechampij. ibid.</i>			<i>Stropei quæ non nisi alii crocei</i>	
			<i>fructus</i>	

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM

— fecundant.	1401	Syagris	364	Tarson.	685
Strepis Umbellifera.	688	Sycamore.	210 360	Taurion.	35
in Styrpibus, ve in ceteris rebus,		Sycomorus unde nomen habeat.		Tavris.	24
interdum aut manifesta exfluit		14. & 342		Taxis eiusque, descriptione, ubi	
aut productio quædam, & digna		Sycomorus, Aegypti peculiaris ar-		frequenter nascitur & quo an-	
qua literarum monumentis cõ-		bor.	342	no tempore 78. 79 quibus u-	
signentur.	132	Sycomeris succus.	317	cendi præcipue videtur. ibid.	
Styrpibus eisdem non omnes partes		Syderitis quarta Plinij.	576	de eius temperamento, qua-	
ad idem utiles.	1396	Sylva mater.	1427	fit. ibid.	
Styrpium differentia aliquot	688	Symeonis herba.	591	Taxis vel umbra letal. 14. non	
Stices Cytina, sine Sticados		Symphonia vel Symphona, v. l.		ubique.	15
Citrinum officinarum.	779	Symphona Plinij.	540	Taxis umbra sub ea obdormienti-	
Stube, Theophr.	1015 1016	Symphitum magu 1074. Mat-		bui letifera	779
Stube Salomatica altera Claf.	1109	thia ibid. umbrosam, Lobe. lig.		Teda aliter, Cembro Italorũ, cum	
Stichas & Stichas.	917	ibid.		natales forma, vñus 47. 48	
Stichas capitulis foliatis.	918	Symphitum petraum.	1110	Teda quid sit, quando id multos	
Stichas Cytina.	775 779	Symphitum petraum, Matt 1174		exercit. d. g. fiat explicatur i	
Stichas Cytina, Matth. Stichas		Lob. ibid.		49	
Cytina altera	779	Symphitum pumilum repens Bar-		Teda vocis multiplex significa-	
Stichas Matthioli.	918	raginis fasc. Lob.	580	tiõ.	48
Stirax calamita offic.	115	Symphitum quorundam.	1205	Tenbol.	1777 1778
Strangulator hepatis.	1103	Synanchica. v. l. g. Dalecham. ib. d.		Trembotum Persiarum.	540
Stratiotes aquatica.	1061	Synanchica species, Inucaria Sal-		Telephium.	551 555
Stratiotes lutea Claf.	771	manicensis, Cinsy.	1185	Telephium floribus purpureis, Lo-	
Stratiotes multifolia.	768	Syringa.	555	bolly	1195
Stratiotes multifolia maior, Matt.	769	Syringa carnea flore, Lilac. Mat.		Telephium Hispanicum, Claf.	
Stratiotes multifolia minor, Matt.	769	555		136	
Stratiotes multifolia aquaticum,				Telephium minus semper vivens	
Matth.	770			1 ob.	136
Strubul.	4352			Telephium purpurascens, Fuch.	
Strumaria, quorundam.	1056			1515	
Strumaria, Herbariorum.	1017			Terra capillus.	1209
Strumma.	596 599 1219			Terra cernea.	1310
Struthia mala & Struthiella.				Terra merita.	1822
120				Terebintharia Dillij.	1196
Struthium.	1186			Terebinthina Vinceta & cum col-	
Struthium Fuchij.	813			legenda ratio.	54
Struthium quorundam.	810			Terebinthina Veneta qua vulgo	
Styrchodendrum.	600			dicunt, Venetia offerunt ex	
Styrpibus.	556 599 1429			Cypro.	62
Stubulus.	47			Terebinthinum oleum ex fructu	
Styrax. 115. eius vires.	116 117			maturo Terebinthi.	ibid
Styrax ut adulteretur.	116			Terebinthus.	61
Styrax liquidi apud veteres uul-				Terebinthus apud Syros Picem	
la men 10	116			fundit.	74
Suber 12. eius duo genera.	ibid.			Terebinthus Indica Theophras-	
Suber dictatio in orbem cortice a-				ti 361	
li. minuitur. contra castoreũ				Tessiculæ canis.	1549
arborum naturam	25			Tessiculæ 11. species Matthioli.	
Suber tardijimè cariem sentit.				1551	
ibid.				Tessiculæ moriani semina, Do-	
Suberis vires.	ibid.			don.	1552
Succisa.	1065			Tessiculæ moriani mai. Dodon.	
Succus ex Tribulis.	514			ibid.	
Succus Antennæ.	1200			Tessulus odoratus Dodonæi.	
Su. plur. Quilense.	7793			1555	
Supercilium terra.	1209			Tessulus vulpis Dodonæi.	1556
Sura.	1761			Tetrabis Herbariorum & offi-	
Sorngens Serapionii.	1572			narium.	1118
				Tetrabis, s. erba Indica, Sideri-	
				tu prima, Fuchij.	1119

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM

<i>Tetrabit. Sideriis Heraclea Dio-</i>	<i>Thora.</i>	1743	<i>thioli.</i>	1644
<i>scordii.</i>	<i>Thora unde dicatur.</i>	1736	<i>Tithymalus Helioscopus, Dod.</i>	1617
<i>Tetragonia Theophrasti.</i>	<i>Thoryberrum.</i>	1144	<i>Tithymalus Helioscopus, Dod.</i>	1648
<i>Tetralice.</i>	<i>Thua arbor. & super ea varia</i>		<i>Tithymalus Helioscopus Matth.</i>	1644
<i>Tetralix.</i>	<i>discrepantium opiniones.</i>	19	<i>Tithymalus leptophyllus, Matth.</i>	1643
<i>Tetralix spinosa Tragi.</i>	<i>Thua genera quatuor. ibid. &</i>	60, 61	<i>Tithymalus Myrsinites seu fe-</i>	1641
<i>Tetraptyllum.</i>			<i>mina, Matth.</i>	1641
<i>Tetrerchis, vel Trietichis alba</i>	<i>Thua genus tertium, Arbor vi-</i>		<i>Tithymalus Myrsinites melius</i>	1647
<i>Gemma.</i>	<i>ta Gallia.</i>	60	<i>expressus.</i>	1647
<i>Tenacium.</i>	<i>Thua Mafiliensis.</i>	183	<i>Tithymalus paralis, De ex hyl.</i>	1647
<i>Tenacium 1164 primum, Matth.</i>	<i>Thua odorata.</i>	110	<i>Tithymalus paralis, Dod & Te</i>	1647
<i>ibid. alterum eiusdem.</i>	<i>Thuis quod apud Hamerū, Citra</i>		<i>ma.</i>	1647
<i>Tenacium Babicum Clasy. ibid.</i>	<i>interpretatur Macrobius.</i>	61	<i>Tithymalus paralis, Matthioli.</i>	1643
<i>Ten brum.</i>	<i>Thurifera arbor Themeti.</i>	1754	<i>Tithymalus platyphylus, Cuf &</i>	1619
<i>Thalicttrum tenuifolium, Cordi.</i>	<i>Thuris adulteratio.</i>	71	<i>Dod.</i>	1619
<i>1081</i>	<i>Thur.</i>	1751	<i>Tithymalus serratus Dalecham.</i>	1619
<i>Thalicttrum, Dod.</i>	<i>Thur: terra.</i>	1119	<i>Tithymalus serratus, Cusid.</i>	1619
<i>Thalicttrum magnum, Dod.</i>	<i>Thuris hypodis folium, Pena.</i>		<i>Tithymalus suberosus sine styli.</i>	1751
<i>paruum.</i>		1754	<i>Tomentaria, seu Timentaria.</i>	1751
<i>Thapsi.</i>	<i>Th. a Mafiliensium.</i>	40	<i>Tora Faldusium, Aloum l.</i>	
<i>Thapsia.</i>	<i>Thymbra & Samaria.</i>	824	<i>Diase Gifneri.</i>	1751
<i>Thapsia Matth.</i>	<i>Thymbra Dod.</i>	828	<i>Terdylum.</i>	743 11
<i>Thapsia Pena vera.</i>	<i>Th. mbra vera, Pena.</i>	827	<i>Terdylum, Dod.</i>	751
<i>Thapsia Tragi.</i>	<i>Thymclae. 1666. Matth. ibi Dod.</i>		<i>Terdylum, Cusid. Creticum, Lo-</i>	751
<i>Thapsia succi.</i>	<i>ibid.</i>		<i>belli.</i>	751
<i>Thelyphorum.</i>	<i>Thymclae species Myron.</i>	1668	<i>Terdylum, sine Stela Creticum</i>	ibid.
<i>Theriacaria.</i>	<i>Thym Lea vera Clasy, & Dod.</i>		<i>Termentilla.</i>	1267
<i>Therionaria Plinij.</i>	<i>huter purgant.</i>	1667	<i>Termentilla candida.</i>	1275
<i>Thesau De trib. Endimia Tragi.</i>	<i>Thymus & Thymum 839. 16: 2</i>		<i>Terabene vulg.</i>	1275
<i>162</i>	<i>Thymum reticum.</i>	900	<i>Taxicon Ladanum in Africa</i>	1275
<i>Thlas & Thlaspe. 660. 1180.</i>	<i>Thymum vulgare, sine durus,</i>		<i>Trachelium 819. maius ibid. ni-</i>	819
<i>Thlaspi angustifolium Dado. &</i>	<i>Dod.</i>	901	<i>Trachelium minus, sine Fula-</i>	819
<i>Enchij.</i>	<i>Thissellium Plinij.</i>	701	<i>rea Dod.</i>	819
<i>Thlaspi angustifolium Enchij.</i>	<i>Tibulus.</i>	47	<i>Trachelium montanum, Dalech.</i>	1101
<i>692</i>	<i>Tilephon.</i>	1128	<i>Tragacantha.</i>	1277
<i>Thlaspi fruticosum foliū Lencij</i>	<i>Tilia.</i>	89	<i>Tragacantha vera, sine Pectini,</i>	1277
<i>marini minoris.</i>	<i>Tilia locus, temperamenta, vires</i>		<i>Clasy.</i>	1277
<i>1181. 1182</i>	<i>& vsus.</i>	91	<i>Tragacantha Laryma.</i>	1277
<i>Thlaspi fruticosum spinosum Nar</i>	<i>Tilium confusum Plinius cum</i>		<i>Tragacantha Matth.</i>	1277
<i>bonsense.</i>	<i>philyrea.</i>	90	<i>Tragacantha secundum Disfordi</i>	1277
<i>1182</i>	<i>Tintorea.</i>	779	<i>quorundam.</i>	1277
<i>Thlaspi fruticosum alterum, Lob.</i>	<i>Tincterium granum.</i>	151	<i>Tragon Matthioli & Lobel. 38</i>	1277
<i>ibid.</i>	<i>Tincterius flos sine Genista hu-</i>		<i>mi 12.</i>	174
<i>Thlaspi Hederaeum Lobellij.</i>	<i>Tipha & Tiphe. 375. 389. 190. 92</i>		<i>Tithymalus characius, Matth se-</i>	1641
<i>1420</i>	<i>Tithram.</i>	806 1010	<i>condus, Dod.</i>	1641
<i>Thlaspi incanum Mechliniense,</i>	<i>Tithymalus.</i>	1641	<i>Tithymalus characius primus,</i>	1641
<i>Lob.</i>			<i>Dod.</i>	1641
<i>118. 1112</i>	<i>Tithymalus characius quartus,</i>		<i>Tithymalus characius quartus,</i>	1615
<i>Thlaspi minus Cordi.</i>	<i>Tod.</i>	1615	<i>Tithymalus Cyparissius, Dod.</i>	1648
<i>636</i>	<i>Tithymalus Cyparissius, Matth.</i>	1644	<i>Tithymalus dendroides, Doda-</i>	1645
<i>Thlaspi maritimum.</i>			<i>na. ex eod. & Caserio.</i>	1645
<i>1193</i>	<i>Tithymalus dendroides, Doda-</i>		<i>Tithymalus dendroides, Mat-</i>	
<i>Thlaspi Matth.</i>	<i>na. 1.</i>			
<i>1662</i>				
<i>Thlaspi 11. Matth.</i>				
<i>161.</i>				
<i>Thlaspi 11. Matth.</i>				
<i>ibid.</i>				
<i>Thlaspi 111. Matth.</i>				
<i>ibid.</i>				
<i>Thlaspi 111. Matth.</i>				
<i>118.</i>				
<i>Thlaspi minus clypeatum, Pena.</i>				
<i>118.</i>				
<i>Thlaspi montanum candidum.</i>				
<i>1180</i>				
<i>Thlaspi montanum minus, Da</i>				
<i>lib.</i>				
<i>ibid.</i>				
<i>Thlaspi Nerb-nens- Pena 1132</i>				
<i>1132</i>				
<i>Thlaspi secundum sine Cratena.</i>				
<i>quorundam</i>				
<i>806</i>				
<i>Thlaspi umbellatum, Pena. 1183</i>				

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Trageriganum.</i> 888	<i>Triphyllum.</i> 1353	<i>pinæ, Clafy ibid montana</i> 11
<i>Trageriganum</i> 11. Clafy. 890	<i>Triplolum Dodon.</i> 1389	<i>mima, Lob</i> ibid.
<i>Trageriganum, Matth</i> 888 <i>Dod.</i>	<i>Triplolum vulgare Lob</i> 1390. <i>mi</i>	<i>Typha palustris</i> 994. <i>aquatica</i> ibi
<i>ibid. Mangetiense, Dalecham.</i>	<i>ibid. cuspide.</i>	<i>minor, Pena.</i> 995
889. <i>notum eiusd.</i> ibid.	<i>Trithales.</i> 1128	
<i>Tragus framenti genus, Spica ce</i>	<i>Tristiana Brasica nostra.</i> 521	V
<i>rulea.</i> 576-577-391	<i>Trutici ex Dalechamys sententia</i>	
<i>Tragus Matth.</i> 1477	<i>disiſſa.</i> 374	<i>Vaccaria rubra maior.</i> 55
<i>Tragus, ſine Scorpis maritimus.</i>	<i>Trutici vites & temperamenta.</i>	<i>Vaccaria rubra minor.</i>
1387. <i>Dalech.</i> 1388	381	ibid.
<i>Trasi.</i> 1384. <i>cum flore, Matt.</i> ibid.	<i>Trutici viſus tum in alimentis,</i>	<i>Vaccinia nigra, 392. rubra. eodem</i>
<i>Tribulus.</i> 512	<i>tum in medicina.</i> 378	<i>fol.</i>
<i>Tribulus aquaticus.</i> 514	<i>Truticum.</i> 371	<i>Vaccinium.</i> 253-254
<i>Tribulus aquaticus, marinus of</i>	<i>Truticum Boninum.</i> 419	<i>Vaccinium nigrum</i> 100
<i>ficum.</i> 1082	<i>Truticum candidum præſtantius</i>	<i>Vaccinium paluſtre.</i> 187
<i>Tribulus marinus.</i> 1367	<i>ruſo ad paupercum.</i> 374	<i>Vaccinium Plumj, Lacath Theo</i>
<i>Tribulus minor reſtus Dalecha.</i>	<i>Truticum Indicum.</i> 381	<i>phraſi.</i> 255
513	<i>Truticum Indicum Matthioli.</i>	<i>Valeriana maior & hortenſi.</i>
<i>Tribulus terreſtris.</i> 512	382	927
<i>Tribulus terreſtris Matth.</i> 513	<i>Truticum nigrum.</i> 1136. 1137	<i>Valeriana montana.</i> 1127
<i>Tribulus terreſtris minor reſtus.</i>	<i>Truticum rufum.</i> 376	<i>Valerianarubra.</i> 1186
514	<i>Truticum ruſum.</i> 375	<i>Valeriana ſilacſtris maior, Dod.</i>
<i>Trichomanes.</i> 1109-1111	<i>Truticum Spica matica.</i> 378	<i>Plu parum, Matt.</i> 1042
<i>Trichomanes aquaticum.</i> 1022	<i>Truticum Tiptinum.</i> 391	<i>Valeriana ſilacſtris minor, Plu</i>
<i>Tricocum pomum Meſſile.</i> 334	<i>Truticum Turcicum Fachſij.</i> 382	<i>minimum Dodon.</i> 1042.
<i>Trifolium</i> 503	<i>Truticum vaccinium ſine boni</i>	<i>Valeria.</i> 814
<i>Trifolium acetuſum 1354.</i> 1355	<i>num.</i> 1336	<i>Vibna alba Amicenna.</i> 1147
<i>Trifolium ex America, Dodon.</i>	<i>Truticum vaccinium ſine Melam</i>	<i>Venus inter ſe plerumque can</i>
506	<i>pyram.</i> 419	<i>traria natara.</i> 505
<i>Trifolium aſphalticæ legiaribus</i>	<i>Truxago ſine Tryxaga.</i> 1162	<i>Veratrum album.</i> 1631
<i>ſolgi.</i> 504	<i>Truxago paluſtris.</i> 909	<i>Venerca.</i> 1617
<i>Trifolium aſphalticæ rotundū</i>	<i>Trychan.</i> 596	<i>Veratrum nigrum.</i> 1633
<i>ſolgi.</i> ibid.	<i>Taber.</i> 1604	<i>Verbaſculum minimum.</i> 1304
<i>Trifolium cochlearum.</i> 503	<i>Tabera & Fungi 1587-1588. 1587</i>	<i>Verbaſculum Alpinum, Dalecham</i>
<i>Trifolium equinum.</i> 529	<i>Taberam das genera.</i> 317	<i>pp.</i> 1116
<i>Trifolium Hepaticum.</i> 1274	<i>Tabera, Matth.</i> 1585	<i>Verbaſculum quorundam.</i> 1303
<i>Trifolium latum minimum, Pe</i>	<i>Taberariam maior Myconi.</i> 1099	<i>Verbaſcum.</i> 1298. <i>tum genera</i>
<i>na & Lob.</i> 1354	<i>Taberaria minor Myconi.</i> ibid.	ibid.
<i>Trifolium minus.</i> 1076	<i>Tabuli ad aſthmæ viles.</i> 1912	<i>Verbaſcum album ſemina flore</i>
<i>Trifolium odoratum alterū, ſine</i>	<i>Tabulas.</i> 47-52	<i>albo, Dod & Fachſij.</i> 1100
<i>ſatum.</i> 506	<i>Talipa 1493. 1528. maior Clafy.</i>	<i>Vod. flore lates.</i> 1101
<i>Trifolium pratense latum, Fach</i>	1529 <i>minor Dod.</i> ibid.	<i>Verbaſcum ſemina, Lobelij.</i>
<i>ſg.</i> 1155	<i>Talipa ſine Liliæ naciſſus latum</i>	1300
<i>Trifolium pratense. Matth.</i> 1354	<i>latifolius, Lob.</i> 1330	<i>Verbaſcum laciniatum, Matthioli.</i>
<i>alterum eiusdem.</i> ibid	<i>Tam laderum.</i> 1795	1301. 1302
<i>Trifolium pratense Salamantiſc.</i>	<i>Tunica minima Dalechamij.</i>	<i>Verbaſcum l. Matthioli.</i> 1298:
<i>Clafy.</i> 1356	1791	<i>II & III. eiusdem.</i> 1299
<i>Triorchus.</i> 1286. <i>vne diſſa.</i> 1287	<i>Tunica ſcunnice Officin.</i> 806	<i>Verbaſcum nigrum Saluſolium,</i>
<i>Triorchus laeta flore laeta Gem</i>	<i>Turbith Alexandrinum, quernu</i>	<i>Lob.</i> 1299
<i>ma. Lob.</i> 1561	<i>dam.</i> 1646	<i>Verbaſcum ſyncroſtre Dodonci.</i>
<i>Triorchus laeta Gemma, Lobelij.</i>	<i>Turbith nigrum quorundam.</i>	1301
1561	1655	<i>Verbaſcum ſyncroſtre Laticum,</i>
<i>Triorchus Scrapias, Aegineta.</i>	<i>Turſanum.</i> 1495	<i>Lob.</i> 1301. 1302
1569	<i>Turpetum nigrum Alſuazij.</i> 1653	<i>Verbaſcum ſyncroſtre, ſolu Salua</i>
<i>Triorchus Scrapias mas, Fachſij.</i>	<i>Turpetum offici.</i> 1680	<i>reniſolia, Lob.</i> 1301
1554	<i>Tuſilago ſine Farſugium, Mat</i>	<i>Verbaſcum IIII ſyncroſtre, Mat</i>
<i>Triorchus Scrapias ſecundum, Do</i>	<i>thioli.</i> 1049	<i>thioli.</i> 1300
<i>dones, Matthioli Toſſiculus</i>	<i>Tuſilago togo. Matth.</i> 1041	<i>Verbaſcum ſyncroſtre Nonſelico</i>
<i>II</i> 1155	<i>Tuſilago Alpina, ſine montana,</i>	<i>ſum.</i> 1304
<i>Triorchus Scrapias III. Dodon.</i>	<i>Dalechamij 1052. altera Al</i>	<i>Verbenca & Verbenca.</i> 1334
ibid.		du 2

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Verbena Peruviana.</i>	1910	<i>Vinum ex Berberi.</i>	137	<i>Viscum apud Galliam veterum</i>	
<i>Verbena reilla Dod.</i>	1316	<i>Vinum ex Castaneis apud Indos.</i>		<i>Draydes in magna veterum</i>	
<i>Verbena reilla, sine mai. Fuchf.</i>		<i>trad. nre Curtio.</i>	33	<i>vis.</i>	10
1335		<i>Vinum ex Cydonijs.</i>	291	<i>Viscum exitis efforibus ibid.</i>	
<i>Verbena sapina & tenuifolia.</i>		<i>Vinum è 180 Celti. 347-348.</i>	349	<i>Viscum Indicum.</i>	180
<i>Clusj.</i>	1317	<i>Vinum è malis.</i>	289	<i>Viscum nosteris quibusdam</i>	
<i>Verbenace vulgaris, Matthioli.</i>		<i>Vinu myrtites. 141. obsoleuit</i>	242	<i>quere. Lignum sancti cruci</i>	
1335		<i>Vinum è Pyru.</i>	308	<i>du'tum.</i>	19
<i>Vercinum.</i>	1505	<i>Vinum Rhoites ex Punicis matu</i>		<i>visum insula.</i>	18
<i>Vermicularis sine Illecebra maior</i>		<i>ra.</i>	306	<i>Viscum quercu.</i>	13
<i>Labellij sine Sempervivum mi</i>				<i>visum sine radice ubi ubi ad</i>	
<i>nu alterum. Dod.</i>	1132	<i>Viola alba.</i>	1526	<i>nascent. & quibus.</i>	18
<i>Vermicularis officinarum.</i>	1128	<i>Viola albulbosa Fuchfj.</i>	1527	<i>Viscum ad ancipia ex radicibus</i>	
<i>Vermiculatum frutex maior. La</i>		<i>violabarbata maior. 310. latifolia</i>		<i>Viburni.</i>	157
<i>bellij.</i>	1132	<i>& angustifolia.</i>	ibid.	<i>Visnaga Gingidium Dod.</i>	711
<i>Vernica sicci vires.</i>	69	<i>Viola flammea, sine tricolor. 300</i>		<i>Visnaga, Gingidium Matthioli.</i>	710
<i>Vernix.</i>	39	<i>maior Matth. ibid minor. seu</i>			
<i>Vernix quid, & unde fiat. 67. 68</i>		<i>lacea altera, eiusdem.</i>	ibid.		
<i>Vreslaris.</i>	1241	<i>lacea.</i>	800		
<i>Frinolis & Primaria.</i>	1312	<i>Viola latifolia, aus peregrina. 805</i>			
<i>Vernica femina 1050. Dodon.</i>		<i>Viola lutea multiplex.</i>	803		
<i>& Matth.</i>	ibi.	<i>Viola Mariana, Medium Diofco</i>			
<i>Vernica femina Fuchfj 1139.</i>		<i>rid.</i>	815		
1240		<i>Viola matronalis, vel Viola Da</i>			
<i>Vernica mai.</i>	138	<i>mascula & marina 804. alba</i>			
<i>Vernica mai Fuchfj. 1319. Matth.</i>		<i>& purpurea.</i>	ibi.		
<i>ibid.</i>		<i>Viola palustris.</i>	1012		
<i>Vernica maxima, Dalech.</i>	1165	<i>Viola purpurea.</i>	797		
1319		<i>Viola purpurea, Matth.</i>	798		
<i>Verrucaria.</i>	134	<i>Viperina.</i>	1104		
<i>Verrucaria a'ia minor.</i>	1350	<i>Virga aurea altera, Lob.</i>	1273		
<i>Verrucaria Chondrilla prior.</i>	359	<i>Virga aurea 1272. Matth. ibid.</i>			
<i>Vesicaria. 1596. 598. repens.</i>	397	<i>Dod.</i>	ibid.		
<i>Vetonica.</i>	1122	<i>Virga laniolis Onidij, Rhamnus</i>			
<i>Vetonica coronaria Fuchfj, alii</i>		<i>seu Spina alba, & cuius mira</i>			
<i>li & coronaria Dodon. Costa</i>		<i>viros aduersus fascinum. 142</i>			
<i>brico Pene.</i>	816	<i>Virga pistoris.</i>	1447		
<i>Vetonica sylvestris, Dodon.</i>	1068	<i>Virga sanguinea Plinij.</i>	197		
<i>Vgetal.</i>	1849	<i>Virga sanguinea Plinij</i>	270		
<i>Phobebasum.</i>	1845	<i>Viscaria planta, Pena.</i>	683. 684		
<i>Viburnum, Spira Theophr.</i>	256	<i>Visci confectio varia.</i>	19		
<i>Viburnum Matth.</i>	204	<i>Visci discrimina.</i>	18		
<i>Vicia.</i>	478	<i>Visci planta descriptio.</i>	ibid.		
<i>Vicia sylvestris.</i>	479	<i>Visci qui rami ad superstitionem</i>			
<i>Vicia vera, Aphaca Matthioli.</i>		<i>etiam inter Christianos abu</i>			
478		<i>sus.</i>	19		
<i>Vicia perinnica.</i>	211. 832	<i>Visci temperamenta & vires.</i>	18.		
<i>Vincetoxicum sine Asclepias Fuch</i>		19. 20			
<i>fy.</i>	1144	<i>Viscatris an plura genera.</i>	17. 18		
<i>Vincetoxicum Matth.</i>	ibid.	<i>Visci vsus.</i>	19		
<i>Vincetoxicum officinarum.</i>	ibid.	<i>de visco per alium animum red</i>			
<i>VV inter ann. cortex.</i>	1818	<i>dato animaduersione digna.</i>			
<i>Vina picata.</i>	76	19. 20			
<i>Vini medicina radix.</i>	1698	<i>Visco arbores carent Insulores.</i>			
<i>Vitis condendis miseri solata à</i>		19			
<i>venetibus.</i>	77	<i>Viscum.</i>	17. 1457. 1458		
<i>Vinogalla, qua à Græcis nuncius.</i>		<i>Viscum ex Aquifolio.</i>	1-8		
16		<i>Viscum ex radice Chondrilla.</i>			
<i>Vinum acinacium, seu Coqueret</i>		568			
<i>tium.</i>	599	<i>Viscum Damascenum, quod fit</i>			
		<i>ex myxo, querno bonitate ce</i>			
		<i>dit.</i>	19		

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Pinifol. am.</i>	1160	<i>Vua marina querandam.</i>	1397	<i>Tuca.</i>	1908
<i>Vua Cape genu.</i>	1338	<i>Vua marina vulgaris, Claf.</i>	1070	<i>Z</i>	
<i>Volubilis aculeata.</i>	1421	<i>Vua poffa.</i>	1404	<i>Z Acintha . fine Cichorium</i>	
<i>Volubilis maior Herbariorum.</i>	1421	<i>Vuataminia.</i>	1408	<i>verticofum.</i>	319
<i>Volubilis media. ibi. nigra</i>	1414	<i>Vuatranfmarina, Grefularia ra-</i>		<i>Zarza Parilla. 1858. Matth.</i>	1799
<i>minor.</i>	ibid.	<i>bra.</i>	131	<i>ibid.</i>	
<i>Volucrum maius.</i>	1427	<i>Vua verfa & vulpina.</i>	1737	<i>Zea. 14. 184. duplex.</i>	345
<i>Voluulus ceruleus fine Campana</i>		<i>Vua viperina.</i>	155	<i>Zedaria Auccenna.</i>	1748
<i>exatra Lob.</i>	1415	<i>Vua vifi.</i>	133. 192	<i>Zedaria Zerambet.</i>	1810
<i>Voluulus terreftria.</i>	ibid.	<i>Vua vulpina.</i>	396	<i>Zecyrron.</i>	394
<i>Vritica.</i>	1243	<i>Vualaria Dad.</i>	197	<i>Zecyrron Gymnocrithea.</i>	ibid.
<i>Vritica canina Plinij.</i>	1244	<i>Vualaria Herbariorum.</i>	205	<i>Zerambet Serapioum. & Zedda-</i>	
<i>Vritica Hercules, Tragl.</i>	ibid.			<i>ria eiuſdem radicis partes</i>	1822
<i>Vritica Lobes & Vritica fatida.</i>	1247	<i>X</i>		<i>Zerambet Serapioum , Clafia.</i>	1822
<i>Vritica I. Matth. 1243. II. eiuſ-</i>		<i>X Anthium.</i>	1056	<i>Zingiber. 890. Acyſa.</i>	1892
<i>dem.</i>	ibid.	<i>Xilo, indies diſta noua ar-</i>		<i>Zingiber caninum diuifum. 631.</i>	
<i>Vritica III. Matth.</i>	1244	<i>ber in Hiſpania naſcitur</i>	1774		
<i>Vritica oligophyllus.</i>	ibid.	<i>Xylobulſumam.</i>	1773		
<i>Vtilago.</i>	418	<i>Xylocinnamomum.</i>	1797 1798		
<i>Valueria.</i>	543	<i>xylen.</i>	221	<i>Ziziphum.</i>	144. 43
<i>Vua Corinthia.</i>	1406	<i>Xyloſtrum alterum.</i>	201	<i>Ziziphum alba noſtra.</i>	358
<i>Vua Criſpa fine Grefularia</i>	139	<i>Xyloſtrum Uod.</i>	272	<i>Ziziphum alba Matth fine Pen-</i>	
<i>Vua criſpa, ab aliis marina, aliis</i>		<i>Xyphodon.</i>	108	<i>doſcomurus.</i>	ibid
<i>verò creſcina, non nullis Gref-</i>		<i>Xyris. 1611. Lob. ibid. Matth.</i>	1612	<i>Ziziphum Cappadocica.</i>	110
<i>ularia.</i>	132	<i>Xyris maritima.</i>	1392	<i>Ziziphus Panicula.</i>	356
<i>Vua lupina.</i>	596			<i>Ziziphus manu</i>	1128
<i>Vualupina fine Vua verfa.</i>	1322	<i>Y</i>		<i>Ziziphus.</i>	1878
		<i>Y Ayana fructus. 1340. 1841</i>		<i>Zizipon.</i>	930
		<i>Yajoga.</i>	ibid	<i>Ziziter.</i>	1372. 1372
				<i>Zurambet & Zerambet.</i>	1810

FINIS INDICIS LATINI.



INDEX GRÆCVS.



Βρόσσον. 936	Ἀγέσθαι λαλῶν. 1462	ἀναγράφειν. 1764
Ἀγέλλουον. fol. 1769	ἀγέσθαι. 1445	ἀναβῆναι. 1319
Ἀγέμενος, τυελ	ἀγέσθαι καὶ ἀγέσθαι. 1442	ἀναβῆναι. 1350
ἀγέμενος. 1073	ἀγέσθαι. 1436	ἀναβῆναι ἀγέμενος. 1128 1413
Ἀγέμενος rescriptum Græci	ἀγέμενος, τυελ ἀγέμενος. 912	ἀναβῆναι. 1153 1155 1156
Σικαντες. 619	ἀγέμενος. 1732	ἀναβῆναι. 1361
Ἀγέμενος. 777	ἀγέμενος καὶ ἀγέμενος. 1483	ἀναβῆναι. 841
Ἀγέμενος rescriptum. 133	ἀγέμενος καὶ ἀγέμενος. 16.7	ἀναβῆναι. 691
ἀγέμενος. 270	ἀγέμενος. 1	ἀναβῆναι. 691
Ἀγέμενος apud Theophrastum	ἀγέμενος. 266	ἀναβῆναι. 968
non satis intellecta, nullo	ἀγέμενος quid. 10.21.24.26	ἀναβῆναι τυελαν, sive hinc
in erroribus induxit. 46	ἀγέμενος. 814	stria. 1344
ἀγέμενος. 146	Ἀγέμενος ἱερίμνος. 454. 456	ἀναβῆναι. 438
ἀγέμενος διπλός. 8	ἀγέμενος. 589	ἀναβῆναι. 1388
ἀγέμενος. 152	ἀγέμενος. 1724	ἀναβῆναι. 116
ἀγέμενος. 665	ἀγέμενος. 385	ἀναβῆναι. 791
ἀγέμενος. 130	ἀγέμενος. 241	ἀναβῆναι. 1715
ἀγέμενος. 420	ἀγέμενος. 593	ἀναβῆναι. 1380
ἀγέμενος. 1100	ἀγέμενος. 1104	ἀναβῆναι. 691
ἀγέμενος. 535	ἀγέμενος. 1104	ἀναβῆναι. 1715
ἀγέμενος. 535	ἀγέμενος. 1692	ἀναβῆναι. 1339
ἀγέμενος. 1128. μέγα, μακρὸν,	ἀγέμενος. 1232	ἀναβῆναι. 1161
τελείως τέλει. 1161	ἀγέμενος. 1680	ἀναβῆναι. 447
ἀγέμενος. 86	ἀγέμενος. 1141	Ἀναβῆναι καὶ παλιν. 1161
ἀγέμενος. 89	ἀγέμενος. 401	Græcorum hodie quid. 144
ἀγέμενος. 405	ἀγέμενος. 199	ἀναβῆναι. 1330
ἀγέμενος. 43. 49 54	ἀγέμενος. 202	ἀναβῆναι. 306. 1595. 169
ἀγέμενος. 480	ἀγέμενος. 775	ἀναβῆναι. 1730
ἀγέμενος. 152	ἀγέμενος. 1147	ἀναβῆναι. 103
ἀγέμενος. 1305	ἀγέμενος. 1543	ἀναβῆναι. 1406
ἀγέμενος. 416	ἀγέμενος. 1406	ἀναβῆναι. 480
Ἀγέμενος. 160	ἀγέμενος. 1409	ἀναβῆναι. 440
ἀγέμενος. 1245	ἀγέμενος. 1411	ἀναβῆναι. 1389
ἀγέμενος. 1444	ἀγέμενος. 1401	ἀναβῆναι. 976
ἀγέμενος καὶ ἀγέμενος ἀγέμενος. 160	ἀγέμενος. 1411	ἀναβῆναι. 1044
ἀγέμενος ἀγέμενος καὶ ἀγέμενος. 1466	ἀγέμενος. 316	ἀναβῆναι. 66
ἀγέμενος ἀγέμενος ἀγέμενος. 1464	ἀγέμενος. 1813	ἀναβῆναι. 1306
ἀγέμενος ἀγέμενος ἀγέμενος. 1705	ἀγέμενος. 30	ἀναβῆναι. 133
	ἀγέμενος. 1069	ἀναβῆναι. 1214
	ἀγέμενος. 1236	ἀναβῆναι. 1339
	ἀγέμενος. 106	ἀναβῆναι. 1396
	ἀγέμενος. 1401	ἀναβῆναι. 949
		ἀναβῆναι. 1396

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM

ἴται. 380. ἰπῖται. <i>ibid.</i>	<i>Hippocrates.</i> 12	Γ	
ῥτος ἐχάρτης. 381. ὀ- λίας. <i>ibid.</i>	Βελός <i>nomen latè paret.</i> 320	Γ	Αλφίλα 1893
ῥτος ἐπαίθραξ, ἐγκρυρίας, ὕει ἔγκρυπτος. 381	Βαλλέριον. 814	Γ	Γάλωξ. 487
ῥτυλαῦ. 1436	Βαλλυτῆ. 1151		Γάλωσι. 1088
Ἄβρον. 913	Βαίλαρον. 1770		Γαλιόφες, ὑει γαλιόφες καὶ γαλιόβολος. 1147
ἀσκληπιάς. 1144	Βέρυθρον. 618		Γατρίσι <i>Lacedæmonii</i> Χαρα, Βεατίς <i>Brasica.</i> 619
ἀσκυροῖδης. 1155	Βασιλικὸν ἄμυρον <i>quasi di-</i> <i>Etym.</i> 679		Γόλακῆ. 1258
ἔσκυροι. <i>ibid.</i>	Βάττα <i>ποτα.</i> 110, 111		Γερσίδρον. 1
ἀσπάλθος. 1815	Βάττα, καὶ Κατίνα. 153		Γεράσι. 1175
ἀσπαράγια, ὑει ἀσπαράγια <i>Thiophrastus</i> <i>quid.</i> 610	Βάτος. 119		Γερανποδῖον. 814
ἀσπάργος ὑει ἀσπάργος. 690	Βατράχιον. 1017		Γέθρον. 15, 8
ἀσπαρίγην Εἰδῆ, Κασιναῖος, ἔλκτος, ὀρμῖος, μνάχα- ρος. 609	Βδίλλιον. 1781		Γγγίσι. 1890
ἀσπλιντον. 1115	Βίτοι. 879		Γησίδον. 709
ἀσπρί. 1404	Βόχυν. 899 1050		Γλῶξ καὶ Γλάξ. 487
ἀσπρί ἀγρία. 1619	Βίκιον. 478		Γλῆτος. 94
ἀστέριον. 496	Βισάμα. 360		Γλῶχυν. 890
ἀστέρι ἀπλῖος. 859	Βλῶχυν. 1111		Γλῶχυν ἀγρία. 891
ἀσπράγος. 1346	Βλῶτον. 1111		Γλακῶπαρον καὶ γλακῶπι- κρί. 1413
ἀσπρίδων. 1583	Βλῶχυν. 1111		Γλακῶβρα. 147
Ἀτραυλίς. 1467	Βαλκοχάριον. 890		Γλακῶσιδον καὶ γλακῶσις. 585
ἀτράραξι. 535	Βαλός. 771		Γολυκακράμιν. 511
αὐτόπυρος ῥτος. 378	Βάλας. 1500		Γογγύλι καὶ γογγύλις. 639.
Ἀφάριμα. 386	Βάλαχυν. 1781		ῥ. 644
ἄφραδισίον. 1617	Βοσχαρὶς <i>Pix.</i> 75		Γοσιπιν. 211
ἄφροκρόδον. 1545	Βότρυν. 912		Γορίτης ῥτος. 379
ἄφωλῶδες. 864	Βυδῶνον. 859		Δ
ἄφωλός. 1196	Βύγλαστα καὶ Βύγλαστος. 578		Δ
Ἀχραις <i>porum quæ dicuntur</i> <i>Hemero.</i> 86	Βύκερος. 480	Δ	Λακῶσι. 1662
ἄχυλλῆτος καὶ ἄχυλλῆτος σι- διεῖται. 771	Βυμελία. 81	Δ	Δάδωλα. 361
ἄχρῖς. 308	Βυνίς. 644		Δᾶς. 48
Ἀψύθον. 940	Βύνι καὶ Βυνίς. 774		Δαδῖον. <i>ibid.</i>
	Βύρβαλιν. 861		Δάκκος. 716
	Βράβυν. 145		Δάφνη. 351
	Βράβυν. 181		Δαφνίδας. <i>ibid.</i>
	Βρεβανῆ. 1081		Δάφνη ἀγρία. 103, 145
	Βερίλα. 305		Δάφνη ἀλεξανδρεῖα καὶ ἑ- δαία. 108
	Βρύον <i>τυμα Poruli.</i> 88		Δαδρίτιδες ἄμπελοι. 1401
	Βρύον. 1083, 1313		Δαδρίτιδες ἄμπελοι. 586, 188
	Βρύον γαλιόστον. 1367		Δαδρίτιδες. 13
	Βρυονία. 1409, 1414		Δάκκος ἑῖα. 384
	Βρυονία μελῶνα. 1411		Διτάμνος καὶ διτάμνος, ὑει διτάμνος καὶ διτάμνος. 891
	Βρύμις καὶ Βρύμις. 403, 404		Δῶς αἰθός. 815, 821
	Βρύμις πύα. 404		Δῶς βάλωλα. 30, 310
	Βρύζα <i>apud Thracas</i> <i>frugum</i> <i>genus.</i> 67		Δῶσιμος. 346, 350
	Βύνα. 401		Δ

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Κύμα <i>seu</i> κύμα, <i>in</i> Βραβία	Λέπος.	30	Μαλακίαιος.	1414
<i>quid.</i> 528. 530	Λεπιδάρια.	319	Μαλ'χρ.	524
κυαλίμνος.	λεπιδόφυλλον.	195	Μαλ'χρ' αζία.	529. 711
κυμβάλιον.	λδ'εζ'εστ'α.	1463	Μαλ'δωκος.	1781
κύμνος.	λδ'κ'.	86	Μαλ'δ'ιον.	815
κυμώθιμος.	λδ'κ'ία.	1309	Μαδ'ραγύρας.	1715
κυοάρα.	λδ'κ'ίον <i>εχθ</i> λδ'κ'ίον μάλι-		Μάραθρον.	688
κυωία.	τον.	801. 802	Μαράθρυλλον.	769
κυωσώζων.	λδ'κ'ύφυλλον <i>Vetulae</i> <i>mas.</i>		Μάρον.	183
κυωύγλωστον <i>εχθ</i> κυωύγλω-	1199		Μαρίλλον.	545
σος.	Λιβ'λον.	217	Μάσπιον.	727
κυωυρέμω.	Λιβ'ανος <i>εχθ</i> λδ'κ'νίος.	1751	Ματ'ιμον.	<i>ibid.</i>
κυωύχρον.	Λιβ'ανωτίς. 763 <i>εχθ</i> λδ'κ'νίος		Ματ'ίχ.	66
κυωύσματος.	εμφανισματικ'.	<i>ibid.</i> 967	Μαχαμ'ίον.	1610
κυωύς <i>ερχ</i> ς.	λδ'κ'νίον.	744	Μέβον.	758
κυωύσματος <i>encl</i> κυπ'ερίος.	λδ'κ'νίον.	<i>ibid.</i>	Μελ'κ'νίον.	1033
ἀπὸ τῷ κύβη παρίσιν τὸν	λδ'κ'νίον.	1374	Μελ'κ'νίον.	1136
ἀκ'ρ'κ'νίος.	λδ'κ'νίον.	1176	Μελ'κ'νίον.	1441
κύπ'ερος <i>seu</i> κύπ'ερος.	λδ'κ'νίος.	1616	Μελ'κ'νίον.	812
κύπ'ερος <i>εἰδ'κ'νίος</i> <i>Theophrasta-</i>	λδ'κ'νίος <i>αζία</i> <i>αζία</i> .	1618	Μελ'κ'νίον.	797
<i>βου.</i>	λδ'κ'νίον.	493	Μελ'κ'νίον <i>Salix quae di-</i>	
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	177	<i>catur</i> <i>Theophrasta.</i>	176
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	177	Μέβον <i>πράσιον.</i>	112
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	494	Μελ'κ'νίον.	812
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	131	Μελ'κ'νίον.	81
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	473	Μελ'κ'νίον.	51
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	126	Μελ'κ'νίον.	408
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	144	Μελ'κ'νίον <i>εχθ</i> μέλ'κ'νίον.	411
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	473 474	Μελ'κ'νίον <i>εχθ</i> μέλ'κ'νίον.	957
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	1210	Μελ'κ'νίον.	191
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	31	Μελ'κ'νίον.	504
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	166	Μελ'κ'νίον.	31
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	280	Μελ'κ'νίον.	16
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	1325	Μελ'κ'νίον <i>εχθ</i> μέλ'κ'νίον.	331
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	1104	Μελ'κ'νίον.	<i>ibid.</i>
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	346	Μελ'κ'νίον.	502
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	506	Μελ'κ'νίον.	545 549
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	<i>ibid.</i>	Μελ'κ'νίον.	1707 1707 1707
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	<i>ibid.</i>	Μελ'κ'νίον.	1712 1712 1712
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.	1077	Μελ'κ'νίον.	1618
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.		Μελ'κ'νίον.	419
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.		Μελ'κ'νίον.	291
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.		Μελ'κ'νίον.	297
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.		Μελ'κ'νίον.	285
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.		Μελ'κ'νίον.	297
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.		Μελ'κ'νίον.	190
κύπ'ερος.	λδ'κ'νίον.		Μελ'κ'νίον.	190

Λ

Λαγύριος <i>Hippocrati-</i>	430
Λαγύριος.	217
Λαγύριος.	<i>ibid.</i>
Λαγύριος.	1657
Λαγύριος.	470
Λαγύριος.	541
Λαγύριος <i>εχθ</i> λδ'κ'νίον.	600
Λαγύριος.	55
Λαγύριος.	541
Λαγύριος.	518. 560
Λαγύριος.	1421. 1516
Λαγύριος.	1083
Λαγύριος.	449
Λαγύριος.	453
Λαγύριος.	1308
Λαγύριος.	485
Λαγύριος.	1608
Λαγύριος.	1342
Λαγύριος.	709

Μ

Μαγύριος.	727. 729
Μαγύριος.	545
Μαγύριος.	1776
Μαγύριος.	569
Μαγύριος.	1776
Μαγύριος.	688

Μαγύριος.	1618
Μαγύριος.	419
Μαγύριος.	291
Μαγύριος.	297
Μαγύριος.	285
Μαγύριος.	297
Μαγύριος.	190
Μαγύριος.	190

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Μυλία μυδιλική.	298	Νάρθηξ.	751	Ορεοτρίλινα.	80
Μύλαροι oleum.	293	Νάρκισσος.	1516	Οργάνουρα.	1436
Μύρα.	285	Νεφελ.	1487	Ορχάνος.	886
Μύρον in Rosa, cortex Plin.	128	Νήριον.	244	Ορείδης.	397
Μυροπλάκω.	293	Νικατοξοειδ.	1144	Ορείδης.	ibid.
Μύλωθρον Theophrasti.	1413	Νιμφαία.	1008	Ορμον.	964
Μύρον.	758			Οριβόγαλον.	1581
Μύτρα in arboribus.	74	Αίθιον.	1056	Οριβός.	468
Μύλοξ δροχία η λεία.	1413	Ξαρά Ριχ.	75	Ορέβιον Archipent.	1341
Μύδος.	2578	Ξεριδος.	1018	Ορυζα και ορυζον.	407
Μύλωθρον Theophrasti.	1407	Ζίζιον.	1620	Ορχις.	349
Μίγρι.	61	Ζυλαχασία.	1796	Οσπερα.	414 449
Μύδωχ.	584	Ζυλακίριτα quid Gracii re-		Οσμελάιον.	485
Μύδος εκος ζία.	385	centionibus.	112	Οσμελις.	1334
Μυόφυλλον.	1260	Ζύλον.	221	Οσνίδιον.	330
Μορία.	325	Ζυλώδης Refina.	71	Ούραία Ιρις.	1609
Μόρον.	ibid.	Ζυρίς.	1611	Ορυζογλωσσον.	1047
Μοχαχάιον, μοχαχαριδαν.	1760			Οχυν.	308

Ο

Μάχαρον.	1136	Οΰα, Ού.	330	Π	
Μήνιτες.	324 1585	Οιάνθ.	782	Π Αγαράτιν.	1578
Μύλα.	1504 1595	Οίβη.	1585	Πάργαρι.	915
Μύζος, μύζαι, μύζα, μύζα-		Οίκακίς Galla.	16	Πάιδωρος.	1413
μα.	359	Οίος κινίας και πασιτίς.	76	Πάισα.	855
Μυσσός.	1328	Οίγ.	133	Πάλαστια.	75
Μυσσώτις.	1231	Οίον.	1188	Παλίνος.	143
Μύς άτα, και μύς άτίς, και		Οίόρως.	478	Πάπικς και πάπξ.	738
μύς άτις.	1317	Οίωθως.	335	Πάππος.	1878
Μυρόν.	179	Οίωμα.	389	Παραβόγαλον.	618
Μυρόφυλλον.	769	Οίωμαλις.	202	Παργήιον.	1616
Μυροβώδης άρωμα.	365	Οίκακίς apud Paulu Argin.		Πατάλη και πάπαλος.	408
Μυρίνη.	136	quid, et quomodo Dissol.		Παλκίος.	444
Μύρμις vel μύρμα.	760	et Galen hac voce uti.	15	Παζαρυλλον.	1263
Μυροσύν.	236	Οιφαλόμαχος.	1330	Πατόβολος.	855
Μυροσύν άρσία.	241	Οίάρα, και οίάρον.	865	Πάπρι.	1807
Μύρις.	137	Οιόρωχις.	490	Πάπρις.	1618
Μύριον άρωμα.	242	Οιόβρις, και οιόβρις.	865	Πάπρις.	ibid.
Μύρι.	1522	Οιόκίς Galla.	16	Πάπρις.	612
Μύρα.	30	Οιόπρις και οιόπρις.	1471	Παρόδιον.	141
		Οινία.	865	Παρενάλιον.	1417
		Οινχίς των ίδιων.	126	Παροσκόας.	ibid.
		Οινίς.	447	Παριτριών.	1334
		Οίξια Theophrasti, nostra est		Παρία.	1816
		Phagus.	5	Παριόκον μύλον.	293
		Οίξιν.	3435	Παριόκον μύλον.	ibid.
		Οίξυροσύν.	242	Πάσις.	1013
		Οίξυρις.	501	Πάσις quid.	419
		Οίξιν και άπιν.	1711	Πατριόκον η πατριόκον.	72
		Οίπρις. 185. quid.	365	Πατριόκον.	72

N

Νάπυ.	645				
Νάρδος και Ναρδοσά-					
χυν.	910				
Νάρδος άρσία.	913 917				
Νάρδος κελτακή.	923				
Νάρδος όρτιν.	ab aliquidus				
Νυλακίς και νυλακίς.					
Galeno utitur.	916				

πδλδ

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

απλῆτος.	1215. 1217	Σχαῖνος καὶ χαῖνος ἀφῆμα	Φαλαγγίς.	415
αποδίας καὶ αποδιῆς.	130	εἰκός.	1884	Φάσγανον, καὶ φαργάνιον.
Στεφυλῆτος.	718		1016. 1620	
σαφῆς.	1404	Τ	Φασάκος.	473
σαφῆς ἀγρία.	1408. 1629	Τέρμαθος.	61	Φάσκοι quid Græci dicūt.
σαφῆς τρικλῆς.	555	Τετραγῆμα.	6:9	Φαγόπυρος.
σαχύντες.	1007	Τετράλιξ.	185. 1482	383
σαχύν.	962	Τάβερν.	918	Φαγὸν.
Στίμφυλος.	113. 1403	Τάκερον καὶ τιάκερ.	1165	514
τίρμηθρον.	1118	Τάτλον.	331	Φιλαιαῖα Peta. sine illa potius
τίφανος, τίφος καὶ τίμμος.	796	Τάλαφάκον.	333	φιλαιαῖα dicenda est.
τορχαῖ καὶ τυχᾶς.	917	Τάλος.	480	1186
τορλίωτος ἐνυδρος, ἥμε δ' ἐπὶ		Τιθύμελος καὶ τιθύμελον.	1642	Φιλῆς.
τῶν ὑπὸ τῶν φουμῶντος,		Τίψη.	392	22
quæ est ὁ ποτῆμων παπυ-		Τραγέλαθα.	147	Φύλαρα.
rant.	1061	Τραγόπυρος.	383	89
τρακίωτος ὁ χυλοφύλλος.		Τραγοπύγων.	114. 1078	Φαῖς.
768		Τραγοεργάνη.	888	11, 8
τροβύλος πικρὸς πάλιν.	43.	Τρίγος.	9:5	Φλάξ Theophrasti. 800 970
44 52		Τρίβαλος ἐνυδρος.	1082	Φλακίαι, καὶ φαίει, 362. 416
τρίχινος.	396	Τρίβαλος χερσῶς.	512	φαίειες ἀορχαί, ἀνίστηναι,
τρίχινος ἀλεχθῆς γλῶσ.	396	Τετραλῶν.	1389	366
τρίχινος κυπρίος.	ibid.	Τετράφυλλον.	303	φῆος.
τρίχινος μακρὸς.	ibid.	Τετράφυλλον ἐν χορτοκαπέτις	1353	271
τρίχινος ὑπὸ τῶν ὑλῶν.	ibid.	Τετράφυλλον.	1109. 1111	φῆος Spina que nominata.
τρίβων.	1485	Τριχίος.	396	1467
τρίβωξ.	115	Τριγλοδύτα unde ἀκτῆ.	131	Φῆ.
Συγκομιστὶς ἀρίος.	378	Τρώϊος.	54	917
Σχάμνα ποτα.	110	Τύψη.	294	Φινκτὸς Χησίνα.
Συγκομιστὶς καὶ συγκομιστὶς.	325.			72
328. 340		Υ		1369
Συκὸν.	335. 1658. 1660	Υλκῆτος.	1505	Φυλλῶν.
Συκὸν ἀγρία.	335	Υδία.	1585	732. 1194. 1776
Συκὸν ἡμερὸς.	ibid.	Υλκῆμαλον.	293	Φυῖα.
Συκὸν ἡμερὸς.	340	Υλκῆμαλον.	1038	82
Σύκοι.	335	Υλκῆμαλον.	1716	Φυῖα.
Σύκοι ἡμερὸς.	ibid.	Υλκῆμαλον.	1715	596
Σύμφυτον μέγα.	1074	Υλκῆμαλον.	1715	Φυτῶν μακρῶν, Laurus.
Σύμφυτον αὐτῶν.	1174	Υλκῆμαλον.	293	353
Σφακελισμός.	419	Φ		
Σφακίλος.	879	Φακίος καὶ φακὸς.	475	Χ
Σφινδισμός.	94	Φακὸς ὁ ἐστὶ τῶν γελμάτων.	478	Χαμῆς.
Σφινδῶν.	733	1014		169
Σχελῆς μακρὰ καὶ μεγάλη.	1100	Φαλαγγίς καὶ Φαλαγγίτες.		1596.
Σχελῆς, Lēsis fructus.	63	8μ		1651
χῆος, quafi χῆος.	ibid.			119
χῆος ὅτε.	1544			119
χῆος ὅτε.	496			1660
Χαῖνος.	283			1664
				449


INDEX HISTORIÆ PLANTARVM

Χελιδὼν μέγα.	1249	Ψ	Ω
Χελιδόνων μικρὰν.	1048		Κυριε Εἰς.
Κερσσίη μελῶχμ.	584	Εὐδαιμονία.	197
Χιλωδωύμης.	1186	Ψ δὲ δαμάδος.	919
Χαιροσπίλιδρον.	1100	Ψ ἰλιῶρον.	1409
Χυδελιάλ.	566	Ψ γυθροφον.	1282
Χυδερπολύσιον.	386.399	Ψ ἰλλων.	1172
Χυδρος Gracorum	Latina-	Ψ ὦρα morbus arborum.	152
rum Alia.	385		
Χρυσολῶχρον.	535		

FINIS INDICIS GRÆCI



I N D E X A R A B I C V S

	Bannu & Abe	Alharar.	182	Angiara.	1243	
	nus.	1711	Alharmel.	972	Anusden.	712
Abf.	1188	Alcummitz.	340	Anlu.	ibid.	
Abhel.	182	Alkali.	1377	Araba sine Bari.	893	
Achachengi.	196	Alkitran.	37	Archanas aut Aromas.	66	
Achache.	160	Alluf.	1601	Aromas. aut Archanas.	ibid.	
Agin.	1423	Almacharam.	1907	Arz.	43	
Adhar vel Adher.	1886	Almharut.	732	Arz. ſeu Arzi.	491	
Adlen aut Adhlen.	499	Almetzerion.	1664	As.	246	
Adurion.	106	Alnam ſeu Alnegen.	890	Aſabaſſaſa.	1069	
Adiſſphacos.	879	Alſadar.	546	Aſchil ſeu Alachil.	1798	
Aes.	236	Alſcebran.	1128	Aſteugi.	120	
Affinchium.	940	Alſebam.	1612	Aſmeni imi	1608	
Agalugin ſeu Agalugen.	1769	Aſſigiem.	639	Aſſinalſach.	761	
Agileuz.	319	Alneh.	732	Aſſilus.	701	
Aibeig.	1229	Algarur.	332-333	Aſſochados.	377	
Aierſa.	1609	Algelin.	1183	Athamos.	461	
Alas.	236	Alizr.	1500	Athm.	1208	
Alaſſe.	899	Ambela.	1873	Anas.	313	
Alberas.	1629	Amerberim, ſeu Amyrbarim,	133	Auſel.	1791	
Albotum.	61	ſeu Berberis.	166	Axeras.	1188	
Alboucer.	1714	Amuron.	841	Axi.	1914	
Alcanna.	252-253	Anahamen.	313	Axmec.	1723	
Alchamech.	1181	Anas.	624	Azadararhe.	358	
Alchar.	499	Anazue.	1128	Azz Alſachel.	1081	
Alcheiri.	801	Andrachahara.	892			
Alfaſaſat.	102	Anegen.	692			
Alſſera.	1409	Aniſum & Anexiſum.	732			
Alſſer ſeſſera.	ibid.	Angiden.				

A R A B I C V S.

Barbe.	1866	C	Chafara.	1282	
Barbele albanica.	310	C Afal, Cafil, seu Gafil.	Chafur.	329	
Bak'anchen.	ibid.	1311	Chate.	459	
Balador.	1764	Cafur.	1783	Chathe.	619
Balfem, balfema, belfan.	1770	Cahade, lahade, seu Gialde.	928	Charbich.	1479
Barbes siue Carmas.			1176	Charon & chaunie.	150
Basar.	1100	Calab.	504	Chazie.	405
Fafiatrahagi.	1123	Calamentum.	763	Chauch.	399
Baffad.	1374	Calchale.	1249	Caum.	1145
Baffil seu Baffal.	1136	Callidanium.	1891. 1894	Ch mpr.	461
Bathes, seu Batheca.	625	Calnegiam.	656	Cheri.	301
Batheca alcahi.	625	Camum.	476	Cherbachem, seu Charbich.	1631
Batheca filistin.	ibid.	Canab.	156	Abaid.	1631
Batheca Inda.	ibid.	Candaris, Candaron.	1783	Cherbachem, seu Charbech.	1631
Batheca viridis.	ibid.	Caphor seu Chafur.	111	Afuld.	1631
Baton.	61	Cappar.	1783	Cherbas.	145
Bazara Charoma.	1173	Capur.	179	Chermes.	29
Baziri chichen.	493	Cafse.	641	Chriat'harnar.	1673
Bediarog.	679	Cardel.	1718	Ch'har.	619
Fed'guar.	1463 1474	Carh'mfel, & Carimfel.	653	Chere allimar.	1672
Bedarangie, bedarings, bedarenz'gum.	917	Carmas, siue Barbes.	391	Ch'bruce.	1123
Fiffurg.	1229	Carua seu Carui.	1621	Chiahas.	34
Fefah'alca.	1128	Cafab.	31	Chio'lonontoma.	1249
Breufsigi.	797	Caforas.	916	Ch'naos.	34
Bengi.	178	Caffal.	1693	Ch'cini.	190
Benguchest.	280	Cathum.	131	Ch'ira.	1477
Birbengine.	629	Cebur.	520	Chubas.	154
Berberim.	133	Celb.	126	Churiz.	ibid.
Berendaros.	679	Cembul & Cembul Indi.	1841	Churial.	403
Berfanan.	1205	Chach'le.	111	Chaxaid.	1371
Befregnafeen.	1209	Chaurim.	274	Cormet.	306
Befd.	1174	Chalef.	1162	Co'it.	1196
Begercothume.	1172	Chalif.	1159	Condes & Condifum.	323
Bhulle.	74	Chamadrios.	1675	Condif.	220. 222
Bhunc.	1188	Chamahithum.	614	Cordummi.	120
Buwach.	ibid.	Chandel.	700	Corumb.	518
Buberg.	1229	Charba.	ibid.	Cofas siue Choff, Cof.	1817
Buthomari.	1604	Chardel.	27	Cast.	302
Bovin & Borin.	61	Chares.	112	Cubebe.	343
Bucha'e.	411	Charfi.	700	Cubebe & Quabebe.	1313
Bucharmacen.	1604	Charmen.	1449	Culbare albu.	1209
Bulf.	374	Charnub.	145	Cult.	196
Bulrich.	119	Charf.	3707	Curat.	1141
Bundurch.	319	Chartom.	1149	Cuscut.	1682
Burdi, siue Bardi.	1818	Chas.	1165	Cyfe.	323
Buthermarien.	1604	Chafcar.	1623		
Buziden, siue Buzidan.		Chafi alkes, seu Chafi alchli.		D	
	1169	Chafi atraleb.		D'acu.	716
		Chaffuh.		Dalfit.	405

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Damodrios.</i>	1162	G	<i>Asfel.</i>	1231	<i>Harara.</i>	114
<i>Darſchichaham.</i>	1215		<i>Gauſſum.</i>	936	<i>Haraha.</i>	ibid.
<i>Darſeni.</i>	1796		<i>Galengen.</i>	1293	<i>Harbatum.</i>	743
<i>Darſhaben.</i>	1203		<i>Garch.</i>	306	<i>Harin.</i>	1401
<i>Daru.</i>	63		<i>Garichum ſiue Garicum.</i>	1703	<i>Harmel.</i>	972
<i>Daſſer.</i>	401		<i>Gaſi alchaleb.</i>	1165	<i>Haromigi.</i>	1203
<i>Dauffer.</i>	ibid.		<i>Gauſre.</i>	321	<i>Haſce.</i>	399
<i>Daufir.</i>	ibid.		<i>Gaur vel Gar.</i>	371	<i>Haſſel.</i>	1791
<i>Decka.</i>	331		<i>Geguers.</i>	408	<i>Haſar.</i>	1176
<i>Deſana.</i>	401		<i>Gezar.</i>	716, 718	<i>Haſach.</i>	172
<i>Dhenbenalchaul, Dembalchil</i>			<i>Giaufir.</i>	738	<i>Haud.</i>	1769
<i>ſiue Danebalchil.</i>	1069		<i>Gianzi.</i>	320	<i>Haur.</i>	ibid.
<i>Didar.</i>	20		<i>Gianziban.</i>	1760	<i>Haur romi.</i>	26
<i>Dileg.</i>	499		<i>Giarzir.</i>	649	<i>Hemen.</i>	302
<i>Dili.</i>	ibid.		<i>Giauers.</i>	408	<i>Hencha.</i>	771
<i>Dirdar.</i>	20		<i>Gizar.</i>	716, 718	<i>Henne.</i>	202, 311
<i>Du.</i>	983		<i>Gingibil.</i>	1290	<i>Hentia.</i>	371
<i>Docho.</i>	411		<i>Gumceizi.</i>	340	<i>Hexarchaſan.</i>	1499
<i>Doronigi.</i>	1202		<i>Guart.</i>	1211	<i>Hexargeſan.</i>	ibid.
<i>Driz.</i>	711				<i>Hiſpanach.</i>	143
<i>Dulb.</i>	93	H			<i>Plumadh.</i>	600
<i>Dullaha.</i>	621		<i>Abatte.</i>	431	<i>Humeſſe.</i>	106
<i>Dumbebe.</i>	174		<i>Habben ſeu Ben.</i>	1684	<i>Hundh.</i>	600
<i>Durungi.</i>	1202		<i>Habebras.</i>	1629	<i>Hundebe.</i>	114
			<i>Hachille.</i>	471	<i>Hunſure.</i>	1243
			<i>Hadad.</i>	148	<i>Hunen.</i>	316
			<i>Hades.</i>	431	<i>Hutladib.</i>	131
			<i>Hadhadh.</i>	143, 151		
			<i>Haſrk.</i>	112	I	
			<i>Hagnas.</i>	313	<i>Ibes.</i>	932
			<i>Haualhalec.</i>	1128	<i>Iaboroſe.</i>	723
			<i>Hau.</i>	324	<i>Iaca.</i>	1163
			<i>Halalzelin.</i>	1131	<i>Iackarak.</i>	741
			<i>Galeicho.</i>	119	<i>Iantum.</i>	7
			<i>Hahon ſiue Helion.</i>	609	<i>Iarrus.</i>	113
			<i>Hamad.</i>	600	<i>Iaſm.</i>	101
			<i>Hamama.</i>	1214	<i>Iau.</i>	316
			<i>Hameb alchahch.</i>	396	<i>Iebet.</i>	631
			<i>Hameb althomaleb.</i>	396	<i>Iergir.</i>	643
			<i>Hameſiroc.</i>	1119	<i>Ieuers.</i>	404
			<i>Hamehaulla.</i>	1091	<i>Ieuſir.</i>	713
			<i>Hamenus ſiue Hamana.</i>		<i>Ieuze.</i>	320
					<i>Ieuzebane.</i>	2760
					<i>Iezar.</i>	512
			<i>Hamos.</i>	461	<i>Imgu & Imgara.</i>	731
			<i>Hanab.</i>	316	<i>Infuſiti.</i>	266
			<i>Hanab althaleb.</i>	126	<i>Inhamchaulla.</i>	1091
			<i>Handachocho.</i>	106, 1077	<i>Inca.</i>	1477
			<i>Handel ſiue Handal.</i>	1671	<i>Iuſa.</i>	913
			<i>Hanſha.</i>	771	<i>Iuſbagia.</i>	166

K

K Ali.
Kalungen.
KameaEia.
Kanturion fages.
Kanturion fege & fege.
Kappar.
Karabe.
Karauia.
Karrin.
Karni.
Kartam.
Karumb.
Kaffton.
Katalbener.
Kauronch.
Kauioch.
Kauz.
Kefene, fime Kefene.
Kemadrius.
Kemetri.
Kemum.
Kenne.
Kermes.
Kerna.
Kefum.
Keyri.
Kiletem.
Kir.
Kitran.
Kulb.
Kuman.
Kuraz.

L

L Aber.
Ladegi Indi.
Lauzi.
Ler Mur feu Mor.
Lefan althaur.
Lefen arthaur.
Leuz.
Leuz alkei feu alke.
Leuz atrachaha.
Loc Sumutri.
Lowan.
Louaniatoy.
Lubia.
Luf.

1377
1893
269
1286
ibid.
113
68
693
1481
ibid.
1449
118
1620
1672
1249
1823
316
458
1162
306
696
212
27
1630
936
202
148
74
37
1176
303
1141

Lupha.
Luzach.

1596
20

M

M Achla.
Mahendane.
Marmacor.
Mafmoca.
Maflech, Mafleche fime Ma
fliche.
Ma.
Melata.
Mclonabrachi.
Melongena.
Nemiram.
Menfana.
Mergen.
Mermex feu Mirmix.
Mergenius, feu Merfangius.
Mefcatremfr.
Mefmes.
Mex.
Merzgon.
Mufmi.
Minberzgi.
Mokaita.
Morgian.
Mocheica.
Mubazagi.
Mukeita.
Mumeiz.
Muza.

362
1617
917
976
46
718
1713
425
626
1249
1617
1374
297
1374
893
297
297-397
1664
299
1629
359
374
359
1629
359
340
303

N

N Abatnaba.
Nachal.
Naf albef feu Naf.
Nahai.
Nanachur.
Nanochach.
Nartes feu Nargies.
Nard.
Naron.
Natig.
Negen.
Negen.
Negl.
Nil.
Nilofar, Ningfar & Nilofar.

671
362
614
1143
694
ibid.
1116
124
ibid.
63
420
ibid.
ibid.
499

P

P Anax afculbet.
Panax.
Pu.
Puflech.

738
1262
927
260

Q

Q Verfai & Querfe.
Quermes.
Queura.

1403
27
1271

R

R Aienigi.
Ramech.
Ramet.
Rafen.
Ratim.
Roma.
Roman.
Roracabalmi.
Rofaiducos.
Rofbar Sadifticos.
Ruman.

688
1181
222
269
63
1181
303
1691
106
ibid.
303

S

S Achmunia.
Sadar.
Sadab.
Sadanalach.
Saffaf.
Saffabheramon.
Saffargel.
Saheradi.
Sakakanbeamen.
Salkali.
Samabeff.
Sambach.
Sandal.
Sandarax.
Sandaros.
Sara.
Saraffe.
Sarax & Sarachs.
Sarch.
Scammontia.
Sebran & Seobram.
Seylem.
Schibedenzi.
Scheiceregi.
Schuffelblumen.


1661
346
972
31
274
1018
290
991
241
1377
280
1410
1768
6768
ibid.
1196
369
1222
293
1661
1612
416
496
1291
213

INDEX HISTORIÆ PLANT. ARABICVS.

<i>Scolofendrium</i> , & <i>Scolufendrium</i>		<i>Sumach.</i>	106	V	
<i>Sebesten.</i>	319	<i>Sunis</i> seu <i>Suniez.</i>	312	V	<i>Age</i> , seu <i>Vgi.</i> 7677
<i>Seher.</i>	691	<i>Sura.</i>	39		<i>Vagen.</i> 420
<i>Sedab.</i>	973	<i>Sus.</i>	247		<i>Vard.</i> 124
<i>Seil.</i>	1707	<i>Susen.</i>	1491		<i>Vesme.</i> 499
<i>Selgem.</i>	639			T	<i>Vrauthlatum.</i> 1241
<i>Selicha</i> , <i>Seliche</i> , siue <i>Selichachia.</i>	1796				<i>Vnec.</i> 1323
<i>Seliem.</i>	639	T <i>Ahalcb</i> seu <i>Thaleb.</i>	3014	X	
<i>Semferm.</i>	482	<i>Tamar.</i>	362	X	<i>Ahaer.</i> 358
<i>Sema</i> , <i>Mauritanis.</i>	215	<i>Tarfa.</i>	379		<i>Xaier Almerum.</i> 763
<i>Senabar.</i>	43	<i>Tarims</i> seu <i>Tormus.</i>	466		<i>Xanam.</i> 312
<i>Sene.</i>	217	<i>Tartarichi.</i>	1165		<i>Xanxer.</i> 1642
<i>Senesfigi.</i>	797	<i>Tatoula.</i>	628		<i>Xebz.</i> 691
<i>Sensera.</i>	482	<i>Thahabel.</i>	1367		
<i>Sent.</i>	121	<i>Thaleb.</i>	ibid.		Y
<i>Serbin.</i>	36	<i>Thaxthax.</i>	1707		<i>T Abrohae.</i> 1721
<i>Seresh.</i>	175	<i>Thespic.</i>	318		
<i>Seru.</i>	57	<i>Thum.</i>	1545		Z
<i>Shair.</i>	398	<i>Thwif.</i>	506		<i>Z Ahafaram.</i> 1012
<i>Sin.</i>	335	<i>Tilafon.</i>	1128		<i>Zaizalacht.</i> 318
<i>Sifalsos.</i>	748	<i>Tim.</i>	335		<i>Zambach.</i> 1470
<i>Sonofrig.</i>	797	<i>Tufa</i> & <i>Tufaha.</i>	285		<i>Zameni.</i> 190
<i>Stebules.</i>	33	<i>Tumer.</i>	1585		<i>Zarar</i> seu <i>Zarar.</i> 332-333
<i>Stensir.</i>	738	<i>Tupha.</i>	1873		<i>Zaraund</i> , seu <i>Zaraund.</i> 576
<i>Sucaram.</i>	728	<i>Turbith.</i>	1329		<i>Zefs.</i> 74
<i>Suchaha.</i>	1486	<i>Turingem</i> , siue <i>Trugiam.</i>	916		<i>Zeruba.</i> 1222
<i>Suluc.</i>	1915	<i>Tut.</i>	325		<i>Zewen.</i> 456
		<i>Tuth.</i>	ibid.		<i>Zingibel.</i> 1290
					<i>Zufalzeff.</i> 116

FINIS INDICIS ARABICI.

INDEX



INDEX GALLICVS.

A					
A bricots.	297	Aspie.	919	Blé rouge.	374
gros Abricots.		Aspie d'oultre mer.	910	Blé qui truche.	376
ibid.		Athanasie.	915	Blé Turquet.	ibid.
petits Abricots.		Aubeau.	86	Blé de Vache.	419
ibid.		Auberges.	195	Blète.	318
Abûnle <i>fine</i> Abûnthe.	940	Aubepin.	336	Bluet.	436
Ache.	701	Aubefoin.	416	Bois gentil.	114
Agarie.	1703	Aucron <i>vel</i> Auceron.	404	Bois à faire lardoirs.	171
Agnus Castus.	178	Auet.	33	Bois puant.	105
Agourre de lin.	1683	Aulbour.	103	Bonnes Dames.	133
Agrimoine.	1151	Aulne.	96	Borrage.	178
Agripaume.	1149	Aulne noir.	97	Borrache sauvage.	1104
Agron & Agreuo.	147	Aunee.	867	Bouillon blanc masse.	1198
Aigrene.	605	Auoine.	403	Bouillon blanc femelle.	ibi.
Aiguille de bergier.	710	Aureges.	301	Bouillon noir.	ibi.
Ail & Aux.	1545	Auriolo.	1464	Bouillon sauu ge.	ibid.
Ailpourreau.	1548	Auronne.	917	Bouleau.	91
Airelles.	191	Auua.	47	Bourgepine.	139.145.158
Alarders.	159.157			Bourache.	578
Albour.	103	B		Bourse de berger.	1097
Alexandre.	703	Acille.	767	Bouys.	165
Aliser.	101.103	Baguenaudier.	114.115	Bouys picquant.	242
Aloë.	1691	Barbe de Cheure.	1080	Branche vtin e.	1443
Alquaenge.	396	Barbe de bouc.	1078	Bray <i>ant</i> Brac.	1369
Aluine.	940	Barberenard.	1477	Brayes de cocu.	333
Amalenchier.	201	Barbotine.	945	Bredone.	160
Amandrier & Amandes.	316	grande Bardane.	1054	Bronde.	187
Amarines.	174.178	Basilie.	679	Brouchin.	96.166
Ambres.	ibid.	Basilie sauvage.	681.9.2	Bruiere.	185
Amourettes.	433	Balsinet.	875.1037	Brulure.	418
Ampes.	113.114	Balsinetz.	794	Bugle.	1075
Ancolye.	810	Baubino.	8	Buglosse.	578
Anet.	691	Baume.	1770		
Angelique.	714	Bec de gruë.	1175	C	
Anis.	692	Bec de cigoigne.	ibid. & 177	Abaret.	913
Api.	701	Berie.	1091	Cade.	67
Apperitz.	1139	Bes.	91	Caimeute.	904
Arbousier, <i>fruits</i> , Arbouises.		Bere.	551	Cameline.	1136
191		Bere rouge.	ibid.	Camemine.	ibid.
Arbre du Bresil.	1846	Betoesne & Betoine.	1181	grande Camomille.	940
Arbre de la graine d'escarlate.		Bierre.	402	Camomille bleüe.	1389
27		Binioum.	50	Camomille vulgaire.	1144
Argentine.	1064	Bistorte.	1185	Campanes blanches.	1516
Argouffes.	139	Blancheputain.	257.165	Camphre.	1783
Armegnes.	197	Blanchette.	554.1577	Canne.	995.999
Armoities.	808	Blauer.	416	Cappres.	155
Armoites sauvages.	809	Blé blanc.	374	Cardons.	1439
Armoise.	49	Blé de Breuf.	419	Cardon lechal, ou lecher.	1418
Arrestebeuf.	447	Blé Locar.	395	Carottes jaunes.	719
Arroches.	535	Blé motet.	374	Carottes & Carottes rouges.	
Artichans.	1439	Blé noir.	419	711	
Asnes.	114	Blé riguez.	376	Carotte ou Pastenade sauu?	
Asparge.	609			ge.	719

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM,

Carnouges.	112	Coing & Pomme de Coing.	Drvie.	1	
Caru.	693	Cognassier.	Durcines.	920	
Casse.	113	Coing dier & Coignacier. ibid.			
Ceboule.	1518	Coloquinte.	1675	E	
Cedre.	46	Comin.	696		
pet. te Centauree.	1286	Concombre.	619	E Bene.	1701
Cerueiz.	710	Confanons.	439	Eglantier.	12127
Cenifer, Cenfes.	309	grande Consolide.	1074	Ellebore blanc.	1611
Cerelat.	1115	Consolide, & Consolide Sarra		Ellebore noir.	1633
Chamaraz.	909	zine.	1270	Eneens.	1751
Champignons.	1385	Confy e.	1074	Endiue.	114195
Chanure.	496	Coq.	678	Englantier.	121
Chapperon ou Coqueluchon		Coques de Leuant. 1721. 1831		Eolife.	10
de moyne.	1745	Coqueliquoc.	439	Etable.	54
Charbon de quartier.	3	Coquelourde.	1513	Etable madré.	ibid. & 91
Charbon de branche.	4	Coqueret.	596	Etable raine.	94
Chardon à cent testes.	1418	Cotal.	1374	Etable mol.	99
Chardon argentin.	1445	Cormes.	330	Ers.	418
Chardon à carder vel Chardô		Cormier.	ibid.	Escarlate.	17
à fouillon.	1447	Corne de Cerf.	668	Echalese.	381
Chardon nostre Dame.	1474	Corneole.	1058	Echalottes.	1519
Chardonnette.	1457	Cornouilles.	419	petite Esclaire.	1148
Chardouffe.	1453	Cornouillier.	ibid.	Eseuelles.	1618
Charme.	81	Cornigole.	1123	Espargoutte.	911
Charpene.	ibid.	Cotton.	211	Espeaute.	54
Chastaigne, Chastaigner.	31	Coucombre sauage.	1672	Epi d'eau.	1007
Ciausse trappe.	1473	Coueourde.	65	Espinats, & Espinoches.	145
Cheliuine.	1249	Couillon de Prestre.	272	Espine de bouc.	1477
Cheneue.	416	Couillon de chien.	1549	Espine vineite.	117
Chermillaz.	5	Couldre.	100	Espurge.	1617
Cheruy.	721	Coleuuree.	1419	Eufoube.	1699
Cherne.	28	Couleuuree noire.	ibid.	Eufrafe.	167
petit Chêne.	6	Couleuuree sauage.	ibid.	Eupatoire.	121
Chêne verd.	20	Courge.	615		
Chesnette.	1161	Courge sauage.	1675	F	
Cheueux de Venus.	1209	Couli es.	192	F Au.	54
Cieure feul.	1427	Croufines de marais.	187	Fangoule.	904
Chou.	518	Cramosili.	29	Faine.	54
C nou capu.	521	Creneufe.	1149	Fenouil.	688
Chou capu rouge.	513	Cresson de iardin & Cresson		Fenouil marin.	757
Chou de chien.	1618	alenors.	654.658	Fenouil de pourceau.	741
Chou cressu noir.	513	petit Cresson aquatique. ibid.		Feugiere & Feuehiete.	1222
Chou de Cypre.	512	Cresson d'eau.	1094	Feugiere aquatique.	2225
Chou fleur.	ibid.	Cresson sauage.	666	Feugiere de chesn.	1227
Chou noir.	513	Crete marine.	767	Feugiere femelle.	1222
Chou rane.	511	Croissette.	1219	Feugiere maile.	ibid.
Chou rouge.	513	Curage.	1018	Feut.	411
Chou de Sauoye.	521	Cuyderelles.	808	Feue grasse, & Feue epaile.	1315
Churks.	1581	Cypres.	57	Feues printez.	411
Ciche.	461	Cyprez de iardin & petit Cy		Fiel de terre.	1226
Cichoree de iardin.	515	prez.	957	Figues.	151
Cichoree sauage.	ibid.			Filipede & Filipendule.	78
Cicutaire.	740			Flambe.	1609
Cidre.	189			Flammule aquatique.	1041
Ciguë & Cocue.	788			Fleur à rendre.	174
Citer.	202			Fond de Bourgogne.	102
Citrouille.	615			Foutinne.	179
Citrons.	298			Fouette.	976.979
Claues & Cluons.	1538			Fouarte.	586
Codigiai.	29				
Clou de Gyruffe.	1718				

D

D Ares, & Dactier.	362
Dent de chien. 410. 411	
451. 454	
Dickam.	891
Dignale, & Doigtier.	831
Double facille.	260
Dragou.	685

GALLICVS.

Foutreau.	34 35
Fraisier & Fraises.	613
Framboisier & Framboises.	143
Franc-olier.	178
Froument.	371
Froument Locar.	395
Froument rouge.	ibid.
Froument à six quarrés.	376
Froumentee.	ibid.
Fumeterre.	1191
Fusain.	172
Fustet.	194

G

G Ailier.	110
Galle ou Noix de Galle.	15

Gantelee, ou Gans nostre Dame.	819 831
--------------------------------	---------

Gelee de Coing.	291
Genest 168 & Genesle.	171
Genest d'Espagne.	168
Genest de Florence.	ibid.
petite Genesle, petit Geuest.	173 174
Geueure & Geueurier.	66
Gentiane.	1118
Germandee.	1161
Gesses.	470
Gingembre.	1810
Glaieul puant.	1611
Glaieul de marais.	1618
Glus & Glaitel.	1620
Glaod de terre.	1347
Gloutteron aigu.	1056
grand Gloutteron, & Gloutteron.	1054
petit Gloutteron.	1056
Goutte.	1683
Grace de Dieu.	1185
Graine d'escarlate.	17
Graine.	19
Graine jaune.	151
Graine à teindre.	ibid.
Graine d'Auigooon.	1811.
Gramme.	410
Grande Escalote.	1249
Grateron.	1310
Gremil.	176
Grenadier.	303
Grenouillere.	1017
Griotes, Griotier.	310
Groslier.	131
Groselle.	ibid.
Groslier noir & Groselles noires.	131
Groslier rouge & Groslier d'oultre mer.	131. 111
Groselles rouges & Groselles d'oultre mer.	ibid.

Grosse Germandree.	1165
Guede.	499
Guimaue.	590
Guimaue de Venise.	194
Guimaue sauvage.	593
Guindoles.	110
Guines.	309. 310 311
Gurguer.	418
Guy.	17
Gyrofile.	1738
Gyrofilee de Damas, ou des Dames.	804
Gyrofilees.	806
Gyrofilee d'eau.	1011
Gyrofilees jaunes.	801
Gyrofilee jaune.	802

H

H Ache Royale.	1388
Hanebane.	1716
Hauveau.	137
Hautains.	95
Hepatique.	1083. 174
Hestre.	34. 35
Hieble.	169
Hilope.	931
de l'Herbe.	411
Herbe aux Aulx.	911
Herbe S Barbe.	650
Herbe de Bouc.	541
Herbe à cent maladies.	1061
Herbe au chancre.	1149
Herbe au Charpentier.	1510
Herbeau chat.	918
Herbe aux cloches bleues.	816
Herbe de cœur.	673. 1317
Herbe à cotton.	1115
Herbe aux cuilliers.	1310
Herbe dorée.	1173
Herbe d'esperuier.	569
Herbe de feu.	1041
Herbe contre la gravelle.	1114
Herbe S. Jacques.	575
Herbe à saumir.	1741
l'Herbe S. Jean.	949
Herbe au la. Q.	487. 1641
l'Herbe aux limassons.	501
Herbe du masclou.	164. 166
Herbe militaire à millefeuilles.	768
Herbe aux perles.	1176
Herbe du Perroquet.	1691
Herbe aux puces.	1171
Herbe aux pouilleux.	1619
Herbes aux poumons.	1316. 1317
Herbe du prés.	411
Herbe Robert.	1178
Herbe aux tigneux.	1051
Herbe aux viperes.	1104
Huile de Cade.	39. 39

Houbeton & Houbilon.	1414
Houx & Houillon.	147
Hyslope.	593

I

I Euse.	10
I f.	14 78
Iosemin & Iasmin.	1430
Iosim rouge & Iosmin large.	1431
Ioue.	583
Iouc.	111
Ioubarbe. 1118 grande Ioubarbe. ibd. petite Ioubarbe. ibid.	

Iue muscate & Arretique.	1159
Iugioline.	481
Iuubes.	356
Iuraye.	416
Iuraye sauvage.	ibid
Iusquiamme.	1716

L

L Aideros.	571
Laiue.	545
La luceresque.	ibid.
Laiue pommee.	ibid.
Lampe.	601
Langue de cerf.	1118
Langue de chien.	1161
des Lans.	164. 173
Lapas, & du Lapais.	601. 602
Lauande.	919
Lauande femelle.	ibid.
Laurole.	110
Laurier.	351
Lentille.	475
Lentille d'eau.	1014
Leontique.	63
Leueche.	706
Liege.	11
Lierre.	1415
Lierre terrestre.	1310
Lemons.	301
Lin.	493
Liz.	1491
Lis d'estang.	1008
Lis sauvage.	1493. 1497
Liseron.	1411. 1413
petit Liseron.	1414
Liseron de vigne.	1413
grand Liser.	1411
Liser piquant.	ibid
Long gran.	376
Louchon.	54. 166
petite Lunaire.	1313
Lupin.	466
Lusse.	166
Luzerne & Luzert.	503

Mandra

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM

[illegible]

GALLICVS.

Pied d'oiseau.	486	Pois ramé.	449	Q ^{ue} ue de cheual.	1079
Pied de pigeon.	1276	Poiure.	1807	Q ^{ui} ue de souris.	1318
Pied de veau.	1396	Poiure aquatic.	1038	Quinafeuille.	1263
Pignons.	4412	Poiure d'Inde, & Poiure d'E-			
Pilofelle.	1098	spagne.	631		
Piment Royal.	110	Poiurette.	812		
Pimpinelle fawage, & cultri-		Poiuriet.	132		
uee.	1087	Pois fondue.	74		
Pin.	43	Poir refine.	6971		
Pins fawages, ou Pinnateaux.	46	Poir feche.	75		
Piretbre.	1170	Polipode.	1129		
Pirole.	841	Polytric.	1111		
Piffenli&.	564	Polytric dore.	1112		
Piftaches.	360	Pomcires.	298		
Piuoune.	855	Pomier, & Pome.	181		
Plane.	94.101.120	Pomes d'Adam.	302		
Plantain d'eau.	1096	Pomme d'Amour.	626		
Plantain de mer.	139	Pomme d'Amour, & Pomme			
Platane.	93	d'or.	618		
Poeree.	551	Pomme Apiole.	126		
Poirier, Poires.	306	Pommes de Capandu.	ibid.		
Poire Aeciole.	307	Pommes Follanes.	ibid.		
Poire d'Agneffe.	ibid.	Pomme Girandete ou Pom-			
Poire d'Argent.	306	mepoire.	ibid.		
Poire Bergamote.	ibid & 307	Pome de Grenade.	303		
Poire Blanchete.	306	Pomme Grilote, & Pomme			
Poire Bon Chretien.	ibid. &	de Palfepomme.	126.127		
307		Pomme de S.lean.	126		
Poires de Cailloiam.	ibid.	Pomme de Merueille.	619		
Poire difte Caluau Rofat.		Pommes Panetes.	214		
ibid.		Pomme de Paradis.	217		
Poire Carmagnole.	ibid.	Pomme du Perou.	618		
Poire Certeau.	ibid.	Pommes de Pin.	44		
Poire Char.	ibid.	Pomme Rembure.	127		
Poires de Chio.	ibid.	Pomme Rofe.	125		
Poire Courle.	ibid.	12 rofes Pommes rouges.	ibid.		
Poire Cuiffe madame.	ibid.	dem			
Poires d'eau Rofe.	ibid.	Pomme Suzine.	ibid.		
Poirier d'Efpine.	116	Pomme Taponne.	120		
Poire Efne.	137. & 307	Pomole.	398		
Poires d'Eftanguillon.	308	Ponceau.	459		
Poires de Guor.	307	Porellaine.	550		
Poire Fotel.	306	Porteau.	1541		
Poire d'Hypoc.	307	Porteau de chien.	1543		
Poire de lalouffe.	ibid.	Potirons.	1586		
Poire S.lean.	ibid.	Poule gra.	114		
Poire de Loure.	ibid.	Poulliot.	892		
Poire S. Martin.	ibid.	Poupom.	612		
Poire groffe Mufcadelle.	306	Poupoms fupercins, & fucere-			
Poires Mufcadelles.	ibid. &	des.	613		
307		Pourchailles, & Pourpier.	550		
Poire Muffet.	306	Preffe.	1069. 1070		
Poire Noftre Dame.	307	Preffes.	205		
Poire Perle.	306	Primeuete.	833		
Poire Pomme.	317	Prunes, Prunier.	313		
Poire Prenoft.	306	Pruuelier, & Prunier fawage.	130		
Poire à deux Teftes.	307	Prunelle.	105. 312		
Pois.	449	Pudis.	ibid.		
Pois bechu.	461	Pulier.	952		
Pois cache.	ibid.	Pyment.			

Q^{ue}ue de cheual. 1079
Q^{ui}ue de souris. 1318
Quinafeuille. 1263

R

R^{ab}e. 619
Racine fentant les Ro-
ics. 988
Rafin de reuard. 1311
Raiponce. 641
grande Raiponce. ibid.
Rameboue. 1477
Raue. 606
Rauenon. 341. 640
Recliffe & Regaliffe. 147
Reifort. 614
Reifort fawage. 636
Reif ut d'eau. 1090
Renouée femelle. 1072
Renouée mafle. 1123
Reperet. 828. 829
Refine. 63. 69
Reftinle. 63
Reuille matin. 1648
Reuille mazin des vignes. 1658

Rhu. 194
Riorre. 217
R^omarin. 763. 767
Rompe pierre. 1112
Romp pierre doree. 1114
Ronce. 119
Roquent. 649
Rolage, & Refagine. 244
Rofeau. 595
Rofe. 114
Rofes d^e Damas incarnates. 125
Rofes de Damas rouges. ibid.
Rofes incarnates. ibid.
Rofes Mafques, & Mufcadelle. ibid.
Rofe d'oultremer. 584
Rofes de Prouins. 125
Route. 4. 6.
Routee de Soleil. 1112
Rue. 418. 972
Rue demur. 1112
Rys. 407

S

S^{aff}ian. 1551
S^{aff}ian baffard. 1449
S^{aff}ian foim. 102
Salette. 605
Sallade de Chanoine. 1127
Sanguis. 157
Sanuele.

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM, GALLICVS.

Saniele.	1168	Solane furieux.	ibid.	Treflle.	173
Sap & Sapin.	51. 55	Solane mortel.	1721	Treflle odoriferante.	104
Sarrasine.	976. 979	Sorbes & Sorbier.	330	Treffles des pres,	111
Sarrazine.	1270	Souchet.	991	Triolet.	ibid.
Sarytion.	1349. 1365	Soude.	1377. 1378	Triguemadame.	112
Satyrtion Royal.	1565	Soulié.	811	Troefne.	312
Sauge, grande Sauge, Sauge		Soulié d'eau.	1038	Truffies.	155
franche, & Sauge menue.		Sparfe.	489	Tue-chien.	1570
879		Sraphifagre.	1629		
Sauinier.	181	Stichedes.	917	V	
Saulx & Saule.	274	Stipoule.	1375	V Acier.	256. 1506. 1511
Saunes blanches.	542	Sureau.	166	grande Valeriane.	917
Saune vie.	1112	Suyer.	ibid.	grande Valenane sauvage.	1042. petite.
Saxifrage.	786	Sycomore.	340	ibid.	
Saxifrage blanche.	1112			Velar.	611
Scabieufe.	1065	T		Veraire.	161
Seammonet.	1661	T Abouret.	1097	Ver de vefcie.	146
Scariote.	355	Tamaris.	179	Verge d'or.	1171
Scordion.	909	Tanaife.	955	Vermillon.	27
grande Serofulaire.	1085	Targon.	781	Veronique femelle.	1050
Sebestes.	319	Tarnottes.	1347	Veronique malle.	1195
Seclou Segle.	396	Tartouraire.	1669	Verueine.	1314
Semoule.	376	Teigne de Thym.	1681	Vefce.	478
Senelle vivam.	137	Terebinthe.	61	V.d de prestre.	1396
Senefion.	574	Terbentine de Venife.	54	Vigne.	1401
Seneue.	645	Tillet, Teilleu, Teil.	89	Vigne fauuage.	1406
Seneue fauuage.	661	Thefe, ou Thie.	49	Vignoble.	1616
Serbin.	59. 183	Thym.	904	Vinette.	61
Serpentaire & Serpentine.	1601	Tifane.	401	Violette d'Automne.	814
Serpentaire d'eau, & aquati-		Tithymal.	1647	Violette de Damas ou des	
que.	ibid.	Tourmentille.	1167	Dames.	814
Serpoller.	902. 904	Tormigue.	99	Violette de Marie.	815
Siboule.	1338	Toutelle.	651	Violette de Mars & Violene	
Signet de nostre Dame.	1409	Toufelle.	376	de Mars double.	797
Signet de Salomon.	1623	Toutebonne.	601. 965	Violier jeune.	804
Simoule.	379	Toutefaine.	1156	Viorne.	257. 1407. 1605
Soiffe.	49	Tréble. 86. petit Tréble.	ibid.	Vnefucille.	1140
Solane dormitif.	396				

FIN DE LA TABLE FRANCOISE.

I N D E X

INDEX ITALICVS.



A

<i>Bete.</i>	13	<i>Barzobianco.</i>	135
<i>Abrotano.</i>	916	<i>Barba di becco.</i>	1078
<i>Agarico.</i>	1703	<i>Basilico.</i>	679
<i>Aglia.</i>	1545	<i>Basilico saluatico.</i>	679
<i>Agno Casto.</i>	280	<i>Bedollo.</i>	93
<i>Agratto.</i>	614	<i>Belvedere.</i>	226.1225
<i>Agrifolia.</i>	147	<i>Berbena.</i>	1334
<i>Alaterno.</i>	119	<i>Betula & Bettola.</i>	93
<i>Albastro.</i>	195	<i>Biada.</i>	384
<i>Albero da le Patenoftri.</i>	318	<i>Bidone.</i>	264
<i>Albero de l'rua.</i>	102	<i>Bietola.</i>	153
<i>Alga.</i>	324	<i>Biondella.</i>	1286
<i>Amarella.</i>	913	<i>Bistongua.</i>	205
<i>Amor di donna.</i>	1161	<i>Bismalua.</i>	193
<i>Ampelo.</i>	135	<i>Blua.</i>	138
<i>Ampomela.</i>	123	<i>Bonsaccia.</i>	271
<i>Anagiri.</i>	101	<i>Porragine.</i>	578
<i>Anrtho.</i>	691	<i>Bracche di cuculo.</i>	213
<i>Aniso.</i>	692	<i>Buscandula.</i>	1414
<i>Anguria.</i>	625	<i>Buon vischio.</i>	193
<i>Apio domestico.</i>	700		
<i>Apio palustre.</i>	701		
<i>Arabrica.</i>	465		
<i>Armenia che.</i>	297		
<i>Ara.</i>	1596		
<i>Asparago.</i>	609		
<i>Asprella.</i>	1069		
<i>Asphodelo.</i>	1528		
<i>Auellano.</i>	319		
<i>Astenza.</i>	940		
<i>Astora.</i>	121		
<i>Atriplice.</i>	135		
<i>Auino.</i>	96		
<i>Azavolo.</i>	222		

B

<i>Bacche.</i>	297	<i>Carobe & Carobole.</i>	113
<i>Bagaia.</i>	135	<i>Carofano.</i>	1718
<i>Bagoiara.</i>	346	<i>Carobaria.</i>	220
<i>Balsamina.</i>	677	<i>Castia.</i>	113
<i>Balsamo.</i>	1770	<i>Castagne.</i>	31
<i>Bambagia.</i>	221	<i>Cataputia minore.</i>	167

<i>Canalo.</i>	578
<i>Canali fiori.</i>	127
<i>Ceri.</i>	461
<i>Cedri.</i>	298
<i>Cedriuolo.</i>	619
<i>Cedro.</i>	34
<i>Cefaglione.</i>	369
<i>Cefaglioni.</i>	1762
<i>Celidonia.</i>	1249
<i>Celidonia minore.</i>	1048
<i>Centauria minore.</i>	1286
<i>Centogran.</i>	1126
<i>Centone.</i>	1272
<i>Cerro.</i>	6
<i>Chambrosiana.</i>	212
<i>Chamedrio.</i>	1162
<i>Chamoptio.</i>	1179
<i>Charanna.</i>	629
<i>Chiona di soue.</i>	1164
<i>Chondrilla.</i>	163
<i>Chortal.</i>	403
<i>Cicribia.</i>	171
<i>Ciclamino.</i>	1604
<i>Cipolla.</i>	1336
<i>Cirge.</i>	309
<i>Cirge Acqua'uole.</i>	310
<i>Cirge Amarine.</i>	ibid.
<i>Cirge Corbine.</i>	ibid.
<i>Cirge Duracine.</i>	ibid.
<i>Cirge Marasche.</i>	ibid.
<i>Cirge Marine & Marinelle.</i>	ibid.
<i>Cirge Marobiane.</i>	ibid.
<i>Cirge verrule.</i>	ibid.
<i>Cirge Visciale.</i>	ibid.
<i>Cirmolo.</i>	48
<i>Cisto.</i>	222
<i>Citroni.</i>	298
<i>Cocomero.</i>	619
<i>Cocomro saluatico.</i>	1672
<i>Coda di cavallo.</i>	1069
<i>Coda di brone.</i>	425
<i>Coloquintida.</i>	1075

8

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Conastello.	213	Fauoscello.	1048	Grana de tintori.	21
Consolida maggiore.	1074	Felce.	1223	Granellosa.	1128
Copertiuuele.	1608	Fegire sentanim.	1411	Grano.	371
Corallo.	1374	Fichi.	331	Grafella.	1128
Corniolis.	329	Fico d' Egitto.	340	Grisomele.	391
Corniole.	ibid.	Finocchio.	688	Guado.	499
Corsigiolia.	1123	Finocchio marino.	767	Gustrico.	313
Cotone.	231	Fior Campese.	436		
Crepalo.	162	Fiore d' ogni mese.	174-211	H	
Cressina.	137	Fior di primauera.	833-813	H Alicacabo.	196
Cressione.	618	Fior raucio.	811	H Hedera.	1471
Cuculus de Levante.	1723	Fior veluto.	870	Hedera spinosa.	1431
Cumino.	656	Fongino 1586, Prignoli ibi. Pra		Herba Belladonna.	1721-1727
Cumeno.	414	tauoli, Turim, Bolei, Orcije,		Herba Gatta.	908
Cypresso.	37	Cardarelli, Ordinoli, Parigioli, Vescie di Lupo, 1587		Herba Giulia.	177
				Herba inoderata.	1311
D				Herba lupa.	431
D Attoli.	362	Formento.	371	Herba de la marauiglia.	148
Dutamo.	892	Formentone.	383	Herba de la Milza.	1246
Dolzolini.	1184	Frasinella.	1623	Herba del moro.	612
Dragoncello & Dragone.	681	Frasino.	82	Herba del sampetro.	161
Dragoncello.	781	Fusaro.	272	Herba di Sampetro.	662
Dragontea.	1601			Herba tora.	431
				Hyacintho del pater nostro.	
E					
Ebeno.	1711	G			
Ebulo.	269	Alla.	13		
Echelo.	104	Garofoli.	306	Hydropepe.	1028
Egilopo.	401	Gattaria.	908	Hissopo.	933
Elue.	20	Gatto.	1447	I	
Elleboro bianco.	1631	Gellimino.	1410	I Ncnso.	1712
Elleboro nero.	1633	Genestra.	168-172	I Ingioluna.	412
Endiua.	514	Genguo.	1890	Iride.	1609
Enola & Enoa.	867	Ghianda r'unguentaria.	1684	I schia.	6
Erica.	181	Gigaro.	1596	Iua.	1219
Eruo.	468	Giglio.	1491	Iunco.	383
Efculo.	6	Giglio azzurro.	1609	Iusquiamo.	1716
Euforbio.	1690	Giglio celeste.	ibid.	L	
Eufrafia.	1167	Giglio matto.	1574		
		Giglio rosso.	1493	L Acca & Lachetta.	1580
		Giglio saluatico.	1497	L Lagrimas.	14
		Ginepra.	66	Lambusca.	1406
		Ginochieto.	1623	Lantagne.	204
		Gioglio.	416	Lantana.	216
		Gioglio saluatico.	ibid.	Lapario.	600
		Girafole.	1630	Lappola maggiore.	1014
		Gistone.	438	Lappola minore.	1016
		Giuggiole.	316	Larice.	11
		Gladuolo.	1620	Lattaiuala.	166
		Gorgolestro.	1091	Lattuca.	141
		Gramigna.	420	Lauandula.	919

<i>Lauanese.</i>	371	<i>Minutola.</i>	1424	<i>Pice secca.</i>	72
<i>Lauro.</i>	311	<i>Morha.</i>	1713	<i>Pennachi Persiano.</i>	1494
<i>Lauro saluatico.</i>	304	<i>Monacucce.</i>	1620	<i>Peonia.</i>	815
<i>Lella.</i>	867	<i>Monache.</i>	397	<i>Pepe.</i>	1807
<i>Lente de i paludi.</i>	1014	<i>Moro.</i>	329	<i>Pepe aquatico.</i>	1078
<i>Lenticchia.</i>	435	<i>Mosco.</i>	1323	<i>Pere. 304. Campana, Carouella,</i>	
<i>Lentisco.</i>	63	<i>Mugo.</i>	47	<i>Ciampoline, Duella, Gentili,</i>	
<i>Licio.</i>	148	<i>Myrio.</i>	316	<i>Ghiaciuole, Guignole, Mos-</i>	
<i>Limon.</i>	301	<i>Myrio mortella.</i>	238	<i>chatelle, S. Nicolo, Papali,</i>	
<i>Lintermo.</i>	159			<i>Porcine, Quadrane, Roggia</i>	
<i>Lithospermo.</i>	1176			<i>Sementine, Spinose, Verna-</i>	
<i>Lodano.</i>	239	N		<i>recce, Zuccate. 308. Mena-</i>	
<i>Loglio.</i>	416	<i>Narcisso.</i>	1116	<i>ti.</i>	309
<i>Loio albero.</i>	346	<i>Nasso.</i>	34	<i>Pirlaro.</i>	506
<i>Loio domestico.</i>	106	<i>Nasturto.</i>	654	<i>Perfa gentile.</i>	822
<i>Lupino.</i>	466	<i>Nasturtio saluatico.</i>	668	<i>Persiche.</i>	293
		<i>Naumne.</i>	644	<i>Petra findula.</i>	788
		<i>Nespoli.</i>	112	<i>Petraciani.</i>	629
		<i>Nocelle.</i>	319	<i>Petrofello.</i>	700
		<i>Noci mofcada.</i>	1760	<i>Petrofello, & Petrofello salua-</i>	
		<i>Nociuole.</i>	319	<i>tico.</i>	714
		<i>Noci.</i>	320	<i>Petimborsa.</i>	824
				<i>Petzo.</i>	49
		O		<i>Piantagine aquatica.</i>	1016
		<i>O dano.</i>	229	<i>Pie coruino.</i>	1027
		<i>Oleandro.</i>	244	<i>Pie d'oca.</i>	94
		<i>Olus d' Aucto.</i>	14	<i>Pignola.</i>	1128
		<i>Oliuella.</i>	210	<i>Pino.</i>	43
		<i>Oliuella & Oliuetta.</i>	212	<i>Pirra.</i>	324
		<i>Oluno domestico.</i>	142	<i>Pirra farra.</i>	ibid.
		<i>Olmo.</i>	80	<i>Pistachi.</i>	360
		<i>Ombilico di Venere.</i>	1608	<i>Pistacio saluatico.</i>	102
		<i>Opolo.</i>	94	<i>Piza gallina.</i>	1233
		<i>Orvola.</i>	210	<i>Platano.</i>	93
		<i>Origano.</i>	886	<i>Platano aquatico.</i>	94
		<i>Ornello.</i>	82	<i>Polenta.</i>	384
		<i>Ortica.</i>	1247	<i>Polio gno maschien.</i>	1123
		<i>Orzo.</i>	398	<i>Polipodio.</i>	1229
		<i>Onio.</i>	96	<i>Pomi.</i>	285
				<i>Pomi d'oro.</i>	628
		P		<i>Pomogranato.</i>	303
		<i>Palma.</i>	362	<i>Pomo di Ierusalem.</i>	629
		<i>Panarina.</i>	1232	<i>Pomo spinoso.</i>	628
		<i>Panico.</i>	411	<i>Pongioipi.</i>	342
		<i>Pan d'orso.</i>	135	<i>Popolo bianco.</i>	86
		<i>Pan porcino.</i>	1604	<i>Popolo nero.</i>	ibid.
		<i>Papauero.</i>	1707	<i>Porcellana, Porcellina, Por-</i>	
		<i>Papauero saluatico rosso.</i>	419	<i>chella bia.</i>	510
		<i>Parietaria.</i>	1241	<i>Porranello.</i>	1143
		<i>Patrofalo.</i>	1072		
		<i>Pice liquida.</i>	74		

INDEX HISTORIÆ PLANT. ITALICVS

[illegible]



INDEX HISPANICVS.



A
Beto, ar-
bol. 33
A bogalla.
15
Abrolhos.

512
Abrotono. 936
Abroyos. 512
Acibar. 1693
Acocifo. 356
Adelfa. 244
Agarico. 1703
Alamo Blanco. 86
Alamo nigrilho. ibid.
Albahara. 679
Albarchigas. 297
Albardin. 179
Albiricoques. 297
Albocigos. 360
Alcaparas. 155
Alcaranea. 693
Alcarobas. 112
Alcolcaz. 457
Alcornoque. 22
Alegría. 482
Alfalfa, & Alfafa. 504
Alfena, & Alhena. 252
Alforuian. 1690
Algodon. 211
Allahaqua motequina. 682
Al Mastiga. 66
Almendras. 316
Almez 346. Alfalfa. 545
Aluaricoques. 297
Amapolas. 439
Amapolas morades. 1713
Ambares. 1874
Amexias. 313
Ananas brauo. 1871
Andrinhas. 313
Anorca. 1409
Arbol contralas erysipo-
las. 1862

Armoles. 335
Arroz. 407
Arrula. 972
Aruceria. 63
Aruga. 649
Aselgas. 331
Asprilla. 1115
Auellanas. 319
Auellana dela India. 1684
Auena & Auea. 423
Auzina. 10
Auzinheira. ibid.
Ayos. 1545
Azebo. 147
Azeure. 1693
Azeytuno. 342
Azufecifa. 356
Azumbar. 9.0

B

B Accarra. 913
B Baldroegas. 550
Batades. 1909
Bexigo de perro. 596
Bonnaron. 574
Borraia. 578
Box. 165
Brufalagam. 1668
la Burladora. 2913

C

C Alabazza. 65
Cápanilla. 1426. 1513
Cannas. 295
Canela. 113 1796
Caninero. 266
Carumbolas. 1872
Carca. 119
Cardon. 1698
Cebolla albatrana. 1575
Cedro. 36
Ceguda. 783
Celiduenha. 2149
Centeno. 396
Cepolha. 1536
Cercas. 309

Cerezo syluestre. 329
Cerguacos. 212
Ceudilla. 1906
Ceuada. 398
Cidras. 258
Ciegegato. 1668
Cipolic maligie. 1558
Clauo de especia. 1758
Coda di mula. 1069
Cogombrillos amargos
1672
Cogombro. 619
Cogomelos. 1586
Corhes. 518
Colleion. 515
Coloquintida. 1675
Comino. 696
Contrayerua. 1825
Corallo. 1374
Cornicabra. 61
Cortizolos. 329
Coronilla de Roy. 490
Corregula mayor. 1912
Cef. oia. 20
Couues. 518
Coyon de perro. 1549
Cucinas. 1001
Cuebras de Capillo. 18 5
Cul átrilo de pozo. 1109
Cy herquas. 1586
el Cypres. 57

D

D Ariles. 362
Datura. 1911
Doradilha. 1215
Dormidera. 1707

E

E Dera. 1415
Encienfo. 5752
Endiuiia. 554
Enebro. 66
Eneldo. 691
Enramocos. 466
Euzina. 6

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM,

Enzo.	1485	Inucia odorosa.	991	Mostaza	445
Eruaye.	501	Ionquillos.	1510	Murta.	236
Escudetes del rio.	1008	Iorgilin.	481	N	
Esparagos.	609	Ispopo.	933		
Espigafil.	910	Iua arthetica.	1159	Abicas.	644
F		Iunco.	985	Nabo redondo.	639
Fabaras paparaz.	1629	Iunquiera.	568	Naranzas.	301
Fallado.	105	Iusbarba.	242	Nasturcyo.	654
Fauade Malaqua.	1764	L		Neguillia.	811
Feyones.	473	Abaca.	600	Nelperas.	331
Figuera del'inferno.	1630.	Larice.	55	Norchila.	1866
1790		Laurel <i>fw</i> Laureiro.	351	Nozelhas.	1580
Fil y Aguilla.	1698	Laureizo.	ibid.	Nuxa.	1409
Frailillos.	1600	Lechuga.	545	Nuez de especie.	1760
Fresno.	81	Lengua de Cauallo.	105	Nuczes.	310
Frexo.	ibid.	Lenreias.	475	O	
Funcho.	688	Lenteiuela.	1014	Liuro.	342
G		Liga mordago.	17	Oregano.	886
Amones & Gamoni		Lino.	493	Ortiga.	1143
tes.	1588	Lirio.	1580.1615	Oruga.	649
Gatillo Casto.	180	Lirios azules.	ibid.	P	
Genestra, Giesteira, Gie-		Lirio espadanal.	ibid.	Almeira.	361
stra.	168.172	Lirio Illyrico.	ibid.	Palmitos.	1762
Giganre.	874	Loreola.	210	Palomilla & Palomina.	1294
Gingiure.	1890	M		Paniqueso del flor blan-	
Giralda.	874	Acucas.	1580	quo.	661
Grana en grano.	17	Madronho <i>fw</i> Ma		Panifo & Panizo.	411
Grana para tegnir.	ibid.	dromeiro.	195	Papolos.	439
Granadas.	303	Maios flores.	1411	Parra & Parilla.	1898
Grauanços.	461	Malpica.	654	Pastel.	499
Guindas de las Indias.	600	Maluas.	584	Paya de la Mequa, <i>fw</i> Pa	
H		Malua de Vngria.	593	ya de Camelhios.	1884
Aba de India muy		Malua montefina.	ibi.	Pepitas del Peru.	1866
larga.	1891	Mâcanas de la India.	1873	Perexil.	700
Haia.	34	Mandracola.	1715	Perexil de la mar.	767
Helechoyerua.	1112	Manfanas.	1285	Pexegos.	295
Hiezguos.	169	Marmello.	1290	Pex negra.	74
Higos.	335	Marroio negro.	1451	Pie de Borro.	1535
Higos del rio.	1008	Marrones.	31	Pimenta de Bresil.	633
Hinoio.	688	Mata.	63	Pimienta.	1807
Hissopo.	913	Matuhlua.	691	Pimienta del rabo.	1809
Hongos.	1586	Mechioacan.	1901	Pinilho.	1159
I		Membrilho.	290	Pino.	43
Ambeiro.	1873	Merenderas.	1572	Pino negro.	49
Iambos.	ibid.	Mierda cruz.	1668	Pinones de Maluco.	1875
Iaro.	1600	Milho.	408	Pirlitero.	185
Ieruos.	468	Miyo.	ibid.	Porcellanes.	560
Igname.	457	Moras del Moral.	325	Prunas.	393
Igname cicorero.	1909			Puerro.	1541

HISPANICVS.

Pyras.	306	Soagem.	1100	Violetas amarilhas.	801
R		Sombrereta.	1053	Vlmo.	80
Abacas.	1091	Sorbas.	330	Vua de Perro.	105
Rabo de mula.	1069	Sparto.	177.178	Vuero.	1850
Raiam.	236	Spelta.	384		X
Rapontis.	1288	Sumach.	106	Xara.	229
Rauano & Rauanillo.	634	Sumagro.	ibi.		Y
Regaliza.	247				
Reylla buey.	1615	T			
Romanas.	303	Abaco.	1895	Y Erua de Baleste.	1630
Romero.	763.967	Tamaras.	362	Yerua belida.	1027
Rosas.	124	Tamarqueira.	179	Yerua buena.	671
Rosa albadeira.	855	Taxo.	24	Yerua Cidreira.	957
Rosa del monte.	ibid.	Teia.	89	Yerua dulce.	692
Rosella.	439	Texo.	78	Yerua di S. Gayteria.	568
Rosetta.	1713	Tomilho falso.	899	Yerua de las golaudri-	
Rucas de mar.	1394	Tonnanda.	1522	nas.	1249
S		Torongil.	957	Yerua de Monteferrato.	1668
Abina.	181	Treuol.	503	Yerua mora.	596
Sabugo.	266	Trigo.	371	Yerua del muro.	1241
Sabugo pequenno.	169	Turmas de terra.	1585	Yerua Turmera.	1100
Salce & Salgueiro.	274	A		Yerua Tussiera <i>vel</i> Pelu-	
Sarza parilla.	980	Elenho.	1716	da.	838
Scorzonera.	806	Vellotas ; <i>Hisp.</i>		Yoio.	416
Scorzonera, <i>aur</i> Scurzo-		<i>glandes Esculi vocant.</i>	6		Z
nera.	1106	Verangenes.	626		
Scudetes.	1608	Verdezilla.	1426	Z Argatona.	1172
Sened' Alexandria.	217	Verdolagas.	550	Z Zarza parilla.	1898
Serpollo & Serpam.	902	Violeta.	797	Zizania.	416

FINIS INDICIS HISPANICI

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

GERMANICVS.

grietegele.	203
gelo ylop.	219
geb blamen.	174
gichtenbaum.	43
gichtraut.	1134
gigtraut.	123
gugherhart, aus fingerhut.	211
gughertraut.	210
gugumung.	676
glachs oocor.	1136
glachs, aus glachs.	493
glachfiden.	1633
glor amor.	270
grammossel.	1474
grammohar.	1109
gryffum traat.	200
grammossel, aus gramen	106
traat.	215
gryffumtraut.	1163

G gyl, aus Wolgen.	210
Gelloppfel.	15
Ganander, leyßen Barchel.	1161
Gabbrot, aus Ganchbrot.	1078
Gaben.	723
Gardostrefe.	654
Gachblum.	619
Gachblum.	209
Gach hornungs blamen.	153
Gach hol.	1136
Gachroel.	1073
Gachschiffblamen.	233
Gachschiff.	1612
Gachride loofen.	153
Gachvad.	201
Gachwaidich.	1072
Gachst.	171
Gach weiffchblamen, aus Gach	1003
wais blamen.	
Gachwaidich, aus Gachwaidich	1338
leber.	
Gachwaidich.	1044
Gachwaidich.	106
Gachwaidich.	713
Gachwaidich.	138
Gachwaidich.	1417
Gachwaidich.	405
Gachwaidich.	174
Gachwaidich.	173
Gachwaidich.	1143
Gachwaidich.	1114
Gachwaidich.	1495, 1588
Gachwaidich.	612
Gachwaidich.	1279
Gachwaidich.	1310
Gachwaidich.	109, 404
Gachwaidich.	438
Gachwaidich.	103
Gachwaidich.	1007
Gachwaidich.	206
Gachwaidich.	1444
Gachwaidich.	917
Gachwaidich.	1165
Gachwaidich.	138
Gachwaidich.	1054
Gachwaidich.	1312
Gachwaidich.	1310
Gachwaidich.	1347
Gachwaidich.	1340
Gachwaidich.	1311
Gachwaidich.	1315
Gachwaidich.	602

H hensleinbrach.	1112
henslein.	403
henslein.	135
henslein.	219
henslein.	1017
henslein.	2122
henslein.	745
henslein.	197
henslein.	63
henslein.	41
henslein.	319
henslein.	100
henslein.	439
henslein.	447
henslein.	191
henslein.	1122
henslein.	902
henslein.	270
henslein.	1149
henslein.	100
henslein.	673
henslein.	413
henslein.	143
henslein.	269
henslein.	590
henslein.	233
henslein.	215
henslein.	1413
henslein.	428
henslein.	1122
henslein.	1585
henslein.	691
henslein.	208
henslein.	166
henslein.	208
henslein.	241
henslein.	976
henslein.	1414
henslein.	273
henslein.	1501
henslein.	100
henslein.	1161
henslein.	1119
henslein.	100
henslein.	113
henslein.	1507
henslein.	590
henslein.	1413
henslein.	1711
henslein.	1596
henslein.	219
henslein.	1890
henslein.	596
henslein.	20
henslein.	933
henslein.	933
henslein.	292
henslein.	1465
henslein.	155
henslein.	1447
henslein.	419
henslein.	902
henslein.	131
henslein.	710
henslein.	394
henslein.	100
henslein.	131
henslein.	180
henslein.	461

I ichten.	1507
ichten.	590
ichten.	1413
ichten.	1711
ichten.	1596
ichten.	219
ichten.	1890
ichten.	596
ichten.	20
ichten.	933
ichten.	933
ichten.	292
ichten.	1465
ichten.	155
ichten.	1447
ichten.	419
ichten.	902
ichten.	131
ichten.	710
ichten.	394
ichten.	100
ichten.	131
ichten.	180
ichten.	461

K uchen.	461
Kuchen.	461
Kuchen.	109
Kuchen.	100
Kuchen.	419
Kuchen.	1110
Kuchen.	1112
Kuchen.	100
Kuchen.	1141
Kuchen.	1549
Kuchen.	1545
Kuchen.	419
Kuchen.	512
Kuchen.	1100
Kuchen.	995
Kuchen.	416
Kuchen.	1172
Kuchen.	673
Kuchen.	100
Kuchen.	100
Kuchen.	593
Kuchen.	668
Kuchen.	66
Kuchen.	654
Kuchen.	1144
Kuchen.	131
Kuchen.	416
Kuchen.	519
Kuchen.	615
Kuchen.	190
Kuchen.	100
Kuchen.	100
Kuchen.	545
Kuchen.	100
Kuchen.	919
Kuchen.	1541
Kuchen.	147
Kuchen.	1310
Kuchen.	493
Kuchen.	1116
Kuchen.	1407
Kuchen.	55
Kuchen.	1617
Kuchen.	1491
Kuchen.	20
Kuchen.	29
Kuchen.	1316
Kuchen.	475
Kuchen.	151
Kuchen.	1111
Kuchen.	404, 416
Kuchen.	214
Kuchen.	1407
Kuchen.	1559
Kuchen.	416
Kuchen.	401
Kuchen.	116
Kuchen.	100
Kuchen.	511
Kuchen.	215
Kuchen.	1474
Kuchen.	215
Kuchen.	66
Kuchen.	63
Kuchen.	213
Kuchen.	1016
Kuchen.	693
Kuchen.	315
Kuchen.	1113
Kuchen.	1112
Kuchen.	100

INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

[illegible]

GERMANICVS, ET BELGICVS.

Schiering.	1409	Baslerandorn.	1064	Weldes Dolequum.	991
Schorfischmole.	1171	Basler Baumg.	909	Weldengarten affica.	1449
Schleich.	174	Basler liden.	1014	Welder kahlen.	871
Sien Gerechtmes.	176	Baslermanng.	676	Welderkertrun.	1168
Schleichig.	147	Baslerpfiffen.	1038	Weldertruffel.	718
Synon.	1181	Basler wegrich.	1056	Welder cacumen.	1671
		Basler Betomp.	1156	Welderpalgen.	991
T		Basler Blum.	1111	Welder treib.	619
Teg ond nach.	1141	Basler Blum.	955	Weldertrout.	1111
Tamarisken.	179	Baslermistrat.	1447	Welder witten.	479
Tamersack.	1166	Baslerarten.	145	Welder hingenen.	1104
Tein Tenfrudt.	1166	Baslerornen.	1111	Weldertruffel.	1618
Tenbrüfel.	1146	Baslergr.	478	Weldertruch.	1143
Tenbrüblatt.	763	Basler.	174	Weldertruch.	1406
Tenbrüforn.	1118	Basler.	971	Weldertruch.	1717
Tenbrüfen.	1170	Basler.	1751	Weldertruch.	1118
Tenbrüflich.	1618	Basler.	1444	Weldertruch.	1411, 1413
Tenbrüflich.	1066	Basler.	1611	Weldertruch.	1414
Tenbrüflich.	49	Basler.	960	Weldertruch.	841
Tenbrüflich.	51	Basler.	1461	Weldertruch.	804
Tenbrüflich.	119	Basler.	1461	Weldertruch.	1144
Tenbrüflich.	899	Basler.	1491	Weldertruch.	1111
Tenbrüflich.	114	Basler.	763	Weldertruch.	1643
Tenbrüflich.	1166	Basler.	811	Weldertruch.	110
Tenbrüflich.	1167	Basler.	1166	Weldertruch.	1118
Tenbrüflich.	1149, 1154	Basler.	1445	Weldertruch.	911
Tenbrüflich.	911	Basler.	1611	Weldertruch.	788
Tenbrüflich.	416	Basler.	1401	Weldertruch.	1091
		Basler.	66	Weldertruch.	1151
		Basler.	471	Weldertruch.	801
		Basler.	111		
		Basler.	160		
		Basler.	1481		
		Basler.	119		
		Basler.	110		
		Basler.	1146		
		Basler.	941		
		Basler.	940		
		Basler.	768		
		Basler.	499		
		Basler.	111		
		Basler.	101		
		Basler.	1041		
		Basler.	1671		
		Basler.	811		

INDEX BELGICVS.

Brugie appel.	101	Baslerboorn.	164	Zaarnboorn.	111
Betropen.	1117	Berlijch.	1618	Zepeltray.	1110
Blesmolywortele.	1745	Bertraten.	1071	Ziden.	89
Bogboom.	1019	Betoren Kooften.	179		
		Beneserboorn.	66		
C					
Christas ooghen.	815	Besick.	169	Besickboorn.	874
Citroen.	198	Bomderbeet.	1119	Besickboorn.	115
Cornoelboom.	119	Bomderene.	1119	Besickboorn.	111
Croenbloemfens.	809	Berlijchkerftruyt.	1616	Besickboorn.	416
Croft.	479	Beyden.	185		
Croasfens cruyt.	1643	Besick.	147		
D					
Dageboom.	161	Besickfens.	815	Dageboom.	110
Dorrenbloemen.	1011, 1049, 1051			Dageboom.	80
Dreack.	404			Dageboom.	141
E					
Eggekoolen.	1011	Kertruyt.	111	Eggekoolen.	115
Egghen.	81	Kapp.	496	Eggekoolen.	140
Egghenboom.	115	Kerfens.	808	Eggekoolen.	801
		Koolen.	111	Eggekoolen.	106
		Kruken.	109	Eggekoolen.	106

INDEX BOEMICVS, ET ANGLICVS.

Blaspreboom.	41	Koomschebissel.	148	Blancraye.	166
Blaspreboom.	108				
Blaspreboom.	111	Sandboom.	183	Blaufkruut.	712
		Scleropy.	965	Bracteyfch.	911. 10. 8
Blaspreboom.	190	Stemraye.	1113	Uerlot. & Broit. & Bloet.	
Kirtjes.	1018	Zerue.	171		
Kogge.	196	Zhambloemen.	839		

FINIS INDICIS
BELGICI

INDEX BOEMICVS.

B. Oef.	351	Bloc.	135	Doel.	171
B. Oromet.	41	Braslop.	106	Koog.	114
Brig.	91	Janafch.	111	Sandpoo.	118
Cenogla.	181	Klafterka.	181	Zopd.	86
		Kyrbiny.	110		
Doelyle.	161	Zeforce.	147	Wolffe.	108
Drac. u- Drifal.	117	Zippa.	89	Wolff.	96
Drinf.	180			Worot Zistokap.	119
Drinkoap.	119	Wotafe.	140	Wurba.	174
g. f. f. f.	135	Wypale.	131	Zob.	171
Kofm.	81				
Kula.	80	Wifarpa.	140		
		Woffowa.	165		

FINIS INDICIS
BOEMICI.

INDEX ANGLICVS.

A. Zmonatree.	116	Figge tree.	117	Orten.	401
Appel.	117			Shuetra.	141
B. f. f. f.	41	Bafidtree.	119	Orange tree.	301
B. f. f. f. Poplatree.	86	Baer.	401		
		Beth.	185		
Berberis.	137	Bump, & Bump.	496	Prer.	306
Bloer. u. part.	169	Boly.	147	Pichette.	49
Bumblebulp.	119			Tallies & f. f. f.	366
Buis.	105	Junipetre.	66	Plantree.	113
				Pomaratree.	101
C. f. f. f.	309	Kale.	118	Potatoes.	1009
C. f. f. f.	194	Kapali & Kachalas.	141	Prycet.	171
C. f. f. f.	101			Pymete.	43
Cuse.	118	Zaarorby tree.	111		
Cornatree.	119	Zimontree.	101	Quintetra.	190
Cypress.	17				
		Wolhouet.	169	Riff.	407
Dacts tree.	141	Wolhouet.	41	Sadatre.	111
Dede.	11	Wolhouet.	11		
		Wolhouet.	111	Terpentine tree.	61
Elatre.	80	Wolhouet.	111		
Elas.	401	Wolhouet.	111	Wolhouet.	110
		Wolhouet.	111	Wolhouet.	171
figa.	478	Wolhouet.	111	Wolhouet & Wande.	497

FINIS INDICIS ANGLICI



APPENDIX
HISTORIÆ GENERALIS
PLANTARVM: CONTINENS
IMAGINES QVARVMDAM RARIORVM,
& paucis cognitarum, quæ è longinquis
regionibus missæ fuerunt.



G. R. L E C T O R I.

QUAM iam hac Plantarum generalis historia excusa propemodum tota esset, hinc inde alie quedam rare & paucissimis nota, & vel earum imagines, missæ ad me fuerunt: quas nullo modo ante, quamvis nulli nec labori nec sumptui parens, nancisci poteram. Huius etiam boni quum te participem facere in hac ipsa editione, potius quam alij referuare vellem (etiãmsi hoc plerique mihi suaderent, ut isti mora longior non asserretur) eas quoque plantas, quàm fidelissimè & exactissimè fieri potuit expressas, in hanc Appendicem relegi: quum in sua quaque classe locum una cum ceteris habere non possent, utpote iam excusis. Quamobrem non est quòd dubites quin omnium plantarum, siue stirpium (id est, herbarum, arborum, & aliorum quæ illis nominibus comprehenduntur) veras iconas liber hic tibi sit exhibiturus: non solum quarum ab ullo scriptore facta mentio fuit, sed & quarum insuper notitiæ ad plurimos qui diuersas regiones incolunt, peruenire potuit: quæ antea incognita fuissent. Si qua tamen præter has omnes in manus meas venerint, ne iis quidem te priuabo, simulque sumptu te non grauabo. Neque enim eas in alia totius operis editione, sed seorsum in secunda Appendice tibi dare decreui.

DE CANELLA.



CANELLÆ arbor mali aureæ amplitudine est, nonnunquam maior, interdum minor, ramosa admodum, cuius teneriores rami recti sunt: folium Laurino simile, larius tamen, colore dilutius, & minus siccum, tribus nervis insignitum: flos candidus, odoris propemodum expers: fructus silvestris oleæ baccis par, virescens initio, deinde rufescens, & ubi plenam maturitatem consequutus est, niger atque splendescens (quo tempore colligi debet) osiculum intus continens silvestribus oliuis simile, simileque carne præditus, ex qua exstillat oleaginosus quidam liquor subvirescens, odore baccarum Lauri, sapore acri cum pauxillo amarore coniuncto. Præditus verò est hic fructus sessili parte paruo calyce, læuiore minùsque crispo quàm sint ilicis calyces.

Forma.

Tempus.

A A A a

CANELLA A Costa.

Locus.

Vitis.



Harum arborum magna est frequentia in his provinciis Malabar: sed præstantia longe sunt inferiores us quæ in Zeylon insula nascuntur. Scillarius Cerealis vitreis aut plumbeis organis extractus præfertur, qui è viridi cortice, præsertim radicem, minutim inciso educus est: etenim non modò corroborat & stomachi imbecillitatem, colicæ dolores ex frigida causa provenientes lenit: sed urinam cit, & oris anhelum commendat: utilis est præterea iecoris, splenis, cerebri & nervorum ægri tudinibus, atque in syncope cardiacisque affectibus convalescentis resistit & virulentorum animalium morsibus, menses movet, & vteri affectibus prodest, vomitiones cohibet, & appetentiam excitat: valet item ad spasmos, & convulsivos morbos: atque ut summarim dicam, æger incidit, digerit, calefacit & corroborat. Ficitur etiam liquor ex Canellæ floribus, sed longè minore quantitate, minúsque præstans superiore.

DE MACERE.

Locus.

Forma.



NASCITUR quibusdam Orientalibus insulis, præsertim verò in provincia Malabar, in insula S. Crucis regni Cochinchina, tum in ripis fluminis Mangate & apud Cranganor vasta quædam, & multis ramis prædita arbor Ulmo multò maior, cuius folia in longitudinem sex aut septem uncias longa sunt, duas lata, exteriore parte dilutius virentia, interiore saturata. Ea non alium florem, non alium fructum habere creditur præter semen quoddam denarii magnitudine, tenue, cordis effigie, colore flavo, sapore vero amygdalæ, aut nucleis persicorum malorum, renui & candida tunica tectum, quod vesica quadam ex tenuissimis duabus simul iunctis & transparentibus membranis constante includitur: ea autem vesica in medio folio nascitur aliis magnitudine non dissimili, sed cuspidè obtusiore, & circa pediculum angustiore, colore medio inter rubrū & fulvū, inæquali, & multis fibris à pediculo ad extremitatem recta linea ductis, crispo & rugoso, haud absimilis illi quæ in Ulmo nascitur, paulo tamen latior & planior. Succo lacteo prædita est hæc arbor uti Morus, radicibus habet Illici persimiles, magnas, crassas, in latum & profundum diffusas & cortice tectas crasso, aspero, scabro, duròque, cinereo foris colore, interiori albo & lacteo succo prægnante dum recens est, flavescente autem dum secca est, & admodum adstringente: licet succus ille cum adstrictione nonnihil mordicet, brevi tamen evanescit hæc veluti insensibilis mordicatio. Atenosa & humida loca amat, & reliquas ferè plantas circumnascens enecat. Nomen vulgare huius arboris apud Lusitanos est *Arbore de las camaras*, & *Arbore sancto*, hoc est, Arbor dysentericæ, & Arbor sancta: ab indigenis Christianis *Arbore de sancto Thome*, id est arbor D. Thomæ, & *Macuyre*: à Medicis Brachmenis *Macre*, apud quos summo in pretio est arboris cortex. Radicis corticem recèti trito, & cum oxygala seu lacte acido mixto, omnis generis dysenterias & alui profluvia mirabili successu curant omnes Medici, cum Brachmenes tum Canarini & Malabarici. Aliqui huius corticis sicci &

Nomina

Temperam.
& Vitis.

in puluerem redacti seminiam per noctem macerant in quatuor viciis feri lactis, omque bis in die propinant manè & vespèri, deinde medicamento sumpto orizam sine sale & butyro coctam, atque pullos gallinaceos coctos, maceratos & tritos in orizæ decoctione statim ægro exhibent: interdum si necessitas urgeat, opium admiscunt roborandi medicamenti causa: solent vero etiam Arabes cuiuscunque generis alui profluuiâ opio nuce moschata admixta curare. Huius item radi-

MACER A Costa.



cis vñs salutaris creditur ad vomitus coepescendos, & ventriculûm roborandû cum aqua Mentha & mastices puluete. Rogatus Brachmenes quidam medicus mihi familiaris, virq; probus, boni iudicij & magnæ existimationis apud omnes ciuitatis S. Crucis regni Cochîn incolas cum gentiles tum Lusitanos, quod illius fideli opeta sæpius vñ essent, vt bonâ fide exponeret istius corticis quem *Macre* vocant facultates, in hæc verba respondit. Sivos Lusitani hunc corticem probe nossetis, multo pluris illum faceretis quàm Piper: Sed quoniam istuc in Lusitania eius facultates ignoratis, ideo contemnitis. Pulvis quem in omni generis alui profluuiâ ex oxygala propinare soleo, ex hoc cortice de quo percontatis conflatus est. Eius magnam quantitatem tibi ostendere domi possem, quam in Bengala & Japan sum missurus. Sine verò inutile medicamentum, tu ipse qui illius effectus plerumque conspexisti, iudicare potes. Hunc corticem etiam ostendi rhizotomo cuidam *Joque* (genus quoddam hominum est cir-

cumforaneorum qui peregrinando pœnitentiam agere sese prostentur in illis regionibus) petique vt quid esset (tametsi probè nossem) significaret: respondit i'le, eum sequeretur, cuius arboris cortex esset se demonstraturum, ostenditque arborem quam autè scierant & addidit, Apud nostros homines appellatur *Cura sancta macré mistusa garul*, hoc est, Macre ab Angelis ostensum hominibus ad ipsorum salutem. Subiunxit insuper istius corticis apud ipsos vñm esse in compescendis vomitibus, aluique profluuiis sistendis, plûsq; pollere huius radices portiunculam, quàm magnam quantitatem corticis Myrobalanorum aut Arecæ, eamque præstantiorem esse Cori Malabarico de quo proximè dicemus. Referebat præterea Macre fructum omnis generis lumbricos in humano corpore natos necare & expellere, & calculum in renibus frangere: tum etiam eos qui singulis diebus manè eo vterentur, liberos fore à calculo & à coli doloribus, nec inebriari posse. Magna disceptatio est inter Neotericos, an Græci Macin & Arabes Macerem nouerint. Negari non potest quin multo plura medicamenta nunc nouerimus quàm veteres: inficiari etiam non possumus, pleraque illis cognita fuisse, de quibus dubitamus. Nam certissimum est, Græcis probè notum fuisse Macer de quo dubitamus, & quod plerique adhuc ignorant: nesciuisse autem Macim & nucem moschatam nobis adprimè nota, vt ex eorum scriptis constat. Galenus simplicium lib. septimo Macerem aduehi ait ex India, constare essentia pleraque frigida & terrestri, pauca verò frigida: conferre sua adstrictione aduersus dysenterias & cruentas excreationes. Dioscorides verò, Macer qui ex Barbaria aduehitur, est cortex flauescens, crassus, & gustu perquam adstringens, qui contra cruentas excreationes

Dioscor. lib. 1.
cap. 94.Plin. lib. 12.
cap. 8.

bibitur, dysenterias & alui fluxiones. Quæ facultates inueniuntur in cortice & semine arboris, non in Maci odorato nucis moschatæ operculo, quod siccumque est in fine secundi gradus, aut inirio tertij, tenuiusque partem & leuissimi amaroris, pauculæq; adstrictionis particeps itaque certum est vtrumque loqui de cortice nostræ arboris, non de Maci quod illis ignotum fuit. Admodum præterea medicus quidam Regis Cochîn, ne dubitarem quin hic cortex Auicennæ Macer esset: magnæque inscitæ esse de re tam aperta disceptare: huius etenim *Maore* facultates, eis, quas suo Maceri vereres tribuunt, persimiles, facile id demonstrare. Plinius etiam Macer, inquit, ex India aduehitur, cortex nobis radicis magnæ, nomine arboris suæ. Minimè vero nos mouere debet quod Dioscorides ex Barbaria Macerem aduehi asserat, quem Plinius & Galenus ex India defetri scribunt: idem enim illis accidisse potest in hoc medicamento: quod si Cinnamomo & Casia, vt (quoniam ex peregrinis & longinquis regionibus ad nos adueherentur) eorum naturales non fuerint probè cogniti. Ait tamen Ptolemæus: Quædam in Indo fluuii insula vel vrbs sita est, quæ Barbaria dicitur, ex qua facile comportabatur Macer: vel quod afferretur ex Arabia eo maris sinu qui a Barbaria insula Barbaricus appellatur. Cui suffragatur Strabo, Omnia, inquit, quæ in India proueniunt, ea scilicet parte, quæ ad Austrum vergit, similiter in Arabia nascuntur. Macis & Maceris differentia Auicennæ probè fuit cognita, quippe qui Macim odoratæ nucis inuolucrum cap. 456. & Macerem radicis corticem cap. 694. sub titulo Talisfar descripsit. Non igitur etiam fuit Serapioni, qui ex auctoritate Isâch, Macim esse nucis odoratæ operimentum dixit, diuersum ab eo cuius Dioscorides meminit, quippe qui scriptum reliquerit, Macerem esse ligni corticem siue corium. Liqueat itaque Macim & Macerem differere se qualitate, substantia, figura, planta & regione, quandoquidem Macer radicem arboris cortex in Malabar nascitur: Macis verò nucis Moschatæ operimentum, in Banda, longissimè inter se disitis. Tamen si Monachi qui in Meluen commentarios scripserunt, asserant non differre, suam negligentiam ista ratione prodentes. Vulgaris admodum huius corticis Maceris est vsus in omnibus nolosomii prouinciarum Chinæ, Iapan, Malacæ & Bengala, in dysenterias, alui profluuiis, & sanguinis reiectionibus, cuius causâ ex Malabar vsque petuntur.

DE NUCE MOSCATA.

Locus.



Nomen.

N insula Banda nascitur arbor quæ Nucem moschatam fert, colligi mittique ad externos solitam. Alunt & quasdam genetis eius arbores Moluccæ, & Zeilan insulæ, verum humiles, fructuque tam paucos & pusillo vt nihili sit. Bandenses Pala vocant, Macin verò à Macere diuersum, Buna Palla: Decanenses Iapatti, *Macin Iayfol*: Arabes *Seygar*, & *Jauzband*, id est, Nucem Bandensem, Macim vero *Thalisfar bubese*, vel *Berhaça*, id est Nucis corticem: Persæ arborem ipsam, *Drach*: Turcæ, *Agache*: oleum Macerinum Arabes *Geuzsami*, Turcæ *Geuziat*: Persæ, *Geuzi erugant*. Assurgit in Pyri vel Persicæ magnitudinem hæc arbor, rotundiore folio quam Pyri, in extremo acuro: fructu Pyris simili, aliquanto rotundiore: cortice toris cornoso, subdureo, quem pro nihilo ducunt Bandenses, tamen si quidam eo vescantur ob astringentis saporis incunditatem, condiri sale & aceto, Lusitani verò Nucem adhuc imaturam integram condunt saccharo. Nuce iam matura cortex ille carnosus ac externus in multas partes dehiscit, ac tum sub eo videtur Macis, colore perquam eleganti rubescens: acuti odoris, ac saporis, membrana reticulatam

textâ,

NUX MOSCATA,
A Costa.



textâ, interioris Nucis proximè calycem ambiens, & sic agglutinata, ut tubercula in solido Nucis putamine elata repræsentet. Macis color à siccata & purgata Nuce reuulsi, minus ruber, quam in ipsa prius arbore. Abditur Maci Nucis interioris putamen, quo rupto Nux detegitur, nunc amplior, nunc otrigola, quam recentem si dispartiantur, apparet intus candida medulla, languidioris acrimonix, quam Nucis reliquum corpus. Vertitur autem spatio temporis in Nucem ea medulla, & eadem cum Nuce fit. Grandiores India longe pluris facit quam nos, & charius emit. Ex hac Nuce paratur oleum Brachmanibus, & Indorum medicis valde laudatum, ad vteri & neruorum frigidos morbos, quemadmodum & ex Maci. Eligenda Nux moschata recens, grauis, pinguis, humore plena, minime pertusa. Emendat illa & tollit fectorem anhelitus: visum acuit: roborat ventriculum, & hepar: adiuuat cibi coctionem: flatus dissipat: aluum cohibet: vrinam prouocat: maculas faciei delet: vteri morbis prodest: splenis dueros tumores lenit, & emollit, itémque hepatis: impetigini medetur.

Vires.

CARYOPHYLLUS, A COSTÆ.



ROX Caryophyllos proferens magnitudine & forma Lauri est, sed superiore parte magis ramosa, minore & angustiore folio: copiosos fert flores, initio candidos, deinde virides, cum nunc in fructum efformati sunt, at ubi maturuerunt, rubros, qui deinde collecti & siccati nigrum colorem contrahunt: nascuntur ficus modo sparsim per ramos ad foliorum basim bini, terni aut quaterni simul iuncti, vel vnici interdum. Dicitur Arabibus, Persis & Turcis Caranful, ipsa arbor Siger, foliū Varaqaa. Paulus Aegineta acres illos constituit, calidos & siccos ordine tertio: alij duntaxat secundo. Ventriculum, iecur & cor roborant, concoctionem iuuant, vrinam cient, aluum cohibent, oculis instillati eorum aciem exacuunt, nubescq; extergunt: & quatuor drachmarum pondere ex lacte sumpti venerem extimulant.

Forma.

Nomina.

Vires.

Genera.

Forma.

PIPER aliud domesticum, cuius vsus est, aliud silvestre, quod ob amarorem negligitur. Domestici planta sarmentosa est, scanditque hederæ modo, arboribus quas nancisci potest sese circumuoluendo: nodis per intervalla prædita, ad quos folia nascuntur Betele foliis similia, parte interiore saturè virentia, exteriorè dilutiora, cuspidè mucronata, & gustu linguam vellicante. Horum foliorum alia aliis nigriora sunt: quæ dilu-

PIPER NIGRVM,

A Costa.

Temper.
& Vires.

tiora sunt fibrasque æqualiter nascentes habent, feminas censent (nam vtrumque sexum in foliis eiusdem plantæ constituunt) nigriora verò, inæqualibus fibris, mares. Ad singula internodia, vnde folia dependent, ex ipsa foliorum sede nascuntur vix, quarum maximè circiter quinquaginta grana obtinent, minores verò triginta. Radix pusilla est, & summa rellure fibras agit. Summa autem similitudo est plantarum quæ nigrum Piper proferunt & album: albi tamen folia tenuiora & molliora videntur: eius etiam fructus magis aromaticus, meliorisque saporis quàm nigræ. Huius verò foliorum nullus est vsus apud eius regionis incolas: sed nigri Piperis folia diutaxat expetuntur in coli doloribus, aliisque omnibus alui ægritudinibus è frigida causa provenientibus: ea oleo Cocci siue Nucis Indicæ prius inuncta, deinde calefacta supra aluum adhibentur magno effectû. Porro scriunt Piperis planta hoc modo: sarmentum eius secatamus iuxta prægrandem qualemcumque arborem aut palum defoditur, atque bubulcum sterens & cinetes cum aqua inspergantur: infra annum deinde fructifera est, quòque ve-

tustior est planta, eò feracior, quippe quæ ad ipsius arboris, cui maritata est, fastigium sese circumuoluendo scandere solet.

DE AVELLANA INDICA

Forma.

AMODVM procera est hæc arbor rectaque, tenuis, rotunda, & fungosa materia: folia habet longiora latiorque quàm Palma quæ Cocco seu Indicas Nuces fert, ex summa arbore nascentia, inter quæ prodeunt tenues virgæ parvis floribus onustæ, albis & ferè inodori, quæ deinde in fructum *Arca* nuncupatum efformantur, Nucis iuglandis magnitudine, minimè tamen rotundum, sed oblongum oui gallinacæ exigui modo, exteriorè cortice admodum virente, dum recens est, &, vbi maturuit, admodum flauo, vñ longè spectantibus veluti dactyli siue palmulæ maturæ appareant: materia molli & tomentosa constat hic cortex, continetque inclusum fructum Castanæ grandioris magnitudine, altera parte similiter sessilem, candidum, durum, rubris venis plenum, quem incolæ edunt. Eum adhuc virentem sub arc

AVELLANA INDICA,
A Casta.



sub arena condere solent, ut melior gratiorque
esui fiat: vulgo autem edunt cum foliis *Betele*:
confringunt etiam, folique exponunt & siccant,
(tum *Checeni* appellant) eoque plurimum utun-
tur tum in cibo, tum in lotionibus adstringen-
tibus: & cortice, seu involucrio dentes repur-
gant. Cum verò adeo fungosa huius arboris sit
materia, frangitur difficulter: ideoque virga
duorum digitorum crassitudine ex hac arbore
parata Crocodilum cum in aqua, tum in terra
facile retinere potest, si per eius fauces trans-
mittatur (ea etenim ratione illos venari solent)
ut saepe conspexi.

V. fus.

DE PALMA INDICA,
qua & Elephantis.



RAEALTA est hæc arbor, & recta,
nec admodum crassa, præsertim in
fastigio: nam ab infimo ad sum-
mum paulatim gracilescit, & colo-
re cinereo est truncum à radicibus ad fastigium
usque parvis quasi gradibus circumdant, qui

Forma.

ascensuris scalarum vicem præbeant: flos Castaneæ similis: fructus verò integer
capite humano maior, forma oblongiore, triangulari, & colore viridi admodum
diluto. Tamen si *Narel* huius arboris nucem vulgo appellant cum Persæ tum
Arabes, negant tamen Persæ legitimum esse nomen sed *Nargel* dicendum: ipsam
arborem *Durach* Persæ vocant, Arabes *Siger Indi*, Turci autem arborem *Agach*,
fructum *Cox Indi*: Brachmanes arborem nuncupant *Maro*, nucem *Navala*.

Nomina

Ex hac arbore ex insulis de Nalediua fabricantur naues, atque clavi, malis, velis,
rudentibus absque armamentis necessariis instruuntur: instruuntur etiam, mercibus
ex eadem arbore confectis onerantur, oleo, vino, aceto, saccharo nigro, fructibus
aqua, & ardente aqua vulgo vocata. Ex eadem arbore extruuntur ædes cum suis
tabularis satis firmæ: atque eiusdem ramis, (quos *Ola* dicunt) contegunt imbrici-
um vice, nam imbres commodè arcunt. Ex iisdem ramis tecta comparant ad
regendas hieme naues, quæ in portum deductæ, remulco deinde in terram tra-
hantur. Istarum porro Palmarum duo genera constituunt: Vnum enim *Suræ*

V. fus.

Genera.

cogendæ gratia deligunt, ea est veluti vinum mustum, quæ ignibus decocta in
licorem transit vino similem, incolis *Orraca* appellatum, alterum fructuum geren-
dorum causâ adferunt. Colligitur verò *Suræ* in hunc modum: Aliquem e ramis
cerebro viciniorum præcidunt, duorum pedum longitudinem relinquentes, ad
quem vascula ampla, oris tamen angustî, illis *Calons* nuncupata, colligant: per
hunc ramum præcisum exstillat arbor *Suram* iam memoratam, qua organis distil-
latoriis imposita, ignis vi aquam eliciunt ardentem, purior, illis *Fula* dicta, hoc
est, flos, facilius igne incenditur quàm nostra aqua ardens, siue vinum adustum:
altera *Orraca* nuncupata non item: sed huic purioris aliquantulum admiscere
solent. *E Suræ* antequam ignibus decoquatur, soli exposita, fit acetum satis inter-
dum acre, tamen si neque *Mentha*, neque cortex arboris *Myrobalani* iniiciantur,
quæ medicamenta plerumque admisceri solent ut acetum acius reddant. Exem-
pro primo vase *Suræ*, exstillat alia, quæ ignis vel solis caloris in spissata, Saccha-

PALMA Elephantis,
A Coste.

Locus.

Vires.



CVCIOPHERA Martb.

Temper.



Vfus.

est, frequentiorem huius nucis vsum, lumbricos generare: cui morbo totius provincie Malabar incolæ admodum obnoxij sunt. Externo illo primoque cortice siue operimento crasso, foris læui, intus verò romentofo dum rescissus est, sunt rudentes & alij funes nautici, vti in Hispanijs ex sparro. Tomentum illud Malabares *Cayro* vocant, magni apud eos vsum, nam quoniam aqua marina non corrumpitur,

rum sit incolis *Jagra*, appellatum: præstantior censetur, quæ in Nalediua colligitur, quam quæ in Malabar. Fructus recens sub primo illo crasso vitidique operimento, alio cortice nigro præditus est, medullam tegente, qui recens nequam nigrum colorem contrahat, tener & candicans est, editurque cum sale, vel sine sale, vel cum aceto & pipere interdum, atque gustus est Cinaræ: cum verò iam nonnihil induratus cœpit, Cardui caput sapit. Medulla cortici adhærens tenera & dulcis est, continetque multam aquam limpidam, suauem, nec fastidium aut nauseam sua dulcedine parientem quæ vulgo in solis ardoribus bibitur. Frequens est huius aquæ sub dio refrigeratæ, atque etiam lagræ vltus aduersus iecoris renumque nimios calores, purulentæque marerie per virgam excretionem: refrigeratur verò hæc aqua in sua nuce viridi *Lafia* appellata diu conseruatur, nam toto anno inteniuntur istæ nuces virides, quarum nonnullæ interdum tres aut quatuor libras siue pintas aquæ continent. Postquam iam indurata est hæc nux, duriorémque medullam contraxit, remanet in cõcauitate limpida quidem aqua, ar non adeo dulcis vt prior: nucem tum vocant Malabares *Elem*. In annotinis nucibus mutatur hæc aqua in rotundam quidam substantiam mali instar, candidam, spongiosâ & leuem, sapore dulci. Medulla nucis recens tenera alba & dulcis, sola editur ab incolis aut cum *Jagre*, hoc est, Saccharo è *Sura* confecto, vel cum *Auela*, pulmento ex Oriza in aqua cocta, deinde trita & probe sole exsiccata: editur item cum piscis quodam genere siccatum ex insulis de Nalediua aduecto, simili ferè bubulis carnibus fumo induratis, *Comalamasa* appellat, bonumque condimentum est ad bibendi appetentiam prouocandam. Ea verò mixtura non modò incolis in vfu est, sed ab ipsis etiam Lusitanis expetitur. Ex eadem medulla lac conficitur Amygdalino simile, ad edulia paratâ vile. Solibus exsiccata hæc medulla vocatur *Copa*, suavis est, reconditur, illisque perinde in vfu est, atque nostris Europæis castanæ siccæ.

Vulgo creditur, & experientia comprobatur

pitur,

pitum, Hispani ex omnibus generis naues: itaque illis populis usum præbet lanæ, xyli, stuparum, huius, & sparti. E secundo nigroque & duro cortice, qui à nostris *Cocco* dicitur, ab incolis verò *Xareta*, sunt scutella: & alia vasa potoria in tenuiorum usum. Fiunt etiam ex eo vstulato carbones auri fabris utiles, qui in iis prouinciis petri & industrii, nec admodum sumptuosi reperiuntur. Solent enim suum opificium proclamantes compita circuire, secum deferentes vitæolum, malleolum, & duo cæla, cannæq; tubulum palmari longitudine manu tenentes quo focum incendunt. Ij in ardes admixti, vasa ex auro & argento conficiunt, pro eorū qui ipsos euocant arbitrio. Fiunt ex huius Palmæ foliis petali maiores & minores ad Solis ardores & imbres arcendos idonei: texuntur etiam floreæ & alia pleræque. *Coccus* porro de *Nalediua* cognominatus adeo commendatur ab ipsis incolis, & à Malabarënsibus, non modo a plebe, sed à Regibus & Principibus viris, ut in omni fere morborum genere ad eum confugiant tanquam ad sacram anchoriam. Fiunt in eam gratiam ex illo pocula quæ auro vel argento excipiuntur, & in nauum tritremiumq; figuram efformantur, ad aquam bibendam, in quam ex carenula medullæ ipsius *Cocci* fragmentum pendere sinunt: sibi quoque certo persuadent, illis, qui aquam ex similibus poculis hauriunt, nullum venenum nocere posse, futurorūque immunes a multis morbis, in quos memini multos incidere, qui ex iis poculis bibere soliti erant. Ex licet omnem diligentiam adhibuerim, nunquam tamen obseruare potui, similia pocula aliquem ex morbis curare, ad quos utilia esse creduntur: potius igitur arbitror tantam laudem obrinuisse à vulgi opinione. Nonnulli ex huiusmodi vasculis bibere soliti, mihi affirmarunt sese experientia didicisse iecur incedi, renes noxam contrahere, & calculum generari: nihilominus tamen magnū est eorum pretium, longeq; pluri æstimantur iis locis ubi inueniuntur, quàm aliis procul inde distitis: nam interdum eiusmodi Nuces nudæ, neque auro aut argento exornatæ quinquaginta aut amplius aureis nummis æstimantur. Nigrior autem, nitidior, longior, maiorque est hic *Coccus* quàm aliæ nuces *Coca* communis.

TAMARINDUS, A COSTÆ.



SUNT Tamarindi fructus elegantis & aspectu pulchre arboris, Castaneæ aut Ceratiorum arboris magnitudine, multis ramis prædita, & totius latam vinbram præbentibus, materie solida admodum: folia filicis femine (quam Hispani *Helebo*, Cantabri *Aristora* appellant) foliis persimilia, dilute virentia, valde elegantiæ, gustu acido, gratoque, è quibus condimentum fit (*Salsam* vocant) perinde atque è petroselino: flores candidi, Aureæ mali floribus admodum similes forma exteriori, & odore: attamen octonis foliis constant, quorum quatuor interiora alba sunt & crassiora velut Mali aureæ florum folia, quatuor verò exteriora tenuiora, & bina ex his eleganti nervo radiata: è medio flore quatuor enasuntur stamina corniculorū modo inflexa, candida & tenuia. Fructus admodum similis est Ceratis foris virens intus, deinde per siccitatem cinereus, continens osi-
cula

cula rotunda Calsiz solutiuz modo aut paruis Lupinis similia, dura admodum & colore nitido terreo, haud quaquam flauo, quemadmodum nonnulla referuntur non vitur, sed sola pulpa quæ nonnihil lenta & viscida est, iucunda tamen ac ditare grata, tamen nonnulli indigenæ asserant osicula asfata & in pollinem redacta ex oxygala in alui profluuiis vtiliter exhiberi: facile auellitur hic fructus, & etiam sponte decidit. Folia sub noctem sese contrahunt, suumque fructum amplecti solent, qui si desit, sua virgulta & tamos complectuntur: summa vero arbor sese explicare incipiunt grato spectaculo: hæc trita partibus erysipellate imponunt, atque etiam circa phlegmonas ad arcendum qui influit humor eiusdem cum sale Ormuziano phlegmonas resoluunt, & cum cineribus ex Cam pituitosos & melancholicos tumores. Vocatur hic fructus in *Arabia* *Chincharo*, osicula vetò *Chincharo*, in Malabar *Puli*, & in Guzarate *Ambili*. Arabes, *Puli* Turci *Tamarindi* vocant, osicula *Abei*, arborem *Siger Tamarindi*. Præfatus in locis montanis iisque Septentrioni obuersis nascuntur: vsu vero compertum est, huius arboris umbram sub ea dormientibus non minus noxiam esse, quam arboris iuglandis.

DE RADICE CHINÆ.

Nomina

Locus.

Forma.



Vocatur hoc excellens medicamentum in Chinaram regione *Lampatan*, in Decem *Lampao*, in Canarin *Bonti*, ab Arabibus, *Pendu* & *Tu* *Chophchina*. Nascitur abundantissimè in Chinaram regionibus, uenitur tamen etiam in Malabar, Cochin, Cranganor, Coulan, *Ti* *nor*, & aliis locis. Planta est multis tenuibus spinosisq; sarmentis prædita, foliis asperis non ab similibus, quorum maxima minimum manus digitum crassitie non superant, foliis plantaginis latifolia magnitudine: radices pugnum nonnumquam exquant, interdum minores sunt, solidæ, graues, candidæ, interdum etiam

RADIX CHINÆ,

A Costa.

Vires.

Temper.



scætes, & multæ sæpenumero simul occurrunt. Plurimus est huius radices vsus in Orientalis Indiæ prouinciis ad varios morbos, quin adeò innoxia censetur, ut eam sumant tametsi nullam victus rationem obseruent, nec liberè carnibus & piscibus vescantur, nec ita commodi adferre credatur. Vulgatis tamen in Chinaram Indiæ prouinciis obsoletum, tamendi huius radices decocti consuetudo est, ut radices vncia vna, additis radicibus *Api* duabus drachmis decoquatur lento igne & sine fumo, in decem & sex aquæ libris ad sex librarum consumptionem reliquos decem in fictili vitro adseruant, sumuntq; singulis diebus recens decoctum, quoniam facile corrumpitur, nec ultra diem obseruari potest. Eius verò repidi mane sumit æger plenum haustum, duabusq; horis in lecto remanet, postea surgit, duabus autem horis ante cœnam totidem haurit, interdum eodem frigido bibit. Plerique tamen etiam dum sua negotia exercent & nauigant singulis diebus manè & vespere duas eius radices in puluerem redactæ drachmas ex vino, aut ipsius decocto

CROCUS INDICUS,
A Costa.



decocto felici successu bibere solent. Organis etiam ex hac radice recenti, aqua elicitur, delicatioribus admodum familiaris: attamen & ab aliis magna quantitas absumitur, quoniam illi plurimum fidunt nō modo in morbis à D. Orta enumeratis, sed etiam in hemiplegia, in hernia humoralibus, & vērosis, in colli, vesicæ & penis callis, eorumque vlceribus, venerem etiam admodum excitare creditur: decoctum tamē ipsa stillatitia aqua præstans est. Optimè conseruatur radix, si Pipete contracto inuoluatur.

DE CROCO INDICO.

MAIORA laioraq; habet Crocum *Forma.*
Indicum solia quam Orchis Serapias dicta, colore foliorum Scille, dilutiora tamen & tenuiora, caule habet e totius simul implicatis, & sese mutuo amplexantibus constantem: radicem foris Zingiberi similem, intus croceam. Præter nomina ab Orta enume- ara, apud Arabes etiam *Caucasus* *Nomina* dicitur, apud Turcos *Saroth.*

DE MUSA, SEV FICV INDICA, A Costa.



DECEM & octo aut viginti Palmorum magnitudine hæc pulchra & *Forma.*
elegans arbor, cuius truncus ex multorum corticū sibi mutuo incumbentium coniunctione constat, & humani cruris crassitiem adipiscitur, radice rotunda & crassa, Elephantorū grato pabulo: foliis nouem palmorum longitudine, duorum cum semisse latitudine, neruo satis crasso per longitudinem excurrente, & transversis fibris in latera spatiss, parte superiore saturis, inferiore dilutioribus: ex huius arboris fastigio nascitur veluti thyrsus quidam florum simul congestorum in modum pinei strobili coloris rufi: deinde vnicū ramum fert humani brachij crassitie in multos nodos diuisum, è quorum singulis decem aut quatuor decim dependent Ficus, ita vt nonnunquam ramus centenis aut ducentis ficibus onustus conspiciatur. Hos in diuersas species distinguunt Lusitani provinciam incolentes: nam *Cerninus* appellant qui admodum flauent, læues, longiusculi, gratique saporis sunt, & odoratiores: *Chincapanos* vero qui virescunt nonnihil, longioresque sunt, isque etiam grati saporis. Laudantur præterea qui in *Cofula* nascuntur, *Aethiopia* dicti. Legitimum autem nomen apud Arabes *Logan* & Persas

Nomina

& Persas (vt è præstante medico Persa in Ormuz nato intellexi) est *Mous*, item autem *Musa* aut *Amusa*: arboris verò *Daracht Mous*. Reliqua nomina ex Galieno pendenda. Semel dumtaxat feritur hæc arbor, nam ex eius radice aliæ enascuntur singulæ verò vnicum (quemadmodum retuli) fructuum ramum gestant, qui, dum maturi sunt, rescinditur, plantamque ipsam sponte exsiccati sinunt, tanquam in posterum inutilem, aut amputant, in domesticorum Elephantorum pabulum. Nonnulli interiora tenerioraque, antequam explicentur, folia, florumque ipsum sum Piperem, Zingibere recenti, allio, sale & aceto condiunt, & caprarum modo edunt. Folia verò quoniam amplissima, mollia frigidaque sunt, subternere ad accumbendum in æstu solent: & ambustis nonnunquam imponunt. Ruellius huius fructus meminit ex auctoritate Theophrasti & Strabonis.

Vfus.

DE ANANAS.

Locus.

Forma.

PEREGRINVS est hic fructus, & ex prouincia S. Crucis in Brasilia primum in Indiam Occidentalem, deinde etiam in Orientalem Indiam delatus, in quibus nunc vberimè provenit. Citrij verò minoris magnitudine est, admodum flauus & odoratus cum probe maturus est, adeò vt prætereuntes ex odore dignoscere queant ædes in quibus hic succulentus & gratissimæ saporis, procul intuentibus cinara videtur, sed pungentibus aculeis caret. Singulæ stirpes a duobus annis magnitudinem æquant, vnicumque malum gestant in medio quasi caule, & circa eum multas alias proles, quarum nonnullæ etiam suo fructu præditæ sunt. Qui itaque fructus maturos colligunt, proles ilicò tertæ manuum solent: è quibus singulæ deinde stirpes proveniunt suo malo onustæ, vti mater, quæ in 12 annuum spatium colliguntur. Eius radix carduo eduli perquam similis est, sed & folia non sunt disparia, tamen si ad *Ananas* siluestris totum magis accedant. Vulgo *Ananas* vocant: Canariini verò *Ananasa*. Cùm primum in Indiam illatus est hic fructus, singuli decem ducant, aut paulò amplius æstimati sunt: nunc vero propter abundantiam (tamen si neque sapore neque odore primis cedant) vix duobus regalibus Castellanis veneunt. Hactenus in medicum usum non est receptus, sed solummodo ob saporis gratiam commendatur. Calidus & humidus est, editurque maceratus in vino vt Persicum malocotoneum, & facilis est concoctionis, nimius tamen eius vsus inflammationes parit quemadmodum Duriones Malacenses.

ANANAS A Costa.

Nomina

Vfus



Si medius secetur, & partes denuo coniungantur, vtiuntur vt cucumeres: perfossus verò cultello, si in vulnere vnus diei aut noctis spatio cultellus relinquatur, inuenietur tota ea pars quæ in vulnere hæsit absumpta.

DE CARCA

DE CARCAPULI.

CARCAPULI Malabaribus, *Garcapuli* Canarinis, vultu magnitudinis arbor est, fructum ferens malo aureo cui cortex exemptus sit, magnitudine & forma similem, ex grumis omnino constantem, (sed non separabilibus ab invicem ut in malo aureo) tenui, levisque & splendenti cortice tectum, non admodum sicco, colore pallido, ac ubi maturuit

CARCAPULI A Costa.



aureo: gustu admodum austero, sed quadam adstrictione grato. Eo utuntur in cibis, magnaque apud incolas eius est laus in curationibus: sed inter omnes quæ experientia comprobatae sunt primas obtinet profluuij alui cuiusque generis constrictio, in iis praesertim qui nimio veneris usu hoc malum contraxerunt: editur verò aut ipse fructus maturus, aut eius succus cum oxygala sumitur, aut illius exsiccati pulvis: cum oxygala autem mixtus & cocta oriza, mirifice appetitum deiectum reuocat. Utiles etiam est eius succus, & exsiccati pulvis in oculorum caliginibus & suffusionibus. Familiaris est eius fructus pulvis obstetricibus, cum enim puerperis exhibere solent ad pellendas secundas, & ad purgationes, atque lactis vberitatem praestandam, tum etiam ad facilitandum partum magna, ut aiunt, efficacia. Succus eius cum aliis plantis mixtus vngui maioris digiti pedis imponitur eodem larete quo quis aut caliginem, aut suffusionis initium in oculo habet, vtilemque esse perhibent. Transfertur hic fructus siccus ex Malabar in alias prouincias.

DE BETRE.

REQVIENTISSIMO in usu est apud Indos Betre: ab instituto igitur alienum non erit, si hoc loco eius mentionem fecero. Betre masticatorum, amarum inuenitur: eam ob causam ei Arecam admiscunt, & calcis momentum, sicque praeparatum suavisimi esse sapotis affirmant. Mihi sanè cum primum degustavi, propter amarorem ita displicuit, ut ab eo tempore semper abhorruerim, nec vngquam degustare potuerim. Sunt qui addant Lycium: potentiores verò & opulentiores Caphutam de Burneo, nonnulli lignum aloës & Moscum aut Ambarum. Sic autem paratum adeò suavis est sapotis, orisque halitum adeò commendat sua fragrantia, ut perpetuo fetè illud mastificent opulentiores, tum etiam alij pro facultatum ratione, tametsi non desint, qui Arecam cum Cardamomo aut Garyophyllis mastificent. In solitudinibus autem & remotioribus à mati locis caro venditur. Ideo settur Nizamoxa singulis annis in id impendere trigiesies mille aureos Lusitanicos. Hæc sunt eorum tragemata, hoc abeuntem donant: atque Rex ipse interdum propria manu potentioribus elargitur, aliis verò per manus famuli sui quem *Xarabdar*, aut *Tambuldar* vocant. Sed quia Betre venas habet aut costas secundum folij longitudinem excutientes, vngue pollicis (quem ea de causa in acutum praesecant, non, veluti nos,

BBBb

in rotundum) eas eximunt, deinde admisto calcis momento (quæ ob exiguum quantirarem & materiam vnde confata est, fit enim ex ostreorum relictis concretis, nullum nocumentum adferre poreft) & Areca contufa aut contrita, folium Betre complicant, atque in os iniectum masticant, priorem illum succum expuentes (quod tamen nonnulli non faciunt) qui cruentus videtur, deinde alia

BETRE, *Garcia ab horto.*

F. fus.



atque alia folia simili modo præparata ſuſſe-
quenter ſumunt. Solent aliquem dimiſum, aut
ipſi ab adſtantibus diſcedentes his foliis præ-
paratis plena buſſula ſericea abeuntem hono-
rare. Nemo diſcedere ſuſtinet, donec Betre ſe
donatus, id enim dimiſſionis eſt indicium.
Ceterum opulentioreſ aliquos adituri, hoc
Betre maſticare pro more habent, vt odore ei
commendent. Siquidem apud eos ſummæ in-
ciuiliratis eſt odoratum non habere anhelitum:
ita vt ſi tenuioris fortunæ aliquem cum po-
teriori fabulari neceſſe ſit, manu ori oppoſita
id faciet, ne reter aliquis odor alterius naſes
feriat. Sic etiam muliereſ viris congreſſuræ,
Betre maſticant antequam colloquatur, enſi-
manq; ad laſciuiam ſummum eſſe illeſctam o-
tum. Omneſ huius regioneſ incolæ id, in po-
cibo, mandere ſolent, alioqui cibos naſe
quodammodo mouere aiunt: & maſticare aſ-
ſueris, oriſ halitum retrum olere, ſi quando ab-
ſtineant. Solent ab eiſ uſu per aliquot dieſ ab-
ſtinere, quib; obierunt ſanguine iuncti, & in
quibuſdam ieiniis. Ab huius etiam eſu abſti-
nent, & humi ſe abiciunt Arabes & Moab,

hoc eſt, Ali ſectatores dicti, decem diebus quibus ieiuant. Fabulantur autem iſti
Ali ſectatores, ſiti ſe morituros concluſos in quadam arce, multâſque præterea
fabulas addunt. Naſcitur Betre in omnibus Indiæ regionibus maritimis Luſitanis
cognitiſ: nam in continenti non reperitur, niſi è maritimis allarum. Verum qu-
dem eſt in Dultabado, vrbe opulenta in Decan, & Baſnagua inueniri, ſed minor
certè quantitate, quàm vt ad Perſas & Arabes deferatur. Supra Calaiate, quod
oſtoginta leucis ab Ormuz diſtat, inuenire haud erit facile. Nam neque regionem
frigida amat, vt eſt China, neque ſolibus nimium aduſtam, vt Moſambique &
Sofala. In Malauar vocatur Betre, in Decan, Guzarate, & Canam Pam, in Maluo

Locus.

Nomina

Siri. Hallucinantur qui Betre folium Indum eſſe purant: in quo errore etiam ver-
ſatus ſum, cum primùm in Indiam appuli. Sed ſententiam mutare coacti ſum
poſtea, à Nizamoxa, quem Nizamaluquo vocant, euocatus: cui medicamentum
roborando ſtomacho iuſſus componere, ea ſimplicia quæ medicamentum ingre-
derentur enumerari, addens, id folium quod maſticaret, Folium Indum eſſe. Ad
quam vocem, riſiſ ille (ſiquidem hoc vocabulum intelligebat) & Auicennam
mihi oſtendit Arabica lingua conſcriptum, qui diuerſis capitibus de folio &
Betre agebat. Ducèteſimo enim quinquageſimo nono capite, lib. 1. de Folio Indo,
Cadeſi Indi illi nuncupato ſcribit, & ſeptingenteſimo ſeptimo capite lib. 1. de Be-
tre, quod ille *Tembul* vocat corrupto, vt mihi videtur, aliquantulum vocabulo,
quod ab omnibus *Tambul*, non *Tembul* dicatur. Huc adde, quod ſi quem Arabem
Æthiopem perconteris, qui vocetur Betre, ſtatim *Tambul* dicet. Auicenna lib.

cap. 709. giugum confirmare est auctor, iniquum etiam usum semper ab hoc masticatur, & postea possit subiciat, stomachum non nocere, ob quam locustatem ab Indis expectatur. Quod autem fructum illi faciliate tribuit in primo, & exicca em in secundo, potius (im exen) sui vitiosum sit, aut quod rudius Arabes arbitrantur) Auicennæ, in temperamento delectatissimo possum esse, sit enim plerumque ut vulgus erret in temperamenti dignitate, utpotest cui Piper, Cardamomum, Cepa sint frigida. Calidum autem & siccum est Bette ad hunc secundum excessum, ipse expertus sum, & sic ex sapore & odore cernitur. Est autem Bette folium simile ferè Mali medicæ folio, ob longius tamen & per se tenacius, citius venas, siue costas, ut diximus, per longius audirentur currentes. Abest autem primum censetur bene maturum, color valde scissus, si nonnulla noster præferant quod immaturum est, quippe quod minore loco edat in ore duri masticatur. Corripitur, si recessu à planta collectum durius manibus tractetur. Fert Bette in Maluccæ fructum quandam contortum, Laccis rauda similes, quem istic edunt, quod bene illis sapiat. Fuit id semen delatum Maluccam, atque degustatum optimi saporis inuentum est. Seritur autem Vitis modo, addunturque stipites & pedamenta per quæ repens se sustineat nobilitati federæ modo. Quidam maioris quæstus gratia Piperis aut Arceæ arboribus id maritant, atque ea pulcherrima umbracula coniciunt. Mulam verò curant, & aliduum negotium in desiderat.

DE NARDO INDICA.

Item affirmare possum, multo plura aromata, maioriq; quantitate, & minus adulterata ad nos adferri, vihorique emi, quam antiquitus fiebat: quod nunc Lusitanorum nauigationibus Indix nobis aperta sunt, ipsiq; regiones, quæ aromata gignunt, longe cultiores nunc sunt, quam Veterum tempore fuerunt. In eorum numero Nardum repono quæ legitima & sine mangonio ad nos importatur, licet interdum aut maris humore sibi citio situm contrahat, aut senio suaueolentiam illam amittit, qua initio prædita erat. Vocatur autem Nardus incolis (nam Græcum & Latinum nomen notum est) *Calizara*. Auicennæ lib. 2. cap. 646. & omnibus huius tempestatis Arabibus *Cembul*, quod est Spica, & *Cembul indi*, id est, Spica Indica: eadem ratione, quam nos Spicam Celticam vocamus, illi *Cembul rumum* appellant. Quod autem corruptè Matthæus Syluaticus cap. 640. *Simbel* & *Sumbel* protulerit, mirum non est, cum is linguam Arabicam ignorat: nisi malimus tempore paulatim corrupta fuisse vocabula. Ceterum nascitur Nardus in Mandou & Chitor prouinciis, Regni Delli, Bengala, & Decan vicinis, iuxta flu. Gangem, quem incolæ *Ganga* appellant, & sacrosanctum existimant, ita ut morituri regni Bengala incolæ hoc flumine mergi se iubeant, sed pedibus duntaxat. Sunt in eo flumine certa idolorum delubra, ad quorum cultum cateruatim confluunt Mercatores de Guzarate & regno Decam, magna que donaria in hæc idola conferunt, inde redeuntes sanctificari, ut ipsi sibi persuadent, imò potius à cacodæmone obfessi. Porro non sunt diuersa Nardi genera: sed vnicum duntaxat mihi notum genus, id scilicet quod ex iam memoratis locis adferri diximus. Prouenit quidem in monte quodam, qui altera parte Orientem spectat, altera Occidentem, ad quem scilicet Occidentem sita est Syria multis regionibus ab India discreta. Sed tamen multis aliis eius regionis locis sata prouenit, non facile enim sponre nascitur. Neque una præstantior est altera: Spicæ uve habet alia altera multo longiorem. Cerrè radix est, spargens supra solum breuem virgulam seu caulem circiter tres palmos longam, cum longissimus, atque alias insuper virgulas multò breuiores: in summa

NARDVS INDICA,

Garcia ab horto.

Lib. C. 11.

Lib. C. 6.

radice spicæ producuntur, item alix *per singulas*. Tali enim modo venditur in Cambugete, Afurate & Gogua, aliisque portibus marinis, vnde mercatores Arabes & Persæ petunt, potissimâ tamen partem ab indigenis absterunt. Inuenitur interdum sordida & puluere lenta, villis ipsius plantæ in pollinem redactis. Emitur tamē ab iis quos dixi mercatoribus, & eo puluere manus eluere intelligo. Hac vicia Nardo quæ iuxta Gâgem oritur, quamq; occidentē exportât, vtuntur medici cū Indici, Turci, Persæ & Arabes. Nā quod ex inre pretio quo antiquitus, teste Plin. emebatur, nunc voluit, nostram Nardū non esse legitimam. Objectioni me satis respōdisse arbitror, cū diuindias nunc magis apertas & cognitās esse, tēpore Pl. fuerint, & ipsa aromata maiori cura ad nos adferri. Ceterū fabulosū omnino iurco quod And. La. suis in Diosc. comētariis scribit, Nardi vsū apud Indos esse periculosū, quod ex ea fiat veneni quoddā gen^o mortiferū, quod nō modò haustū, sed etiā cuti in sudorē aspersum, hominē illico iugulet, idq; toxicum

Pisum vocari. Nam cū multis in India annis Medicinā exercuerim, & non modò versatus sim cū omnis generis medicis Asiaticis, sed etiā Regibus & Principibus familiaris fuerim, nunquā tamē hoc Pisū videre mihi cōtiguit, aut eius nomen audire. Id genus quod Sepulveda *Sariach* & *Sariach* appellat, id esse puto, quod et Satiguā adiungitur, celeberrimo regni Bégala portu & Emporio ad fluuij Ganges oras.

ACONITVM TARDALIANCHES PRIMVM.



L. 111.

PRÆCESSIT inter Aconitorum genera Pardaliachis figura, quæ Matth. exhibuit, verissima, & certissima, quamvis falsâ ac comestitiâ esse quidâ existimarint, sed munla, radice tantū picta cū foliis. Ego integrâ nactus Lepasiario Treuorensi, in cuius horto plantæ aliquot multis iam annis viuūt, & vident, controuersiam pertinaciorem de hoc Aconito, quod his oculis conspexi, iactatam inter Gesnerum ac Matthiolum viros præstantissimos, clarissimos, doctissimos, vi dirimâ, Matthiolo hanc suam, quæ labare videbatur, asserui, & plurâ ostendi, minime decuit tam, adiectis paucis, quæ totam historiam reddant locupletiorē, ac illustriorem. Nascitur copiosè in Allobrogibus, haud procul à primario cenobio Carthusianorum, in confragoso & arduo monte, quem ideo Scalas nominant, vulgo, *les Echeles*, ob angustos tramites in saxo velut gradibus, ex his per quos

per quos in cacuminis fastigium conscenditur. Primo veris elementis arectis. *Tempus.* caulis exit, antequam folia prodeant, ut in petasite officinarum, & Bochno, palati altus, opertus candicante lanugine. Foliola quatuor, bina ex aduerso se sibi opposita, extant in caule, quorum alterum altero paulò demissius est. Flos densus, ac velut congestus in globum, gracilibus pecioli insidet, caulis verticem ambiens, ex sublueto pallefcens, arectis in cuiusque flosculi medio complusculus apicibus, subluetis. Diuanescente ac dilapso flore, emergunt folia, hirsuta, fere quatuor, huc illuc diducta, tenui pediculo subnixa, venosa, supernè virentia, infernè abdicantia, & tomentosa, punctis quamplurimis notata, rotunda fere margine. Subest radix, nodis articulata siue genicularum multis compacta, similis caudæ Scorpionis, prorsus ea specie quam Matthiolus delineauit, ac expressit. Quo sapore lingua feriat, taceo, non ausus illius mortiferæ venenatæq; herbæ gustum explorare.

DE GUAYAVAS.



ARBOR cuius fructus est Guayauas, apud Indos & Hispanos celebratissimus est, mediocris magnitudinis, ramis spatiosis, folio laurino, flore candido aureæ mali floribus simili, aliquanto tamen maiore, odorato: facillè nascitur quocunque loco seratur, adeoque luxuriat & ferpit, ut in terræ vitiorum nomine habeatur, nam plurimorum agrorum gramen quod depascitur essent greges corrumpit nimio uti rubi implexu: fructus nostris malis similis est, eorum magnitudine quæ ab Hispanis *Camuesas* vocantur, viridis initio, & per maturitatem aureus, pulpa interiore alba, interdum etiam roseadiuisus quatuor concauerationes aut vascula habere conspiciuntur, in quibus semina reconduntur, mespilorum seminibus similia, durissima, colore fulco, omnino ossea, medulla & saporis expertia. Fructus edi solet prius dempto cortice, palato gratus est, sanus & facilis concoctionis: viridis in alui profluuiis utilis est, nam valde adstringit: præmaturus aluum soluit: æt medius, hoc est neque immaturus neque præmaturus, si asseretur, valentibus & ægris confert, nam ea ratione paratus, sanior est graviorisque saporis: præstantior autem is est quem domesticæ & cultæ arbores ferunt. Foliorum decocto Indi utiliter tumentia crura lauant, eodè lienis obstructions tolluntur. Fructus frigidus esse videtur, propterea febricitantibus assatus datur. Vulgaris est per vniuersam Indiam.

BALSAMVM TOLVTANVM.



ADVENTVREX Continetis quadam prouincia inter Carthaginem *Locus.* & Nomen Dei sita, Tolu ab Indis appellata, Balsami quidam liquor, maximarum virium, & præstantissimum omnium quæ hætenus ex his regionibus attulerunt, medicamentum. Arbores e quibus colligitur pumilis Pinis sunt similes, multos ramos quaquaersum spargentes, foliaque Ceratæ similia obtinentes perpetuò virentia: præferuntur domesticæ & in cultis natæ. Colligunt verò hunc liquorem Indi vulnerato & inciso arborum cortice qui tenuis & tenellus est, suppositisque, & arbori adnexis veluti quibusdam cochlearibus è cera nigra in illis regionibus nata confectis, quæ emanantem è vulne ribus liquorem excipiant, quem deinde in alia vascula ad eam rem parata effundunt: id verò feruentissimo sole fieri necesse est, ut liquor facilius emanet, nam noctus ob frigiditatem nihil effluit: erumpit etiam interdum ex ipsis arboris nodis & aliis non nihil liquoris, qui cum exiguus sit, & in solem decidat, perit. Porro apes quæ ceram istam conficiunt, nigra sunt, eamque in terræ hiatus & cauernis subterraneis elaborant. Plurimam autem huiusmodi ceram in Hispaniam deferri vidi,

qua ad paranda funalia utebantur : sed ob tetrum quem eius fumus spirabat odorem vetitus fuit eius vsus , postea tamen in medicamenta receptus. Etenim utilia ex hac fiunt ceræa ad mitigandos dolores è quavis causa frigida præcurrentes : nam rumores resoluit , & plurima alia commoda præstat. Ceterum Balsamum hic liquor apud Indos maxime celebris est , ob insignes eius facultates , a quibus edocti deinde Hispani , cum miros eius effectus animaduertentes : pro re maximi pretij inde in Hispaniam detulerunt , magno illum istic redimentes , nec absere , quandoquidem mihi præstantius esse maioribusque facultatibus pollere videatur eo qui è noua Hispania aduehitur. Colore rubro ad aureum tendente est , medietate inter liquidum & densum consistentiæ , glutinosus admodum , & ubicunque reponatur firmiter in hærens , sapore dulci & grato , nec si sumatur nauseam mouente quemadmodum reliqua Balsama , odore excellentissimo , & limonum fragrantiam quodammodo referente , sic ut ubicunque reponatur , abscondi non possit , sed suo odore locum gratiorem reddat : etiam paucillum in vola manus alatum , suauissimum spirat odorem uti lasmini ferè. Eius facultates insignes sunt , quoniam incisione elicitur , quemadmodum olim Balsamum in Ægypto , ad eadem omnia ad quæ illud celebrabatur , efficax. Omnia recentia vulnera , curat consolidat , glutinatque labra , nec materiam purulentam in iis exorti sinat : quodque maius est , nullum cicatricis vestigium curatis vulneribus relinquit , si comminuta probe iuncta fuerint , quapropter in faciei vulneribus singularis est , quandoquidem ea sine purulentæ materię generatione curat , nec vestigium vllum relinquit. Primum autem emundandum est vulnus ab omni spurcitie , & vino eluendum , deinde eius labra probe vnienda , Balsamumque subreptum illinendum , & lineus pannus duplicatus eodem Balsamo intinctus superimponendus , atque ita colligandus , ut labra hiare nequeant : postmodum victus ratio sit tenuis , secernenda que vena si necesse sit : quarto demum die solvatur ligatura (nisi symptoma aliquod anre soluere cogat) & vulnus consolidatum inuenietur. Quod si singulis diebus vulnus curare necesse sit , lineum pannum Balsami liquori intinctum subinde adponendo glutinabitur : etenim eius facultas est prohibere , ne materia in vulnere generetur. Præsertim verò utile est in vulneribus in quibus contracta sint ossa , exemplis prius iis quæ separata sint fragmentis , & reliquis intactis , quoniam Balsami facultas ea expellet , vulnusque sensim consolidabit. Miræ etiam virtutis est in articulorum vulneribus , & nervorum sectionibus , omnibusque puncturis , cum ea curat , atque à contractione liberat , ne partes inutiles fiant & motu priuentur. Altè penetrantia & cuniculosa vulnera curantur huius Balsami albo vino mixti per syringam iniectione , & post ternas deinde horas eius educatione : idem fit in vulneribus punctim inflatis , semel in die mediocriter calidum iniiciendo. Vtile præterea est in contusionibus , reliquisque chirurgi operam requirentibus , inodò nulla insignis inflammatio adsit : ea verò convenientibus medicamentis subblata , balsami est vsus. In motibus chirurgi operam minimè requirentibus plurimum prodest , veluti in asthmate , haustis eius aliquor ex albo vino guttis : capitis dolor è frigida causa prognatus lenit , lineo panno eius liquori intincto , capiti circumligato : & temporibus adpositum , omnem defluxionem cohibet , ita oculos præsertim , eorumque dolores leuat , calidum admodum cerebro impositum dolorem tollit , roborat , & paralyti remedio est. Vsi sunt eo nonnulli phthici , monè aliquot guttas è manu lambendo , magnamque senserunt commodum , quoniam pectus egregiè expurgat. Aliquor eius guttæ ex aqua vitæ collata initio rigotis in quarantis , aut terrianis diurnis & importunis sumptæ , utiles sunt , sed etiam ante frigus eodem balsamo feruenti oleo rutaceo permixto ceruices inungendæ. Si quis ab orificio vetriculi ad vmbilicū vsque inungatur , venter

tricus robotatur, & dolore libetatur, languens cibi appetentia excitatur, concoctio iuuatur, flatus discutuntur: at longè maiore efficacia istud molitur, si æquales balsami & olei nardini compositi vel simplicis partes misceantur, & facilius etiam illinitur. Longa experiëntia apud Indos probatum est, eos qui Hydropticotum in motem tument, si hoc balsamo æquis partibus cum vnguento aperitiuo mixto ventrem illinant, lienis regionem præsertim, magnum leuamen sentire: quoslibet tumores & edemata cuiuscunque partis corporis resoluit: omnes dolores à frigida causâ promanantes etiam diuturnos tollit emplastris modo applicatum, & continuè delatum donec sponte decidat. Eisdem effectus præbet aliud adpositum, lineoque panno, qui aqua vitæ selectissima & calefacta madeat superimposito, ubi sunt flatus siue in ventre, siue in alia corporis parte, magnæ est etiam efficaciz in nephritico dolore, si feruës cum aliis oleis ad eum morbum virilibus mixtum illinatur: contractorum neruorum dolorem lenit, & si per sumos æstus illo illinantur & fricentur, eos relaxat: parotides seu scrophulas tum excas tum appetas curat. Alias præterea multas facultates obtinet hic mirabilis liquor, quæ me latent, sed quas intelligere potui, vniuerso orbi notas facio, vt adeo præclaro medicamento & tam insignibus viribus prædito (quibusque longè plures & maiores tempus detegat) quilibet vti queat. Donatum se ait Clusius paxillo simili Balsamo à suo Morgano sub suum è Londino discessum anno 1581.

PLANTARVM AEGYPTIARVM ET

Syriacarum eiconica figura, & historia summa diligentia

& cura descripta à Leonardo Raruvolf

Medecina doctore Augustano.



KALI ARABVM PRIMUM GENVS.



PRIMUM genus Kali Arabum ab illis *Usnen*, ab incolis verò regionis, quæ hanc Plantam fert *Schinnan*, nominatum: ex cuius cinere Sapo fit, & vitri liquandæ instandæq; materiz nitrosa massa: (quam Galli vocant *Soude*.) Hæc Planta surculosa est, multisque veluti ramulis tenuibus venustè dispersa, in summis virgis hinc, illinc, nodulos multos edit, sub quibus folia emergunt angusta, tenuia, acuminata, (quæ forma, & facultate, minori Kali respondent,) infernè candida, supernè cinerea. Hæc non de foliis tantum, sed tota Planta intelligenda.

KALI ARABVM secundum genus.

Forma.



LYTHERVM genus Kali, multos quoque ramulos spargit & genicula plurima: Radicem habens crassam, lignosam, & colore.

CONYZA SYRIAE.

Locus.



IN cauitatem Tripolin, in Prouincia Syriæ, in multis locis gignitur, crescitque planta, quam Dioscorides, Græci & Latini Conyzam nominant. Ex cuius radice cauliculi multi gignuntur ad longitudinem pedis, quorum alij sese erigunt, alij vero, & maior coarctati in terram se humiliant, & prosternunt: ex quibus postea, nouæ radiculi lucre scunt, quæ rursus alios caules recentes producunt, vt possint multiplicari. Folia huius Plantæ sunt longa, Oliuæ similia, pinguis, aliquantulum hirsuta. Odor non exigui, suavis tamen, quæ sicut & flores Conyzæ maioris sunt limi es.

KALI ARABVM
secundum genus.

CONYZA SYRIÆ



BRASSICAE MARINAE GENUS.

Nomina.

Locus.

Forma.



IN Hortis, & locis incultis, & desertis, prouenit, Brassicæ marinæ genus, seu Soldanellæ, quod ab incolis Meudheudi à Rhafæ, & ad Almanforem, Corigiola nominatur, Germani Brasicam marinam, sua lingua, in vniuersum *Merkoul* appellant. Planta hæc crescit in arida & sicca terra, & locis arenosis, habetque radicem tenuem, huc illicque per terram diffusam. Folia eius sunt oblonga & parua, non vt in vulgari, rotunda, & euntibus in latera venis, tanquam virgata, ad pediculum cui insident, latiora, & quadrata, in summo veluti crenata. Flores ex turbinatis capitulis emergunt, quæ cum adolefcunt, in quinque foliola sese expandunt.

BRASSI

BRASSICAE *Marsia* genus.

FICUS CYPRIA.



FICUS CYPRIA.



EXTRA Ciuitatem Tripolin, conspiciuntur variz arbores, & inter alias, *Locu.*
multæ à Græcis Sycomori, ab Arabibus verò Mumeitz nominatæ, hatù
Dioscor. & Theophrastus, duo ponunt genera, quorum alterum Ficus *Genera.*
Agyptia dicitur, alterum verò Cypria dicitur, à loco denominatæ, vbi hæ copiosè
proveniunt. Huius Cypriæ nempe, quæ & in Syria frequens, arbores sunt magnæ,

PLANTA RARA

*Plantaginis longè similis.**Forma.*

proceræ, vt etiã nonnullæ altitudinem Mori
candidæ assequantur. Cuius folia & iis similia
sunt, nisi quod paulo sint rotundiora, & in am-
bitu minimè serrata, quater in anno fert fructus
suos non in caudice ipso & ramis grãdioribus,
sicut Agyptia, sed grominibus, ex hũce nascenti-
bus. Ficubus similes, minores tamen, Pruni
magnitudine, dulcioreſque. Qua de causa, cum
minus esui apti, vilioreſ habentur. Inopi tamen
plebeculæ venales exponuntur. Amant valles,
& loca plana.

PLANTA rara *Plantagini similis.*

DEſcriptionem Plantæ addere nolui, ne
ob vires occultas, quas attribuit Dioſc.
Veneficis innotefcat, & in abuſum veni-
at, quæ non tantum hac præcipua nota, quod
eiufdè primæ ſpeciei folia aſcetiã, ad formam
vnguiũ Milui exanimati, ſeſe cõtrahunt cogno-
ſcenda, ſed & reliquis omnibus, quas attribuit
Dioſco. Eam ob cauſam, illam tantam nomine,
Græcis characterib⁹ imptiſſo, inſcribere volui.

CYPRIVS

Nomina

Locus.

Forma.

Vfus.



re, tingunt. Ex radice huius arboris trita, vel vsta, Arabes Spodium parant, cuius Auicenna capite 17. meminit.

PLANTA LACTARIA.

Forma.

Nomina



& Sabeam, ab Arabibus vocatam, cuius, Rhafis, sæpius mentionem facit.

INIMIS quoque acris, & in Germania *Boysen* vocatur, *bolze* nominatur, *Ligustrum*, ab Arabibus *Alcanna* seu *Henne*, à Græcis nunc *podagry* & communi vocabulo *Sihema* nuncupatur. In Ægypto, & præcipue in Cæria, vixisse prouenit, eò defeatur. Hanc *Thunberg* & *Blomberg*, propter gratum & suauem odorem, similem, quæ flores exhalant, diligenter in se custodiunt, & Hyeme, ne frigore pereant, in cubiculis, & subterraneis locis, & in domibus eius sunt pallidi, subflauis, & odoratis. Ramuli flori concolores erant, quibus natis leuigatis dentes purgant, & in eum vendunt. Folia tota Hyeme durant, ex quibus, Succo Citrietum madefactis, liquorem extrahunt & recondunt, quo vngues digitorum, & oculos infantium, testis diebus, rubro colore, etiam equorum iugas & caudas, Turcæm co-

AVO procul ab Horto, & totidie oblata nobis est incognita Planta Lacte turgida, cuius flores & folia, deciderant: Alta illa fuit & plerumque duos, exte infusus a summo ad radicem usque scabra, nō quidem tota, sed hinc inde scaberrima illa apparet quam pictura ostendit. Sicca & intus concaua, Sambuci modo: coloris e flavo virentis, multos habuit ramulos, recta sursum se attollentes veluti arundinaceos tubulos, & compactos, non geniculis, sed scissura aliqua interfecta, ac si studio cultello esset facta, an interiore parte apparente, quæ ramis grandioribus intus minoribus, separatiim tufos, intus Lactis succo plenos, qui succus acris punctis, qui Tithymali lac, aut Esule. Ab Tocolis, nuncius eius, quamvis sæpe percuntatus sim, & non potui. Tandem, ut ex multis signis & coniecturis cognoscere licuit, iudicavi, hanc Plantam esse Xabra, & Camarrorum Rhafis, *Tanathus*, &

MELANTZANA ARABUM.



VIDIMVS quoque Plantam, Melantzanam, ab Arabibus *Melongena*, Nomina seu *Bedengia*, nominatam, trium generum, colore distinctorum, nempe Cinereo, Flavuo, & ferè Purpureo. Fructus oblongos, cur- *Forma.* uos, longæ cucurbitæ similes, procreat, & cuiuscunque generis sunt, inter se forma non discrepant.

MELANTZANA NIGRA.



MELANTZANAE nigrae, duo genera, Mauri vocant *Bathleschain*. Fructus longus, altus, aliàs rotundus, colore nunc atro, nunc sub- *Forma.* nigro, cortice lævi, & procul intuenti, splendido, qui, vt Auerrhoes inquit, salubrior est coctus, quàm crudus.

MELANTZANA,
*Arabum Melongena.*MELANTZANA
Nigra.

SECACUL ARABVM, PASTINACA STRIACA:

Germani Gerelen, sine Siferis Species.



EXTRA Halepi hortos gignuntur duæ raræ plantæ, quæ quia, in vul- garibus cibus commendantur, inter Hortenses poni, numerarique debent. Harum altera quam Arabes nominant *Secacul*, extra urbem *Locus.* Halepi, in locis opacis & sub arboribus, & in segetibus, reperitur. Radice lævi, fragili & tenera, foris coloris cinerei, & intus albi. Carne lenta, molli, *Forma.* & tenera. Ei crassities, digiti, sesquidigiti longitudo, pro fibris sunt, quædam tuber- cula,

cula, parua rotunda, instar verrucarum, grati, & dulcis saporis, qualis est nostræ Pastinacæ flauæ, cui carne, caule & umbella valdè similis est, sed floris colore flauo, qui in Pastinaca nostrâ, candidus est. Radices, circumferenciæ seplasiarij, verè, filo connexas, & asseruatas, publicè, multas magnâque quantitate vendunt, & distrabunt.

PLANTA SPINOSA, MAVRORVM ALHAGI.

- Nomina.** **P**LANTA rara Spinosa, Maurorum, *Alhagi*, *Agul*, & *Algul*. In eius fronde, præcipuè apud Persas, colligitur Manna, quam illi *Tranfchidun*, Arabes verò *Tereniabun* & *Trungubin* vocant, multis spinulis rubris ea liquata manum tractantis, pungentibus. Circa ciuitatem Halepi, Plantæ spinosæ multæ, nascuntur cubito altiores, ramulis teretibus, & rotundis quamplurimis, multis tenuibus & molliusculis hinc, inde, spinis rigentibus. Spinibus riget Planta hæc, sunt subcinerei coloris quemadmodum & folia, quæ Polygono sunt simillima sed siliquulas habet rubras, quæ & semina eiusdè coloris continent, quibus etiam hæc Manna scaet. Flore purpureo, ex capitulis paruis & rubris, quibus oriuntur siliquulæ, scorpiodi, vel Colutæ Scorpiodes simillimæ. Intus eiusdè coloris semina concluduntur. Radix medioctiter longa, fusca. Folia longiuscula, Gramini vel potius Polygono similia, cinerei coloris, circa spinularum radicem exeunt. Sicut Cuscuta variis sese implicat plantis, ita hæc spinam illam fere totam circumuolutam reperi. Temperamento, calida & sicca, incolæ, decocto horum foliorum, corpus purgaturi vnius manipuli decoctum, in aqua fontana, pauca paratum, bibunt. Manna, quæ his arboribus illabitur, *Tinamiabin* à Costa vocat, cap. 66. & *Carduis* insidere, scribit.
- Locus.**
- Forma.**
- Temper.**

SECACUL ARABVM,
Pastinaca Syriaca.



PLANTA SPINOSA,
Maurorum Alhagi.





S Oe rarum genus Salicis, extra ciuitatem Halepi nascens incolis Salsaf nominatur. Mnkæ hæc arbores ibi crescunt, magnitudine tæquales, sed trunco, ligno, ramis similes Beulæ, & præsertim virgis, quæ lōgæ, prætenues, flexiles, pallentis, subhau, aut sublutei sunt coloris, quibus insunt folia oleagina, supernè virentia, infernè candicantia, Vitiæ similia, & in caudice, ramisq; grandioribus germina, instar Ficus Cypriæ. At non sunt illa sine foliis, è quibus in Vere prodeunt, flosculi tenues, molles, & lanuginosi, populi albi, pallidi, & iucundi odoris. Incolæ hos flosculos, eo quod nullum ferat fructum, auellunt & colligunt, aquamq; ex illis igne eliciunt, cordi roborando conuenientissimam & valentissimam. Has arbores Arabes vocant *Zarneh*, & *Zarnabum*, vt Rases cap. 353. & Auicenna ca. 749. Serapio verò cap. 26. cōmuni nomine *Zurumbeth*, prout ex eorum scriptis cognoscimus. Arbor hæc non videtur esse Ziziphus Cappadocia, eodem ferè loco sub nomine Seifefun describo. Siquidem hæc quæ & in Syria frequens, fructifera, illa verò cuius suprà mentionē facio, sterilis est. Præterea memini me & Ziziphi speciem aliam describere, folio 461. Hæcæporici mei, quam & in finibus Tyri & Sidonis reperi, quæ videtur omnino respondere Paliuro Theoph. Ibi, qui præterea quid cupiet plura inueniet.

Forma.

Nomina

MORGSANI STORVM.



P LANTAM hanc raram, Syri Morgsani vocant, aspectu pulchram, ac elegantem, valde virentem, mediocriter crassam, & frondosam, radice longa, minimè succulenta, sed sicca lignifera modo, ex qua cauliculi aliquot erumpunt. Foliis rotandis Cappari similibus, vtrinque binis semper, & eodem ortu, vt in Faba. Inter hæc prodeunt flores, intus rubri, extrinsecus albi, quibus succedunt siliquæ oblongæ, quales Sesami: Plantæ toti ingratus inest sapor odorque grauis, incolæ illa vtuntur lumbricis necandis, & depellendis. Quo autem nomine Veteres illam appellarint, dubitant, imò nesciunt. At ego, ex descriptione, & facultate illius suspicor esse Ardifrigi Auicennæ, & Andirian Rhafis.

Forma.

Vs.

Forma.



Genera.

ASTRAGALVS DIOSC.
vulgo Christiana radix.

Forma.



ANEMONES genera, floris
lutei, purpurei varietate, di-
cta, aspectu pulchra, quæ Anemones
Sakaick vocant. Inisdem locis
seuntur genera aliquot Anemones venusta ac
insignia, vario floris colore, aliis rubro, aliis
purpureo, nonnunquam luteo, quæ
communi nomine Sakaick appellantur. Anemones
men addentes è floris colore sumptum, Anemones
Sakaick achmar, Sakaick alfar, Sakaick aserach,
id est, Anemone, rubra, purpurea & lutea

ASTRAGALVS DIOSCORIDIS,
vulgo Christiana radix.

REPERIVNTVR iis in locis, Astra-
gali genera duo, alterum foliis
parvis Hedy sarî, siue Securidacæ,
aut quomodo quidam per-
tinent Securidacæ alterum, quod descriptum
Dioscoridis omnino respondet, ac ideo mihi
verus Astragalus esse videtur. Frutex est ex-
iguus, radice fusca, longa, magnitudine Rapha-
ni grandioris ex qua prodeunt cauliculi nigri,
ipsa radice duriores, alij in terram inclinantes,
alij in altum assurgentes, fastigio, velut in con-
stua diviso, gustu dulci, cum medioeri siccitate
& adstrictione. Cauliculorum qui è radice na-
scuntur, & in terram flectuntur, idem est co-
lor, longitudo verò digitalis. Ex his spulsi-
luci ramuli diffunduntur, in quibus folia Lentis
aut Orobi, ex aduerso, bina semper, novem
aut vndecim. Flos, purpureo, fusco & cæru-
leo, distinguitur. Semen, in folliculis densis &
carnosis, statu distentis, Coluteæ modo, con-
tinetur. Depictæ radici non dedit proportionem,
quamvis enim exigua sit Plama, munus
tamen longè apparet in cicone, quàm in vno

CHONDRILLÆ, ALTERUM GENUS
DIOSCORIDIS.

AN Agris cultis, & terræ aggeribus nascitur secundum genus Chon- *Locus.*
drillæ Dioscoridis, radice rotunda, satis crassâ, lævi, nigra, aut fusca,
cum in altum excreuit, forma & crassitie vnus digiti. Longitudine *Forma.*
digitorum quinque, ac interdum octo, tanquam bulbofo, inferne
tuberculo, Castaneæ simili, quod Lacteum succum fundit. Ex summa radice, cau-
liculi ferè tres oriuntur, folia Graminis, longa, tenuia, multa in terram flexa, flos-
lureus, ac flauus, auriculæ Muris similis, inter illa prodit: florum cuique suus est
pediculus.

CHONDRILLÆ ALIVD GENUS
DIOSCORIDIS.

Non procul ab iis locis quæ memorauimus, in Agris lapidosis & aridiori- *Locus.*
bus, prouenit alterum genus Chondrillæ Dioscoridis, superiori-
quam descripsimus, radice & flore similis. Foliis vero, quæ sola dif- *Forma.*
ferentia est, latioribus & crassioribus, colore cinereis, & ferè talibus,
qualia nos in Holostio Mompelij vidimus.

CHONDRILLÆ,
alterum genus Dioscor.



CHONDRILLÆ,
aliud genus Dioscor.



HISTORIÆ GENERALIS PLANTARVM,
CHRYSOGENVM DIOSCORIDIS

Forma.



CHRYSOGENVM Plantago inter Segetes, ad cultum rusticum confurgit, quam inter segetes, & tuberola radice, quæ in segetibus, Leontopetalo valde comperi, differunt tamen inter se, eo quod Chrysogoni caulis, exilior & tenuior est, plures veluti furculos diuisus, a se mutuo separatos, in quorum vertice aureus flos emittitur, coronis aptus, formosior, & copiosior, Volutæ quàm in Leontopetalo maiores. Exeunt ex radice superiore parte, quæ è terra profuit, tres aut quatuor ferè furculi. Plerumque quatuor apparent, nec memini me tres reperisse. modo tenues, in quibus folia sunt ex altera vtrinque bina, obscurius virentia, humi stant, in summo & extremo, qua parte latiora sunt, Quercus modo dissecta.

LYCOPSIS DIOSCORIDIS.

Locus.

Forma.



IN eodem agro, vidi plantam raram, Cynoglossi genus, & vix bitror veram Lycopsin Dioscoridis, radice rubra, caule recto, bicubitali. Foliis multis, asperis, duris, Rubi modo, aut Sylvestris Cynoglossi scabris, prope radicem in orbem circumiectis & distentis, superiori parte caulis, non sic dispositis, hinc inde è caule prodeuntibus, & in summo & vertice acuminatis, furculis parvis, tenuibus, numerosis viginti, aut pluribus, nudis, foliis nullo vestitis, vt in Echio. In horum summo flores purpurei micant, exiles, extrinsecus minimè diuisi, intrinsecus verò in sex foliis spertiti, vt in Sylvestri Bethonica.

MAVRORVM RHASVT, ET RUMIGI.



DESCRIPTEE Lycopsidi, vicina fuit planta rara, & nobis incognita, quam incolæ Rhasvt & Rumigi nominant, odoris exiguus, sed haud quaquam gratus. Ramulos habet *Forma.* albicantes, plerunque quatuor, aliquando plures, prope radicem, filia modo, valde tenues. Folia circiter septem, vel octo, tenuia, mollia, cinerei coloris, ex aduerso bina, ab utraque parte sita & inuicem sibi obiecta, magnitudine, longitudine, & incisuris, florenti Filici similia, nisi quod adnatas habent, ad exortum suum, Lacinijs duas, velut auriculas quoddam rotundas, omnino folij principio coherentes & coniunctas, ut in Salvia minori. Quaparte, folia cauliculo adnexa sunt, exeunt flores Aristolochiæ similes, aliquanto maiores, colore magis fusco, & longiore pediculo subnixi. Radix longa, satis profundè demissa, gustu amara, unde cognoscimus, eam siccare, & nonnihil calfacere. Plantam hanc non in-

commodè ad Aristolochias referri posse existimo.

TRAGIVM ALTERVM DIOSCORIDIS,

Secudes & Sucudum Auicenna.



TRAGIVM riuiolos & aquosa loca, nonnunquam & in Monrosis, frequenter nascitur Tragium alterum Dioscoridis. Radice longa, tenui, candida, ex qua prodeunt lignosi tanquam surculi graciles, digito non longiores, à quibus consurgunt folia multa simul longa, quæ rursus multis foliolis à latere utrinque dispositis cinguntur, Saxifragiæ rubræ, Trichomanis modo, paulò longioribus. Cuiusmodi in Aspleno apparent, quæ lanuginosa, præsertim minora, quæ inter alia oriuntur. Flores huius Plantæ iam primum tum temporis incipiebant apparere, ita ut nondum potuerim illos exactè cognoscere. Flos violaceus & fuscus, oui figura stipatus, sui & peculiaris pediculi fastigio, euehitur. Incolæ hanc plantam Secudes appellant, quo nomine & Arabibus fuit cognita præsertim Auicennæ, cap. 679. qui facultatem illi astringentem attribuit, & Dysentericis vtilem esse tradit. Aliam *Locus.* *Forma.* *Vul.*

tamen Plantam suprà descriptam, Secudes Arabum esse, quidam potius existimant.

Forma.



DIVINGENDAM his Plantam, raram Lilly dicitur, & argentinam, pinxerunt, quoniam Pharsinacopolis ciuitas Phalapi, raturant in locis aquis provenire. Caulis procerus est, crassitie & colore Lili non dissimilis, sed latior, præcipue circa vasa, quæ in parte, latitudinem, quæa occupant, præcedit. Undique quantum potuit, eriguntur, & tenuia, longiuscula, tendula, & quæa, acceperunt. In eius summo calycis o a quoribus candidi, nostratibus, similes videntur. Plantam, quidam esse valentem Lilium, & Phraslo memoratum, locis, & apud Phraslo de Stratiote aquarico Theophrasti, verba intelligenda sunt, cum meminit, Aristoteli lib. 14. & Plinius cap. 15. lib. 24.

GARAB MAVRO RUM.

Forma.



Viti.



ARAB MAURO RUM, sicut & peregrinum Salicis, genus, & quoniam Aphronitrum, Salicis Peracant optimum habetur, & quoniam parando, quo in bellicis tormentis, & cutiendis utuntur. Appiæta Platarum, & quoniam genus est Salicis. Incolæ apud quos, scitur, etiam nunc veteri Arabum nomine Garab vocant. Hæ Arbores non nebulosæ, sed altum attollunt, sed humiliores huc, & illuc diffundunt virgas crassiores, & firmiores, quoniam nostrarum Salicum, ideoque minus vegetæ, & ad ligaturas aptas, cortice luteo utuntur, & pallescente, quem & folia habent, quæ ad altum longa, duos digitos lara, in ambus formata. Attriplicis modo duos digitos longa, quæa ab aliis Salicibus differunt: modicè quodvis servare potui, sicant & adstringunt in a 326. & cap. 686. meminit, quoniam con-temporè nec vidi, nec quicquam alius cognoui, nil certi scribere possum.

TRIOTON

TRIONVM THEOPHRASTI.



TN agris Planta rara gignitur, ob altitudinem facile spectabilis. Sefamo non dissimilis, sed caule longiore & crassiore. Foliis asperioribus circa extremum, in tres partes a se distantes & separatas, fissis, quod in Sefami foliis Salici, longitudine & colore similibus, non conspicitur. Ex imo foliorum, eo quod certis intervallis prodeunt, emergunt Flores, aspectu pulchri, foris, lutei coloris, cum rubentibus vixulis, intus verò, purpurei ad fuscum vergentes, in quorum medio extant parvi torulei, quibus post florum lapsum, vascula succedunt in modum siliquarum, longitudine ferè & crassitie digiti, extrinsecus aspera, & in summo acuminata, intrinsecus in quinque veluti loculos divisa: quibus continetur digestum semen omnino Pisif simile seminibus Maluz, vel Ibisici, quod pro Abutilo Auicennæ habetur. Planta hæc ab illis, *Lube Endagi*, id est, Indicus Phaeolus vocatur: ni fallor, puto esse Trionvm Theophrasti, cuius ille sæpe mentionem facit.

Forma.

Nomina

TEREBINTHVS INDICA, prior Theophrasti.



TN officina pharmacopolarum, Terebinthi fructus passim venduntur gustu pistacii simili. Incolæ autem videntur ubique, ut nostri Germani Acellanis. Ego cum manderem, lenè lalsedinem in iis cum mediocri siccitate, deprehendi. Arabes *Botin*, Persæ *Thebaick*, nominant. Horum duo sunt genera, magnitudine distincta, maiores qui dem Arabes, ut differentiam indicent, *Botin quibor*, id est, magnos, minores, *Botin Souger*, id est, paruos, appellant. Maiores, figura similes sunt nostris Pistaciis, mediocri magnitudine, non tamen sic longi ut Pistachia, sed globosius magis. Minorum ea est magnitudo, ut quæ Pisi habitio ris, forma turbinata, ut Cordis, siue Milij Indici, quorum magnus est in Perside, Mesopotamia, & Armenia proveniunt. Quæ hos fructus profert Terebinthi, ubi hic nascuntur, folio, aliàs longo, ut in Terebintho nostrate, aliàs maiore & rotundiore, quale est Pistaciorum sequentis arboris depictæ, quibus folia sunt sub-

Nomina

Genera. c

Locus.

Forma.

longa, ut in Terebintho nostrate, non ut in Pistachiis rotunda: ita ut hæc primo intuitu, dignosci hæc possint.

RIBES ARABVM, cum suis Capreolis.

Locus.



N edirissimis locis montis Libani, præter Scottzoneram, luteo flore & Tulipam, sub flauis Ribes veram, ego quoque reperi, sed Autumno incommoda Plantis inuestigandis anni parte, sine flore, ac semine, duobus ranrum foliis recenter enatis, asperis, rotundis, Petasiti similibus, pediculo quidem breui, subnixis, sed crassiusculo: radice satis longa, magna, dura, incurua, rugosa, colore fusca, saporis, odorisque ingrati Gaude humidis & opacis locis. E iuncea huius plantæ Capreolis, extrinsecus scabris, & rugidis, supernè virentibus, infernè rubris, quod etiam tradit Scapio. Caulibus fructu & foliorum pediculis, succus acidulus exprimitur, vt ex nostratis Ribes vua & acinis, quo Rob Arabes parant, viris primariis, ac dignioribus, quoniam magno pretio habetur,

Forma.

TRAGACANTHÆ ALTERVM GENVS

Locus.

Genera.

Forma.



Locis a monte Libano in descensu occurrunt tria Tragacanthæ genera. Quorum primum, cuius doctissimus vir Carolus Cusius ineminor, verè videtur esse simillimu. Alterum illo quidem hominilius, forma ramen, aspectu & habitu, haud dissimili, nisi quod floris flauescunt, ex rotundis & subflauis, tanquam vasculis exeuntes, & per totius culos, vtrinque impari exortu, sinr dispositi. Tertium est altitudine & statura simile secundo, ramos habet densos, oblongos colore, fusco in quorum vertice, capita multa subalba visuntur, qualia sunt Poterij cū floribus, puri pures & spectati.

RIBES ARABVM,
cum suis Capreolis.*TRAGACANTHÆ*
alterum genus.

MEDIUM

*MEDIUM DIOSCORIDIS, VEL
MINDIVM RHASIS.*

VLERIVS progrediendo, in locis obscuris, vmbrosis & opacis, *Locus.*
inter arbuscula, vidimus Medium Dioscoridis, seu Mindium Rhasis,
insigni proceritate, Violæ Marianz, Dodonzi, simile, foliis Planta-
ginis minoris, valdè Laciniatis, à se inuicem multum separatis, flore *Forma.*
lato & amplo, purpureo, nonnihil albicante, foliolis octo reclusum & apertum,
cingentibus. Maturum semen videre & colligere, non licuit. Historiæ Dioscori-
dis profus hæc planta, conuenire videtur.

BACCHARIS DIOSCORIDIS.

PLANTA hæc, quam pro Bacchari Dioscoridis nos ostendimus, fru-
tcosa est, altitudine cubitali, foliis lanuginosis & albicantibus,
Verbaſci modo, eo minoribus, quæ veluti exulta, sima sui parte,
sine pediculo, caulem amplectuntur, vt in Nicotiana siue Tabaca.
Flos in ima parte, & summis virgis nitet; purpureus, subalbicans, densus & valde *Forma.*
stipatus, qualis Elichrisi, vel auriculæ muris, seu Pilosellæ Fuchsi. Radicem effo-
dere non potui. Ea si Verarro similis est, & odorata, vt videtur esse, prout ex pau-
cis fibris in illa relictis apparet, veram Dioscoridis Baccharim esse iudicarem.

MEDIUM DIOSCOR
vel Mindium Rhasis.



BACCHARIS
Dioscoridis.



GINGIDIVM DIOSCORIDIS.

Forma.



GINGIDIVM illud nostratū haud absimile est, sed folio fœniculi tenuiore, gustūque amariore, quā sylvestris Pastinacæ nostratis, cui in cacumine umbella alba, & in medio purpureū quiddam apparet, ē quibus semen prodit, quod altera parte intrer squamulas, quibus, quali corolla circumdatum, extuberat forma rotunda Coriandri, minori tantum, quo maturescēte, tota sese contrahit umbella, radix parua, candida. Ex his scilicet notis Gingidium Dioscor. esse ego censui.

MAVRORVM BELLAN, FORTASSE

Sanguisorba spinosa.

Locus.



Forma.

RVTIX in declivi montis Libani parte nascens, furculis compluribus cubitalibus, foliis renellis, longiusculis, in pediculis ordine ex aduerso positis, supernis virentibus, infernē cineris, nostræ Pimpinellæ, Sanguisorbæ similibus, cui hæc Planta, tam formā, quā viribus, astringente nāmque & exsiccante, videtur admodum respondere. In summis ramulis eminent spinæ, ē quibus alix deorsum, alix ad larus, quamplurimum aurem sursum spectant. Ex iis tempore Veris præsertim eminentioribus, strobili prodeunt, ē viridi pallentes, stellari, quibus succedunt baccae albicantes, magnitudine Piperis, cum rubore nonnihil conspersæ, racematim coherentes, ut in viti Ribes nostratis, quibus similes sunt. Bellan incolæ nominant, quidā Hippophacn Dioscor. esse existimant, sed, quod in multis descriptioni non respondet, inter Pimpinellæ, Sanguisorbæ species videtur recensendū.

Nomina

GINGIDIVM,

Dioscoridu.

MAVRORVM BELLAN,

fortasse Sanguisorba spinosa.



BEHMEN

BEHMEN ABIAD ARABVM,
Id est, BEHEN ALBVM.



• ELEGANS
genus Limonij.



Ad radices Libani, umbrato solo loco, & aquoso, geruntur veru Behen album Arabu, quod et iam hodie in Arabia, Behmen Abiad vocant, ut dicitur in Libani, Behmen Ackmar. ea plantis, in fine iam Hyeme, fere interierat, multis ramulis & foliis exlicentibus & atefactis, velum alio loco, noui amuli & furculi extiterunt, ut Ve. is tempore germinare solent. Folia, longa, spissa, qualia Oxipathi. in huiusmodi parte, foliis Lacinae quatuor, ex aduerso binæ: at quæ ex ante superiorem nascuntur, longitudine aequali amplectuntur illam sine pediculo ut in Persicaria vulgaris, & Syris, in Cretico. In caulis fastigio, linculi prominent, cum foliis minoribus oblonga, flaua, squamola capitula sustinentes, & quibus prodit flauus quoque flos. Radix longa, geniculata nullis capillata fibris, serpit intus Glycyrrhizæ, quæ simulatur & forma & crassitie, sed intus alba potius, quam flaua. Quod autem scribit Aucenna huius Plantæ radices contrahi & corrugari, conspicitur id quidem, in etatis & inueteratis, non in gracilioribus, & nuper enatis.

Locus.

Tempus.

Forma.

ELEGANS GENUS
LIMONII.

In opacis & humidis locis nascitur elegans genus Limonii, decem aut duodecim foliis, Aspleno similibus. Radice oblonga, extrinsecus fusca, intus rubra, duobus aut tribus ramulis, inter folia exorientibus, cubitum altis, in quorum vertice multi furculi emicant, cum tribus foliis longis & tenuibus, quæ illos circumdant, flore purpureo aspectu pulcherrimo, flores & futeuli sicandi vim habent Eos mensis apponunt, incolæ pro acetariis, folia tantum.

Locus.

Forma.

Vires.

SCHEHA

SCHEHA ARABVM, ABSINTHII GENUS.

Locu.


Forma.



IN CA Bethlehemi prouenit, copiosum Absinthii genus, cinereis, quale est nostratis ramulis tenellis multis, in quorum vertice, semen copiosissimum est grauis odoris, qui nauseam moueat, etiam velle molestem, gustu acre, salsum, amarum. Hanc Plantam Arabes Scheha vocant Semen vultu nutissimum est, semen Zina, lumbricis candis vtilissima: quam obrem semen vermes Mercatores, qui vendunt & c. nuncupant.



FINIS APPENDICIS.



INDEX APPENDICIS

HISTORIÆ GENERALIS

PLANTARVM.



<i>Conium Pardalianches primum.</i>		<i>Macerii Bracmenici facultates.</i>	3
pag. 16.		<i>Macer Dioscoridi.</i>	ibid.
<i>Ananas à Costæ.</i>	12	<i>Macer Galeni.</i>	ibid.
<i>Anemone, & eius genera.</i>	26	<i>Maci & Macerii discrimen.</i>	4
<i>Astragalus Dioscoridi, & eius genera.</i>	ibid.	<i>Maurorum Bellari sive Sanguisorba spinosa.</i>	14
<i>Aureliana Indica à Costæ.</i>	7	<i>Medium Dioscoridi vel Mendi Rhasis.</i>	23
B		<i>Melanzana, Arabum Melongena.</i>	23
<i>Balsamum Tolutanum.</i>	17	<i>Melanzana nigra, & eius genera.</i>	ibidem
<i>Baccharis Dioscoridi.</i>	33	<i>Morgani Syrorum.</i>	21
<i>Behmen abiad, sive album Arabum.</i>	21	<i>Musa à Costæ.</i>	11
<i>Betre Garcia ab horto.</i>	12	N	
<i>Brassica Marina genus.</i>	20	<i>Nardus Indica Garcia ab horto.</i>	11
C		<i>Nux Moschata à Costæ.</i>	4
<i>Canella à Costæ.</i>	1	P	
<i>Carcapuli eiusdem.</i>	12	<i>Palma Indica, quæ & Elephantis, & eius</i>	
<i>Caryophyllus eiusdem.</i>	1	<i>genera.</i>	7
<i>Chondrilla Dioscor. alterum genus.</i>	27	<i>Palma Indica nux Persis Narel & Nar-</i>	
<i>Chondrilla eiusdem eiusdem genus.</i>	ibid.	<i>gel.</i>	ibidem
<i>Chrysogonum eiusdem.</i>		<i>Piper nigrum à Costæ, & eius genera.</i>	6
<i>Coccus Palme Indica cortex.</i>	9	<i>Piperis ferendi modus.</i>	ibidem
<i>Conyza Syria.</i>	20	<i>Planta rara Platagini similis.</i>	21
<i>Crocus Indicus à Costæ.</i>	11	<i>Planta Lactaria.</i>	22
<i>Cuciphera Martholi.</i>	2	<i>Planta spinosa, Maurorum Alhagi.</i>	24
<i>Cypripis Græcorum.</i>	22	R	
F		<i>Radix China à Costæ.</i>	10
<i>Ficus Indica à Costæ.</i>	11	<i>Rhasis Maurorum vel Rumigi.</i>	29
<i>Ficus Cypria, & eius genera.</i>	21	<i>Ribes Arabum cum suis Capreolis.</i>	22
G		S	
<i>Garab Maurorum.</i>	20	<i>Saffas Syrorum.</i>	21
<i>Gingidium Dioscoridi.</i>	24	<i>Scheha Arabum, Absinthij genus.</i>	26
<i>Guayausa.</i>	17	<i>Secacul Arabum, Pastinaca Syriaca: sive Si-</i>	
K		<i>serij speciei.</i>	22
<i>Kali Arabum primum genus.</i>	19	T	
<i>Kali Arabum secundum genus.</i>	20	<i>Tamarindus à Costæ.</i>	9
L		<i>Terebinthus Indica prior Theophrasti, & eius</i>	
<i>Lilium album Syriacum.</i>	20	<i>genera.</i>	22
<i>Limonij elegans genus.</i>	21	<i>Tragacantha alterum genus.</i>	ibid.
<i>Lycopsis Dioscoridi.</i>	28	<i>Tragium alterum Dioscoridi.</i>	29
M		<i>Trionum Theophrasti.</i>	21
<i>Macer à Costæ.</i>	2	F / N / S.	







S.N.IV.3

